

FELICIS PLATERI
quondam

ARCHIATRI ET PROFESS.
BASIL. ORDINARIJ

PRAXEOS MEDICAE

Tomi tres.

Quorum summam sequens docebit pagina.

Quibus accessit

QVÆSTIONVM MEDICARVM
PARADOXARVM ET ENDOXARVM

CENTVRIA POSTHVMA.

Studio & opera

THOMÆ PLATERI D.
Felicis fratris

IN ACAD. BASIL. ANATOMICI BOTANICIQ.
PROFESS. ORDINAR.

Nunc primum in lucem edita.



61461

BASILEÆ, IMPENSIS LVDOVICI REGIS
TYPIS IOANNIS SCHRÖTERI.
MDCXXV.

61461

61461



61461

TOMVS PRIMVS

agit

DE FUNCTIONVM LÆSIONIBVS

*libris duobus, quorum primus Sensuum;
secundus Motuum lesiones
continet,*

*Illarumq; Symptomata, in generibus: Morbos
eorumq; Causas, in causis: & Curam
in curatione proponit.*

TOMVS SECVNDVS

tractat

DE DOLORIBVS, LIBRO VNO, QVI

*tertius totius est Operis, atque itidem Dolorum Sympto-
mata, in generibus: Morbos eorumq; Causas,
in causis: & Curam in curatione
exhibet.*

TOMVS TERTIVS

recenset

VITIA LIBRIS DVOBVS, QVORVM

*primus Corporis: secundus Excretorum vitia continet,
singulaq; illorum Symptomata, in generibus:
Morbos eorumq; Causas, in causis: &
Curam in curatione declarat.*

Omnia methodo nouâ, sed facili & perspicuâ, hætenusq;
diu desideratâ, descripta: nec solum veterum neoterico-
rumque, sed & propriis obseruationibus,
ac remediis innumeris referta.

TOMI PRIMI
DE FUNCTIONVM
LÆSIONIBVS

Libri duo.

PRIMVS est de Sensuum Lætionibus;

SECUNDVS Motuum læsiones continet.

Singula illarum Symptomata in generibus:
Morbos eorumque Causas, in causis:
& Curam in curatione
proponens.



*Ad Illustrissimum Potentissimumq; S. Rom. Imp.
Principem,*

**FRIDERICHVM DVCEM
WIRTEMBERGENSEM ET TECCEN-
sem, Comitem Montisbeligard. Dominum in Heiden-
heim, Equitem ordinis Regij Francorum
& Anglorum,**

Principem Dominumq; meum clementiss.

FELIX PLATERVS ARCHIATROS BASIL.



*VM sanitatem hominis conseruandi, amissamq; recuperandi
scientia, Illustrissime Princeps, primis mundi atatibus, qui-
bus olim ob innatum corporibus vigorem, firma valetudine,
longo annorum spacio homines fruebantur, non adeo esset ne-
cessaria, inculta ferè remansit. Seculorum verò successu,
declinantibus numero annorum & robore virium, corpori-
bus, atque sensim propter intemperantiam, morbis inuale-
scentibus, necessitate urgente, qua omnium rerum usum in-
trodixit, paulatim excoli cepit. Vnde non mirum, primum
à Grecis, qui quod voluptatibus & luxuria perquam dediti*

*essent, omnigenos morbos sibi conciliarunt, fuisse luculentius traditam; post ab Arabibus
multorum remediorum accessione locupletiore factam; sicq; subinde à sequentibus, an-
tecessorum vestigiis insistentibus, nouarum obseruationum, variorumq; medicamento-
rum cumulo adiecto, eousque auctam, vt quantum miseria nostris temporibus per morbos
acceffit, tantum felicitatis per multifariam rerum naturalium cognitionem, ex altera
parte, hoc modo Dei prouidentia, pulcherrima quadam veluti contemperatione facta, sit
additum. Quod cum ex Anatomica corporis humani descriptione, omnibus numeris ab-
solutissime à nostris tradita: tum ex simplicium & compositorum medicamentorum, anti-
quis incognitorum, inuentione, cognitione & accurata preparatione abundè liquet.
Cum enim Medicina ab experientia, duce & comite ratione, originem traxerit, ab ea-
demq; incrementum sumpserit, & perfici oporteat indies, nec eam certitudinem habeat,
quà alia scientia, qua legum diuinarum humanarumq; autoritate, omni exceptione ma-
iore nituntur; nunquam ita absoluta omnibus suis partibus futura est, quin Magistra ex-
perientia, semper ei aliquid addere, aut quod ante ignorabatur, aut etiam quod tanquam
certum exploratumq; diu fuit habitum, detrachere mutare ve iure suo quodam possit. Idq;
quia non vnius aut plurium hominum, imò ne quidem integrarum atatum est, omnia sin-
gularia euenta & casus, ita perfectè obseruare, vt aliis quod notent nouum, atq; à receptis*

diuersum, non sit reliquum: maximè cum multi, ambiguas potius coniecturas, quàm rationem & experientiam certam secuti, plenior in quibusdam rerum notitiam assequi nequiverint, aliosq; secum in opinionum suarum patrocinium, quæ vim sapiusculè veritati facere solent, pertraxerint. Vnde non modò non vitio verti, sed potius summæ laudi dari debet illis, qui quod longo usu, multâ lectione, diligenti & assiduâ rerum perscrutatione compererunt, in commune hominum còmodum, publicæ magis quàm priuatæ utilitati studentes, animo prompto & fido conferunt. Quod ego, Princeps Illustrissime, apud me perpendens, veritatis studio iam inde à prima adolescentia flagrans, totis annis quinquaginta, quibus arti Medicæ operam nauo, annis quadraginta quatuor, quibus Meditinam facio; triginta & eo amplius, quibus eam publicè in Academia Basileensi doceo, atq; Archiatri officio insuper fungor, longo hoc temporis defluxu, dies noctesq; id egi, atque in eo totus fui, ut veram aliquam & solidam huius artis cognitionem adipisci possem. Atq; ideo in scrutandis, conquirendis & conseruandis rebus naturalibus, etiam ex remotissimis quibusq; orbis partibus petitis, nullis laboribus, nec sumptuum impensis peperci, ut supellectilem meam medicam, multis rerum millibus constantem, in immensum usq; augerem. Corporis quinetiam humani structurâ & usum, tanquam totius artis basim, assidua lectione, & crebrò facta sectione, ut probè cognoscerem, operam dedi; atq; ante annos aliquot tabulis succinctè comprehensa, publici iuris feci. Deniq; ut ad usum non tam propriū meum ipsius solū, quàm publicum multorum omnia referrem, cum vitam longam, quæ in arte longa, penitus cognoscenda, requiritur, eamq; satis firmam Deus mihi hucusque, suâ gratiâ concessisset, quippe sexagenario iam maior quinquennio, ut quid indefatigato studio, diuturnâq; experientiâ congesserim, obseruauerim, & in multos annos presserim, publicè constaret, specimine de Febribus nuper præmisso, absolutam praxin medicam edere decreui, hortantibus ad id, non solū coram, sed etiam literis, precibus, precio, flagitantibus, urgentibus, & prouectam ætatem meam, ne fortè mors conatus meos præueniret, considerare iubentibus, clarissimis quibusq; Medicis, qui me in scholis docentem, disputantē, multaq; noua proponentem, vel audiuerunt ipsi, aut etiam ex aliis, vel scriptorum meorum lectione cognouerunt. Quorum monitis crebris & indesinentibus tandem morigerandum, tractatumq; hunc practicū in lucem dandum, censeui; in quo vnicè mihi fuit propositum, veritatem quantum possem sectari, nulliusq; in verba magistri iurare; quæ rationibus firmis, experientiâq; certâ vera esse comperi, pro veris asseuerare: quæ verisimilia, vel incerta & dubia, etsi ab aliis tanquam certa venditarentur, quid de illis mihi videatur, ingenuè profiteri; quæ incognita, ex effectibus potius quàm causis diiudicare, neq; obscura, ut vulgo fit, quia sibi turpe fore arbitrantur, ignorantiam quorundā fateri, rationibus longè obscurioribus, magis obscurare. Quod quàm laboriosum mihi fuerit, qui totius meæ ætatis curriculo in eo sudauerim, consenuerimq; ac labores intollerabiles praxin medicam comitari solitos, nihilominus sustinuerim, æquus & candidus lector facile est iudicaturus. Cæterum, cum aliorum potius quàm mei ipsius iudicio, rem non levis momenti suscepisse, & in ea magnum opera pretium fecisse, iudicer, magno quoq; Patrono ac defensore, ad splendorem meo operi adferendum, suôq; patrocinio illud defendendum, opus esse cogitavi. Occurrit verò inter potentissimos Principes, quorum Illustrissima familia, consilio & opera medicâ aliquando inferuiui, maior nullus, Celsit. T. Dux Illustrissime, cuius potentissima defensionis, opus hoc meum consecrarem, cuiusq; sub nominis toto Christiano orbe celeberrimi protectione, in apertam lucem, & litterarum conspectum producerem. Ad quod facien-

dum, plures me cause impulerunt; quod praxeos medica mea initium quasi, apud principes Illustrissima stirpis Wirtembergica, ante triginta & aliquot annos fecerim, medendoq; primum innotuerim, inclaruerimq; post magis magisq; & quod superstiti adhuc Illustrissimo principe Georgio, felicissima memoriae, T. Cels. parente, in aulam illius, consilij communicandi causâ, fuerim vocatus; & paulo post mortem Illustrissimi Principis Christophori, Ducis Wirtembergici, T. Celsit. patrueis, laudatissima memoria, ad relictam viduam, generosissimam matronam, similiter sapius accersitus, ipsi & filio Illustrissimo, Duci Ludouico, sancta recordationis, per multos annos, sapius consulendo, medendoq; subsidiariam praestiterim operam. Cuius rei memoriâ T. Cels. retinuisse, amplo mihi documêto fuit, quod cum Celsit. T. ad rerum gubernaculum venisset, saepe fuerim ab eâdem benigne inuitatus; cumq; ante sexennium Principem Illustrissimum, Georgium Fridericum, Marchionem Badensem comitatus, Stutgardiam venissem, adeo clementer à T. Cels. fuerim exceptus, ut verbis satis depradicare insignem illam clementiam, quâ T. Cels. me hospitem prolixissimè complexa est, non possim. Præterquam enim quod Cels. T. colloquio multo longoq; me est dignata priuato, aureo quoq; gestamine, Celsit. T. effigiem & insignia ostentante, tanquam unum ex senioribus Illustrissima domus Wirtembergica Medicis, quibus verbis memini T. Celsit. usam fuisse, donauit, ut hoc tanquam auctoramento veterum officiorum, ad alia præstanda, sicubi res & necessitas postularet, T. Cels. magis obstringerer. Quinetiam magnificentissimum illud Theatrum suum, iure optimo Microcosmon appellandum, rebus omnibus, quæ aut natura produxit, aut ars fingere potuit, repletum, commonstrare, necumq; de plurimorum nominibus, naturâ, proprietate atq; virtute, clementer conferre haud est dedignata, adiunctâ gratiosæ suæ beneuolentiæ & clementiæ in posterum etiam mihi pro re nata ostendendæ, promissione, in cuius spe adhuc suauiter conquiesco. Quæ sanè uti mihi stimulum addiderunt, ad dedicandum T. Cels. hoc opus meum, tot sudoribus, vigiliis, laboribusq; ut effari satis nequeam, concinnatum; sic & arcta illa coniunctio atq; necessitas, quæ inter Tubingensem & Basileensem, peruetustas & inclytas Academias hætenus fuit, non exiguum attulit momentum. Calcar etiam admonuit, præstantissimorum & clarissimorum in omni genere disciplinarum virorum, quos T. Celsit. non solum in illa Academia, sed etiâ in aula sua, & alibi fouet, fauoreq; prosequitur suo, cum nostratibus amicitia, ut Principi bonarum literarû, literatorum, & omnium in quibus aliqua virtutis significatio elucet, fautori, hunc meum partum medicum deuouerem, defensioniq; ipsius, quantâ possem animi subiectione & obseruantia nuncuparem. Quem ut T. Cels. solitâ vultus serenitate, & equanimitate, quâ inter grauias & serias, leuiores etiam, sed cum utilitate coniunctas, non aspernatur; quæ virtus in T. Celsit. inter ceteras heroicas virtutes, tanto Principe dignas, quibus T. Celsit. ad miraculum usque excellit, imprimis multorum sermone predicatur, accipere dignetur, & porrò me ut hætenus, gratiâ fauoreq; suo, completti pergat, suppliciter oro atq; rogo. Deum Opt. Max. qui imperia pro suo bene placito constituit & transfert, illisq; bonos principes praponit, toto pectore precor, ut T. Celsit. clauum Reipublicæ, summa cum prudentia moderantem, ad eandem prosperè feliciterq; deinceps quoq; administrandam, legibus piis & iustis gubernandam ac regendam, nec non studia optimarum literarum conseruanda propagandaq; incolumem & sospitem, unâ cum Illustrissima sobole, diutissimè conseruet atq; tueatur. Basilea 13. Febr. An. 1602.

IN NOVVM ET RARVM OPVS
medicum, Clarissimi & Celeberrimi Viri

D. D. FELICIS PLATERI,
Archiatři Basileensis,

Carmen hendecasyllabum.

Quantò est nobilior rubente carne
Thesaurus preciosus ille vitæ
Sanguis, spiritus, optimusq; succus:
Tantò est utilior Liber PLATERI
Libris omnibus omnium medentum.
Multum hic sanguinis, utilisq; succi,
Multum est in reliquis videre carnis.

Martinus Prætorius, Sil. M. D.

Clarissimo Viro

D. FELICI PLATERO
Medicinæ Doctōri celeberrimo.

FELICIS nomen tibi quod pater indidit olim,
In fati certè credo fuisse tuis.
Artifici varios nosti medicamine morbos
Tollere, felices ritè adhibendo manus.
Non hoc Rauriacus tantum testatur Horizon
Aut si qua est illi terra propinqua solo,
Adde peregrinas etiam venisse sub oras
Nominis & famam percrebuisse tui,
Et tibi diuorum prognati stemmate regum
Concredant vitæ tristia fata sua.
Hæc tibi contribuit flammantis rector olympi
Dona, ad Castalias feruor & ardor aquas.

Theobaldus Myllerus, Marburg.

Ad Lectorem,

DE ORDINE TOTIVS OPERIS.



Affectus homini noxam adferentes, quos contra & præter naturam vocant, cum tres sint, Morbus, Causa & Symptoma; nos ab illis qui sub sensus cadunt, vel qui sensibus ægrotantium aut astantium percipiuntur, de quibus & primùm ægri apud Medicos conqueruntur, eosque illis enarrant, tanquam à notioribus exordimur, atque secundùm hosce affectus manifestos, summa genera, seu capita prima, in toto nostro opere practico diuidimus.

Hi autem affectus Symptomata plerunque sunt, cum ea omnia sensibus sint exposita, & signa reliquorum affectuum, à quibus prodeunt; Morborum scilicet, ipsorumque Causarum; quæ duo in causis horum symptomatum proin proponuntur & explicantur: ideoque nulla peculiaria morborum latentium, sensusque fugientium (vt exempli gratiâ, Intemperie ventriculi & hepatis, illorumque Obstructionum) proponimus capita, quemadmodum verò aliàs facere solent, & in praxi scribendâ, nunc morborum, nunc symptomatum nomina capitibus præfigere: cum nos in symptomatibus enarrâdis, eorundem morbos in causis horum symptomatum (vt modò dictorum morborum Hepatis & Ventriculi, in Cardialgiâ, Nauseâ, Vomitus, Cachexiâ & Hydropis causis) describamus. Qui verò sensibus expositi sunt morbi, vt illi qui extrinsecus plerunque occurrunt, tumores, vlcera, &c. similiter, quemadmodum symptomata, capitibus certis explicantur. Cæterùm cum eiusmodi affectus, sensibus obiecti, rarò simplices, sed ferè plures simul, diuersorumque generum concurrant, nos, etsi illorum in omnibus eiusmodi generibus meminerimus, ibi tamen potissimùm, vbi magis se produnt, illorum genera, causas curationemque ex professo tractamus; vt licet Suffusionem quæ tunica est in oculo, visum illius obliterans, in Visionis læsione præcipuè explicemus, nihilominus tamen rursus in Macularum oculi descriptione, illius mentionem sumus facturi.

Summa autem & præcipua omnium affectuum genera, qui sensibus percipi possunt: Vel in hominis functionum læsionibus: Aut aliis illius accidentibus, molestiis nimirum & doloribus, deformationibus & turpitudinibus: Vel in reiectis, obseruantur.

De functionum autem læsionibus primùm hoc in opere agimus, quo pacto ille peccent: vel quantitate, cum deficiunt, idque vel omnino, vel ex parte: vel qualitate, quando deprauantur, hoc est, aliàs non rectè fiunt. Quod quomodo in sensuum læsionibus eueniat, Primus liber; in motuum verò læsionibus, Secundus declarabit: sub quibus omnes functionum læsiones comprehenduntur. De Accidentibus reliquis, vti & Reiectis, quæ commentati sumus, ea in sequentibus proponimus libris.



DE FUNCTIONVM LÆSIONIBVS,

LIBER I.

SENSVVM LÆSIONES

continens.



SENSVS cùm alij sint interni, alij externi. De internis primo loco agendum, cùm illis læsis; externi sensus simul & motus quoque interdum labefactentur.

Interni sensus tres sunt; Imaginatio, Ratio & Memoria, quos simul comprehensos Mentis nomine appellabimus. Hi cùm læduntur, vel simul omnes, vel sigillatim aliqui deficiunt vel deprauantur.

Deficiunt mentis functiones, cùm per se imminuuntur, vel abolentur; nam ex accidenti; vitali quoque motu læso, etiam hæ functiones, sicuti & reliquæ omnes totius corporis cessant: sed tunc ad vitalis motus læsiones referuntur, illicque explicantur.

Mentis imbecillitas. Imminuuntur autem mentis functiones, cùm non sufficienter obeuntur, in variis illius generibus: ut sunt *Hebetudo mentis, Tarditas ingenij, Imprudentia, Oblivio*; quæ simul explicabimus in MENTIS IMBECILLITATE, CAP. I. pag. 1

Mentis consternatio. Abolentur cùm omnino non sunt: ut fit in diuersis soporis & stuporis generibus; cuiusmodi sunt præcipuè *Somnus immodicus, Somnus profundus, Carus, Lethargus, Typhomania, Sopor demoniacus, Sopor cum stupore, Ecclipsis, Apoplexia, Epilepsia, Conuulsio, Catalepsis, Ec-*

stasis: de quibus agemus sub titulo MENTIS CONSTERNATIONIS, CAP. II. pag. 11

Deprauantur mentis actiones, quando fiunt quidem, verùm non decenter, sed sinistrè, vel magis quàm decebat.

Sinistrè seu præposterè sensus interni exercentur, in variis quoque generibus; qualia sunt præsertim *Stultitia, Temulentia, Animi commotio, Amor, Melancholia, Hypochondriaca melancholia, Mania, Obsessio demoniaca, Hydrophobia, Phrenitis, Paraphrenitis, Saltus Viti*; quæ tractabimus in MENTIS ALIENATIONE, CAP. III. p. 80

Nimiùm quàm par erat, fiunt vel obeuntur, in *Vigiliis & per Insomnia*; de quibus agemus in MENTIS DEFATIGATIONE, CAP. IV. pag. 143

Externi sensus quinque sunt, Tactus, Gustus, Visus, Auditus, Olfactus: qui cùm læduntur, in defectione vel deprauatione peccant.

Tactus defectus & deprauationis genera sunt, *Stupor, Formicatio, Sensus falsus caloris & frigoris, Hemodia*; quæ proponemus in TACTVS LÆSIONE, CAP. V. pagina 151

Gustus quoque aboletur, imminuitur, deprauatur in *Defectu gustandi, Deprauato vel*

SENSVS LÆSIONIS, LIB. I.

falso gustu; quæ tractabuntur sub titulo Gv-
STVS LÆSIONIS, CAP. VI. pagi-
na 159

Visus læ-
sio.

Visus præsertim multa incommoda pati-
tur: quando vel non fit, vel diminutè, vel
malè, in diuersis illius generibus; quarum
præcipuæ sunt *Cacitas, Amaurosis, Scotoma, Am-*
blyopia, Caligo, Visus iuuenibus vel senibus incom-
modans, Myopia, Nyctalopia, Vespertina acies, Hal-
lucinatio, Imaginatio, Nubecula, Colores, Splen-
dores falsi, Vertigo, Scotodinos; quæ simul ex-

plicabuntur in VISVS LÆSIONE, CA-
PIT. VII. pag. 169

Auditus eadem quoque patitur, in *Surdi-* *Audi-*
tate, Graui auditu, Obauditione, Tinnitu, Sibilo; tui læsio.
vti describetur in AVDITVS LÆSIONE,
CAP. VIII. pag. 239

Olfactus itidem aboletur, minuitur, vel *Olfactus*
deprauatur; in *Olfactus defectu, & Olfactus de-* *læsi-*
prauatione; quæ explicabuuntur in OL-
FACTVS LÆSIONE, CAP.

IX. pag. 259



DE MEN

DE MENTIS IMBECILLITATE.

CAPIT. I.

Genera.



MENTIS imbecillitas dici potest, cum aliquis apprehensione seu ingenio, iudicio vel ratione; memoriaque minus quam homo ingeniosus & industrius valet. Quod ali-

quando in morbis accidit: aliàs verò non ægrotatibus, sed alioquin sanis euenit, de quo hic agemus.

Hebetudo mentis. Quandoq; autè hi sensus interni omnes simul hebetantur, & tam ingenium, quam iudicium & memoria deficiunt; diciq; tunc potest Hebetudo mentis.

Tarditas ingenij. Aliàs verò ingenio carent, cum ægrè loqui discunt, & literas aliasque artes difficulter apprehendunt; Tarditasque ingenij dici potest.

Imprudencia, iudicij defectus. Interdum iudicio destituuntur, in rebus quas apprehenderunt diiudicandis, atque Imprudentia vocari poterit.

Oblivio, Memoria imminuta. Plerumque memoria labefacta est, cum ea quæ apprehenderunt & didicerunt, difficulter retinent, Oblivioque dicitur. De quo vitio multi, senescentes præsertim conqueruntur: & promillius duntaxat ferè Medici in curationibus sub titulo Memoriae imminutæ meminerunt; cum & reliquorum sensuum internorum defectus, easdem causas, eandemque curationem obtineant; quæ & nos omnibus simul accommodabimus.

Causæ.

Pars affecta. Cerebrum autè hic, quod sensuum horum est organum, afficitur: quod tamen non adèd vehementer est læsum; vt hi sensus interni penitus, vel vnà cum illis externi quoq; sensus & motus aboleantur, sicuti hoc in grauioribus cerebri læsionibus accidit. Quod verò plures paucioresve sen-

sus, illique plus minusve labefactentur; id prout substantia cerebri vniuersa, vel ex parte tantum affecta est, non prout ventriculi anteriores, medii, posterioresve, vti voluerunt, afficiuntur, accidit: dein & pro ratione morbi, quo cerebrum impeditur, sicuti dicitur, hæc variant.

A parentibus, hæreditariâ hanc sibi nonnulli contraxerunt & hauserunt imbecillitatem, per causas insitas: vnde sæpè fit, vt sicuti ingeniosi & industrii sibi similes, ita ignaui torpidos gignant. Quod hisce signis, quia à teneris tales sunt, parentesque tales habuerunt, facillè colligitur.

Imbecillitas causata Men- tis imbecillitas.

Ætatis causa aliis hoc accidit: vnde senes obliuiosi ferè fiunt, interdum & hebetes, ob caloris natiui defectum: nisi hoc ab intemperie aliqua cerebri, vti mox dicetur, accidat.

Concussio vel ictus capitis, post se imbecillitatem aliquam relinquens cerebro, id quoque potest efficere.

Sanguinis quoque nimia profusio, à quacunque corporis parte; vel alia nimia euacuatio, spiritus exhaustiens. Quo nomine & venus nimia, sensus plurimum, memoriam præsertim, labefactat.

Morbus item diuturnus, calorem natium destruens, capitis præsertim; vti post carum, item post melancholiam, post conuulsiones: obliuiosos homines admodum factos vidimus: vel malignus, aut à veneno aliquo prodicens; quale fortè illud fuit, quod à Circe sociis Vlyssis exhibitum, memoriam illis rerum omnium præteritarum ademit: quod & philtre amatoria nonnunquam effecerunt: & narcoticorum vsus sinister potest efficere.

Ob vulnus in oculi sede profundè adactum, adèd memoriam fuisse in quodam perditam, quidam scribit, vt de nouo elementa literarum cogeretur addiscere, cum

prius & Græcè & Latine doctus fuisset.

Verum & cum mentis functiones remissius exercentur; tunc calore natiuo otio torpente, nec in actum deducto, segnius procedunt.

Quod & contraria ratione, si nimirum nimium animus studiis, cogitationibus, vigiliis, curis exagitetur, potest accidere. Vnde tamen memoria primum ferè læditur, senescentibus potissimum, iudicio nihilominus acri adhuc perseverante. Quod ipsis non tantum ob imbecillitatem, quam etiam hoc pacto accidere ex eo, eleganter colligi potest; quod animus illorum, qui toto vitæ spatio, tot rerum species, imagines & concepta suscepit, illis adeò obruitur, ut novas quas haurit, ac si nullus amplius illis esset locus, diutius retinere nequeat: unde & evenit, quod senes ea quæ iuvenes apprehenderunt, firmiter ad extremum vsque retinent: quæ verò iam senio confecti tractant & cogitant, facile quidem concipiunt, recteque & arduè diiudicant, sed illorum mox iterum obliuiscuntur: consimili modo aliquo pacto, quo videmus senes plerosque, res procul disitas rectius quam propinquas cernere, atque diiudicare: quod tamen aliam ob causam evenire, in visus imbecillitate explicabimus.

Dein, etsi animus diuersis studiis distrahatur, pluribusque simul rebus obruatur, fit, ut non tantum pluribus intentus minor sit ad singula sensus, sed & ut dum se hæc inuicem confundunt, atque vnum ab alio impeditur, & obfuscatur (sicuti duobus doloribus vnum locum instantibus, vehementior alterum obscurare solet) memoria illius quod debilius est, mox quoque euanescat.

Instru-
mentis vi-
tiis, cau-
sa Men-
tis imbe-
cillitatis.
Instrumenti quoque imperfectio sensus internos languidiore facit. In infantibus tenerioribus, quibus cerebrum mollius adhuc & fluidum, nec dum crescendo absolutum, segnes edit functiones. In adultis itidem, si cerebrum molem iustam non sit ademptum: tuncque ferè caput paruum habent.

Figura indecens cerebri, illiusque situs peruersio, à natura vel violenter facta, idem efficit. Quod egre cognoscitur, nisi caput cerebri formæ correspondeat.

Temperies:
excessus.
Temperamentum cerebri à naturali im-

mutatum, nodum tamen cerebri grauiore morbos pariens, sensuum interiorum ignauiam illam quoque facit.

mutata causa Mentis imbecillitatis.
Idque maximè, cum humidius quam naturaliter esse debebat, existit; quæ præcipuam memoriæ diminutionis causam Medici statuunt: idque quod in cerebro humidiore, & proin molliore, minus diu rerum impressæ manent imagines. Nos verò, quæ sic languidius ad operationes edendas fit, illud fieri credimus. Huius autem humiditatis causa, aliquando à morbo aliquo cerebri prægresso, frigido & humido dependet: à quo, licet maiori ex parte sublato, hæc tamen humida illi impressa remansit constitutio: quod & à causis externis, aëre & medicamentis fieri potest. Cognoscitur autè hic defectus, ab humiditate proficisci, quod & tunc somnolenti sunt, aliisque humidioris cerebri indiciis.

Siccior quoque cerebri constitutio, quod res ægre apprehendant, causa statuitur, idque quod in sicco corpore difficilior res imprimantur. Verum & obliuionis siccitatem hanc causam esse quoque posse, plerique docent, & memoriæ imminutionem à siccitate curationem explicant, quando post febres ardentes, post vigilias nimias & studia, memoria labilis fit: quod nos ex imbecillitate potius inde contracta, accidere supra docuimus.

Curatio.

Prædictio.
Incurabilis est hic sensuum interiorum defectus, si ab imbecillitate contracta à parentibus, vel ætatis ratione: aut insigni aliqua cerebri læsione accidat: aut à conformatione, peruersa cerebri nascatur. Egere quoque impressa illa cerebri præternaturalis constitutio, siue humida siue sicca sit, emendatur; cui tamen potissimum corrigendæ, suas curationes Medici, in memoria læsa sananda, accommodant. Nos quomodo ea vitia saltem corrigi, si non penitus tolli possunt, per operandi modos docebimus.

Exercitium, cum omnes functiones ignauas acuat, & veluti in actum deducat, hic quoque in animi operationibus, iuuare poterit, si ex remissione illorum usu, & veluti torpore hebetescant. In imbecillitate quoque, licet illa vix emendari queat, cum calor nati-

humidior.
curatio.

ius exercitio restauretur, & consuetudo sit altera natura; aliquid saltem præstare poterit, mentis exercitatio. Sed & in humidior illius intemperie, cum mentis hæc agitatio excrementa absumat, proderit.

Hoc fiet exercendo sæpè has animi functiones, iis maximè quæ cum voluptate fiunt, (cum nihil inuita fiat Minerua) easq; vel omnes simul; vel priuatim ingenium: si addiscant loqui, literas, linguas, artes, quibus apprehensio acuitur & ingenium, quod alias otio torpet. Iudicium, si res discernant iudicentque; scrupulosa præsertim, idq; frequenter: uti videmus multos legum ignaros, sibi vsu naturalem comparasse legum scientiam, prudentiamque. Memoriam acuent, multa memoriter studendo, retinendoque, aliarumq; rerum artes memoriæ mandando; in quo hoc singulare obseruatur, quod quæ ante somnum post cœnam vesperti concipiuntur, vel repetuntur, matutino tempore melius impressa manent.

Quies quoque animi functionum, eas nimio vsu & vigilijs defatigatas, tandemq; sic debilitatas, reficit.

Quod fit, si à nimio studio res cognoscendi tractandive, animiq; affectibus immodicis, sibi temperent: si decenti tempore, & quantum necesse est, dormiant: cum somnus sit animi quies, & per illum, eius actiones interne sentiendi tantisper quiescant, nisi quatenus per insomnia nonnihil se aliquo modo exerunt.

Euacuationes quod attinet, si à cerebri humidior constitutione ignauia oriatur, adsitque excrementorum cerebri prouentus, illa successiuè euacuanda erunt: sicuti in cerebri morbis, à pituituosis & serosis humoribus natis, fieri solet; quod hac methodo fiet.

Communia excrementa primum eluenda sunt, sequenti clysmate, vel simili: quod R. herbarum Maluæ, Altheæ cum toto, Parietaræ, Betæ, Mercurialis, Betonicæ, Saluiæ, Hyssopi ana, M.j. florum Chamomillæ, Meliloti, Sambuci, Lauandulæ ana P.j. Furfuris P.j. seminum Fœniculi, Carui ana 3.iiij. fiat decoctio; dissolue succi Mercurialis 3.j. Mellis 3.j. olei Rutacei 3.ij. Benedicte laxa-

tia, vel Hieræ alicuius fortis 3.ß. Salis 3.j. fiat clyster.

Præparandi deinde humores hoc decocto; quod R. radicum Ireos, Acori veri, Enulæ campanæ ana 3.ß. Pyrethri (memoriam valde iuuat) Galangæ, Zingiberis ana 3.ij. herbarum Betonicæ, Maioranæ, Thymiana 3.ß. Melissæ 3.ij. florum Lauandulæ, vel Spicæ, Saluiæ, Stœchados ana 3.ij. Anthos 3.ij. radices Liquiritiæ 3.vj. seminum Anisi, Fœniculi ana 3.i.ß. Carui 3.i. Cubebæ ana 3.ß. fiat decoctio in Aqua & Vino, & in colaturâ f. l. ß. dissolue Mellis vel Sacchari q. s. aromatizetur Cinamomo & Nuce moschata; Pro quinque vel sex matutinis.

Vinum per infusionem horum fieri poterit, relicto melle & saccharo, si dulcibus delectetur; sin minus illorum loco Absinthio substituto: cuius odore plurimum delectantur, nec amarorem abhorrescunt.

Syrupis idem fieri poterit, si minor labor, maior gratia requiratur: R. syrupor. de Betonica & Stœchade, Mellis rosacei ana 3.ß. aquarum Betonicæ, Maioranæ, ad duplum; aromatizetur Cinamomo: Bibat totidem, vti de decocto dictum est, vicibus,

Hisce factis, corpus purgabitur pilulis hisce: R. pilularum Cocciarum 3.ij. Castorei (peculiariter confert) 3.ß. cum Vino odorato: fiant pilulæ.

Vel hac potione: R. electuarij Diacarthami tui 3.ij. vel alterius phlegmagogi dosim vnam, Agarici infusi in Oxymellite 3.j. syrupi de Liquiritia 3.j. aquarum Melissæ & Betonicæ q. s. fiat potio.

Hisce factis & corroborato cerebro, vti post purgationem fieri debet, si caput adhuc excrementitium sit, repeti hæc possunt statim, vel tempore idoneo, aut per intervalla.

Quod syrupo fieri potest; qui ex decocto præcedenti parabitur, additis Sena, Carthamo, Agarico, Turbith: quibus & Fœnicum marinum, cum pituitam, si recens sit, educat, permiscere possumus, & Saccharo & Melle additis, ad consistentiam decoquere.

Pilulæ quoque vsuales phlegmagogæ vsurpari poterunt.

Vina minus apta sunt si diutius asseruari debent, cum facile corrumpantur: si vero

continuis diebus quinque vel sex vsurpanda purgatio, ex ijsdem quibus decoctum infusus in vino, parari poterunt.

Particularibus quoque euacuationibus, Caput purgijis dictis, per masticatoria, gargarismata, errhina, si humor aqueus redundet, caput per vices purgabitur: vti suo loco dictum est.

Alterantia quod concernit, omnia ea quæ caput roborant, illiusque calorem innatum excitant, intus forisq; administrata, iuuare possunt: inter quæ, quæ potentia agunt, calidissima in humida hac cerebri constitutione esse debent, cum ea adeo impressa, & temperamentum cerebri adeo muratum, ægre reducantur, validiora que eo nomine requirant, & vt sic quoque illorum operatio melius ad cerebrum possit pertingere: nec possint assumpta, procul dissitam hanc partem, aut admota, ob capitis crassitiem, nimium cerebrum inflammare. Reliqua vsu inuenta, proprietate quadam memoriam restaurare creduntur.

Quæ assumuntur itaq; ad memoriam potissimum restaurandam, in causa humida, vti dictum, sequentia sunt:

In forma pulueris, hic singularis ad memoriam conseruandam prædicatur, qui R. Thuris masculi seu olibani ʒ. β. fiat puluis: Capiat per se vel cum Vino aut Aqua conuenienti frequenter.

Si Piper addatur, tam rotundum quam longum, laudatissimum erit remedium, hoc modo paratum: R. Thuris masculi ʒ. xv. Piperis ʒ. v. fiat puluis: Detur omni mane ʒ. j. per dies 40.

Zingiber coditum in syrupo vel siccum, vti præparari solet, mane sumptum, probatur. Acori item veri, id est, calami aromati conditura.

Pyrethri item radix, dum recens est condita, zingiberis instar comesta, magni fit: cuius decoctum contra obliuionem Paracelsus probat.

Confectio anacardina, ad memoriam reparandam præcipue inuenta fuit, præsertim si sine castoreo, ob ingratiam paretur, vti docet Gordonius. Cuius ʒ. β. vel ʒ. j. aut plus etiam, cum aqua aliqua conuenienti, vt Fœ-

nic. & Apij, secundum Gord. exhibetur: quæ si nimium corpus accendat, sic parabitur.

R. confect. Anacardina ʒ. j. conseruarum Maiorana, Rosmar. ana ʒ. β. Capiat semel vel bis in hebdomada, ʒ. j. pro vice.

Composita ex enarratis, & alijs capiti conuenientibus & appropriatis, memoriæ labefactata, vt myrobalanis, rad. cyperi, cranio hominis, & consimilibus, ad cerebri corroborationem, sic fiunt:

R. Confect. Anacardina ʒ. j. Thuris ʒ. ij. Piperis, Zingib. ana ʒ. β. Sacchari dissoluti in aquis Cinamomi, & Maiorana ʒ. xij. fiant tabulæ: Detur vna, quolibet mane, vel alternatim.

Aliæ efficacissime parabuntur hoc modo: R. Thuris masculi ʒ. iij. Piperis, Zingib. ana ʒ. β. Cinnamomi ʒ. ij. Coralli ʒ. j. rasurae Cranij humani ʒ. ij. Cornu cerui, Eboris ana ʒ. β. adde Sacchari ʒ. xj. vel duplū, fiat puluis: vel dissoluto saccharo in aqua Maioranae fiant tabulæ; vel minuatur sacchari quantitas, & cum inf. gummi Tragach. in aqua Ros. fiant formulæ: Vtatur.

Possunt & electuaria ad eundem vsu parari ex capitalibus, hoc modo: R. conditurarum Zingiberis, Acori veri, Pyrethri, vt dictum: ana ʒ. β. Myrobalanorum chebularum, emblicarum ana numero ij. Maiorana, Anthos, Lauandula vel Stechados, Saluia ana ʒ. vj. conseruarum Rosarum, Buglosi ana ʒ. iij. adde Cyperi, Galagæ, Gariophyllorum ana ʒ. β. Piperis ʒ. ij. Cubegarum ʒ. j. Olibani ʒ. j. β. pulueris Diambrae, Diamosci ana ʒ. β. (Moscu vel ambram addere possumus) Cranij hominis si voles, ʒ. ij. Mellis anacardini q. s. fiat electuarium: Capiat a ʒ. j. β. ad ʒ. ij. cubitum iturus.

Theriacam & Mithridatum commendant quoque: quæ nos propter opium, quod omnes sensus stupidos vel languidiores facit, etsi vetus sit compositio, malumus omittere; cum alia nō desint, & nullus dolor hic, aut necessitas requirât, nec humoris adsit malignitas.

Si ingratis vti necesse est, satius erit in forma pilularum: R. Thuris ʒ. ij. Piperis, Zingiberis, Cubegarum ana ʒ. j. Castorei ʒ. β. Mosci, Ambrae ana gr. vj. cum confectioe vel melle

melle Anacardi; fiant pilulæ: Da in introitu lecti duas, per multos dies.

Vinum ad hoc conueniens sic fiet: R. radicū Acori veri, Galangæ ana ʒ. β. Zingiberis ʒ. j. β. herbarum Maioranæ, Saluæ, florum Lauandulæ, Stœchados, Anthos, Rosarum ana ʒ. iij. Piperis, Gariophyllorum, Cubebæ ana ʒ. β. infundantur conuassata in Vino. Bibat interdum manè, cum fumis iusculum, haustulum.

Aquæ stillatiæ probatur simplices, Anthos vel similes. Vel compositæ ex varijs, affusa aqua vini, quam Vitæ vocant: quam & simplicem, si manè cochlearis vnus mensura sumatur, prodesse scribunt.

Composita talis fieri poterit: R. Materialium supradictarum pro vino, conuassatarum; affunde Spiritus vini, vel vini maluatici, vt superemineat digito vno, confectio- nis Anacardina ʒ. vj. destillentur in balneo Mariæ, & vtatur.

In cibis multa eiusmodi, gratiora præfer- tim adhibita, pro condimentis vsurpari pos- sunt: vt arom. prædicta, Piper, Zingiber, pro infarctu, Maiorana, Saluia, & similia.

Sinapis item bellarium cum Melle: vti mensis adhiberi solet. Vel idem Saccharo obductum: cum proprietate hoc semen me- moriam acuat.

In vino quoq; herbæ similes infundi pos- sunt, & macerari.

Externa remedia similia vsurpari pos- sunt, quæ calorem excitent, & humiditates absumant: qualia sunt hæc:

Ericare manè caput pectine, & pannis, ordinariè post somnum.

Lixiuio caput nonnunquam abluerè, sed mox iterum siccare, pannis calidis Thure suffumigatis: cum thus, vt dictum, peculiari vi memoriā iuuat; Lixiuuium autem tale erit: R. Agarici ʒ. ij. herbarum Saluæ, Beto- nicæ, Maioranæ, Spicæ celticæ, Pulegij, Lauri, florum Rosmarini, Spicæ, Lauandulæ, Rosarum rubrarum, Chamomillæ ana p. j. baccarum Lauri, Iuniperi ana ʒ. j. β. Piperis ʒ. j. conuassentur & coquantur in lixiui- tonforis, factū cum aqua extinctionis ferri.

Inungitur nō modo posterior cerebri re- gio, in memoria læsa, sed & tota capitis su-

perficies ad eadem; vt: R. Olei seminis Si- naps per expressionem: vngatur.

Efficacius sic erit: R. olei de Been, Sam- bucini ana ʒ. j. feminis Sinapis, Piperis, lon- gi ana ʒ. β. Euphorbij, Castorei ana ʒ. j. Ceræ parum: fiat linimentum.

Sunt qui confectioe Anacardina, disso- luta in Spiritu vini, caput inungunt.

Cucuphæ & pileoli, ex roborantibus ca- put, noctu & interdū quoque gestantur: de quibus suo loco.

Amuleta si nō viribus, saltem apprehen- sione iuuant, vt Lingua vpupe suspensa, ob- liuionem tollere creditur, Rhazi: Ametitius lapis gestatus sensus omnes acuit, vt quidā scribit; sicuti & lapidem Berillum gestatum bonum facere intellectum.

In sicca cerebri constitutione, vnde me- moriam minui dicunt, si impurum corpus fuerit, purgetur, vt in melancholia dictum fuit; cum in puris corporibus rectius medi- camenta adhibita opèrentur.

Humectetur cibis euchymis & succulen- tis; qualia in hæcticis & melancholicis ex- plicata fuere.

A siccantibus omnibus & immodicis e- uacuationibus, Veneris imprimis, qua nihil nocentius, abstineat.

Electuario hoc per vices vti poterit: R. conseruarum fl. vel rad. Cichoræ, Buglossi, Borriginis: item Violarum, Capillorum Ve- neris & Betonicæ ana ʒ. β. specierum Dia- tragach. frig. Triasantali an. ʒ. β. cum syrupo Violarum fiat electuarium: Capiat instar ca- staneæ, vel ʒ. j. β.

Vel tabulis eiusmodi vtantur: R. florum Buglossi, Borriginis, Violarum, ana ʒ. j. fo- liorū Maioranæ ʒ. β. Thuris masculi ʒ. j. Cra- nij hominis vsti ʒ. β. Sacchari dissoluti in a- quis Violarum & Rosarum, fiant tabulæ.

Topica capiti in melancholia dicta, ap- plicabuntur. Imprimis lotio hæc capitis & pedum quoque utilis, quæ R. decoctum ca- pitis & pedum Veruecis q. l. addendo herb. Buglos. Borrag. Violarum, cum floribus, si haberi possunt, florum Rosarum, Betonicæ, (nam calida frigidis permiscenda, cum hu- mectandum, vt in melancholia dictum est) ana m. j. decoquantur.

Memoria imminuta a siccitate cerebri, curatio.

Vtile & sequens: R. radicū Altheæ lb.ß. herbarum Betonicæ, Maioranæ ana M.j. florū Violarū, Rosarū, Chamomil. Meliloti, Lauandulæ ana P.j. coquantur in Lacte, pro ablutione capitis.

Inunctio quoque talis laudatur, præsertim post ablutionem: R. oleorum Amygdalarum dulcium, Rosacei ana 3.j. pinguedinis Anatis 3.ß. album Ovi numero j. Lactis 3.ß. agitentur, pro illinitione.



DE MENTIS CONSTERNATIONE.

CAPVT II.

Genera.



MENTIS consternationem vocamus, cum sensibus, vel saltē aggrauatis, vel omnino ferē sublati; vel dormiunt non naturali modo, vel stupent. Idque vel cum corporis languore seu resolutione: vel agitatione seu convulsione: vel rigiditate: quæ quatuor præcipua, & summa mentis consternationis sunt genera, sigillatim explicanda.

Somnus præternaturalis is est, qui secus ac naturalis longius durat, diciturque tunc Immodicus, & qui sensus magis consopit, vocaturque ideo Profundus. Nonnunquam sanis adhuc accides, nimia in somnum propensio: vel profundus admodum somnus. Alias in morbis eueniens: & nunc sine, interdum cum febre, aliquando etiam cum delirio inuadens, vel cum stupore.

Inclinatio nimia ad somnum, in sanis alioquin, quibusdam hominibus frequens est vitium: non quando hoc certis naturis, ætatis causa, vt infantibus & senibus: vel regionis (in quibus aliquibus noctu & interdiu dormire naturale existit) consuetum & utile est, sed cum à causa non decenti proficiscitur: vnde non tantum noctu somno longius indulgentes, manē tardius surgunt: sed & interdiu, præsertim mox à cibo sumpto, maximeque tempore vel loco calido, ad dormiendum adeo impelluntur, vt omnino eos dormire necesse sit: ad quem aliqui tam proclives sunt, vt licet se ad illud minime ac-

commodarent, sed ad eum executiendum aliquid agerent, nihilominus in ipso opere obdormirent: & quendam ex illis etiam cum biberet in mensa, poculumque ori adhiberet, hoc situ somno correptum, vel aliud quid agentem, corporis ea forma dormire solitum, vidi.

Profundus nonnunquam somnus, sanis interdum obrepit, post vini potum in ebrijs, vel sumptum aliud narcoticum: qui diuturnus non est, si mitior horum fuerit vsus: si vehementior, in stuporem; vt illic diceretur, conuertitur.

In morbo sopor grauis, Caros, Coma, Cataphora, Lethargus, Veternus, Subeth dicitur; in quo vt & in naturali, oculis clausis, corporeque prostrato dormiunt: Sed in illo sensus interni & per cōsequens externi, non tantum, vt in naturali somno quiescunt, sed veluti obruti, plus minusve torpent, adeo vt vix vel nunquā excitari possint, atq; expurgati, de nullo dolore, nisi quatenus caput graue & ponderosum esse sentiunt, conque-rantur, moxque iterum obdormiant. Motus quoq; corporis languidior, non tamen vt in apoplecticis, resolutis mēbris, abolutus. Neque, vt illis, respiratio est impedita, sed libera & facilis, nisi quatenus in aliquibus oscitatione & stertore deprauata est. Pulsus quoq; etsi imbecillior, nō tamē vt in syncope cessat.

Interdum sopori febris comes est: quæ si mox vnā cum illo incipit, Lethargi nomen, quod tamen & reliquis commune est, obtinuit. In quo præter soporis inditia, calor præternaturalis corporis, pulsus citus, vrina tincta, febrem adesse denotant. Sed & caros febrem nonnunquam sequitur, illiusque est symptoma.

Præter hæc soporis species, vna quoque inuenitur, in qua licet maxima sit ad somnū propensio, & decubitu oculisq; clausis eundem exprimant, nihilominus vigilant, illisque variae rerum obuersantur imagines & spectra: Vel si dormiunt, in somnijs varijs, vel horrendis diuexantur, quæ postea vigilantes enarrant: qui impulsī egrē oculos at-tollunt, tangentemq; aspiciunt atque desipiunt: & licet sentiant moueanturq; tamen è lecto surgere, & vigilantium opera exerce-

Somnus
immodi-
cus.

Somnus
profun-
dus.

Sopor
grauis,
Caros.

Sopor cū
febre Le-
thargus.

Sopor cū
delirio.

re nequeunt. Hanc Cataphoram seu Coma agripnion, id est infomne vocat: aliqui Typhomanian appellant, tanquam attonitam insaniam: nec ineptè Sopor delirans appellari posset, atq; ad delirium referri: vel Sopor grauis, cum infomniis horrendis, altera illius species describitur: vulgus eos ac si ecstasi correpti essent, Ecstaticos vocat.

Sopor
demoniacus.

Huc & demoniacus Sopor sagarum referri posset, in quo se per aërem ferri, suauiter victitare, choreas ducere, & cum dæmone congregari, putant, & vigilantes in eodem errore permanent.

Sopor
cum stupore.

Vidimus & alium in Barone quodā, hisce nonnihil consimilem, qui longo tempore attonitus & somnolentus, nihil secundum rationem agebat, cibum nec petebat, nec nisi per vim intrusum capiebat, nec lectum nisi coactus accedebat, sed ad mensam tota die brachio innixus, oculisq; clausis veluti dormiens sedebat, nec nisi interrogatus sapius que admonitus, quicquam, sed tunc quoq; quæ ad rem minimè pertinebant, respondebat.

Stupor
cum resolutione,
ne, A.
poplexia.

Stupor, Stupiditas, cum corporis languore seu resolutione, Obstupescencia, Eclipsis, Apoplexia dicitur. Estq; affectus in quo non dormiunt, sed attoniti stupiti instar iacentes, stupent: sensibus omnibus ex æquo, & motu quoque simul abolitis. Quæ accidentia mitiora nonnunquam sunt, alias vero grauiora: In quibus sensus & interni & externi simul tolluntur: vnde nullius rei habent intelligentiam: nec vident, etsi ex illis quidam oculis fixis aliquem intueri videatur: nec clamores audiunt: nec puncti aut vsu sensus signum dant. Motu quoq; corporis omni in momento priuati corruunt, omniaq; ipsis membra resoluta languent: nec loquuntur, nec deglutiunt, sola respiratione sed perquam obscura remanente, cuius efflatio ex ore vel naribus, xyliino admoto, aut thoracis motus, ad illam perficiendā poculo aquæ pectori imposito, interdum vix ex motu illorum potest dijudicari, vel quæ cum magna difficultate & stertore in iam moribundis ducitur: pulsu interim pleno & valido in hac dispncea, sed admodum inæquali sese declarante: idq; tam diu donec

redeuntibus sensibus, iterum ad se redeant, quod in leuiori illius specie accidit: vel si grauior sit, resoluti maneant: vel si pessima sit, mox respiratione penitus sublata, suffocentur; spuma tunc ex ore ipsorum emanante.

Stupor cum corporis conuulsione seu vehementi agitatione, Conuulsio, Epilepsia dicitur: estq; affectus, in quo sensus omnes ex improviso tolluntur: corpusq; vniuersum motu inordinato aliquandiu cōcutitur, seu conuellitur: per vices seu paroxysmos hominem exercens. Qui ab eo quod subito apprehendat, epilepsia; quod conuellat, cōuulsionis nomen obtinuit. Cuius duo primum occurrunt genera, quatenus alia diuturna, alia brevis existit, variantia.

Diuturna ea est, quæ diu durat: atq; siue ante pubertatem eueniat, eaq; superueniente nō desinat, siue post pubertatem primum incipiat, toto plerumq; vitæ tempore, nunc certis, nunc incertis temporibus, horis, diebus, mensibus, annis, aut lunæ mutationibus (vnde Lunaticus morbus quoque appellatur) ægrotantes inuadit: quorum & functiones cum non subito pessundet, sed sensum duntaxat labefactet, idè accidit, vt quando a paroxysmo liberi sunt, sua munia nihilominus obire queant, & quod, si dum hisce operam dant, hoc malo corripiantur, cadant: vnde & Caducus morbus, Germ. *Fallende Stichtag* dicitur. Et cum repentinus illorum casus, horrendaq; symptomata, maximum terrorem soleant incutere, adeo vt aliqui ex apprehensione sola mox in eundem affectum incideriat, eoq; nomine plerique conspectum horum subterfugiant, & si in congregatione hominum accidat (vt nostro seculo in concionibus) cæter soluantur, atq; apud veteres comitia eadē de causa dissoluebantur, Comitialis morbus ab illis dictus; nomen retinuit: qui ob pertinaciam, Magnus quoque, Sonticus & Herculeus vocabatur. Estq; hoc genus, cui Epilepsia nomen potius quam cæteris, cum tamē omnibus conueniat, accommodarunt.

Breuis, nec ita diuturna cōuulsio est, quæ vel mox cessat, vel saltem tamdiu, vt prior, minimè protrahitur: quæ rursus quod vel

mitior,

mitior, vel deterior sit, in species duas diuiditur.

Mitior, & si periculo non vacet, ea habetur, cuius causa, nec magna, nec perseverans existit: Vt quæ modo natis, cum dentes primum erumpunt, vel vermes incommodat, eueniens, mox cessat. Et quæ virginibus, antequam menses erumpunt, adueniens, iis supervenientibus remittit. Et quæ gravidis mulieribus primis fere mensibus accidens, medio uteri gestationis tempore, vel post partum statim desinit. Hanc ne metuendo morbi caduci nomine, horrorē adferant, quod in pueritia frequenter eueniat, Puerilem morbum, sicuti & German. *Kind-sinn* appellat, affectus atrocitatem, nomine blando mitigantes.

Deterior summeq; periculosa species existit, quæ morbos graues, uti vulnera, febres, colicos dolores, aliosq; sequuta: quacunque ætate: nunc vno, nunc altero paroxysmo, nunc pluribus iisq; continuis, vel aliquandiu intermittentib. accessionibus, egrum terribili aspectu exagitat, & plerumque iugulat: vel si sanetur, pessima tamen interdum accidentia, uti membrorum contractiones, vocis sensuumq; læsiones, aliæve posse relinquit incommoda. Quam speciem Convulsionem seu spasum tantum, non epilepsiam, cum tamen hac specie affecti, non minus quam epileptici subito hoc casu corripiantur, appellant, eamq; generalem, ad differentiam particularis convulsionis seu spasmi: qualem quoq; inueniri, in qua sensibus illæsis partes duntaxat quædam conuelluntur, in motu læsionibus ostendimus. Hanc autem speciem Germani peculiari nomine *Sticht* vocant: vel si pueris contingat, uti frequenter illos, tum modò natos, tum prouectioris ætatis interire solet. Puerilem morbum quoque vocant.

Accidètia in omnibus epilepsiæ tam diuturnæ, quam brevis speciebus, eadem fere concurrunt, & in omnibus æquè variare possunt, tam quæ in sensuum, quam motus obseruantur læsionibus.

Sensus enim interni omnes, & per consequens externi simul, in omnibus, toto, quo

paroxysmo tenentur tempore, sunt aboliti: nihil quicquam intelligètes, iudicantes aut sentientes: quare neque à motibus violentis, etiam si seipso iis lædant, sibi temperant: & postquam ad se redierint, nullam eorum quæ passi sunt, retinent memoriam: nec hoc malum se perpeffos esse, nisi de eo fuerint admoniti, aut ex læsionis aliquo vestigio relicto, ut vulnere aut contusione, signum capientes, in suspicionem veniant, cognoscunt.

Motus quoq; omnis, tum qui ex arbitrio nostro totus dependet voluntarius: tum qui natura adiuvante obitur, respirationis & evacuationum; tum is quem natura solum molitur, pulsuum, in omnibus hisce speciebus perseverans, epilepticos ab apoplecticis & animo deficientibus, quibus motus hi (solo pulsu remanente in apoplecticis) deficiunt, distinguit. Qui tamen cum depravatè in convulsis fiat, facit ut cadant, & motus inordinatos obeant.

Cadunt autem non ob sensuum priuationem, sed quia totum ipsorum corpus simul, idq; derepentè conuellitur: ita ut nisi vertigine, quæ nonnunquam solet præcedere, præmoniti, vel consuetudine de die vel hora accessionis, si statis temporibus inuadere soleat, edocti, sibi caueant, ea perculsi dum erecti sunt, apoplecticorum, & eorum qui in syncopen labuntur more, subito corruant, & ut vulgò fertur, neq; ab aqua aut igne tuti, in summo, ob casus periculum, versentur discrimine. Quod & si eo nomine minus impendeat iis, qui in lecto ægritudinis causa decumbentes, convulsionibus supervenientibus, cadere nequeunt, magis tamen ob morbi sæuitiam periclitantur. Adeo ut omnis horrida & abominanda sit epilepsia: quam ob id Sacrum morbum, tanquàm à Diis pœnæ loco immissum, veteres appellauerunt: alij verò diuorum nomina supersticiosè ipsi imposuerunt.

Exagitant quoq; motibus inordinatis adeo corpus, ut & totum sæpè æstuet, pulsusque fiat velocior, & sudores nonnunquam prorumpant. Dorsum, cervicem, caput, brachia, pedes, in varias figuras torquentes & curvantes, iisq; obuia quæq; ut stratum, pa-

rietes,

rietes, terram pulsantes & quatientes; propria membra contundentes ac vulnerantes, dentibus constrictis stridentes, linguamq; si exerta sit, mordicis scindentes, Oculos hinc inde voluentes, quibus apertis diductisque admodum, vti & faciei versus posteriora reflexione, primum ferè incipientis paroxysmi præbent indicium: quos tandem, in fine illius, veluti defæsi & artorati iacentes, fixos toruosq;, donec ad se rursus redeant, retinent.

Respiratio ipsorum inæqualis quoq; admodum existit, cum eam aliquandiu interdum retineat, adeò vt ex retentione illa spiritus, conatuq; vehementi, stercus & urinâ, aliquando & genituram simul, præsertim si redundet, profundant; Aliàs verò cum difficultate & stertore, tum quando epilepsia vteri dictam strangulationem comitè & causam habet, tum quando pituita in fauces narsq; defluens, eam impedit, spiritum ducat; Spumamq; in ore & naribus, ex pituita cum aère illic confusa agitataq; natam (quod apoplecticis & strangulatis, non nisi moriantur, teste Hippoc. accidit) proferant: Sæpeq; vociferando clamorem edant: quam speciem schetende Geycht Germ. vocant.

Hæc autem quæ enarrata sunt accidentia, vti subito ingruunt, ita cessante paroxysmo, mox iterum remittunt. Interdum tamen reliquæ quædam illorum remanēt, sensibusq; debilitatis adhuc, nihil rectè intelligere, ratiocinari, vel reminisci queunt: Vel mentis alienatione superueniente, sinistrè omnia agunt & blasphemant: vel in profundum risum & cachinnum, Sardonium fortè illum, de quo Cicero, soluuntur: idq; donec nouus paroxysmus, qui hæc signa prænuntia mox comitari solet, redeat. Sed & ante & post accessiones hæc, particulares aliquæ conuulsiones, interdum vel præcesserunt, vel remanent: vt tortura oris, transglutiendi difficultas, vel partium aliarum spasmus, sicuti suo loco explicabitur: vel spasmus ille, quæ flatulentum vocant, qui conuulsiones quoq; si nervorum causa, vti dicetur, fiat, interdum minatur: vti & conuulsiva illa palpitatio, quam Zupsen Germ. appellant, quæ etiam à nervorum affectu facta, epilepsia diu antè se-

pè præcedit, & post eam in mēbris adhuc remanet, seq; exercet. Aliæ, quæ gesticulando, interdum saltando, vel inquietudine alia membrorum, & tremore nonnunquam exercent mortuum symptomata.

Stupor cum corporis rigiditate, affectus est rarus & admirandus, qui Catochē seu Catalepsis, id est Prehensio dicitur, quem & Congelationem, cum ac si congelati essent, rigeat, vocant. In qua sensus interni omnes & externi statim abolentur. Motus verò corporis tantum deprauatur; cum eam formam, quam corpus antequam hoc malo corripere, recumbens, sedens aut incedens, habebat, prehensi quoq; statum alicuius instar, retineant, nec sponte, nec impulsu mutant. Oculis quoq; apertis, vnde Stuporem vigilantem vocarunt: cæci tamen vti & muti omnino; Non sublata interim aut vehementius impedita respiratione, aut pulsa.

Sed & accidit in quibusdam, vt licet trunci instar rigidi sine motu & loquela iacerent, nihilominus tamen ea quæ astantes loquebantur, perciperent, & postea referent: quos Ecsticos vocarunt.

Alij verò in eodem statu manentes, mortuorum instar, etsi nihil audirent, nec cernebant, nec puncti quicquam sentirent, tamen si quid ori inferebatur, deglutiebant, & sublatis consistebant, impulsu incedebant, & membra prout illis flectebantur, eo situ fixa retinebant.

In quadam sic prehensa, venter tantum & thorax admodum mouebantur, toto reliquo corpore stupida.

Causa.

IN omnibus enarratis soporis & stupiditatis cum languore, conuulsione, aut rigore, generibus, cerebrum affici necesse est, cum ab eo omnis motus & sensus proficiatur. Neq; hic vti voluerunt prout ventriculi illius anteriores, medii, posterioresve leduntur, diuersimodè functiones labefactantur: neq; quatenus ante vel ponè cerebrum afficitur, cum cerebri substantia vndiq; suas functiones obeat; sed prout plus minusve læsum est, plures paucioresve functiones amittit. Nam si magna sit læsio, cerebrum,

adeo efficiens, ut sensus omnes aboleantur, tunc & motum simul cessare necesse est: remanentibus interim aliis functionibus, quas cerebrum minime efficit: ut pulsu, quem cor subministrat: & cum respirationis motus partim sit naturalis, partim voluntarius, & proin ab utriusque motus organis, & septo transuerso, & pulmone prodeat, non mirum, eam quoque, si cerebrum admodum offensus sit, adeo ut omnis motus voluntarius cesset, sicuti in apoplecticis fit, nihil tunc conferente ad motum septo, aut musculis thoracis, sed solis pulmonibus, adhuc aliquo modo se mouentibus, & dum dilatantur, aereque implentur, quod motu proprio naturali perficiunt, thoracem nonnihil eleuantibus, respirationem tantisper perseverare; sed valde impeditam & difficilem esse, adeo ut nisi mox noxa illa cerebri cesset, respiratione penitus sublata, aegrum suffocari necesse sit: sicuti vero cum motus voluntarius non penitus cum sensibus tollitur, respirationem tunc liberiores adhuc permanere. Quod si vero cerebrum minori affectu, si cum priori conferatur, afficiatur, per quem sensus aggrauantur saltem, ut in sopore vel stupore leuiore, tunc motus, etsi propter soporem & consternationem quiescat, nihilominus perseverat: Vel si spirituum duntaxat cerebri extrauagantium causa hoc fiat, ut in conuulsione & catalepsi dicetur, motum quoque perseverare, citiusque rursus ad se redire: sicuti quomodo hoc fiat in singulis causis, a quibus haec prodeunt, explicabitur.

Causae autem omnium mentis consternationum accidentium sunt: vel affectus aliquis, cerebrum, quod sensum & motum confert, per se vel per consensum ita laedens, ut haec illius functiones plus minusve deficiant: ut sunt intemperies: repletio ab humore pituitoso vel sanguineo: laesio insignis: tumor: a vapore vel qualitate maligna profecta cerebri intemperies: vel est spirituum animalium cerebri defectus. De quibus omnibus causis, ipsorumque effectibus, nunc sigillatim agemus.

Intemperies frigida sola sine materia, cerebrum alterans, quia functiones laedere solet, stupidum illud potest reddere. Et si hu-

midia simul existat, quod raro sine materia fit, soporem immodicum quoque inducet. Qualis aliquando etatis causa, aut ob morbi durationem, relicta cerebri intemperie, ad somnum perpetuo propensos, vel, ut dictum in mentis imbecillitate, ignauiores reddit: quam potius imbecillitatis, quam frigiditatis causa accidere docuimus.

Sed & aliis de causis inducta, maxime ab externo aere frigido, flante Borea, extrinsecus caput refrigerante, aut per meatus ad cerebrum penetrante, stuporem grauiorem potest accersere.

A frigida & sicca quoque intemperie spiritus congelante, stuporem vigilantem, seu catalepsim nasci posse, scribunt. Verum cum spiritus congelari non possint, aut si fieri posset, maior tunc stupor sequeretur, minime hoc probare possumus.

A siccitate, quam inanitionem vocant, conuulsiones fieri interdum, communis est opinio: quod non in hac conuulsione, sed particulari accidere, illic explicabimus.

Pituita soporis & stuporis, persaepe causa est (quo nomine nos omnia cerebri excrementa aquea, frigida & humida, comprehendimus) quae intra caluariam, immoderatus congesta (uti cerebrum ex sanguine pituitoso ad ipsum delato, & partis imbecillitate, talia subinde congerit) nisi per vias destinatas effluat sed supprimatur, tunc si substantiam cerebri largo humore perfundat, & refrigeret, carum efficit. Vel si eandem longo impulsu adeo irriget, ut magna illa cerebri moles mollior laxiorque facta, subito diffluat & subsidat, neruorumque principium in basi calvariae, a cerebro prodiens, premat, & spiritui animali transitum pracludat, apoplexiam graue parit. Vti quando ventriculos seu cavitates cerebri pituita subito adimplet, non obstruendo, cum spiritus animalis non in ipsis, sed in cerebri substantia vndique & neruis sedem suam habeat, nec per ventriculos transeat, sed eodem modo cerebri basim grauando, apoplexiam quoque inducere potest: quae tamen, si humor ex illis descendens, neruorum ductum sequatur, in paralysem potest desinere. Haec omnia sic se habere, in caro & apoplexia mortuis, ex

poru, humida, somni immo diu.

Pituita, causa Cerebri Apoplexia.

Intemperies frigida, causa Stuporis.

eo quòd copiosus hic humor, per os tunc illis aliquando effluerit, deprehendimus: & sectione quoque diligentè aperta crassa cerebri meninge, in quibusdam copiosum humorem mox profilientem, per capitis regionem ad thoracem vsque descendisse: ipsamque adeò cerebri substantiam, in quadam annu, quam apoplexia è medio sustulerat, lactis cremoris instar dissolutam, simili modo per faciem defluxisse, obseruauimus. Cognoscitur autem ab hac causa prodiisse hoc affectus, ex præcedenti corporis constitutione; in etate potissimum senili quæ huic malo est obnoxia: Et ex temporis cœlique constitutione frigida: quodq; prius de capitis grauedine, ac pondere, pigritia, oculorù obreuebratione, nec non pituitæ per nares ac fauces consuetæ excretionis suppressione, fuerant conquesti: & quod mortuis, apoplexia maximè, magna sæpè pituitæ copia, per dictas vias emanat.

Ab eodem humore pituitoso, meatus cerebri obstruente, vti apoplexiam, ita & epilepsiam fieri, plerique scripserunt: proin & vt in illa, sic in hæc sensus omnes aboleri, sed mox iterum redire, quòd cerebrum concussionem eam statim excutiat: dein & motum vnà cum sensibus, vti in apoplexia, hic minimè cessare, quod non omninò, sed ex parte duntaxat, ventriculi, vel vt alij volunt, anteriores tantum, posterioribus illæsis obstruantur, portioq; spirituum ad neruos nihilominus possit præterfluere. Quæ tamen, vt multis possent redargui, sic hoc præsertim ad tollendam hanc opinionem attulisse, satis erit; quòd nimirum, si non sufficiens spiritus animalis descenderet quâtitas, imminutæ potius cerebri functiones, in sensu & motu, quam abolitæ ex parte, ex parte deprauatæ sequerentur: & quòd, si pituita in causa esset, eaq; mox à cerebro excussa deflueret, paralysem eâ, qualis post apoplexiâ, eandem ob causam sequi solet, induceret.

Putrescetem in cerebro pituitam, lethargum efficere docent, febremq; comitem inde accendi. Verum nos cum ex pituitæ putredine, præsertim in capite, febrem accendi minimè posse, in febribus ostenderimus: & quomodo idem humor pituitosus putridus,

sua frigidityte carum, & calore febrem accendere, atque vnum idemque & frigidum & calidum esse, queat, cum contraria in eodem subiecto non possint consistere, nullam rationem inueniamus, longè aliam lethargi causam, eamq; à cari illius qui febres sequitur, non adeò diuersam, mox in caro per consensum factò, adsignabimus.

Pituitam quoq; non simplicem sed bile permixtam, stuporem vigilantem seu catalepsim ea ratione efficere docent, quòd pituita soporem, bilis vigilias excitet, sicq; ex contrariarum causarum permixtione, contrarios effectus produci. Quod quidem, si in diuersis locis consisterent, fieri posset, verum in eodem subiecto duo contraria permixta confusaq; medium quendam, vel compositum ex vtriusq; effectum potius, quam contrarios producunt: ob quam causam, causæ hæc ex effectu potius, quam signis horù certis excogitatæ fuerunt, vt, quo pacto eodem tempore, stupere (non dormire, cum dormire & vigilare & simul, sit impossibile) & vigilare quis possit, aliquid ostenderent, ac singulis suos humores proprios attribueret.

Sanguis quoque, in sinibus cerebri adhuc contentus, sicuti magna alioquin illius adest copia, ita amplius adhuc redundans, si crudior, serosior, frigidior sit, cerebrum grauando, stupidius: vel refrigerando, soporosum reddere potest. Quæ, capitis dolor sine dubio præcessit, & nonnunquam comes adhuc remanet: & ex plethora ruboreq; faciei id cognoscitur.

Sanguis causa Cari & Apoplexia.

A sanguine multo, cerebri substantiam affatim subitoq; irrigante, eam speciem catalepticos à qua adolescens per hæmorrhagiâ nariû liberatus fuit, generari, docet Aëtius. Qui effluxus sanguinis, motu naturæ, in solutionibus morborum sæpè consuetus non propterea hunc affectum, cuius aliam causam proponemus, à sanguine procreatum, arguere potuit: vti neq; leuiorem illius speciem, cum vox tantum intercipitur, aphoniâ dictam à plenitudine sanguinis, vias spiritus animalis intercipientem, prodire, sicuti scribit Hollerius, cuius nos mox aliam causam adferemus concedere possumus. Neque epilepsiam, quam à sanguinis copia, ventri-

culos cerebri occupante, spirituumq; meatus obstruente, quoq; prouenire aliqui prodiderunt, ab hoc humore & hoc modo nasci, approbare licet. Sicut neq; à sanguine vel succo melancholico, aut bilioso, à quo catalepticos eam speciem, quæ melancholicis accidere solet, gigni, aliqui docent, & propter frigiditatem ac siccitatem illius humoris, spiritus sic congelari, ut in intemperie simili dictum fuit; quod nos ea ratione fieri negauimus, & à melancholia, melancholica potius accidentia, quam catalepticos, nisi alia accedat causa, uti dicitur, fieri existimamus. Vel ab eodem ventriculos obturante, epilepsiam quoq; nasci, sicuti has opiniones aliqui sparserunt, illo modo admittere possumus. Cum iam enarrati affectus, utpote non diutius permanentes, sed per vices inuadentes, & cessantes, non fixam in cerebro causam habeant, sed per consensum tantum eo affecto, uti postea declarabitur, accidunt.

Extra vasa sanguis delatus, si non in cerebri substantiam infusus, inflammationem pariat, tunc enim phrenitis fieret, sed anfractus, & ventriculos subito opplendo obstruat, nervorumq; initium premat, stuporem & apoplexiam causat. Ut frequenter rupta vena accidit: idq; nonnunquam ob plethoram ad vasa: ijs præsertim, quibus consuetæ hæmorrhagiæ per menses, hæmorrhoides, & nares substituerant. Quibus & viuentibus adhuc, & post mortem, magnam sanguinis copiam, per os, nares, erumpere toties observavi: ut hanc potissimam apoplexiæ causam esse aliquoties mihi persuaserim. Idem à causa externa violenta, ut cerebri contusione, ex ictu vel casu potest accidere, etsi cerebri substantia vulnerata minimè sit, ut sanguis quoq; cerebri cavitates, ipsiusq; substantiam, iis locis præsertim, ubi confusa est, oppleat: sicuti in taurorum securi percussorum cerebro fieri, quotidie vident mulieres, quando cerebrum antequam coquatur à sanguine grumoso prius repurgant: unde apoplexiam fieri subito necesse est, nisi iis per nares, aures aliæve partes seu vias vicinas, ut quoque interdum fit, statim erumpat: aut leuior fuerit casus, unde leuior obstupescencia potius accidit. Licet & sæpe in grumos con-

uersus sanguinis affluxus, retentusque diutius, si putrescat, phrenitidem convulsiones, quæ ante obitum, lethargos & apoplexias sequuntur, ægrumq; iugulant, pariat.

Sed & ab eadem causa violenta externa, *Lesio* si cerebri substantia contusa, vel cesa, *rebra* pū- *causa* timve lædatur, cum pars sit princeps, cuius actio tunc destruitur, apoplexiam subito sequi necesse est. Vel si fracta duntaxat inde caluaria depressa sit, adeo ut cerebrum substratum premat, stuporem quoque accidere contingit. Vel si ex validiore impetu cerebri moles corruat, nervorumq; initium premat, apoplexia similiter sequitur. Quæ omnia ex causis prægressis manifesta sunt.

Tumor præter naturam, durus, pondere *Tumor* suo potius, quam intemperie afficiens, *cerebri* stuporem sensum cum tumore genitum, sed diuturnum facit. Qui ægrè nisi post mortem *Stupor* aperta caluaria deprehenditur. Qualis in nobili Boncourtio, qui aliquot annis veluti attonitus, uti supra dictum stupebat, inuentus fuit: glandula nimirum magna, dura, supra callosum corpus genita, cum humoris copia; qui cerebrum irrigans, soporem stupori copulatum, uti supra hoc genus exposuimus, efficiebat. Cuius causa, ictus, quo in vertice percussus fuerat, licet diu, antequam in morbum tunc incideret, id factum fuerit, esse potuit. Sed & cataleptism, cum veras illius causas ignoraret, plures alias excogitantes, præter supradictas, etiam à cerebri tumore proficisci posse, putarunt. Et lethargum quoq; ab apostemate phlegmatico prodire, aliqui scripserunt: quod, cum à causa in cerebro latente febrem fieri non posse, superius ostenderimus, neque hic accidere asserimus. Cuius & abscessum aliqui causam statuerunt, qui tamen in cerebro genitus, à calidis potius tumoribus, phrenitim & convulsiones potius quam lethargum efficit.

Vapor sursum ad cerebrum delatus, vel in cerebro congestus, soporis immoderati per consensum facti, causa esse potest: si copiosus & haliciosus co feratur, spiritusque aggrauet, vel crudus cerebrum adeo humectet, ut languidum ad actiones obeundas fiat. Talis à cibo vel potu pleniore, vel vaporoso, vel humidior eleuatur: quæ si moderatio-

ra sunt,

ra sint, somnum qui post prandium vel cœnam mox solet esse molestus, conciliat: præsertim si vinum, quod narcoticam quandam vim habere, mox dicemus, vti fere consuetum est, bibant: & cerebri constitutio accedat humidior, qualis est in senibus. Quam ad somnum propensionem, à cibo fieri solitam, quies corporis, quæ post labores interrim dum cibum capiunt, perficitur sedendo, eoq; magis, quò longiorem moram in prandio vel cœna trahunt, animum quoq; vt per somnum quiescat inuitas, plurimum etiam concitat: & calor si accedat solis meridionalis, vel regionis, vel loci, vt hypocausti, nihil adiuuat: tum quia vapores calor sursum euocat, tum quia corpora fessa recreans, & ad quiete rectius disponens, vt animus simul ad requiem inclinet, efficit. Sed & ab immoderato cibi & potus, vel certorū alimētorū vsu, non qualitate stupefaciendi cerebrū, obtundente, sed vapore multo opplente, sopor immodicus fieri potest. Quod inde cognoscitur, si post crapulam, etiā citra ebrietatem, de qua postea, aut certorum ciborum vsu hunc patiuntur, & postea ad se redeant.

Vapor causa Soporis pro fundi. Ab humoribus & excrementis vaporosis ac humidis, vapores hinc inde in corpore suscitati, soporem gignere interdum solent. Si in ventriculo vel vtero colligantur: vnde multi alij cerebri morbi, per consensum facti prodeunt, sic & interdum soporem immodicum, si vaporibus illis cerebrum infestetur, inducunt. Qui ex partium istarum affectibus quòd inde prodierit, facile cognoscitur. In intestinis à vermibus putrescentibus, tales euaporationes capiti demandatæ, sopore; in infantibus præcipue, frequenter causant. Et vermium indicijs, vnde prodierit indicatur. Licet hic sopor frequentius febris comitis causa promoueat.

Vapor causa Ectharas in febribus. In venis melaicis febrium intermittētiū materia putrescens, calore attenuata, copiosq; sursum, in prima præsertim inuasiōe, ad caput delata, soporis hoc symptoma, in tertianis & quartanis, nonnullis in principio accessionis, dum frigus adhuc vrget, nec dum corpus penitus incaluit, accidens, & interdum ad solutionem vsq; paroxysmi perseuerans, parit. Sed & in febribus

continuis, cerebrum dolore præcedente diurno & graui labefactatū, in vigore vel post ipsum, caro subsequente, percussū, ægrum in summum discrimen adducere, sæpe obseruauī. Quod & in principijs continuarum febriam si accidat, & mox propter nimiam euaporationē, princeps hæc pars cerebrum, aliquo pacto præsertim dispositū ad carum, ita labefactetur, vt sopor grauis sequatur, lethargus is erit, qui cum febre continua copulatus est, & mox cum illa inuadit: ab alio caro qui in declinatione febrium accidit, periculoso quoque, non aliter, nisi quòd statim cum febre incipiat, differens.

Ab euaporationibus à ventriculo, ab vtero, reliquoq; corporis habitu, cerebrum petentibus, epilepsiam per cōsensum fieri pleriq; asserunt: vti & catalepticos aliquam speciem, à melancholicis vaporibus prodire aliqui scripserunt, & quomodo illud fiat, diuersimodè assignant: cum alij opplendo quoque ventriculos cerebri, vel alia ratione illud afficiendo, vel irritatione id fieri existimant: quod tamen quomodo neruosi generis affecti causā id fiat, mox explicabimus.

Occulta nonnunquam qualitas, proprietate incognita, soporis & stuporis causa esse solet. Qualis vis est narcotica, quæ non frigiditate, vti hæcenus creditum est, sed proprietate ea, qua sensus consopit, per assumptā eiusmodi medicamenta, corpus subeuntia (licet odore quoque aliquid efficere possint, admota autem vix adeo operantur, vt stuporem inducant) soporem non naturalem, si leuiora sint, sed veluti artificialē conciliant. Quod si fortioribus exhibitis potentius agat, adeo stupidos reddit, vt apoplecticorum instar, sine sensu & motu iaceant, & nisi ad se redeant, sublata respiratione, suffocentur: sicuti à papaueris succo, alijsq; sæpe euenire comperimus, quo nomine illorum vsus adeo est periculosus. Sed & ex vini immoderato vsu, non propter euaporationem, vti putarunt, sed ob narcoticam illius vim, sopor immodicus & stupor quoque, qui non minus ac si opium sumpsissent, eos attonitos reddit, sæpeque interficit, in ebriosis sequuntur. Quemadmodum ex vini elicito liquore, quem spiritum vini vocāt, id quoq;

Narcotica vis causa Soporis & Stuporis.

accidit, eoq; potentiùs, cum vis ipsius sit magis in angustum redacta & collecta: cuius ingurgitatione infantes aliquot simul, qui casu biberant, nec non adultos quosdam obstupefactos, extinctos vidimus.

Venenata qualitas, causa Soporis et Stuporis.
 Venenata quædam, idem abscondita efficiunt, extrinsecus illata, per ictum bestiarum quarundã, sicuti ex morfu aspidis soporem lethale succedere, Plutarchus in morte Cleopatræ scribit. Qualis vis maligna, in corpore quoque, ex humoribus in venenatam qualitatem degenerantibus, suscitari potest: in febribus malignis, pestilentialibus, quarum euaporatione cerebrum inficiatur, sopore graui & lethargo grauari potest. Quod & in epilepsia inde profecta, in fine paroxysmi accidit, diu illos tunc sopore vel stupore premi: non tam ob defatigatum nimia agitatione cerebrum, quam quod vapores hi maligni, qui prius neruofum genus afficiendo, vti mox dicetur, motus illos epilepticos causabant, cerebrum postea labefactantes, soporem vel stuporem aliquandiu, donec vapores hi disculsi sint, & paroxysmus solutus sit, inducunt. Quod & in catalepsi simili ratione, cum convulsione quædam sit species, accidere potest.

Dæmon causa Soporis dæmoniæ.
 A dæmone, si causa soporis illius delirantis, quo dæmon sagas ludificatur procedat, non nostrum est, causas illas abditas exquirere, quas veneficæ, vnguentis quibus res inungunt, iussu diaboli, aut decoctis quibus grandines concitare se posse, & cælo deducere nubes, somniant, attribuunt: qualia & Fotis apud Apulæum, & Circe Homeri, alia, serpillumque, & herbas contundendo o-lentes, parabant: quæ relinquimus.

Ob spirituum animalium in cerebro defectum, stuporẽ, sublatis cerebri functionibus, accidere quoq; necesse est: Quod duplici nomine euenire potest; vel absumptis illis; aut effusis saltem & extrauagantibus.

Spiritus animalis consumtio, causa Apopleciæ.
 Absumptis spiritibus animalibus in cerebro: si saltem imminuti sint paucioresve existant, vnde cerebri sequitur imbecillitas, illius quoque functiones labefactari, in mentis imbecillitate dictum fuit. Quod si verò penitus vel eousque consumantur, vt non tantum functionum debilitas, sed omnino

da illarum sequatur abolitio, grauis & subito hominem iugulans erit apoplexia: qua senes aliquando interire, & vulgus quoque ab humore pituitoso factam fuisse, credit, sæpe vidimus: sicuti spiritu vitali imminuto, virium defectum, absumpto verò omnino, mortem subsequi videmus.

Effusis seu profusis à cerebro spiritibus animalibus, in neruos cerebrum continuatos (aliò enim extrauagari nequeunt, cum nulli nisi in cerebro, neruisq; possint consistere) tunc sensus internos, vel omnes vel aliquos, prout maior minorve illorum cerebrum derelinquit copia, cessare contingit mouendi verò vim minimè aboleri, cum spiritus illi in neruis adhuc persistant, neq; nerui illis, sicuti verò in resolutione sit, transitu illorum tunc è cerebro ad illos impedito, destituantur. Dein & cum in neruis spiritus animalis quoq; contineatur, æquè ac in cerebro, cuius portiones sunt, etsi cerebri functiones tantisper desistant, illi nihilominus vim mouendi, quam in se continent, aliquandiu adhuc possunt exercere. Quam & à neruis potiùs, quam cerebro in quibusdam animalibus, quæ motu magis quam sensibus prævalent, prodire, ex eo, quod illa cerebrum nullum vel exiguum tantum possideant, dorsalem verò medullam amplam & copiosam, cuius etiam portio, à reliqua parte amputata, nihilominus adhuc aliquandiu mouetur, satis possumus conijcere. Estque hæc vera & legitima causa, quod sensibus abolitis, motus nihilominus possit aliquandiu persistere: in qua inuenienda, tantopere se & veteres, & neoterici Medici excruciarunt, inuicemq; dissentaneas opiniones prodiderunt: spirituum nimirum hæc in neruos effusio: Quæ à duabus potissimum causis proueniens, diuersa nonnihil, sicuti iam explicabitur, accidentia profert.

Quarum prima est, nimia & vehemens perseveransque sensuum internorum operatio: per quam, vti in cordis magnis passionibus, adeo spiritus vitales efferri videmus, vt animi inde defectus sequatur: ita & si per vehementiorem cogitationem, & intentionem in rem aliquam, spirituum animalium fiat in externorum sensuum organa dissipatio, ac-

Spiritus animalis è cerebro in neruos nimia profusio, causa Soporis diuersi- rum generis, Catalepsi seu Epilepsia.

tio, accidere potest, vt veluti attoniti, leuiter stupeant, & vel mox iterum remeantibus illis, ad se redeant: vel si diutius perseuerent, diuersæ illæ catalepticos species, quas ex nimio studio, vel amore, vel animi aliquo graui affectu alio, melancholia præsertim (vnde factum vt causam catalepticos pleriq; melancholicum succum statuerint) accidisse aliquando, in generum superiorum explicatione demonstrauimus, prodeant. In quibus si nos penitus spiritibus effusis, portiones aliquæ illorum in cerebro remanserint, sensus quoque aliquos persistere, alijs cessantibus, & prout in nervos effunditur, motus quoq; vel saltem permanere, aut cum rigiditate sese citra concussionem exerere posse, si nulla neruorum, vti in epilepsia dicitur, fiat contractio, hancque diuersitatis catalepticos specierum, sicuti in diuersis illius historijs superius ostendimus, causam esse, verisimile videtur. Vti tamen quoque, si per animi violentum affectum, adeo spiritus effrangentur, vt aliquandiu se recolligere nequeant, epilepticorum instar illos quoque corruisse, remanente pulsu, quo ab animo deficientibus distinguebantur, vidimus in quibusdam, qui cum in magnis conuentibus perorabant aut disputabant, ob nimiam animi & sensuum cōtentionem, accedente interdum vel metu, vel pudore, spiritibus agitati, hoc passi sunt. Vnde fortè quoddam ob eam causam in comitijs aliquibus contingere solebat, epilepsia comitialis morbus dictus fuit. In quibus animi vehementibus motibus, vti fieri potest, ita ab ira quoq; convulsiones facillimè euenire posse vulgò creditur: cui opinioni fortè ansam præbuit quoddam in dispositis, paroxysmus hac ratione promouetur: nisi forsan hoc ob bilis per iram concitationem, sicuti mox declarabimus, accidat.

Altera verò & frequentior spirituum profusionis in nervos causa, vnde grauiora epilepsia & catalepticos sequuntur symptomata, cerebri irritatio existit: talis, per quam facultas illius expultrix excitata, ad executiendum illud, quod illi molestiam parit, insurgens, spiritus simul propellit: vti natura, vbi que dolorem & molestiam sentiens, eo spiritus, & vnà cum illis sanguinem quoq; adeo

potenter sæpè, vt inflammatio partis illius, quæ recipit, sequatur, solet protrudere.

Quam certè cerebri molestiam, seu irritationem, per cōsensum potius & compassionem cum aliqua parte, quàm proprio illius affectu, accidere demonstrant: quod ab alterius partis, procul etiam interdum à cerebro dissitæ, affectu & morbo potius, quàm cerebri, & neruo puncto, vel violento sumpto pharmaco, convulsiones euenire videamus: cum si ex cerebri morbo aliquo graui (sicuti reuera grauem morbum, qui tam vehemens symptoma induceret, esse oportet) accideret, non tam citò convulsionum accidentia, quæ infert remitterent: queamodum & in alijs huius partis principis læsionibus, diuturna & perseuerantia, vt in apoplexia videre licet, succedere symptomata, videmus: eosq; affectus, qui neruis contingentes convulsiones excitant, veluti puncturam, inflammationem, si in cerebro fiant, non illas, sed apoplexiam & phrenitidem inuehere. Licet & per cōsensum hac ratione cerebrum molestatum, si causa offensionis magna sit, continuoq; repetat, cerebrum ipsum non solum irritans, sed & vehementia, & frequentia adeo lædens, vt proprium quoq; affectum contrahat, tunc ferè iusta convulsionum continua permanet, nec ad se exactè amplius ægri redeunt, aut paroxysmus integrè cessat, donec penitus extinguatur æger. Fieri tamen quoque potest, vt ab eadem causa, sicuti de venenata mox dicemus, & neruosum genus & cerebrum simul læsa, convulsiones vnà cum alijs mentis læsionibus copulatæ, accidant:

Hanc autem partem quæ primum afficitur & cui cerebrum condolet, vt inueniamus, si symptomata consideremus, motum scilicet inordinatum, & sensuum priuationes, eam esse oportebit; quæ cum musculis motum voluntarium edentibus, & cū cerebro, sensus communicante, tantum habeat cōsensum, vt ea laborante, musculi impellantur, & cerebrum à functione tantisper cesset. Quam nos neruosum genus, quod à cerebro prodit, & in musculos definit, esse dicimus: quo nomine neruos omnes totius corporis, tum intra, tum extra caluariam, sensu tactus

tactus præsertim præditos, & partes nervo-
sas, quæ ex illis componuntur, exquisitissi-
mè quoque sentientes intelligimus. Quibus
adeo læsis, ut per compassionem cerebri abo-
leantur, musculorumque intenduntur fun-
ctiones, convulsiones subsequi necesse est:
quod qua ratione fiat, explicabimus.

Offensio nervosi generis, non ea, quæ ip-
sius functiones labefactat, sed quæ mole-
stiam illi adferendo, facultatem illius potius
excitat, si fiat siue vno loco pluribusve ner-
vus aut nervosa pars afficiatur, dummodo
offensa magna sit, tunc uniuersum nervo-
sum genus insurgens, dum illud quò offen-
ditur, nititur excutere, cerebrum à quo pro-
dit, simul exagitat, & in consensum trahit,
ita ut & illud nervorum hosce affectus per-
sentiens, dum suppetias illis ad expellen-
dam molestiam adferre nititur, spiritus ani-
males, à se in nervorum initium propellens,
tantisper suis destituatur functionibus: non
aliter quàm nonnunquàm in syncope, cor ci-
tra quoque illius affectum proprium, alterius
causa, spiritibus extrauagantibus, à func-
tione sua cessare, donec rursus illi remeant,
obseruamus. In qua spirituum effusione in
nervos, vim mouendi non tantum, sicuti su-
perius declaratum fuit, in ijs persistere con-
tingit, sed & ob spirituum in nervis copiam,
musculos ad motum edendum quoque con-
citari. Inprimis verò inordinatū & violentum
motum, in epilepticorum paroxysmo-
rum principio, ob hanc causam edi, quòd
dum nervosum genus hac offensam expel-
lere conatur, in sese contrahitur, rursusque
deducitur, totius corporis musculos, quorū
principijs nervi inseruntur, consecutione ad
eos motus inordinatos perpetrandos, con-
uellendo seu trahendo remittendoque impel-
lit: idque tam diu, donec materia noxia, ab il-
lis expulsa fuerit: aut propter viriū prostra-
tionem, & veluti lassitudinem, cum motum
amplius edere nequeant, membra nihilomi-
nus convulsa seu attracta, rigida, donec in-
tegrè ad se denuò redeant, aliquandiu fixa,
retineant. Quod in catalepsi statim ab initio,
nulla prægressa corporis agitatione euenit,
quia fortè nec tanta spirituum in ea, cum &
in illa sensus aliqui adhuc interdū consent,

fiat in nervos profusio: minorque nervorum
irritatio, unde leuior quædam epilepsia cen-
seri potest: rariùs tamen eueniens: à causa
alioquin eadem quæ & epilepsiam parit pro-
ueniens, sed quæ vel minùs nervosum ge-
nus irritando afficit, vel proprietatem eam
habet, ut stuporem illum cum rigiditate
membrorum potius, quàm convulsiones
producat.

Has autem offensionis nervosi generis,
unde epilepsia frequenter, rariùs catalepsis
prouenit, causas non mirū diuerfas frequen-
tesque esse: cum nervi propter exquisitissi-
mum sensum, non tantum graues molestias,
doloresve perferre nequeant, sed & à lenissi-
mis tam facillè offendantur, ut neque con-
tactum durioris corporis (quò nomine, dum
in corpore feruntur, ne ossa quoque tangen-
rent, aut alijs præterquam quibus partibus
neciterentur, inseruntur, ipsis à natura pro-
spectū fuit) pati queant: à quibus tamen in-
cursionibus varijs, non nisi magnæ & violentæ
fuerint, adeo ut conuellantur, exacerbantur.
Quales sunt quæ à vulnere, irritatione
aut infectione, vel separatim, vel pluribus
simul agentibus, illis possunt accidere.

Ex vulnere, tam in nervo, quàm nervosa
parte facto, fieri convulsionem, casus eiusmodi
frequenter contingentes, satis declarant: non
tamen ex quouis nervi vulnere, sed ab eo
tantum ferè, quo nervus punctim læditur,
convulsiones superuenire solent: excitata
tunc ob offensam, illius functione: quæ, si
penitus abfectus sit nervus, potius aboletur:
quam & ob causam, nervum convulsum, si
amputemus, convulsionem in eo factam, sanamus.
Cæterum hanc nervi molestatio-
nem, à continui illius solutione profectam,
magis adhuc adauget inflammatio, vel pu-
tredo, ex retenta sanie in angusto puncturæ
nervi foramine: summusque inde dolor; quæ
plerunque huic affectui superuenire solent:
aut si vulnus à ferro, suapte natura nervis,
propter æruginem ferè, aut quia infectum
fuit, infesto, vel morsu aut ictu venenatę be-
stię, accidat.

Sed & nervosa parte, eo præsertim in lo-
co, ubi nervi eam subeunt, maioremque ipsius
portionem constituunt, vulnerata: ut vesica

in collo, musculis circa initia, vel casu vel dum chirurgi & lithotomi sectiones in corpore moliantur, læsis, convulsiones periculosæ frequenter superueniunt: quas transglutiendi difficultas, (quam spasmodum ad stomachum, vti supra dictum, vocantes, chirurgi tantopere metuant) præcedens, præfigere ferè solet.

Irritatio nervosi generis, si vehemens fuerit, convulsiones excitare quoque potest: qualis procedit vel à causa, quæ, quia dolore graui nervos excruciat, ex accidenti convulsiones facit: vel quæ per se, qualitate manifesta nervos excitans, doloremque vel vnà, vel nullum inferens, eos conuellit. Quæ causa, vel à medicamentis: vel humoribus internis, vt sanguine, bile & pituita, substantia propria, vel vapore solo nervos molestantibus procedit.

Doloris autem occasione præcipue convulsiones fiunt: si vel enormes & diuurni sint cruciatus: quales in colicis, convulsiones sæpè promouent: vel si corpora sensu exquisitissimo prædita, & quæ ob teneritatem eiusmodi tormèta difficulter perferunt, infestent: quo nomine & infantes, non tantum in varijs ipsorum ægritudinibus, sed & cum dentire incipiunt, doloribus exacerbati, frequenter conuelluntur. Sed & titillationem immoderatè factam in eiusmodi corporibus, quia molestiam tristemque sensum quoque exhibet, convulsiones in quibusdam peperisse, testatur experientia: imò leuem quoque titillationem à vermibus, intestina ventriculumque perreptantibus, osculisque suis illa fugentibus, inductam, in infantibus, non tantum horrores, morsusque narium, sed & leues epilepticas convulsiones mouere omnibus in confesso est.

Assumpta medicamenta, quæ facultatem expultricem ventriculi & intestinorum stimulant, si nimium eas partes excitent, vti convulsivum motu, qui per singultum fit, concitant: ita si vehemèter acrià sint & adurentia, quemadmodum narium indita, sterutinationem mouent, sic accedente præsertim cathartica vi, qua naturam simul admodum ad vomitionem & deiectionem sollicitant, ob insignem efficaciam, convulsiones,

quales ab hellebore aliorumque vsu contingunt, frequenter procreant: easque lethales, si nimium se hisce partibus insinuando eas exagitare nõ desinant: nondum verò lethales, si, vbi primum naturam sollicitare incipiunt, ab ea repulsa, supra infraque deiciantur: sicuti ex antimonij asarique vsu, aliquos præludia duntaxat spasmi, in cruribus præsentientes; alios verò convulsos quoque, ad se rediisse, obseruauit.

Sanguis corruptus putrescensque, si in nervosum genus feratur, illud quoque afficiendo, convulsiones excitare potest. Sicuti ex ictu capitis, caluariam penetrante nondum tamen cerebri substantià diuidente (vnde apoplexia potius sequeretur) sed cerebri meningis duntaxat vulnerante, quandoque accidit: effuso tunc sanguine, retentoque sub caluaria: qui putrescens, maligna qualitate cerebri membranas inficit: quorū consensu, tum quod subsidens, nervorum principium è cerebri basi productū occupet: afficiatque, convulsiones, quæ capitis vulnera sequuntur, parit. Quales quoque in abscessu meningum, post illarum inflammationes, phrenitidem prægressam, convulsiones nonnunquam solent subsequi.

Bilis ex humorū classe, præcipua esse solet, tam flaua, quam viridis & atra, quæ acrimonia sua nervos, nervosque partes, quas & faciliè tenuitate sua subit, stimulare, irritareque solet. Quæ in colicis doloribus, non tantum quod cruciatus hosce pariat, sed & quod ventriculo atque intestinis sese insinuans, vi quadam caustica eas nimium sollicitat, convulsiones illas, quæ quamdiu acris hic humor irritare non desinit perseverant, excirat: vt non alia ratione eam ad nervos procul rapi, si convulsiones excitare debet, excogitare necesse sit. Quod & si ab ira convulsio fiat, ob bilis effervescentiam, atque effusionem accidere posse, putant: licet hoc potius à nimio animi motu, spiritus cõcitante, vti supra dictum fuit, prodeat.

A pituita quoque tenui, salsa acrique, à cerebro in spatia per quæ nervi feruntur fluente, nervosque vellicante, epilepsia fieri potest: qualis in paralyti nonnunquam nervos irrigans, primò resolutiones, mox acri-

monia sua, quam vel prius obtinuit, vel ex putredine de nouo adeptæ est, nervos sollicitans, convulsiones eas, quæ paralytices quandoque sequuntur, excitat. Quas sternutatio, ab eadem pituita in nares à cerebro quoque destillante oborta, præuenire & præagere solet: unde fortè hæc benè præcædi post sternutationem consuetudo, cum sternutationem epilepsiæ prænuntiam interdum esse obseruassent, primam suam sumpsit originem.

Vapores quoque tetri & acres, maximè si malignitas quædam, uti dicitur, simul addit, in corpore suscitati, nervorum principium præcipuè vellicantes, aut alibi quoque eos, maiores præsertim sollicitantes, epilepsiam quam per consensum fieri dicunt, gignunt. Quales ex vitiosis, corruptis & putridis cibis, humoribus, excrementis, vermibus: in ventriculo, intestinis, vtero, venoso genere, alibi que collectis, in varijs morbis harum partium: vel totius corporis, ut in febribus, eleuati, convulsiones quæ hosce morbos sequi solent, procreant.

Ceterum quæ venenata & perniciofa qualitate convulsiones excitant, varia sunt: quæ pro venenorum diuersa natura, & prout vel nervoso generi tantum infesta, illud tantum, vel vnà cum illo cerebrum quoque inficiunt, vel convulsiones: vel cerebrum simul leso, alia quoque pariunt accidentia, quæ interdum etiam soluto paroxysmo epileptico, in sensuum læsionibus, mentis præsertim alienatione, & motu deprauato, uti dictum, permanent. Inter quas causas venenatas, ea quoque nonnunquam se offert, quæ proprietate sua & priuata noxa, catalepticos potius quam veræ convulsiones accidentia parit: quod tamen, cum rara sit affectio, raro talem venenatam qualitatem, quæ talem effectum in corpore proferat, in corpore suscitari, uti verò illam, quæ veras convulsiones facit sæpissimè, euidenter ostendit. Qualiscunque autem ea sit, illius fons & origo, nunc intrinsecus in cerebro; vel visceribus; aut venoso genere, vel corporis habitu delitescit; nunc verò extrinsecus corpori accedit.

In cerebro, à corruptione vel abscessu meningum cerebri epilepsiam diurnam fatam, se sectione deprehendisse testatur Fer-

nel. ab ijsque tetrum vaporem eleuatum, statoque tempore ventriculos subeuntem, paroxysmos procreasse, ratiocinatur. Verum quidd hæc, non quia tetrum vaporem ventriculis demandent, sed aliam ob causam, & quod breues potius & lethales, quam diurnas epilepsias excitent, supra demonstratum fuit: cum, si cerebri substantiam illiusve ventriculos occuparent, & tantoperè læderent, apoplexiam potius quam convulsiones inducerent.

Interea tamen epilepsiæ causam, in capite sæpè numero latere, minimè negamus: multa que intra caluariam, tum in membranis cerebri, tum ipsius quoque substantia, vel humoribus illius occurrere vitia, fatemur, quæ venenata & aduersa qualitate, certis temporibus, prout veneni natura est, sequentia, meningibus nervosumque genus sollicitando, epilepsiam illam diurnam, sæpeque incurabilem causant. Cuius tamen causæ naturam, uti & aliorum venenorum, aliter cognoscere non possumus, quam quod sectione facta, nunc macula: nunc humor aliquis ater vel spumofus, in interna caluariæ sede aliqua, vel ossis, vel membranae, vel cerebri, interdum verò nihil penitus, deprehendatur: venenatam aut eam vim fuisse ex eo, quod cum causa manifesta, aut tanti momenti non sit, tam horreda nihilominus adferat symptomata, & interea tamen hominem minimè iugulet, nec ullis remedijs cedat, colligimus.

Sed & in visceribus venenata hæc causa latitans, diurnas eiusmodi & pertinaces epilepsias efficit. Veluti in ventriculo & intestinis assumpta venena, quæ proprietatem aliquam epilepsiam gignendi habent: vel cibus in veneni naturam conuersus, vel excrementa venenatam qualitatem induentia, illis in locis, vel etiam in vtero, uti voluerunt, contenta. Quorum omnium causas hæc esse, & in venis latere, ex affectibus quoque simul ferè concurrentibus, uti dictum, alijsve circa præcordia & venosum genus sese offerentia, & ex vteri ventriculique vitij cognoscitur, & dijudicatur.

Venosum quoque genus, si malignis & venenatis eiusmodi humoribus refertum sit: uti in morbis perniciosiss, præsertim pestiferis, epi-

ris, epidemijs & contagiosis frequenter accidit, eaq; vis maligna non solum cordi, sed nervoso in primis infidetur generi, tunc convulsiones, quales in febribus, nō ob nimiam nervorū à calore vehementi exiccationem, sed humoris malignam vim lethales evenire solent, sequuntur. Vel si etiam extra hoc morbos, in venis coaceruatus humor, in malignam qualitatem versus, eam naturam cerebro & nervis aduersam induat, vt epileptica potius accidentia, quàm alia inducat, (sicuti in melancholia, venenatam talem illuc quoque vim melancholiam veram & maniam excitare solere, in mentis alienatione ostendemus) tunc epilepsiam illam diuturnam & incurabilem ab hac potissimum causa prodire existimauerim: vt ab eodem loco excitata venenata quoq; causa, maniam illam tam diu durantem excitat. Quod & consimili ratione in venis mesentericis, tali materia collecta, quæ potius epilepsiam, quàm hypochondriacam melancholiam procreat, accidere, verisimile est: vbi & catalepticos causam contineri, melancholicū nimirum humorem, quem nos malignū insuper statuimus, à quo vapores eleuati eam inducunt, pleriq; scribunt, & curandi catalepticos rationē, huic loco & humori, vti mox ostendemus, accommodant.

Sed & in mulieribus, circa vteri venas, talis materia frequentius coaceruari solet. Vbi & retētus corruptusq; sanguis potius quam semen (quod vix ad eā peritiam peruenire posse credimus) convulsiones, quales in virginibus hystericis & mulieribus, suppressis menstruis, ante & postquam grauidæ sunt, frequenter evenire solent, excitat, & catalepsi quoque occasionem præbere potest.

In habitu corporis, qualitatē similem exurgere posse, epilepsiamq; causare, testis est experientia: quā instructi Galenus & Fernelius, illē auram in puero epileptico à pede ascendentē: hic vaporem à vertice per exteriora capitis excurrentē, quorūcūq; epileptici paroxysmi inuadebant, hisce occasionem præbuisse, se obseruasse scribunt: nosq; à manu vbi postea abscessus natus fuit, vti & à pedibus, alijsve è locis auram discurrentem, idem fecisse, aliquoties notauimus.

Extrinsēcus eiusmodi venenum corpus subiens, epilepsijs simili ratione occasionem præbere, vti in alijs regionibus bestiarū virulentarum, præsertim viperæ morsus, ictus scorpion, ostendunt: sic in nostris, ex canis rabidi morsu id contingere, & præter maniae aliq; sæua symptomata, convulsionibus periclitari, tandemque multis accessionibus è medio tolli ægros, manifestum est.

Odore solo maligno, quæ epilepsiam de nouo gignere possint, an aliqua inueniantur, nondū satis constat: paroxysmos tamen epilepticos odore quorundā promoueri certum est. Quæ vel proprietate quadā id faciūt: qualia scribuntur esse; vngulæ asini, cornu capræ, pedis veruecis, crematorū cinis: item bituminis, myrrhe, apij odor: vti & carniū caprarum, iecoris caprini vel hircini nidor: eoq; magis si hæc quoque edantur. Vel quia caput nervosumq; genus, diuturnitate huius affectus imbecilliora reddita, vapore vehementi, vel subtili tentant (vt & vinum, quod præter hoc, nervos quoque suapte natura facile sollicitat) accessionibus epilepticis, occasionem præbent.

Curatio.

IN eiusmodi casibus à cerebro profectis, tota operatio Medici, quæ in prædictione & curatione consistit, causæ erit accommodanda: non neglecto interim symptomate, quod maximè vrget.

Si itaq; ab intemperie simplici frigidiorē & humidiorē cerebro impressa: vt ætatis ratione infensibus, vel ex morbo diuturno accidere posse diximus, soporosi aut stupidiores, fiant, nondū tamen omnino ægrotent, cum illa ægrè corrigatur, hoc quoq; vitium ægrè tollitur. Emendari tamē non nihil hæc intemperies, sicuti in mentis imbecillitate à similibus causis genita dictum fuit, iisdem quoque alterantibus medicamentis & alimentis, tam sumptis quàm admotis, potest.

Vti quoque si à frigida & sicca intemperie stupor accidat, ea competent, quæ illic in eadem intemperie emendanda dicta sunt. Si verò ab externo aëre aut vento, cerebrum actu refrigeratum, stupor sequatur:

admotis pellibus & plumis, alijsque actu calidis; item fustibus, emendabitur: qui cum in pituitosa causa quoque competant, illic copiosius explicabuntur.

Cari &
Apople
xia à pi
uita cu
ratio.

Si verò à pituita vel affluxu humoris frigidi, aut cerebri excrementis, ut dictum, sopor grauis fiat, etsi vulgus de illis, quos non sopore oppressos, sed apoplexia tactos iudicat, desperet, & reuera periculo non vacent, non tamen spes sanationis abiicienda; cum multi ex illis, nisi grauius aliquod accidens superueniat, ut convulsio, humore putrescente, & febris, ut dicitur, acuta comes sit, vti in lethargo, qui in senibus lethalis est, sanentur: licet & viderim post aliquot convulsionum paroxysmos, à caro nihilominus conualuisse, relicta tamen in visione & memoria, hallucinatione quadam, quæ postea ob senium emendari minimè potuit.

Quod si verò apoplexiam pituita inducat, tunc nisi illa deorsum in dorsalis medullæ initiū delapsa, paralysem, vti dictum, causet, respiratione sublata, ægrum mox iugulat.

Curatio, siue soporem aut stuporem pituita causet, ferè erit eadem, nisi quod fortiora in apoplexia, cum causa sit maior, erunt vsurpanda, magisque in curâ, propter periculum festinandum: quæ in paralysem definit, ut paralytis erit sananda. Sed & lethargo, non aliam curam quàm caro, paucis quibusdam, vti dicitur, ratione febris mutatis, accommodant.

Reuellemus itaque in hisce omnibus, pituitam à capite, per generales, particularesque euacuationes: Et per loca vicina quoque, pituitæ vacuandæ destinata, os, nares, illam deriuabimus. Et ad superficiem capitis eam attrahentibus resolvere conabimur. Atque alterantibus intus forisque admotis, eam dissoluere, absumere, caput calefacere & roborare, studebimus; sequenti modo procedendo.

Sanguinis detractione, per venæ brachij, cephalicæ dictæ, apertionem, in sopore, si magna adsit plethora, suadent: & apoplexia, iisdem signis apparentibus, eam quoque aliquando revulsionis causa, concedunt: sed parce factam: eamque si aliquid emolumenti

attulisse videatur, reiterant. Nonnunquam & venam frontis aperiunt. Alij in hisce affectibus venam pedis malunt tundere: quæ omnia consideratè in apoplecticis præsertim, ne mortem sic accelerasse videamur, erunt faciendæ.

Alvus sollicitanda, in vtrâque specie, & vt deiciant, stimulanda, cum ad revulsionem, tum ad sopitas facultates excitandas. Idque immisiss in podicem acribus suppositorijs & clysteribus, cum ægrè aliàs deiciant.

Suppositoria cum egregiè irritent, & citò parari possint, ac clysmata ob torporem non retineant, valde conueniunt: sæpeque reiteranda, præsertim in apoplecticis: in quibus adurentia etiam, cum sine sensu sint ægri, nocere minimè poterunt.

Itaque leuioribus prius tentatis, si nihil proficiant, sequentia fortia vsurpabuntur: R. Mellis ʒ. ij. succi Mercurialis ʒ. ʒ. Fellis tauri ʒ. ʒ. coquatur: adde in fine radicis Helleborei albi & Pyrethri ana ʒ. ʒ. Colocynth. ʒ. ʒ. Salis gemmæ ʒ. ʒ. fiat suppositorium. Vel vt citius paretur: excipiantur hi pulueres Melle crudo; fiant suppositoria.

Clysmata non tantum ante venæ sectionem, si ea fiat, ad intestina eluenda; sed & post eam; primum ex emollientibus, & stimulantibus calidis, capitique appropriatis, parata conueniunt: mox etiam ex fortiter irritantibus; quæ quoque cum non retineant diutius, repetenda, eoque frequentius, quo morbus magis vrget, vt in apoplecticis.

Leuior itaque talis ab initio exhibeatur: R. Maluæ Mercurialis seu Betæ, Saluiæ, Rutæ, Pulegij, an. M. j. rad. Ireos recent. ʒ. iij. Furfuris, florum Chamomillæ, Anthos ana p. j. seminis Carui ʒ. ij. fiat decoctio; dissolue in decenti quantitate, Mellis ʒ. j. Benedict. lax. ʒ. ij. olei Laurini, Rutacei ana ʒ. j. Salis ʒ. j. fiat clyster.

Fortior sic fiet; qui post primum exhiberi poterit, vel statim in principio, si vrgeat malum: R. rad. Ireos rec. Sigilli Salom. Cyclamin. ana ʒ. j. Imperatoriæ ʒ. vj. herb. Rutæ, Thymi, Saluiæ, Lauri, Pulegij, Origan. Calamenthi Hyssopi, ana M. j. florum Stœchados, Anthos ana p. j. seminum Carui, Cimini ana ʒ. ij. seminis Carthami baccarum

carū Lauri, Iuniperi an. 3. β. Agarici in panno ligati 3. ij. fiat decoctio; dissolue in decenti quantitate, Hieræ colocynth. 3. ij. Mellis anthosati 3. j. fucci Mercurialis vel Betæ 3. j. Fellis tauri 3. β. olei Rutacei 3. ij. de Castoreo 3. β. Salis fossilis 3. j. fiat clyster.

Fortissimus in apoplexia admodum irritans: R. radicū Ireos, Pyrethri ana. 3. j. Ari vel Serpentariæ 3. β. rad. Hellebori 3. j. herb. Rutæ, Saluæ Thymi, summit. Centaurij, Nasturtij ana M. j. feminum Carui 3. β. Vrticæ & Rutæ ana 3. j. Sinapis 3. ij. Colocynthidis pulpæ in petia ligatæ 3. β. Anthos p. ij. fiat decoctio, dissolue Hieræ colocynth. 3. β. Mellis 3. j. β. olei Rutacei 3. ij. Castorei, Euphorbij ana 3. j. Salis fossilis 3. j. fiat clyster.

Vomitum mouere etsi vile esset, tū quia conatus ille eos excitat & simul reuellit, tamen in apoplecticis, ob periculum suffocationis, non erit tentandum, cum si sponte conatus vomendi illos vrgeat, vel tussis, vti vidi, motu illo violento coacti, citius suffocentur: In sopore tamen, si vires constant, concitatus ob dictas causas, plurimum iuuat. Quod actu fieri poterit, gulam irritando: vel exhibito vomitorio, pituitæ simul prouocandæ destinato.

Purgantia per os apoplecticis infusa, cum nihil deglutiant, vel rursus sine fructu effluunt: vel si, vt sæpe fit, ipsis in asperam arteriam incidant, in suffocationis inducunt periculum: vbi verò ad se redierint, tunc vt resoluti, sicuti in paralyti dicitur, purgandi erunt. In caro verò vel stupore leuiore, vbi primum aliquid assumere possunt, statim illis cathartica erunt exhibenda, sed quæ parua quantitate citò ab ipsis, dum excitantur, veluti vno haustu, minori labore, cum vix obtemperent, deglutiri possunt.

Et proin si pilulas exhibere velimus, cum arduum sit eas assumere, illas potius dissoluimus, insuauitatem hic nihil metuentes, cum paulò stupidiore id minus obseruent, vt R. pilul. Cocciarum, Fœtidarum ana 3. β. Castori. 3. β. cum aqua Saluæ vel Rosmarini, vel Cinamomi: dissoluantur: & exhibeantur in potu,

Sed rectius tabulas dissolutas exhibebim⁹, vt Diacarthami, Diaturbith, de Citro solut. Vel electuaria similia: vt Diaphænicon, Indum maius, & alia phlegmagoga. Hieras colocynthideas infundere possumus, nisi summa amaritudo impediatur.

In progressu quoq; iteranda sunt purgantia prius præparato humore: præsertim si crassus sit: rursusq; repetenda, si malum non cedat prioribus, idque donec conualescat æger.

Præparabitur itaq; hac ratione: R. Syrupi de Betonica, de Hysopo ana 3. ij. Oxymell. scyll. 3. j. Syrupi de Stœchade 3. β. aquarum Rosmar. Saluæ, Melissæ ana 3. ij. fiat iulep: pro quatuor vicibus: Cinamomo vel alio aromatizetur.

Vel: R. radicū Aperitiuarum in Vino macer. ana 3. j. Ireos 3. β. Angelicæ 3. ij. Liquiritiæ 3. vj. herb. Saluæ, Maioranæ, Thymi, Iuæ arthet. Betonicæ ana 3. β. feminum Anisi, Fœniculi ana 3. j. Nigellæ, Petrosel. ana 3. β. florum Rosmarini, Lauandulæ vel Stœchados, Sambuci, Primulæ veris ana 3. ij. fiat decoctio, & in tb. j. β. adde Sacchari vel Mellis vel Syrupi de supradictis, ad dulcorandum: clarif. & arom. Cinamomo: pro quatuor dosibus.

Vel infundantur hæc Simplicia in Vino albo, addendo summis. Centaurij min. quia pituitam admodum incidit, 3. ij. Absynthij 3. ij. odoris grati causa: Et vtatur.

Si Syrupum vsualem facere vis, adde supradicto decocto, Carthami, Senæ ana 3. j. β. Agarici 3. ij. Turbith 3. ij. Zingib 3. j. addito Melle vel Saccharo; decoquatur: Capiat 3. j. pro vice.

Vinum purgans eadem ratione, hæc purgantia alijs permiscendo, facies secundum artem.

Potest & potio purgans sic parari: R. Agarici infusi in Oxymell. & aquis Saluæ & Rosmarini 3. j. β. Zingib. similiter infusi 3. j. fiat expressio: dissolue postea, Diaphænici, Diacarthami ana 3. ij. β. fiat potio.

Per destinatas pituitæ expurgandæ vias, vt os, nares, & oculos, pituitam a capite deriuabimus: illis medicamentis quæ sunt sensilem oris nariumq; tunicam

hoc faciunt, ut per has sedes & vicinos oculos, pituitam lachrymasq; , facultas expultrix hisce excitata, propellat. Cæterum cum gargarizare aut masticare nequeat, hac forma caputpurgiorum non utimur, donec ad se redeant.

Sed palatum fricamus pituitam elicientibus: ea tamen quantitate, & forma, ne apoplecticis in asperam arteriam si incidant, eos suffocent.

Sinapis semen, quod valde potens est, adeo pituitam prouocat, ut lachrymas statim moueat. Decoquitur in Aqua vitæ, vel Vino forti, & palatum eo decocto fricatur: vel in puluerem redactum, & cum Melle exceptum, illinitur. Cuius vices compositio vulgaris, quæ ex sinapi parata, condimenti loco mensæ exhibetur & Senff vocata, supplebit: quam & statim ad manus habere possumus.

Pyrethri radice decoctum, in Oxymelle, idem præstat; eodem modo vsurpatum.

Euphorbium quoq; in Aqua vitæ dissolutum aliq; fauces accendunt.

Vti & castoreum simili ratione permixtum & adhibitum.

Hieras aliq; electuaria purgantia, palato aliqui, sed sine fructu, & incommode affricant: quorum loco satius est confectio Anacardina, quæ non nihil inflammat, vti.

Vel talis fiat compositio: R. seminis sinapis, Piperis longi, rad. Pyrethri: puluerisata excipiantur Melle & succo Rutæ & Raphani: Fjat illinitio. Acetum quod addunt, emittimus, quia acrium vires retundit: ut videmus in capis & raphanis fieri, si cum acetato edantur.

Narium tunica summè sensibilis vellicatio, pituitam egregiè elicit: vel sine impetu ex naribus stillantem, & per oculorum lachrymas emanantem: vel impetu quodam per sternutationem: Quæ si in apoplecticis superueniat, bonum est signum. Non tamen violenta hæc cõcitatio in sopore, priusquam iam parum materia euacuata sit, erit tentanda, ne humor cerebrum adhuc replens, concussus, illud opprimat: aut in nervorum principium subito delapsus, conutilliam aut resolutionem pariat: quod in a-

poplecticis, cum non aliter sanentur, nisi paralysis subsequatur, haud metuitur. Hæc autem varijs modis fieri possunt: inter quæ errhina minùs, cum ea non attrahant ægri, conueniunt. Itaque alio modo, hoc sic præstari poterit.

Illinantur nares eadem illinitione, quam palato affricari debere diximus. Vel ne crassiora nares obserant, quas liberæ respiratio- nis causa, in apoplecticis esse oportet, tenuioribus hisce erit vtendum: R. succorum Raphani, Cæparum Ireos ana partes æquales: In hisce penna intincta, naribus sæpè indatur.

Hellebori, Pyrethri, Piperis, Euphorbij, pulueres insufflentur, sed pauca quantitate.

Narium irritatio per fibrâ Hellebori, vel Seram porcinâ, vel Pilum aliq; crassiorè, actu potenter operatur, pituitamq; elicit.

Cæparum odor mirè lachrymas prouocat: quo nomine si detracto tenuiore cortice naribus adhibeantur, plurimum iuuat. Sinapis item & Raphani odor idem faciunt, & Flammulæ folia contrita, olfactaq; potentissimè efficiunt.

Hisce peractis, si ita ad se redeant, ut errhinis, masticatoriis, gargarismatibus vti possint, neque hæc erunt negligenda: qualia suo loco explicabuntur.

Attrahentibus ad superficiem corporis, studebimus quoque humorem à parte affecta reuellere, iis quæ calore vel dolore id faciunt: quæ & potentiùs agent, si simul soluendo continuum attracto humori, ut euacuetur, viam aperiant.

Frictiones eo nomine faciendæ validæ, manibus vel panno aspero: Incipiendo à capite & deorsum per dorsum descendendo. Item brachiorum, crurû & in illis locis quæ potissimum frigent; quas donec incalescat, & rubeant: fricare oportet; adhibito interdum & Oleo calido: vel etiam Sale.

Quæ de causâ & Ligaturæ in extremitatibus faciendæ, quæ dolorem inferre possint: quæ interdum soluendæ, rursusque stringendæ sunt.

Lotiones pedum quoq; ex Saluiæ, Rutæ, Betonicæ, Pulegij, Calamenti, Anethi, Chamomillæ, Rosarum decocto, proderunt.

Cucurbitulæ cum multa flamma item, occipitio primum adhibendæ, si fortè per magnum illius foramen humor deriuari possit: ob quam causam mox ceruicis posteriori regioni, dein scapulis & humeris sunt applicandæ.

Scarificatio etiam ante cucurbitularum applicationes, interdum illis in locis faciendæ; plagæq; factæ Muria erunt perfricandæ.

Pilorum euulsiones, circa pudenda, sub axillis, barbæ, capillorum, item Vellicationes, hinc inde in corpore factæ; Punctiones quoq; & Vstulationes plurimum proderunt.

Sartago vel pala, aut alia lamina ferrea candens, capitis regioni eousq; adhibita, donec illam valde calefaciat, & veluti pilos incuruet, nondum tamen caput vrat, egregie extorsum eliciendo, apoplecticos sæpe vt ad se redirent, effecit: cuius vsum Arabes introduxerunt.

Dropax seu picatio capitis regioni, prius rasæ, adhibitus, sæpeq; dum adhuc calet detractus & repetitus, ad superficiem quoque humores euocando, iuuat. Tum si simplex: tum si compositus fiat. Qui & efficacior ad ditis calidissimis sic parabitur, & vesicas excitabit: R. Picis lb. β. olei Rutacei q. s. vt liquefcat, forte ad 3. j. β. adde rad. Pyrethri, feminum Sinapis, Piperis ana 3 j. Euphorbij 3 β. misce.

Sinapisini idem præstabunt, supra caput appositi: illiq; tum simplices: vel sic compositi: R. pulpæ Ficium ex leui illorum decoctione extractæ, feminis Sinapis an. 3. j. β. Stercoris columbini vel hirundinum (quod passim in cubiculis inuenitur) 3. iij. Piperis, Euphorbij ana 3. β. Castorij 3. j. olei Spicæ guttas vj. misce cum Aceto acerrimo.

Vrticæ folia, veluti actu vesicas excitant: quæ nuchæ & ad reuulsionem cruribus affricantur.

Elamula cõtusa, potentissime quoq; id efficit, si ceruicis posteriori regioni apponatur.

Cauterium item potentiale, capitis regioni vel dictæ ceruicis sedi adhibiturum: licet cum necessitas exigit, vt in apoplexia, attuale cum citius operetur, & non sentiant, rectius adhibeatur: quo pili vti possunt capitis, & cutis quoq; nonnihil.

Alterantia quæ humorem dissoluere discutere, cerebrumq; roborare debent, per os in soporosis potius, quàm apoplecticis, qui ferè nihil degiunt, exhibentur: quæ tamè si minima quantitate & nihilominus efficacia parentur, guttatim etiam apoplecticorum ori infundi possunt, cum & in ore contenta vires suas exerant: quæ tamen in asperam arteriam illapsa, ne tussim moueâr, aut eos suffocent, liquida potius esse debent.

Aquæ elicite sic præcipue commendantur: quales præsertim sunt Rosmarini, Saluiæ, Rutæ, Lauandulæ: quæ arida in vino infusa, si destillentur, efficaciorum aquam reddunt. Cinamomi aqua stillatitia, vti grata & odorata, ita summe est efficax. Lilij cõtalliij florum & Tiliæ, dum recentes adhuc sunt, extracta aqua, magni in hoc casu apud vulgum æstimatur. Calendulæ florum aquam, & Chelidoniz, Melissæ, herbarum aquam, aliqui quoq; commendant.

Compositæ efficaciores sunt, quales innumeræ describuntur. Nos ex selectioribus appropriatis talem parare possumus; quæ R. Saluiæ, Rosmarini, Thymi, Maioranæ ana 3. β. Rutæ 3. ij. florum Lauandulæ 3. iij. Stæchados 3. j. feminum Eruce 3. j. Cinamomi 3. β. Nucis mosc. 3. ij. Gariophyl. 3. j. β. Cubebæ 3. j. pulueriscentur: infundantur in Vino præstantissimo, vt excedât spacio duorum digitorum; destillentur: Detur cochleare vnum, duo vel tria, prout deglutire poterit. Cum dicta aqua misceri potest Castorium & aliquoties percolari, & sic exhiberi: neque vt solent, toti compositioni permiscendum: satius enim gratam adhuc ad vsum asseruare, & cum necesse est portioni illius alicui, ingrata hæc permiscere, atq; exhibere. Masticem hisce stillariis aquis vel infusionibus permixtam, vim ipsorum valde augere autumant.

Si quoque prædictas herbas, in spiritu vel liquore Vini stillatitio præstantissimo infundas, diuque in sole vel alio calore mace- raueris, aut iteratis etiam infusionibus validiorem reddideris, liquorem efficies, in hosce vsus præstantissimum. Vel si ex singulis herbis separatim infusionem talem facias, quælibet ad hæc erit efficax. Vti & si plu-

si plures sic simul cōmmisceas, compositam quoque validam sic exhibere poteris aquam. Inter quas, quæ ex infusione seu exstillatione Rosmarini fit aqua, præ cæteris extollitur. Licet autem spiritus Vini, vim aliquam stupefaciendi habeat, quia tamen eximia subtilitate, qua pollet, & calore, reliquorum vim valide ad cerebrum deducit, & pituitam exturbat, caloremque natium & facultates excitat sopitas, propter illas commoditates, commodè prædicta simplicia illi infusa, vires in illum deponunt; illiusque narcoticam vim retundentia, aptum medicamentum ad prædictos affectus sanandos faciunt: Quem tamen spiritum Vini solum exhibere, vti aliqui suadent, non consultum ob vim illius stupefaciendi esse putamus. Quemadmodum neque aquas Theriacales, aut alias ex Opiatis paratas, sicuti neque ipsa electuaria, vllō modo propter opium, quod continent, probare possumus, quæ licet inueterata, narcoticam vim tamen minimè deponunt, quam in stupore & sopore toto cœlo fugere debemus.

Olea arte chymica ex supradictis elicitæ, præ cæteris omnibus summam vim vel minimam guttula exhibita, exerunt: & proin in omnibus stupidis vtilissima, si gutta vna aut altera osi infundatur: vel liquore conuenienti dissoluta, illis qui deglutire possunt exhibeatur: quale est oleum Maioranæ, Saluæ, Lauandulæ, & suauæ illud oleum Cynamomi: item Gariophyllorum: Vitreoli spiritum potius, quam oleum nominatum extollit Hollerius, quod quia acetosum est vigilias excitare poterit. Succini oleo multum quoque tribuunt.

Solidiora medicamenta simili ratione infusa & diluta exhiberi possunt, quamdiu ægrè medicamenta admittunt: & cum ita ad se redierint, vt crassiora quoque sumere possint, tunc, vt & toto deinceps morbi processu, hæc alijs quoque formis exhiberi possunt.

Confectio Anacardina, vt in omnibus cerebri frigidis morbis, sic & hic summo-pere probatur: qua potius quam theriaca, aut alijs opinatis vtemur: per se eam exhi-

bendo: vel cum aqua Vitæ dissoluendo, in qua supradicta prius infusa sint.

Castorium, pondere granorum quatuor vel quinque cum Oximellite exhibet Galenus in lethargo: quo & in alijs speciebus vti licebit: cui grana aliquot Euphorbij addere possumus: quæ & cum spiritu Vini per infusionem facto, dari possunt.

Sinapis semen contusum, & pondere 3.℔. similiter exhibitum, mirè est conueniens, quia sursum illius vis ad caput fertur: vel detur conditum illius, & condimenti loco cibis addatur.

Succus Caparum, cum aqua Rutæ vel Saluæ, vel infusione dicta ad 3. ij vel cum Vino vt gratior sit, exhiberi potest.

Nasturtium quoq; probatur comestum: cuius succus acris cochlearis vnus mensura consimili ratione, vti reliqui, dari potest.

Electuarium quod sequitur, valde conueniens est, quo & per morbi progressum, vti licebit: R̄. confervarum Ireos, Acori veri, id est, calami off. ana 3. j. Saluæ, Rosmarini, Maioranæ, Stœchados vel Lauandulæ ana 3. ℔. confect. Anacardina 3. ij. pulu. Diambræ. Diamosci ana 3. ℔. seminum Erucæ, Rutæ ana 3. j. cum Oxymell. squill. vel Melle Anacardino: fiat electuarium: Capiat instar castaneæ, alternis diebus.

Potest sumi huius confessionis 3. j. illiq; permisceri gr. aliquot, Castorei vel Euphorbij, cum necessitas vrget, sicq; propinari.

Extractum Saluæ, pro magno secreto in apoplexia exhibent chymici.

Ex iis quæ foris adhibentur, alterationis causa, ea quoq; quæ naribus admoventur, id præstant efficacissimè, cum ipsorum vis recta ad cerebrum penetret: quocirca nares hisce succis illinuntur: R̄. succorum Rutæ, Maioranæ, Aceti fortissimi (quod præcipuè in sopore, vt vigilias exciret vsurpatur) ana æquas partes: Et penicillo vel penna, in hisce intinctis, nares intrinsecus vngat.

Vel sic: R̄. Castorei, Assæ fortid. ana portionem aliquam: Quam dissolutam in Aceto fortissimo eo em modo adhibeto.

Item: R̄. olei Rutæ 3. ij. Aceti scyllit. 3. j. succi Scyllæ 3. ℔. Castorei 3. j. misceantur: Pro narium illinitione.

Olea arte chymica elicita, potentissima sunt: si guttula naribus indatur: qualis prius exhiberi quoque posse diximus: imprimis oleum Spicæ, quod subtili sua euaporatione, mirè calefacit, atq; oculos mordicando, lachrymas simul elicit.

Odoramenta penetrando ad superiora, plurimum quoque iuuant: qualis est Aceti fortissimus odor, naribus exceptus, qui siccando, vigilias inducit.

Suffitus quoq; ab eo si supra laminam ignitâ effundatur, naribus exceptus cōuenit.

Fumi crassiores, ita tamen ne suffocent, naribus admissi proderunt: ut fumus qui à Capillis humanis vstis excitatur, maximè si, antequam vrantur, Aceto prius madefiant: & qui à Pennis accensis, quarum eadem cū pilis est materia, fit: inter quas Perdicum & Pauonis pennas meliores esse vulgus iudicat.

Sic quoque factus plurimum iuuabit: R. Capillorum hominis minutim incisorum & Aceto fortissimo madefactorum 3. β. rasuræ Cornu Cerui 3. β. gummi Galbani, Ammon. Oppopanacis, Gagatis ana 3. j. Castorei 3. i. seminis Nigellæ 3. j. misce: Projiciatur porio illius super carbones & fumum excipiat.

Sulphuris accensi fumus, mirè est efficax: quod & ex eo quoddam rosas rubras dealbet, satis patet.

Auribus quoque indita, si efficacia admodum sint, aliquid præstare poterunt: ut si oleum Spicæ illis inmittatur: vel spiritus Vini cum infusionibus, uti superius dictum fuit: oleum quoque Rutæ, sed per distillationem potius, quam macerationem elicetur.

Capitis superficiei, prius rasæ, sequentia quoque alterationis causa adhibentur. Ut fons seu embrocationes sequenti modo: R. radicum Ireos, Cyperi, Acori veri, ana 3. j. herbarum Samfuci, Lauri, Saluix, Serpilli, Pulegij, Satureiæ, Melissæ ana M. j. florum Lauandulæ, Stæchados, Chamomillæ ana 3. j. seminis Viticis 3. j. decoquantur in Lixiuo, addito paucò Vino: Fouetur vel irigetur caput.

Vel sic: R. olei Nucum quar. j. aquæ Vi-

tæ 3. j. β. succorum Rutæ 3. j. Pulegij, Serpylli, Saluix ana 3. ij. incisa; decoquantur: Pro foru capitis.

Postea inungatur caput sequentibus: R. oleorum Rutacei, Laurini ana 3. ij. succi Rutæ 3. j. β. Aceti 3. j. aquæ Vitæ 3. β. coquantur ad consumptionem, addendo Castorei 3. j. Euphorbij 3. β. Inungatur caput.

Efficaciùs sic fiet: R. oleorum Rutacei 3. ij. de Piperibus, ex semine Sinapis ana 3. j. olei destill. Spicæ, ol. Rosmarini vel Thymi per distillationem facti ana 3. β. gummi Oppopan. Bdellij, dissolutorum in Aqua vitæ ana 3. β. seminum Rutæ, Sinapis ana 3. j. Castorei, Euphorbij ana 3. β. Capillorum hominis vstorum 3. β. Cera q. s. fiat linimentum.

Emplastrum ex iisdem parabitur, addita Pice vel Resina: vel ceratum, aucta Cera quantitate: in quibus parandis gummorum pondus augetur, addito quoq; Ammonia-co, & Asa foetida: Quæ sic parata, capiti pilei instar imponuntur.

Cataplasma ex herbis & radicibus contusis simili modo fieri possunt: Ut: R. fol. Rutæ, Pulegij, Saluix ana M. j. rad. Ireos recent. 3. ij. coquantur in Vino forti: cui permiscebis Aceti, Aquæ vitæ ana 3. j. addendo dein Scyllæ sub cineribus asæ 3. j. Pomorum putridorum 3. j. β. contundantur, & postea adde oleorum Irini, Rutacei ana 3. j. ol. Spicæ 3. β. rad. Pyrethri 3. j. Fimi Columbini vel Hirundinum 3. ij. Castorei, Euphorbij ana 3. β. misceantur; fiat cataplasma.

Pulmonè porci in lethargo applicat aliq.

Sanguine testudinis perungit caput aliq.

Præter hæc quæ capiti applicantur remedia, spinæ quoque remedia adhibentur in apoplepticis, ut materia deorsum feratur: cuius principio hoc emplastrum applicatur attractiuum: R. gummorum Oppopanacis, Sagapeni ana 3. j. dissoluantur in Aqua vitæ: postea misce seminis Sinapis 3. ij. Castorei, Euphorbij ana 3. j. fiat emplastrum: Applicetur nuchæ; & postea inungatur tota spina, deorsum ducendo manus, oleis calidis: quale est Rutaceum.

Velas manuum in apoplepticis quoque Sulphure & Vitriolo in oleo calido distillat.

tis, & commixtis, fricare non erit inutile.

Inter amuleta, Smaragdum collo appentum maximè conferre, si nudam carnem tãgat, afferunt. Philomela puluinarì substrata, Caput vesperilionis, intra lateres recti positum, à somno excitare proprietate creditur.

*Cariæ
Apoplexia à
sanguine
curatio.* A sanguine si sopor fiat, quia tunc sanguis in vasis adhuc remanet, facillè curatur, nisi grauior aliquis morbus subsit. Quod si verò rupta vena, in cerebrum sanguis effusus, apoplexiam pariat, siue hoc à plethora vel causa violenta accidat, nisi è calvaria subito per nares, aures, vti sæpè fit, erumpat, statim in grumum conuersus, mortem adfert: eoquè citius, si cerebri substantia simul læsa sit: præcedente tunc conuulsione, si sanguis prius putrescat, antequam æger extinguitur.

Statim tamè in eiusmodi casibus, & quàm citissime dum materia adhuc fluit, sanguinem reuellere, deriuare & propellere debemus: sequenti ordine.

Vena primùm aperienda, nisi quid impediat. Humeraria nimirum in brachio; & si magna sit plethora, in vtroq; dein etiam in pede Poplitis vel Malleoli vena, quam humeraria nonnulli præmittunt, vt maior fiat reuulsio, quæ tamen rectius fit in brachio, secanda erit: dein & Frontis vena & Nasi: quæ feris pungendo aperit Rondel. vel sub Lingua, deriuationis causa, præmissis reuulsionibus tundi potest: quæ & si non magna sit plethora sufficient: nam iugularem aperire, vti aliqui docent, valde est periculosum. Atque sic sopor à sanguinis copia procedens facillè emendatur. Et in contusione capitis magnum adfert adiuuentum.

Scarificatio adhibitis concurbitulis illic præsertim, vbi iugulares per collum ascendant, plurimùm deriuat. Quam & in Mento factam approbant. Quod & Sanguisugis si tempus det, continuari poterit, præsertim si pedici adhibeantur, suppressis hæmorrhoidibus. Quas & si consuetæ fuerint prius, & nunc suppressæ sint, vel alias tumeant, aperire debemus.

Cucurbitulæ solæ quoq; illis in locis, & humeris, & scapulis, adhibita, cum non tanta adest plethora, sufficiunt.

Quod & ligaturæ extremitatum, & Frictiones præstare possunt.

Alui irritatio in hac causa, æquè ac si à pituita fieret, reuellit: idquè per suppositoria, vel clysmata egregiè stimulantia, minus tamen quàm in alia causa inflammantia: idè; mox post venam sectam, quæ hic tanquam potior præire debet.

Tale erit enema sequens: quod vt mox præstò sit ad manum paratu sic fit facillè: R. Mercurialis vel Betæ, hyemis tempore, M. ij. Violariæ M. j. affunde Lix. iij. q. s. fiat decoctio, & in tb. j. dissolue Mellis 3. ij. Salis fossilis 3. j. Butyri vel Olei 3. j. (ne maiori copia reliquorum vim infringat) fiat clyster.

Sternutationem ciere, post aliquot exhibita clysmata, in apoplecticis, non tamen nimium violenter licet.

Repellemus Oxyrhodinis, si caput admodum æstare appareat, sed talibus quæ siccando potius, quàm frigiditate astringat: caute tamen iis, ne materiam si in superficie sit, intro pellamus, vtendo: proin & Rondel. siccante tantum, in caro inunction, & sinapismo vitur: cum tamen necessitas exigit tale fieri poterit: R. aquæ Rosæ 3. iij. succi Plantag. 3. j. vel aquæ eiusdem 3. ij. quia huius vis in sanguinis influxu exhibendo mira est. Aceti rosæ 3. j. Albuminum ouorum agitatur num. ij. misc: olea ob laxitatem omittuntur.

Pullus columbinus, vel gallinaceus, vel catulus, per medium facta, capitiq; admotus, miram vim in sanguine discutiendo habet: vt & alia in phrenitide exposita.

Nasturtium comestum, in iusculis vel acetariis, carum à sanguinis copia profectum, sanare scribit Rondel.

Contusio si in capite appareat, & sanguinis grumi in cerebro suspicio sit, ea quæ in contusionibus dicuntur, extrinsecus adhibenda erunt.

Quale hoc est cataplasma: R. Absynthij M. j. florum Rosæ rubræ & Chamomill. ana. P. j. fiat puluis: decoquatur in oleo Rosaceo: contundatur, addendo farinæ Fabarum 3. j. sanguinis Draconis 3. ij. Mumie 3. iij. Applicetur.

Per os, quando aliquid sumere possunt, eodem

eodem nomine, sanguinis grumos dissoluentia, dantur: de quibus suo loco agetur.

*Apo-
plexia à
lesione
cerebri
curatio.*

Quod si verò læsa cerebri substantia, Apoplexiam causet, cum sit lethalis, tum quia partis principis soluta est continuitas, tum quia ab extrinsecus illata iniuria, meningum sinus simul lædi necesse est, unde maxima sequitur hæmorrhagia, prognosticis sunt relinquendi: interim tamen quamdiu viuunt, nihilominus prout vulnus vel sectum, vel punctum, vel contusum est, illud tractari debet.

Si autem fractæ caluariæ pars depressa, cerebrum comprimendo, stuporem causet, Terebello, alijsq; artibus eleuanda retrahendaq; erit. Ossicula si quæ adsunt, quæ & sepe pungunt, eximenda. Sanguis eluendus; & sicuti fracturæ, vulneraque sanari debent, hic quoque procedendum: sic enim si modo pars subiecta minimè læsa fuerit, ad se redeunt, atq; sanitati restituuntur.

*Stupor à
sopore,
tumore
cerebri,
curatio.*

Tumor in cerebro, si stuporem inducat, vel uti putarunt, lethargum, quia ægrè viuentem hominem cognosci potest, vix illi alia cura accommodatur, quam quæ frigidis humoribus debetur, cum frigidum humorem hunc, qui id efficere possit, esse oporteat: calidus enim phrenitidem potius faceret. Diuturnus autem tunc erit stupor, & mortalis cum tumor hic abditus in cerebro, emolliri nequeat, nec resolui.

Vapores soli, nisi occulta, vt dicetur, adsint, stuporem vix pariunt: licet aliqui apoplexiam inde fieri posse, scribant, quæ sola corporis agitatione concussioneq; discussis vaporibus sanetur: soporem verò frequenter causant; in quo partis mandantis, ventriculi scilicet, vteri, intestinorum & venosi generis, in febribus, & recipiendis, capitis nimirum, rationem habere oportet.

*Somni
inmodi-
ci à va-
pore, cu-
ratio.*

Ventriculi causa si accidat, à cibo & potu, somni illa inclinatio, quæ à prandio & coena, multos diuexare solet: in consuetis & quibusdam naturis, potius corpus defatigatum reficiendo prodest, quam obest, propterea & postea alacriores ad munia obeunda euadunt. Quod si verò caput grauat & excrementorum prouentum in eo faciat, cauebitur cibi parsimonia & temperantia;

Vini moderato & debilioris vsu. Si item prandium non longius protrahant, aut menses diutius assideant, sed post breue prandium, mox surgant, deambulent; & iucunda peragant, quæ mentem alio inuitando, quiescere minimè sinant. Quod in aliis facit musica, in aliis lusus, vel aliæ cuiusque ingenio gratæ actiones. Et cum calor summum inuitet, si in loco temperato vel frigidiusculo potius, tunc temporis cibum capiant, versenturq; & sensim defuescèdo, consuetudinè hanc prauam, emendare studeant.

*Sopor à
sopore
profundo
à vapore
curatio.*

Quod si verò sopor, cibi & potus assumpti, vaporosi nimium causa, aut copia profusus fiat; Vomitus iuuabit: repetitus, si prima vice non profuerit. Et ventriculi euacuatio, per pilulas utilis erit.

Si verò ab humoribus, in ventriculo existentibus, vapores eleuati carum inducant; Euacuandi erunt: & ventriculus roborandus: uti & si vteri causa fiat, huic potissimum remedia erunt accommodanda. Et si à vermibus, illis necandis expurgandisq; scopus curandi adhibebitur.

Quod si verò à venoso genere, in febribus vapor eleuatus, soporem, febris comitem efficiat, febris quoque in curatione illius habenda est ratio; quæ si mox in lethargo dicto incipiat, cum sit periculosus admodum, & senes plerunque interficiat, eoque nomine ad se potius, quam ad febrem curam trahat, sic erit instituenda: vt cum calida remedia illi quoque vt in alio caro competant, ratione febris comitis ita temperentur, ne corpus prius accensum, nimium inflammantia, periculum, quod ratione cari iam prius adest, au ita febre, conduplicent. Cuius tamen causa etiam venæ sectio, quæ in caro simplici vix conceditur, hic propter febrem comitem, in plethoricis tamen admittitur. In reliquis febribus, si caros in declinatione superueniat, quia iam febris cessauit, tota cura ad symptoma hoc graue auertendum, dirigetur. In intermittentibus febribus, in principiis paroxysmorum inuadens sopor, cum non adeo sit periculosus, curam priuatam aliam, quam quæ febre conuenit non requirit: nisi quod obiter, vt dicetur, capitis ratio est habenda.

*Cari fe-
Lethar-
gi in fe-
bribus,
curatio.*

Cerebri verò, quodd vapores qui soporem procreant recipit, occasione, ea quæ illorum ascensum impedire possunt, administrabuntur.

Exhibitis illis, quæ illos in parte suscitatos, veluti deprimant & retundant: quod fiet, si à ventriculo ascendant, remedijs astringentibus. Et quæ ipsos vti & flatus discutiant: Et in febribus si alterantia, quæ ipsorum euaporationem reprimant, exhibeantur, sicuti illis in locis dictum fuit.

Dein vapores, iam ad cerebrum delatos, reuellentibus, atq; eisdem deriuantibus, à parte affecta retrahemus: præsertim si lethargus ille grauis cum febre inuadat, non alia ratione, quam in simplici caro, iisdem quæ pituitam à capite reuellere diximus, eoq; hic magis, cum vapores simul caput petant; idcirco & in lethargo, Venæ sectione, Scarificatione, Cucurbitulis, Clysteribus, alijsq; hoc est moliendum. Quod & cum caros febrem sequitur, locum habebit.

Extrinsècus ea quæ vapores reprimunt, in omnibus speciebus per consensum factis, præsertim in febribus, & lethargo quoque in principio, capiti erunt applicanda.

Qualia sunt oxyrhodina sequentia: R. aquæ Rosaceæ ʒ. iij. Aceti Rosac. ʒ. iij. olei Rosacei ʒ. j. misce: Applicetur capiti, vt decet: vel eo caput inungatur.

In progressu sic parabitur, si morbus perseueret: R. aceti Rosacei ʒ. ij. olei Ros. ʒ. j. Chamomellini ʒ. ʒ. Oxy mell scyllitici ʒ. j. ʒ. secundum Rond. fiat oxyrhodinum.

Postea ad fortiora calidiora sensim, si lethargus nondum cesset, progrediendum, qualia in caro iam explicata sunt: cum in progressu morbi, lethargi cura à cari cura nihil, aut parum differre debeat, & proin in eodem capite, à practicis ferè describuntur.

Qualis quædam abscondita, si soporem grauem & stuporem causet, curatio distinguenda primum erit, quatenus à narcotica vel maligna vi hæc prodeunt, vel à dæmone procedunt.

Narcotica dicta assumpta, si soporem aut stuporem inducant, tunc Vomitus quam citissime erit prouocandus: actu fauces irritando, vel exhibitis quoq; si deglutire possint, vomitorijs.

Propinanda quoque ea, quæ narcoticorum vim possunt infringere, qualia calida esse hactenus creditum fuit, quæ frigiditatem narcoticorum sic retundendo, profint, & proin calidissima, qualia sunt succus caparum, allij, piper, castoreum, euphorbium, exhibent. Nos verò qui narcotica calida quoq; esse alibi sufficienter declarauimus, hæc si quid iuuant, quia sopitam facultatem caloremq; natium excitant potius, quam quod narcoticorum vires infringant, prodesse putamus. Theriacam verò, quam plerique in hoc casu probant, propter opium quod recipit, quocirca & narcoticorum vires potius auget, quam inhibet, minimè cōcedimus. Vnde neque vinum fortissimum, vti quoq; docent, longè minus spiritum illius, eo nomine exhibemus, cum & hæc narcotica sint: vnde rectè Diosc. cicutam si cum vino detur citius interficere scribit, licet hic aliam causam, quare hoc faciat, quod nimirum citius ad cerebrum vim medicamenti deducat, fingant.

Quæ verò reuera narcoticorum vires debilitant, ea sunt, quæ leniendo, temperie quadam, ipsorum caliditatem potius, quam frigiditatem emendant: quibus & tunc præcipue vtimur, cum à narcotico vehementer corpus accenditur: sicuti à spiritu vini, stuporem mortalem, & summum simul æstum excitari diximus: in quo casu, vt & in alijs à simili causa excitatis, Lac exhibemus naturale, & facitium ex Amygdalis, & seminibus Cucurbitæ paratum. Butyrum item, Oleum commune & amygdalinum, aliq; pingua & mucilaginosæ: qualia & in erodenti veneno competere diximus.

Sed & acida exhibita, vti acrium humorum & bilis effervescentiam, sic & narcoticorum efficaciam retundunt: quæ ego potius exhibere soleo; vt succos acidos vel syrupos, vel ipsum Acetum, quod & proin ebrietatis remedium esse certissimum, alibi diximus. Reliqua quæ proprietate id quadam agunt, in remedijs explicabuntur.

Maligna qualitas, quam rectè explicare non possumus, si extrinsècus adueniat, ab istu bestiarum, vti de sopor vel stupor, nec veritatem pharmaca hinc venenis letitiam, etiam exhi-

Sopor
e stu-
poris a
vi int
cipit
est a

Sopor
est stu-
poris a
vi int
cipit
est a

benda : qualia suo loco describuntur. Quòd si verò talis in corpore suscitetur, vt in febribus malignis, soporem & stuporem quoque accidere diximus, tunc exhibitis quæ malignitati resistunt, eadem quæ in lethargo dicta fuit curandi methodus, obseruatur.

Soporis demoniaci à spiritibus malignis curatio.
Dæmoniacus sopor, si sagis, vt diximus illudat, cum causa præternaturalis sit, non naturalibus remedijs, sed precibus & vitæ emendatione curabitur: quòd si ea facere recusent, dignæ quæ igne adhibito purgentur.

Apoplexia à spiritibus animalibus sumptio.
Absumptis in cerebro spiritibus animalibus, si homo apoplecticus fiat, mors ipsa, quæ iam iam instare prædicere oportet, omnem curandi rationem antevertit.

Epilepsia, Cataleptosis, et Stupor, à spiritibus animalibus à cerebro profusio.
Profusis verò à cerebro spiritibus, meditatione graui, si aliquandiu stupeant, facile iterum remeantibus spiritibus ad se redeunt. Quòd si verò affectu animi vehementiore adeò spiritus efferantur, vt stupore grauiore prehensi, cum rigore, cataleptici fiant: tunc pertinax admodum est malum, idq; præsertim si à melancholia hic affectus originem traxerit: sic enim affecti difficulter curantur, & licet eo liberentur, stupidi tamen & melancholici manent. Quòd si ab ira quoque in epilepsiam cadant, periculo non carent. In quibus speciebus dum paroxysmo laborat, eadem præsidia, quæ in reliquis epilepticis, ad illorum paroxysmum citius soluendum, usurpantur, similiter adhibentur: quo cessante, causa erit auertenda: hoc facto, si nihilominus redeat malum, cum causam internam subesse ex eo cognoscamus, quam externa primum commouit, huic tollendæ, cura erit accommodanda: quam in catalepsi melancholiæ, in epilepsia pituitæ expurgandæ, sicuti dicitur, accommodant.

Quod si verò à nervosi generis affectu, cerebrum in consensum trahente, atque interdum simul afficiente, convulsio, vel quod rarius fit, cataleptis sequatur, causa ipsa diligenter erit consideranda, & pro ratione illius & prædicendum, & curatio instituenda: quam diximus esse in epilepsia illa diuturna, vt & catalepticos aliquando, sed rarius accidentis, maligni, aliquem, melancholicum & venenatum humorem: in abditis corporis locis, in venoso genere, circa cor-

poris interiora, vel exteriora quoque, alicubi in corporis habitu latentem; vel etiam intra caluariam à vitio aliquo, nondum tamen cerebrum perfundante, sed nervosum genus per vices afficiente, profectum, consistentem. Mitioris verò epilepsię & breuioris, euaporationes aliquas, hinc inde ab internis visceribus à causa minus perseuerante, profectas: & nonnunquam etiam dolores vel tantum molestias; quæ etsi causam non adeò magnam habent, in pueris debilioribus, adhuc paroxysmos epilepticos progignere possunt. Convulsionum verò reliquarum, quæ breues sunt, causas internas, venenatum in venoso quoque genere humorem, in febribus quas hæ convulsionem sequuntur, esse diximus: vel alioquin acrem, perniciosum, biliosum, vel serosum humorem, aut sanguinem corruptum: vel ab assumptis deleterijs aut venenatis dependere; aut dolore graui: vel ex vulnere: aut ictu bestiarum proficisci.

In quibus omnibus speciebus, cum omnes arduæ sint, nihil boni temere, etsi cura idonea, vel naturæ beneficium, prognosticum nonnunquam mitigat, erit prædicendum: Nimirum diuturnam dictam epilepsiam, si ante pubertatis tempus incipiat, & non eo aduentante, tunc nimirum cum masculi semen emittere possunt, vel foeminae menses erumpunt, cesset, vt & eam quæ post pubertatem primum incipit, incurabilem & desperatam; ad extremum vsque vitæ tempus, longo tempore, nisi sæuitia symptomatum mortem acceleret, homines afflicturam. E breuiore verò convulsionem dictam, deteriori, lethalem existere. Mitioris quoque illius speciem appellatam, periculo non vacare.

Quæ cum ita se habeant, prognosticis hisce præmissis, curatio nihilominus tentanda erit, quam non secundum causas, cum tam variae & abstrusæ sint, primum distribuemus, sed per modos operandi procedentes, quomodo euacuantibus & alterantibus medicamentis, partim vsu inuentis, partim ratione aliqua, causæ accommodatis, epilepsias & convulsionem sanare, vel saltem illarum accessiones, prostrahere aut mitigare debeamus, explicabimus.

Euacuantia remedia sunt, quæ causas convulsiones procreantes aut fouentes, siue vapores humorésve sint, vel à parte affecta reuellendo, deriuandoque, aliò deducunt: aut repellendo, impediendoque, ad eam peruenire non sinunt. Idque vel per aperturas, sectione, suctione, vitione factas: aut expurgationes per varias corporis vias institutas: aut operationes alias extrinsecus adhibitas.

In sectionum genere, phlebotomia occurrit, sanguinem minuens: quæ in epilepsia diuturna locum habebit, si plethoricus sit æger, vel hæmorrhoides prius consuetæ suppressæ sint: generali vena aliqua insigni, & patente ad hanc rem selecta. Pleriq; tamen humerariam, cephalicam nominatam, capitis causa aperire suadet. E' poplitis quoque, & malleoli venis sanguinis emissio facta, valde conuenit, eoque magis, si menstrua in fœminis retenta sint. Quam & in frontis & linguae venis factam, aliqui laudant. Et si à sanguine maligno, causam illius dependere conijciamus, sæpè hæ sanguinis detractiones erunt repetendæ, cum & in mania, in non admodum dissimili causa, hoc potissimum esse remedium ostenderimus: vnde & hîc, si à sanguine vitiatò procedat, hoc remedij genus sæpe vsurpatum valde proderit: sicuti & in catalepsi, si simile ratione oriatur: cum & sponte nonnunquam narium hæmorrhagia sequente, sanetur. In alijs verò causis extra sanguinem positis, corporibus præsertim epilepsia longa attenuatis, vti & convulsionibus, morbos sequentibus, in quibus vires, morbi convulsionem patientis sæuitia, deiectæ sunt, sanguinem detrahete minimè consultum foret. Scarificatio verò, loco venæ sectionis, in pueris & adultis, quando sanguinem aliò auertere potius, quam exhaurire volumus, ijs locis, quo eum ducere animus est, non inutiliter instituitur. Sed & paracentesis; & per fetas factæ aperturæ; & trepanatio exempta caluariæ ossis parte, in morbis hisce desperatis tentari possunt.

Suctio sanguinem eliciens, sanguifugorum fit opera: quas in fronte & reliquo ambitu capitis applicatas, in epilepsia sananda prodesse scribit: præsertim verò tunc, quan-

do hæmorrhoides suppressæ sunt, podici affixæ, sanguinem hunc, quem alia arte prouocare aliàs vix possumus, exurgendo, valde in hoc casu conueniunt.

Vitio, cautio tam actuali, quam potentiâ facta, sicuti in extremis morbis, extremum est remedium: ita & hîc in perseuerante malo, si præcipuè causa in capite lateat, an fortè hoc pacto causa à nervoso genere ad partes ignobiliores deriuari possit, non sine ratione tandem adhiberi potest. Quo pacto, modò natis, Florentiæ, vt fertur, verticem perurentes, epilepsiam, quæ ijs in locis infantibus consuetæ est, solèt auertere. Quibus de causis & experientia moti, ferro candenti, vitionem moliri (quam dum paroxysmo tenentur, stupidiq; sunt, etiam sine sensu doloris, in ipsis perficere possumus) vel caustico adhibito, idem experiri, in diuturna epilepsia, si alia omnia respuat remedia, non inconsultam esse putamus. Quam & aliqui non tantum in ea capitis sede, vbi futurum in capite sit congressus, sed & in ceruice & pedibus quoq; adhibent. Vel si certo aliquo in loco aura eleuata epilepsiam causet, causticum huic sedi appositum, eam admodum reuellit.

Expurgationes per corporis loca destinata, alvum, os, nares, utrumq; in fœminis, diuersis modis instituuntur. Inter quas deiectio quæ per alvum fit, varia excrementa educens, purgantium vsu fieri solita, diuersimodè pro diuersis convulsionum generibus, perficitur.

In diuturna enim caducaq; epilepsia, cum sicuti in omnibus diuturnis morbis, excrementorum sit prouentus, vt corpus purum fiat, iterum iterumque per vices, & quotiescunque illa de nouo recolliguntur, temporibus conuenientibus erit purgandum: Primum alvum eluendo: postmodum humores qui huic affectui ansam præbent, præparando, atq; educendo. In quibus cum tantopere authores, vti dictum, variant, nò mirum est, diuersa quoq; ab ipsis cathartica statui purgantia: phlegmagoga enim & quæ à capite pituitam educunt, plerique, quibus ab humore isto epilepsia nasci persuasum est, præ cæteris vsurpant: alij cholagoga potius, vel mela-

Melanagoga, qui bilem flauam vel atrā causam statuunt, reliquis praeualere in purgantibus medicamentis contendunt. Nos verò, prout corpus humoribus vel refertū vel contaminatum deprehēditur, huic illiue humori educendo, remedia accommodamus: eorumq; delectum ex eo praesertim, an leuioribus fortioribusve catharticis, vt humor expellatur, opus habeat, (omissa illanimum scrupulosa, & obscura catharticonum cum humoribus similitudine & proprietate) desumentes, ea quæ vel mitiora, vel efficaciora, prout humoris natura, corporisq; robur & constitutio efflagitant, eligimus: illaq; quæ à veteribus & neotericis probata sunt, praesertim Dioscor. autoritate, in hoc casu commendata: qualia ex leuioribus Serum lactis, Agaricus, Sena, & è fortioribus Veratrū existunt, additis reliquis quoq; idoneis, approbamus, & secundum praedictā intentionem administrata, in epilepsia conducibilia esse existimamus. Imprimis verò cauentes, cum epilepsiam acris malignæve materia suscitatur, ne nimium calidis acerbisve, & fortioribus purgantibus, corpus supra modum exagitemus: & si causa in dubio sit, vel abstrusa, ne nimis solliciti, vni alicui humori euacuando, ex cōmuni opinione incumbentes, corpora magis debilem, quam iuuenimus. Verum & catharticis idoneis eiusmodi medicamentis, ea quæ nervoso generi appropriata sunt: & quæ peculiari vi epilepsie resistunt, inter quæ Pæoniæ succus, affatim sumptus alvum quoque subducit: & quæ materiam, si preparatione opus habeat, simul preparant (quæ omnia in alterantibus explicabuntur) erunt permiscēda. Sed & quæ menses, hemorrhoidesq; aperiant, si hæc retenta fuerint, iisdem commixta, quia facultas expultrix tunc varijs modis impellitur, vt facilius prouocentur, procurant.

Cæterum, vt ea exemplis quoq; demonstramus: obseruata hac methodo, in epilepsia diuturna vti & in catalepsi, sic erit procedendum.

Alvus sollicitada primū, vt à primis vijs faeces, ipsisque permixta eluuijs educatur: idq; tum ante purgantium vsum: tum etiam in paroxysmo nonnunquam, vt citius ad se

redeant: vel per vices quoque, si alvus non sufficienter respondeat.

Quod glandibus quibuscūq; fieri poterit: vel sequentibus inditis: R. Mellis, succi Rutæ ana æquales partes: coquantur: adde in fine Salis quantum sufficit & parum pulueris radcis Pæoniæ.

Vel clysmata iniiciuntur: ab initio laxantia, mox stimulantia, tandem & fortiora, cerebro neruisq; simul accommodata.

Quale hoc in pituitosis potissimum esse poterit: R. rad. Liliorum, Pæoniæ recentis ana ʒ. j. β. Aristol. rotundæ vel vulgaris ʒ. β. herbasum Maluæ, Betæ, Saluiæ, Rutæ, Centaurij minoris ana M. j. florū Lauandulæ vel Stœchados, Anthos, Primulæ, Chamomil. ana P. j. Furfuris P. j. seminis Pæoniæ ʒ. j. β. Carui ʒ. j. fiat decoctio: dissolue succi Mercurialis vel Betæ, Mellis vel sacchari rubr. ana ʒ. j. Hieræ picræ & logodij ana ʒ. ij. olei Rutacei ʒ. j. β. Salis parum: fiat clyster.

In melancholica constitutione, praesertim si circa hypochondria, & venas meseraicas epilepsie vel catalepsies causa lateat, tale exhiberi poterit: R. herb. Maluæ, Betæ vel Mercurialis, Betonicæ ana M. j. summitatū Thymi, Fumariæ ana M. β. fl. Chamomil. P. j. Polyodij, Senæ ana ʒ. β. seminis Fœniculi ʒ. ij. fiat decoctio: dissolue in sufficienti quantitate confect. Hamech ʒ. ij. Catholici ʒ. β. Mellis ʒ. j. olei Chamomil. Anethini ana ʒ. j. β. Salis parum: fiat clyster.

Præparatur humor redundans, ante purgationem, prout vel pituitosus, vel biliosus, vel melancholicus est: exhibitis sequētibz per triduum vel quadriduum.

Pituitosus hoc pacto: R. Syrupi de Hyssopo (in hoc casu valde commendatur) ʒ. ij. de Stœchadæ, Oxy mell. squil. an. ʒ. j. aquarū Betonicæ, Pæoniæ, Hyssopi, Melissæ ana ʒ. ij. misce; aromatizetur: Vel tabulam conuenientem mox eo sumpto, sumat.

Vel fiat melicratū: R. Hyssopi, Calamenthi ana M. j. florū Stœchados, Cicerum rub. ana P. j. addito Melle coquatur parum.

Vel decoctum: R. rad. Pæoniæ, Galangæ crassæ ana ʒ. j. Visci quercini, radicum Enulæ, Aristolo. rotund. ana ʒ. β. radic. Graminis, Asparagi, Liquiritiæ ana ʒ. j. herbarum Hyssopi,

fopi, Betonicæ, Melissæ, Calamenti ana M.j. fl. Stœch. Anthos, Saluiæ ana P.j. feminum Anisi, Fœniculi ana z.j. Ocimi, Pœoniæ ana z.j. Passul. z.j. fiat decoctio: dissolue in tb.j. col. syr. rupi de Hysopo, Acetosi ana z.j. misce: Fiat apozema.

Vel vinum: R. herb. Absynthij, Chamæpitheos, Chamedreos, Calamenthi, Hysopi. fl. Stœchados, ana, infunde in Vino.

Melancholicus humor sic præparabitur: R. syr. de Fumaria, z.ij. de Stœchade, de Hysopo ana z.j. cû aquis Betonicæ, Buglosi, Fumariæ, Hysopi quantum sufficit.

Vel hoc decoctum, quod & in catalepsi accommodum erit: R. rad. Aperitiuarû in Vino maceratarum ana z.ß. rad. Buglosi recentis z.j. rad. Pœoniæ z.ß. cort. Tamaricis z.vj. herbarum Melissæ, Fumariæ, Hysopi, summit. Thymi ana M.j. fl. Cordialium ana P.j. feminum Petroselinici, Fœniculi, seminis Carui ana z.j. & in tb.j. dissolue: Sacchari q.s. fiat Iulep. clarificatum & aromatizatum Cinamomo.

Si biliosus humor exuperet sic fiet: R. syr. de Endiuia, Acetosi simplicis ana z.ij. aquarum Endiuia, Acetosæ, Pœoniæ ana quantum sufficit.

Vel hoc decoctum: R. rad. Graminis, Asparagi, Cichoræ ana z.j. rad. Pœoniæ, Visci querc. ana z.ß. herbarum Endiuia, Capillarium, Buglosi vtriusque cum toto ana M.j. Betonicæ M.ß. florû Violarum P.j. feminum Anisi z.j.ß. seminis Pœoniæ z.j. Passul. z.j. Prunorum num. vj. fiat decoctio: dissolue syr. rupi Viol. & Endiuia ana z.ij. misce.

Purgantia, præparato humore, talia adhiberi possunt. In pituitoso corpore primum.

Potio sequens ex electuarijs vsitatis parata, efficax, sed amara: R. elect. Diaphœni. z.ij. Hieræ Colocynthidis & Rûi z.j.ß. syr. rupi de Fumaria compositi z.j. aquarû Hysopi & Pœoniæ q.s. fiat potio: in robustioribus etiam hiera Logadij officin. dari potest.

Alia cum decocto conuenienti: R. rad. Acori veri, Pœoniæ ana z.ß. Liquiritiæ z.vj. Visci querc. z.ij. herb. Hysopi, Melissæ, Betonicæ ana z.ij. florû Stœchados z.j.ß. fl. Buglosi vtriusq; ana z.j. seminis Pœoniæ z.ij. seminis Fœniculi z.j. Polypod. Seneg. ana z.vj. Epithymi z.ij. Passul. z.j. fiat decoctio: infunde Agra-

rici z.j.ß. Zingib. z.ß. fiat expressio: dissolue electuarij Hieræ colocynth. z.j. vel si amara respuunt Diaphœni. z.ij. syr. rupi Ros. sol. z.j. fiat potio.

Vel in forma pilularum hoc modo: R. pilul. Cocciarum z.ß. Sine quibus, de Sarcocola ana z.j. cum syrupo de Stœchade, vel aqua Hysopi: fiant pilulæ.

In biliosis & melancholicis sequentia potius conueniunt: R. Polipodij z.vj. Senæ z.ij. Epithymi z.ij. seminis Fœniculi z.j. rad. Pœoniæ z.ß. infundantur in Sero caprino: decoquantur: dissolue Cathol. z.ß. conf. Hamech z.ij. Syrup. de Fumaria z.j. fiat potio.

Vel sic: R. rad. Pœoniæ recentis z.j. herb. Betonicæ, Callitrichi, Cichorij, Endiuie, Lupulorum ana M.ß. fl. Cordialium, Genistæ ana P.j. feminum Anisi, Fœniculi ana z.j. Passul. par. x. Prunorum Sebesten ana par. v. Polipodi z.v. Senæ z.ß. Tamarind. z.ß. Myrobal. citrin. confricatarum succo Ros. z.j.ß. fiat decoctio, infunde Rhabarbari el. z.j. Spicæ z.j. fiat expressio: dissolue Syrup. ros. sol. vel de Fumaria, vel de Pomis redolentibus, z.ß. fiat potio.

Quæ pluribus vicibus vsurpatur, vel continuis, vel interpollatis, hisce formis præscribuntur.

Syrupus talis fieri poterit: R. rad. Pœoniæ recentis z.ij. rad. Acori veri, Visci quercini ana z.j. Aristol. rot. z.ß. Scyllæ præparatæ, rad. Pyrethri ana z.ij. rad. Fœniculi, Liquiritiæ ana z.j. herbarum Hysopi, Betonicæ, Saluiæ, Maioranæ, Melissæ ana M.j. Rutæ, Thymi, Primulæ veris, Chamæpitheos, Endiuia, Lupul. Fumariæ ana M.ß. florû Stœchados, Anthos, Borrage, Buglosi, Genistæ ana P.j. feminum Pœoniæ z.ij. feminum Rutæ Fœniculi, Anisi, Sesebeos montani ana z.j. Passul. par. xx. Ficum, Prunorum ana num. x. Polypodij z.ij. Epithymi z.vj. Senæ, Carthami ana z.ij. Agarici z.v. Rhabarbari z.ij. vel z.ß. Turbith. z.ij. Hellebori nigri, Galangæ crassæ, Nucis mosch. ana z.ij. Zingib. Spicæ Cardamom. ana z.j. fiat decoctio secundum artem, in Aqua & tertia parte Vini, & colaturæ adde succi rad. Pœoniæ, Pomorum redolentium ana z.ij. succi Mercurialis z.j. succi Hysopi z.ß. Sacchari tb.ß. coquatur ad consisten-

sistentiam : De quo capiat ab ʒ.j. ad ʒ.ij. cum aqua Pæoniæ.

Vinum per dies aliquot assumendum, ex iisdem vel paucioribus sic fiet: Rʒ. Senæ ʒ.j. Agarici troch. ʒ.β. Turbith ʒ.ij. pulpæ Colocynthis ʒ.β. Tartari ʒ.ij. rad. Pæoniæ, Acoriana ʒ.β. herb. Absynthij, Hyfopi, Betonicæ ana ʒ.ij. fol. Rutæ ʒ.j. fl. Stœchados vel Lauandulæ ʒ.ij. seminis Fœniculi ʒ.j.β. Galangæ crassæ ʒ.ij. Zingib. ʒ.j. Cardamomi ʒ.β. conquassentur: adde Vini, vt benè diluatur: Experiatur quantitatem vnius haustus, & diebus aliquot bibat.

Electuarium vsuale sic fiet: Rʒ. hieræ Colocynth. ʒ.j. Diaphœn. ʒ.β. Diacarthami, Diasenæ ana ʒ.ij. cum syrupo de Stœchade & de Hyfopo: fiat electuarium ad vsum: A ʒ.ij. incipiendo.

Vel in forma pilularum: Rʒ. spec. Hieræ simplicis ʒ.β. Agari ʒ.ij. Rhabbarbari ʒ.j.β. Hellebori nigri ʒ.j. troch. Alhandal ʒ.ij. lap. Lazuli præparati ʒ.j. medullæ seminis Pæoniæ, Stœchad. Arab. ana ʒ.j. Castorij gr. vj. Salis gemmæ ʒ.j. cum syrupo de Hyfopo fiat massa: Incipiat à ʒ.β.

In mitiori puerili dicta epilepsia, purgantibus sed leuioribus quoq; vtendū erit, cum infantes vel grauidas mulieres, fortioribus purgare tutū non sit: quæ cum vehementer calida existat, in illis corpus nimium accenderent, in hisce verò fetum propellerent.

Ex prædictis itaque leuiores vsurpari possunt. Vel si infantes adhuc sint, quia respuunt ingrata & amara, dentur dulcia, vt Manna, vel Cassia cum saccharo. Vel detur Lac in quo Rosæ, Violæ, Sena, similiaque ebullierint. Quod si adhuc lactentur, nutritrix quoq; leuibus purgetur, vt lac quod fugit minus sit excrementitium.

Alijs detur de cōfectione hac Passularum, quæ sic ad hunc casum conueniens paratur: Rʒ. fol. Senæ ʒ.j. Agarici, rad. Pæoniæ ana ʒ.β. fol. Hyfopi ʒ.ij. infundantur in Aqua & parum coquantur: colentur: dein impone Passularum quartar. ʒ. iterū coquantur, & exprimantur, & ad Mellis consistentiam coquantur: Detur primum ʒ.j. pro ratione ætatis experiundo.

Pulis quoq; exhiberi potest, qui Rʒ. Tar-

tari ʒ.ij. Diacrydij ʒ.β. Anisi ʒ.j. rad. Pæoniæ ʒ.β. Sacchari ʒ.vj. Detur ʒ.j.β.

Præsertim verò si à vermibus epilepsia exorta sit, ea quæ præterquam quod purgant simul vermes enecant: qualia sunt, aloë, rhabbarbarum, feliguntur: ijsq; quæ putredini resistunt, vt sunt citriorum, limonum, succi & semen, cornu ceruinū, coralliaque: & quæ epilepsię resistunt, vt rad pæoniæ & semen, viscum quercinum & similia permiscuntur: atque in forma pilularum, vel puluerum aut tabularum exhibentur.

Pilulæ valde conueniunt, propter aloëm, si eas deglutire possint: quales hæ sunt: Rʒ. Aloës, Rhabbarbari ana ʒ.j. seminis Contra vermes, Corallinæ, medullæ seminis Pæoniæ ana ʒ.β. Diacrydij gr. vj. excipiantur syrupo de Limonibus: fiant paruæ pilulæ: Deglutiat aliquas.

Tabulis ferè magis delectantur: quæ sic parari possunt: Rʒ. Rhabbarbari ʒ.j.β. seminis Contra vermes ʒ.β. medullæ seminis Citri & Pæoniæ, rasuræ Cornu cerui, Eboris ana ʒ.j. Coralli ʒ.j. Visci quercini ʒ.j. Diacrydij ʒ.β. Sacchari dissoluti in aqua Portulacæ addito, succo Limonum, vel paucio Aceto ad ʒ.j.β. fiant tabulæ: Capiat ʒ.j.

In deteriori verò convulsione, quæ vires, iam prius morbi quem sequitur sequitia labe factatas, prosternit, vel cuius causa ab externis subito progressa est, purgantibus corpus eneruare, vel superuacaneum, vel periculosum quoq; existit. Si tamen post colicos cruciatus, ab eodem humore, nondum vel non sufficienter expurgato acciderit, purgantibus vna eademq; opera, & colicis cruciatus, & convulsionibus inde natis, prospiciemus. Inter quæ clysmata vtrumq; ferè præstantia (et si vulgus eorum vsu convulsionem & paralyses, quæ colicos hos affectus sequi solent, accidere sinistrè opinetur) præ cæteris cōmendantur: quæ & in reliquis convulsionibus prauis, in quibus purgantibus aliquin vtinon licet, vsurpara, quia reuellunt, atq; interim naturā non nimium offendunt cæteris purgantium formis præferuntur.

In euacuationum, quæ per os naresque fiunt, genere, vomitus, tunc quando ab assumptis, aut alijs ventriculi repletionibus,

epilepsia vel exortum aut incrementum capit, iuuabit: qui & in ipso paroxysmo, immissa in fauces penna alijsve artibus excitatus paroxysmum breuiorem, si vomitio, sequatur, efficit.

Quod & sternutatio eodem tempore facta (quæ vt casum epilepticum interdum præcedit, ita nonnunquam eundem finit) prestare poterit. Quæ Pyrethro in nares insufflato, in hoc casu commodè mouetur: vel sequenti puluere: R. rad. Hellebori albi ʒ. ʒ. Pyrethri, Piperis ana ʒ. j. rad. Pæoniæ, fl. Stæchados ana ʒ. ʒ. fiat puluis sternutatorius.

Idem præstabunt errhina naribus indita, quale hoc esse poterit, quod R. succorū Rutæ, Cyclaminis ana ʒ. ij. succi Pæoniæ ʒ. j. Castorei, Fellis, ana ʒ. ʒ. Mellis ʒ. j. fiat instar liniamenti: Pro naribus. Sed & errhina extra paroxysmum existente ægrò, per vices vsurpata, si caput pituita refertum sit, utilitatem aliquam præstabunt.

Vti & excreatio, eodè nomine manè sæpè facta, competet. Quæ Pipere manso, vt docet Diosc. hic utiliter promouetur. Vel alijs apoplegmatismis, vt masticando sequentes formulas: R. Masticis ʒ. ʒ. Pyrethri ʒ. iij. Cubebæ, seminis Sinapis ana ʒ. j. rad. Pæoniæ, Nucis moschatæ ana ʒ. ʒ. fiat puluis; excipiat Cera, formetur masticatoria. Acori radicem conditam, diu masticatam, plurimum commendant.

Per vterum in muliebri sexu menses promoti, tum ijs quæ per os exhibentur, tum quæ vteri orificio induntur, regioniq; illius adhibentur, si in sanguine illic retento causa mali lateat, epilepsiam sæpenumerò sanant.

Inter ea quæ id præstant, pilulæ hæ valde sunt vtilis: R. Agarici troch. Aloës ana ʒ. j. Rhabarbari ʒ. j. ʒ. Myrrhæ ʒ. ʒ. Castorij ʒ. j. medullæ seminis Pæoniæ ʒ. ʒ. cum succo Porri, fiant pilulæ: Capiat à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. media nocte.

Pessarium item inditū tale menses potenter mouet, quod R. rad. Ireos, seminis Nigellæ ana ʒ. j. Elaterij ʒ. ʒ. vel Colocynthidis ʒ. j. Castorij ʒ. ʒ. excipiantur Melle, quod cum succi Panis porcini, vel Mercurialis portione aliqua, ad spissitudinem decentem coctum sit: fiant pessaria.

Hæmorrhoides mouere, exhibitis admotisque, singulare præsidium est, si epilepsiæ causa, in venis meseraicis, vti dictum est, potissimum lateat. Quod & sanguifugis, alijsque suo loco explicatis remedijs, præstari poterit.

In operationum reliquarū, quæ euacuationis causa, tum in paroxysmo, tum extra hunc extrinsecus fiunt, Cucurbitularum applicationes recensentur: quæ nunc occipitio, nunc scapulis, nunc hypochondrijs, nunc inguinibus ad diuersionem adhibentur. Vti & frictiones extremitatū: quibus omnibus vapores & humores à neruoso genere reuellentes, accessiones & pauciores & breuiiores reddimus. Sed & ligaturis auræ quandam epilepsiæ causam præbentem, a parte aliqua, quæ vinciri potest, si supra illius exortum fiant, impediri posse, quo minus excurrens, paroxysmum inducat epilepticū, Galenus in puero epileptico expertus memoriæ prodidit. Sicuti & repellentibus capiti exteriorius applicatis, idem nonnunquam successisse, aliqui testantur.

Alteratiua remedia, quæ in convulsionum curatione adhibentur, ab ijs petuntur, quæ causa illarum malignitati, cōtrarietate quadam resistunt: idque occulta potius, quam manifesta proprietate, nimirum, quæ epilepsiæ in genere, à quacunque causa excitata fuerit, aduersantur: vel alexiteria, quæ si à venenata aliqua vi prodeat, vel epilepsia vel catalepsis, eiusmodi venenis cōtraria sunt. Vel quæ neruoso generi opitulantiæ, vt à causa minus promptè afficiatur, efficiunt: idq; quia roborando illud firmū reddunt: vel leniendo demulcent: aut stupefaciendo impatibile efficiunt. Vel quæ corpus vniuersum alterantia, constitutionem illius, quæ ad epilepsiam proclius erat, mutant.

Epilepsiam proprietate quadam depellere vsus multa inuenit & comprobauit remedia: vt sunt pæonia, viscū quercinum, craniū hominis, vngula asini, hirundo, aliq; multi eiusmodi in remedijs explicata præsidia: quæ licet in omnibus illius causis vsurpari possint, cum tamen præter hanc vim simul vel calida, vel frigida, vel temperata existant, et si confusè circa horum respectum ijs vtan-

tur, nos pro ratione constitutionis ægri vel morbi seligi debere, & hæc illave cæteris præferri, consultum magis esse putamus.

Venenatam qualitatē, epilepsiam vel catalepsim inducentē, quænam præter ea, quæ iam proprietate epilepsiæ resistere diximus, retundūt, & quæ priuatim huic veneno (sicuti in alijs venenis, quæ illis resistent repertiuntur) aduersentur antidota, hætenus nulla, quæ id promptè & citò faciāt, inuenit experientia: Quapropter si à venenato humore vaporēve epilepsia fiat, cōmunia remedia ea, quæ in genere venenis omnibus aduersantur alexipharmaca, vt theriaca, similesq; cōpositiones: quemadmodū in omnibus morbis venenatis, & pestiferis, vsurpantur: sic quoq; in hisce casibus ijs, quæ proprietate epilepsiæ resistunt permista, ad causam illius profligandā, emendandamq; adhibentur. Et si abiectū bestię, morsuue canis rabidi, extrinsecus venenum corpus subiens, epilepsiam procrearit, alexiterijs eandē, vt reliqua innata symptomata, curamus.

Robur addētia neruoso generi appropriata sunt remedia, quæ ex capitalibus & artheticis simplicibus, saluia, rosmarino, maiorana, betonica, steechade, primula & iua parata, in paralyfi, alijsq; frigidis & humidis cerebri morbis, quoq; competūt: quæ & cum neruofum genus, vt validiūs ijs quæ ipsum molestant, resistere possit, nouis quasi viribus instruant, non incommodè cæteris, quibus in epilepsia vtimur medicamentis, addi consueuerunt. Verū non ea mente aut intentione, sed quia à pituita cerebrum obdurante, epilepsiam fieri crediderunt, non tantūm hæc appropriata neruis calida, sed & quæ, vt pituita crassa incidi attenuariq; posset, calidissima sunt, vt castoreum, euphorbium, pyrethrū, scyllam, variaq; aromata, in curatione epilepsiæ plerūmq; remedia adhibuerunt: quæ tamē nos, si ab irritatione neruosi generis epilepsia fiat, quia magis corpus accendūt, vtī eam hisce minimè sanari videmus, sic magis irritare illiusque accessiones promouere & exacerbare, experti cognouimus: proin & hæc, nisi in frigida & humida cōstitutione corporis, vel quādo alia insuper proprietate, qua venenis aut huic affectui re-

fistunt, instructa, plus illa prodesse quā calore obesse posse, vel comperimus, vel à fide dignis, & probatis authoribus accepimus, non temerè aliàs adhibenda arbitramur.

Qualia exempli gratia, ex veterū neotericorumq; proprijsq; obseruationibus, selectiora remedia, tam quæ occulta contrarietate prædita, quā quæ neruoso generi appropriata sunt, aut ex vtriusq; simul componuntur: formis diuersis: quibus vel exhibentur, vel elfacienda proponuntur: aut alioquin corpori adhibentur, describemus.

Inter ea quæ sumuntur, multa inter alimēta, ex appropriatis vsurpari possunt: qualia sunt, Hirundinū, Milui, Picæ, Cuculi, pulli, Cerebrum leporis, comesta: reliqua à quibus natura abhorret, & quæ nō consuecta, omittimus: vtī & sanguinē à necato homine calentē adhuc, potum, quod adeò vulgus approbat. Laudantur & Ficus siccæ, Plantago cum lenticula, Vitis nigræ teneritates, vtī hæc docet Diosc. quæ & cum Aceto, & Oleo sumi possunt: vtī & Cappares, quas adeò laudat Fontanonus: & si cibi Hyssopo, Saluia, Maiorana, alijsq; neruis appropriatis, condiantur simplicibus.

Inter medicamentosa potus hic exhiberi poterit, qui R. rad. Pæoniæ ʒ. j. Visci quercini ʒ. ʒ. rad. Azari Aristolochiæ ana ʒ. ij. seminis Pæoniæ ʒ. j. Anisi ʒ. ʒ. Schœnanthi ʒ. j. fiat decoctio in Iusculo, vel Vino & Aqua, vel Aqua appropriata; dissoluendo Mellis scyllitici ʒ. ʒ. fiat haustus: Detur, cum paroxysmus timeretur.

Decoctum in corporibus plethoricis hoc parari poterit: quod R. ligni Guaiaci rasi lb. ʒ. Visci quercini quart. j. rad. Pæoniæ ʒ. j. decoquantur in Aqua lb. xij. ad consumptionem tertiæ partis: Bibat loco vini, vel vinum eo diluat.

Succum Sedi maioris vel Rutæ, in paroxysmo, mox expressos, ori indunt, Castorei pauxillum interdum addentes.

Vel sic ad vsū vt semper præstō sint eiusmodi medicamēta parari possunt. R. succorū Millefolij, Rutæ, Sedi mai. Cardui bened. ana ʒ. ij. Saluiæ, Calendulæ ana ʒ. j. Sacchari ʒ. iij. decoquantur ad consistentiam syrupi: Sumat frequenter cochleare j. vel ij.

Syrupus Pæoniæ parari potest ad vsum, hoc modo: Et succi Pæoniæ ʒ. vj. Mellis scyllitici ʒ. j. β. Aceti scyll. ʒ. β. Sacchari ʒ. ij. decoquantur ad syrupi consistentiam. Laxat quoque, & quia acidulus, eò erit gravior. Syrupus de Cichorea plurimum in pueris laudatur.

Compositus sic fieri poterit: R. rad. Pæoniæ ʒ. j. β. rad. Eryngij, Filipédulæ, Dictamni albi, Aristolochiæ ana ʒ. j. rad. Imperatoriæ, Pyrethri, Scyllæ, præparatæ ana ʒ. β. Visci quercini ʒ. vj. herb. Hyfopi, Saluiæ, Maioranæ Rutæ, Betonicæ, Cardui bened. Chamæpitheos Chamædreos, Millefolij, Pentaphylli, Hyperici, Plantaginis, Vitis albæ ana M. j. florum: Stœchados, Lauandulæ, Violarum, Garyophyl. hortensium an. p. j. feminû Pæoniæ ʒ. iij. feminû Rutæ, Trifolij an. ʒ. j. β. Anisi, Fœniculi ana ʒ. ij. fiat decoctio, & in colatura adde succorû rad. Pæoniæ & Hyfopi an. ʒ. ij. Mellis scyllitici ʒ. iij. Sacchari ʒ. v. aromatisetur Cinamomi ʒ. ij. fiat syrupus: decenter, vt asseruari possit, coctus: De quo fumat frequenter ab ʒ. β. ad ʒ. j. per se, vel cum liquore conuenienti dissoluendo.

Vinum ex iisdem aridis in vini mensuris quatuor vel sex infusus, in dolio parari potest ad vsum: quod & ex paucioribus fieri poterit. Vel si Guaiacum, Viscum quercinum, rassa, addita radic. Pæoniæ, vt prius de decocto dictum est, Vino indas. Vel scylliticû vinum vt docet Diosc. exhibeas.

Aquæ consuetæ sunt, in hosce vsus paratæ, atque asseruatæ, quæ separatim, vel commistæ hac ratione parari possunt: R. aquarum florum Pæoniæ, Lilij conuallij, Tiliæ, Cerasorum nigrorum maturorum ana ʒ. β. Detur ab ʒ. β. ad ʒ. j. In cuius aquæ ʒ. ij. si Castorij ʒ. j. infundas; erit efficacior; longeque magis, si Assæ fœtidæ tantundem addas: quæ tamen ob fœtorem vix, nisi in paroxysmo, ab ægro stupido tunc admittitur.

Ex varijs concinnata efficacissima sic parabitur: R. Hirundinum pullorum numero xv. Picæ, Cuculi pullorum numero quatuor, vel si haberi non possunt, hirundinum xxv. Sanguinis humani vel hirci ʒ. iij. Cranij hominis ʒ. j. Castorij ʒ. β. rad. Pæoniæ quart. j. & feminis ʒ. j. Scyllæ præparat. ʒ. ij. Visci

querc. ʒ. β. herb. Rutæ, Hyfopi ana M. ij. Betonicæ, Maioranæ, Saluiæ, florum Rosarum, Lauandulæ ana M. j. Cinnamomi, ʒ. ij. Gariophyl. Nucis mosc. Cubeb. Piperis ana ʒ. j. Vini præstantissimi vel maluatici t̄b. iij. aquarum Lilij conuallij, & florum Tiliæ, ana ʒ. ij. aquæ Vitæ ʒ. j. macerentur per horas tantum aliquot, ne corrumpantur; destillentur. Detur ab ʒ. β. ad ʒ. j. ad præcautionem: quæ & aqua in paroxysmo infusa, excitat; citiusque si in portione illius Assam fœtidam, vt prius dictum, infundas.

Alia ex sanguine hos modo parabitur: R. Sanguinis humani, è recenter iugulato, vel vena aperta hominis sani collecti t̄b. β. rad. Pæoniæ recentis incisæ ʒ. ij. feminis Pæoniæ ʒ. β. Hyfopi, Rutæ ana M. j. Cranij hominis ʒ. j. eliciatur aqua mox dum calet: Cuius datur ʒ. j. ad præcautionem.

Pulueres sic fiunt: R. rad. Pæoniæ & feminis illius, Visci quercini ana ʒ. j. Maioranæ, Nucis mosc. feminis Anisi ana ʒ. β. fiat puluis: potest addi Cranij hominis pulueris ʒ. j. Et si vermes adsint, in pueris, rad. Dictamni, rasuræ Cerui cornu an. ʒ. β. feminum Santonici, & Portulacæ ana ʒ. j. Coralli ʒ. β. fiat puluis: Detur per se, vel cum Saccharo addito, fiat tragema: vel tabulæ, dissoluto saccharo in aquis Pæoniæ vel alijs.

Vel sic: R. Cranij humani ʒ. j. Ungulæ asini, cineris Hirundinum ana ʒ. β. rasuræ Eboris ʒ. j. Coralli rubr. ʒ. j. Margarit. præparatarum ʒ. β. Auri limati ʒ. j. feminis Pæoniæ ʒ. β. Diamosci (qui puluis epilepsiæ sanandæ accommodatus censetur) ʒ. j. fiat puluis: potest addi Sacchari quantum sufficit & manere puluis, vel in tabulas redigi cum aqua conuenienti.

Electuaria & conferuæ sic parantur: R. conferuari Pæoniæ florum, & Stœchados, Rosmarini, Saluiæ, Betonicæ ana ʒ. j. conf. fl. Cichorij & Violarum ana ʒ. β. rad. Pæoniæ & feminis eiusdem ʒ. j. β. rad. Pyrethri, Hyfopi ana ʒ. j. feminis Ocimi ʒ. β. Cranij hominis ʒ. j. cum Melle Scyllitico quantum sufficit fiat electuarium.

Vel sic: R. rad. Pæoniæ, Pyrethri ana ʒ. j. β. Hyfopi, feminis Pæoniæ ana ʒ. ij. Mellis scyllitici quantum sufficit, fiat electuarium.

Ex scylla remedium paratum Galenus valde commendat, quod magis appropriatum sic fiet: R. Scyllæ recentis incisæ, Mellis selectissimi ana ʒ. β. adde pulueris rad. Pæoniæ ʒ. j. & feminis ʒ. β. rad. Pyrethri ʒ. j. Visci quercini, fol. Hyfopi, Rutæ, Agarici ana ʒ. ij. Craniij hominis ʒ. iij. hoc vitro clauso excepta, macerari sinantur in calore fimi, aut arenæ ad solem, per dies quindecim; postea expressus succus per se, vel leuiter prius coctus, vt ad vsum asseruari possit, exhibeatur: Capiat æger cochleare vnum vel duo plena; his tēve in septimana.

Vel sic ex varijs concinnatum remediū, & veluti contra epilepsiam antidotus: R. rad. Pæoniæ, Visci quercini ana ʒ. ij. radic. Tormentillæ, Aristolochiæ rot. Filipendulæ, Pentaphyli, Dictamni ana ʒ. j. Scyllæ præpar. ʒ. j. β. Agarici, fol. Hyfopi, Maioranæ ana ʒ. ij. fl. Stœchados & Lauandulæ ana ʒ. j. feminum Pæoniæ ʒ. j. β. feminis Callitrichi ʒ. j. feminis Seseleos, Ocimi, Nasturtij ana ʒ. β. Cinamomi, Cubebæ, Cardamomi, Nucis mosc. ana ʒ. j. Piperis longi, Zingiberis ana ʒ. β. pulu. Diamosci dulcis ʒ. ij. Pliris arcoticon, Diamargaritonis frig. ana ʒ. j. Craniij hominis puluerisati ʒ. β. Vngulæ asini ʒ. ij. cinerum Hirundinum & Cuculi ana ʒ. j. β. rasuræ Eboris & Cornu Ceruianæ ʒ. β. Coaguli leporis ʒ. ij. Benzoini, Mastice, Ammoniæ, dissol. in Aceto scyllitico ana ʒ. j. cum Melle scillitico: fiat electuarium.

Ex illis quæ venenis in genere resistunt & priuatim epilepsiæ, sensumque nonnihil obrundunt, opiata sic fit: R. Theriacæ veteris ʒ. iij. rad. & feminis Pæoniæ, Visci quercini ana ʒ. j. feminis Callitrichi, Ocimi ana ʒ. β. Craniij hominis ʒ. ij. cum Melle scyllitico vel syrupo de Papauere; si stupefaciendum magis sit; fiat opiata: Detur ʒ. j. noctu cubitum ituro.

In forma pilularum ingrata; ad præcautionem exhibentur, hoc modo: R. Castorij, Assæ, fœtidæ ana ʒ. β. gummi Ammoniæ, Sagapeni, dissolutorum in Aceto scyllitico ana ʒ. j. Fellis vris ʒ. β. olei Succini, (quod valde probatur chymicis) guttas quatuor cum succo radic. Pæoniæ; fiat massa: Ex-

hibeatur ʒ. β. cubitum eunti.

Eadem dissoluta in succo Rutæ, ori dum paroxysmo tenentur indita, illum abbreviant: vti & Castoreum solum Oxy melliti permistum, eoque oris interiora illinita. Quod & cum Felle factum, plurimum iuuat: cum hæc ingrata sensum gustus potenter mouendo, vt citius ad se redeant, efficiant.

Olfaciendo eodem nomine, odores suffitusq; ægro adhibentur: quæ etsi accessiones sæpe promoueant, & prodant epilepticas, eas tamen discutiendo, vti aiunt, præsertim in paroxysmo naribus indita, breuiores reddunt, ægrumq; excitant.

Imprimis id præstant Castoreum, Assa fœtida, Galbanum, Ruta, naribus adhibita, quæ fœtida & graui odore prædita sunt.

Vel suffitus fiat ex sequentibus: R. Ladani ʒ. ij. Benzoini, Styracis calam. Mumie, (propter bitumen) Mastice ana ʒ. j. feminis Nigellæ, Pæoniæ ana ʒ. β. fiat puluis: Vratur supra carbones.

Sed & extra paroxysmum cubiculum suffumigari poterit, non tamen nimium fœtidis.

Et pomum gestare, & sepe olfacere: quod sic paratur: R. rad. & feminis Pæoniæ ana ʒ. ij. fol. Hyfopi, Rutæ, feminum Nigellæ, Coriandri ana ʒ. j. Ladani ʒ. β. Storacis cal. ʒ. ij. gummi Ammoniæ in Aceto dissoluti q. s. fiat pomum.

Ex admotis capiti, pulueres, cucuphæ quam noctu gestent in sui, aut in sacculis apponi, vel puluinis capiti subijci consueris, imponi, aut pilis capitis inunctis prius inspergi debent.

Qualis hic est: R. radic. Pæoniæ ʒ. ij. Cyperi, Ireos, Visci quercini ana ʒ. j. β. Rutæ, Hyfopi, Maioranæ, feminis Coriandri præpar. feminis Pæoniæ ana ʒ. j. sem. Ocimi, Nigellæ ana ʒ. ij. Gariophyl. Ros. rubr. fl. Lauandulæ ana ʒ. β. Gallæ mosch. ʒ. j. fiat puluis.

Vel sic: R. rad. Ireos ʒ. ij. Galangæ, Cyperi ana ʒ. j. Nucis mosch. Garyophyl. ana ʒ. β. fol. Maioranæ, Melissæ ana ʒ. j. flor. Lauandulæ, Rosmar. Rosarum ana ʒ. j. Granorum tinctorum ʒ. β. fiat puluis.

Inungitur caput, rasum prius, sequentibus: R. oleorum Chamomil. Liliorum, Sábucini ana ʒ. j. Aquæ vitæ ʒ. j. agitentur.

Caput itidem moderatè calidis fouendū; vti hoc foru: R. radic. Altheæ, Liliorum alborum ana ʒ. j. herb. Maluæ M. ij. Betonicæ, Saluæ, Maioranæ, Melissæ ana M. j. fl. Chamom. Sambuci, Anthos ana P. j. feminum Lini, Fœnogr. ana ʒ. ʒ. Carui ʒ. j. fiat decoctio in Aqua & Vino, vel Lixiuio debiliore: Pro foru vel lotione capitis.

Repellentia capiti, si à vaporibus fiat applicantur oxyrhodina. Vel Puluis hic tenuissimus capillis inspergitur, qui R. seminis Coriandri præpar. ʒ. ij. granorum Myrthi, flor. Rosm. rubrarum, Masticis, Santali rubr. radic. Cyperi, & Pæoniæ ana ʒ. j. Gariophyll. Anthos ana ʒ. ʒ. fiat puluis.

Spina dorsi oleo Lacertarum si inungatur, prodest: vel alijs nervos roborantibus, vt in remedijs dictum.

Cordis regioni & pulsibus sequēs quoq; emplastrum admoveatur, quod R. Theriacæ vel Mitridati ʒ. ʒ. radic. Pæoniæ, Rutæ sol. contusorum ana ʒ. ij. subigantur cū Aceto.

Hoc & ceruicis regioni, simul applicatum proderit.

Extremitatum lotiones vel balnea, ex epilepsiæ & capiti & nervis appropriatis plātis, parata, vt ex Pæonia, Ruta, Hyssopo, alijsq; vt in remedijs dictum proderunt.

Appensa gestataq; amuleta, vñtata plerunque sunt, Pæonia, Viscum quercinum, Alcis vngula: reliqua in remedijs explicata fuerunt.

Cæterum quæ leniendo nervosum genus demulcent præsidia, vt in omnibus conuulsionum generibus, sic præsertim cū magnum imminet nervis tantoperè affectis periculum, ob causæ vehementiam, in deterioribus scilicet appellatis conuulsionum speciebus, vtiliter adhibentur: quæ moderato calore, humore & temperig nervos cōstrictos conuulsosque humectando, emolliendoque, relaxent, & refocillent. Qualia multa eiusmodi in conuulsione particulari, in qua musculi cū nervis reuera astricti sunt, explicantur.

Quæ extrinsecus plerunq; spinæ dorsi, v-

bi nervorum occurrit copia & exortus, per illinitiones olei Amygdal. dulc. Violacei, Butyri, Mucilaginum & similium adhibentur. Et cataplasmatum applicationes: quæ ex Malua, Althæa, ol. Violaceo, & farina feminis Lini, paratur.

Vel in forma balnei humidi, pinguis & tepidi: in quo moram aliquam trahat, administrantur: cui Malua, Pæonia, Chamomilla; aliæq; possunt incoqui.

Vel capiti quoque accommodant: illud Lacte embrocando, in infantibus præsertim, quibus matres eam ob causam lac ex vrberibus supra caput tepidum emulgent: vel oleo Violaceo inungendo.

Idem quoq; clysterum emollientium & humectantium beneficio perficitur.

Et exhibitis in cibo vel medicamentis, pinguibus vt Butyro recenti, & oleo Amygdal. dulcium, assatim bibito, quod singulare conuulsionum habetur remedium, præstat. Quonomine & serum lactis potum commendat Dioscor. & Violarum decoctum; syrupus item in pueris probatur: atque lac Amygdalinum, cui commode emulsio feminum Pæoniæ permisceri potest, vtiliter propinatur: è quo cum Saccharo permixto eclegma paratum, infanti antequam lactetur inditum, præseruatuum contra epilepsiam vtile fieri, aliqui scripserunt.

Stupefacientia nervos, quia sensum ipsorum obtundendo faciunt, vt cū irritantur, minus molestia afficiantur, eamque ob causam non tam facile conuellantur, si leuiora ex iis, in conuulsionibus grauib; & periculosis, quæ ab acri & maligna procedunt materia, exhibeantur, plurimum profuisse sæpissimè sum expertus. Quo nomine Theriacam aliasque Opiatas, (quas vt nervosum genus roborarent & calefacerent, in hoc casu practici approbarunt) non solum quia venenatam epilepsiæ causam infringunt, sed & quia nervorum exquisitum sensum aliquo modo consopiant, in conuulsionibus conuenire existimo.

Corporis totius constitutionem quæ immutant alterantque, & nouum veluti illius tempe-

77

temperamentum efficiunt, sicuti in multis diuturnis morbis desperatis, ita & in epilepsia diuturna & immedicabili aliàs, interdum aliquid singulare præstare posse, experientia comprobavit. Quæ mutationibus magnis, & euacuationibus novis in corpore factis, perficiuntur.

Mutatione ætatis, cum & temperamentum immutetur corporis, nonnunquam accidit: ut & epilepsia quæ in pueritia inuasit, pubertate superueniente sanetur: eaq; quæ adultis primum euenit, in senectute, si non cesset, mutationem tamen aliquam subeat. Sic & regionis mutatio, præsertim si de loco, in quo affectus hic popularis existit, aut aliàs de insalubri in salubrem fiat transitus, magnum in curatione huius mali adfert adiumentum. Et sexus veluti permutatio, quæ per eumuchisimum corpus aliàs masculinum & virile effæminatum reddit, à veteribus per castrationem facta, in epilepsia tanquam extremum remedium fuit commendatum.

Euacuationibus novis nondumque consuetis, naturalibus præsertim seminis & sanguinis, suo tempore superuenientibus, cum corpus vehementer etiam alterent, non mirum, si pubertatis ænnis incipientibus, non tantum ob ætatis mutationem, sed & quia semen tunc ejicere incipiunt, puelisq; sanguis fluit menstruus, epilepsia frequenter desinat. Et hæmorrhoidibus in quibusdam naturis erumpentibus, eadem interdum cesset: & mulieres gravidas, postquam partum enixæ sunt, beneq; purgatæ, epilepsia derelinquat. Quod cum per eiusmodi, quas natura molitur, expurgationes succedere intelligant Medici, varias quoque euacuationes, casu frequentius quam methodo institutas, in epilepsia desperata tentant.

Symptomatum occasione, cuiusmodi in diuersis mentis confternationis generibus varia occurrunt, præter legitimam curam, quæ causæ summouendæ debetur; qua & ablata, ipsa quoque cessant, statim cum ea urgent, quædam administranda erunt. E quibus præcipua quorum rationem habere oportet, sunt; suffocatio, casus, mo-

tus violentus, sopor & stupor, delirium, imbecillitas.

Ex casu inopinato & repentino, periculum magnum imminet apoplecticis & epilepticis, quo sæpe caput impingentes extinguuntur: aut aliàs grauiter læduntur, nisi ex consuetudine aut vertigine præcedente, epileptici admoniti de tempore, tunc sedendo vel cubando, casum præcaueant.

Suffocationis periculum apoplexia graui laborantibus, quia non tantum ob respirationem impeditam anguntur; sed & ob impedimentum, quod dentibus mordicis costrictis, ore clauso, aëris liberior transitus interclusus sit, imminet. Idcirco dentes subito erunt diducendi; & si non facile cedant, instrumento per vim intruso diuellendi; eoque interposito ne rursus recludantur; cauendum, quod & ne illud mordendo abscindant, durum esse oportet: cui rei vel os vellignum durum, quodcumque primum occurrat (sicut cochlearia in hunc usum ferè semper præ cæteris præsto inueniuntur, quorum manubrium interponitur) inseruiet. Quæ si dentibus iam costrictis intrudi nequeant, diremptorio instrumento ad id parato, dentes dirimendi & interposito, ut iam dictum, ne iungantur, continendi: vel si neque sic disungi queant, dens vnus alterve euellendus erit. Corpus dein sic collocandum, ut thorax minus compressus, liberius moueri queat: non tamen illud vehementius dum mouetur erit agitandum, unde spiratio cita sequitur, quam cum non possint perficere citius, ut sæpe incuria sit, suffocentur.

Ex commotione corporis & agitatione illa vehementi, ne seipsos vulnerent, vel alioquin lædant epileptici, præcauebitur: si interpositis mollioribus puluinaribus, vestibus, ne membra rebus durioribus allidant, ipsis prospiciatur. Nam ipsos vel retinere aut vinculis coercere, cum per motum materia epilepsiæ excutiat, discutiatq; tutum minime existit. Et quia in eiusmodi corporis conuulsione etiam mordent, linguamque vehementer interdum vulnerant, interponendum subito dentibus ipsorum antequam constringantur, non digitus,

gitus, quod cum periculo sæpe temerè adstantes faciunt, sed instrumētum, sicuti hoc in apoplecticis ob suffocationis metū, quod in epilepticis vt linguæ subueniatur, cum de suffocatione minimè periclitentur, intrudi debet: & si lingua apprehensa iam sit dentibus, diremptorio instrumento subueniendum.

Sopor & stupor in hisce affectibus, si diu perseverent, aut sæpe redeant, calorem natium opprimunt. Soporè itaque nimio vel profundo, & stupore vehemēti apoplectici vel etiam epileptici, correpti, subinde erunt excitandi, & ne relabantur, impediendi: quod fiet, sensus externos obiectis fortioribus mouendo, vt internos impellat, & in actum prouocent. Sic mouetur auditus, clamore in aures, sono alto strepituque facto: visus splendore multo lucis & ignis: Gustus amaris & acutis: Olfactus foetidis supra enumeratis: Imprimis vero tactus, cum sensum admodum moueat, si cum dolore fiat, in partibus sensu exquisito præditis; vt in cute, pilos euellendo, vrendo, pungendo, admodum excitat. Quod & fiet nares, quæ eximium sensum habent, irritando odoribus & aliis, quæ sternutationem simul mouent, per quam magis adhuc corpus concussum excitatur. Vt & si oculos splendore subitaneo, aliisque lachrymas mouentibus vellicando, excitemus. Item aluum suppositorijs ad excretionem: Gulam digito, penna, ad vomitionem sollicitemus. De quibus omnibus, cum simul quoque causam reuellant & deriuent iam superius dictum est.

Imbecillitas non adeò vrget, vt huic alia à reliquis morbis debeatur virium restauratio, per victus rationem aut medicamenta cordialia; inter quæ tamen externa, cum antequam ad se redeant, ægrè aliquid assumant, quæ cordis regioni & pulsibus applicari solent, locum maximè habebunt, & si moribus sit diuturnus, victus ratione efficaci, aliisque erunt refocillandi.



DE MENTIS ALIENATIONE.

CAPVT III.

Genera.



MENTIS alienatio seu hallucinatio Paraphrosyne appellata est; quando ea quæ non sunt, ac si essent: vel quæ sunt, sinistrè & præter rationem fingunt, iudicant & memorant: Idque vel simul vel separatim: Siue hoc cogitatione sola fiat, vel idem dictis factisque exprimant.

Hæc à causis insitis plerumque adueniens, innata quædam est Stultitia: Aliàs ab externis causis proueniens, si ab assumptis, Temulentia vocatur; si ab affectu aliquo vehemēti nascatur, Animi dicitur commotio: nonnunquam vero à causis internis dependens, Desipientia est; quæ vel sine febre comite, Melancholia; vel cū furore accidens, Mania aut insania existit: vel cum febre copulata; Phrenitis dicitur: quorum singulorum accidentia explicabimus.

Stultitia, Moria, Fatuitas, Infantia, etsi Stultitia. non pueris tantum, cum iudicio adhuc destituantur, & senibus, qui repuerascere dicuntur (quæ tamen potius metis in illis est debilitas quàm deprauatio) sed & omni ætati, omnibusque hominibus eo nomine adscribatur, quod ipsorum actiones omnes humanæ stultæ esse videantur: vti Erasimus in moria, Brandus in naui stultorum, in cunctis hominum statibus eleganter ostenderunt: Propriè tamen de illis dicitur qui verè stulti & insipientes nati, mox etiam in ipsa infantia stultitiæ indicia, gesticulando, præter reliquorum infantium consuetudinem, edunt; neque faciliè obtemperant, aut dociles sunt, ita vt sæpe neque loqui discant; longè minùs alia munia obire, in quibus industria aliqua requiritur. Quod in quibusdam regionibus frequens est malum, vti de Ægypto scribunt, & in Valesiæ pago Bremis, sicut ipse vidi, & in Carinthiæ valle Wnngersthal dicto, multis infantibus solet accidere: qui præter innatam stultitiam,

tiam, capite interdum infirmi, lingua immensa & tumida, muti, strumoso sæpè gutture, aspectum deformem præbent: & sedentes in viis solemque intuentes, ac bacillos digitorum interstitiis interponentes, corpusq; variè torquentes, oreque diducto, cachinnum & admirationem prætereuntibus mouent.

Alij verò, quibus aliqua nota stultitiæ ab ortu, vel postea primùm impressa est, etsi omnes actiones reliquas vitæ, rectè obeant; & in quibusdam præ cæteris singulare quid præstare possint, ingenioque valeant, atque arte aliqua, vt pingendi sculpendi, architectura, musica, alijsq; excellant, tamen stultitiam hisce produnt, quòd se laudari libenter audiunt, ceterò res ludicras narrant & agunt: quorum cōsuetudine magnates maxime ob id delectantur, quos & ob phantasmata diuersa illis occurrentia, Phantasticos vocant.

Alij verò magis adhuc fatui, nugis varijs, gestibus, & iocis stultitiæ aures, vt dicitur exerunt: è quibus aliqui vitia non omnibus accepta, eaque sæpè grauia in se habent: quæ pro naturarum varietate nunc ira nunc furore, nunc mœrore, nunc alijs, quæ omnia explicare superuacaneum esset proferunt.

Temulentia.

Temulentia vel ebrietas à vino aliisque quibusdam, vt in causis dicitur, procedens, nec dum eousque progressa, vt soporem & stuporem causet, de qua iam dictum est, sed hilaritatis, qua vinum moderatè sumptum cor hominis lætificat, terminos prætergressa, dementans, pro naturarum diuersitate, vt prius de stultis quoque prolatum fuit, diuersos temulentiae & ebrietatis effectus prodit. Cum ex ebrijs alij stultis potius, profuso & immodico gaudio similes sint, fatuitatem risu & cachinnis (vnde proverbiū per risum multum debes cognoscere stultum) item garriendo, cantando, ridendo, osculando, amando patefaciant: Alij verò insanorum mores potius, clamore, ira, verberibus, morfu, exprimant: Alij melancholicorū instar tristentur, lachrymas profundant, de religione multa & de morte loquantur, quam speciem Germ. Das drun-

cken essendi vocant. Quam illorum desipientiam plerunque sopor vel stupor, sicuti illic explicatum fuit, excipiens, eousq; compescit, donec excitati rursus ad se redeant, immemores sæpè prægressæ dementiæ: capitisq; dolore & grauitate aliquandiu postea diuexati, desipientiæ penas dant.

Animi commotio vehemens vel peruerans, ab affectu aliquo illius, vt in causis dicitur, exorta, similiter mentis alienationis species est: illam adeò vt multa à ratione aliena vel agat vel cogitet deprauans: Sicuti est fatuum illud gaudium nimium, quo elati, pueriliter multa & insolita dicunt & gestiando obeunt, & ridendo præ gaudio, vt inquit Comicus lachrumentur: Item furor ille brevis, quo ira perciti, iurant, & præcipientes, nulla pericula, vt se vlcisci queant, metuentes, feruntur: Dein & ex mœrore & terrore concepta melancholia, quæ sæpè in veram & perseverantem degenerare, vt in causis patebit, solet. Huc & phantasia pertinet illorum, qui amore graui premuntur, ex corrupto iudicio & imaginatione nata, referri debet, adeò homines immutans, vt sicuti ille ait, non eundem esse noscas: quæ non tantum viros sed & mulieres, iuuenes & senes dementat: quam speciem dementiæ Hereos nomine, quòd heroibus seu diuitibus accidere soleat, satis inconsideratè, cum nec pauperimi tela cupidinis deuicare possint, appellant. Hæc mentis conturbatio, composita quædam ex omnibus reliquis animi passionibus est affectio, cum nunc gaudij, nunc tristitiæ, nunc iræ in ea effectus eluceant, nihilque sit amantibus inconstantius: qui vt amore perfrui queant, adeò cogitabundi fiunt, vt & necessaria corpori, qualia sunt, cibum capere, dormire, aliæque munia negligant: qui omisissis grauib; & serijs negotiis, vel segniter ea tractantes, munditiei, musicæ alijsque quibus amicæ placere possint, potius operam dant. Et cum se aliquid in amore obtinere posse sibi persuadent, in gaudium profusum erumpentes, stulta multa & obscœna sæpè loquuntur, atque peragunt, & pudore soluto turpia interdum perpetrant facinora, periculisque grauib; se exponere

Animi commotio.

Amor, Animi commotionis species.

non verentur. Vel si de mutuo amore & voluntate desperant, mœrentes lugentesq; continuo seipfos affligunt, & consolationes nullo modo admittunt: consilia utilia respuunt, doloremque lachrymarum profusione, suspiriis frequentibus, pallore (pallet enim omnis amans) & cordis dolore, quo se angi præsertim conqueruntur, exprimunt: Quorum & pulsus, prout animus illorum vel erigitur, vel deprimitur, instabilis, & ex amicæ intuitu, vel recordatione concitatus & commotus (quo signo. amorem deprehendit Erasistratus) vel desperatione, languidus & sedatus existit. Quibus accidentibus oppressi, tandem in morbos graues incidunt, mortemque sibi ipsis accersunt, vel sæpe desperabundi violentas inferant manus.

Melancholia. Melancholia ab atra bile denominata, mentis alienationis est species, in qua imaginatio & iudicium ita peruertuntur, ut sine aliqua causa, admodum tristentur & metuant: neq; enim mœroris aut timoris causam ullam certam adferre possunt, nisi eam quæ nullius est momenti, vel quam ex deprauata apprehensione, conceperunt falsam opinionem.

Vt, cum se damnatos, Deo minimè curæ, nec prædestinatos esse, etsi religiosi & pii interim sint, sibi persuadent, & extremum iudicium æternumque supplicium metuunt: quæ horrida & ad desperationem sæpe hominem adigens melancholia, frequentissima est eius species: in qua curanda, sæpissimè multum fui impeditus. Qua correpti, se ad blasphemiam erga Deum, ad multa horrenda perpetranda, ad manus violentas sibi inferendas, maritum, uxorem, liberos, vicinos, principem interficiendos, nulla zelotypia, nulla inuidia erga illos, quos potius inimicè ament, commotos, contra voluntatem veluti cogi, talesq; cogitationes inuitis etiam sibi obrepere; cum interea Deum, ut se ab impijs illis cogitationibus liberare dignetur, instantè rogare non cessent, sæpe mihi multis cum lachrymis, altè ductis suspirijs, summo cordis angore, totiusq; corporis tremore falsi sunt.

Alij verò terrore mortis illiusque metu

potissimum diuexantur, dum se in mala gratia esse principum & magistratus, aliisque commississe, & ad supplicium requiri; sibi falsò imaginantur: vel qui alioquin mortem quam sibi iam iam impendere fingunt, summè expauescunt.

Alij alijs nugis animo conceptis & impressis falsi, seipfos decipiunt: Ut ille qui se testam factam existimans, ne contactu collideretur, obuijs quibusvis cedebat. Vti aliqui se in bruta animalia conuersos esse crediderunt. Item alius, qui nasum longissimè se habere putans, hæc opinionem non prius deposuit, donec chirurgus, se partem illius amputasse, simulato ictu & ostensa carne illum fefellit. Et sicuti illa, quæ quod indies vestes induere; rursumq; exuere cogeretur, mirè angebatur. Aliaque mulier, quæ quoties maritum se mortua aliam uxorem ducturum cogitabat, in hæc ferebatur accidentia. Nonnulli qui se serpentes ranasve deuorasse, eaq; viua adhuc in corpore gestare, vel alijs præstigijs deludij eiusmodiq; multa & mira somniant: quæ aliquando narrantes magno affectu & dolore, non sine risu sæpe, alias summa cum admiratione & commiseratione, audiui. In quibus omnibus casibus, tristitiæ & pavoris notas, multis & continuis lachrymis, dum conqueruntur, clamant, corpus & animum miris modis exagitant, præbent.

Alias verò desides sunt & taciturni, interrogati nihil respondent, impulsu ægrè procedunt, solitudines amant, hominumq; consortium fugiunt, quæ species Misanthropia ab hominum odio, ob id dicitur: & si luce exosi, tenebras expetant, sylvas petant, & in latebras antraq; se abscondant, uti de Nebucadnezare sacra testantur literæ, Lycanthropiam à luporum consuetudine, alij Lupinam melancholiam appellant.

Quibus animi peruersis imaginationibus, doloribus & diris cruciatibus multis sæpe non tantum mensibus, sed & annis afflicti, & tandem euicti, nisi ad se redeant, & consilio & arte iuuentur, vel contabescetes moriuntur, vel mortem sibi, quem tamen prius meruebant, suspendio vel submersione, vel alia vi, sicuti multa tristitia eiusmodi-

inmodi exempla nouimus, confiscunt.

Quæ enarrata mœroris & timoris pathemata, ut in omnibus non æquales effectus producant, sed in aliis magis in aliis minus animum peruertunt: sic licet continuò illos quos semel inuaserunt detineant, habent tamen & suas per vices exacerbationes & remissiones, ut & in febribus continuè alioquin accidere, ob causam in venis simili modo cōtentam, ostendimus: aliquos tamen certis temporibus duntaxat ut aliqua anni tempestate, vel lunæ mutatione & præsertim mulieres dum vterum gestant, vel pepererunt vel per menses purgantur, sic diuexari obseruauimus.

Hypochondriaca, Melancholica species. Est & species illius alia quam Hypochondriacam melancholiam à loco affecto denominant: in qua accidentia enarrata sæpius, sæpeq; eodem die intermittunt, rursumque repetunt, & qui eā laborant, quoties ad se redeunt, secus atq; alij (qui nisi aliud aliquid accedat, de capitis tantum dolore, vel grauedine aliquando conqueruntur) se verè egrotare agnoscunt: & licet vix vel rarius decumbant, muniaq; alia nihilominus obire queant, perpetuò tamen de hypochondriorum in latere præsertim sinistro, dolore (quæ cordis dolorem vocant) æstuatione, pulsu, murmure, ructibus, vomitu, expuitione, capitis dolore, vertigine, aurium tinnitu, artierum pulsatione, aliisque innumeris affectibus, quos sentiunt, & sibi aliquando imaginantur, conqueruntur: & medicos obtundunt, curationes expetunt, variaque remedia tentant, & nisi mox leuentur, medicos pharmacq; mutant.

Mania. Mania, Insania; mentis omnium functionum tanta est deprauatio, ut pleraque falsò fingant, iudicent & memorent: non tantum ut melancholici mœrentes & metuètes, sed omnia præter rationem agentes: idq; interdum citra furem, modestius quæ dicunt faciuntque perpetrant: frequentius verò in rabiem conuersi, truci aspectu, & dictis factisq; animi impetum exprimunt, cum falsa, obscena & horrenda narrant, vociferantur, iurant; & brutali quodam appetitu, diuersa, & ex his quædam etiam hominibus aliàs inusitata, bestiarum instar, obeunt; &

præsertim quidam ex ijs venenum potissimum appetunt: sicuti nobili matronæ, honestissimæ alioquin, quæ & homines & canes ad congressum verbis gestibusq; turpissimis inuitabat, accidisse vidi. Adhuc cum sibi ipsis tum alijs vim inferre conatur: quare & capillos euellunt, vestes dilacerant, corpusq; proprium, morsu, alioq; modo interdum lædunt: & nisi sedulo vinculis & catenis cohibeantur, quæ tamen omni conatu disrumpere student, & custodiæ inclusi arceantur, quorum portas effringere, & fodendo carceres, exitum parare sibi certa sæpè industria tentant, & in astantes impetum faciendo, belluarum instar illos vnguibus petere, mordere, strangulare, cedere nituntur.

Obsessio à dæmone, ne Mania species. Verum & inter hos aliqui maniacorum vel melancholicorum, nunc vehementiora, nunc mitiora hæc accidentia edentes, præternaturalia simul quoque & monstrosa agentes, & dicentes, à dæmone se obsessos esse, manifestè declarant: quos ob id Obsessos & Dæmoniacos vocant. Qui præter mentis deprauatas actiones, ut dictum, diuersimodè, sicuti dæmon mirabiliter hominibus illudere, eosq; fascinare solet: muti sæpè quàm diutissimè manent. Item à cibo interdum longius quàm natura aliàs perferre posset, citra tamen aliquam læsionem abstinēt: Atq; corpus aliquando adeò torquent, inflectunt & curuant, ut, sicuti oculis meis vidi, citra articularum luxationem id naturaliter nullo pacto fieri potuisset. Vel hariolando, vaticinando, res abstrusas alioquin, diuinat & prædicant: vel linguis quas non didicerant, nec cum sani essent intelligebant, loquuntur, dæmone veluti per ipsorum os effante: quorum varias historias quas adferre possemus, studio omittimus.

Hydrophobia Mania species. Est & aliqua peculiaris Maniæ species, in qua ab animali rabido demorsu, in eandem rabiem qua animal vexabatur, conuertuntur: Ut si à cane hoc fiat, canum more latent: vel si à lupo accidat, vlulent, & obuiam factos morsu adoriantur: lucè & quæ clara & splendida sunt, cum in illis imago canis à quo læsi sunt, propriæ figuræ humanæ loco, uti volunt, appareat, fugientes. Impriusq; aquam metuentes, & ad ipsius intui-

tum trementes : vnde hæc species infaniæ, Hydrophobia priuatim nominata fuit; cum nervorum distentione, & totius corporis, imprimis faciei rubore, & sudore hominem diu exercens, & tandem nisi succurratur, interimens.

*Saltum
Viti.*

Huc quoque horrendus ille & admirandus sed rarus affectus referendus, in quo furore quodam infano salendi perciti, choreas ducere continuo appetunt: quæ proin affectum Viti saltum, à sancto cuius inuocatione se ab eo liberari credunt, vocat. Quem licet aliqui, vt eleemosynam maiorem extorqueant, vel ideo subornati, vt vulgi falsam opinionem hominum mentibus magis imprimant, simulant. Inueniuntur tamen aliqui vtriusque sexus homines, qui reuerà hoc malo detenti, appetitu adeo inordinato ad saltationem feruntur, vt nullo interposito spacio, sine quiete, dies noctesque, non solum per dies, sed & septimanas aliquot, cum alijs tripudiare gestiant, atque interim vix dum defatigantur, sed mire recreantur & reficiantur, & nisi id faciant, summo perè lædantur. Vnde & cum cibum coacti capiunt, aut somno oppressi tantisper à saltu cessare coguntur, à corporis tamen agitatione minimè abstinere, statimque rursus quoslibet arripientes, ad saltum sollicitant: idque tam diu, donec viribus tandem omnino prostratis, & attritis pedibus, ad se iterum redeunt, summam imbecillitatem sentiant: à qua ægrè rursus resciri & restaurari possunt. Quale exemplum ego in muliere, hic Basileæ, integro mensis spatio in publico loco sic tripudiante, cui magistratus certas personas, viros fortes, qui cum ea alternis vicibus, cum vnus minimè sufficeret, choreas ducerent, subornarat, cum iuuenis essem, vidi. Multique scriptores id aliquando accidisse testantur, vulgusque tandem cognitum hoc malum quoque imprecari solet. Atque Arabes aliqui Saltuosam membrorum dispositionem vocarunt, & conuulsionis speciem esse voluerunt: cum tamen hic nulla membrorum fiat conuulsio, sed mens alienata in hanc insaniam & perversum appetitum feratur, & impellatur: vt & in alijs melâcholiæ & ma-

niæ speciebus, aliarum rerum, quæ alio modo horrendæ quoque esse apparent, desiderio tenentur: vti modò eos qui à cane rabido demorssi sunt, pauore aquæ potius excruciaci diximus, sicuti pro ratione venenatæ causæ, vt in causis dicemus, diuersa hæc accidentia prodeunt. Si modò non à dæmone hic saltus inordinatus quoque proficiscatur, & pœnæ causa hominibus, quod saltando deliquerint, Deo concedente, accidat.

Phrenitis, Delirium est, in quo æquè ac *Delirium* in mœnia, mens omnino, plus tamen minusve, prout grauis est affectus ab alienatur: quod & eodem quoque modo verbis factisque patefaciunt: nunc placidiores cum risu, iocis & nugis lasciuientes: nunc irati, cum iurgiis, clamore, blasphemiiis furentes, & lædere quoque vti maniaci cupientes. Quibus & peculiare hoc accidit, quod cum muscas floccos, festucas oculis oberrare & spectra varia apparere, ex falsa imaginatione existiment, ea venari, carpere, colligere, propellere conentur.

Cæterum præter eiusmodi mentis, quæ illis cum maniacis communia sunt vitia, accedit comes & alius grauis morbus calidus, febris præsertim, cui si mox in prima inuasionem delirium copuletur, hic affectus Phrenitis appellatur. Quod si verò illud postquam febris iam aliquandiu perseuerauerit, & capitis quoque dolor præcesserit, circa statum præsertim, si continua sit: vel in paroxysmi principio, aut vigore, si intermit-
*Phreni-
tis Deli-
rij spe-
cies.*
*Para-
phreni-
tis, Deli-
rij altera
spe-
cies.* tens existat, primum superueniet, tunc Paraphrenitidis nomine designatur.

Proin vnà cum delirio, quod tunc graue admodum, nunc mitius, vt dictum, existit, febris etiam continuæ concurrunt symptomata: vehementiora vel leuiora quoque, prout calor febrilis maior, placidiôrve se offert: vt sunt cordis caloris causa, pulsus celer, respiratio cita, & aliquando cum suspiriis, longis interuallis ducta, animi defectus: Et partium naturalium accensorum causa, sitis, linguæ ariditas: Imprimis verò cerebri supercalefacti causa, præter delirium, insomnia, vigiliæ, suffusiones, vertigines; quæ, si cerebrum, vt in causis dice-

tur,

tur, vehementius inflammatum sit, grauiora pluraq; sese offerunt.

Causa.

Causa omnis mentis alienationis; Alia est præternaturalis, à spiritu maligno profecta: Alia naturalis, affectus quibus cerebrum rationis sedem, per se, si in eo causa lateat, siue per consensum, si alibi consistat, ita afficiens, vt mentis functiones potius deprauentur quàm imminuantur. Est autem nonnunquam occulta proprietate agens qualitas, quæ id efficit, quam cum explicare nõ possumus, ab effectu vnam temulentam vim, alteram venenatam appellabimus. Aliàs verò morbus aliquis fuerit, intemperies nimirum quædam cerebri: qualis est abstrusa & incognita illa, cuius summa efficacia ex eo, quod vehementer mentem exagitet, satis cognoscitur, sed cum ea diuturnum malum efficiat, & tamen interim ægri minimè decumbant, cum tamen aliæ intemperies cerebri manifestè, si diutius perseuerent, cerebrum lædendo periculosa sint, explicatu certè perdifficilis existit: quã nos cum spirituum illius causã, qui cerebro vndique infusi & illius substantiæ connati colligatiq; sint, id accidere certò comperiamus, spirituum cerebri nimiam agitationem & confusionem: alteramq; speciem perturbationem illorum, seu cum aliena materia permissione appellare malumus, quàm intemperiem talem, quæ id efficere nequit, vt de frigida scribunt, confingere. Sed & intemperies manifestã cerebri, morbum periculosum inducens, id quoq; potest causare. Qualis est calida vehementer, maxime si cum timore iungatur: Nec non conformationis vitium: Item macula aliqua aut putredò in cerebro inuenta: quæ omnia quomodo mentem abalienent, ordine explicabimus.

Spiritus malignus causa Obsessum. Spiritus malignus, dæmon, cum sit humani generis hostis, mentem præstantissimam ac veluti diuinam hominis functionem, non tantum continuò infestat, adeoq; perturbat, vt contra legem diuinã multa sinistrè agentes, in peccatum deducat: sed & suis artibus exagitans, fascinãs, Melancholiam grauem sepe, vel Maniam diabolicam inducit. Vel o-

mninò corpus subiens, Obsessos & Dæmoniacos dictos reddit: quod qua ratione fiat (et si Matthiolus, vt eiusmodi insanias omnes atræ bili acceptas referret, cacodæmones per humores illius, in quo eos sedem habere dicit, medium hoc agere, asserat) disputare aut inquirere nostri nõ est instituti. Hoc saltem certũ est, tales olim quoq; fuisse, vt historiæ variæ, sacre & prophane testantur, sicuti & nostro seculo quoq; illos inueniri negare minimè possumus.

Vis temulenta, quia caput tentat sic dicta, à proprietate quorundã exsurgens, mentis alienationem, quam Ebrietatem siue Temulentiam vocant, procreat: Hæc ab illis procedit, quæ pro naturarum diuersitate, & prout vsurpatur soporem & narcosim, id est, stuporem inducere possunt, narcotica ob id quoque dicta.

E quibus aliqua assumpta id faciunt: Vt vinum præ cæteris frequentius, quia potus est ordinarius, quod temulentia huius speciem Ebrietatem dictam facit, si immoderatiùs vel potentiùs, nondum tamen eousque, vt perfectum stuporem faciat, bibatur. Idque ob eam causam, quod proprietate sua sensus leuiter obfuscat. (vnde principium stuporis est) inter quos memoria plerumque primum deficere solet, obliuionem quandam dolorum & laborũ pariendo, læticiam stultam & effusionem adferat, eam quæ cum ratione adhuc à vino moderate sumpto, euenit: adiuvante insuper calore illius, quo calefaciens simul, & spiritus accendens, actiones nimium exagitat: quod & à vino destillato potentiùs, quia coacta ipsius vis, & calor maior est, accidit: quo nomine rustici illud manè, vt postea ad munia obeunda alacriores sint, bibere solent. Hoc & aliarum plantarum quarundam succi possunt efficere, si plantæ illæ edantur, aut succus ipforum expressus vel decoctione elicitus, detur: Vti sunt lupulus, à quo cereuisia vim inebriandi quoque sumit, & muscæ si hauriant, stupore correptæ moriuntur: Cannabis item, cuius pulvis si cum vino detur, citius inebriat. Lolij semen & nigellæ: forrè pseudomelanthij in pane: quæ vitia frugum si luxurient, panis ex hisce confectus, soporosos reddit, & con-

Via Temulenta, causa Ebrietatis.

tinuo usu multos passim, quod tamen non observant, lædit. Talis & planta illa, ex qua potum Caouin dictū, inebriantem Indi parant, est. Sed & alia narcotica id possunt efficere, præsertim si calidissimis permixta vsurpentur, vtraque vi tunc, vti modò de vino dictum est, agente: Vt si semen hyosquiami in cereuisia decoquatur, quod aliqui facere solent, citius & vehementer inebriat: Si cortex mandragoræ in vino donec rubeat, decoquatur: Si opium cum vino fortissimo bibatur: vti Turcas cum in aciem prodeunt, vt audaciores & furibundi, pericula minus metuant, opij ad 3.ß. cum vino innoxie bibere narrat Bellonius: Sicuti & cicutam cum vino sumptam, efficacius operari, citiusq; interimere scribit Diosc. Quæ tamen omnia, vti prius de vino diximus, pro temperamenti varietate, plus minusve demerant. Vti & cerebri imbecillitatem, vt citius afficiantur, causam esse posse, in illo cui propter casum pars caluarie exempta fuit, & id eo citò inebriabatur, obseruauimus.

Admota quædam capiti idem præstare posse, testatur Rondel. exemplum adferens illius, qui cum vt somnum conciliaret, hyosquiami folia capiti applicuisset, ad insaniam redactus est.

Inspiratione, attracto etiam fumo hyoscyami Peruuiani, quæ perum, vel tabacum vocant, per os naresq; haurientes, sed vt Angli dicunt, bibetes, qui ad pituitam excreandam, & hilaritatem simul inducendam, illius usum consuetum & in delitijs habet, ebrijs similes fieri, omnemq; appetitum & edendi & bibendi amittere, famemque sic diu tolerare posse, qui de eo scripserunt; & idem experti sunt, testantur: Quod etiam, si radix solani maioris, quod lethale vocant, in vino infundatur, illisque dilutum detur, accidere, & famē & sitim cessare, ostendit Matthiolus: donec aceto sumpto vitium illud corrigatur; sed & vtrumq; somnum superueniens, vt in alijs, sanat.

Venenata qualitas extrinsecus corpus subiens, vel ab assumptis profecta (nam de ea quæ intrinsecus in humoribus suscitatur, in humore melancholico dicitur) à quibusdam venenis, quæ potius mentem alienan-

do, quàm alia ratione lædunt, vt venorum varij sunt effectus & noxæ, mentem quoq; perturbare potest: Cuiusmodi multa Diosc. quæ venenata potius quàm narcotica vi id præstare possunt, proponit: & nos studio cum nobis sint cara, omittimus. Inter quæ & Plinius sanguinem menstruum deuoratum, & homines & canes ad rabiem adigere posse, censuit.

Sicuti & à morsu animalium in rabiem conuersorū, per saluam veneno corpus humanum subeunte, similem rabiem illis accidere, in canibus præsertim sæpenuerò experimur: qui facilius quàm cætera animalia rabiosi, circa canicularium dierum, ob hanc causam sic appellatorum, astum nempe, vel etiā circa summa frigora, vt vult Diosc. fiunt: Et ex eo quòd cibū auersantur, spumam emittunt, caudam demittunt, & in eos quoq; quos tamen prius amabant, inuehuntur, illosq; mordet, cognoscuntur. Quorū morsus licet ab initio præter vulnus & dolorem, nulla grauiora adferat incōmoda; si tamen negligatur, interdum quadragesimo primū die, aliquando citius, nonnunquam post semestrem, vel annū etiam, Hydrophobiam dictam & rabiem, hominis mentem, vt superius dictum est, mirè immutantem, & in caninos mores conuertentem inducit. In qua tantā vim veneni esse, vt & catulos vel carnes aliquas illis similes aliquos minxisse, nonnulli, inter quos & Auicenna est, pro verò testari ausi fuerint: sed & malū ad septennium vsq; occultatum, tunc primū erupisse testimonio cuiusdam probat Diosc. Occasionemq; vt citius prodeat hæc mania, contactum lignorū quorundam, præsertim corni arboris, & vitæ sanguineæ præbere, scribit Matthiolus. Sed & ex sola conuersatione cum infecto, quendam similem contraxisse affectum, Diosc. prodidit: & Galenus rabidorum saluam, si nuda corporis membra contingat, non aliter quàm si demorsi fuissent, homines rabidos reddere posse, docet.

Quæ vti à canibus, cum magna copia & familiaris cæteris animantibus cum homine viuant, rabidis frequentius eueniunt: Sic & à lupis in rabiem actis, accidere testantur, egoque bis rabiem horrendam & lethalem inde

Morsu
canum
bidi, ex
Venena-
tis causa
Mania.

Venenata
qualitas
ex causa
Mania.

inde profectam, obseruauit. Nec dubium, quemadmodum idem ex aliorum animalium rabidorum morfu, vt de camelo & equo scripsit Aristoteles, & de mulo Auicenna; ita quoque à vulpis, mustelæ, martis, uerræ, quorum alioquin morsus aliquid venenati in se habent; imò simiæ etiam & ipsius hominis iam rabie hac laborâtis, moribus, quorum salua veneni naturam induit, posse contingere.

Quemadmodum ab ictu bestiarum quarundam venenatarum, insaniam quoq; , vt ab alijs venenis alia accidentia excitari est verisimile. Quibus cum nostris in regionibus destituamur, nec ob id periculum ab illis imineat, non necesse est hic plura dicere.

Agitatio spirituum, causa Animi commotionis. Agitatio nimia spirituum cerebri, vel confusio, non tantum affectionem leuem aut breuem, quæ & statim cesset, sed impressum & permanentem aliquandiu affectum inducens, Commotionis animi causa existit; in illis maxime qui dispositi sunt, vel ob pusillanimitatem, aut rationis imbecillitatem, affectibus non possunt resistere. Id autem facit commotio quæ subito cum in iram quodam fit: vt per gaudium, aut terrorem: vel quæ vehemens & diuturna in mœrore solet accidere: vel quæ diuturna & deprauata in stultitia simulata euenit.

Gaudium magnū ob consequutam rem aliquam, præsertim si inopinatò accidat, idq; ferè imbecillioribus, vt senibus & fœminis, stultam illam cum fatuo gaudio Animi perturbationis speciem, vt dictum, gignit: spiritibus cum sanguine aded profusis, vt non tantum rubore suffundatur facies, sed & ex oculis exstillent lachrymæ, omniaq; membra excelsa inquieta sint.

Ira, excandescētia, ob offensam, Furibundam illam animi commotionis speciem excitat: spiritibus & sanguine vehementer accensis, & vindictæ studio profusis, mox tamen ob animi dolorem, rursus recurrentibus, vnde aded rubet ab initio, mox pallent & flauescunt. Quod & calidioribus & bilosis naturis facilius accidit, atque ijs qui ex vino prius incaluerunt & dementati sunt: hinc pluribus tunc causis concurrentibus, veluti insanunt.

Terror vel metus grauis, maxime ex improviso accidens, non tantum animum percellit, sed & si aded animo imprimatur, totumq; corpus & spiritus commoueat, immutet & confundat, in dispositis maxime, vt ex eo vel nunquam, vel difficulter possit eximi, Melancholiam veram, eamq; grauissimam, deterioremq; ferè quàm illa quæ ab interna causa, vt mox dicetur, euenit, sæpenumero inducit: impressione aded facta in spiritibus & humoribus, & cerebro ipso, vt ægrè nisi tota massa sanguinis exhauriatur, sicuti explicabitur, possit eximi. Estq; illa melancholiæ species, in qua, veluti ostensum fuit, horrendis atque impijs tentationibus diuexantur: quæ specie alia frequentius mihi non fuit oblata, tam mulieres quàm viros exercens, nec ipsis etiam iunioribus parcens.

Hæc autem vel à visione aliqua horrenda vel per insomnia, vel reuera apparente, vt spectri alicuius, vel cadaveris hominis suspensi proficiscuntur: vt in illa puella, quæ pendens in cruce extra urbem intuita, in melancholiam talem incidit, quæ in convulsiones desinens, mortem illi intulit: & muliere, quæ patibulum ferò prætergrediens, metuensq; ne vrbe exclusa illic pernoctare cogeretur, in diuturnam melancholiam incidit: alia item quæ cadavera furis, qui in carcere laqueo sibi gulam frægerat, dum dolio intrudebatur, vt in profluentem projiceretur, casu conspecto, animo percussa, miserè multis annis melancholica permanens, vix ad se redire amplius potuit. Quæ & sæpè ex imaginatione tantum & metu periculi alicuius, vt latronum, dum soli in sylua, vel noctu in tenebris, in quibus omnia metum magis incutiunt versantur, proficiscuntur: Vel ex timore æterni supplicij, ob graue peccatum commissum; quale concubina illa sacerdotis, quod tot liberos illegitimo thoro procreasset, in graui sua melancholia prætebat, prodeunt. Quam imaginationem & conceptam ex ea persuasionem, etiam affectum hunc iam patientes retinent, atque eiusmodi res quæ illis occasionem præbuerunt, vt in melancholiæ accidentibus dictum fuit, verbis req; ipsa exprimunt.

Tristitia vel mœror vehemens diutius persequens

feueranis Animi perturbationem melancholicam quoque gignit, quæ etiam in veram si altius radices agat, spiritusque perturbet, & corporis temperamentum immutet, degenerare potest: vel Phantasiam quandam nunc stultam, nunc insanam, & desperationem nonnunquam, ut in generibus explicandis descripsimus, inducit.

Proficiscitur autem hæc animi moestitia ex dolore seu luctu, ob rem aliquam amissam frequentius, ut iacturam pecuniæ, honorum, vel alterius rei, uti mortem liberorum, parentum, amicorum: quibus animus mirè longo sæpè tempore torquetur & affligitur. Vel ex pudore & verecundia: quibus generosi præsertim animi, ob commissum errorem adeò perturbantur, ut ad desperationem aliquos adactos inde esse, sicuti Homero, quod piscatoribus ænigma soluere nequiverit, accidisse scribunt, constat. Invidia quoque adeò hominem affligit, & cor, ut consuetum est dicere, rodit, ut & hi melancholici penitus fiant, formæque & gestibus invidiam, sicuti eam Ovidius depingit, omnibus modis exprimant. Imprimis verò ex appetitu seu concupiscentia nimia rei alicuius honestæ, vel inhonestæ, quam utilem vel honestam fore sibi persuadent, diuersi quoque animi affectus prodeunt. Ut cum studio scientiæ vel artis alicuius immodico, homines sæpe nimium intenti, phantasiam quandam, unde prouerbum *Gegelehrter, ye verkehrter* sibi conciliant. Et quos ambitio inanisque vexat gloria; ac qui amore sui ipsius (philautia) capti, stulta multa & ludicra iactabundi dicunt, & faciunt: quæ eleganter in milite glorioso, sub persona Thraſonis & Pyrgopoliniciis, in Comædijs suis ostenderunt Comici: Vel cum vindictæ studio, non cessante post iram, in odium permanens, & inimicitiam, quæ deleri vix amplius potest, deducti, ultionem continuò appetentes, huicque intenti, nihil rectè sed pleraque sinistrè, mente commoti, peragunt: vel avaritia, diuitiarum amore, impulsæ, adeò dementantur, ut in multa vitia, peccata, & facta enormia præcipientes ruant: quod & delirium illud alchymistarum referri debet, qui lapidem illum philosophorum tanto ardore quærentes, etsi laborum & impen-

sarum iacturam se facere videant, nihilque efficere, vel alios effecisse cognoscant, tamen indefesso labore non remittunt, & spe continuà seducti, à labore minimè remittentes omnem substantiam dilapidant. Dein & potissimum ex amore in utroque sexu ardor ille vehemens & concupiscentia prædiens, cum frui minimè vel non semper licet, mœroris illius, (nam mœret omnis amas) causa existit: quo tandem eucti, tot animi pathematibus diuersis anguntur, cruciantur, & desperabundi, res ludicras vel graues & periculosas, uti in accidentibus dictum fuit cogitant, tentant & peragunt: cui amor nunc forma elegans, nunc mores amabiles, prout suum cuique pulchrum videtur, cæco plerumque iudicio, nunc sympathia quædam & morum conformitas, principium, occasionem & fomentum præbent.

Stultitia simulata & diu continuata, spiritus indefinenter deprauatè exagitans, facit, ut per consuetudinem hanc, naturam immutantem, moriones aliqui, qui gula, ventris & lucri causa, apud magnates, quibus stultorum conuersatio iucunda est, stultitiam quæstus causa exercent, à tenore huic cum se accomodauerint & assueuerint, in eam vitam eum acquirant, qui cum postea deleri amplius minimè possit, verè stulti permanent.

Perturbatio spirituum cerebri, non illa quæ ab affectibus animi suscitata, illos nimium exagitat, & confundit, aut qualitate occulta afficit, de quibus iam dictum est, sed quæ intrinsecus à materia aliqua spiritibus permixta excitata, spiritus animales, quos claros, serenos, lucidos & purissimos esse oportet, obscurat, obscurat, obtenebrat, Melancholiam dictam, & Maniam quoque, si vehentius hæc agat, inducere potest.

Quam materiam, melancholicam, quia atram eam esse censent appellant: eamque non tantum spiritus perturbando, sed & cum frigidum & siccum hunc humorem statuunt, cerebrum quoque refrigerando, mentem alterare, contendunt. Verum nos, cum à frigiditate cerebri, siue cum humiditate siue cum siccitate iungatur, functiones ipsius imminui vel aboleri potius, quam intendi, in sopo-

Perturbatio spirituum, causa Melancholia et Mania.

pore & stupore demonstrauerimus; materiam hanc melancholicam, quam turbulentam, impuram & tetram quoque esse dicimus, non refrigerando, sed quod spiritibus permista eos perturbet, & cerebro, cuius substantiæ spiritus vndique connatos esse, in Anatome probauimus, malignitate quadam, quam simul quoque adepta est, noxam tandem illam, ex qua tam enormia sequuntur accidentia, quæ tamen propterea mortem mox inferre nõ possit, cum diuturnum sit malum, imprimat: Quæ materia, vel vapor vel humor est melancholicus.

Vapor, causa Perturbationis spiritus in Melancholia hypochondriaca.
Vapor melancholicus, teter, conturbans spiritus, caputque afficiens, melancholiæ speciem parit, quam Hypochondriacam, cum de eo loco affecto maximè conquerantur, appellant. In partibus enim abdominis, quod mirach Arabes vocant, hancque speciem melancholiæ Mirachalem ab eo denominant, sub costis seu hypochondrijs causa huius mali latet: ab eaque sede vapor sursum certo tempore ad caput delatus, melancholiam hanc, tunc quando illud petit, se exerentem efficit.

Huius fomitem plerique in liene; quod melancholiæ naturalis sedes existat, & quia in sinistro latere magis molestatur, esse scribunt: alij verò in ventriculo quoque, sinistrum etiam hypochondrium magis occupante, partibusque vicinis, materiam hanc contineri asserunt: alij etiam in iecinore & mesenterio, illiusque venis meseraicis dictis eam collocant. Quam & nos in meseraicis venis, non tantum mesenterium & omentum, sed & alia viscera naturalia perreptantibus, congeri & latere asserimus: illis præsertim in locis, vbi plures maioresque hi venæ portæ rami versus lienem & ventriculum, in sinistro latere tendunt: licet & in alijs quoque possit hæc materia coaceruari sedibus: quo nomine frequentius in sinistra, nonnunquã tamen & in dextra hypochondriorum & dorsi sede, vbilien, præcipuaque viscera abstrusa latent, molestias sentiunt.

Cæterum materiam illic latentem, à qua euaporatio hæc exsurgens mentem afficit, sanguinem melancholicum esse plerique perhibent: quod & nos negare minimè possumus,

sed frigidum esse negamus, cum æstuatio quam in eo loco vbi humor latet, sentit æger, acrimoniam & caliditatem humoris illius satis declaret. Quemadmodum enim in febribus dictum est, sanguinem in venæ cauæ ramis febres continuas, illum verò qui in venæ portæ propaginibus biliosior & excrementitior continuo ex cibo & potu coaceruatur; cum putrescit, euaporatione sua febres causare intermittentes; sic & in hoc casu accidit, quod vti ex sanguine melancholico, in venæ cauæ ramis contento, veram melancholiam fieri mox ostendemus: ita & ex illo qui in venæ portæ ramis accumulatus, venasque illic certis in locis implet, nondum tamen putrescit, sed adustus, sæculentus & malignitatem quoque aliquam adeptus est, si vapores eius eleuati, conditionem humoris à quo prodeunt seruantes, cerebrum perant, melancholiam per vices repetentem causabunt: quæ eousque durat, donec rursum discussi, leuamen aliquod ægro, tandem donec noui exsurgant, quod plerumque indies fit, concedant.

Hincque fit, quod hæc melancholia secus ac vera suas habeat intermissiones; tunc maximè quando excretio aliqua, flatuum præsertim, quibus hæc euaporatio ventriculum & intestina quoque implet, per ructum fit: qui ardorem ratione humoris à quo prodit, & aciditatem causæ ventriculi, in quo aciditatem quandam semper contineri suo loco declarabimus, præ se fert; vel quando per vomitum, aliàs quoque per crepitum & deiectiones, vapores hi qui sursum tendunt, partim euacuantur, partim reuellantur. Aut quando cibo frigidior, moderatè tamen sumpto, ardores illi mitigati & vapores repressi, malum nonnihil alleuiant: sicuti verò calidior & copiosior sumpto, affectus ille ob æstuationem partium illarum & flatuum copiam, exacerbatur. Nam quod his ventriculis compressionem sentit & dolet, inflatur, atque vnà cum intestinis, murmur, rugitum fluctuationemque edit; flatus iam dicti, in hoc affectu adeò frequentes, ut flatus quoque melancholia hæc dicatur, atque excrementa varia à venis meseraicis eò propulsa, in causa existunt: quorum & causa ardores illi in lo-

etis, tum ubi materia hæc præcipue latet, ut dictum, sentiunt. Sed & vaporibus hisce tectis sursum ascendentibus, quia cor quoque obiter, sæpe etiam grauatim afficitur, de pal- pitatione cordis & pulso arteriarum, & septo nonnihil impedito, de suffocatione aliqua conqueruntur. Ita ut vix malum aliud tam diu hominem, alioquin non decumbentem ex morbo, tot accidentibus, in partium naturalium, vitalium, animalium læsionibus, de quibus infinitis continuè conqueruntur, diuexet, quam hic affectus.

Causa autem & origo melancholici huius sanguinis, in venis meferaicis collecti, à mala victus ratione, succum illum melancholicum seu biliosum crassum gignente, diu continuata, unde magna sensim illius illuvies tandem coaceruatur, procedit: sicuti in febribus intermittentibus, simili ratione sanguinem illum biliosum nasci diximus. Quod ab omnibus cibis pravi fucci, difficilis concoctionis, corruptis & calidioribus potius quam frigidioribus & siccis (nisi quatenus hæc ægrè digesta quoque corrumpuntur) quibus maxime gulæ & voluptatis causa, cum dulcia, falsa, pingua, acria sunt, peccatur, evenire potest. Licet plerique carnem, quæ à feris & solitariis seu melancholicis desumitur animalibus, ut leporem, ferinam, melancholico succo gignendo aptiorem esse credant, ut & ex plantarum genere brassicam & lètes. Magnam quoque occasionem & præcipuam huic malo præbet, si excretiones per quas natura, hæc in ventriculo aut intestinis primum collecta, euacuare solita, ut deiectiones alui vel vomitus, quibusdam certis temporibus consuetæ, non amplius fiant: aut si iam in venis meferaicis illuvies hæc collecta fit, hæmorrhoides supprimantur, præsertim si aliquando fluxerint, quæ præcipua interdum est huius mali origo.

Humor Melancholiam veram procreans, sæpe & Maniâ, sanguis est melacholicus dictus, qualis si sæculentus, crassus, vel ipsa bilis atra sit, esse putat. Nos verò hæc materiâ malignitate aliqua minimè carere, superius iam diximus, eamque venenatam, cum aliter rectè explicari non possit, sicuti Galenus ex corrupto semine & sanguine venenatam mate-

riam generari, lib. 6. loc. affect. ostendit, iudicare quoque possumus: quod enormia illius accidentia satis declarant, quæ se, ac si veneno perciti essent, in illis proferunt, furor præsertim; cum tamen nulla alia sit læsio, nullus morbus manifestus, nec mortis periculum, & cum per multos annos sæpe sine alio detrimento hæc patiantur. Quæ certè à frigido humore, qualem esse sæcem sanguinis putant, neque atra bile, quæ si sanguini confundatur, iterum nigrum aliâque cutis grauiora vitia adferre solet, fieri minime possent. Idcirco nos ad malignam venenatam & occultam vim, qualem in multis morbis eiusmodi pertinacibus & horrendis, quos ab atrabiliariis humoribus, ut dictum, nasci crediderunt, & in quibus ob malignitatem cacodæmones etiam sedem habere asseruit Matthiolus, inueniri sæpe declarabimus, malumus recurrere; quâ ut ea, quæ ita ex consuetudine quadam, & in sanguine emisso atro videri creduntur, cum tamen ex natura sua sanguis cōgelatus etiam in sanis nigricare, diuque retentus, picis instar ater apparere soleat, pro veris doceamus, & comprobemus: veritatemque potius quam opiniones amplectemur: vel apertè nos veram causam rectè explicare minime posse, fatebimur.

Verum in venæ cauæ ramis sanguis iam enarratus, ut ille qui hypochondriacam melancholiam excitabat, in venæ portis ramis, continetur: & proin Melancholiam vel Maniam perseverantem, nisi quatenus exacerbationes suas habere & remissiones, sicuti in febribus continuis quoque eandem ob causam id fieri diximus, non per vices ut verò facit hypochondriaca, inuadentem, excitat: sicuti & harum venarum discriminis causa, in quibus materia febrium continetur, eadem ratione continuas vel intermittentes fieri, explicatum fuit.

Cæterum aliàs in capitis tantum, aliàs verò in vniuersi corporis venis, maioribus præsertim, eam materiam contineri certum est: eoque nomine quoque grauiora mitiorave causare accidentia. Sicuti enim in febribus continuis declaratum est, si materia circa cor putrefcat, ardentissimam febrem, causam dictam, fieri,



Humor
melan-
cholicus,
causa
Pertur-
bationis
spirituum
in Me-
lancholia
& Ma-
nia.

fieri, sic & hic euenit, vt nimirū si talis materia in sinibus cerebri, vbi alioquin sanguis venarum & arteriarum inuicem confusus calidior est, contineatur, mania, vel grauis melancholia excitetur. Vel si circa nobiliorē partem vt vterum sanguis qui illic abundare solet, & semen quoque retentum corruptum in venenatā illam materiam, vt supra Galeni testimonio adductum fuit, conuertatur. Furorem illum vterinum, in quo concubitus enormem & brutalem tantopere efflagrant, vt exemplo mulieris, quæ ex diuturno mariti morbo propter feminis retentionem, in hunc affectum inciderat, & canum congressum appetebat, demonstratum fuit, excitat. Et quo remotiorem à parte principe in inferioribus habet situm, eō mitior quoque melancholia exsurgit.

Quæ omnia quo pacto se habeant, ex accidentium natura, & ex eo, quod causæ aliæ externæ, vt de terrore dictum fuit, à quibus melancholiam grauem quoque & frequentius fieri, nullæ prægressæ fuerint, potius quam constitutione; quam melancholicam ex pilis, corporis cutis colore & habitu, item excretis depingunt, sunt diiudicanda; cum hi morbi non tantum fuscis, macilentis, & natura tristioribus, sed omnibus naturis, omni ætati, vti toties obseruaui, possint accidere.

Cæterum causam illius, à constitutione melancholica, quam à natura, vel mala viuendi ratione, sicuti in hypochondriaca ostensum fuit, sibi compararunt, dependere posse minimè negamus, cū & sanguis melancholicus, turbidus & impurus, malignitatem facilius acquirat. Quemadmodum & hypochondriacam melancholiam, sanguine in venis diutina illius euaporatione tandem infecto, in veram transire interdū quoqueprehendimus. Sed & illa quæ ab animi affectibus procedit melancholia, si in constitutionem aptam, melancholicam dictam, cadat, geminam causam concurrentem, veram melancholiam excitantem habebit. Dein ex suppressione excrementorum talium, quæ facili in venenatam hanc materiam abeunt, vti ob retentionem præsertim sanguinis menstrui vel feminis, sicuti inter-

dum vteri suffocatio, ita alias furor vterinus, quemadmodum explicatum fuit, prodeunt.

Calida intemperies, cerebrum, illiusque meninges afficiens, capitis dolore ferè primum, & si intensior sit, delirium, metis functiones nimium exagitando, facit. Incalescit autem à vapore calido nonnunquam: qui eleuatur à cibo & potu calido; sed nisi tunc accedat vis narcotica vel demetans, vt de vino dictum est, solus calor vix delirium sed capitis tantum adferet dolorem. Ab humoribus verò calidis, sanguine nimirum euaporante hoc citius fit, præsertim si malignitatem simul aliquam contrahat, quæ cerebrum mox dementare solet, vt in melancholiæ causis ostensum fuit: quod in sanguine alterato vel putrescente, siue in venis, siue extra has, faciliè accidit, vt corruptione malignitatem aliquam acquirat: ab eo igitur vapor similis sursum ad cerebrum delatus, Paraphrenitidē dictam, in multis morbis ab eiusmodi humoribus genitis, quorū symptoma est, parit.

Sic à sanguine, calidam eleuatam expirationem, in morbis ex accenso sanguine genitis, vt febribus diariis, synochis & internis inflammationibus, delirium interdum subsequi solet. Quod inde prouenisse ex morbo comite cognoscitur. A putrescentibus quoque humoribus caliditatemque sic præternaturalem adipiscens, in febribus omnibus putridis, quo tempore potissimum exspiratio calida caput admodū ferit, sicuti in intermittentibus sæpe in principio, alias circa statum, vt & tunc maximè in continuis, delirium nonnunquam inuadit. Adiuuante cerebri calore, quod ratione febris vnà cum omnibus corporis partibus simul quoque incalescit. Eadem ratione & propter vermes, cum putrescunt, accedente plerunque febre, pueri sæpenumerò delirant. Bilis in ventriculum effusa, calidam etiam euaporationem cerebro demandans, quia acris & subtilis est, dolorem potius & vertiginem, vti suo loco dicetur, quam delirium efficit.

Sanguis itidem calidior, præsertim & tenuior factus, in sinibus & vasis cerebri contentus, non vapore solū, sed propria etiam

Intemperies calida causa Delirii. Vapor calidus causa Intemperies calidæ delirii in Paraphrenitide.

Humor calidus, causa Intemperies.

rici calida delirij in Paraphrenitide.
Inflammatio, causa in temperiei calida delirij in Phrenitide.
 substantia cerebrum accedens, Paraphrenitidem inducit. Vti interdum fit, cum ab ictu vel casu, vel in febribus eo affluit.

Quod si verò extra vasa delatus in cerebrum, illiusq; meninges effusus, inflammationem vel erysipelas, pro vt sanguis existit, pariat, veram tunc Phrenitidem excitat, quæ & Syriasis, maximè si pueris accadat, dicitur. Cuius causa externa & violenta, caput concutiens, vel lædens esse potest: vel interna, sanguinis plethora, illiusque inflammatio: unde febris synochos exorta: effundens portionem sui sanguinis calidioris in hanc partem principem, sanguine iam prius admodum redundantem, morbum hunc grauem, cui febris continua comes est, sicuti in febribus declaratum fuit, facit. A paraphrenitide proin, quod febris in illa delirium præcedat: in phrenitide verò simul ambo inuadant, differens. Quo etiam signo potissimum agnoscitur.

Conformatio praua, causa Stultitie.
 Conformatio praua cerebri, vt si nimis magnum aut paruum, vel alias, non rectè formarum existat, Stultitiam dictam, ab ortu quibusdam innatam, cum ab insitis causis, à semine parentum, qui vel ipsi stulti fuerunt, vel semen ipsorum vitium aliquod contraxit, hoc proueniat, plerumq; præcreat. Facileq; ex eo, quod stulti ab ortu fuerint cognoscuntur; & quod caput cerebro informi, magnitudine vel exilitate aut deformatione, respondeat. Quod vitium si ad nervos quoque aliasq; partes pertingat, non mirum hos interdum, sicuti descripsimus, vel surdos, vel mutos, vel incuruos, aut strumosos, aliòve modo vitiatos nasci. Quà certè potissimam stultitiæ originalis causam esse, vti hæc ipsorum deformatio interdum apparens, interdum non nisi sectione post mortem deprehensa, ostendit. Ita & hoc à mala cerebri in temperatura accidere posse, non negamus: quæ tamen cum rectè explicari non possit, nec emendari, vel etià investiganda non erit.

Intemperies, causa Stultitie.
Macula in cerebro, causa Manie.
Putredo in cerebro, causa Madie.
 Maculam quandà nigram in cerebro vel meningibus deprehensam sectione, Maniæ causam fuisse aliquando inuentum fuit: sicuti & nonnunquam putredinem in cerebri meningum aliqua sedè naram. A quibus vapores fetros continuo suscitatos spiritus con-

turbasse verisimile est. Quod & à vermibus in cerebro genitis accidere posse, aliqui prodiderunt. Quæ vitia occulta, cum post mortem apertâ caluariâ primum manifestentur, vix viuente homine qualia sint, nisi in genere, ex eo quod alia signa quæ alias demonstrabant causas, hinc desint, conijcere licet.

CURATIO.

IN curatione, causæ erunt distinguendæ, illisque remedia accommodanda: quas diximus esse, vel spirituum malignum: vel qualitatem temulentam aut venenatam: spirituum agitationem, vel perturbationem: calidam intemperiem: & vitia quædam cerebri.

Præternaturalis causa à dæmone profecta, vti ad Medicum minimè pertinet, sic nec curatio. Nam dæmon coactus expellitur Theologorum & piorum precibus in nomine Iesv: sicuti & Christus dæmones eiecit, & discipulis suis hanc potestatem dedit. Sed & sponte nonnunquam dæmon certis hominum vocibus ceremonijsq; se fugari simulans, mortalibus illudit.

A vino alijsque, vti dictum, inebriantibus si temulentia nascatur, sponte, post horas aliquot discussis vaporibus, maximè verò interuentu somni ad se redeunt: & si vomitus sequatur, bonum: quo nomine semel in mense inebriari bonum esse censuit Auiicenna.

Si verò hanc viuendi ratione continuant, nervoso genere ob frequentem illorum stuporem debilitato, quod iam tum fieri ex eo, si statim postquam etiam non immoderatiùs adhuc biberint, balbutire & titubare incipiant; deprehenditur, tremuli, paralytici, podagrici, hydropici, sicuti in illis locis dicetur, fiunt.

Itaq; vt ab ebrietate sibi caueant, præmonendi, periculq; enarrando deterrendi. Et si sibi temperare nequeant, vt vinum penitus fastidiant, suffocata in vino anguilla, vel rana, vel mullo pisce, vel etiam putrefacto in eo rubellione pisce, vel vva marina, eoque vino postea propinato effici id posse, aliqui prodiderunt.

Cæterum si necessitas aliquando bibendi, &

di, & poculis certandi, vti hoc tanquam ciuile in conuiuuiis magno mortalium malo, in vsum introductum est, vigeat, ad præcautionem sequentia præsumpta ebrietatem cauere, vel saltem mitiorem reddere obseruatum est.

Amygdalæ amaræ quinque vel sex ante pastum comestæ.

Absynthium item: cuius tamen vino helluones potius sequenti die post crapulam, vt stomachum bile offensum corrigant (cùm vt illam contemperent rursus se potum implent) vtuntur: vnde versus:

Sinocturna tibi noceat potatio vini,

Hoc mane rebibas & erit tibi medicina.

Ruta quod pocula tuta, vt carmen sonat, faciat, in hunc vsum laudatur; quod ego quia à veneno præseruat, potius dici existimo.

Brassica in cibo sumpta ebrietatem impedit: vti & semen ipsius.

Lac si ieiunus bibat, ea die tutus erit.

Pulmones animalium assos comestos, ebrietatem arcere docet Plinius: alij Ovis pulmonem nominatim denotant.

Hirundinum combustorum puluerem sumptum, in æternum non sinere inebriari, quidam scripsit.

Pulis ebrietatem tardans, sic parabitur. Cuius cochleare vnum cum vino austero exhibetur.

R. seminum Caulium 3. j. Coriandri 3. ss. Camphoræ gr. ij. fiat puluis.

Côpositus magis sic fiet. Cuius cochlear vnum vel 3. j. cum Vino granatorum vel alie acido, stiprico, vel cum Aqua frigida detur: vel cum Saccharo in formam tabularum redigatur: R. seminis Caulium 3. j. Plantag. Portulacæ, Berberis ana 3. ss. Coriandri præpar. 3. ij. florum Rosar. rubr. Nupharis, Santali rubri ana 3. ss. Masticis, Succini ana 3. j. Spodij 3. j. Salis 3. ss. Camph. gr. vj. fiat puluis.

Electuarij forma vsurpari poterit: Illudq; ante potum propinari: R. Conferuæ Rosarum, rob de Ribes, & de Berberis ana 3. ss. Amygdalar. amararum excort. confusarum num. xij. seminum Caulium 3. j. Ros. rubrarum 3. j. syrapi de Agrestâ q. s. fiat electuarius.

Syrupus elegans, Cuius 3. j. sumi debet antequam vinum bibatur: R. succi Cauliû alborum Granatorum acidorum, Ribes ana 3. ij. Aceti 3. j. bulliant simul ad vsum.

Minus inebriantur qui non nisi bene ventriculo cibis repleto tardissimè bibunt: citius verò qui ieiuni vel statim in principio mensæ potum vini accelerant.

Extrinsecus, Hedera coronæ instar capiti apposita: vel succus capiti admotus, ebrietatem prohibet.

Gestatus item lapis Amethystus, idem facere posse creditur.

Cæterum iam ebrios, quo minus vinum noceat, vt cures. Vomitus maximè iuuat. Et si dentur acida mox in fine mensæ, aut quò citius eò melius, eaquæ assatim sumenda: quia, sicuti in narcoticis dictum fuit, vini efficaciam refringunt: qualia sunt sequentia.

Puls ex Lacte & farina Hordei cū Aceto.

Lac item acetosum vti conrescere solet.

Poma acida, comesta. Punica item mala acida illorumq; succus. Vti & Cytonia.

Caulium capita condita, & Rapæ, donec acescant, vti nostri parare solent, valde iuuant.

Acetum cum aqua dilutum bibitum: vel per se bona quantitate sumptum, ebrietatis est antidotus: quo insignis quidam potator, iam longo tempore indies ebrius, senè inde labem contrahat, præmunire solet.

Præter hæc, Lactuca, Mentha, Absynthium, Myrthibaccæ, comesta: vel succi ipsorum assumpti ebrietatem arcent.

Croci flor. stillatitia aqua pota, idem facit.

Odor Camphoræ & Santalorum similiter profunt.

Oxyrhodina item capiti applicata.

Et si testes Aceto vel Aqua frigida madesiant.

Quæ omnia non tantum in ea temulentia, quæ à vino contracta est, sed & in ea, quæ à similibus inebriantibus, vti dictum, proficiscitur, sine dubio proderunt: vti & narcotica ea ratione acidis emendari diximus. Et solano furioso sumpto, Acetum remedium esse ostendimus.

Verum quæ præter enarrata, proprietate

quadam, quibusdam, tam narcoticis quam alijs resistunt, suo loco explicabuntur.

A Veneno, vel assumpto vel morfu aut istu corpus subeunte, exorta melancholia vel mania, ea tantum quæ à Canis rabidi morfu facta est rabies, curanda hic proponitur: cum aliæ species raræ ob raram causam existant: nec illis alia quam quæ cæteris quoque venenis debetur, cura accommodetur.

In morfu itaque canis vel etiam lupi, rabidorum (neq; enim cura differunt) etsi periculosus omnino sit affectus, auxilijs tamen subito adhibitis, permulti sanantur. Postquam verò malum inualuerit eò visque, ut iam aquam metuant, ægerrimè, ut & Dioscor. recenset, restituantur, & plerique moriuntur: in quibus tamen salutis spes aliqua hoc signo concipitur, si speculum aut aquam intuentes, in quibus canis imago, ut dictum, illis repræsentatur, hallucinationem esse, sedq; falli animadvertant: vellea minimè apparente, suam ipsius figuram, se offerentem, agnoscant.

Statim itaq; vulnus morfu inflictum dilatandum: & labia vulneris, ut sanguis optimè fluat scarificanda. Cucurbitulisq; cū multa flamma admotis; vel Hirudinibus si ad manum sint, veneni vis extrahenda. Quod, etsi magna & ampla plaga, quæ ob copiam sanguinis fluentis, cum quo & virulentę saluę portio exhauritur, melior quam si parua & angusta sit, existat; nihilominus erit faciendum: & laniata scissaq; scalpello per ambitum caro erit amputanda.

Vitio quoque cauterio actuali facta, cum ignis virus domet & ulterius progredi non patiatur, expeditissimum est auxilium. Et ne crusta decidente vlcus cicatrice obducatur, ante quadrigesimum diem, vel etiam ultra hoc tempus cauendum erit. Idq; vel seprico vel erodente, quale præcipitatum est, medicamento: quo etiam si vitione ferre rollit, illius loco ab initio quoq; vti possumus: vel vitio repetenda erit. Et ut fordium vlcus maleq; dispositum potius quam mundum existat, neque consolidetur, adhibitis ijs, quæ præter quod venenum attrahunt, carnem quoque suppurant, procurandum erit.

Quod fiet, si Tritici grana mansa, vel pista vulnere applicentur: quia suppurant & vlcus dilatant: & propter saluam dum masticantur proprietate quoq; iuuant.

Cæpa, Allium sylvestre & Ruta; simul cōtusa, & cum Melle & Sale subacta, egregiè venenum alliciunt; magisque si Theriaca quoque permisceatur: quibus & succum Cyrenaicum addit Dioscor.

Pici Brutia, cuius loco & vulgaris fumi potest, si Oppopanacis quarta pars & Aceti sextarium addatur, emplastrum fiet attractivum, ad hæc efficacissimum, ut Gal. docet.

Caro salita piscis Smaridis & Omotariachi, applicata, aliaque Salsamenta profunt. Glarum item omnium piscium, fomento adhibitur.

Rumex, Potamogeton, Ballore, Foeniculi radices, Ruta, radices Angelicæ, Laser, Panax Herculeum, cum Sale & Melle contusa, idem præstant.

Propinanda quoq; confectum, quæ proprietate huius veneni vim euincere possunt remedia. Qualia ex cancro fluuiatili vero, carcino dicto parata, Diosc. & Galen. plurimum probarunt. Cuius loco cancrum marinum & in stagno iuxta mare Monspessuli repertum, accipit Rondel. Et nos forte nostrum astacum fluuiatilem, cum & ille venenis resistat, non minori successu sumere possumus.

Parabuntur autem hæc antidota hoc modo: R. cineris Cancris fluuiatilis veri, in sarmentis Vitis albæ cremati & puluerisati part. ij. rad. Gentianæ subtilissimè contuse part. j. misceantur. Dentur cochlearia ij. cum Vino meraco, quadriduo: post quos dies triplicetur pondus. Hoc vnum multis profuisse testatur Dioscorides: hancque antidotum Damocrates ante Diosc. carmine descripsit: adeoque eam Gal. commendat, ut neminem mortuum fuisse, qui eavsus fuerit, testetur.

Ex simplici cinere, vltis cancris viuis in patella æris rubri, puluerem Gal. quoq; parat & exhibet.

Vel sic compositum, quem à præceptore suo Æschione empirico se habuisse narrat, propinat, admodumque commendat: R.

cineris Cancrorum fluuiatiliū vstorum, part. x. rad. Gentianæ part. v. Thuris part. j. Cuius vice resinam Terebinthi veteres addiderunt; fiat puluis: Detur quotidie mensura magni cochlearis Aquæ inspersus, ad dies quadraginta: vel si tardius Medicus adueniat, cochlear. ij. pro vice exhibeat.

Sunt qui hoc medicamentum sic parant: R. cinerum Cancrorum part. ij. rad. Gentianæ part. j. β. Myrrhæ. par. j. fiat puluis.

Præter hæc antidota, Hepar à cane rabido tostum exhibitum, Dioscor. & Galenus magni faciunt.

Caninum item sanguinem & vrinam: vti & leporis, vulpis, capreoliq; Coagulum.

Alysson Galeni siccum, quadraginta diebus continuè ex Hydromellite datum, efficax Archigenis esse remedium testatur.

Bituminis Iudæici 3. j. cum aqua bibita, affectum hunc sanare docet Aetius.

Vincetoxici radices, 3. j. β. pondere, cum aqua Cardui benedicti, quadraginta diebus potæ, Matthioli est remedium: Liciū quoque confert & Caprifici cortex cum aqua propinatus. Scorzonæræ item radix vel eius succus: vti & Angelicæ radix cum Nitro.

Mel item cum rosaceo bibitum. Dioscor.

Mithridatum & Theriaca, vti omnibus venenis aduersantur, sic & huic.

Sed & quæ assumpta admotaq; profunt, sequentia existunt.

Hippocampus marinus, ex Aceto & Melle subactus.

Melissophryllon, Arthemisia, Absynthiū, Centaurium, Aristolochia, Chamedrys, Pulegium, Hippolapathi radix, Oxylapathum & Bryonia.

In cibandi ratione, veneno aduersatur, si Allium, Porros, Cepas edant: Cancros ite fluuiatiles veros. Cibos aromatibus condiant. Vinum meracum & passum bibant. Aquam bibere ferratam aut chalybeatam iubet Auicenna. Lac item schistum, quod deiectionem mouet & venenum domat.

Imprimis Aquæ potus, quam adeò metuunt, hydrophobos sanat: quare omnibus modis fallendi, vt eam non intuentes per longum canalem vel alia industria bibant:

quam ob causam Cicer nigrum, quod simul veneno resistit in eo decoquere iubent, vt sic obscurior facta intuenti, imaginem nullam, quæ pauorem illis incutiat, repræsentet. Sed & vt sitibundi admodum fiant, Catuli coagulum ex Aceto propinatur, tunc enim aquæ desiderium eos capere scribit, hocq; vehementer laudat Aetius.

Vrinarum prouocatio, edusq; & tam validis medicamentis, vt & sanguinem mingant, valde iuuare Auicenna docet: qui vt dictum, catulos vel quid simile per vrinas excerni existimauit.

Eamque ob causam cantharidum vsum admodum commendat: quæ sic rectius exhibebuntur: R. Cantharidum, abruptis, alis tenuioribus, 3. j. Lentium mundat. 3. β. Spicæ, Gariophyll. Croci ana 3. β. Detur 3. β. cum Vino ieiunis, tribus vel quatuor diebus, donec sanguinem excernant.

Rumex acutus si potandus exhibeatur, copiosam & turbulentam mictionem facit: qua sola planta exhibita, si simul decocto, illius foueatur plaga & succo ipsius illinatur, quidam morfos à cane rabido integrè sanabat, vt docet Auicenna.

Sudorum ante & post cibum prouocationem iuuare docet Dioscor.

Deiectionem per aluum, magnum etiam adferre adiuumentum, si Hiera colocynthidis vel Helleboro id fiat, idem scribit: cuius tantam vim esse, vt & ferè desperatos sanat, idem censer. Quod & aliis purgantibus, melancholicis maximè humoribus destinatis, potest fieri.

Dropacismis, Sinapismis in toto corpore, quoq; vtitur Dioscor. vti & aliqua Cauteria occipiti & post aures admota, probant.

Inter amuleta, Dens caninus à cane qui momordit euulsus, & brachio alligatus: item Pili ab eodem cane euulsi, & vulnere impositi, multum præstare creduntur.

Exorcismis hoc malum sacerdotes quibusdam in locis sanare scribunt: quæ præternaturalia cum sint, ea relinquimus.

Ab affectu animi vehementi vel diuturno concepta mentis perturbatio, vel commotio, interdum sponte cessat: aliquando difficulter cedit, sæpe nunquam potest corrigi.

Animi
commo-
tionis à
Spiritu
agitatio
ne, cura
Gau. 110.

Gaudium enim profusum facile euanescit. Ira quoque furor brevis est, in illis præsertim, qui quidem mox excandescunt & rubent, sed subito iterum remittunt: quos & tunc ferè se iratos fuisse poenitere solet. Tristitia ex dolore animi, cum tempore cessat, cum nullus sit dolor, ut inquit Cicero, quem non longinquitas temporis aut mutet aut minuat. Invidia concepta ægrè deletur. Ambitio, in quibusdam & avaritia in senescentibus præsertim, animis impressa, vix dum eradicari possunt. Quæ omnia tamen non adeo homines dementant sicuti amor: in quo etsi levis ab initio mentis alienatio tantum esse videatur, si tamen altius radices agat, adeo eam perturbat, ut ad veram insaniam & desperationem nonnunquam homines adigat. A terrore melancholia vera & perseverans profecta, præ cæteris omnibus est pertinax, & curatu difficilis: ad multos annos hominem sæpe excrucians, consumens, & desperabundos tandem reddens. Sed & ex consuetudine contractam stultitiam corrigere amplius non licet.

Curatio tamen non negligenda, si perseveret malum, & offensa adsit vel periculum: quod fieri;

Causæ ablatione primum, & occasiones auferendo, à quibus hæc prodeunt, si illa adhuc præsentia, affectum foueant vel augeant: ut in ira id, quod offendit: in tristitia illud quod molestat: & sic de aliis illa auertendo. Imprimis verò amoris præcipuum remedium est, illius obiectum & stimulum mox & procul diuque remouere, quod vulgus hoc prouerbio; ab oculis à corde, innuit: & quod in peste iunare dici solet, cito, longè, tardè, hic quoque potissimè curationis est regula.

Consolando, admonendo, persuadendo, sæpe affectus animi mitigantur vel arcantur. Proponendo, prout animus afficitur, rem nullam vel nullius momenti esse: dein incommoda quæ inde sequuntur: nunc offensam Dei exponendo: & spè præsentis vitæ commutationis cum futura meliori mox successura eos consolando. Quæ si non iuvent, seuerè quoque iram Dei & gehennæ supplicium minando: coarguendo, & ver-

beribus quoque, donec quæ amant, illis fœteant, ut Gordonius scribit, si non pareant, eos castigando.

Imprimis verò affectus animi huic affectui qui afficit contrarios mouere, & sic in contrariam passionem deducere, cum ad moderationem, sicuti contraria contrariis curari solent, rursus adigant, magnum in quibusdam animi pathematibus adiuumentum adfert; sicque ea quæ alias cedere nollent tolluntur: Sic gaudio nimio elati, si aduersa audiant, mox remittunt. Et qui tristantur, lætitiâ inopinata & vehementi refocillantur. Ita irati si perterrescant, mitigantur. Si perterresciti ad iram incitentur, liberantur. Qui vehementer oderunt, misericordiâ moti, reconciliantur. Et qui amore graui premuntur, si in odium personæ quam amant adigi queant, certissimè liberantur: quod nonnunquam si inhonesta & turpia de ipsa audiant, quæ vel excogitantur, vel vera sunt, sed amantes cæci non vident, adduci possunt. Præsertim verò in generosis animis, si se ab amasia contemni putent, & repulsam pati (nihil enim amorem æquè ac reciproci amor fouet, nihilque charius Antiphila) mox indignatio sequitur: quæ perseverans, nisi falsa aliqua & vi expressa extinguatur lachrymula, odium parit. Huc & animi vehemens in aliam rem intentio refertur, quæ priorem conceptam solet restinguere, vel saltem imminuere: vnde Poëta ait: Otia si tollas perièrè Cupidinis arcus. Et si in binos vel plures licet eosdem affectus, diuisa sit apprehensio, fit, ut partita vel dispersa minus quàm vnita sit foris: Nam pluribus intentus minor est ad singula sensus: vnde & Ouidius inter remedia amoris, vnum binas quoque amicas habere, posuit.

Cæterum quod præsertim Medici operationem attinet, in subitaneis & vehementibus animi passionibus: spirituum & humorum commotionem, qui in quibusdam affectibus à centro ad superficiem, in aliis è contrà mouentur, diligenter obseruare oportet, eosque contrario motu ad sedem ipsi destinatam reducere. Euocamus autem eos qui cor veluti opprimunt in terrore, mœrore: frictionibus, & exercitiis, iucundis præsertim il-

tim illisque idoneis; & balneo. Et vicissim eos, qui ira, gaudio effusi sunt: non tantum contrario animi affectu, ut dictum, sed & Aquæ frigidae perfusione, & Venæ sectione: quæ tamen non in ipso furore, sed paulo post fieri debent, ad interiora rursum repellimus.

In perseverantibus autem corpusq; iam immutantibus animi pathematis, pro constitutione corporis & humorum redundantia, plethoræ nimirum vel cacochymia, euacuationes & alterationes, tum ad curationem, tum ad præseruationem, si ad hos filiosve affectus dispositi sint, instituemus. Et si melancholia vera vel mania inde sequantur, uti à terrore præsertim accidere dictum fuit, eadem ratione, sicuti allic explicabitur, curatio peragenda.

Hypochondriacæ melancholici vapores spiritus perturbantes, curatio. Si in venis meseraicis sanguis melancholicus crassus adurens & malignus, sicuti explicatum fuit, contentus, vapore suo Melancholiam hypochondriacā dictam procreet, etsi illa mitior, quia nonnunquam mitigatur vel cessat, quam vera esse videatur, grauis tamen quoque existit; tum quod non tantum mentem perturbat, sed & tam multos alios affectus circa partes naturales præsertim, uti expositum fuit, sese offerentes, inducat: & quod adeo pertinax & diuturnum, curationemque tam difficulter admit tens sit malum: idque ideo, quia materia illius in venis meseraicis abstrusa, & subinde noua ab assumptorum excrementis continuo congestis aucta, nec sanguinis detractio ne educi, nisi hoc per venas hæmorrhoidales fiat, queat, nec purgantibus facile cedat: sicuti & febris quartanæ diuturnitatis causam, huius loci & similis ferè materiei occasione accidere, in febribus demonstra uimus: in quam & sæpe, si putredo sanguinem illum inuadat, hic affectus commutat ur: vel alioquin viscerum vicinorum, lienis, hepatis, & venarum illarum obstru ctiones & tumores parit. Nonnunquam & vapore suo massam sanguinis in reliquo corpore inficiens, in veram & perseverantem melancholiam conuertitur.

Scopus curandi in eo consistit, ut materia illa melancholica in venis meseraicis cōten-

ta, euacuetur: vel per sanguinis detractio nem: vel illam ad ventriculum & intestina euocando, per vomitum secessumque; illis quæ obstruções soluant naturamque ad excretionem sollicitent. Dein ne rursum noua generetur, bona concoctione institu ta, præcauendo. Et ne vapores sursum ferantur cerebrumque imprimis perturbent, & cordi quoque molestiam adferant, eos diuertendo. Hasq; partes principes roborando, & ventriculo, hepati, lieni ne lædantur, prospiciendo.

Sanguinis detractio valde conueniret, si ex venæ portæ ramis fieri posset: quæ cum nullibi nisi circa podicem, vel oscula ad ven triculum & intestina pertinentia, aperiri possint, hocq; nisi sponte natura faciat, medicamentis, quæ summè acria esse oportet, ut colocynthis (nisi vehementer amara, ut aloes quæ venas aperire solet, & hic quoque ut dicitur comperit, id facerent) alias tentare periculosum sit: nihil præstantius erit, quam hæmorrhoides, nisi sponte fluant, sanguifugarum appositione, aut alijs applicationibus; etsi tumeant & appareant, sectione quoque aperire. Quibus vel per se, vel vi reseratis & fluentibus, hic affectus qui curari prius non potuit, sæpè curatus est. Sed & per menstrua, cum naturalis sit euacuatio, si suppressa sint, & prouocentur, plurimum mulieres iuuabuntur: cum & per hæc fortè venæ meseraicæ se exonerare possint. Cutaneas autem reliquas venas incidere quæ venæ cauæ rami sunt, nisi pletho ra id suadeat, aut iam ille sanguis quoque infectus sit, alias superuacaneum.

Vomitum in affluetis præsertim, & malo iam proculysque protracto, plurimum conuenit, cum sic excrementa quæ in illis locis continuo ferè in prima concoctione colliguntur, subito, & nonnunquam in venis meseraicis retenta materia, per hanc viam quoque, ut in febribus intermittentibus dictum, & aliqua portio, biliosa maxime, ejiciatur. Quod tamen leuioribus primum, mox si non iuuant, fortioribus in robustis institui potest.

Alui irritatio & laxatio, vapores sursum petentes reuellit, & flatibus ex iis uti & ex

cruditate genitis, viam ad eruptionem facit: tantoque magis si ventris adsit constipatio, proderit. Fit hoc Suppositorijs; & majori adhuc vtilitate Clysteribus; quæ cum intestina penitus subeant, à venis meseraicis quoque illuiei partem euacuant. Quæ si alternis diebus injiciantur, vel indies, longè tutius erit, quàm nimium purgantia, quæ tandem fastidiunt, & ob morbi diuturnitatem ægrè ferunt, exhibere, sic successiue materiam è partibus vicinis ad intestina deducere: quare sæpe reiteranda. Quæ ex humidis, lenientibus, flatu discutiuntibus, stimulantibus & purgantibus paratur hoc modo: R. fol. Maluæ, Brassicæ Mercurialis vel Betæ ana M. j. rad. Polypodij ʒ. j. Epithymi vel Cuscutæ, Thymi ana ʒ. ij. flor. Chamomillæ, Matricariæ, Aneti, Violarum (propter ardorem) ana P. j. Furfuris P. j. fiat decoctio & in colaturæ decenti quantitate, dissolue. Mellis rosacei ʒ. j. Sacchari rubri ʒ. ʒ. Hieræ picræ ʒ. ij. oleorum Liliorum, Chamomil. ana ʒ. j. ʒ. Salis parum: fiat clyster. Si fortius euacuandum erit, in decocto adde Fumariam (Lupulos quia caput tentant omitimus.) & Senam: & dissolue confect. Hamech vel succum Mercurialis, &c. sicuti in clysteribus in melancholia explicabitur.

Purgatio quæ materiam è venis meseraicis propellat, facienda erit: sæpiusque per vices reiteranda. Prius reseratis vijs, quæ obstructæ esse solent: & humore ad euacuationem præparato. Cauendum tamen à valide calefacientibus, siccantibus, quia morbum augent: eodem modo ferè ea administrando, vti in quartanis febribus vsurpari debent.

Præparabitur igitur hoc Iulepo: Per dies aliquot ante purgationem cum sumèdo: R. Syrupi de Bizantijs, Endiuæ simplicis ana ʒ. ij. de Pomis redolentibus, Epithymi ana ʒ. ʒ. aquarum Buglosi, Cichorii, Fumariæ ana ʒ. ij. fiat iulep: aromatizetur puluere Dyanthi. vel illius tabulam postea sumat.

Decoctum, illius loco, tale eodem modo exhibebitur: R. radicum Graminis, Asparagi, Borrag. ana ʒ. j. Liquiritiæ ʒ. ʒ. Endiuæ, Cichorii, Bellariæ, Ceterach, Betonice ana M. j. flor. Borrag. Buglosi, Scabiosæ, Ta-

maricis ana P. j. Anthos P. ʒ. seminum quat. Frig. mai. Anisi ana ʒ. ii. Fœniculi ʒ. j. fiat decoctio & in 1b. j. adde succi Pomorum sæpe instar cocti ʒ. ij. arom. pauc. Cinamomi.

Vel cum Vino, si vehementius aperendum, vrantur hoc modo: meliori ferè successu, cum non adeo calefaciat nostrum vinum, vt alibi dictum: R. radicum Cichoreæ, Graminis ana ʒ. j. Enulæ (quia lætitiā adfert) ʒ. ij. Ceterach, Asparagi, Chamædreos, Fumariæ ana ʒ. ij. flor. Cordialium ana ʒ. j. ʒ. seminum Fœniculi ʒ. j. conuassata, infundantur in Vino albo vulgari, vel diluto, si forte sit: Vtatur diebus quatuor vel quinque manè.

Purgetur dein decocto leniore, non fortissimis medicamentis exasperatur malum: quale ex multis hoc conuenire poterit: R. Senæ mund. Polypodij, Garthami ana ʒ. ʒ. Epithymi ʒ. ij. Passul. part. x. Prunorum part. v. rad. Borrag. rec. ʒ. j. Equiritiæ ʒ. j. flor. Cordialium ana P. j. feminis Anisi ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua & pauc. vino albo: in col. ʒ. iij. dissolue Catholici ʒ. ʒ. vel Syrosol. ʒ. j.

Vel vtatur sequenti: R. Catholici ʒ. j. confect. Hamech ʒ. j. ʒ. Syrupi de Rosis sol. cum inf. Rhubarbari ʒ. j. cum aquis Buglosi, Fumariæ q. l. & Cinamom. parum: aromatizationis gratia.

Per vices purgantia repetenda erunt in morbi diuturnitate præsertim si clysteribus vti nolit; vel hæc successiue vsurpanda, vt resolutis obstructionibus, & natura indefinenter sollicitata, ad intestina excrementa potius è venis meseraicis deponat. Idq; varijs formis Syruporum, vini, pilularum: sic præparatarum, vt diutius ad vsum asservari possint. Quibus semper præparantia, ad dies aliquot præmitti debent: vel vnà cum ipsis in compositionibus sunt permiscenda: quorum exempla pauca hæc adferemus.

Syrupus itaque inspissatus sic parabitur: De quo alternis diebus, vel per tres dies continuo vrantur, & post dies aliquot repeat: R. radicum Graminis, Cichoreæ ana ʒ. j. Fœniculi, Petrosel. ana ʒ. ʒ. Icos ʒ. ij. Borrag. rec. ʒ. j. ʒ. Azari ʒ. ij. corticum Capparum, Tama-

Tamaricis ana ʒ. β. herb. Fumariæ, Lupul. Chamædreos, Chamæpith. Ceterach, Betonica ana M. j. florum Cordialium quat. Tamaricis ana P. j. feminum Anisi ʒ. β. Fœniculi ʒ. ij. Passul. ʒ. j. Senæ ʒ. ij. β. Polypodij, Carthami ana ʒ. j. β. Epithymi ʒ. β. fiat decoctio; & in col. infunde Rhabbarbari ʒ. ij. Agarici ʒ. iij. Cinamomi ʒ. j. Zingib. ʒ. β. succi Pomorum inspissati ʒ. iij. Borræg. ʒ. j. Sacchari ʒ. iij. fiat decoctio ad spissitudinem syrupi. Dentur ʒ. ij. plus minúsve, prout operabitur; dissolue cum Aqua, Iure aut Vino.

Syrupum de Polypodio Matth. ad hanc affectionem plurimum commendat.

Vinum ex iisdem aridis infusis parabitur addendo Absynthij ʒ. iij. Maioranæ ʒ. j. sed quia diutius retentum corrumpitur, media illius pars duntaxat infundatur, & per biduum sumat: dein cum rursus opus erit, ex alia parte noua fiat infusio.

Pilulæ in hoc casu, vti in omnibus eiusmodi obstructionibus vtilissimæ: quæ & hæmorrhoides & menses prouocant: R. Aloes ʒ. ij. Myrrhæ ʒ. β. (ad putridos humores) Epithymi ʒ. j. rad. Gentianæ, Azari ana ʒ. β. gummi Ammoniacy dissoluti in Aceto ʒ. j. (si durities adsit circa glandulas omenti & mesenterij, vti sæpe fit.) feminis Petrosel. ʒ. β. Rhabarb. el. ʒ. j. β. Spicæ ʒ. j. cum succo Absynthij fiat massa: Capiat ʒ. ij. alternis vel tercio die.

Tryphera de Epithymo Mesuei, frater nis diebus exhibetur, singulare est in hypochondriaca melancholia remedium.

Post vsum purgantium, corroboretur æger sequenti die: vtendo conserua rad. Buglossæ: vel similia alia.

Interea vt obstructiones soluantur, & materia è venis meseraicis ad intestina euocetur, ventri vniuerso, cum per ipsum venæ meseraicæ omentum & mesenterium implicant, remedia adhibebuntur.

Fotusq; primùm fiat. Quo semel in die ante cibi assumptionem, vel bis quoq; mane & vesperi, ab initio, cum spongia venter fomentetur tepide hoc modo: R. herb. Absynthij, Abrotani, Matricariæ, Thymi ana M. j. florum Chamomil, Meliloti, Sambuci,

Genistæ ana P. j. baccharum Lauri ʒ. j. β. feminis Anisi ʒ. ij. cort. Ebuli, rad. Polypodij, Senæ, Epithymi ana ʒ. iij. fiat decoctio in Aquæ & Vini æquis partibus: addendo parum Aceti vel scyllitici: Pro fotu.

Balneum loco fotus ex aqua dulci, alijsq; temperatis & humectantibus conueniet.

Vngatur post fotum vel balneum ventriculi regio, & hypochondria venterque, vnguento tali: R. oleorum Amygd. dulci. Chamomill. Anethini ana ʒ. j. Amygd. am. Sábucini, de Capparibus an. ʒ. vj. Irini, Nardini an. ʒ. β. succi Absynthij ʒ. j. Aceti albi scyll. ʒ. j. decoquantur ad succorum consumptionem: adde gummi Ammoniacy dissoluti in Aceto ʒ. j. rad. Azari ʒ. j. feminum Nigellæ, Brassicæ ana ʒ. β. Croci ʒ. j. Cera q. f. fiat linimentum.

Cucurbitulæ supra ventrem sine scarificatione, cum flamma interdum admotæ, flatus egregiè discutiunt, materiamq; euocat.

Rubificantia quoq; eo nomine quandoq; adhibentur: inter quæ emplastrum ex Sinapi valdè laudatur. Sunt qui etiam Vesicatoria adhibeant.

Picatio supra ventrem, priùs oleo inunctum facta, valde in quibusdam probatur.

Ne autem de nouo materia continuò cõgeratur, Bona victus ratione cauere oportet: euchyma, temperata, sed minimè flatulenta. Quo nomine quæ flatus discutiunt, vt semen Anisi, Fœniculi, Carui, Piper, Zingiber, cibis adduntur: ea tamen quâtitate, ne nimium accendant, quod summo perè cauere oportet. Ob quam causam & vini vsum si intermittere possint, non indigere alio medicamento inquit Rhazis, potens nimirum intelligens: cum quod tenue & mire est, assuetis præsertim, nocere minimè possit.

Demum vapores & flatus quoque discutiantur; Puluerem alternis diebus post pastum, vel ante, cochleari vnus pondere exhibendo: qui sic parabitur: R. feminum Anisi ʒ. β. Fœniculi ʒ. ij. Carui ʒ. j. florum Cordialium ana ʒ. β. fiat puluis: adde Sacchari ros. tab. ʒ. ij.

Frictionibus, Ligaturis & Lotionibus extremitatum, rectè suo tempore adhibi-

tis, vaporum ascensum diuertere oportebit.

Partium principum capitis, cordis ventriculi, lienis, hepatis: quæ diuturnitate & malicia morbi tandem læduntur, ratione quoque habere oportet. Caput, quod potissimum afficitur, irrigando, vngendo, vt in vera melancholia dicitur. Cor quoque quod vaporibus hisce læditur & palpitat, epithematibus, sacculis roborando. Ventriculum qui flatibus molestatus errat, externis internisque, confectionibus concoctionem promouentibus, non tamen nimis calidis, roborando. Hepar lienemque, ne indurentur, externis & internis, vt in illorum vitijs eius modi proponetur, cauendo.

Melancholia & Mania, ab Humore melancholico, spiritus perturbato, curatio.

In vena cava sanguis melancholicus talis qualem descripsimus malignus: vel in capite, aut circa maiores trunci corporis venas, aut circa vterum, in sanguine illic, qui menstrui sanguinis & seminis est materia, abundans, melancholiam vel maniam, si deterior sit, procreans, cum ægre totus exhauriri queat, quamdiu adhuc sanguinis aliqua remanet portio, tam diu pertinax & diuturnum illud malum durat. Quo sæpe non tantum mensibus aliquot, sed & annis ad vitæ finem interdum vsque misere affliguntur: & si ferociunt, carceribus inclusi detinentur: nihilominus reliquas vitales naturalesque actiones obeunt: nisi hæc, quia cum mente capti sunt, multa delinquant, & quod, si mente aliquo modo adhuc consent, miserore seipsos conficiunt, labefactentur. Idcirco nullam spem salutis temere polliceri debemus. Licet multos, vt dicitur, larga præsertim sanguinis emissionem curatos nouerimus. Et insanos furentesque, aliquos ab adolescentia ad extremum senium vsque, in eo ita ad se rediisse, vt postea è custodia vinculisque liberati, circumuectes, neminem amplius læderent, aut verbis lacefferent. Sed & tunc melius sperandum erit, si moderatè adhuc omnia perpetrent, & cum risu potius quam aspectu truci res peragant, atque aliquando monentibus obtemperent, medicamenta que admittant.

Methodus & indicatio curandi talis erit. Vt materiam illam è venis euacuemus. Et à partibus nobilioribus ab ipsa hæsis, cerebro

imprimis & corde diuertamus. Nam quæ ratione alios quoque morbos à maligna quadam materia genitos, multis euacuationibus interdum sanari, experientia (vt in lue venerea patet) docuit; ita & in melancholia & mania à maligna hac materia prædeuntibus, maximis & frequentibus euacuationibus empiricos multos sanasse, à reliquis medicis, qui his vim metuebant, relictos, sæpe numero vidimus, nosque ipsi felici cum successu multoties experti sumus. Quod varijs formis modisque fieri potest: vt per sanguinis è corpore extractiones: vel ad alia loca deriuationem: per aluum factas purgationes: & per vomitiones. Deinde alterantibus seu immutantibus illam intemperiem, seu constitutionem melancholicam, in sanguine totius sæpe corporis & præcipuis visceribus, cerebro & corde imprimis emendabimus: Exhibitis medicamentis, Externisque præfidijs, capiti, cordi, hepati, lienì, corporisque alijs quibusdam partibus adhibitis: Actuali quoque operatione per castrationem: Et appensis amuletis: Viribus interim quoque prospiciendo, idonea viuendi ratione: quæ & vitia hæc corrigere potest. Demum symptomatum quorundam aliorum, quæ interdum illis superueniunt, rationem habebimus; quæ omnia quomodo paranda administrandaque sint, ordine sumus explicaturi.

Sanguinis itaque emissio facta, in vena aliqua cutanea maiori & apparente, cum non tantum sanguinem, sed vnà cum ipso morbi huius materiam, in venis latentem euacuare possit, primum & præcipuum ad curationem horum affectuum, si ab hac causa proficiatur, remedium erit. Quod etsi pluresque non docuisse, aliquos etiam improbasse sciam, longa tamen obseruatione, innumeros hac ratione sanatos fuisse, à chirurgis quibusdam, vel alijs qui ex professo hisce morbis sanandis operam dabant, cognoui: qui vigesies, sexagesies quoque venas tundendo, insanos penitus, vel melancholicos ita restituerunt, vt postea incolumes adhuc longà vitam vixerint. Qui in vena certa aliqua eligenda nihil laborabant, sed nunc brachij, mox pedis, hanc illamve, nunc alibi

sine discrimine aperiebant. Quod idcirco remediū genus, nos quoque sed maiori cura & prouideria, quā illi, qui non nisi tanquam deploratos curandos suscipiunt, methodicē, prēmisis semper alui elutionibus, & intermixtis purgationibus, vti dicitur, vsurpare minimeque negligere debemus.

Brachii itaque vena aliqua magis patens primū aperienda, reiterandaque. Dein & in manu, saluatellam præsertim sinistræ manus venam, quæ priuatim lienis causa, cum quo consentire censetur, secanda erit. Et in pedibus quoque malleoli venam saphenam dictam: eoque citius, si menses non recte fluant; vel quæ ad pollicem pedis excurrit, & cum capite communicare censetur. Frontis enim vena, si perseveret malum, & causa præcipuè circa caput latere deprehendatur, tundenda erit. Et e naribus sanguis, fetis intrusis, sanguisugis adhibitis, aliisque asperis immixtis, erit prouocandus. Varices etiam si in cruribus aut alibi appareant, cum magnam eiusmodi melancholicæ materiei, à natura eodetrusæ illicque coaceruatæ copiam contineant, aperiendæ, illuiesque per hanc viam emittendæ, quod non nisi plurimum prodesse poterit. Mensium prouocatio si non deceter purgentur, aut substituerint, cum causam, vti dictum, huic malo præbere possint, multum iuuabit. Hæmorrhoidum quoque apertio, etsi venæ portæ rami sint, in consuetis magnum adiumentum adferet.

Huc & Scarificationes referri possunt: illis maxime locis factæ, sæpeque repetitæ, vbi venam alias tundere deberemus, vt brachiis & pedibus: Vel vbi venam alioquin secare non solemus, vt scapulis & humeris. Quæ certè non tantum sanguine euacuant; sed si cucurbitulæ adhibeantur, etiam egregie materiam à capite reuellunt, & sæpe, vt obseruauimus, multum profunt.

Quo nomine & Frictiones, Dropaces, Vescicatoria, Cauteria, Sectionesque in capite factæ, & Trepanationes in desperatis, ossis parte ablata, & per mensum foramine aperto relicto, adhibentur.

Intestina ab excrementis eluere frequenter conuenit suppositoriis, rectiusque clysteribus; quæ etsi non adeo materiam melan-

cholicam in venis distantioribus latentem, vt in hypochondriaca, in qua vicina est intestinis, euacuent, tamen ante venæ sectionem, & reliquas purgationes, vt melius succedant, satius erit per clysmata crassiora excrementa prius educere: quibus interdum ea quæ melancholiæ euacuandæ dicata sunt, permiscenda erunt: quæ continuata, in distantiore causa quoque aliquid efficient.

Simplicius igitur quod præstantissimum est, egregie stimulans, sic parabitur: R. succorum Mercurialis vel Betæ ʒ.ij. Maluæ ʒ.j. Mellis communis ʒ.ij. dissoluentur cum iure carnum pingui & salso: Detur.

Compositum magis sic fiet: Quo per vices vteretur: emolliens, purgans & stimulans: R. herbarum Maluæ, Atriplicis, Bliti, Betæ vel Mercurialis, Buglosi vtriusque, Fumariæ ana M. j. florum Chamomill. Melilori, Sambuci ana P. j. Ficum num. xij. Furfuris P. j. seminum Lini ʒ.β. Maluæ, Fœniculi ana ʒ.ij. fiat decoctio: dissolue, Mellis violacei vel rosacei ʒ.ij. succi Mercurialis vel Betæ ʒ. j. Benedict. laxat. ʒ.ij. olei Chamomill. Butyri ana ʒ. j. β. Salis parum: fiat clyster.

Ex purgatis validius, in maniacis præsertim, sic parabitur: R. radicum Altheæ ʒ. j. herbarum Maluæ, Buglosi vtriusque, Mercurialis. Lupuli, Fumariæ, Thymi ana j. florum Chamomil. Sâbuci, Buglosi vtriusque, Violarum ana P. j. seminum Lini, Cucurb. ana ʒ. β. feminis Maluæ, Fœniculi ana ʒ.ij. feminis Rutæ, Viticis ana ʒ. j. Ficum part. vj. Tamariind. ʒ. β. Furfuris, Hordei añ. P. j. Polypodij, Senæ, Carthami ana ʒ. vj. Hellebori albi ʒ. β. vel nigri ʒ. j. fiat decoctio, dissolue, Mellis viol. Sacchari rubri ana ʒ. j. Hieræ colocynt. Diasenæ sol. confect. Hamech ana ʒ. succi Mercurialis ʒ. j. β. olei Violarum, Chamomill. Liliolum ana ʒ. j. Salis q. s. fiat clyster.

Purgare materiam hanc è venoso genere conuenit: Incipiendo à leuioribus & ad ad fortiora progrediendo. Eaque diu multumque continuando: nam & facile hoc plerumque ferre possunt: & quamuis debilitentur non nihil, cum ea ratione magis sedati & quietiores fiant, nihilominus confert, nec adeo ipsis nocere potest, cum cōtinuò etiam

refocillari possint. Itaque præparato prius humore, euacuatio mox sequi debet: semel, bis tervè, continuis vicibus administranda. Eaquè hebdomadatim semel vel bis iterum repetenda erit: intermiscendo sanguinis vti dictum, detractionem. Et semel in mense, vt quoq; docet Auicēn. fortè admodum solutivum exhibendo. Præcipua enim curandi ratio in magnis illis euacuationibus, sanguinis excrementorumque, vnde successivè morbi materia tollitur, vti dictum, consistit.

Præparatur humor antepurgationem; observando an biliosi sint admodum qui hoc malo affecti sunt, tunc enim frigidioribus & acidis magis vtendum: hoc pacto: R. syrupi Viol. Borrag. ana ʒ. ij. Acetos. simpl. ʒ. j. aquarum Buglosi vtriusque, Laetucæ, Nymphaeæ ana q. s. fiat iulep. Pro quatuor vel quinque vicibus: aromatizando pulvere Triafantali, vel exhibendo tabulam illius post quamlibet dosim.

Vel sic ex succis parabitur: R. succorum Buglosi vtriusque, de Pomis redolentibus ana ʒ. ij. ʒ. aquarum Buglosi vtriusque, Fumariæ ana ʒ. iij. Sacchari ʒ. ij. decoquantur, & depurentur: aromatisetur Cinamomo: Pro aliquot vicibus.

Decocto vel infusione sic præparetur: R. radicum Buglosi vtriusque, Liquiritiæ ana ʒ. j. cort. Tamaricis ʒ. ʒ. Fumariæ M. j. Ceterach M. ʒ. florum Cordialium an. P. j. Nymphaeæ P. ʒ. Thymi P. j. decoquantur in aqua communi, & poculo Vini, addatur Sacchari, & succi Pomorum ana ʒ. ij. aromat. Pro aliquot dosibus.

Vel infundantur in Vino tenui: addendo odoris causa parum Absynthij: Et bibat.

Purgetur dein humor, vti dictum, exhibitis varijs melancholico humori dicatis formis. Quæ, si ægri non obtineant, sic parandæ erunt, vt sub forma vini, vel alterius medicamenti quod illis magis familiare erit, eos fallere queamus. Qualia multa in remedijs cathartici melanagogis dicta fuerunt. Hic selectiora quædam preponemus.

Ab initio igitur mox, præparato humore, hoc exhibeatur: R. Catholi ʒ. j. confect. Hammech ʒ. ij. Syrupi ros. sol. ʒ. j. Cum sero Lactis

vel aqua Buglosiæ dissolue: Et exhibeatur.

Vel: R. Senæ, Polyp. an. ʒ. ʒ. Epithymi ʒ. ij. infundantur in Sero caprino: adde Mercurialis recentis ʒ. j. sem. Anisi ʒ. ij. fl. Cord. P. j. fiat decoctio: diss. Catholici ʒ. ʒ. confect. Hammech ʒ. ij. syrupi de Fumaria compof. vel de Pomis redolent. ʒ. ʒ. fiat potio.

Vel: R. Pilular. de quinq; generibus myrobal. Indarū, de Lapide Lazuli an. ʒ. j. Cum Vino albo: formentur pilulæ.

Successivè & multis vicibus vt corpus purgetur, sequentia convenient.

Apozema primum, compositum: quod sic parabitur: R. rad. Polyp. ʒ. ij. fol. Senæ ʒ. ij. feminis Carthami ʒ. j. Epithymi ʒ. ʒ. Turbith. ʒ. ij. Myrobal. ind. citrin. chebul. confectatum oleo Amygdal. dulc. ana ʒ. j. Hellebori nigri ʒ. j. albi ʒ. ʒ. (si levis purgare velimus helleborum omittimus, si fortius, augeamus) radicum Graminis, Pentaphyli, Liquiritiæ ana ʒ. j. Enulæ ʒ. ʒ. corticum Fraxini Tamaricis, Ebuli ana ʒ. ʒ. herb. Mercurialis, Fumariæ, Lupulorum, Hemionitidis, Buglosi vtriusque cum toto, Ceterach, Polytici, Thymi, Melissæ ana M. j. florum Cordialium, Tamaricis, Scabiosæ, Genistæ ana P. j. femin. Anisi, Melonum ana ʒ. ʒ. feminis Cucurbitæ ʒ. vj. feminis Portulacæ ʒ. ij. feminis Ocimi, Viticis ana ʒ. j. Tamarind. Passul. ana ʒ. j. ʒ. Prunorum par. vj. Iuiub. Sebesten ana par. v. fiat decoctio s. artem: & in col. tb. ij. infunde, Rhabarb. el. ʒ. ʒ. Cinamom. ʒ. ij. Spicæ ʒ. j. fiat expressio; adde succi Pomorum dulc. tb. j. decoquantur adhuc parum: Vtatur hoc syrupo per dies quatuor vel quinque diluculo.

Potest ex eodem decocto fieri syrupus ad usum conservandus duplicatis omnibus: si decoctioni Sacchari iusta quantitas, vel illius loco defrutum ex Pomis addatur, & ad spissitudinem coquatur. Cuius cochlearia duo vel tria, prout operatur, cum purgare volumus, exhibentur.

Alter leuior ex succis sic parari poterit: R. rad. Polypodij ʒ. ij. Senæ mundt. ʒ. iij. Epithymi ʒ. ʒ. florum Borrag. Violarum ana P. j. feminum Anisi ʒ. ʒ. Cinamomi ʒ. ij. conquassentur parum: affunde succi Pomorum redolentium tb. ij. succi borraginis depurati

purati 3. iij. stent in infusione calida per
xxiij. horas: dein parum bulliant: colentur:
bulliant rursus ad mediam spissitudinem
defruti, vel syrup: Capiat 3. ij. plus minus-
ve, per se vel cum Vino.

In sero caprino infusa quoq; proderunt,
vel iure galli decrepiti. Et decoctum exhi-
bendum.

Vinum ad hunc usum valde vtile sic pa-
rabitur. Quod tribus vel quatuor vicibus
exhibendum erit, cum diutius asseruari ne-
queat: nisi in dolio maiori quantitate, dupli-
catis omnibus vel triplicatis, prout maior
minorve vini erit quantitas, vel musti, pare-
tur: & quæ induntur valde prius exiccen-
tur: R. Senæ 3. ij. Turbith 3. iij. Agarici 3. ij.
Myrob. indarum citrin. chebul. ana 3. j. Epi-
thymi, Thymi ana 3. iij. florum Cordial. ana
℞. herb. Absynthi, Fumariæ ana 3. iij. semi-
nis Ferri culi 3. iij. Zingib. 3. ℞. infundantur
conquassata in ℞. iij. Vini albi: decoquan-
tur parum in duplici vase: Bibat tribus vel
quatuor vicibus.

Et quia remedia mutari debent, aliq; quo-
que formæ excogitari possunt: vt electuarii
sequentis; Cuius ad probam, prima vice ad
3. iij. per se vel dissolutum sumere potest,
& pro successu dosim augere vel minuere:
R. pulpæ Tamarind. & Cassiæ extractæ cū
vino albo (ad gratiam) ana 3. j. Mannæ ele-
ctæ 3. vj. Catholici, Tryphera de epithymo
Mesuai, vel persicæ, vel magnæ 3. ij. cort.
Myrobalan. ind. chebul. conficatarum oleo
Amygdalarum dulcium ana 3. j. Rhabar. j.
℞. in vino parum emolliti, Senæ prius vino
lotæ, Epithymi ana 3. ij. seium Anisi 3. ij. Ci-
namom. 3. iij. fiat pulvis subtilissimus: &
cum syrup. Ros. fol. fiat electuarium. Si vis
vt minori quantitate potentiùs operetur,
sume 3. ij. & adde confect. Hamech. 3. j. Exhi-
be.

Pulvis talis parari poterit, ad ægros fal-
lendos: Qui vna vice per se vel cum vino,
brodio, lacte, hydromellite, exhibebitur:
R. lap. Lazuli multoties loti Hydromelite
3. ij. Epithymi 3. j. Sacchari 3. puluerizentur.
Vel sic: R. lap. Lazuli præpar. 3. j. Diacrydij
3. ℞. Turbith 3. j. Sacchari 3. j. Detur.

Vel compositius vñal. sic parabitur. Cū

ius prima vice 3. ℞. probæ loco propinabitur:
postea procedendo ea quantitate quæ rectior
deprehensa fuerit: R. lap. Lazuli multoties
loti vino & aqua 3. ij. Diacrydij 3. ℞. Turbith
3. ij. Senæ 3. ℞. Epithymi 3. ij. Tartari 3. j. Ani-
si, Cinamom. ana 3. ij. Croci 3. ℞. Sacchari
candi ad pondus omnium: pulueriscentur.

Tabulæ ex iisdem parari possunt. Vel
dentur aliæ, quales sunt tabulæ electuarij
de Citro, &c.

Vomitum interdum factus conferet plu-
rimum, cum naturam ad excretionē egre-
giè sollicitet. Præsertim si exhibitis illis p-
uocetur, quæ supra infraq; simul euacuant:
cum robustiores hæc quoque vt in purgan-
tibus dictum, faciliè ferant. Inter reliqua ve-
rò Helleborus præsertim tantoperè com-
mendatus in mania est, vt hos qui insani di-
cuntur, helleboro opus habere, in prouer-
bium venerit. Exhibetur autem variis mo-
dis: vt cum per inferiora magis purgare vo-
lumus, nigrum potius eligimus, vt in pur-
gantibus dictum fuit: si verò vomitum po-
tissimum ciere volumus, album sumimus;
cuius puluerem, vel infusionem in vino po-
tius, vbi multum comederint & iuscula bi-
berint, vt minus lædantur, exhiberi conue-
nit. Vel ramentis aut fibris illius, raphani
taleolis confixis & per noctem relictis, post-
eaque diligenter rursus exemptis & taleo-
lis in oxymellite maceratis; sicq; vnam propi-
nabimus.

Helleborismus sequens à multis admo-
dum commendatur: Si de illo cochleare v-
num cum pinguiusculo exhibeatur: R. ra-
mentorum Hellebori 3. j. infundantur per
triduum in aquæ pluuiæ 3. iij. Decoquan-
tur lento igne ad tertias: colaturq; adde Mel-
lis optimè despumati 3. ij. seruetur ad usum.

Quòd si deorsum simul quoque euacuare
animus est, cochleare vnum sequens detur:
R. pulueris Hieræ colocynth. 3. iij. Epithy-
mi, Senæ ana 3. ij. fiat pulvis: excipiat
Melle helleborato.

Scribij vsq; donec pellucidum fiat, vel leui-
ter saltem calcinati, vt expertus sum, pulue-
rem ad grana aliquot: vel infusionem illius
in vino, nunc si frequenter in hunc usum ex-
hiberi: vnde biliosam, luteam vel viridem
mae-

materiam copiosè solent euomere, & deicere: quod & Matthiolus laudat, egoque in robustis sine noxa sæpè probaui.

Medicamenta quæ alterationis causa asumere debent, ex iis parantur quæ temperata humiditate vim tetri & acris huius humoris, & proprietate malignitatis illius corrigunt. Atq; intemperiem cerebri quod potissimum afficitur, & cordis, cuius complexionem in hisce casibus primum corrumpi censet Auicenna, emendant. Lienis quoq; ubi melancholiæ sedem esse putant, & hepatis, quod illius causa etiam affici existimant, habentes rationem. Ex quibus hæc medicamenta concinnantur, quæ ferè, si compositiones consuetas cōsideremus, corda alia penitus sunt: quæ cum non tantum reficiant, sed & malignæ & venenatæ, qualis hæc est, materiæ resistunt, nos quoque, sed vitatis nimium calidis & siccis, probamus, & sequenti modo præscribimus.

Pro infusione in vino, vel decoctione: quæ vel simplici vtimur, addito saccharo & aromatibus; vel syrupum paramus, hæc sumi possunt: Per vices vtenda: R. florum Buglosi vtriusque (cordi & lieni appropriata) q. f. macerentur in vino ordinario: vel decoquantur in iusculis.

Eadem ratione & alia in vino infundi possunt, vt folia Linguae ceruinæ: quod in hac re vulgus facere solet.

Composita magis infusio vel decoctio fiet: R. florum Rosarum, Violarum, Buglosæ vtriusque, Scabiosæ, Tamaricis ana p. j. fol. Betonicæ, Melissæ, Linguae ceruinæ vel Ceterach ana M. j. rad. Enulæ 3. ij. feminis Ocimi 3. j. conquantur ad vsum.

Syrupus ex hoc decocto fieri potest vt dictum. Vel sequens ex succis paratus: R. succorum Pomorum redolentium lb. j. Borraginis 3. iij. Maluæ (qui valde utilis censetur) 3. ij. depurentur, & addita Sacchari lb. 8. decoquantur ad consistentiam.

Iulepos potius quoque vsutramus quam aquas illas cordiales compositas, quas aliqui docent; cum nimis corpus inflamment. R. aquarum Rosarum 3. iij. Buglosæ 3. ij. Melissæ 3. j. Cinnamom. 3. 8. flor. Aranti, (quam aquam Nasse vocant) 3. ij. Vini albi

3. j. Sacchari albissimi q. f. fiat Iulepus.

Electuaria per vices alternis diebus sumenda: superbibendo parum de dicto iulepo, vel aqua illius, cum pauco vino, sic parantur: ex paucioribus pluribusve: R. conferva. Rosarum, Violarum, fl. Buglosi vtriusque, Nenuph. condituræ rad. Buglosi, cort. Citri ana 3. 8. rad. Emulæ 3. j. sem. Ocimi 3. j. pulueris Diamarg. frig. 3. j. cum syr. de Pomis redolentibus: misce.

Aliud ex multis & rarioribus & preciosioribus confectum sic parabitur: R. confervarum quat. flor. Cordialium ana 3. j. conf. Nymphaeæ, Scabiosæ, Garyophyll. hortensium, Tamaricis, Cichoreæ, Cirsij, Iryngorum, Satyrionis, Anthos, Betonicæ ana 3. 8. conditur. rad. Buglosæ, Lactucæ, Caulium, Cucurbitarum & carniū Citri, cort. Citri ana 3. j. Myrobalan. emblicarum num. ij. seminum Cucurb. & Melonum mund. ana 3. 8. feminis Citri mund. 3. j. sem. Ocimi 3. j. 8. sem. Lactucæ 3. j. Granorum tinctorum 3. ij. Santali mosc. 3. 8. Cinam. 3. j. rasuræ Eboris, cornu ceruinæ 3. j. Vnicornu (pro diuitib.) 3. j. Coralli rubr. 3. j. pulueris Diamarg. frig. vel electuar. de Gemmis 3. 8. Ros. nouellæ, Diamosci, Dyarrhod. Aromat. ros. Triasantal ana 3. j. trochif. de Camphora 3. ij. confect. Alkermes & de Hyacintho ana 3. j. Lætificantis Rhazis 3. ij. cum syrup. de Pomis redolentibus spissè cocti, ne confectio quæ diu seruari debet, corrumpatur: fiat electuarium.

Abrotanum cum Melle & Aceto Theophrast. commendat assumptum.

Pulueres quoque vsurpare possumus. Et ad 3. j. illorum addendo sacchari 3. j. 8. formare tragema. Vel dissoluere saccharum in aquis in iulepo explicatis, ad parandas tabulas.

Primus talis erit: R. radicū Vincetoxici 3. j. cort. Citri, feminis Ocimi ana 3. 8. Margaritarum 3. 8. fiat puluis: Ad vsum, vt dictum est.

Vel sic: R. florum Cordialium, fol. Melissæ, Maioranæ ana 3. j. cort. Citri, feminis Ocimi ana 3. 8. Santali mosc. 3. j. rasuræ Eboris 3. j. Coralli 3. 8. Margaritarum 3. 8. Cinnamom. 3. 8. fiat puluis.

Vel ex pulueribus vsualibus, vt Diamargaritone, vel el. de Gemmis, aliisque in electuariis dictis, & pulueres & tabulę paratur.

Tabulę hac ratione paratę admodum cordiales sunt, & capiti appropriatę: R. cōf. & Alkermes vel de Hyacintho 3. j. pulueris Diamarg. frig. el. de Gemmis ana 3. β. Diamofci, Aromat. ros. ana 3. β. feminis Ocimi 3. j. Sacchari dissoluti in succo Pomorum redolentium q. s. fiant tabulę.

Capiti, in quo cerebrum residens semper in hisce affectibus, siue per se, siue per consensum, afficitur, interdum & causa mali latet, remedia extrinsecus adhibentur.

Et primum repellentia in principio tantum: si a vapore sursum eleuato hypochondriaca melancholia fiat: vel furor magnus in mania existat; Tunc in principio Oxyrrhodo vtimur: cui tamen oleum Violarum & Chamomelinum ne nimis siccet, addimus.

Vel oleo Rosaceo, Myrtillorum, Cytonior. Violar. & Chamomelino caput inungimus.

Postea vero humectantibus admodum vtetur, quę & simul aliquid resoluant, & caput roborant, & somnum quoque, cum vigiliis admodum vexentur, inducant.

Irrigationes seu embrochę, vel capitis ablutiones & madefactiones, nostris magis consuetę, fiant. Idque semel in die, vel bis mane & vespere, multis diebus, prout ex vigiliis & inquietudine plus minusve opus esse coniciamus. Quibus & si cum balneo simul vtetur, ante & post illius vsum, vt dicetur, eodem balneo caput irrigabimus.

Hic autem lixiuis, cum nimis siccet, minime vtimur: sed decoctis sequentibus: R. rad. Altheę 3. j. herbar. Violarię, Lactucę, Maluę ana. M. j. florum Violarum, Nenupharis, Borrag. Chamomil. Meliloti, Hqrdei ana P. j. seminum Lini 3. j. (foenogracum propter grauem odorem omittimus) Papaueris 3. β. fiat decoctio in Iure capitis & intestinorum vituli; addatur parum vini: Pro irrigatione.

Alia, vbi somnum quoque simul conciliare volumus, quod plerunque necesse est: R. fol. Salicis, Lactucę, Violarię, Iuncorum teneriorum, florum Violarum, Nenuphar.

Chamomillę, Parthenij, Thymi (maxime circa finem) ana P. j. seminum Cucurbitę conquass. 3. j. Coriandri 3. ij. feminis Lactucę Altheę, Anethi ana 3. j. cort. vel capitum Papaueris vel radic. Mandragorę 3. j. fol. Hyosquiami M. j. fiat decoctio in Iure capitis & pedum veruecis, vel vituli, vel pipionum, vel hirundinum, vel pulmonum arietis: addito pauco vino.

Vel sic: R. emulsionis feminis Papau. albi, & semin. Cucurbitę, factę in aqua Violarum 3. ij. Lactis 3. ij. mucilag. sem. Psili 3. j. agitentur: Et applicentur.

Ex vinctuosis, ablutio vel embroca vtilis sic erit paranda: R. oleorum Violacei, Lactucę ana 3. ij. Chamomil. 3. j. Albumin. o. uorum bene agitatorum numer. ij. Lactis mulieris vel alterius 3. iij. vel plus: misce diligenter.

Vinctuosa illitio vel applicatio in capite circa tempora, frontem, & si rasum fuerit, in pilosa quoque illius parte, eadem intentione, post irrigationem, vbi exiccatum rursum fuerit, vel etiam sine ea per se sepe quoque facienda, hoc modo: R. oleorum Violarum, Nymphę, Amygdal. dulc. ana 3. j. Chamomel. 3. β. axungię Porci recentis 3. j. mucilag. sem. Lini 3. j. Cerę albę q. s. fiat linimentum.

Simplex magis, sed nihilominus efficax, sic fiet: R. mucilag. feminis Lini, Foenograci, Maluę, Butyri ana 3. ij. axungię Porci 3. iij. Medullę bouis vel porci 3. j. Applicetur.

Compositum verò & efficacius, hoc erit: R. oleorum Viol. s. Cucurbitarum ana 3. ij. Chamom. 3. j. de semine Papau. 3. β. mucilag. Psilij 3. j. seminum Lactucę, Hyoscyami ana 3. j. Coriandri, Myrtillorum ana 3. β. Croci 3. j. misce.

Vel si vigilię admodum vrgeant: R. sem. Hyoscyam. semin. Papauer. albi ana 3. ij. rad. Mandragorę 3. j. Opij 3. β. Croci gr. vj. excipiatur olei Violacei 3. j. Chamomel. 3. β. Applicentur capitis regioni.

Circa declinationem magis calida adtenda, in irrigationibus & vnguentis: ex Thymo, floribus Rosmarini, Stęchados, Lauandulę, parata.

Et vt caput roboretur, pulueres sequentes capillis inspergemus noctu, & manè pettinando blandè rursum capillos purgabimus: R. seminum Coriandri ʒ. ʒ. Myrtill. ʒ. ij. Lactucæ, Papau. albi ana ʒ. j. granorum Alkermes ʒ. ij. florum Viol. Rosar. ana ʒ. j. ʒ. Anthos Chamom. an. ʒ. j. cort. Citri ʒ. j. Maceris, Gariophyll. ana ʒ. j. fiat puluis.

Plurimum conueniet in summo furore & desipientia: si Pulmonem arietis recenter extractum, tepentem adhuc, vel si refrixerit, calefactum, capitis vertici applicemus: vel Agnum per dorsum sectum & exenteratum sic adhibeamus: vel Pullum columbinum per medium dissectū & puluere Hyosquiami conspersum, capiti imponamus: aliaque quæ mox in phrenisi dicentur, pari ratione vsurpemus.

Cor quod in hisce affectibus quoque affici & angi docuimus, vt assumptis corroborari debere demonstratum fuit, ita & externis iisdem viribus præditis, vt venenato huic humori resistere possit, erit instruendū.

Epithemata, syndone vt decet excepta, in ieiunis adhuc, talia cordis regioni erunt adhibenda. Vel pulsibus applicanda: R. aquar. Rosar. ʒ. ij. Violarum, Nymphaeæ, Buglosi ana ʒ. ij. Melissæ ʒ. j. succi Pomorum redolentium, Vini odoriferi ana ʒ. j. Acetorosei ʒ. ʒ. seminum Ocimi ʒ. ij. Acetosæ ʒ. j. ligni Aloes & Santali mosch. ana ʒ. ʒ. trochisc. de Camphora, pulu. Diamarg. frig. ana ʒ. ʒ. fiat epithema. Crocus adderetur, si flauities illius qua res commaculat, non impediret: vt & Ambra, si non nimis cara esset.

Sacculi cordiales duo parari poterunt, in forma quadrata, interbassati vt decet. Quorum vnus Vino & Aqua rosacea irrorari, & si nimium madeat, exprimi, sicque applicari indies debet: & cum remouetur, alter siccus apponi, continuoque gestari.

Qui sic parabitur: R. florū quatuor Cordialium, Nymphaeæ ana ʒ. ij. Anthos ʒ. j. fol. Melissæ, Maioranæ, Balsamitæ ana ʒ. j. ʒ. semin. Ocimi, Citri ana ʒ. ij. Acetosæ, Lactucæ, Portulacæ ana ʒ. j. granorum Alkermes ʒ. j. Santali moscatellini ʒ. j. ligni Aloes ʒ. ʒ. Gariophyll. ʒ. j. Been albi & rubri ana ʒ. ʒ.

puluerisentur, ad vsū: possunt & pulueres cordiales consueti Diamarg. de Gemmis, alique addi.

Hepar & lien non sunt negligenda, tanquam partes quoque principes, si a tetro hoc humore calorem præternaturalem, aut labem aliquam patiantur: tunc epithematibus & inunctionibus quoque rescicienda erunt.

Corporis etiam quibusdā reliquis partibus remedia adhibita, illius intemperie peruersam emendare possunt, illudque rescicere. Vt si præcipua illius pars balneo immergatur; Pedes lauentur; Spina pectusque inungantur.

Balneum aquæ fluuiatilis, in eo natando aliquandiu, dum æstatis ratione licet: vel in sessione domi in eo tepesfacto, in iunioribus & robustis aliquoties repetitum, proderit. Vel si additis humectantibus, artificiale pareretur, & in eo tepido æger ante cibum parum insideat: & postea in lecto quiescat & sponte, nulla vi adhibita, sudet.

Quale hoc est: R. herbarum Maluæ, Buglosi vtriusque, Salicis, Vitis, Lactucæ, Nymphaeæ, Violaria ana m. j. florum Camomil. Meliloti ana p. j. radicū Altheæ ʒ. ij. seminum Lini ʒ. j. decoquantur in aqua fluuiatili vel pluuiatili: cui decoctum pingue aliquod vel glutinosum, ab animantium partibus factum, addi potest: vel Lac in diuitibus.

Eodem balneo & caput irrigari; & pedes lauari poterunt.

Spinæ longitudo, sub qua trunci venæ cauæ & arteriæ magnæ latent, in quibus præcipua morbi causa inest, post balneum inungitur.

Hac ratione: R. oleorum Amygdal. dulc. ʒ. ij. Violarum ʒ. j. axungia Gallinæ ʒ. j. ʒ. Ceræ albæ parum: misce.

Pectus iisdem inunctū, illis partibus adferet commodum.

Castratio à veteribus in morbis desperatis quibusdā, vt in epilepsia dictum, vsurpari solita, quia temperamentum hominis immutat, virilitatem & vehementiam compescit, corpusque laxius & humidius reddit, in maniacis præsertim, iam diu incarcerationis & desperatis, cū alioquin inutiles sint, meo videre, aliquid emolumenti adfer-

re posset: quam circumstantiis omnibus diligenter examinatis, si alia non iuuat, tentare liceret.

Amuleta non negligenda: inter quæ de vno sic scribunt. Lapis Chelidonium, ille qui rufus est, dextro brachio alligatus, valet contra phantasticas illusiones ex melancholia, sanat lunaticos & insanos, facitq; amabiles & iucundos.

Viuenti ratio, seu diæticè, sic instituatur, vt & humores laudati gignantur, & maligna aliorum intemperies, corporisq; praua constitutio, emendentur & contéperentur: viresq; reficiantur: quod sic præstabitur.

Aër, locusque temperata & pura conueniunt. Sed & horum mutatio, præsertim si illis loca quædam suspecta vel aduersa sint, aut occasionem aliquam tristitiæ præbeant, plurimum conferunt: qua sola diuturni alioquin & graues morbi sæpenuerò sanantur.

Cibus alimentosus ex sua natura humiditate temperatus prodest: qui euchymus, concoctu facilis, humidiorq; esse debet. Qualis est caro tam animalium quam piscium: non antiqua, dura, diuè asseruata, aut suffumigata, nimiumve falsa aut aromatibus aliisve calidioribus admodum condita: sed iuuenis, recens: simpliciterq; elixa vel assa. Inter quam accipitris & noctuæ pullorum caro comesta proprietate valere, vti verò è contrà, caprina, ferina, leporina, ob causas supradictas, nocere, creduntur. Lac, caseus laudatus, non salitus nimium, nec putris, butyrum, in consuetis, & oleum commune & amygdalarum, concedi possunt. Oua quoque nisi corrumpantur, vt in biliosis vetriculis facillimè fit, conueniunt. Panis ex farina pura, non vitiis frugum inquinata: vnde lolij causa multi in stuporem vel insaniam redacti sunt: fermentatus; parum salitus; recteque coctus conuenit. Et ex cerealibus, leguminibusque hordeum, & pisorum genera, ita cocta & præparata, vt facile digeri possint, nec inflent: lentes verò & fabæ, quia succum melancholicum gignere putantur, improbantur. Ex fructibus, poma præsertim omnibus modis tanquam appropriata conueniunt, reliquique fugaces: & qui suspensi vel exciccati asser-

uantur, vt prunæ, vuae, passulæ, cerasæ & similia: & ex durioribus, nuces recentes & amygdalæ. Ex oleribus, temperata: vt spinachia, lactuca, endiuia, beta, conceduntur: imprimis bulgossium vtrumq; tanquam appropriata extolluntur: sola brassica quod melancholiam procreare existimetur, damnata: quam tamen ego ex gustu iulicans, rectè præparatum bonum sanguinem præ cæteris plantis cum tenera sit & suavis, potius efficere censerem.

Potus imprimis habenda est ratio. Eæ consuetudini aliquid concedendum, in illis qui aquam vel vinum bibunt: cum vinum debilius, vel si fortè sit, dilutum moderatè sumptum nocere minimè possit, sed cum exhilaret, potius profit: quod tamen si tristiores vel ferociiores ipsius vsu fieri videamus, magis adhuc erit diluendum, vel omnino subtrahendum. Idem de cereuisia iudicium esto. Sed & feri potus quia laxat, in hisce affectibus admodum commendatur. Vt & lac amygdalinum: quod adeò caput, vti putarunt, tentare minimè potest.

Somnus non tam quia humectat, vt volunt, sed quia corpus mentemq; reficit, valde commendatur: & proin si minùs inuitet, exhibitis soporiferis vel externis, vti explicabitur, admotis, erit conciliandus.

Motus inordinati, in maniacis præsertim, iisdem soporiferis compefcendi erunt. Atq; iurgiis, verberibus, vinculis, custodiis, carceribus erunt coercendi: nã & hoc ad curationem maniacorù, quos virgis & flagellis empirici cædunt, facere, experientia docet.

Excretiones naturales vt decenter fiant, procurandum. Et si ob retentionem seminis, turgente materia sæuiant moniales, aut virgines, si nubant, sanantur.

Animi affectus imprimis, præsertim cum à nulla causa manifesta prodeant, illis, vt in mentis perturbatione dictum est argumentis sunt eximendi. Et si falsas causas prætendant, vt illè nasi magnitudinem, vel alter serpentum in copore copiam, vt illis satisfaciendo opinio concepta eximatur, ingeniosè hæc amputari, vel expurgari, ostendendo tale quid, & clanculum proferendo aliisve artibus fallendi sunt. Iucundis quoq; quæ

fratribus ipsorum offerenda sunt, & quibus maximè delectari videmus, recreandi erūt: quibus tamen plerunq; non mouentur: vel si omnino insaniant ea minimè intelligentes nec apprehendentes, negligunt nec curant, magisq; illis potiùs offenduntur.

Symptomata alia quæ melancholicis & maniacis adueniunt si nimium virgeat, corrigenda erunt, vt in singulis ipsorum capitibus explicabitur: Inter quæ vigilie corriguntur iis quoque, quæ capiti applicari diximus: & lotionibus pedum: & si admodum infestent, exhibitis soporiferis: in vigiliis & hoc libro passim explicatis. Dolor ventriculi, ventris, vteri: tensio hypochondriorum, vnctionibus, foribus ventris aliisq; emendantur, vt suis locis docebitur: & si qd per os eo nomine exhibetur, iis semper ea quæ melancholie resistunt sunt pmiscenda.

Vt si in flatibus copiosis prauaq; concoctione talis pulvis post pastum vsurpandus præscribatur: R. pulueris Diacyton. sine speciebus ʒ. ij. seminum Anisi, ʒ. iij. Coriandri præparat. ʒ. ij. Cinamom. ʒ. iij. Schœnanthi ʒ. ʒ. Folij Indi, Maioranæ ana ʒ. j. florum Rosarum, Buglossi ana ʒ. ʒ. Margarit. ʒ. j. fiat pulvis: addatur Sacchari ad pondus omnium.

Phrenitidis & Paraphrenitidis, ab Intemperie calida, & inflammatione cerebri, curatio.

Calida intemperies cerebri, si delirium causet, & sit Phrenitis vera, quæ ab inflammatione cerebri & meningū oritur, & mox cum febre inuadit, morbus est periculosissimus & acutissimus, qui tertio die quandoque terminatur. Si verò minus ferociant, & cum risu delirent, spem maiorem conualescentiæ, hæc nobis adferunt. Quòd si verò Paraphrenitis sit, cerebrumq; nondum inflammetur, sed tantum ab humore vel vapore, vt frequentiùs fit, accendatur, morbumq; calidum, febrem potissimum sequatur, ex morbi conditione prædicendum erit. Nam si in paroxysmis febrium intermittentium, siue in principio aut statu, hoc fiat, sicuti pueris hoc frequens esse solet., vnà cum paroxysmo febris rursùm remittit. Si verò in continuis hoc accidar circa statum, periculo carere minimè potest: cerebro tunc cordi laboranti consentiente: vbi tamen si natura morbum vincat, febre decli-

nante delirium quoq; cessat. In pestilentialibus febribus etiam pro ratione morbi qui sanatur vel interficit, delirium lethale vel minimè tale existit: nihil tamen boni si superueniat, denotat: & si tunc simul pulsus remittat, maculæq; erumpant mors vicina est. In vermibus infantij etià pro ratione febris iudicatur: & sæpe cōuulsiones superuenturas prædicat: aliàs sine noxa cum febre tollitur.

Intentio curandi in vera phrenitide hæc est. Vt euacuantibus primùm humorē sanguineū cerebrum accendētem, vel inflammationem, à capite reuellamus, & deriuemus: idq; imprimis sanguinis detractionibus: nec non & aluum laxantibus medicamentis. Dein & alterantibus intus forisq; vsurpatis: & viuendi ratione, calorem in capite potissimum, nec non hepate, corde, quæ quoq; vti & totum corpus ratione febris incaluerunt, emendemus. Et circa finem materiam residuam discutiamus. Symptomatum interim quoque, si quæ præter hæc adsunt, rationē habentes. Quæ & in paraphrenitide, sed pro ratione morbi comitis, à quo pròdit directà, administrantur: in qua & vaporum ascensum hac ratione impedire, reuellereq; sursum delatos intentio sit.

Sanguinis detractio reuulsionis causa in vera phrenitide subito fieri debet. Eaq; larga vel repetita. In brachij vena magis patente, præsertim humeraria. Sed non nimis amplo foramine, vt Galli solent suis lanceolis scindere, vena erit aperienda, ne dum inquieti sunt, sanguinis fluxus minus compe-sci possit. In paraphrenitide similiter, si magnum affluxum humoris ad caput ferri ex delirij magnitudine, & oculorum venis turgentibus, videamus, nisi febris causa, quia in statu est, vel quia diutius perseverans, aut malignitate sua vires prostrauit, cogamur eam intermittere, neq; aliud impediatur: vena quoque erit aperienda: etsi priùs febris causa iam secta fuerit.

Deriuationis quoque causà in phrenitide semper, & paraphrenitide nonnunquam, si vehemens sit delirium, vnde calorē vehementem, humoris affluxū concitare suspicamur, etiam eo tempore, quo venam generalem aliquam incidere prohibemur, particula-

rem, per quam non tanta sanguinis fit profusio, etsi in statu sit, metu, ne falsa in veram phrenitidem commutetur, impulsu, interdū tundere oportet. Qualis imprimis vena sub lingua est: qua aperta plurimū sēpē in delirio iuuat. Quo nomine & frontis venam, si manifesta sit. neq; stringendo collum fascia, quo sanguis nimium sursū impellitur, eam dilatare cogamur, scindere, cū necessitas summa vrget, conuenit: Nariumq; venas setis vel alijs asperis pungendo fricandq; aperire: Vel adhibitis, post aures, fronti, naribus, podici, sanguisugis sanguinem exsugere.

Scarificatio ad motis simul cucurbitulis ad reuulsionem in vtraq; delirij specie prodest: & cū secare venam non licet in phrenitide, tunc quoq; illius loco adhibebitur, reuulsionis causa in scapulis, humeris, brachijs: quā ego deriuationis vice in colli lateribus circa iugulares, cum successu facere soleo: alij etiam in aurium pinnis factam probant. Pro qua scarificatione, si eam nolint ferre, cucurbitulæ solæ vsurpantur.

Frictionibus extremitatum, reuellere, & ligaturis, illis in locis quoq; factis, nimium motum ad superiora, cohibere debemus. Quod & lotionibus pedum, quas ad somnū inducendum mox præscribemus, præstari poterit.

Clysmata, si non admittant, per vim ipsi sunt injicienda, & vt retineant, podex panno premendus: nam plurimū stimulando reuellant, & calorem corporis alterando, & excrementa biliosa excernendo, emendant. Quo nomine & delirij & febris comitis causa, in vtraq; phrenitidis specie conueniunt. Quæ ante venæ sectionem injici: & postea sēpē iterum repeti debent. Qualia in febribus multa præscripta fuerunt.

Exempli causa hæc saltem proponimus: ℞. Cæsiae rec. ext. ʒ. vj. Sacchari rubri seu impuri ʒ. j. olei Violacei ʒ. iij. succi Betæ vel Mercurialis ʒ. j. Salis ʒ. j. cum decocto herb. Emollitiuarum: fiat clyster.

Compositus magis sic paratur: ℞. herb. Maluæ, Altheæ cum radicibus, Parietariæ, Betæ, Mercurialis, Lactucæ, Violariæ ana M. j. Hordei integri P. j. seminum Cucurb.

ʒ. β. Prunorum num. vj. fiat decoctio, in decenti quant. dissolue Mellis viol. Sacchari rubr. ana ʒ. j. Catholici, Cæsiae ana ʒ. j. fici Betæ, vel Mercurialis ʒ. j. olei Violacei ʒ. iij. Salis parum: fiat clyster.

Laxantia exhibita & nonnihil stimulantia, in constipatis præsertim, aluum leniendo exhiberi possunt: præsertim cū clysmata nolunt admittere, vel ea non retinent. Sed à cathartici quæ corpus accendunt, cauendum: in quo empirici, nil aliud quam purgare scientes, grauiter sæpe delinquant.

Itaq; postridie quam vena secta fuerit, tale exhiberi poterit solutiū: ℞. syrupi Ros. sol. simpl. ʒ. ij. aquarum Violarum, Lactucæ, Buglossæ q. s. ad diluendum: Detur.

Vel hoc: ℞. succi Ros. ʒ. j. β. Sacchari ʒ. vj. dissolutū in aqua Ros. bulliat leuiter: coletur: Et detur.

Aliiter hoc pacto: ℞. syrupi Ros. sol. Violarum ana ʒ. j. cum decoctione Fructuum Mesuæ: Exhibeatur.

Si quandoq; ad fortiora transcundū erit, sic fiat: Rhubarbari ʒ. iij. infundatur in aqua Rosarum & Violarum; exprimatur; adde, syrupi Ros. sol. ʒ. j. vel plus: Detur.

Vel: ℞. Senæ (cuius succus rhubarbari succo non absimilis) ʒ. ij. vel iij. Polypodij ʒ. β. Prunorum acidulorum num. vj. decoquantur, colaturæ adde, syrupi Ros. sol. Viol. ana ʒ. β. fiat potio.

Alterantia exhibentur, tū febris comitis causa, tū ob intemperiem calidam capitis; In forma potissimum illis grata; potus præcipue, cū valde sitiant, nam medicamentosa non libenter assument: quibus & humorem biliosum, si quis adsit, ante purgationem præparare oportet. Horum compositiones variæ in febribus occurrunt, proin pauca hîc tantum exempla proponuntur.

Iusculis, Acetosa, Lactuca, Buglossum, incoquantur: & harum aqua illis permisceatur: vt & succus Citri & Acetum roseaceum.

Potus loco, Aquæ coctæ quam bibit, syrupum de Ribes, de Granatis, de Limonibus, Granatorum vinum, vel alios succos acidos, permiscebimus.

Vel Iulepos per vices quantitate decenti per se exhibebis, vel potui adicies.

Hoc pacto: R. syrupi vel vini Granat. de Berberis ana ʒ.ij. Viol. ʒ.j. de Papauer. (propter vigilias) ʒ.β. aquarum Lactucæ, Acetosæ, Rosarum, Buglosi, ana ad quadruplum: Bibat. Syruporum loco, succi vsurpari possunt.

Conserua in eundem vsu parata, frequenter fumenda: Vt: R. conser. iij. Cordialium ana ʒ.j. condit. Caulium Lactucar. carnium Citri ana ʒ.vj. seminum Acetosæ, Endiuæ, Portulacæ ana ʒ.β. pulu. Diamarg. frigid. ʒ.j. syrupi de Granatis vel Ribes: fiat electuarium.

Capiti ab initio mox dum humor fluit, vel vapores ascendunt, quæ eos repellunt, sunt adhibenda, frigida & astringentia nonnihil.

Oxyrhodina in hunc vsu conueniunt, sic parata. R. aquæ Ros. Plantag. ana ʒ.ij. olei Ros. ʒ.ij. Aceti ros. ʒ.j. misce.

Vel sic: R. olei Rosacei omphacini ʒ.j.β. vnguenti Popul. Aceti ana ʒ.β. Album. oui num.j. agitentur: Applicentur fronti.

Decoctum verò repellens sic fiet: R. fol. Salicis, Lactucæ, Plantag. ana m.j. florum Rosarum p.ij. Violarum p.j. seminum Plantag. Myrthi ana ʒ.ij. decoquantur in Aqua ferrata.

Refrigerantia & humectantia postea adhibentur: quibus soporifera permiscemus.

Hac forma: R. succorum Lactucæ, Solani ana ʒ.ij. Plantag. ʒ.j. Panni intincti applicentur.

Æstatis tempore ex aquis potius paramus: R. aquarum Rosarum, Solani, Lactucæ, Nenuph. ana ʒ.ij. Plantag. ʒ.j. Intincti panni adhibeantur.

Decoctum pro irrigatione tale fiat: R. fol. Violarum, Lactucæ, Solani, Nenuph. Semperuiui, Portulacæ an. m.j. florum Viol. Nenuph. Borræ. ana p.j. seminum Lactucæ, Papau. ana ʒ.ij. Hyoscyami ʒ.j. fiat decoctio: Pro irrigatione.

Inungatur postea caput sequenti vnguento: R. oleorum Violarum, Nenupharis ana ʒ.j. Rosacei ʒ.vj. de Papau. de Mandragora ana ʒ.β. vnguenti Popul. ʒ.j. (camphoram non addimus, quia vigilias facit) misce cum pauca Cera alba: Pro inunctione.

Pulueres tunc loco inuncto inspergere

possimus, hoc modo: R. flor. Rosarum, Violarum, Nenuph. femin. Lactucæ ana ʒ.ij. Papau. albi & nigri ana ʒ.j. Santali rubri, Coriandri ana ʒ.β. misce.

Cum iam remittere incipit delirium, addimus discutientia quædam cum enarratis formis: qualia in humore melancholico, melancholiam & maniam causante, præscripta fuerunt, temperatiora nonnihil. Et præsertim tunc inunctionibus contenti sumus, addendo oleum in quo Serpillum incoctum fuerit, & Chamomill. Et postea sinapizando, vt vocant, caput.

Vt sequenti puluere, qui & cerebrum confortat: R. seminum Coriandri ʒ.ij. florum Rosarum, Chamomil. Lauandulæ, Anthos an. ʒ.j. rad. Ireos ʒ.β. Santal. omnium ʒ.j. fiat puluis.

Præter hæc cum delirium in summo est, remedium singulare & probatum existit, ex carnibus & sanguine animalium, repentibus adhuc, capitis vertici applicitis, paratum: quæ tanquam assa ex summo capitis æstu cum deponuntur vaporem aliquem emittere videntur, & sola ferè iuuisse, sæpius obseruaui. Quod an discutiendo, vti voluerunt, id faciat, vel impetum sanguinis sistendo, longius hic disputare nolo: hoc scio, vt in hæmorrhagijs dicetur, mirabiliter hæc sanguinem è vulnere fluentem sistere. In hunc vsu autem sequentia ferè eliguntur.

Animalia quædam integra per dorsum secta, moxque exenterata: vt agnus, catellus, pullus columbinus vel gallinaceus: vel partes illorum sanguineæ: vt pulmo arietis, castrati, agni: vel hepata: aut aliæ quoque carnes à recenter mactato animali tepida, vti & alia omnia, vel si refrigerata sint, calefacta, adhibita.

Cordis causa, illius regioni, tum febris, tum imbecillitatis, ob geminum morbum, ratione, roborantia applicantur epithemata. Quæ & pulsibus alligari in panno possunt. Qualia in febribus & prius in melancholia proposita fuerunt.

Fietque simplicius hoc modo: R. aquarum Rosarum ʒ.iiij. Violarum, Buglosi ana ʒ.ij. Aceti ʒ.β. Santal. omnium an. ʒ.j. Croci ʒ.β. Camphoræ gr. vj. misce.

Hepatis habetur quoque eandem ob causam ratio: illiq; epithemata apponuntur.

Pectus etiam oleis relaxantibus frigidis, vt Violaceo inungitur.

Testesque actu & potentia agentibus refrigerantur.

Crura & brachia totius corporis refrigerij causa, & vt dormiant facilius, abluuntur: herbarum Vitis, Violaria, Lactuca, Papaue-
ris & similium decocto.

Viuendi ratio non tam virium conseruandarum causa, quam vt alterando nonnihil iuuat, instituenda.

Aër ad frigidum inclinet. Cæterum an in tenebris: vel luce, vt minus delirent contineri debeant, admodum se torquent aliqui, cum illis falsa spectra tam in luce, quam in tenebris appareant: satius tamen illos loco paulò obscuriore contineri.

Cibus refrigerans & humectans, sicuti febricitantibus conuenit esse debet. Herbis & alijs frigidis, conditus, vt Lactuca, Endiuia & similibus: Omphacio quoq; & Aceto, succisq; alijs acidis frigidis. Et cum delirantes quid faciunt, nesciant, cibumq; sæpè non solum, sed & alia abominabilia deuorent, non est mos ipis gerendus, sed cum tenuis visus esse debeat, subtrahendus: & Hordeo, Prunis; alijsque leuioribus cibandi.

Potus, dum sauiunt, si Aqua, per se vel coctione prius præparata, bibita. Cui syrupos, vti supra dictum, præparationis & alterationis causa, permiscemus.

Quæ ad somnum, motum, animique affectus concernunt, in symptomatis iam explicabuntur.

Symptomata enim quæ præter delirium accidunt, alia quoq; tum causa capitis morbi, tum febris comitis illis superueniunt: quorum rationem habere oportet.

Vigiliæ ob cerebri summum calorem, illis communes & noxiæ sunt. Quæ & in genere iisdem remedijs morbo resistentibus, vt dictum, cum refrigerent & humectent: præsertim externis, quibus soporifera eo nomine adduntur, corriguntur: & priuatim illorum causa medicamenta soporifera cordialibus permixtis, vt suo loco dicetur, exhibentur.

Motus inordinati, ob deprauatam imaginationem, illos adeò exagitant, vt è lecto surgere omni vi, & se induere, & nisi coërceantur, effugere conentur: vnde sæpè mentis impotentes ex alto cadunt, mortemque sibi inferunt. Quæ inquietudo, soporiferis similiter exhibitis, cum animo quiescente, corpus quoque quiescere necesse sit, castigatur. Atque vt cohibeantur, quod cum rabies illos robustos faciat, perdifficile est, vinculis interdum constringuntur: quæ tamen nonnunquam, cum eo nomine irascantur, magisq; ferociant, relaxare illisq; aliquid concedere, cautione tamen magna adhibita, ne se ipsos aut alios lædant, oportet.

Vrinæ suppressio illis peculiare symptoma est, cum adeò intenti in suas imaginationes, urinae stimulum non sentiant, proin eam reddere non curent: ex cuius retentione vesica nimium impleta distentaque, postea magna difficultate lotium reddit. Quibus non illos admonendo maturè, matulamque ostendendo, & remedijs externis admotis, de quibus in vrina retenta agemus, medebimur.

Linguae ariditas, nigredo, quæ summum febris incendium denotant, vt suo loco explicabitur, corrigitur.

Sitis quæ illos valde ob calorem excruciat, alterantibus frigidis & humidis, præsertim in potu exhibitis, vt iam dictum est, & in siti generatim dicetur, emendatur.

Imbecillitas virium & prostratio ex pulsu cognita, cum inquietudo illos alioquin exagitant, eis, vt dictum, robur addere videatur; victus ratione; & medicamentis cordialibus, intro forisque vsurpatis, vt & iam dictis, reparatur.


A praua conformatione, ab ortu homini innatam stultitiam, cum partes semel formatas aliter formare impossibile sit, curare velle; Aethiopem lauare, & dealbare, effect conari. Sicuti & impossibile, si à temperamento peruerso hoc accidit, aliquid velle immutare: quod tamen interdum ætatis mutatione, castratione, vt in mania dictum, emendatur. Vbi & consuetudo multum facere potest: qua factum, vt Cimon ille amore Iphigeniæ, cum stultos suos mores ei displic-

*Stultitia
à Confor-
matione
praua et
intempe-
rie, cura-
tio.*

displicere cognosceret, illis sensim commutatis, ex stulto sapiens factus sit: sicuti hoc siue verum siue fabulosum, rationi consentaneum est.

*Mania
in Putre-
dine.
Macu-
la. Vermi-
bus, in ce-
rebro, cu-
ratio.*

A putredine vel macula, aut vermibus, uti voluerunt, si exorta sit mania ob vapores inde cerebro demandatos, ægre curam hisce quæ ferè nos latent accommodare possumus. Si tamen ea cura, quæ in mania ab humore melancholico orta, descripta fuit, hæc quoque adhibeatur, minimè peccabitur. Sed si vitium graue est, incurabile est.



DE MENTIS DEFATIGATIONE.

CAPVT IV.

Genera.



MENTIS defatigationem appellamus, cum sensus interni plus vel longius quam conueniat, exercentur: vel non tempore ipsis præscripto, per somnum qui animi quies est, aut nõ sufficienter quiescunt. Vti fit cum non dormiunt in vigilijs nimijs. Vel cum dormiunt, sed inquietè per insomnia grauiora. Quæ & in sanis & ægris nonnunquã debilitant, molestiam quæ pariunt, morbosque augent.

Vigilia.

Vigiliæ nimix & præternaturales sunt, quando omninò non dormiunt, per aliquot dies, menses. Vel non sufficienter, & terminum septem vel octo horarum vel plurium, pro naturarum consuetudine, cum infantes plus dormiant quam vigilent, adimplent. Hæ siue morborum sint symptomata, siue extra hos contingant, noxam tandem inferunt: cum spiritus propter nimium illorum vsum & exagitationem accendant, vnde humores quoque, calidos præsertim accendi contingit; & eosdem tandem absumi.

Hincque corporis functionum aliquarum imbecillitatem, tandem sequi necesse est: Vti etiam animalibus spiritibus consumptis, sensuum internorum defectum aliquem, & per consequens externorum quoque: visionis imprimis, cum ad illam edendam tanta spi-

rituum copia opus sit. Dein & consecutione quadam vitalium quoque spirituum dissipatione facta, languor totius sequitur corporis. Et naturalibus simul offensis, naturales læduntur actiones: concoctioque imprimis, non quòd somnus uti putant concoquat, sed quòd concoctio, cum spiritu & calore, ut rectè obeatur, copiosioribus indigeat, horum penuria citius quàm aliæ ferè offendatur.

Sed & molestias doloresque certis partibus vigiliæ immodicæ adferunt: idque quia spiritus non tantum, sed & humores ipsorum contagio accenduntur. Vnde spiritibus sanguineque per vigilias nimias in capite primum incalcescentibus, dolor capitis, oculorum rubedo, lachrymisque calidis eò affluentibus, pruritus ut oculos perficere sæpè cogantur, vigilantibus accidunt. Et si hæ diutius perseverent, sanguinisque massa inflammetur, febres fiunt diariæ. Et si in alijs febribus symptoma hoc vrgeat, calore adactò, febrium inualescunt symptomata. Bilis quoque in biliosis hac ratione efferuescens, per vigilias nimias, & in ventriculum effusa ac ebulliens, ventriculi rofiones, aliæque illius accidentia, & per illius consensum capitis dolorem, vertiginesque parit.

Insomnia præternaturalia sunt, quando per somnũ sensus externi tantum quiescere videntur, interni autem, non leuiter duntaxat, ut per insomnia naturalia fit, sese exerunt, sed immodicè & cum vehementia & labore, ac si vigilarent, licet deprauatè se exercent, spiritusque etiam exagitant & dissipant: ita ut excitati potius defatigati, quàm refecti, videantur.

Immoderata insomnia, corpus lassum & debile reddentia, sunt, quæ præter consuetudinem longius & tota ferè noctem durant. Hoc autem alijs naturaliter accidit, ut insomnia tunc primum, cum vapores, qui somnum perfectum efficiebant, discussi iam sunt, post primum, ut vocant somnum incipiant: Alijs verò, uti operarijs, labore defatigatis & post cibum mox dormientibus, ob vaporum copiam, somnus adeò obrepit, ut insomnia nulla penitus habeant, vel si quæ ipsis oberrent, eorum minimè recordentur.

Quod

Quod ipsum licet naturale quoque sit, rusticus tamen ille non conueniens esse, nulla posse se inter pocula suis combibonibus infomnia recitare, existimans, ob eam causam Medicum consuluit, acceptoque ab illo purgante forti pharmaco, superdormiens lectū concassasse somniauit, post expergesfactus, & infomnium se habuisse, illudq; verum & fatidicum fuisse, re ipsa deprehendit.

Gravia infomnia sunt, quæ nō leuiter tantum animum exercent, vti naturalia (quæ & proin cum non admodum cerebro imprimantur, facile vel omnino vel ex parte memoria elabuntur, vt expergesfacti pauca referre queant) sed admodum exagitant, & sensus non minus ac si verè illa acciderent, quæ illis per somnum apparent, afficiunt: adeo sæpe, vt terrore percussi subito excitentur: vel si in somno nihilominus perseuerent, omnino inquieti sint, & corpus variè per somnum iacent, sudent, nonnunquam & loquantur, multa garriant, plorent, rideant, vociferentur: Imò & dormientes adhuc, nihilominus è lecto surgāt, & quod Galenus sibi accidisse scribit, ambulent, vel varia loca peruadant: in quo vulgus, quomodo sine periculo, si nō impediuntur, vel proprio nomine vocati excitentur, aliàs vigilantibus impossibilia ardua loca scandere possint, multa superstitiosa & anilia sibi persuadet. Cuiusmodi quamplurima, & ægotantibus & sanis alioquin, graua infomnia, indies offerri, omnibus notum existit.

Talia autem sunt, si horrendæ res inter dormiendum illorum animis obuersentur, quibus vel vehementer terrentur: vt cum se periclitari ob vim illata, casum exalto, ignem, aquam, somniant. Vel propter offensam magnam, aut ob amissionem rei gratæ, illis representatam, irascuntur, tristantur & dolent.

Portentosa quoque infomnia prognostica, præsertim mali aliquid portendentia, admodum percellunt: & licet boni quid præfagiant, nihilominus aliquomodo commouent. Quæ à spiritu bono & malo hominibus immitti, tot historiæ sacræ & prophanæ testantur.

Causa.

Causa tam vigiliarū, quàm infomniorum, alia est supranaturalis, à Deo, vel dæmone dependens. Alia naturalis: ex consuetudine, quæ altera est natura: vel in cerebro latet, estq; spirituum animalium nimia commotio vel perturbatio; vt cerebri intemperies calida.

Deus Opt. Max. vt vigilantibus nobis voluntatem suam patefacit, animisque nostris inferit: sic & per infomnia, de futuris, vel etiam præsentibus aut præteritis, nos quandoq; admonere vult: Visionibus interdum per se incognitis immisis, quarū tamen interpretationem nonnullis, vt Iosepho, Danieli, concessit: Aliàs verò rem ipsam qualis est, per infomnia veluti ob oculos posuit: sicuti futuram annonæ caritatem Pharaoni: monarchias securas Danieli: præsens periculum Iulij Cæsaris, vxori eius: præteritam mortem Cæycis mariti, vxori Alcyoniæ.

Sed & dæmon, Deo concedente, vt falsis rerum speculis & simulachris dormientibus sæpè illudit: sic & veris interdum, aliquid certi significantibus, si modò illis nocere possit, cum alioquin mēdax sit, in infomnijs homines perturbat.

Consuetudo sæpè facit homines certa noctis hora excitari, diuque vigilare. Quemadmodum naturam assuetam, sua tempora obseruare, in excretionibus quoque, alijsq; illius operationibus naturalibus, sæpè iam docuimus. Quod senibus in vigilijs familiare admodum est: qui licet ad somnū procliuēs sint, citiq; se lecto dent, tamen vel circa medium noctis, aut citius aut tardius excitati, dormire amplius nequeunt: hocq; illis postea consuetū fieri solet: accedente interim cura & cogitatione, quibus dum varia scrutantur & disponunt, magis expergescunt. Sed & infomnia quædā, ex consuetudine quadam in habitum veniunt, vt postea diu eiusdem generis infomnia somniēt, nec solum mente concipiant, sed dictis factisque in somno exprimant.

Spirituum animalium nimia commotio vel perturbatio, vigilijs & infomnijs præternaturalibus causam præbent. Quod sit in-

Præternaturalis causa infomniorum.

Consuetudo, causa vigiliarū & infomniorum.

Spirituum animalium commotio.

causa *gignitur* Externis sensibus nimium affectis: tunc enim spiritibus agitat, cum non quiescant, dormire minimè possunt, sed vigilant: vel si dormiant, in somnijs nihilominus vel nimis vel grauioribus diuexantur. Quæ internorū sensuum impulsio, vel ex accidenti ratione externorum sensuum: vel per se illis accidit.

Externi enim sensus admodū à proprijs obiectis commoti, internos quoq; mouent & quiescere non sinunt, vel si quiescant, nihilominus commouent & impellunt. Vt visus luce nimia: auditus strepitu magno, somnum auertit, & dormientes inquietos reddit vel excitat, cum ad somnum silentium potius & tenebræ requirantur, Tactus imprimis dolore & molestia affectus, vigilare facit: quo nomine in morbis quī dolore excruciant, vigilijs simul molestantur: & dormientibus dolorem per insomnia repræsentant. Et qui cardialgia, stomacho nimis pleno laborant, inquietè dormiunt. Quod & illis qui aliam aliquam molestiam in morbis patiuntur accidit, vti sitientibus admodum, qui sitis causā vigilant: vel si dormiant eiusmodi appetitu bibendi per insomnia quoq; excruciantur. Vt & illis qui dispnoea in morbis varijs pectoris & hydrope anguntur, euenit, vt dormire nequeant: vel si obdormiant, suffocationis periculo angustati, talia quoque habeant insomnia.

Per se etiam sensibus nimium commotis intentione vehemētī animi in rem aliquam, spiritibus agitat, vt sit in animi affectibus vehementibus & perseuerantibus, scilicet gaudio, ira, timore, mœrore, amore, vigilijs nimis affliguntur: vel si dormiant, suis affectibus nihilominus per insomnia exagitantur. Sed & tot rerum species & imagines, & variarum scientiarum, artium studijs, & humanis actionibus profectæ, apprehensæ & cerebro impressæ, memoriam vigilantium non tantum exercent adeo, vt minus dormiant; sed & dormientibus adhuc obuersantia, spiritusque commouentia, per insomnia repullulant: & vel quæ eodem die, vel præcedentibus, vel diu ante occurrerunt, vel eadem forma qua erant, se repræsentant: vel ex commistione eorum varijs formis enatis, mira quæ vel non

acciderunt, neq; in rerum natura inueniuntur spectra, se nobis offerunt. Hincque fit vt sæpè talia insomnia ob enormitatem, quorum tamen quoque causa naturalis est, commixtio scilicet hæc formarum (vt si quis equum elegantem interdū viderit & hominem, centaurum se videre somniet) portentosa esse existiment: vulgusque propter insomnia diuersitatem, quæ non mirum ob tot mentis concepta variare, singula aliquid portendere magno errore sibi persuadeat.

Sed & decubitus forma, per quam spiritus animales commoti, minus in sua sede quiescunt, sed facilius locum mutant (vt hoc fieri posse in membris diu non naturali situ retentis, ob spiritus impeditos stuporem patientibus, & corporis circūactu propter discurrentes spiritus in vertigine videmus) ad insomnia turbulentiora faciendū multum facit. Vti per decubitum supinum capite præsertim decliui accidere cernimus: spiritibus tunc à capite spinalem medullam magis penetrantibus, motumque & sensum adeo mouentibus, vt licet minimè excitentur, nihilominus tamen per insomnia magis exagitantur.

Perturbatio quoque spirituum cerebri à vaporibus impuris, tetrīs, melancholicis, vel humoribus, insomnia graui & turbulenta, spectraq; similia per somnū apparentia, efficit. Et quemadmodum iucunda & læta somnia; salubrem constitutionem, sic hæc tristia & horrenda insomnia, melancholicam plerumq; constitutionem, morbosq; sæpè futuros prænunciant. Vehementerq; in morbis eiusmodi, à melancholia malignaq; materia genitis, vnā cum alijs cerebri accidentibus & desipientijs, hominem exagitant, vigilijsq; quoq; causant. Sed & à certis quibusdam assumptis insomnia terribilia fieri, scribit Diosc. vt si fabæ, lentes, phasæoli edantur: & similacis femina & picnocomi doricionium item assumantur: spiritibus sine dubio ab horum viribus perturbari consuetis.

Calida cerebri intemperies, spiritus si mul accendens, quia inquietos facit, & vigiliarum & insomnia præternaturalium causa esse potest. Quod à vaporibus non nunquam

*Spiritus
animales
per
turbatio,
causa
insomnia
morum.*

*Calida
intemperies
cerebri,
causa
vigiliarum
insomnia.*

harū & nunquam calidis, ab assumptis profectis e-
Infom- *niortum.* *nienit:* vt cibis calidioribus & præsertim vi-
 no: quod etsi somnum narcosi sua conciliet,
 tamen infomnia inquieta parit. Ab humo-
 ribus vel excrementis calida euaporatio: vel
 ipse humor sanguineus cerebrum inflam-
 mans, vt dolorem capitis, delirium sic & vi-
 giliis & infomnia grauiā, turbulenta, & quæ
 naturam humoris referunt, sæpè in febris-
 bus, in phrenitide, alijsque morbis calidis
 procreant.

Curatio.

IN Curatione causæ & symptomatis ha-
 betur ratio. Causam autem vigiliarum &
 infomniorum diximus à Deo; dæmone;
 consuetudine: spirituum agitatione & per-
 turbatione; cerebriq; caliditate proficisci.

Infom- *niorum* *à causa* *præter* *naturali* *curatio.*
 A Deo immissa infomnia, cum bonā sint,
 nihilq; à Deo nisi quod bonum est, vel in bon-
 um finem tendit, proficiscatur, mutare nec
 possumus, nec debemus: dæmonis artes,
 precibus, ieiunio, vitæq; emendatione & fi-
 de indubitata auertuntur.

Consuetudo tanquam altera natura non
 facile nisi contraria consuetudine mutatur.
 Quare qui certa noctis hora excitari solent,
 tardius dormitum se conferant, vel alio mo-
 do consuetudinē hanc immutent: & à pro-
 fundis cogitationibus, somni tempore, quo-
 ad fieri potest, abstineant. Infomnia quoque
 si ex consuetudine hominem ita angant, vt
 inquietus sit, gestiat, loquatur vel ambulet,
 tunc aliquoties perterrefaciendo sunt exci-
 tandi: hinc enim fit, vt terror ille repetitus,
 per infomnia tandem se illis offerens, sponte
 eos excitet, & à mala hac consuetudine sen-
 sim auertat. Vt quidam cum noctu ambula-
 re soleret, virgis aliquoties cæsus, tandem
 hanc consuetudinem reliquit. Et sutor ille,
 qui cum se suere per infomnia existimaret
 diductisq; brachijs, vt filum trahendo face-
 re solent, vicinum solum percuteret, ab eo-
 dem simulante se, quod equitaret, somniare,
 pedibus egregiè sæpius iterum percussus, ab
 hoc errore tandem fuit liberatus.

Vigilia *rū à Spi-* *rituum* *commo-*
 Si verò ex spirituum nimia copia vigilare
 cogantur, vel infomnijs grauentur, causæ
 quæ illos exagitant, primum auertendæ e-

tionē co- *ratio.*
 runt. Vt si luce nimia aut strepitu somnus
 impediatur, aut inquietius dormiant, tene-
 bris inductis, & quiete, hæc erunt declaran-
 da. Si animi affectus id faciant, sicuti in men-
 tis alienationis illa specie dictum fuit, corri-
 gantur, eaq; quæ lætitiā adferre possunt, &
 soporem simul conciliant, vt vinū, exhiben-
 da. Præsertim verò si in rem aliquam nimis
 intentio, & de ea discursus factus, somnum
 impediat, nec animus ab eo possit ad quie-
 tem capiendā abstrahi; meditatione alterius
 rei, à priore animo auocato, somnus hac ra-
 tione conciliatur facilius, sicuti noctu vigi-
 lantes, si precibus deuotè ad Deum admo-
 dum intenti sint obliti aliarum curarum, citi-
 tius obdormire obseruamus. Quod si verò
 molestia quædam infomnes faciat, aut in so-
 mno perturbet, vt sitis, tunc quæ eam exci-
 tant, falsa, in cæna præsertim erunt omitten-
 da: somnusq; qui superueniens sitim feda-
 re solet, erit expectandus: si perseveret, vt suo
 loco dicetur, emendanda. Ita quoq; si ex re-
 pletionē inquietius dormiat, cæna parca &
 sobria vitium hoc emendare solet, idq; præ-
 sertim si nō statim à cibo sumpto dormiant.
 Si dispncea propter decubitus contracta, ita
 angat, vt dormire nō possint, erecti sic collo-
 candi, vt liberius spirare, & corpus nihilomi-
 nus quiescere possit, vt in dispncea explica-
 bitur. Sicuti & si decubitu supino infomnijs
 diuexentur grauioribus, si in latete, capite
 magis elato, dormiant, minus grauabuntur.
 Si quoque dolor grauis in morbo aliquo, so-
 mnum, vt hoc est frequentissimū, impediat,
 isq; alia ratione mitigari non possit, sopori-
 feris medicamentis, cum & stuporem indu-
 cant, eadem opera & somnū conciliabimus,
 & dolorem mitigabimus: exhibitis, si maior
 vrgeat necessitas, potiùs, cum sic potentius
 operentur: vt vino: vel si fortioribus vtendū
 sit syr. de papauere: alijsque opiatīs. Aut vi-
 guentis temporibus & fronti adhibitis: qua-
 le Populeon est; Et pedum lotionibus, quæ
 ad somnum inducendum plurimū quoq;
 possunt; sicuti in hypnoticis varia eiusmodi
 explicabuntur, vt emur.

A perturbatione spirituum, si vigilæ vel
 infomnia prodeant, causa etiā auferenda erit.
 Quæ si à cibo vel medicamento proueniat;

Infom- *niorum* *à Spi-* *rituum* *commo-*

turbatio
ne, cura-
tio.

à leguminum vsu aliorumque sursum euaporantium, erit cauendum. Si à vaporibus vel humoribus hoc accadat, quodnam extremum vapores sursum emittat, qui humor peccet, diligenter indagando, hisce euacuandis intenti: si plethora sit, per venæ sectionem, si cacochymia per purgationes: exhibitis quoque ijs, quæ vapores reprimant: post coenam maxime & diæta in coena præsertim moderata, ne tales gignantur; aut ascendant cauendo; medendi scopum adimplebimus.

Vigilia-
rum &
insom-
niorum à
Calida
intempe-
ria, cura-
tio.

Si cerebri calida intemperies vigilias & insomnia causet, sitq; calida quedam euaporatio à cibo; vel vino potissimū, vt diximus, frigida in fine mensæ, vt de aceto dictū fuit, aliq; sumpta quæ & actu refrigerant; eam corrigunt. Quo nomine aliqui si aquā frigidā cum dormitū eunt, bibant, suauius dormiunt. Si verò in morbis hoc accadat, tunc ea quæ morbo sanando competunt, cum frigida sint, hic quoq; iuuabūt. Præsertim si soporifera & narcotica illis quæ intus forisq; adhibentur, permisceantur: sicuti in delirijs & cephalalgijs calidis explicatum fuit.

DE TACTVS LÆSIONE.

CAPVT V.

Genera.

Stupor.



SENSVS tactus primū læditur, quando aboletur, diciturq; Stupor, Narce, nō ea ratione, sicuti cum mentis functiones abolentur, suporem quoq; vel stupiditatem mentis vocamus: vel cum ex affectu animi immoderato, eos stupere dicimus, adeo sæpè, vt etiam si vulnerentur, illud tamen non sentiant, donec ad se redierint: Sed hic stupor propriè appellatur, cum pars adeo sensu tactus, quo prædita erat, priuata est, vt nō amplius obiectæ rei qualitates sentiat. Idq; vel omnino non, ac si mortua esset: vel aliàs diminutè admodum, ac si vt vulgò dicitur, obdormiuiisset.

Generalis aliàs stupor est, corporis multis partibus simul eueniens. Qui frequentius

motu simul cum sensu abolito, accidit in paralyfi, in qua pars resoluta vel omnino, vel ex parte saltem stupet. Interdum antequam motus aboletur, stupor prius inuadit, paralyfimq; præcedit, in eamq; tandem definit. Rarius stupor ille generalis solitarius inuenitur: qualem tamen, in quo corpus vndiq; stupebat, ex vinolentia accidisse, se vidisse testatur Fernelius.

Particularis stupor certis duntaxat partibus euenit, non tantum paralyfi particulari affectis: sed & non resolutis partibus, interdum in manibus; pedibus; facie; vt mihi post epidemium morbum in coxæ parte stupor iam multis annis relictus est, id nonnunquam solet contingere. Forteq; intrinsecus in vesica & podice non tantum, quando resoluntur, sed & cum sensu saltē tactus abolito, stimulum amittunt nec ad excretionem vt eam rectè obeāt, sollicitantur, id euenire, causasq; quare aliqui ad deiectionem & mictionem adeo tardi sint quandoque, vt illic dicitur, esse potest: Sed & in partibus sensu tactus præditis, quæ motu voluntario minime mouentur, proin nec resolui possunt, vt cute, membranis, internis visceribus, ventriculo, intestinis, solitarius hic stupor, vt in alijs que mouentur, potest accidere.

Deprauatur sensus tactus, non quando ex obiecto suo ita afficitur, vt tristis fiat sensatio, quem dolorem vocant, & ad deprauatū sensum tactus referunt; nos verò, quia tunc obiectum suum tale quale est, & se offert, sentit, non ad deprauatum sensum, dolorem sed accidētia simplicia inter symptomata, vt suo loco dicemus, potius referendū arbitramur: sed cum falso sentit, & veluti hallucinatur, vt alij sensus, quando putant se videre, audire, gustare, quæ talia qualia repræsentantur minime sunt; tactum, si sic afficiatur, deprauatè sentire dicimus.

Talis est sensus ille, qui ex contactu rei allicuius, illud nō rectè, sed in se ipsa pars aliud quid sentit: vt cum discursum aliquem veluti fornicarum per partem fieri sentiunt; vnde Fornicationem hunc affectum recentiores appellauerunt.

Item alter sensus: quando aëre vel aqua, ac si summè frigida vel calida & vrentia essent, membrum

Formi-
catio.

Sensus
falsus
caloris

et fit. membrum cum tangitur, affici & perfundi
perufo- deprauate sentiunt.
ra intus

que. Quibus & noua species rario, à me primum obseruata aliquoties, accidit: sensus quoque molestus, auræ vel aquæ ardentis vel frigide, circa œsophagum & ventriculum, in deglutione maxime se manifestans: Symptoma paralyticis vel conuulsis, cum difficultate deglutiendi, loquendi, ridendi, tussendi, vt in illis demonstrabitur, interdum adueniens. Vel etiam sine resolutione partium istarum, tantum sensu hoc molesto, admodum homines diuexans.

Huc & refertur sensus ardoris vehementis & intollerabilis, quo virum in malis & buccis: item mulierem in linguæ lateribus citra apparentiam aliquam, ad extremum usque, quam diutissime multis annis excruciatos vidimus.

Quos sensus ad deprauatum sensum tactus, vel si hoc semistupente membro accidat, & nihilominus molestiam hanc sentiente (vnde stupidum dolorem Archigenes non adeo inconcinne, vt à Gal. redarguitur, vocauit) ad diminutum saltem sensum tactus referre, vel compositum ex hisce affectum statuere possemus.

Hæmodia. Quo & sensum illum molestum, qui dentibus inter masticandum aliquando euenire solet, quem Hæmodiam vocant, & stuporem esse dentium putant, referimus.

Quibus quoque etiam sensus ille summi doloris, qui refrigeratis ad stuporem usque digitis, & repente iterum calefactis, ad radices usque vnguium pertingens, à Germanis Rinn vel Kalt potius dicitur, ab vnguibz vocatus, propter præcedentem stuporem, adscribi debere videatur: quia tamen hic dolor summus & perseverans, ob repentinam mutationem, & alterationem accidit, ad dolores relegandus, illicque explicandus erit.

Causa.

IN neruo omnis ferè stuporis veri, causa latet, Quæ in omni neruo esse potest, cum omnis neruus sensu tactus præditus sit, eundemque parti, cui inferitur, cum influxu spiritus animalis propriæque substantiæ com-

municatione, vt in nostro opere Anatomico docuimus, communicet. Quo ita affecto, vt illa communicatio intercepta, vel omnino vel ex parte impedita sit, si hoc fiat in neruo, qui in musculum insertus, simul cum sensu tactus illi motum confert, & resolutionem & stuporem, vt in paralyti dicitur, simul accidere necesse est. Quod quando in generali pluribusque partibus communicato neruo affecto fit, generaliore quoque læsionem multis musculis, nec dum solum illis, sed & cuti & membranis, cum à muscutorum neruis, ad has quoque partes propagines delatæ, illis sensum tactus conferant, communem sequi oportet. Si verò in priuato aliquo neruo ad vnâ tantum partem delato accidat, eam tunc saltem lædi necesse est. Sicuti vberius hoc in motus voluntarij resolutione, seu paralyti cum præstantior hæc sit functio quæ aboletur, explicabitur.

Sed & ex eiusdem nerui, siue generalis siue particularis existat enarrato affectu, accidere potest, vt motus langueat vel cesset, remanente nihilominus sensu tactus vel integro vel obtuso saltem, cum ad motum edendum maior vis spirituum, quam ad sensum, sicuti etiam in paralyti explicabitur, requiratur.

Fieri tamen quoque potest, vt & neruo affecto stupor tantum remanente motu in parte fiat: si nimirum neruus sensorius solum, hoc est, qui non in musculos sed cutem aut membranam, aut alia viscera immobilia tantum definit, afficiatur. Quales insignes cutaneos neruos, in neruorum magnorum diuisionibus duntaxat cutem membranasque implicare, atque ad partes naturales deductos, neruos sextæ & septimæ coniugationis, multis illis quæ non mouentur partibus, sensum tactus saltem communicare ostendimus. Aliosque neruos sensorios à neruis motoriiis musculis insertis, ad illas quoque quæ non mouentur partes ferri. Quibus sensoriiis neruis vel etiam motoriiis, sed extra musculum ductis, læsis, partem nunc duntaxat eam, quibus inferuntur, vel omnino, vel ex parte, prout læsio magna est, stupere contigit. Quorum tamen omnium causa eadem quæ resolutionis, diuersa sede tantum differens, esse potest.

*Nerui
motorij
affectus
causa
Stupor
cum re-
solutio-
ne, vel si
ne ea,
accident.*

*Nerui
sensorij
affectus,
causa
Stuporis
sine re-
solutione.*

*Nervi
tam mo-
torij quā
sensorij
affectus,
causans
Formi-
cationem.*

Nervi etiā cuiuscunq; tam sensorij quā motorij causa, deprauatus ille sensus formationis distē, cum molestia in partibus euenire potest. Tunc nimirum, quando spiritus animalis aliquandiu retentus, in stupente vel resolutio membro, rursus vi quadam & impetu, sublato impedimento, in illud recurrit. Tunc enim circa extremitatem membri maximē, ut digitos, quod spiritus primo impetu vsq; perfertur, vel alibi quoque quod peruat, pruritus & punctionis hinc inde sensus, spiritu vndiq; membrum veluti pungente & titillante, molestat: tamdiu, donec sufficiēter eo affluxo, pars ad pristinum sensum tactus absolutum redeat. Quod & nonnunquā validē percussio aut ictio nervo sensorio accidit: uti eo qui in cubiti gibbo circumflexus, ad annularem & minimum digiti excurrit: quo violenter casu impulsio, duo hi digiti formationis illum sensum aliquandiu donec nervus compressus ab ictu rursus dilatetur, spiritusq; sufficienter transmittatur, patiuntur: quod & in aliis locis in nervis cutaneis potest accidere.

*Nervi
tam mo-
torij quā
sensorij
affectus.
Sensum
deprauatum
caloris
vel frigoris
inducens.*

Sicuti quoque nervo frigido humore affluente imbuto, sensum auræ illius vel aquæ frigidæ (quemadmodum similem auram frigidam ē dente cauo, defluxione frigida molestato exire, lingua experimur) membra quæ afficiuntur, percipiunt. Quæ etiam calida vel aura vel aqua, à spiritus calidi copia & impetu, qui nervum impedimentum transire non potest, illic copiosè collecto, suo calore talem sensum præbens, simili modo, uti de frigida dictum, membrum quod afficit, molestat. Quod uti in omnibus nervis resolutionem quoque vel stuporem adferentibus euenire potest, sic & illis, qui à 6. & 7. coniugatione, partibus vitalibus, & naturalibus motum & sensum præbent, si accidat, circa ventriculum & cesophagum occurrentem illum ardorem, uti dictum, producit. Quorum causas rectius in paralyti, cum hosce affectus illa vel præcedat, vel comitetur, vel sequatur, explicabimus.

*Membra
natum
& cutis
afficitur.*

In instrumento sensu tactus, cute scilicet & membranis, causam stuporis esse posse, cum illarū substantia ex nervo dilatato con-

flata sit, verisimile videtur: non quando calore nativo extincto penitus, hæc partes per gangrænam emoriuntur, sed cum tantum stupent, adeo ut vel nihil, vel obtusè hæc sensus instrumenta sentiant. Quod aliquando accidisse in cute totius corporis, ut iam dictum, ex violentiā, scripsit Fernelius: in quo casu, si vinum sua narcosis, non hoc fecit, quia generalem stuporem excitavit, ut in mentis consternatione dictum, certè vis illius narcotica tantum in cutis sensu abolendo se manifestavit: quod tamen quin & cerebri & nervorum quoque vis obtundatur simul, à vino vel alijs narcoticis fieri, vix potest: idcirco post solutam ebrietatem, fortè ob frigiditatem aeris externam, in quo attoniti sæpè ebrii iacent, huic quoque ebrio, cute sic obtupestacta, accidere potuit: cum frigus extrinsecus diu perceptum, talem stuporem in cutis aliqua sede, quæ frigus hoc sustinuit, fortè aliquando excitare possit. Vix enim aliàs à causa interna hoc potest euenire: quomodo verò elephantiorum cutem insensilem & stupidam, adeo ut puncta quoque non sentiat, ab interna aliqua causa & morbo cutis reddi, hætenus creditum sit: qua ratione id verum, in elephantiasi sumus declaraturi.

Sed neque ab externo narcotico cuti applicato, eam stupidam aut indolentem reddi posse, licet, ut certi aliquid cognoscerem, massam opij emollitam parti podagricæ dolenti, sed sine fructu applicari, vnumquam deprehendere potui. Quod autem hoc ex contactu torpedinis fieri posse, non solum manu apprehensa, sed & si remo piscatoris tangatur, manum illius obtupestecere, pro vero scribunt, ego cum tale quid Monspessuli, ubi torpedines tractant & comedunt, nihil obseruari, pro vero affirmare non audeo. Quapropter rarum hunc affectum esse, & qui vix accidere possit, ut cutis sola, membro cui obducitur non simul ob nervi affectum stupente, insensilis fiat, dicimus. Nisi fortè, quando ob impedimentum, quod cuticula crassior & callosior, quàm ut sensum verum alicuius rei exactè percipere possit, occasio præbe-

*Stupor
sine re-
solutione
procre-
ans.*

tur,

tur, causam stuporis illius, qui tamen verè stupor minimè est, dicere velimus.

Membranis quoque intrinsecus affectis, nervis non simul læsis, vix stupor, illarum tantum causa, potest accidere.

Nervorum circa dentes affectum, causans Hæmodiam.
Sed neq; qui dentibus accidit stupor, vel potius molestia in Hæmodia, à dentibus solum, cum sensu tactus vti reliqua ossa destituantur, existit: sed quòd dentibus; esu acidorum & frigidorum, quæ & tenuitate sua & frigiditate dentibus & nervis inimica sūt, nimium exasperatis & refrigeratis, & membranæ sensilis cum radicibus ipforum continuatione, qua fit vt dens ipse sentire videatur, similis intemperies per contactum, ei sedi quæ dentes tangunt, imprimatur, & sic sensu ipforum immutato, accidit, vt cum dentes inter masticandum pressi, illa veluti tumescencia premunt, inde sensus ille molestus exurgat, quem Hæmodiam vocant.

Curatio.

Stupor à quacunque causa curatio.
Stuporis curatio, cum alia secum & ple- runque grauiora symptomata coniuncta habeat, quæ ab eadem causa profiscuntur, in illis, ne bis eandem curam repetere necesse sit, potius explicabitur. Vt si fiat neruorum vitio; vti omnem stuporem illorum causa accidere diximus, & resolutio quoque adsit, eadem vtriusque, vt in paralyfi explicabitur, cura debetur. Vel licet ea nondum adsit, sed solus stupor partem tentet, quia tamen ab eadem causa vt & paralyfis profiscitur, vnde stuporem, diminutam vel imperfectam paralyfim vocant, eadem opera illic quoque cura illius describetur.

Cuius curationis summa hæc est. Vt si ab humore fiat, euacuetur: Si à sanguine, sanguinis detractatione reuellendo & deriuando: Si à pituita vel alijs excrementitijs humoribus, purgantibus generalibus & particularibus eam expurgando: Si ab alia aliqua causa externa, illam ante omnia remouendo: Alterantibus item neruosum genus reficiendo & roborando.

Dein vt spiritum animale ad partem stupentem, quæ eo destituitur alliciamus, atque attrahamus, actu & potentia id agen-

tibus. Qualia in paralyfi & atrophia quocumque sanguine simul alliciant, explicabuntur: inter quæ præcipua hæc in membro stupido sanando vsurpantur.

Frictione partis stupentis, manu, adhibitis quoq; pannis calidis: Cucurbitularum applicatione, cum multa flamma: Picatione item sæpius iterata: Alijsq; dolorem inferentibus, spiritus allicimus.

Vsurpantur quoq; Sinapifini rubificantes, parti affectæ admoti; Illinitiones oleis calidis varijs, inter quæ præsertim illud in quo semen Vrticæ coxerit, item Thymus, Ruta, aliaque nervis appropriata commendantur, alijsq; vnguentibus quibus in atrophia vti solemus, hic quoq; vtimur.

Fotus & balnea ex Aqua calida, tepidiorè primùm, mox calidiorè, sensim calorem augendo, conueniunt: quibus Vinum & Elixium interdum addimus: sæpeq; in eo Thymum, Rutam, Saluiam, Chamomil. Seminaq; calida decoquimus.

Cataplasma ex Stercore columbino; anserino, additis baccis Lauri: item oleis & axungijs calidis herbisq; probatur.

Calcatio racemiorum, si pedes stupeant: Aut si in aceruum vinaciorum recentium feruentium membrum stupidum intrudatur: aut in musto immergatur, pro singularibus in stupore auertendo remedijs habentur.

Quæ quoq; iam enarrata topica remedia, si à nimia refrigeratione cutis subiectorumque neruorum stupor fieret, vniuerso corpori adhibita prodesse possent.

Quòd si deprauatus vel diminutus sensus tactus in fornicatione dicta; aut sensu auræ illius vel aquæ oriatur, cum & hic stupor aliquis sit, eadem ratione curabitur.

Si verò in deprauato eodem sensu, dolor stuporem exsuperet, vt in dentium stupore quem hæmodiam vocant: vel in digitorum dolore ad vngues pertinente, vti dictum, in doloribus earum partium, quæ affliguntur rectius curatio explicabitur.



DE GVSTVS LÆSIONE.

CAPVT VI.

Genera.

Defectus gustandi.



GVSTVS deficit, cum rerum saporibus vel omnino non, vel diminutè, instrumentum gustatoriū sentit. Quod cum sensu tactus simul præditum sit, eundem vel simul amittit cum gustu: vel gustus tantum, remanente sensu tactus, labefactatur.

Deprauatus vel falsus gustus.

Deprauatio sensus gustus fit, cum rerum saporibus non tales quales sunt sentit, sed ac si alterius essent saporis, quam reuera sunt, ea percipit. Vt cum ea quæ gustat, siue insipida, aut alimentosa, aut medicamento-fa sint: dulcia, falsa, amara, acida, acerba, cum tamen talis illorum sapor reuera minimè sit, esse putat.

Causa.

Causa gustus læsionis rariùs in neruo, nisi cerebrum vnà læsum, vt in apoplexia dictum est, omnium sensuum abolitionem gignat, de qua iam actum, latet: sed frequentius in instrumento sensus gustus: tunica nimirum communi os succingente; maximè illic vbi linguam inuestit, palatumque succingit: Si illa vel nimium exicetur; vel limo obducatur; aut humore vel vapore alieno imbuatur.

Exiccatio tunicae os succingentis, causa defectus gustus.

Si exicetur & induretur nimium, in asperitate & scabritie dicta, tunc gustus impeditur, vel deperditur, vel imminuitur: adeo vt res omnes illis insipidae & ligneæ, vti conqueri solent, esse videantur: cum ad sensum rectè percipiendum mollities decens & humiditas requirantur.

Proficiscitur autem hæc, ab inspiratione seu attractione aëris, non per nares (cum sic naturaliter per narium amplitudinem mox asperam arteriam subiens aër, intraq; oris non attingens, ea minimè exicare possit) sed quando ore aperto hauritur. Tunc humiditatem linguæ & faucium ab-

forbens, eoque magis si calidus simul & siccus existat, partes illas exiccat, duriores & asperas & ad rectè gustandum ineptas inutilesque reddit. Quod vt vigilantibus, sic præsertim dormientibus, ore aperto, & sanis & ægris solet accidere. Vel ex consuetudine mala: Vel quod naribus obstructis, cum via respirationis naturalis, vel omnino vel ex parte interclusa sit, per os aërem, vel omnem vel pleniorē, si per nares non sufficienter subeat, attrahere coguntur. Quod & accidit, si corpore nimium accenso, maiori quoque, quam solæ nares admittere possint, aëris inspiratione opus habeant, vt eam tunc & narius plenis, quæ ad inspirationem eo nomine se tunc pandere solent, & ore dicto dilatatoque hauriant. Vti illis qui se calidioribus cibis impleverunt inter dormiendum euenit. Et in morbis calidis, internis inflammationibus & febribus, linguæ ariditas, frequens symptoma existit. In quibus non tam inspirationis necessitas quam etiam expiratio calida à morbis illis calidis accensa, nec tantum nares, sed & fauces peruadens, partes illas vehementer exiccat, nigroque vel viridi aut flauo colore inficit.

Exiccatio tunicae os succingentis, causa defectus gustus.

Quæ linguæ, faucium, nariumque ariditas, ab ægris ipsis cum de iis admodum quoque conquerantur, persentitur: & chirurgus contactu & visu facile potest cognoscere. Quæ & adeo sæpè inualefcit, vt lingua fissa non solum in longum, sed & transversum scissa appareat. Et cum hæc ob causas malè verba proloqui possint ægri sæpè balbutiant: Vnde Medicus hosce linguæ affectus, antequam eam inspiciat, coniectura nonnunquam assequitur.

Limo appellato si obducantur lingua vel fauces, quominus ex contactu rerum saporibus exactè percipiant, interposita hac materia insensibili, impediunt; adeo vt nullius saporis ea quæ gustant illis esse videantur.

Limo tunicae os succingentis, causa defectus gustus.

Generatur autem hic limus ex salua naturaliter alioquin fauces irrigante; sed tunc, illis præsertim in locis vbi faucibus adhæret, vel ob permixtionem alterius rei

crassi-

crassitiem adipifcente. Exiccatur enim iisdem de causis, à quibus & tunicam succingentem arescere diximus: vnde & faucium ariditas & limi huius copia, maximè in lingua sæpè in iisdem causis & morbis concurrunt, & gustui tunc magis quoque duplicata causa incommodant. Permissione autem saliuæ crascescit illic, ob vaporem à prima concoctione sursum continuè euaporantem, linguæ, faucibus & dentibus (quibus limosa hæc & tandem in tophum conuersa adnascitur materia) adhærentem, saliuæq; permixtum, coloreque vario nonnunquam & fetore partes illas defœdantem. Quod in sanis etiam, præsertim si noctu ore clauso penitus, ita vt euaporare nequeat, vapor ascendens, dormiant, & os manè non eluant, accidere solet; vnde limo hoc albo plerumque partes enarratæ successiue inficiuntur: & in ægris conditionem putridorum & malignorum humorum referens, nunc albus pultis instar, nunc subflauus, nunc niger, linguam fauces dentisque afficit & commaculat. Sed & ex pituitæ commissione saliuæ tenacior facta, hisce partibus veluti adglutinata, hæret: quod & sanis ex defluxionibus frequenter accidit: aut ægris, interdum illius causa tantam viscositatem acquirit, vt ægrè elui, vel abradi possit. Et ab alimentis tenacibus, viscositatem aliquam, qua partibus dictis accrescit, quoq; defumit.

Facileq; ex colore illius & substantia hic limus, & ex hoc affectus, vnde procedit, cognoscitur.

Imbuitur quoque tunica os succingens gustui destinata, humore & vapore, alieno sapore præditis: quem quamdiu persentit, alia quæ illi offeruntur gustanda, rectè sentire & qualia sunt diiudicare nequit, sed illa quoque illius saporis quo iam affecta esse putat.

Fithoc nonnunquam ab assumptis quibusdam, quorum sapor adeo gustui imprimitur, vt non tam citò cedere aliisque saporibus locum dare possit, vt illis commixtus, falsum quoque rei saporem gustui offerat. Quod ingrata, sæpè si assumantur, faciunt: vel quæ sapore vehementi gustum admo-

dum afficiunt: Vt cum ægris, alimentoso sapore præditi cibi, quos fastidire plerumque solent, offeruntur, & per vim quasi intruduntur, tunc quicquid etiam alterius saporis postea capiunt, alimentosum hunc saporem habere, vel redolere sibi persuadent: & cum dulcia febricitantibus plerumque ingrata, illis exhibentur, omnia postea dulcia esse iudicant. Sed & in sanis, vehementer amara, falsa, austera, gustata, diutiusque inhærentia, reliquorum quæ sequuntur saporem immutant. Hincq; fit, quod post caseum putrem, post acetum in acetarijs, assumpta, si superbibant, vinum non quale est, sed vel amarum, vel alijs magis dulce, pro naturarum diuersitate, esse videatur.

Ab interna causa proueniens alienus sapor, gustum etiam deprauat, si vapor vel humor talis tunicæ quæ gustum percipit, se insinuet. Hincque fit vt interdum dulcia omnia quæ gustantur, esse existiment, si pituita dulcis, vel ab alimento è ventriculo ascendens vapor dulcis & alimentosus tunicam dictam imbuat. Et si à chylo, quem semper acidum esse alibi docuimus, vel cibo semicocto, aut assumpto vino acido, eructans acidus vapor, vel vomitu ad os vsque sursum eleuatus, acido sapore os inficiant.

Vel à fero aut pituita falsa edè defluente, falsus sapor, dictis partibus quoque imprimatur.

Aut cum os amarescit adeo, vt & omnia quæ gustat amara quoq; esse iudicet: quod bilis causa, si in ventriculo collecta sit, communione quadam cum os succingente tunica, quæ ventricululum quoq; inuestit, sæpe numero euenit.

Tum in sanis pycrocholis, si ieiunio longiore edè rapiatur, aut ira concitata edè effundatur: vel alijs in morbis biliosis & febribus, vel copia redundans, aut calore effervescent, in ventricululum se exoneret: vel

illic ex assumptis bilem generantibus, aut in bilem corruptione desinentibus, generentur.

Curatio.

Affectus hic si per consensum à nervis aut cerebro proficiatur, communis illi cura cum apoplexia aliisque nervorum resolutionibus, quæ tunc simul adsunt, erit. Si verò per idiopathian instrumentum gustatorium, linguæ & faucium tunica, afficiatur, illudque vel arescat, vel limo obducatur, vel sapore alieno imbuatur, hisce indicatio curandi accommodabitur.

Defectus gustus ab ariditate tunicae oris, cunctis talio.
In ariditate causa primum erit auertenda. Quæ si ex consuetudine prava, quod ore aperto dormiant, nascatur, desuescendo erit immutanda. Imprimis si naribus obstructis sic respirare cogantur: tunc capite altius collocato, & subiecto pulvino eleuato, si dormiant, quod narium amplitudo tunc magis dilatata sit, liberius aërem sic attrahere posse experientia docet. Et si mucus aut pituita nares obstruat, per errhinæ erunt expurganda. Quod si viuendi ratio calidior siccitatem hanc adferat, falsis & calidioribus cibis abstineant: vinum benè diluant: acetarijs in cœna præsertim, ex Lactuca, Cichorea & similibus vtantur: nec alia ratione corpus nimium accendant. Deinde aër os frequenter subeat illudque siccet, parum loqui debent, rariusque expuant: cum salua diu retenta, quia glutinosa est, linguam potissimum humectet, & si exicata sit, rursus leniat. In interno aliquo morbo calido præsertim, vt febris ardentibus & continuis, si hoc accadat, ad febris incendium restinguendum, curatio potissimum dirigetur: & imprimis tunc cordi, hepati, partibusque vnde calor maximè exsurgit, epithemata frigidiora frequentius erunt adhibenda.

Oris tunicae postea remedia accommodabuntur, asperitatem hanc mollibus, glutinosis & pinguius leniendo & humectando. Quæ vel in ore contineant, masticeant, lambant; vel iis os colluant; aut si non possint, lingua ipsorum, digito vel bacillo adhibito illis illinatur.

Pruna, Tamarindi, Sebestena, qualia siccata afferuntur, si rursus emollita leui ca-

lore, ore retineantur, grato sapore leniendo, hoc vitium corrigunt.

Poma recentia incisa, masticata parum oreque retenta, idem præstant: vti & Melonum, Cucurbitarum, & imprimis Anguriarum caro & succus.

Portulaca recens, quemadmodum dentium asperitatem, comesta, statim corrigit, sic & fauces plurimum lenit: quod & Lactuca ore retenta, masticataque facit.

Quæ actu refrigerant, si ore contineantur, calorem extinguendo siccitatem corrigunt: vt Aquam frigidam, & Lapides; inter quos Crytallum peculiare quid adferre credunt.

Lambenda quoque, vel ori ipsorum indenda sequentia remedia, linguæ & faucium siccitatem sua mucilaginositate emendantia.

Vt: R. Albumen ouium .j. probè agitur cum Saccharo donec albescat. Vtatur.

Vel sic: R. mucilag. seminis Cytoniorum & Psyllij, extractæ cum Aqua ros. ana ʒ. ʒ. ʒ. Syrupi Violacei ʒ. j. misceantur probè.

Aut: R. prædictæ Compositionis ʒ. j. cui quoque mucilaginis sem. Pomorum addere potes, & sem. Maluæ ʒ. ʒ. infus. gummi Tragach. in aqua Rosarum ʒ. ʒ. Sacchari candi (præsertim si impura quoque sit lingua) Mellis ros. ana ʒ. ij. misce.

Has compositiones paulò spissiores factas in sacculis latis exceptas & sæpè aqua Rosarum madefactas, linguæ imponere, sicque retinere aliquandiu poterit. Vel in hisce liquoribus panni madefiant, & simili modo applicentur.

Quod & in hoc decocto fieri poterit: R. Prunorum dulc. num. vj. flor. Violar. p. j. (quia glutinositatem habent) Hordei mundi ʒ. j. sem. Cyton. ʒ. ij. Psylli ʒ. j. gummi Tragach. ʒ. ʒ. decoquantur in Aqua: ad vsum dictum: addendo parum Mellis vel Sacchari.

Vinctuosa non nihil, sed ex gravioribus parata, siccitatem hanc egregiè contemperant, eodem modo administrata.

Quale hoc est: R. Butyri recentis vel illius loco, olei Amygdalarum dulcium recentius expressi, quantum sufficit, Sacchari albi

albi vel candi vel ros. tab. agitur: Et labat.

Vel sic: R. Album oui num. j. Amyli 3. j. Lactis q. s. agitentur probè: bulliant parum donec puls fiat: adde Butyri recentis, equas partes, Sacchari albiss. q. s. fiat *Meyennius* Germ. dictum: Quo utatur.

Axungia Gallinæ vel Capi parum cocta vt gravior sit, idem præstare potest.

Syrupi, vt Violaceus, Iuiubinus alijsve, sicambi orève retineri possunt.

Collutiones oris ad hunc vsum, ex iisdem dissolutis fieri possunt.

Vel hac ratione: R. syrupi Violacei, Iuiubini ana 3. j. β. decoctionis Hordei mundi 3. iij. Vtatur.

Vel sic: R. foliorum Portulacæ & Lactucæ recent. ana M. j. florum Maluæ autumnalis, Cynocephali, Hordei mundi ana P. j. radic. Liquiritiæ 3. j. seminum Psyllij integri 3. ij. sem. Papau. albi 3. j. decoquantur in Aqua: & in 15. j. dissolue, Albumen oui agitat. num. j. syrupi Viol. vel Mellis rosar. col. ana 3. j. Vtatur.

Lacte frigido frequenter os abluere, butyroso præsertim, admodum conuenit.

Quod si verò siccitati nigredo, viriditas, flauities copulata, à vaporibus malignis linguam quoq; infectam esse significet, malum est indicium, eoq; magis, si calor insuper accedat. Tunc primum illis, quæ febris ardentis malignæ aut pestiferæ debentur, administratis: frigidioribus malignitatemq; reprimentibus, præsertim acidis erit vtendum: additis semper quibusdam, ne nimium exasperent, lenientibus. De quibus in faucium inflammationibus quoq; agemus: Quibus & sequentia adjicimus.

Acidos fructus ore contineant masticient: vt ex Malis medicis, arantia, limonia, citria: vel Punica, Pomæve alia: Pruna, Cerasa, Ribes & Berberis racemos. Et ex herbis Acetosam, Lactucam, Portulacam: sed in Aceto vel Succis acidis prius macerata: vel in Acetarijs, vti & flores Cichoræ, Violarum, cum Aceto: & similia.

Abstant dein os frequenter Aceto rosaceo in Aqua diluto. Velaqua Acetosæ.

Item brodio acido, Condituræ illius brassicæ, & raparum, quam nostri tanquam cō-

positum *Gumpist* vocant, illiusque liquore acido, vel crudo vel prius destillato vtuntur: quod ad hæc præstantissimum vsu cōprobatum, nostrorum Chirurgorum est remedium.

Aquæ puræ si tantillum Camphoræ addatur, accommodum quoq; erit remedium.

Vel paretur hoc modo: R. aquæ Rosar. 3. iij. aquæ Solani 3. ij. Album. oui agitat. num. j. Camphoræ dissolutæ in Aceto 3. s. misce.

Vel talis Iulepus: R. syrupi Acetosi simpl. 3. ij. Oxy-mel. simpl. 3. j. aquarum Rosar. Viol. Nenuph. ana 3. iij. misce.

Aliqui hoc valde laudant: R. aquæ Sedi maioris: cui adde Salis ammoniaci, tantillum.

Post horum tamen vsum ad ea quæ leniunt simul, semper erit accedendum: qualia iam dicta sunt.

Inter quæ & hoc præ cæteris commendatur: R. medullæ seminis Cucurbitæ, Mannæ selectæ, Sacchari candi ana 3. j. cum Oxy-mell. simpl. fiant formulæ: Quas ore contineat.

Reliqua remedia, præsertim si calor accedat magnus & veluti inflammatio, in faucium inflammationibus explicantur.

Limus si linguæ & faucibus adnatus gustui incommodet, & tenacitate sua & foetore molestiam quoq; adferat, causa primum tollenda erit.

Quæ si ab assumptis glutinosis tantum proueniat, os post cibum sumptum semper abluendo, donec ciborum horum reliquæ, vel succus crassus, quæ adhæserunt eluantur, facile cauebitur.

Idem quoque manè semper postquam surrexerunt, faciendum: si vel hanc ob causam, vel ob vapores à cibis noctu eleuatos talis sordities collecta sit, dentesque diligenter abstergerendi, & fricandierunt: sicuti in illorum vitijs quoq; explicabitur.

Et vt pauciores minusque crassi vapores exurgant, cœna vt sobria sit, procurandum erit.

Et ne in ore retentæ hæ exhalationes, successu temporis dictis partibus accrescant, ore parum apertò dormire cōsuescere

Defectus
flus gu-
stus, ab
Aridi-
tate lin-
guæ cum
nigredine
copu-
lata, cau-
sa.

Defectus
flus gu-
stus, à
Limo tu-
mida os
succin-
gentia,
causa.

oportet: quod cum aliqui non sint affueti facere, interposito panno, vel cannula in ore retenta, vapor exitum præbere debent.

Pituita si hanc tenacitatem in saliuam pariat; illius affluxus diuertendus erit; illaque screatu propulsanda expuendaq; præmissis si ægrè cedat, collutionibus mox dicendis, eam incidentibus & abstergentibus.

Si verò causa morbusve calidus, febris acuta, maligna, siccando vel vapores tetros sursum emittendo saliuamq; sic incrassando limum hunc crassum tetrum gignant: morbi primum habita ratione & causæ, ut iam supra dictum fuit, topica tum in hactum alia causa perseverante, parti affectæ, ut sequitur, adhibenda.

Ex ore itaq; à lingua potissimum, dentibus, gingivis & faucibus limum hunc, si admodum abundet, auferimus: iis quæ vim abstergendi, & si tenax sit admodum, incidendi quoq; habent: quibus & lenientia, ne linguam exasperent, præsertim si sicca quoq; sit, permiscuntur: actu simul agentibus adhibitis: eam subinde interim abluendo, & si non facile cedat, abradendo.

Colluitur os, abstergentibus: ut Hordei integri decocto.

Item Sero lactis cum Melle & Saccharo.

Vel sequenti: R. Hordei integri, Pisorum rubrorum, vel Cicerum ana. P. j. radic. Liquirit. 3. j. Ficum par. x. flor. Maluæ autumnalis P. j. fiat decoctio: & in t. j. dissolue Mellis vel Sacchari 3. ij.

Post collutionem, Saccharum candum ore contineat, vel Saccharum rosar. tab. vel Manus Christi: vel parum Mellis rosacei lambat.

Si maiori abstersione & incisione opus est, calidiora quædam & acida quoque si pituita summè tenax sit, adduntur.

Vt: R. Hordei, Cicerum ana P. j. Liquiritiæ 3. j. f. fol. Saluæ, Maioranæ, Hyssopi ana 3. ij. femin. Cytoniorum 3. j. fiat decoctio in Aqua & Vino albo: adde Mellis ros. 3. ij. Sacchari candi 3. j. Vini granatorum vel Aceti parum: misce, Fiat oris collutio. Si addas tantundem Alumnis, vel etiam bona quantitate, quando admodum tenax

est, potentissimè absterget.

Vel: R. aquarum Ros. Plantag. Solani ana 3. ij. aquar. Saluæ, Maioranæ ana 3. j. Oxymel. simpl. 3. ij. Aceti albi parum.

Capiat frequenter cochleas vnum Oxysacchari vel Hydromellitis, vel Oxymellitis simpl. aut squillitici, si summa adsit tenacitas: & post tempus aliquod os colluat, rursusque syropos repetat: quibus nisi cedat, Aluminis portio hisce permiscenda erit.

Vel etiam Acetum squilliticum dilutum, ore continendum: quo tenacissimam materiam quæ nullo pacto auferri prius poterat ex ore tandem cessasse, nonnunquam obseruavi.

Abradenda quoque materia hæc, si pertinaciter adhæreat: ita tamen ne nimium linguam exasperemus, si præsertim sicca admodum & fissâ sit, in quo sæpè chirurgi delinquant.

Fit autem hoc fricando linguam, uti & dentes, palatum, digito vel instrumento ad hoc apto, linteo panno obuoluto, & in collutionibus supradictis intincto. Quod & foliis Saluæ, Menthæ simili modo madefactis commodè quoque fit. Instrumento item rotundo vtitur ex salicibus parato, vel argenteo, cuiusmodi Chirurgi habent, sensim per linguam ducto spiritus illa abraditur: sæpè interim os abluendo, rursusque mox linguam inunctione leniendo. Sed & sæpè adeo tenax est pituita, & crassus pultis instar limus, ut & manibus apprehendi queat, sicq; eximi possit, vel trahi, eoq; pacto cedere cogatur.

Vapor humorve si linguam sapore alieno imbuat, & oppleat, ut alia minimè vel finistre sentiat; causa quoque declinanda primum erit.

Quæ si ab assumptis procedat, cum affectum longius perseverantem minimè inducat, & sponte cesset, negligitur: vel contrariis, ut iam dicetur, facile emendabitur.

Si verò ab interno affectu hoc nascatur: vapore terro vel humore bilioso, alimentario, illic congestis: ad hosce humores euacuandos, & morbos sanandos, curandi intentio dirigitur.

Quod

Depre-
uati qu-
stus à
lingua
Imbu-
tione cu-
ratio.

Quòd si verò sapor ille aduersus, causa sublata minimè cesset, sed diutius perseuerans, & sanis alioquin vel ægris molestus sit: contrario sapore, per exhibita, conciliato, priorem qui molestabat, vel tollimus vel emendamus.

Sic dulcis sapor, tam alimentosus quam qui reuera dulcis est, febricitantibus & alijs ægris plerumque valde aduersus, qui tamen sanis alioquin gratissimus est, corrigitur acidis primùm, quæ illum non tantùm emendant, sed & appetitum simul, quem dulcia tollunt, adserunt; & sitim quam dulcia augent, tollunt: Quæ acida in ore contineant, lambantque, inter quæ Cerasa acida, qualia siccata asseruari solent, rursusque emollita, aliaque multa eiusmodi, quæ in siti explicabuntur, oris hanc insauitatem nauseosam admodum emendant.

Quam & amara, quibusdam naturis magis accepta, præsertim si odore suauis quoque consent, vt Asynthium præcipuè in vino, quod maiorem adhuc illi addit gratiam, similiter corrigunt.

Sicuti & amarus rursus sapor diutius gustui inhærens, dulcibus vel acidis quoque, quæ illorum quæ fauces aliàs inflamment vires retundunt: & insipidis etiam, emendatur.

Quibus & falsus sapor cõtemperatur. Vti vicissim falsus sapor insipidis retunditur.

~~~~~

## DE VISVS LÆSIONE.

### CAPVT VII.

#### Genera.



**A**BOLETUR penitus visio quibusdam, adeò vt omni tempore & semper nihil videant: diciturque Cæcitas. In qua specie si nullum vitium in oculis appareat, quod visionem impedire possit, & oculis apertis & serenis cæci sint, Amaurosis appellatur. Nam si macula, vel tunica, vel humor, circa nigrum oculi apparens cæcos reddat, priuatum nomen à causa, vt in causis dicitur, obtinet.

Alias verò certo tantum tempore visum

amittunt, qui tamen mox iterum redit: nullo impedimento tunc quoque in oculis conspicuo. Vt cum à causa externa ob splendorem vel tenebras, nimia, vel subitanea oculis oblata, aliquandiu excæatur. Et cum ab interna euaporatione oculi ambo ita obtenebrantur, vt visio impedita, primùm veluti nubecula vel fumo obstante, per quæ minuta quædam corpora, interdum colore rubro, flauo vel atro tincta discurrere videtur, mox omninò aliquandiu tollatur, in affectu, qui Scotoma dicitur.

Imminuitur nonnunquã saltem visus in aliquibus, quando rerum species quas naturaliter visus alioquin assequi deberet, vbi cunq; & quando cunq; non benè vel obscure vident; idq; plerumq; nulla quoque causa in oculis se offerente: atq; Amblyopiam: id est, Visus obscuritatem, hebetudinem vel caliginem vocant. Licet aliqui, si oculi vitio manifesto diminutè veluti tenebris offusis videant, Hebetudinem, propriè magis dici existiment: & in senibus hoc vitium Caliginem vocent.

Huc & refertur visionis ea imbecillitas, cum visus res propinquas nò melius quàm dissitas, vt naturaliter fieri deberet; sed vicinas oculis minùs, quàm distantes assequitur: & proin cum res minutas cernere volunt, aut legere, procul ab oculis ea remouere coguntur. Vitium senescètib; familiare; quod cum perspicillo idoneo emendari possit, eo in rebus minutioribus apprehendèdis continuo vtuntur: ob quam causam Senum visionem appellare soleo.

Accidit verò & contrario modo, vt aliqui res dissitas, nondum tamen adeò, vt eas sani quoque ob nimiam distantiam sufficienter videre nequeant, sed exiguo tantùm spatio, licet magnæ quoque sint, rectè dijudicare minimè possint: vnde sæpè vicinos nò cognoscences, insalutatos prætereunt: picturas, scripta, nisi oculis appropinquent, nec cernere decenter, aut legere possint: nisi perspicillo huic vitio corrigendo accommodo, vtantur. Iuuenibus ab ortu plerumq; innatum, & ad extremam senectam vsq; permanens; qua appropinquate, interdum fit, vt res distantes quas minùs in iuuenta vide-

Scotoma, Ob-  
tenebratio, Cæci-  
tatis species.

Amblyopia visus imbecillitas.

Caligo, visus imbecillitas species.

Visus res distantes rectius quàm propinquas percipiens.

Visum res paulò distantiores non rectè discernens.

Cæcitas.

Amaurosis, Cæcitatis species.

bant, tunc melius cernant, & quantum huic accedit, tantum propinquæ tunc visioni decedat: quam speciem ego proin Iuuenum visum dicere soleo.

*Visus res nisi oculis omnino ppin- que sine non recte dijudic- eas, Myopia.* Verum & ex his, qui res nonnihil remotas minus vident, alioqui inueniuntur, qui nisi res paulò minores aut scripta oculis omnino adhibeant, & naso, vt vulgus loquitur, attingant, rectè discernere aut legere nequeant: nonnihil limis & clausis oculis ea intuentes. Qui ab incunabilis ad senium vsq; plerumq; hac ratione videntes, Myopes appellantur. Ex quibus alij perspicilli opera quoque, alij minimè iuuantur.

*Nyctalopia.* Occurrit & alia vidèdi debilitas, quando noctu ad accensæ flammæ lumen parum aut ferè nihil videt, interdum verò in diei luce nullum impedimentum visionis sentiunt: quos Nyctalopes, Latini Lusciosos nominant.

*Vertigina acies.* Sed & in quibusdam accidit, vt noctu in tenebris sine lumine acutiùs quàm interdum videant: vti noctuæ. Rara affectio: quam Vespertinam aciem vocat: malum enim nomina ea quæ vtitata sunt, resque rectè designant retinere, quàm ea inter se, vti ferè faciunt, vno nomine plura significantes, confundere.

*Hallucinatio.* Deprauatur visio primùm, cum res aliter quàm reuera sunt, illi repræsentantur. Vt si ea quæ simplicia sunt, pro geminis cernunt, vti ebrijs aliquando accidit, qui recta pro curuis, aliòve modo res formatas falsò intuentur: quod vitium Hallucinatio dicitur.

*Imaginatio.* Secundo si res quæ non sunt se videre existiment, & sibi imaginentur: vnde hunc affectum Imaginationem vocant. Veluti accidit cum in mentis alienatione & delirijs, vti illic dictum est, varia spectra, qualia per insomnia aliàs occurrere solent, vigilantes cernere: aut muscas, culices, volitare, festucas, floccos rebus adhærere, se videre existimant. Quod & minimè mente capitis, neque aliàs ægrotantibus, interdum euenire solet, vt vni oculo vel ambobus quoque simul, eadem insecta, aut flocci & filamenta lanarum, telæ aranearum, ac similes res minutæ & atomi, obuersari videantur. In quibus quia plerumq; nubeculam quoque se videre putant, hoc vitium Nubecula appellatur.

*Nubecula, Imaginationis species.*

Tertiò, huc falsa visio pertinet: quando, *Colores, Imaginatio species.* citra mentis quoque læsionem, colores alij quàm sunt, visioni occurrunt: nunc rubri, nunc flauī, nunc virides, aliòve modo, se plena luce repræsentantes: vel iidem in ambitu & veluti circulo flammæ candelæ aut alterius rei accensæ, iridis instar, coloratæ apparent. Aut splendor fulguris modo, aliave luce *Splendores Imaginatio species.* centia corpuscula visionem obfuscant.

Quartò ad visionis deprauationem, hæc quoq; referendæ erunt: quando res quas intuentur, etsi firmæ & stabiles sint, eas tamen circumagi, in gyrum agi aut rotari, vel aliter inclinare & subuerti existimant: ita vt licet falsam hanc esse imaginationem cognoscant, tamen cum ex illa rerum circumuersione, visus firmam qua corpus subsistere possit sedem non amplius cernat, illud quoque titubabat & vacillat. Nonnunquam etiam si pauimentum cui insitit inuerti illi videatur, ac si quoque simul inuerneretur, nisi sustineatur aut retineatur, cadit, subitoq; corrui, & pedibus dum se retinere cupit, terrâ pulsar. Integris omnibus nihilominus sensibus: quo signo hoc vitium quod Dinos, Vertigo dicitur, ab epilepsia, apoplexia, syncope, quibus perculsi, statim quoq; prosteruntur, facile distinguitur.

Sed & præter hanc in vertigine laborantibus inquietam visionem, accedit nonnunquam & alia illius deprauatio, quam imaginationem & nubeculam vocauimus (eoque nomine imaginationes hæc, incipientem vel paruam vertiginem, nominarunt) nube vel alijs corporibus vel coloribus simul quoque visioni occurrentibus. Quod tamen si eueniat, plerumq; vertiginè solet præcedere.

Nonnunquam quoq; obtenebratio visus, *Vertigo cum obtenebratione Scotodinos.* quam scotoma superius vocauimus, vertiginem comitatur: cum clausis etiam oculis nihilominus omnia ac si circumuenteretur sensui interno offeruntur, & tunc affectus ex vtrisque compositus Scotodinos appellatur.

Quæ omnes visionum deprauationes, nullo vitio in oculis conspicuo plerunque (nisi in ea, quando color alienus, quo oculos reuera extrinsecus coloratus est, interdum apparet, offertur) siue in sanis siue ægris hoc fiat, eueniunt,



## Causæ.

Sed et aff-  
fecta.

**O**mnium visionis enarratorum acciden-  
tium causa, vel in parte vim videndi  
deferente, cerebro scilicet, existit. Vel  
consistit in instrumēto recipiente vim illam  
& rerum simul externarum species, oculo:  
qui cum ex longē pluribus quā reliqua  
sensuum organa constet partibus, & humo-  
ribus simul, in singulis aliquæ causæ visioni  
incommodantes suboriri possunt.

Primum in neruo visorio, seu retiformi, o-  
culo implantato, & præcipuo visionis instru-  
mento. Dein in humoribus tribus, oculum  
adimplentibus, neruoq; visorio inseruientibus,  
Postremò in ipsis membranis oculi glo-  
bum cōstituentibus, atq; intrinsecus humo-  
res discernentibus: si illis in locis ubi visioni  
peruiæ sunt, vt circa nigrum oculi, causa la-  
teat: Vbi & tantum si visionis impedimen-  
tum consistat, illud videri & cognosci potest;  
nam si alibi existant, ita abditæ sunt vt mi-  
nimè intuentibus oculum, pateant.

In cere-  
bro causa  
visus læ-  
sionis.

Cerebri occasione vti omnes sensus lædi  
possunt, sic & visio quoq; labefactatur. Tum  
si aut generatim, aut speciatim, & præsertim  
ea sedē, ubi nerui optici prodeunt, affectum  
patiatur, vel illi ipsi nerui è cerebro producti  
& ad oculum vsque delati, afficiatur. Qui va-  
rij esse possunt.

Intempe-  
ries frigida  
cere-  
bri, cau-  
sa Cæci-  
tatis vel  
Imbecil-  
litas vi-  
sionis.

Intemperies frigida cæcitatem nonnun-  
quam parit illæsis interdum reliquis sensi-  
bus. Si ex vento frigido diu multumq; fron-  
te & oculis, quæ minùs testā iniurijs magis  
exposita sunt, refrigeratis, frigoreq; ad eam  
sedem vsque, ubi nerui optici originem tra-  
hant, penetrante, dictæ partes adeò lædan-  
tur, vt cæci fiant; vel visionis postea quedam  
remaneat imbecillitas: quod ex oxyrhodi-  
norum actū frigidissimorum nimia applica-  
tione, in cephalalgia nobili matronæ, acci-  
disse vidi, quæ ad dies vitæ visum recuperare  
amplius minimè potuit. Hoc quoque, si ab  
eadem intemperie cerebrum vniuersum læ-  
datur, accidere, sed tunc reliquos quoq; sen-  
sus simul aboleri, in stupore ostensum fuit,  
facileq; ex eo, vnde causa prodit; vti & si ab  
externis fiat, per se cognoscitur.

Calidam intemperiem cerebri vnà cum

mentis deprauatione, visus quoq; hallucina-  
tionem & imaginationem dictam, in qua va-  
riæ visioni offeruntur falsæ rerum imagines-  
adferre in phrenitide dictum fuit.

ries cali-  
da cere-  
bri, cau-  
sa visus  
Hallucina-  
tionis  
& Imagi-  
nationis.

Vti & eā intemperiem, quæ ex spirituum  
perturbatione in cerebro ab humoribus ma-  
lignis nascitur, vnà cum insaniam & melan-  
cholia, visioni similiter falsa spectra offerre,  
illic quoque explicatum fuit.

Intempe-  
ries mali-  
gna in ce-  
rebro cau-  
sa Hallu-  
cinationis  
& visionis  
& Imagi-  
nationis.

Siccitas nimia nerui optici, in febribus ar-  
dentibus, facilius in illo neruo, cum crassus  
sit, inducta, cæcitatem post has febres rema-  
nentem procreat.

Intempe-  
ries siccæ  
cerebri,  
causa Cæ-  
citatis.

Compresso vel irrigato neruorum princi-  
pio, vti apoplexiam fieri ostendimus, in qua  
oēs sensus simul auferuntur; sic &, si hoc tan-  
tum circa neruorum opticoꝝ exortum, vel  
congressum, aut reliquo extra oculū ductu  
fiat; quod tunc ab humoris aut sanguinei aut  
pituitosis affluxu fieri necesse est; cæcitatem  
subito, si statim eò humor delabatur, sequi,  
aliquando solet contingere.

Intempe-  
ries siccæ  
cerebri,  
causa Cæ-  
citatis.

Frequentius tamen ab excrementis aqueis  
pituitosis cerebri, quæ in media hac cerebri  
basis sedē, ubi nerui optici prorumpunt, ad  
infundibulum quod proximum hisce neruis  
est, semper defluunt, & vnà cum neruis, &  
propè illos, in oculi cameram & narium am-  
plitudinem erumpunt, irrigatis vel nimiam  
humectatis neruis opticis, Amblyopia in se-  
nibus & pituitosis, solet accidere. Aut si ab  
eodem humore vel refrigerentur, vel in an-  
gustijs illis comprimantur, potius quā, vt  
illi voluerunt, obstruantur, cæcitas quoq; se-  
qui consuevit. Quæ visionis abolitio vel im-  
becillitas, vnà cum reliquorū sensuum læsio-  
ne, si vitium hoc ad illorū exortum vel pro-  
gressum in basi cerebri vsq; producat, acci-  
dit: vel visus tantum, si ea potissimum sedes  
afficiatur, aboletur. idq; in vtroque ferè ocu-  
lo, ob neruorum opticoꝝ congressum, &  
breuem ad oculum ductū, vt rariùs tantum  
vnus neruus siē possit affici. Quod à pituita  
seu aqueo humore prodixisse, illius humoris  
in cerebro redundantis indicia, satis patefa-  
cient. Nervumq; affici, cum nihil in oculo ap-  
pareat, quod talē visus amissionē vel obscu-  
ritatem adferre possit, facile quoq; cognosci-  
tur: neq; enim hoc signū, quod certissimū

Ab ex-  
crementis  
cerebri  
nata Cæ-  
citas vel  
Ambly-  
opia.

existimarunt, nimirum si compresso oculo ægro pupilla non dilatetur, nervi vitio hoc fieri, quod influxus spiritus in oculum impeditus sit, verum comperimus; cum spiritus animalis, non flatus instar oculum distendat, neque oculum adimpleat, sed in retiformi nervo persistat.

*Cōtorsio  
nervi vi-  
sori in  
cerebro,  
causa Cæ-  
citatis.*

Hoc quoque non infrequens, sed à nemine quod sciam rectè descripta causa illius cecitatis, quæ post convulsiones graves, & frequentes aliquando relinquitur, referenda erit. Quam non ab humoris affluxu, ut voluerunt, sed quia in magnis illis per paroxysmos convulsionum, partium omnium atq; oculorum simul contorsionibus, in quibus sæpè quoq; convulsi, admodumq; exerti & inflexi apparent, attracto sic nimium & tenso nervo optico, illis adnato, illoq; simul contorto & leso, spiritusq; visorij transitu impedito, oculis visione priuari contingit: atque inde provenire, diligenti examine & consideratione inuenimus.

*Solutio  
cōtinui-  
in nervo  
visorio  
cerebri cau-  
sa Cæci-  
tatis.*

Læsa cerebri substantia, uti per apoplexiam omnium sensuum fit priuatio; sic nervo illic cōtuso vel vulnerato, quod aliquando ex punctura iuxta frontem facta accidisse, quidam testatur, cæcitas, ob solutam continuitatem vel callum relictum, subito quoque, & ob istum, manifesta, euenit.

*Imbecil-  
litas cere-  
bri, cau-  
sa Am-  
blyopia.*

Imbecilla cerebri constitutio; dissipatis & absumptis spiritibus propter senium, vel ob morbum grauem & diuturnum, euacuationes nimias, sanguinis potissimū & seminis, unde magna spirituum fit profusio, venaq; immodica, ob id visioni admodum incōmodat: item ob nimias vigilias, ut illic dictum fuit, Amblyopiam seu visionis imbecillitatem, & reliquorum quoque sensuum, maxime eorum qui subtilius obiectum habent, ut est auditus, frequenter, ut in causis illorum hisce externis patet, senibus familiarem, in conualescentibus remanentem, in intemperantibusq; viuentibus consuetam, inducit.

Præter hanc quæ à spirituum defectu procedit, causam, de qua dubitari minimè potest, aliam hic in spirituum crassitie aut tenuitate & subtilitate assignere, ut pleriq; subtilius sanè quàm veriùs hæc proponunt, nulla ratione induci possumus, sed pluribus ut

ab illis dissentiamus, mouemur. Cum spiritus animalis æthereus penè, tales mutationes minimè patiatur: facillimè verò dissipatur: sicuti nec vitales spiritus, crassescere aut attenuari nemo vnquam, ne fingere quidem fuit ausus. Vti & videmus, nisi iam à spiritibus defectus visionis accadat, alia illius incommoda, unde res procul disitæ vel propinquæ minùs rectè discernuntur, instrumenti vitio potius accidere, uti mox explicabitur; non ob spirituum quandam crassitiem vel subtilitatem, quemadmodum existimarunt, cum adeò sint subtiles, ut subtiliores esse non possint.

Spirituum cerebri perturbationis vel agitationis causa, & ipsorum consensu cerebro quoq; affecto, visionis læsionis variæ species, prodire solent. Vt si vapore calido subtili vel turbido aut maligno permixti, non tantum mentem peruertant, sed & visionem quoque; ita ut multa se videre existiment, quæ non sunt, corrumpant: sicuti si ab eiusmodi vaporibus spiritus cerebrumq; incallescant, tunc vnà cum delirio spectra falsa oculis quoque obuersari, in paraphrenitide dictum fuit. Vti & si narcotica quædam cum calore accedat vis, ut ex euaporatione vini fieri ostensum fuit, tunc vnà cum temulentia mentis, visionis quoque fieri hallucinationem, in qua varia quæ non sunt, se videre putant, vel quæ sunt falso diiudicant (sicuti historia de illo qui res geminas ebrius semper esse putans, elusus ab vxore manus combustis, huic rei fidem præbet) in temulentia declaratum fuit. Dein cum alij tetri vapores & maligni, ab hypochondriorum regione cerebrum petant, illudque & illius spiritus perturbent, nō solum mentem peruertunt, sed & visioni nonnunquam falsas rerum imagines proponunt; sicuti in melancholia hypochondriaca explicatum fuit. Qui omnes visionis per consensum facti affectus, cum mentem simul perturbent, ad mentis alienationem pertinent, ubi & de illis prolixè tractatum fuit.

Verum & ex spirituum nimia agitatione, visionem lædi, sæpenumerò contingit: non illa; quæ in animi affectibus, spiritibus non tantum agitat, sed potius inuicem contigit, fulis,

*Spiritus  
cerebri à  
vaporib.  
perturba-  
tio, causa  
Hallucina-  
tionis  
& ima-  
ginatio-  
nis, cum  
mentis a-  
lienatio-  
ne.*

*Spiritus  
cerebri  
nimia a-  
gitatio,  
causa  
tignis.*

fufis, fimul cum humoribus in capite, corde, & toto corpore contentis, animum tantum perturbat, & vifioni vix officit. Sed ea, qua fpiritus in cerebro, vel p fe, vel vaporis permixtione commixtis, fine animi perturbatione, Vertigo, Imaginatio & Scotomia appellata, excitari folent.

Spiritus enim in cerebro illiusque arteriis & finibus contentus, etiam citra vaporis permixtionem commotus agitatufque vehementius, fimilem in externis commotionem imaginationi repræfentans, vertiginem dictam parit, cuius commotionis variae caufæ effe poffunt. Motus enim capitis vehemens, eadem forma diutius factus, efficit vt fpiritus eadem ratione fecuti, agitatione, pofttea quiefcente capite, nihilominus adhuc aliquandiu, donec iterum conquiefcant, eodem modo, quo motus capitis factus eft, difcurrant: Vt fit, fi caput vnà cum corpore in gyrum diutius circumducatur, tunc enim vertigo fequitur: adeo quoque, fi hoc longius agatur, valida, vt pedibus minime confiftere liceat, fed vacillandum & cadendum nonnunquam neceffario fit: ficuti hæc in hominibus & animantibus videre fæpe contingit. Ita capite deorfum diu inclinato, fpiritus tunc ab eo furfum ad nervorum principium vergentibus, cum illud rursum eligitur, iisdem fpiritus impetu rursum ad fedem propriam remeantibus, ex motu illo, vertigo aliquando fenfitur.

Nō autem ex motu hoc corporis faltem, fed & animi perfeuerante vel vehementi commotione, fpiritus fæpe & valide in cogitationibus profundis & afiduus, aliisque animi pathematibus, vti & vigiliis, exagitatis, accidit, vt fic affueti, ex leui caufa aliqua interna commoti, in vertiginem incidunt. Sicuti ftudiis vehementius inuigilantibus, cum ieiuni funt, ob caufas mox dicendas, vertigines nonnunquam moleftias exhibere, obferuamus.

Sed & ex intuitu longiore, rei quæ circumagitur, vel aliàs celeriter mouetur, fiue hoc ita fiat, aut fieri illis videatur, vti nauigantibus terram moueri & currere, quod quibusdam etiam claufis oculis ex imaginatione accidit, vertigine aliqui corripuntur:

fpiritus quoque ex vifionis illa agitatione, quæ ad obiecti fubitam commotionem fequitur, fimili modo concitatis, & vifionis celeritatem veluti fequentibus. Quod vt illis quibus fpiritus facilius agitantur accidit, fic in difpofitis ad vertiginem, paroxyfmo vt invadat, occafio, vel fi levis tantum caufa fit, præbetur. Ex alto quoque præcipiti periculofoque loco, deorfum profpectus vertiginem in non confuetis, fpiritus nimium diffufis, rursumque terrore retractis, ficque inæqualiter comotis parit. Proin & iis qui fibi non metuunt, hoc minime, nifi aliàs difpofiti funt, aut alia accedat caufa, vt fi ex eminentiore tali loco, res quæ rotantur, aut vortices aquarum infpiciant, euenit.

Cæterum quemadmodum ab externis caufis, vertigo hæc ob fpirituum impulsum nimium accidit; Ita & per fe fpiritus in arteriis cerebri, potiffimum feruidiores copiofioresque collecti, quia tunc inquieti funt, facileque per fe, vel etiam leui accedente occafione, agitantur, vertiginem caufant. Quæ diu multumque & facili ex caufa homines vel fola, vel comite quoque capitis dolore diuexat. Quibus & arteriæ vehementer in capite & auribus, cum illarum tinnitu, interdum & reliquo fæpe corpore pulfant; & vix dum nifi illarum apertione, vti dicitur, fanantur. Hoc autem per fe, fanguine adeo calefacto & attenuato in arteriis poteft accidere: vel vaporis tenuioris, vti mox dicitur, permixtione.

Verum & aliam vertiginis caufam à fpiritus procedentem in arteriis, & vasis capitis, fectione in quodam mercatore noftate, qui multis annis vertigine laborans, nec ambulare, nec lecto amplius furgere, quin corrueret, poterat, deprehendimus: vas venofum, nimirum cerebri, omnesque illius arterias ab exortu & ingreffu ipfarum in caluariam, vniuerfo per cerebrum ductu, coalitas induratasque, glandulisque paruis duris toto proceffu diftinctas. A qua ipfarum obftructione fpiritus impediti retenti; in cerebro, ex leui corporis motu circumducti, incurabilem vertiginem pepererunt.

Vaporum verò fpiritus iam enarratis cerebri permixtorum caufa, non tantum Ver-

Vapores  
cerebri  
perentes,

causa  
Verti-  
gini, ima-  
ginationis  
Scoto-  
matis.

tigo, sed & Imaginatio dicta & Scotoma, vel simul, vel separatim occurrentia, procreari solent: Eaque pro vaporum naturæ & loci, à quo exurgunt, & in quem in cerebro feruntur, diuersitate. Si enim illi copiosè cerebri spiritibus in illius vasis confusi, loca illa adimplentes exitumque quærentes, vnà cum illis in latera circumducantur, talem sensum, vt superius dictum, & motum, in externis quoque visioni offerendo, vertiginem pariunt: leuiorem vel grauiorem, prout maior minorve illorum est copia, atque agitatio.

Quæ & sola hominem, si subtilis nec aliter inquinatus sit vapor, afficit. Vel si calidior simul existat, dolor quoque accedit capitis. Si turbidus aliòve modo inquinatus, coloratus, splendescens: vt à variis humoribus & bile, sicut mox dicitur, diuersimodè exhalare potest, imaginationes simul cum vertigine; per quas visui quoque varia corpuscula, infecta, atomi, colores, splendores falsò representantur, tunc fiunt. Vel si obscuritate sua potius quàm crassitie, vt voluerunt, visionem obfuscet, nebulas, fumos, vel tenebras oculis vnà cum vertigine (nam & licet nihil videant, vt suprà de clausis oculis dictum fuit, tamen vertiginem sentire possunt) in affectu Scotodino dicto offundunt.

Quæ tamen imaginationes & obtenebrationes seu scotomata, separatim quoque sine vertigine, si circumactus ille spirituum in capite non fiat, sed sola vaporum cum illis permixtio, sæpenuerò accidunt. Quod qua ratione hoc possit visioni accidere, diligentius, in tanta opinionum de hac re varietate, inuestigare oportet.

Multi, hosce vapores ascendentes, & ex oculorum camera erumpentes, qui oculis fumi instar obuersantur, visionem vel fallere, vel impedire hac ratione moti crediderunt: quod à vaporibus qui simili modo ad oculos penetrant eosque vellicant lachrymas elici, oculosque rubere, cernerent. Hoc tamen, cum potius narium tunica sensilis vellicatione, ob communicationem eius cum oculorum adnata tunica, fiat, comparatio hæc locum habere minimè poterit: & cum vapor, si in oculorum orbitam subiret, ocu-

losque perreptaret, mox euolaret, antequam eos attingeret, hanc opinionem tanquam infirmam reieciimus.

Alij, verò vapores hosce oculos penitus subire, & ad interiora illorum vsque penetrare, adeò vt intrinsecus ab ipsis oculis cernantur, existimant. Verum cum hac ratione ad oculi globum, nulla sit via, illeque adeò spissus ob corneam tunicam, yndique integram, existat, vt vapores illam peruadere, in quem acus vix, cum suffusio tollenda est, intrudi potest, minimè possint, vana & hæc est quorundam opinio; eoque magis inepta, quod corporis nostri perspirabilitate, errores suos palliare & tegere volunt.

Alij verò, vt qua ratione vapores hi oculum subire possint, explicarent, cum non alium introitum in oculi cameram, quam nerui optici, venæ & arteriæ, esse cognoscerent: vapores hosce cerebrum quidem primum petere, sed inde pervenas & arterias ad oculum defendere, scripserunt: non intelligentes, quod nos in Anatome nostra prodidimus, vasa hæc tantum per adnaram oculi tunicam discurrere, nullibi que neque in corneam oculi tunicam, nec oculi interiora pervenire, cum sanguis si oculum subiret, suo colore, visioni (vt fit, cum è vasis effusus in corneam excidit) omnia rubra representaret. Ob eam causam neque hoc modo vapores ad oculos ferri, hac demonstratione probatum fuit.

Alij magis consideratè, nerui optici causa quod præcipuum visionis instrumentum statuunt, id fieri docent. Quod & nos admittimus, non ea tamen ratione, vt illi qui vapores neruum opticum subire posse, perque illum tanquam canalem è caluaria in oculum vsque deferri crediderunt, hoc fieri concedimus; cum per nervos spiritu animali pleenos, vapores turbidi deferri minimè queat, & cum hoc sit contra vaporum naturam, deorsum, nisi impetu quodam pellantur (quod hic minimè fit) ferri.

Verum nos ita potius id euenire probabiliter censuimus. Quod nimirum vapores hi cerebri anteriora præsertim petentes, spiritibusque animalibus confusi, illic splendorem imaginum, quæ à neruo optico cerebro, vbi



sensatio omnis & discretio fit, offeruntur, scintillarum aliquot permistione, quibus illarum lux inæqualis, vel certis locis obfuscata redditur, falsa eiusmodi spectra, cum veris imaginibus confusa, in hac visionis læsione quæ nubecula vocatur, cerebro representent. Quod enim hoc in cerebro non oculis fiat, vertigo, quæ plerumque has imaginationes, ut prius demonstratum fuit, comitatur, spiritibus tunc simul in cerebro affectis & agitat, unde & qui tunc vertigine laborant, non tantum has imaginationes habent, sed & omnino rotari & circumire sibi videntur, satis ostendit: & scotoma seu visus obtenebratio, ut ferè cæci fiant, nonnunquam has nubeculas secuta, spiritibus tunc multitudine vaporum omnino obscuratis, euidenter declarat. Quæ omnia in cerebri ea sede, quæ nervis opticis originem præbet, elatiorque est cæteris, & propterea visioni potissimum incommodare videtur, non autem in oculis accidere, si à vaporibus hoc fiat, satis demonstratum fuit.

Quemadmodum in oculorum vitio interno, ob tunicam illic natam oborto, quoque nubeculas has, & alia dicta visioni offerri posse, & visum penitus quoque obscurari, in pupillæ suffusione dicta, mox ostendemus: quamobrem & hæc nubeculas à vaporibus genitas, falso suffusionis nomine appellarunt, quia vapores tunc quoque oculis suffundi, & illic pelliculam gignere, arbitrati sunt, quas nubeculas & imaginationes, nos rectius indigitauimus. Quæ & à vera suffusione hisce signis distinguuntur, quod in nubecula & imaginatione affectorum oculis nulla macula appareat, utriusque oculo simul his visionis accidentibus oblatis, quæ interdum remittunt & cessant, rursusque certo tempore redeunt; cum in vera suffusione in vno oculo vitium apparens, vix autem perfectè in utroque simul, visioni sine intermissione, ut illic dicitur, obstit.

Causa verò harum euaporationum, unde & vertigo & imaginatio & scotoma proveniunt, in diversis corporis partibus potest consistere: cum aliàs ab inferioribus sursum elati vapores capiti demandentur: frequentiusque à ventriculo prodeant. In quo bilio-

sus præsertim humor, calidam, subtilem euaporationem proferens, eamque non tantum ad nares usque (ut à capis, raphanis, sinapi exsurgens vapor, nares tantum vellicare moxque iterum dissipari solet) sed in caput ipsum emittens, nunc vertiginè, nunc imagines, quæ plerumque naturam bilis imitatur, interdum flauent, aliàs virent, aut nigricant, sicuti dicitur *Gäl vnd grün vor den Augen* causat. Et cum bilis in ventriculo dum ieiunus adhuc est, magis ferociat effervescatque, vaporesque tunc non impediti, liberius sursum ferantur, accidit, ut picrocholis dum ieiuni adhuc sunt, accidentia dicta molesta sint: & quod ex cibi assumptione, quia bilis vehementia retunditur vaporesque reprimuntur, mitescant, denuoque cessent: quod & sponte discussis in capite vaporibus, eoque citius quod subtiliores sunt, euenit: donec novis euaporationibus factis, hæc mala redeant. Cognoscitur autem ex oris amaritudine, rosioneque oris ventriculi, quod cor vocant, aliisque huius humoris indicis, à bile hoc profectum esse: quæ & nonnunquam capitis dolorè, simul cum vertigine eadem opera adfert.

Idè vapores à venis meseraicis progressi, in quibus biliosi succi, ut alibi ostensum fuit, frequenter redundare solent; uti ab eodem loco eleuatis, & per venas & arterias sursum delatis vaporibus, febres intermittentes, hypochondriacæ melancholiæ, per intervalla hominè inuadunt, sic & iam dicta symptomata frequenter excitant: quod fit sursum inde per venas elatis vaporibus; nonnunquam & per arterias quæ venis meseraicis annexæ sunt: tunc maximè, quando vapores illi subtiles sunt, & tales, ut hæc potius accidentia, quam mentis perturbationes, quæ à malignitate potius illius proficisci ostensum fuit, inducant. Qui & proin nunc vertigines solas, vel prout comparati sunt, imagines aut scotomata simul, cum illis, vel sine illis procreant. Quam veriore causam malumus adferre, quam cruditates, à quibus flatus potius quam vapores eiusmodi generantur, prætere.

Sed & ex reliqua aliqua corporis sede, per venas & arterias, vapores eiusmodi à san-

guine tenuiore eleuati, eadem causare possunt. Veluti ex ea quæ circa vterum est; sicuti retentis menstruis hoc quoque symptoma, vti & alia, hac ratione sæpè eueniunt. Et à pedis aliqua sede, aut alterius mèbri prodians vapor, auræque alicuius instar sursum delatus, vti epilepsiæ, sic & vertiginis causam fuisse obseruauimus: vnde & vertigines aliquando epilepsiam præcedunt, eamque mox secuturam præfagiunt, cum à similibus vaporibus cerebrum vellicantibus, epilepsiæ quoque, vt suo loco dicitur, fieri possint.

Verùm & in capite ipso, horum affectuum causa nonnunquam consistit. In quo non tantum sanguis spirituosus feruidior copiosiorque collectus, vti supra dictum, id facere potest, sed & ab humoribus illic contentis, consimiles vapores fuscitati, spiritibusque permixti, hæc accidentia progignere possunt. Quod à sanguine potius vasorum & sinuum cerebri, illique permixtis humoribus oriri, quàm à pituita credimus. Quam tamè vertiginis causam etiam esse, sed non quia vapores emitat, sed modo iam explicando, minimè negamus.

*Humor in cerebro a quatuor spiritibus fluctuatio, causa Vertiginis.*  
Repletionem cerebri, ab humore aqueo tam seroso quàm pituitoso factam, vertiginem illam causare, quæ apoplexiam aut carum præcedere & minari solet, certum est. Quæ frequens & diuturna, & nisi præcaueatur, in hosce morbos terminari cū vitæ summo discrimine solet. Verùm hoc refrigerando & humectando cerebrum, non facit, cum agitatio hæc spirituum, quæ in vertigine fit, sic potius impediretur, quàm promoueretur. Sed fit hoc, cum cerebri anfractus spaciaque adimplens, maxima copia caluariam replendo, & flatuum copiam simul generando (qui ex aqueis humoribus sæpius, quàm vapores, gignuntur) in ea fluctuat, tunc enim sicuti in cordis inuolucro, aqua redundans, cum agitur, palpitationem cordis facit; ita & hic cerebrum vndiq; opplens, cum caput mouetur, agitat, humor & capitis motum sequutus, sicuti de spiritibus diximus, talem sensum capiti præbet. Quod ex ipso rum relatione, qui de tali fluctuatione conqueruntur, satis patet: & aperta caluaria hanc humoris immensam copiam,

sicuti in apoplexia dictum fuit, sæpè numero inuenimus: in eoque cui arterias quoque oc caluisse modò diximus, tantà illius copiamprehendimus, vt aperto cranio vndatim defluerit: quæ & vnà cum arteriarum illa obstruktionem, geminam causam vertiginis proferens, eam tam diuturnam & incurabilem effecerat, in qua humor ille diuturnitate cerebrum irrigans, carum, quo & extinctus est, pepererat. Cognoscitur autem vertiginis hanc causam esse, non solum ex fluctuationis illo sensu, sed & aliis pituitæ redundantis indiciis, in caro & apoplexia explicatis. Ad quæ procliuies, somnolenti simul & stupidiore euadunt, & in hosce affectus, nisi occurratur, tandem incidunt.

Nervi visorii oculo iam implantati, & re- *Nervi visorii forma instar dilatati occasione, visionis incommoda pleraque, cum is visionis principum sit organum, eueniunt. Idque ferè per consensum aliarum partium, cum illarum causa, ijs quæ ad visionem requiruntur, spiritu nimirum & obiecto proprio destituitur, vel rectè frui minimè potest. Nam aliquin oculo ita immersus munitur, vt vix dū proprio aliquo affectu, nisi consentiente cerebro afficiatur.*

Destituitur spiritu animali vel omnino, in cæcitæte: vel ex parte, in visus imbecillitate: ob cerebri vel nervi optici affectus iam enarratos: quales sunt, intemperies, cōpressiones, læsiones, & imbecillitas, a spiritu penuria potius, quàm excogitata crassitie & subtilitate profecta.

Refugientibus quoque ex nervo visorio versus suum principium spiritibus, idem accidit. In diutius presso oculo, & per consequens retiformi nervo, humorum oculum opplentium causa, interdum euenit, eos postea tantisper donec spiritus rursus recurrant, cæcos esse.

Sed & nimis diu otiosis in nervo visorio spiritibus, & veluti sopitis, vel cum illorum non est vsus retrogressis, aut nervo ipso torpido facto: in illis qui in tenebris diutissimè, vt in carceribus aut aliis obscuris locis detenti, nihil videntur longo tempore, quando in lucem redeunt, visum vix dum vel tardius, vel nunquam amplius recuperant.

Et cum spiritus animalis, vitali indefinenter opus habeat, eo quoque per synopes aliquantisper dissipato, & spiritu animali per consensum impedito, visio primum, inter functionum cessationes, in animo delinquentibus obfuscatur, & mox cum reliquis omnibus, tamdiu donec ad se redeant, tollitur.

*Obiecti privatio in nervo retiformi, causa Cæcitatis vel Amblyopie.*  
Obiecti proprii, rerum scilicet imaginum, per lucem & splendorem oculum subeuntium causa, nervus retiformis, visionis lesionem patitur, si illud nimis violenter illi offeratur, eoque adeo afficiatur, ut postea non amplius vel non recte sentiat.

Ut cum a splendore solis, fulguris, ignis, admodum perculsus, postea scintillas aliquamdiu se videre existimat, & vel penitus per aliquot tempus obcæcantur oculi, vel vti sæpe accidit, cæci postea maneant.

Vel si luce destitutus oculus, qua extrinsecus res & intrinsecus oculus ut videat, illuminari debent, propter tenebras externas, rerum species minime possit cognoscere.

Quæ quoque, qua ratione propter pupillæ obturationem accidant, in membranarum oculi vitijs explicabimus. Vti & quando humorum causa id evenit, illic quoque dicitur.

*Humores oculi, causa Visionis levis.*  
Humorum in oculo contentorum causa, visionis impedimentum accidere similiter potest; præsertim crystallini, per quem veluti per perspicillum, nervus retiformis rerum externarum imagines, primum colligit, rursusque dispersas, dilatatas, maioresque redditas, sinu suo excipit: cui crystallino humori reliqui humores tantum inferuiunt. Fitque hoc cum vel deficiunt, quia aut effluxerunt, aut consumpti sunt: Vel situm naturalem permutant: Aut substantia ipsorum immutatur, vel colore alieno inficitur: quod quomodo fiat, in singulis explicabimus.

*Effluxus humorum oculi, causa Cæcitatis.*  
Profluunt & ex oculo humores nonnumquam, aqueus frequentius, cum sit in anteriore sede positus fluidiorque: alij rarius nisi causa magna sit: fitque tunc Cæcitas. Aqueo enim humore effluxo, oculi globus nonnihil collabatur & corrugatur, unde pupillæ foramen, quod splendorem intrmittere debebat, occluditur, reliquique humores antrorsum è sinu retiformis prolapsi, faciunt, ut ille

nonnihil collabatur, unde visionem cessare necesse est. Longèque magis si crystallinus quoque humor cum vitreo cui inhæret, procidat: cum is ad visionem, ut dictum, omnino requiratur, & tunc retiformis nervus penitus collapsus, suo sinu rerum species non amplius possit comprehendere.

Quorum omnium causa apparens vulnus vel vlcus oculi esse solet. Si amplo vulnere, magna cum vi per corneam tam spissam & duram, facto, aperiatur: neque enim per leuem puncturam, qua in catarrhacta tollenda oculi globum perforare solent, aqueus humor, qui suam quoque habet tenacitatem, potest effluere. Ab inflammatione etiam oculi abscessum gigni, in quo corneæ pars in pus conuertitur, qui disruptus, cum pure, oculi humores aliquando profundit: aliquoties vidi; & in febre pestilentiali in utroque oculo accidisse, crystallino humore in barbam usque defluxo, illicque hærente, notavi.

Consumuntur quoque oculi humores, aqueus præsertim, cum sit tenuior: tuncque oculo non sufficienter distento (quod ut pupilla exactè aperta maneant requiritur) sed nonnihil collapsa, pupillæ foramine etsi non penitus occluso, tamen amplitudinem suam vel rotunditatem amittente, & reliquorum humorum situ obiter conturbato, visus sequitur imbecillitas: vel si maior fiat confusio, etiam cæcitas. Sicuti in morbis longis, acutis, summoque & diuturno marcore corpus absumentibus, rarius, frequentius in extremo senio, quibusdam evenit: in quo & vitreus & crystallinus exiccare, ut mox dicitur, possunt. Quibus oculi corrugati nonnihil apparent, quos fractus vulgus idè appellare solet; præsertim cum in mortis agone, calore & spiritibus iam destituti, flaccescunt.

Situs naturalis humorum duorum, crystallini & vitrei (qui solidiores cum sint, proprijs membranis coerciti, loco proprio fixi hæere debent) peruersio, visui quoque nocumentum adfert: quorum sedibus mutatis, aqueus, spaciū relictum ab illis adimplens, facile cedit.

Quod quandoque accidit in vitreo humore

*Situs Vitrei humoris*

moris p-  
uersio,  
causa  
Halluci-  
nationis.

re (cui crystallinus humor præpositus, illiusque anteriori sedi immersus aliquousq; consistit) si is portione aliqua illius, antrorsum delata, crystallino humori præponatur. Vbi & sæpè contentus, albuginis instar sub pupilla cerni potest. Tunc enim nondum cæcitate, cum lucidus vitri instar sit humor, sed hallucinationē aliquam, cum spissior sit aqueo, sicuti in suffusione incipiente, vti dicetur, fieri solet, accidere necesse est. Nisi forte tanta illius quantitas eò delapsa sit, vt penitus crystallinum obliteret, eumq; retrorsum premat, admodumve inuertat: tunc enim ambobus conturbatis humoribus, grauiora, vt in crystallino humore dicitur, visus accidētia superuenire solent. Huius autem causa ictus vel contusio esse potest. Aut frequentius punctata in suffusione detrahenda, nimis profundē ad hosce humores adacta, illorumque tenues membranas, quibus cohærent, disrumpens. Vix enim alias vti voluerunt, conatus ex respirationis retentione magnus, in deiectionibus partu, aut conuulsionibus, in quibus oculi velut exerti apparent, id intrinsecus in oculo moliri potest.

Crystallinus præsertim humor, in medio vitrei humoris cavitatis, solis instar suspensus, à pupillæ foramine nonnihil dissitus, illud recta sua amplitudine respiciēs, & splendorem per illum æqualiter in id dispersum fuscipiens, neruique visorij seu retiformis semiglobati cavitati, in posteriore illius sede posita, diffundens, ita vt eam splendore suo vndique adimpleat, si naturalem hunc situm admodum immutet, sine visionis noxa id fieri non potest. Quæ illius vitia, cum nec humor ipse in oculo videri possit, in eo quoque minimè, nisi penitus in pupillam, vti de vitreo dictum, incidat, conspicua sunt.

Fit autem hoc, si aliquomodo inuersus, latiore sua parte, quæ lentis maioris instar compressa est, pupillæ foramini non recta opponatur, sed in latus nonnihil declinans, eam obliquè vel transuersum, respiciat: Aut cum sursum deorsumve, vel ad latera à media oculi sede delatus: à pupillæ foraminis aspectu nonnihil declinat. Quibus, vel ab ortu in quibusdam, in nonnullis à causa ali-

Situs Cry-  
stallini  
humoris  
inuersus,  
aut in la-  
tera à me-  
dio rece-  
dens, cau-  
sa Hallu-  
cinatio-  
nis &  
Strabis-  
mi.

qua violenta, vti in vitreo modo dictum fuit, accidentibus, vel cæcitatem, si magnus à situ naturali recessus fuerit; vel si minor, visus obscuritatem, vel potius hallucinationem aliquam, in qua res vel geminæ, vel curuæ, vel inflexæ esse videntur, fieri contingit. Quin etiam leuis aliqua duntaxat crystallini humoris à centro pupillæ declinatio, quamuis visioni adhuc minimè obsit, Strabismi causa esse potest. Quemadmodum enim in visione, si crystallinus recta pupillæ foramini oppositus sit, pupilla etiam res externas quas intuetur, recta inspicit; ita si nonnihil à centro illius auertatur humor crystallinus, vt videant, pupilla non rebus recta, sed obliquè opposita, oculum sic inuertunt, strabismo laborantes, vt aliud quid, quàm rem obiectam aspicere iudicentur, quod tamen etiam ob pupillæ situm contortum, vti mox dicetur, accidere potest. Quæ ab ortu plerumque hominibus sic eueniunt.

Imprimis verò si crystallinus humor, in posteriore paulò sede oculi, versus neruum retiformem, suam sedem obtineat, visionis huius qua res distantes non rectè assequi possunt, causa existit. Quod ab ortu multis accidit, vt non sicuti naturaliter fieri solet, versus anteriora magis ad pupillam crystallinus humor resideat, sed in oculi medio exactè situm suum habeat, & adeò frequens est, vt Anatomici plerumque illius situm naturalem, in medio oculi centro descripserint. Vnde non mirum, multis ab ortu hanc visionem quam Iuuenem vocauimus, accidere, vt propinqua rectè & acutè, distantia verò minimè possint discernere, idque cum perspicillum nimis à rebus quas intuemur, retrorsum inclinatum est, quod proin propinquieribus duntaxat sufficienter illustratur, à procul verò disitis imaginibus oblatis, si intermedio perspicillo crasso, ex crystallo facto, collectæ, efficacius sic oculo offerantur, illud illuminare sufficienter minimè possunt. Hincque accidit, vt cum & situs illius sic permaneat, visio hæc toto vitæ curriculo, nisi alias ob causas hoc fiat, minimè immutetur.

Quod si quoque à medio oculi magis ad-  
huc

Situs cry-  
stallini  
humoris  
retrorsus,  
antror-  
sumve  
tractus,  
causa Vi-  
sionis, in  
qua res  
non nisi  
propin-  
quas ad-  
modum:  
Vel distan-  
tias meli-  
us pro-  
pinquas  
vident.



huc versus posteriora remotus sit, longè propius adhuc res, quas cernere volunt, oculis adhibere coguntur, & perspicillo crassiore uti. Quod tamen non ita frequens est, & in iis tantum, quos Myopes vocari diximus, euenit.

Quas veriores causas, quæ propter instrumentum viciatum accidunt, alioque proin instrumento, perspicillo nimirum corrigi possunt, asserre malumus: quam spiritibus, qui in iuuenibus illis, quibus hoc vitium familiare est, atque acutissimè propinqua vident, nec deficiunt, nec cōmutati sunt, quod perspicillo emendari minimè possint, accepta referre.

Sed & contrariam ob causam, diuerso quoque modo visionis exsurgit impedimentum: cum nimirum crystallinus humor à sede naturali dicta, antrorsum versus pupillam magis inclinat: tunc enim maiori incommodo, minus res propinquas vident, sed easdem ab oculo procul remotas, rectius intuentur, nisi perspicillo tenuiore vitreo adhibito, quod veluti crystallini vices præstans, & rerum imagines suscipiens ac diffundens, perque crystallinum maiores oculo repræsentans, defectum hunc corrigant, & proin semper ad legendum cernendumque acutius, perspicillo opus habent. Quod senescentibus plerisque, aliis citius, aliis tardius euenit: non ob spirituum, uti putarunt defectum, cum sic potius visionis imbecillitas, quam perspicillum minimè emendaret, nec novos spiritus suggereret, uti & reliquorum sensuum, sequeretur: sed quod à capitis illa inclinatione, qua toto ætatis tempore, in legendo, & rebus quibuscunque tandem oculis propositis, manibusque tractandis, oculos demittere necesse sit, crystallinus humor ætatis decursu, vna cum vitreo ad anteriora sensim feratur, tandemque illic subsistens, hunc defectum visioni adferat. Præsertim si in illis quoque absumptio nonnihil aqueo humore, nihil illi resistat, & vitreus humor incumbens validius eundem deprimat. Qui defectus & longè grauior, si omnino prolabente crystallino humore ad pupillam, ut illic hære & pupillam obturare manifestò conspiciatur, cæcitas, vel visus im-

becillitas sequantur. Quæ causa & in equis aliisque animantibus, quæ prona incedunt, illorum visionis noxæ frequentior esse solet: quod ut sensim ratione ætatis, sic ab ictu subito nonnunquam accidit.

Substantia humorum oculi immutata, vitium quoque visioni affert. Ut fit, si crystallinus humor nimium induretur, sicuti vel ob ætatem vel alias causas, sed quibus non nisi vehementer & diu corpus exiccatur, euenire potest. Atque tunc, quia pelluciditatem amittit, vel ex parte, vel omnino, sicuti cæcus apparet, cæcitatæ vel visus hebetudinis causa est. Quod ut in illo, sic & in vitreo humore eodem modo potest accidere.

Quod si verò, naturali adhuc constitutione, vel ætatis progressu, solidior sit vel obscurior, quia tunc maiori illuminatione ut illuminetur opus habet; accidit, ut non nisi plena luce perfecte, & cum ea deficiat, licet splendore luminis nonnihil clarescat, minus rectè videre possint. Atque inde Nyctalopia dicta sequitur.

Aqueus verò humor is est, cuius substantia facilius immutatur, cum tenacitatem frequenter acquirere soleat, qua pupillæ formini sensim accrescens, tandemque obduscat, & in pelliculam versus, nubeculas primum, mox suffusionem pariendo; obcæcat. Quod vitium frequens admodum, foris etiam conspicuum, in vicia explicabitur.

Colore alieno humores vix inficiuntur, cum nullæ venæ aut alia vasa humores differentia, oculi interiora subeant, eiusve humores attingant. Quod tamen aliquando ab humiditatibus oculi fieri, in crystallino humore, eumque uti & vitreum glauco colore tingi, prodiderunt, & Glaucoma idè vocarunt: visumque tunc, ac si per nebulam cernerent, vitiari scripserunt. Cum tamen veteres glaucoma cum suffusione eundem affectum fecerint, tum præsertim eam sic appellantes, quando non bene confirmata adhuc pelliculâ, vitri instar crassioris; subvididis, vel cæruleo colore, nec dum alba adhuc, intuentibus apparet.

Membrarum oculi globum constituentium causa, visio læditur, si illa in ea sede consistat, quæ fusca seu nigra, ob pupillam

*Induratio Crystallini humoris, causa Visionis defectus.*

*Obscuritas Crystallini humoris, causa Nyctalopie.*

*Tenacitas aquei humoris, causa Visionis defectus, in Suffusione.*

*Discoloratio humoris crystallini, Hallucinationem pariens.*

*Membrarum seu oculi globi.*

*huius cau-  
sa Visio-  
nis lesio-  
nis.*

seu foramen, oculi interiorem cameram nigram & opacam aperiens, apparet. Quod foramen cum per superinductum illi cornu translucidum, splendorem externum in oculi interiora transmittat, si in ea sede ita obliteretur, ut transitus lucis in oculum impediat, visioni obesse, necessarium est. Quod vel exterioris membranae crassae, oculo cornu conferentis; vel subiectae vuae tunicae foramen efficientis, causa, accidit: illis vel separatim, vel simul huic rei occasionem praebentibus.

*Oculisio  
oculi, cau-  
sa Visio-  
nis lesio-  
nis.*

Vtriusque membranae ratione hoc accidit, si extra oculum impedimentum obijciatur, quod lucem quo minus ad eam quam debet oculi sedem perueniat, intercludere possit: Vti palpebris clausis, manibus, aliisque id fieri solet.

*Pupille,  
seu nigri  
in oculo  
apparen-  
tia peruer-  
sio, causa  
Strabif-  
mi.*

Ex vitio vero hoc sequenti etiam id accidere potest, si ea oculi sedes, per uia & transparens, a vicinis, ut minus recte visio fiat, impediatur. Vti fit, si pupilla non in ipsa oculi globi anteriori sede, nuda & media, sed ab ea declinans, ad latera oculi magis posita sit. Quod ab ortu, in strabismo quibusdam accidit, in quorum oculorum latere vno, plus albi ob id apparet, ita ut ipsos strabos esse quilibet ex eo cognoscat: & quod cum res intueri volunt, ut pupillam recta rebus opponant, oculum intorquendo, adeo toruum aspectum exhibent.

Licet hoc, pupilla etiam in loco naturali consistente, possit accidere, per conuulsionem musculorum oculi, ad latus vnum, oculo nonnihil trasto, & ita inuerso, ut pupilla eo potius respiciat: unde fit, ut cum rem aliquam intueri volunt, pupillam ad eam dirigant, vel caput ad latus inclinent, aut oculos, oppositis sanis musculis, ut ad anteriora aliquoufque rursus pupilla reducat, retrahant. Sicuti & hi, quorum oculi naturalem situm habent, hac ratione eos studio conuellendo, strabonum oculos & intuitum exprimere possunt. Quae conuulsio, nisi in vera conuulsione totius corporis, epilepsia nimirum, oculis acciderit, in qua similem aspectum exhibent, ab ortu plerumque contractis nonnihil potius quam conuulsis musculis, & eo situ permanentibus, strabo-

nibus euenit: eaque sola strabismi causa ab alijs explicata fuit, cum tamen illud ipsum, pupilla in latere impressa, & crystallino humore ex loco suo naturali amoto, ut dictum, fieri possit, ut simili modo oculos distorquendo, res intueantur. Quae tamen omnia visioni hac saltem ratione obsunt, quod oculo in sua sede relicto, ea quae a lateribus occurrunt potius quam quae ante faciem posita, videant donec oculo eoque reducto, ut rebus ante oculos recte positus opponatur, ea etiam aspiciant.

Sed & hoc rarum & memorabile cuidam, ex vulnere iuxta oculi interiorem angulum facto accidit, quo oculi globus adeo inuersus fuit, ut pupilla ad canthum illum maiorem usque deducta, cuteque vulneris sanati obducta, per nasi cauitatem prospicere cogeretur, nihilque amplius, nisi per canalem nasi, tanquam per fistulam videre potuerit, unde nasum ad illud, quod intueri volebat, dirigere necesse habebat. Quod fide dignorum hominum relatione, nostro tempore factum esse constat.

Corneae tunicae priuata vitia visioni tunc obsunt, cum partem illius eam, quae pupillae, instar vitri vel cornu pellucidi praeposita est, occupant, & vel tantum illic haerent, vel ulterius etiam per oculi album disperguntur. Quae & tunc manifeste conspici & cognosci possunt, cum commaculatur aut inuestitur.

Commaculata alieno colore corneae haec sedes diaphana, ita ut lucida & clara amplius minimè sit; sed obscura vel colorata, splendorem qui in visione oculum subire deberet, instar vitri, quod lucem intromittit, impuri, vel intercludit, vel falsum visioni offert.

Fitque hoc praecipue, si obscuro vel albo colore inficiatur: quo nonnunquam tota corneae sedes immutata apparet; Caliginemque dictam in senibus praesertim, quibus hoc potissimum accidit, adfert. Quod si vero in parte duntaxat aliqua illius, macula talis alba nascatur; Albugo dicitur: In quo vitio, si alba perfecte sit macula, pupillaeque toti regioni obducta, Caecitas oritur: si vero albescere primum incipiat, visum ac si nube obfusa impediretur, offuscat: vel si exiguum pupillae

*Pupilla  
peruer-  
sio, cau-  
sa  
Admi-  
randa af-  
fectum in  
visione.*

*Obscuris  
tas cor-  
nea pellu-  
cida sedis  
ex obscu-  
ro colore  
illius vel  
macula  
alba na-  
ta in ca-  
lignie, al-  
bugine,  
caecatrice,  
causa Visio-*

*in defe-*  
*ctus.* pupillæ spaciū comprehendat, aut ab ea ad iridem magis inclinet, Hallucinationem visus quandam parit.

Talis autem corneæ obfuscatio vel albedo, vel à totius corneæ, vel si macula tantum sit, à partis illius duntaxat quæ alba cernitur, exiccatione & induratione nascitur. Sicuti enim alia quæ pellucida sunt, ut albumen oui, & crystallinum humorem in animalium oculis, coctione exiccata, dealbari & pelluciditatem amittere, cernimus: ita & corneæ hic accidit, ut per senium, in quo membranæ exiccare solent, aut ex morbo oculorum post ophthalmias, epiphoras, vel tota exiccata, vel siccitate tantum certis in locis illius relicta, integra vel ex parte dealbetur. Quod & nonnunquam à nutrimenti, quo alitur portione crassiore eò delata, & remanente, maculamque albam relincente, accidere, in vnguibus, qui simili ratione albis maculis notantur, videre licet. Quæ maculæ superficialiæ alias sunt: alias verò altius impressæ, totam corneam penetrant.

Sed & à vulnere vel vlcere oculorum, præsertim post variolas in infantibus, cicatrix relicta, vel callus; nunc altior, nunc profundior & densior, ferè in albuginè oculi, talem maculam albam, interdum amplam, interdum oblongam, quæ Cicatrix appellatur, efficit. Quæ visionem vel penitus obliterat, vel ex parte: aut si longa sit & angusta, illam veluti interfecat & diuidit.

*Discoloratio rubra vel flaua corneæ lucida, sed, causa Hallucinationis.* Præter hæc corneæ tunicæ discolorationes, rubræ maculæ vel flauæ interdum, ex irruente sanguine, ab ictu oculi, vel bilis infusione, in ictericis, sed in alba huius tunicæ sede, quam adnata tunica, vasa deferens, tantum inuestit, saltem ferè apparentes, nec visioni tunc incommodantes, occurrunt. Quod si verò in lucidam corneæ sedem vsq; pertingant (ubi sæpè diu macula rubra, sanguine citra corruptionem in corneæ substantia, veluti infecta in succino persistente, conspicua est) eundem colorem, vel rubrū, vel flauum, in singulis imaginibus, quas oculus videt, visioni repræsentant.

*Tunica corneæ* Inuestitur extrinsecus eadem tunice corneæ sedes transparens, tunica noua accre-

scente. Quæ illi nunc penitus connata, obdusa coalescit, vel citra connexum, nisi vbi exoritur, & in ambitu adhærescit, reliqua se de tantum obducitur: nunc ex maiori, interdum & minori oculi cantho prodiens: alboque oculi primū expansa, mox & nigrum illius, vel ex parte, vel totum obtegit. Estque primū tenuior; mox crassescens carnosa fit, venis multis cruentis connexa, diciturque Panniculus; adeoque sæpè augetur, ut digitis apprehendi, & ab oculo aliquousque eleuari possit, portioque illius aliquando duarum vnciarū pondere, absecta fuerit. Aliàs verò indurata albescit, tuncque Vngula, Vnguis, Pterygium Zebel appellatur, Visum, prout nigrum illius plus minúsve occupat, penitus vel ex parte delens.

Quæ vel ex sanguinis affluxu spontaneo, aut post exulcerationes excrecens, Hypofarcosis aut Chymosis existit. Aliàs à priuato vitio, membranæ præsertim infesto, elephantiacis frequenter admodum accidit, vti illic explicabitur: rariùs aliàs in homine eueniens. Sicuti piscibus, si in aqua impura diu in vinarijs retineantur, accrescente illis limo, eosq; obcæcâte, sæpè accidere vidi. Interdum ab erosæ tunicæ corneæ superficie nascitur vnguis dictus: quando tunc exudans nutrimenti illius portio, in similem illi, cornu vel vnguentum referentem materiam, nisi quod pellucida non est, concreuit: Sicuti erosio ossium periostii, nodos, & cute vulnerata, cicatrices, ex succo quoq; illos nutrire solito, generari, alibi diximus.

Vueæ membranæ vitia visui nocent, cum foramen illius, quod pupillam vocant, in parte ea vueæ, quæ corneæ subtenfa est, minimè tamen adnascitur, peruium, lucemq; in oculum intromittēs, vel humore aliquo, aut mucō obturatur; vel imminuitur aut dilatatur. Quæ omnia, cum cornea, quæ illi præponitur, transparens sit, licet sub ipsa noxa lateat, extrinsecus quoq; nigro oculi, illiusve ambitu, videri cognoscique possunt.

Ab humore obturatur nonnunquam hoc foramen, visuique via intercluditur. Fitq; hoc à propriis nonnunquam oculi humori-

*Obstru-*  
*tio v-*  
*ueæ fo-*  
*raminis*

seu pupillæ ab humoribus pro-  
pris oculi, causa  
Fus hal-  
lucina-  
tionis.  
Obstru-  
ctio pu-  
pillæ, à  
sanguine.  
Et pure-  
ta Hy-  
pophy-  
agma.  
Hypo-  
pho, cau-  
sa Visus  
Hallu-  
cinatio-  
nis vel  
Defec-  
tus.

bus, crystallino & vitreo in ipsum prolapsis: sicuti ex humorum situs permutatione, vti dictum fuit, & pupillæ nimia amplitudine, sicuti dicetur, potest accidere, visioq; sic impediri. Quod & tunc, cum albiginis instar appareat, in oculi ea sede videtur.

A sanguine ab ictu, non tantum in corneam infuso, vti prius dictum est, sed etiam ad spacium hoc, inter corneam & vueam inane vsque penetrante, illudq; omnino, vel ex parte adimplente, & pupillam obturante, idem potest fieri. Qui ruber ab initio, tandem verò luescens, mox nigricans, illic latere apparet (cum sanguis in spacia corporis infusus, mox corrumpatur, secus ac cum cornea illum imbibit, vbi citra mutationem rubeus diu sæpè, vti dictum, persistit) visumque tunc vel depravat, vel obfuscet: plus minusve, prout spacium exiguum, vel totum occupat, oculiq; Sugillatio, Hypophagma propriè appellatur.

A pure quoque in ea sede collecto, visio impediri potest, diciturq; tunc affectus ille Pyôsis. In quo si pus copiosum collectum, oculi nigrum totum occupare, aut etiam iridis spacium totum implere, perq; corneam pellucere videatur, Hypopyos dicitur. Si verò exigua illius portio, in dicta sede vnguis resecti instar tantum translucere videatur, Onycha seu vnguis appellatur.

Cuius parvis collectionis causa, sanguis, vti dictum, oculo illapsus, & in pus tandem conuersus, plerumq; esse solet. Vel inflammatio oculi prægressa, & abscessum post se relinquens: non eum, in quo cornea simul corrumpitur, & in pus conuersa, eo rupto humores oculi profundit, vt superius dictum est: sed in quo, discusso post inflammationem sanguine, in ea tantum sede portio illius remanens suppuratur. Adhæc sine inflammatione vel causa externa puris hanc collectionem, etiam interdum fieri post capitis dolores, scripserunt: quod cum sit, verisimile, ex aqueo humore sic suppurato, & maturato, sicuti pus ex similibus humoribus generari posse, alibi docuimus, hoc factum esse: cum sanguis aliàs huc, nisi per vim contusa cornea, perferri, venis vti dictum, eo minime pertingentibus, vix possit.

Muco tenaci, in ambitu huius foraminis seu pupillæ margini adhærente, illiq; prætenso, sensimque concrecente, in vno scilicet tantum oculo, licet & alter nonnunquam mox simili ratione affici incipiat, visio frequentissimè labem patitur, diciturque, quod pupillæ suffundatur, Suffusio Hypochyma. Quæ ab initio, cum sit adhuc mucus pellucidus, & lucem transmittat, ob crassitiem tamen visioni, ac si nube obtensa obfuscaretur, & varijs atomis, vti dictum, volitantibus, res viderentur, impedimentum ac hallucinatione parit, unde tunc Imaginatio & Nubecula, vti ostensum, appellatur. Atque hæc in oculo nondum bene conspicua est, nisi quod illius nigrum, quod Stellam vocant, non exactè nigrum, sicuti penitus nigrum esse debet, sed turbidum nonnihil apparet. Quo etiam, si in vno tantum oculo hoc videatur, altero adhuc puro existente, ab illa imaginatione & nubeculis, quæ vaporum causa simili ferè modo oculo se offerunt, nisi quod utrumque æqualiter afficiant, distinguuntur.

Tandem verò sensim magis magisque mucus ille incrassatus, perspicuitatemque amittens, facilius intuitu cognoscitur, glaucoq; ferè, vel cinereo, vt Oculistæ vocant, colore se manifestat, ac nigrum oculi nonnihil delens, visui tunc quoq; magis officit, Quam immaturam suffusionem & aqueam, German. Ophthalmotomi, Wasserstern, quia cum mollior adhuc sit, & aquea, acu, vti dicetur, deprimi nondum possit, vocant: quam veteres à glauco colore, Glaucoma, quod crystallini humoris vitium est, nominarunt; & quia crystallinus humor, hoc colore tinctus, suffusionis immaturæ specimen præ se fert, aliqui illud ignorantes, glaucoma propriè dictum idem cum suffusione fecerunt.

Postremò verò, muco iam enarrato, penitus incrassato, dealbaroque, sicuti exiccatione res lucidas dealbari, & perspicuitatem omnem amittere, supra diximus, ita & hic accidit, visioneque penitus tunc sublata, Cæcitas omnimoda sequitur: Nisi fortè, vti sæpè vidi, in parte aliqua illius, vel in ambitu

Obstru-  
ctio pu-  
pillæ a  
muco,  
tandem  
in pel-  
luciam  
concre-  
scente  
Suffusio  
dicta,  
causa Vi-  
sus defe-  
ctus.



ambitu tantillum nigri adhuc, punctum vel circulatim compareat, per quod exigui splendoris scintillæ, oculum adhuc luce obfcura, ex qua tamen nihil rectè dijudicari possit, illustrant. Estque hæc Confirmata suffusio dicta, quam Maturam, si modo exactè videatur, quòd tunc primum eam chirurgus tractare possit, appellare solent: & Pelliculam & Telam, Germani. Scilicet quòd tunicæ instar pupillæ obtensa, splendorem intercipiat, communiter appellat: Oui albumini coctione obnatæ pelliculæ, & colore & tenacitate non absimilis: & licet per se nullius momenti esse videatur, tantam tamen calamitatem corpori, in visus priuatione, multis mortalibus adferre solet.

Causam huius mucoris pupillæ accrescentis, ad vaporis oblationem, vel humoris influxum, referunt. Cæterum à vapore non hanc suffusionem, sed imaginationes simpliciter dictas fieri, & quomodo id accidat, supra ostensum fuit: & sanè hominis nimio otio abundantis esset, adeò vanam opinionem pluribus refellere.

Ab humoris verò influxu, reliqui omnes id fieri censent, huicq; auertendo, vti explicabitur, curam omnem frustra accommodant: & proin hunc affectum ineptè Cataractam, alij Aquæ descensum in oculos vocant. Quod tamen nec ratione vlla probari, nec demonstratione ostendi potest. Primum enim si ab aquæ vel humoris in oculi globum fieret affluxu, non hæc exigua tantum, & vix lentis instar ampla nasceretur materia, sed oculi globus totus distentus, & veluti hydropicus tumeret, Quin quòd nullum spatium inane in oculo inuenitur, quod aquam hanc possit admittere, cum totus vndique proprijs humoribus, ab ortu in eo natis, adeò repletus & distentus sit, vt ne guttulæ quidem alienæ locus superfit, aut cornea vlla ratione amplius distendi dilatarique queat. Dein & per quam viam quæso, hæc aqua in oculum destuet? cum illud per venas & arterias, quæ vt supra declaratum fuit, oculi interiora minimè subeunt, fieri nequeat. Verum per opticum neruum aiunt id fieri: egregium sanè subterfugium, partem tam nobilem, excre-

mentis hisce deferendis, apertam statuere, per quam præter æthereum illum spiritum animalem, transire nihil potest. Sed fac illum humorem per neruum hunc descendere, quomodo obsecro ad pupillæ foramen peruenire poterit? cum nec retiformis neruus cauitate sua, quæ vitreo humore penitus impleta est, illum possit admittere: nec vteam, quæ in ambitu vndique corneæ ciliaribus processibus transuersim connata est, pertransire possit. Quæ certè illos, qui opinionibus eiusmodi, cum sensu & ratione pugnantibus, patrocinantur, si modò oculi fabrica penitus ipsis est cognita & perspecta, ea qua par est diligentia perpendere prius oportebat, & veras vias potius, per quas humores ferri possunt, indagare, quam ignoratis proprijs morborum causis, ad commune illud ignorantie asylum, defluxiones, & corporis nescio quam transpirabilitatem semper confugere.

Nos verò hæc diu multumq; perscrutati, & longa observatione, suffusiones innumeras, earumque principium, augmentum, & punctiorem propius contemplati, ab aqueo humore tenacitatem aliquam adipiscente, causam huius mucoris proficisci, deprehendimus. Ille enim (sicuti in illius & aliorum humorum explicatione superius dictum fuit) cum ab ortu tenacior existat, (nam & hoc vitium recens natos secum in lucem attulisse, aut mox illis superuenisse, sæpè vidimus) vel ætatis decursu in senio, in quo frequenter accidit, exiccatus: vel à morbis calidissimis, post febres ardentes, aut oculorum inflammationes, aut calorem externum vehementem, in illis qui ad ignem sedendo, eumque iatuendo pleraque munia obeunt ortus: vel colliriorum nimis calidorum & siccantium vsu, aqueus humor inspissatus, viscosiorque: vt dictum, factus, membranæ huius foraminis, quod continuo alluit, margini sensim accrescit, atq; ea sede, qua foramen illud opplet, sicuti in pulte cutem dictam nasci cernimus, paulatim concretus, eâ ratione, vt ostensum, induratus, splendorem amittit, & successiuè, sed longo tempore, in pelliculam conuersus, visionem tollit, Quæ si deprimatur, vt po-

sterius explicabitur, portione aquei humoris reliqua, cuius superficiei innascebatur, pellucida adhuc existente, visus statim reddit: sin & illa quoq; iam luciditatem nimia exiccatione amiserit, vti frequentissime accidit, licet superficies illius detracta sit, cæci nihilominus manent, & ob id frustranea fuerit Oculistarum opera.

*Angustatio pupillæ, causa Nyctalopie.*

Angustatio nimia vel imminutio, vt vocant, foraminis illius in vœa, quod pupilla vocatur, visionem vix aufert, cum etiam per angustissimum foramen, lux oculum subire, illumque quantum ad visionem sufficit, illuminare possit. Vnde & eos quibus ab ortu exigua admodum pupilla contigit, nihilominus æquè atque illos qui eam amplam habent, acutè videre, imò interdum acutius, resque magis distantes, animaduertimus. Et quemadmodum per exiguum foramen minori oculi offensa solem intueri possumus, ita illi minus à splendore externo & magna luce, quàm alij, offenduntur. Quibus & cum præ cæteris copiosius ad bene videndum opus habeant; sit, vt sub noctem aut tenebris iam nonnihil ingruentibus, minus cernant, quàm plena luce, estque hæc præcipua Nyctalopie illius, in qua ad leuem splendorem lunæ, stellarum vel accensi luminis, non sufficienter vident, causa. Licet & hoc, vt superius explicatum fuit, corneæ aut humorum obscuræ rationis causa, quia tunc maiori quoque luce vt illuminentur, opus habent, possit accidere, neque in omnibus nyctalopis exigua pupilla obseruetur.

Quod vt congenitum quibusdam est: ita vix ob spirituum oculum distendentium paucitatem, aut tantam oculi globi siccitatem, quemadmodum aliqui docent, vt ob eam penitus pupilla concidat, fieri potest: sicuti aliquando ex oculi vulnere, effluxis humoribus, & collapsis tunicis penitus occæari, vt superius declaratum fuit, contingit.

*Dilatatio pupillæ, seu Myrtiasis, seu causa Vesperiæ, aciei.*

Dilatatio pupillæ Myrtiasis dicta, copiosam lucem in oculum spargendo, visionis claritati obest, nimio splendore tenebras illi offundens: etsi magna illius sit ampliatio, in obscuriore nonnihil & tenebricosiore luce, rectius quàm in nimium lucente vident.

Hincque animaduertimus inter aues, noctuas, & inter animalia catum, quæ noctu quoque vident, pupillæ foramen niſtando contrahere, & spontè diducere rursum posse: atque ad splendorem lucis vel luminis ita coarctare, vt oblonga fissura nigra tantum appareat, noctu verò & in tenebris ad eò dilatare, vt tota anterior iridis regio nigra videatur: ob eamque causam etiam noctuæ obscuras imagines, oculo admodum aperto hauriunt, & interdum ne ijs nimium apparentibus lædantur, rursum coniungunt, tenebrasque captant. Alioquin enim ad res distantes melius aut minus cernendas, vt putarunt aliqui, hæc pupillæ amplitudo angustiaue, parum facit: cum & ampla & angusta pupilla prædictis, visionum hi defectus, quos iuuenum & senum visiones appellauimus, possint, vti sæpè notauimus, accidere, & quod in multis, meq; ipso obseruavi, etsi vnius oculi pupilla longè amplior, quàm alterius oculi in eodem homine existat, visionem tamen in utroque oculo, similem euadere. Nec dum, etsi talis pupillæ dilatatio eueniat, res quæ cernuntur, minores quàm sunt, repræsentari, sicuti aliqui opinati, obseruare potuimus.

Ab ortu verò plerumq; hæc pupillæ dilatatio animantibus quibusdā, sicuti illis quæ noctu videre conueniebat, euenit, & nisi modum omnino excedat, aliter quàm dictum, visioni minimè incommodat, sed potius vtilitatem aliquam, quam mihi quidam exposuit, adferre videtur. Cūcum pupilla contigisset amplissima, non solum capite immoto, ea quæ ante faciem, sed & quæ in lateribus dissita erant, & ab aliis non nisi capite eò inclinato, videri possunt quoque per visum comprehendere, & cognoscere potuit. Quod eò facilius illi narranti credidi, cum & mihi ipsi, in iuuentute hoc contigerit, & in mensa vno intuitu plures in ambitu sedentes, simul cernere, ipsorumque gestus notare potuerim. Quod si verò ex vulnere vel læsione alia, oculi pupilla potius dilaceretur, quàm dilateretur, tunc eo nomine, quod humores ad anteriora nimium ferantur, vt supra expositum, visione citius officit, quàm vt eo quo dictum modo, mutationem

tionem adferat. Ab humorum influxu, vti putarunt, fieri non posse, iam declaratum fuit. A spiritu vero impulsu vehementi, ex conatu, si oculo dilatato, pupilla etiam ampliaretur, mox tamen eodem cessante, ad naturalem rediret amplitudinem.

### Curatio.

**C**uratio omnium harum visionis læsionum: nimirum in cæcitatibus, amblyopiæ, visionis quæ senem & iuuenem appellauimus, myopiæ, nyctalopiæ, vespertinæ aciei, hallucinationis, imaginum, scotomatis, vertiginis, cæterorumque, ratione causæ instituitur. Quæ est, sicuti dictum fuit, vel in cerebro, affectus illius non tantum visioni, sed & alijs sensibus noxam inferentes; Vel priuatim & præcipue visioni incommodantes: nimirum læsio, contorsio, siccitas, refrigeratio, spirituum agitatio & conturbatio, vel repletio ab humore aqueo. Vel est retiformis nervi, per consensum factus affectus: Aut in oculi humoribus membranisque; morbi præsertim organici: nimirum, defectus humorum oculi: situs vneæ foraminis seu pupillæ; aut humorum oculi peruersio: substantiæ autem immutatio: paruitas & amplitudo pupillæ nimia: macula alba ex suffusione, albugine aut cicatrice apparens, & panniculus oculo obductus: vel humor vtilis, sanguinis, pus in oculo, collecta. De quibus, quid in singulis prædicendum, agendumque sit, ordine explicabimus.

Cerebri vitio si visionis læsio fiat, sitque hoc generale, non saltem visionem vitians, sed & sensus alios, tam internos, quam externos tollens; minuens vel deprauans, & per consequens visioni etiam incommodans; curatio, vti & illorum tota tractatio, in generalibus hisce læsionibus, explicata fuit. Vt in apoplexia, cæcitas vna cum reliquis sensuum abolitionibus accidens. In mania & delirio, spectra, imagines & vertigines: quæ illis simul quoque superueniunt cum alijs accidentibus. Atque in mentis imbecillitate, visionis imbecillitatem, quæ sensuum interorum defectum comitatur.

Cæterum si affectus hi extra oculum ad-  
huc, in cerebro vel nervo optico consisten-

tes, præcipue visioni obsint, hic tractandi erunt, & pro causæ ratione, curatio vel prædictio instituenda.

Si itaque ex læsione insigni, vel vulnere circa oculum adacto ad nervum opticum usque, visio sublata sit: sicuti aliquando accidisse, nulla alia læsione secuta, diximus; cæcitas illa immedicabilis erit.

Quod si quoque contorto ex convulsionibus nervo optico, vti dictum est, cæcitas inducatur, nisi intra dies aliquot sponte visio redeat, sicuti euenisse vidi, desperata salus: vti & deinceps toto ætatis tempore cæcos mansisse notaui.

Neque spes aliqua curationis erit, si ex siccitate nimia optici nervi, post febres ardentissimas cæcitas relicta sit: cum ea quæ extrinsecus fronti & capiti, humectationis causa adhiberi, in memoriæ imbecillitate ex siccitate contracta, debere diximus, etsi hic quoque conueniant, tamen parum plerumque profunt, & ad nervum difficulter vires suas producere queunt.

Sed & si ab externo frigore à vento, vel applicatione oxyrhodinorum frigidorum, cæcitas fiat, cum nervis frigidum omnino inimicum sit, noxa illa fere incurabilis existit. Tamen actu calidis & potentia, frons & caput fouenda inungendaque erunt. Impremisque odorata naribus, quæ calida sunt, & penitus ad nervum usque pertingunt, adhibenda. Quorum remediorum formas in stupore à frigiditate facto, iam exposuimus.

Nec quoque salus aliqua speranda, si articularum induratarum vitio, vti aliquando inuentum fuisse diximus, vertigo illa diuturna fiat. Quod tamen cum viuente homine, vix coniectari possit, de eo aliquid certi prædicere, temerarium esset: donec post mortem sectione facta, causa mali deprehensa Medicum excuset.

A spiritu vero in cerebro agitatione, à causa tantum externa, si vertigo fiat, ob motum corporis aut animi saltem, nulla intrinsecus alia causa concurrente, illa etiam, cessante causa, sponte cessat: Citiusque si contrario motu facto, spiritus reducantur & sistantur. Vt si ex circumactu corporis in dextrum latus vel sinistrum, vertigo facta sit, opposito

si nervi  
optici in  
cerebro  
ad huc læ-  
tæ in cau-  
sa fiat,  
curatio.

Vertigi-  
nis rara  
indura-  
tis Ar-  
terijs ce-  
rebri, ac-  
cidentis,  
curatio.

Vertigi-  
nis à spi-  
rituum ce-  
rebri a-  
gitatio-  
ne facta,  
curatio.

in finistrum vel dextrum latus motu, citius ea cessat. In quibus & supinus decubitus iuvat; qui tamen, si ab interna causa vertigo procedat, aut ex ebrietate, eam potius proritat. Si ne sic quidem cesset, frictions extremitatum iuuat. Et somnus superueniens eam aufert.

*Vertigi-  
nis Sco-  
tomatis  
& ima-  
ginatio-  
nis à va-  
poribus  
inductis  
curatio.*

Quod si verò spirituū hæc agitatio & perturbatio à vaporibus sursum delatis oriatur: vnde & vertigines & scotomata, & imaginationes: vel separatim vel semel fiunt. Tunc humores, qui vel in ventriculo, vel venis meseraicis, circa vterum, aut in habitu corporis alicubi, & ipso nonnunquam capite continentur, à quibus vapores hi exsurgunt: quos biliosos, sanguineos, impuros potius, quam pituitosos esse diximus (cum pituitam alia ratione & vertiginem & amblyopiam efficere ostenderimus) expurgandi, & vnà cum vaporibus diuertendi erunt: per sanguinis detractiones: scarificationes; frictions: cauteria: vomitus & purgantia. Idq; exhibitis, admodisq; Et viuendi ratione vapores hi inhibendi: sequenti modo.

Sanguinis detractio, per brachij humerariæ venæ sectionem, in plethoricis, non tantum si alicubi in sanguine fomes mali lateat, sed & si in capite sanguis vel copiosus, vel spirituosus redundet, causamque vertigini præbeat, competit. Nam cum in cerebri finibus, sanguis tam arteriarum quam venarum confundatur, etiam vena aperta, spirituosus sanguis exhauriri potest: in quo, si malum totum ferè lateat, præcipuus curationis scopus in phlebotomia existit. Ob eamque causam etiam iugulares in collo aperire iubent: quod tamen non sine periculo, & metu summæ hæmorrhagiæ, & sterilitatis, si Hippocrati credimus, fieri potest. Imò spirituofo sanguine vertiginē causante, eam curari non posse, nisi arteriæ post aures aperiantur, plerique docent: experientiaque comprobatum est, post varia diu frustra tentata remedia, hoc auxilij genus tandem iuvisse: quod tamen non nisi omnibus prius tentatis, & cum certi de causa sumus, eamq; ex spirituofo illo sanguine profectam esse; ex pulsu arteriarum continuo, vti dictum, cognoscimus, summa tamen adhibita dili-

gentia, cum vulnus ægrè coalescat, denudata, primum arteria, vt postea ligari possit, fieri debet. In fronte quoque, in vertigine ab hac causa orta, vena aperiri posset: & in pede, si inde vapores ascendant. Et sim enses suppressi essent, saphena. præsertim circa vteri venas, causa vapores sursum demandans, lateat. Quò nomine & hæmorrhoides, si in meseraicis mali fomes contineatur, vtilissimè prouocantur.

Scarificationes eadem ratione, loco venæ sectionis, & post illam, ad deriuationem faciendam, in colli lateribus, scapulis, adhibitis cucurbitulis, factæ, etsi causa sit in capite, vel aliunde per vapores sursum feratur, profunt. Peculiareq; remediū in vertigine, scarificatio in carpi regione, vel manus ea sede externa, quæ est inter pollicem & indicem censetur. Quæ & in extremitatibus, si inde aura ascendere sentiatur, eo loco, vnde primum exsurgerè cognoscitur, facta utilis est.

Frictions à collo per spinam ad inferiora, sensim ad extremitates veniendo, easque fricando, fieri debent: sic enim vapores, spiritusque reuocantur. Post quas, vt quod in capite collectum est, discutiatur, caput panno nouo (non calefacto, vt alioqui facere solent, ne vaporum fiat ad caput attractio) fricetur.

Sed & ligaturis, si à parte aliqua prodeat vapor, eam vinciendo, vapor ne ascendat, impedire poterit.

Cauterium in perseuerante malo, vel Vesicatorium, quod plus humoris euacuat, diuersionis maioris causa, eodem nomine in medio capitis conuexi, vel post aures applicandum: siue actuale, siue potentiale existat. Nonnunquam & in pedibus aut alijs locis: si vapor inde suscitari sentiatur.

Vomitus, si in ventriculo aut venis meseraicis, biliosa præsertim, vti dictum est, materia vapores gignat, plurimum iuabit: in imaginationibus, scotomatibus & vertiginibus, inde progressis. Qui leuioribus primum; mox quoque fortioribus, si in venis meseraicis materia lateat, etiam repetitis viciis, si ferre possint, concitandus erit.

Purgantia, si in iisdem primis viciis, materia vapores demandans, aut alibi etiam in cor-



potis alia sede consistat, in omnibus illis speciebus erunt vsurpanda: & si in capite, à sanguine impuro talis evaporatio exurgat, illuvies illa expurganda est: Biliosis, acribus, impuris humoribus, à quibus vapores potius hi, qui subtiles sunt, eleuantur, educēdis; ea, potius quàm pituitæ expurgandæ, accomodantes: de cuius euacuatione, si vertiginis aut visus imbecillitatis causa sit, postea agemus: corporis cōstitutionis interim quoque in illis eligendis, habita ratione.

Hoc autem præstabitur, exhibendo primum pilulas aliquas stomachales leuiiores, ex Aloë paratas, & Hieris: vel Bolum.

Dein materiam, si præparatione opus habeat, prius præparabimus: & imprimis obstrusiones referabimus: hoc modo.

Si materia in ventriculo lateat, & bilis vel cruditas illic in causa sit: R̄. Oxymel. simplic. Mellis ros. ana ʒ. j. syrup. de Absynthio, Vini granatorum ana ʒ. ʒ. aquarum Absynthij, Maioranæ q. s. fiat Iulep.

Vel si in venis meseraicis potissimum lateat: R̄. syruporū de Cichorea, de succo Endiuie ana ʒ. j. de duabus Rad. ʒ. ʒ. aquarum Absynthij, Cichorij q. s. fiat iulep.

Vel Vinum absynthites detur: quod præsertim in illis vertiginis speciebus plurimum laudatur. Idque vel simplex: aut cui Radices aperitiuæ, & Maiorana, aliæque de oppilantia prius infusa sint.

Purgabitur dein fortiori medicamento, vt R̄. pilul. de Hiera, vel Masticinarū ʒ. ʒ. Cocciarum ʒ. ʒ. olei Fœniculi, vel Anisi, vel Carui (propter vapores) guttam j. seminis Pæoniæ gr. iij. cum Vino albo: fiant pilulæ.

Vel vsuales sic fiant, de quibus ʒ. ij. sumat aliquoties: R̄. pilul. de Hiera compos. Aggregatiuar. ana ʒ. ij. Agarici troch. Rhabbarbari ana ʒ. j. seminum Cimini & Pæoniæ ana ʒ. j. cum syrup. Ros. sol. fiat massa ad vsu.

Vel sumat hunc bolum: R̄. Cassiæ ʒ. iij. Hieræ Hermetis ʒ. ij. misce.

Vel paretur bona quantitas: de qua bolus ʒ. ʒ. quantitate per intervalla sumatur: R̄. Cassiæ ʒ. j. ʒ. Hieræ Hermetis ʒ. j. Myrobal. quinq; generum ana ʒ. ij. Epithymi ʒ. j. pulu. rad. Pæoniæ ʒ. ʒ. seminis Cimini ʒ. j. syrupo Ros. sol. q. s. fiat electuarius.

Vel detur potio aut infusio hæc: R̄. Rhabbarb. ʒ. j. Agarici ʒ. ij. Myrobal. citrin. ʒ. ij. Absynthij ʒ. j. Cinamom. ʒ. ʒ. Zingib. ʒ. j. infundantur in Vino albo tenui: exprimantur dissolve syrup. Ros. sol. ʒ. j. Detur.

Vel sic: R̄. Agarici troch. in Oxymel. infusi & expres. ʒ. j. Rhabbarbari in Vino, dilutiaqua Absynthij & Betonice, infusi ʒ. ij. Cinamomicum rhabbarbaro infusi ʒ. ʒ. syr. Ros. sol. ʒ. ij. fiat potio.

Vapores interea semper reprimēdi erūt, qui in vertigine, scotomate & imaginibus, caput petunt: loco interim considerato vnde hi exsurgunt.

Si enim hoc fiat à ventriculo & venis meseraicis electuariū sequens convenit: Quod post prandium & cœnam exhibebitur, interdum & manè, castaneæ quantitatis instar: quod R̄. confervarum Rosarum ʒ. ij. Maioranæ ʒ. j. florū Pæoniæ ʒ. ʒ. condit. Cyton. ʒ. j. cort. Citri ʒ. ʒ. Myrobal. embl. numero j. Rob. de ribes (in biliosis) ʒ. ʒ. pulu. Diacytonit. sine speciebus ʒ. j. seminis Coriandri præp. ʒ. j. Masticis ʒ. ʒ. cum syrup. conf. cort. Citri: fiat electuarius.

Vel vtatur huius pulueris, post pastum dicti, cochleari vno, qui R̄. seminis Coriandri saccharo semicooperti ʒ. j. seminis Anisi simili modo cond. ʒ. ʒ. pulueris Diacyton sine speciebus ʒ. j. Dyarrh. abb. Santali rub. cort. Citri sicci ana ʒ. ʒ. fol. Euphrasie, Maioranæ ana ʒ. j. Masticis ʒ. ʒ. Sacch. ros. tab. ʒ. ij. fiat puluis.

Tabulæ parari possunt, ex puluere Diacyton. sine speciebus ʒ. j. Coralli rub. ʒ. ʒ. rasuræ Eboris ʒ. j. cum Saccharo dissol. in aqua Rosar. ad ʒ. ij. fiant tabulæ.

Ad vapores impediendos, præstantissimum quoque est remedium, si ieiunis, vt fieri solet, paroxysmus eueniat, cibum exhibere: quo sumpto statim mitescit, vel cessat vertigo, imaginatio & scotoma: eoq; sola aliqui, ieiunium viantes, restituti sunt.

Somnus quia vapores discutit, plurimum in hisce casibus iuvat.

Extrinsècus ventriculi regione emplastra, cerata, si inde vapores, & à venis meseraicis pròdeant, ad eos impediendos adhibentur. Quæ nocte gestant.

Veluti emplastrum de Mastice : vel aliud pro ventriculo paratum : malaxatum oleo astringente aliquo. Aut ceratum Galen. pro ventriculo.

Vel tale: R. Ros. rub. fol. Absynthij an. 3. ij. cort. Citri ficci, Ladani ana 3. β. Masticis 3. ij. pulueriscentur & cum oleo Cyton. vel Masticino, addita Cera: fiat ceratum.

Si circa vteri regionem hi vapores exurgant, eadem emplastra de Mastice, vel pro Matrice, illius sedi apponantur: & aliquandiu gestet mulier: nisi mensium retentio id prohibeat, quibus fluentibus, omittuntur.

Si ab alia corporis sede, vt pedibus; aut alijs, aure instar ascendens vapor, vertiginem, vt dictum, procreet: Tunc lotio illarum partium, vti & in alijs causis si fiat, plurimum diuertit.

Quæ & sic fieri poterit: R. fol. Saluix, Rosmarini, Spicæ celticæ, Iuæ, Hyperici, florum Chamomil. Rosarum, Lauandulæ, q. s. decoquantur in Vino & Lixiuio.

Postea vngat sequenti inunctione pedes: R. oleor. Laurini, Lumbricorum, Cheirini ana 3. j. Aquæ vitæ 3. β. Salis parum: Coquantur ad vsum.

Capiti admouenda, quæ vapores repellant, Oxyrhodina, si necessitas admodum urgeat. Et si perseveret, addendo validius astringentia: vt succum Plantag.

Et successiue cucupha talis gestari debet, quæ R. rad. Cyperi, Acori veri, cort. Citri ana 3. j. feminum Coriandri 3. ij. Myrtil. 3. j. florum Rosarum, Anthos ana 3. β. Gariophyll. 3. β. fiat puluis: Pro cucupha.

Supra oculos aliqui in imaginationibus & scopomatibus remedia posuerunt: quæ superuacanea, cum vapor ad oculos minime perueniat, esse existimamus.

In viuendiratione, moderata omnia sint, Cibis simplex; non nimius. Vinum quoque parce vel dilutum bibant. Motus corporis nimius vitetur: & imprimis capitis nimia agitatio, aut inclinatio. Intuitus item rerum rotantium, vel admodum splendentium caueatur. Et à nimia animi per studia & vigilias agitatione, abstineant.

Appensum Crystallum plurimum valere in vertigine, censent: atque ex poculo inde

parato, eiusdem vilitatis gratia bibunt: vel poculis crystallum immergunt.

Repletionem cerebri ab aqueo, seroso & pituitoso humore, vertiginem fluctuatione sua & flatibus efficere, & ex affluxu eiusdem humoris ad nervum opticum, cæcitatem, aut ex illius irrigatione, amblyopiam interdum nasci, dictum fuit. Et præter hæc visionis læsiones, quæ causa cerebri sunt, oculi vitia visioni incommodantia, nulla alia à pituita vel affluxu talis humoris, qui neque nervum retiformem, nec oculum subire potest, fieri posse demonstratum fuit. Proin & hisce tantum affectibus, hanc curandi rationem, quæ huic causæ solum debetur, accommodamus, neque eam, vt alij fecerunt, ad suffusiones, aut alios oculi affectus, quos à pituitæ influxu quoque prodire crediderunt, referimus.

Hic autem, etsi talis quoque cura, qualis caro, apoplexiæ, & alijs cerebri pituitosis affectibus debetur, cōueniat, & propterea fortè hoc loco non amplius repeti deberet; vt tamen, qua ratione in hisce affectibus, ea visioni quoque accommodanda sint, intelligatur, hic explicabimus.

Periculosa autem est vertigo inde nata, si magna capitis adsit repletio: qualem, vt demonstratum est, sæpius inuenimus: quæ cum ægrè auferri possit, in carum & apoplexiam, quorum prænuntia est, interdum desinit. Sicuti & amblyopia si inde accadat, in cæcitatem, quæ interdum mox ab initio, humore affatim affluxo, prima esse solet, temporis spatio conuertitur. Quibus proin præcauendis, in vertigine & amblyopia inde natis, sequenti modo mederi studebimus.

Humores illos excrementitios, serosos & pituitosos capitis, auferre primum conabimur: illos à cerebro euacuando, reuellendo & deriuando. Dein cerebrum quod illos generat, & ab illis rursus humectatur & refrigeratur, calefaciendo: illudque ipsæque illi, nervis, oculisque appropriata sunt, roborando. Et simul causam ne de nouo generetur, aut foueatur, impediendo. Quod remedijs introforisque adhibitis præstabitur. Purgantibus per aluum, per os & nares: Vel per sanguinis detractiones: aut admota capiti, alijsve partibus consentientibus: Vel per exhibita alteran-

Visus imbecillitas et vertiginis ab aqueo & pituitoso cerebri humore prosectorij curatio.

alterantia: Viuendique rationem: Non neglectis amuletis.

Purgationes per aluum ad pituitæ capitis educationem, & causæ, ne de nouo generetur, impeditione, methodicè sic instituantur.

Clystere præmittitur stimulans & acre. Quod & per interualla vel hebdomadatim vtiliter inijcitur.

Et in visionis huius læsionibus, sic magis accommodatum erit: R. rad. Ireos, Pæoniæ, rec. ana ʒ. ij. herb. Centaurij min. Betonicæ, Rutæ, Euphrasie, Fœniculi ana m. j. florum Chamomil. Lauendulæ, vel Stœchados ana p. j. feminum Fœniculi ʒ. ij. Carui ʒ. j. Senæ (quæ proprietate oculis conuenit) ʒ. ʒ. Agari in petia ligati ʒ. iij. Furfuris p. j. fiat decoctio: dissolue Mellis communis vel anthosati ʒ. j. Hieræ logodij vel Hermetis ʒ. ʒ. olei Rutæ, Liliorum ana ʒ. j. Salis nitri, parum: fiat clyster.

Præparatur humor ante purgatione, per dies aliquot: iulepo vel decocto, vel vino.

Iulepus sic parabitur: R. Mellis anthos. (loco rosæ vel oxymell. quod propter acetum non adeo neruis vtile erit) syr. de Stœch. de Betonica, an. ʒ. j. ʒ. aquar. Euphrasie, flor. Pæoniæ, Fœniculi, Maioranæ an. ʒ. iij. misce: aromatizetur nucè mosch. & Cinamomo.

Decoctum tale erit: Pro aliquot vicibus: R. rad. Ireos, Pæoniæ ana ʒ. j. herb. Veronicæ, Euphrasie, Fœniculi, Rosmarini, Menthæ ana m. j. florū Anthos, Stœchados, Pæoniæ ana p. j. feminum Fœniculi, Anisi ana ʒ. ij. Carui ʒ. j. Prunorum Damascen. numero x. Passul. par. x. coquantur: & in tñ. j. ʒ. infunde puluerum Galangæ, Zingiberis ana ʒ. j. Cinamomi ʒ. ij. postea colentur: addendo Mellis optimi vel Sacchari q. s. vel ex supradictis syrups, donec dulcescat.

Vel vinum paretur, cum amara adduntur vt centaureum; quod hic valde vtile: R. fol. Euphrasie, Veronicæ, Centaurij: omnium sic. feminum Fœniculi an. ʒ. ʒ. Carui ʒ. ij. Nucis mosch. ʒ. j. conquassentur: Pro mensura vna Vini albi: ad vsum.

Cathartica postea exhibenda phlegmogoga, sed visui appropriata: vt quæ senam & fumariam recipiunt. Atque ex compositis quæ succum fœniculi admittunt.

Cuiusmodi sunt pilul. Lucis maiores & minores, quod oculis lucem adferant, sic appellatæ: Arabicæ item & Sine quibus dictæ: Et ex electuarijs Indum maius & minus: Nos sequentibus vti possumus.

Pilulis primum, si modo ad deglutendum non sit ineptus, quas media nocte assumere debet: R. pilul. Sine quibus ʒ. ʒ. Lucis mai. Arabicarum, pul. Hieræ colocynth. ana ʒ. ʒ. cum aqua Euphrasie, vel succo Fœnic. fiant pilul.

Vel bolus hunc capiat: R. elect. Indi, Hieræ Hermetis ana ʒ. ij. ʒ. cum Saccharo: fiat bolus.

Vel decoctum: R. Fumariæ, Euphrasie ana m. j. Senæ ʒ. ʒ. femin. Fœniculi ʒ. ʒ. Carui ʒ. ʒ. fiat decoctio in Aqua & Vino, & Melle (loco hydromel. vel oxymell.) infunde Agari, Turbithana ʒ. j. Zingib. ʒ. j. Salis gemmæ ʒ. ʒ. fiat expressio: dissolue syr. de Fumaria compos. ʒ. j. fiat potio.

Vel possumus sumere de sequentibus compositionibus, dosim vnam, & loco horum exhibere. Nam cum per vices in hisce morbis diuturnis, phlegmagogis, & visui interim appropriatis purgantibus, semel in septimana vel mense vti oporteat repetitis denuo nonnunquam præparantibus, sequentes formæ ad hunc vsum parari possunt.

Pilularum forma, quæ, ingrata etiam, quæ hic necessaria sunt, commodius deglutire possunt, aptior & vsitator ferè cæteris esse solet, parando massam ad vsum: Cuius ʒ. ij. ad ʒ. j. exhibitionis quantitas erit: R. Aloës ʒ. ij. Turbith. Agari, Rhabarb. Senæ ana ʒ. j. Myrrhæ, Masticis an. ʒ. ʒ. Tartari, Salis gemmæ ana ʒ. ʒ. Zingib. ʒ. j. sem. Fœniculi, Rutæ ana ʒ. j. Castorij gr. vj. cum succo Fœniculi & Rutæ: fiat massa: quod si addas Hieræ colocynth. & Scammon. parum, validius operabuntur.

Vel ex vsitatis sic parabis: R. pilul. Sine quibus, Aurearum ana ʒ. j. Lucis mai. Arabicarum an. ʒ. ʒ. puluis Hieræ colocynth. ʒ. j. olei Fœniculi gutt. ij. succi Fœniculi quantum sufficit: fiat massa.

Si malit electuario vti, tale fiet: De quo à ʒ. iij. ad ʒ. ʒ. sumat pro vna vice, per se, vel dissoluendo cum aqua Euphrasie & Fœni-

culi: R̄. electuar. Indi mai. Diaphæn. ana ʒ.ß. Hieræ Hermetis ʒ.v. femin. Fœniculi ʒ.j. Cinamom. Gariophyll. ana ʒ.ß. cum syrupo de Stœchade: fiat electuarium.

Sipulvere magis delectetur, sequentis terra pars cum Iulepo, ex syrupo de Stœchade, & aqua Euphrasie facto exhibeatur: R̄. Turbith ʒ.ij. Senæ ʒ.ß. Tartari ʒ.ij. Zingib. ʒ.ß. feminis Fœniculi ʒ.j. Scammoneæ ʒ.j. Sacchari ʒ.j. misce: fiat pulvis.

Syrupus vsualis id præstabit, sequenti modo paratus Equo primò decoctum paratum, tribus continuis diebus exhiberi poterit: & postea ex iisdem, duplo omnibus auctis, syrupus decoqui: conseruandus ad vsum: R̄. radic. Fœniculi ʒ.j. Ireos ʒ.ß. Acori ʒ.ß. Cyperi, Enulæ ana ʒ.ij. Liquiritiæ ʒ.vj. herb. Fœniculi, Verbenæ, Euphrasie, Betonicæ, Fumariæ ana M.j. Thymi, Hyssopi ana M.j.ß. florum Stœchad. Anthos, Borræg. ana P.j. femin. Fœnic. ʒ.ij. Carui, Anisi, Seseleos, Sileris mont. Rutæ ana ʒ.j. Passul. par. x. Senæ ʒ.ij. Polypodij, Carthami an. ʒ.j.ß. Agaric. troch. ʒ.ß. Turbith ʒ.ij. (addere potes tantundem Rhabarbari in ditioribus) Zingiber. ʒ.j. Cinamomi ʒ.ij. fiat decoctio: adde Sacchari ʒ.ij. Pro tribus dosibus: vel duplatis omnibus, vti dictum, in formam syrapi redigatur.

Vinum purgans magis aliquibus placet, & efficacius est, cum sola maceratione, vel leui saltem ebullitione fiat: & hoc modo amara administrata, non adeò ingrata sint. Quod eadem ratione, vt syrupus, tribus continuis diebus propinari poterit, & postea pulvere in tres portiones diuiso, vnoque semper pro vna exhibitione infuso in vino, per vices sic citra corruptionem exhiberi.

Qui pulvis ad macerationem talis fieri poterit: R̄. Absynthij ʒ.ij. Centaurij ʒ.j. Euphrasie, Verbenæ, Rutæ ana ʒ.ij. feminum Fœniculi ʒ.ij. Rutæ ʒ.j. Senæ ʒ.j. Turbith ʒ.ij. Agarici ʒ.ß. cort. Helleb. nigri ʒ.j. Tartari ʒ.ij. Zingib. ʒ.j. fiat pulvis: Pro vino.

Per os & nares, tanquam viam pituitæ expurgandæ destinatam, eam à cerebro, postquam corpus purgatum fuerit, deriuare oportet: quæ expurgatio eò conuenientior erit, quod statim ab ipsa sede affecta, ad quam via hæc rectè pertingit, cerebri excrementa,

illic collecta, expurgat. Fitq; hoc caput purgijs, seu apophlegmatismis dictis, in forma erihini, masticatorij, aut gargarismatis: manè dum ieiuni sunt, vsurpatis. E quibus sequentia hic vsurpari poterunt.

Errhina quæ naribus attrahitur, sic fiet: R̄. succorum Anagallidis flor. purpureo, rad. Betæ vel Mercurialis, Maioranæ, ana ʒ.j. Fœniculi, Rutæ an. ʒ.j. Vini albi ʒ.ß. misce: si succus Cyclaminis haberi posset, & adderetur, efficacius esset: vti & Fella: sed si in fauces attractione perueniant, nimio amarore eas offendunt.

Inunctionarium, ad profunditatem vsq; illarum, eas illiniendo, cum non libenter errhinis vtuntur, conueniet, ex succis enarratis fortioribus, imprimis Cyclaminis.

Vel hoc linimento: R̄. succorum Sampsuci, Cyclaminis, radic. Betæ vel Mercurialis ana ʒ.ij. Elaterij gr. vj. olei Irini ʒ.ij. Mellis & Terebint. parum: vt fiat instar nutriti.

Masticatoriū sequens masticet: frequenter expuendo: R̄. rad. Pyrethri, feminis Staphisagriæ añ. ʒ.j. Cubeb. Piperis, sem. Fœnic. añ. ʒ.ß. Maioranæ ʒ.j. Mastice ʒ.ij. excipiantur pulpa Passul. addendo si nō hæreant parum Cera: ad formandos pastillos.

Gargarismus talis conueniet: Quo os coluat, & fauces gargarizet: R̄. radic. Pyrethri, reos, Angelicæ vel Imperatoriæ an. ʒ.ß. herb. Maioranæ, Saluiæ, Hyssopi, Rutæ, Euphrasie ana M.j. flor. Lauandulæ, Anthos ana P.j. femin. Fœniculi, Rutæ ana ʒ.ij. Nucis mosch. ʒ.ij. decoquantur in Vino & Aqua, addendo Mellis q. s. fiat gargarismus.

Per sanguinis detractionem, vena secta, pituitam à capite exturbare, non possumus, nisi in cerebro pituitosus sit, sicque eum educendo, excrementis hisce pituitosis gignendis, materiam aliquomodo hac ratione subtrahamus. Quod tamen non nisi in plethoricis, & quibus consuetum hoc fuit, sanguisq; impurius esse apparet, nisi alius affectus comes, vt dolor capitis, id suadeat, faciendum.

Sed & quæ per scarificationes fit, sanguinis in partem aliam reuulsio, nō alia ratione proderit. Nisi quatenus adhibita per cucurbitulas attractione, serosi humores simul quoque euacuantur: vti mox explicabitur.

Capiti



Capiti remedia, vt humores hi excrementi, qui coniuncta morbi vel antecedēs causa existunt, alterentur, discutiantur atq; euocentur, & pars ipsa simul roboretur, applicantur. Idq; varijs modis.

Lotiones capitis aliquando factæ sic conueniunt: quæ valde appropriatæ humorem absumunt: R. rad. Ireos, Lauri vel Cyperi ana 3.j. fol. Sampsuci, Rutæ, Saluæ, Fœniculi sum. & Rosmarini, Verbenæ, Chelidoniæ, Euphrasæ, Betonicæ, Iuæ ana M.j. flor. Chamomil. Lauandulæ, Stœchados ana P.j. baccharum Lauri, Iuniperi ana P.j. seminis Fœnic. 3.ß. Rutæ 3.j. Senæ 3.j. Agar. 3.iiij. fiat decoctio in Lixiuio, facto ex cineribus iuniperi, rosarum, lauri, addendo Vini albi quartam partem: Pro lixiuio.

Idem sed succesiue præstat pileolus, notu præsertim gustatus: sequentibus factus: qui & iucundū odorem spirat: R. rad. Ireos, Angelicæ ana 3.ij. Acori veri, Cyperi ana 3.j. fol. Maioranæ, Rosmarini, flor. Rosar. Lauandulæ ana 3.ß. Nucis mosch. Garyophyl. ana 3.j. semin. Coriandri præpar. 3.j.ß. Nigellæ 3.ß. fiat puluis: Pro cucuphæ. Qui si pilis quoque inspergatur interdum, potentius operabitur.

Suffitus idem efficiunt: quorum vis caput subit, & melius siccatur: quibus conclauia potius & cucuphæ suffumigari, quàm nares conuenit, nam vertiginem sic mouerent, visuique nocerent.

Quæ varijs modis parantur: atq; ex granis Iuniperi parata, visioni quoq; appropriata sunt. Galbanum olfactum Dioscor. vertiginosorum accessione tollere scribit.

Communione quadâ cum capite, pedum lotiones interdum factæ, plurimum ab eo excrementa diuertunt, caputq; roborant. Quæ ex iisdem, quibus caput ablui debere diximus, vel alijs quoq; lixiuijs, calidis, odoratis, prius incoctis, parari possunt.

Validius serofos humores, & excrementa cerebri euocant, Vescicatoria & Cauteria: capitis elatiori sedi, vel post aures, aut in ceruice applicata.

Punctura in ceruicis cute facta, & chorda quâ Setonem vocant, transmissa, idē præstat.

Sed & scarificationem in occipitio, adhi-

bitis cucurbitulis factam, visum nervi optici causa amissum, aliquando subito, hærente adhuc cucurbitula, restitutum fuisse Holl. scribit.

Exhibita in vertigine, & visus imbecillitate, à pituita genitis, vtriusq; eadem competunt: quæ appropriata capiti & oculis esse debent, illaq; calefacere & roborare, prouentumq; pituitæ, cōcoctionem primam & tertiam iuvando, impedire. Atque vapores imprimis, qui caput grauando, paroxysmum prohibent, visioniq; nocent, reprimere, eosq; vti & status discutere. Quæ varijs formis & modis vsurpantur.

In pane quædam exhibita profunt. Vt si semina Carui, Fœniculi, & Macis dum subigitur illi permisceantur. Vel si Zingiber, Gariophyli, contusa, affusa Aqua vitæ, ea ratione illi addatur: quod Paracelsus valde probabat.

Sed & reliqui cibi hisce condiri possunt. Vel puluis pro cibo talis parari: R. semin. Anisi, Fœniculi ana 3.ij. Carui, Maceris ana 3.j. Cinamom. 3.iiij. Sacchari 3.ij. fiat puluis: Oryzæ alijsve edulij inspergendus.

Sal tale parari poterit: Quod cum cibis vsurpatur, vel cū ouo forbili: R. Salis 3.j. Nucis mosch. Maceris, sem. Carui, fol. Euphrasæ, Maioranæ ana 3.ß. misce.

Pulueres alij efficacissimi, varijs modis sic fiunt: Manè exhibendi, per se vel cum Aqua aliqua singulari, vt Euphrasæ cum Vino permixta (cū aquæ solæ exhibitæ ventriculo non aded sint gratæ aut accommodæ) quorum hic singularis sæpe feliciter vsurpatus fuit; qui R. Maceris 3.ij. Cinamom. 3.j. fol. Euphrasæ 3.j. Sacch. ad pondus omnium: Dentur 3.ij.

Alter si vertigo epilepsia minetur, perutilis: R. cinerū Hirund. Cranij hominis an. 3.ij. Viperarū 3.ß. sem. Fœnic. 3.ij. Carui 3.j. Pæoniæ, Maceris ana 3.ß. Cubebarum 3.j. fol. Euphrasæ, Maioranæ ana 3.ij. Sacchari ros. tab. ad pondus omnium: fiat puluis.

Ex enarratis, tabulæ parari possunt. Vti & ex speciebus vsualibus: præsertim Diatrion pipereon, Diacimino, Dianiso, Aromat. ros. Diagalangæ, Ros. nouellæ, Diambrae, Diamosci: additis temperationibus, Dyarrhodon, Triafantali, Cordialiū, & de Gemmis.

Post pastum vsurpantur pulueres, ad vapores præsertim arcendos, & concoctionem bonam instituendam; hoc modo: R. semin. Saccharo semicoopertorū sequentium, Coriandri 3.j. Anisi 3.β. Fœnic. 3.ij. Carui, Cubebar. condit. quoq; ana 3.j. fol. Euphrasie, Maioranæ, Rosarum rub. ana 3.j.β. Cinamom. 3.ij. Maceris 3.β. spec. Diacyton. cum speciebus 3.j. Sacchari ad pondus omnium: fiat puluis: capiat cochleare vnum.

Aliqui Senæ 3.ij. pulueribus post pastum addunt, & sic validius vapores reprimi existimant.

Alij ex rhabbaro sequenti modo, ad potentius adhuc vapores reprimendos sic parant: R. Rhabbari 3.ij. Schoenanthi, Origani ana 3.j. Sacchari ros. tab. 3.ij. cum syrupo de Mentha: fiat mixtura: capiat cochl.j. hora antepandium.

Masticis gr.ij. vel iij. si cubitum iturus deglutiat, plurimum vapores retunduntur.

Confectiones saccharatæ siccæ, simili modo post cibum assumuntur, ex seminibus Coriandri, Fœniculi, Anisi, Carui, Cimini, & Cubebis, saccharo obductis, cort. Citri alijsq; paratæ.

Sed & nudum semen Fœniculi, vel Carui, vel grana Iuniperi, manè deuorata, in vertigine & visus imbecillitate, profunt: præsertim si postea anhelitum manibus ori admotis ita excipiant, vt inde ad oculos quoq; sursum ascendat.

Electuaria manè assumenda vsualia probantur, Theriaca, Mithridatū, Asyncritum, si antiquissima sint: item Tryphera Sabor regis, & electuarium Regum, Holl. per se, vel cum alijs permixta & assumpta.

Ex reliquis asseruatis conseruis, conditis, hic conuenientibus, tale parare possumus: R. conseruarum Saluiæ, Anthos, Maioranæ, Stœchados, Lauandulæ, Beronicæ, florū Gariophyllorum hortensium, Chamæpitheos añ. 3.β. Rosarum, Borræg. Diacori añ. 3.j. condit. Myrob. embl. num. j. corr. Citri 3.j. fol. Euphrasie, Origani añ. 3.j. semin. Fœniculi 3.j.β. cum syrupo conseruat. Zingib. fiat electuarium: capiat manè instar castaneæ.

Vel sequens confectio de nouo efficacissima sic parabitur: R. rad. Pæoniæ, Visci querc.

ana 3.j. fol. Euphr. 3.ij. Maioranæ, Anthos ana 3.ij. Origani 3.j. semin. Fœniculi 3.ij. Anisi, Carui ana 3.j. Cimini, Sileris mont. Ocimi, Pæoniæ ana 3.β. Cubebar. Maceris, Gariophyll. Cinamom. ana 3.β. Coralli 3.ij. Margarit. 3.β. Craniij hominis 3.j. Eboris 3.β. fiat puluis: excipiat Melle anthesisato, vel cum succo Rutæ cocto: Sumat manè instar nucis moschiatæ.

Aquæ stillatitiæ cōmendantur, quæ per se, vel post alia sumi possunt: vt aqua Cinamomi interdum sumpta.

Possent & talis parari: R. Verbenæ, Euphrasie, Rutæ, Maioranæ, Chamæpith. ana 3.β. sem. Fœniculi 3.ij. Cinam. 3.β. macerentur in Vino maluatico: destillétur: Sumat aliquando cochl.j. cui Saccharum addi potest, vt magis grata sit. Reliquas in frigidis capitis morbis inuenies.

Salia, Essentias, & Olea, enarratorū, Chymici magnificiunt.

Viuenti rationem quod attinet, sic illa ad vitæ conseruationem necessaria, instituenda erit, ne causa affectuum horum, per hanc augeatur, sed potius minuatur, ipsaq; symptomata mitigentur. Quod temperantia & mediocritate in omnibus fiet. De quibus & iam, vti & de amuletis, in priori vertiginis causæ curatione diximus, quæ & visui conuenient. Eius remedia cetera, in oxydorcicis mox explicandis, describemus.

Nervus retiformis per consensum affectus, spirituum, quibus redundare debet causa factus: Si hoc ob. spiritus influxum prohibitum, cerebri illique connati nerui optici occasione fiat, quid prædicendum & agendum, in illorum affectibus, iam est explicatum.

Quod si pressio oculi refugientibus spiritibus, & aliquandiu subsistētibus, cæcitas fiat, mox sponte illa, remanentibus rursus spiritibus, nisi lesio aliqua in signis facta sit, cessat.

Siverò illi, ob renebrarū diuturnitatem, in neruo sopiti, luce tandem oblata, ea frui aliquandiu non possint, & cæci vel amblyopi sint: tunc luce sensim, non nimium splendida ab initio, mox maiorem splendorem offerendo, vt paulatim sic eam ferre assuefcant, spiritus rursus excitadi atq; in actum deduc-

Visus de  
fectus  
nerui re-  
tiformis  
in oculo  
per con-  
sensum  
affectu  
causa  
curatio.

de lucendi sunt, donec ad integram rursum videndi consuetudinem perueniant.

Contrarium autem faciendum in illis, quibus ob splendorem nimium visus caligat, vt citius & rectius eius usum recipiant: nempe iis tenebras sensum offerendo; primum in vmbra, mox locum obscuriorem, tandem in ipsas tenebras aliquandiu illos collocando.

Quæ in vtrisque & lucis & tenebrarum sensum redûcta consuetudo, nisi iuuet, de perseverante cæcitate vel visus hebetudine periculum est: quam & prædicere, non neglectis interim oxydorcicis remediis, oportet.

Quod si verò per consensum nervus retiformis, quia luce externa destituitur, afficiatur, eaque ob tenebras aëri indultas defuerit, mox solis vel ignis splendore (præter quæ nihil hæcenus compertum est, quid illud sufficienter possit efficere) rursum illuminatione facta, lux redit, oculusque iterum videt.

Si verò lux illi, humorum, vel membranarum oculi impedimento, subducatur, cura in illorum vitijs declarabitur.

*Cæcitas a defectu humorum oculi, curatio.*  
Defectus humorum oculi, si cæcitatem causet: Omnibus humoribus per vulnus aut vlcus simul prolapsis, nihil hîc præter vulneris & vlcus curationem, quæ in oculorum doloribus explicabuntur, tentandû, malumq; incurabile prædicendum.

Quod & si aqueus solummodo effusus sit, cum reparari nequeat, faciendum & dicendum. Nisi fortè si angusta punctura in oculo, siue casu aut studio, suffusionis tollendæ causa facta, humor aqueus (quod tamen vix fit, si acus tenuis sit, placideq; extrahatur) profluuium minetur: tunc oclusis palpebris, oculoq; presso postea, astringentibusque superimpositis, & adhibita fasciâ (sicuti mox in suffusione pungendâ declarabimus) effluxum humoris, donec foramen rursum coalescat, reprimimus.

Effusa verò ex vulnere humoris aquei portione duntaxat aliqua, vel ea per morbos aut ætatem absumpta, ita vt visioni obfit: si exigua sit, nec dum aliud accedat in oculo vitium, in iuuenibus quibus humor il-

le reparari ex oculi nutrimento potest, adhuc bene sperandum, naturæq; illud committendum. In alijs verò nihil boni est iudicandum.

Situs naturalis oculi structuræ peruersio, si visioni officiat: totusq; oculus ita contortus sit, vt pupilla non in medio anterioris oculi sede promineat, sed in alterutro latere occultetur; sicuti aliquando ex vulnere factum diximus, vt ad interiora nasi detrusa, non nisi per eundem prospicere poterit. Vel alias ab ortu oculo inuerso, palpebris adeò obrecta sit, vt visio impediatur; vitia hæc emendari nullo modo possunt. Sicuti nec illa, si à prima natiuitate pupilla non omnino occultata, sed tamen ad latus nimium, oculo veluti conuulso, vel alioquin illic producto, inclinans, strabismo occasionem, vt dictum, præbeat. Quæ & cum visioni nihil aut parum obsint, negliguntur.

Quod si verò crystallinus humor aliquo pacto inflexus, aut ad circumferentiam eius à centro aliquousq; protractus, visionis imbecillitatem aut hallucinationem pariat, vel vna quoq; ex strabismi causis existat. Tunc si hoc à causa violenta aliqua subito factum sit, nisi mox spontè situm naturalem repetat, arte illud efficere impossibile est: eoque minus, si ab ortu vitium hoc contractum sit.

Quod si verò idem humor crystallinus, alioquin rectè positus, nisi quod ab anteriore sede, quam occupare naturaliter debebat, nonnihil regressus, exactè mediam seu posteriorem magis oculi regionem possidens, visionem illam, in qua res paulò distantiores, minus rectè vident, eamque ob causam, res propius vel omnino oculis adhibere coguntur inducat: cum hoc ab ortu plerumq; accidat, humoremq; in naturalem statum reducere nequeamus, visionem hæc immutare, impossibile est. Nisi ea ætatis decursu, ob diuturnam illam toto vitæ curriculum capitis ad anteriora inclinationem, crystallino humore antrorsum semper nitente, sensimq; eò deducto, mutetur. Sicuti sæpe & in alijs, & me ipso expertus sum, senescentibus visionem hanc mutari, ita vt res distantiores tunc melius, quàm dum iuniores essent, cernere queant. Dein & hoc ac-

*Visionis impedimentorum quorundam et strabismi, ob pupillæ situm contortum strabismo.*

*Visionis noxarum aliquarum, et strabismi ab humoris crystallini inflexione vel commotione ad latera, curatio. Visionis illarum, quæ res non nisi admodum propinquas vel quæ res distantes melius quàm propinquas vident, ob crystallini humoris, antrorsum retrorsumve deductionem, curatio.*

cedit in vitij huius ( si modo vitium est, cum quod in distantioribus rebus cognoscendis visioni decedit, illud propinquis rectius cernendis accedat ) emendatione, commodi: quod cum necessitas requirit, res procul dissiras cognoscendi, perspicillo lucidissimo ex crystallino vitro crassiore parato, quod res minores quam sunt oculo repræsentat, adhibito, interioris perspicilli, crystallini nimirum, hunc defectum, quod nimis neruo retiformi propinquus sit, corrigere, & in visione illud quod cupimus, consequi queamus. Quod tamen perspicillum, non vnus semper generis requiritur, sed prout crystallinus humor plus minusve retrocesserit, oculo magis minusve propinquum adhiberi, & vel crassius multo vel minus esse debet. Vti videmus illis qui Myopes sunt, alijs alia, non tamen admodum differentia conuenire. Sicuti hoc experientia potius, quale perspicillum eligi debeat, illud ad oculum probando, quam vt describendo explicari possit, nisi illi qui hæc faciunt, hoc sciant, nobis demonstrat.

Verum vt hæc ab ortu nata visio immutari minimè, sed alio instrumento adhibito saltem corrigi potest; ita & ætatis decursu visionis illud grauius impedimentum, quo res propinquas rectè videre nequeunt, sed melius si ab oculo procul remotæ sint, quod à crystallino humore nimium antrosum delato euenire diximus, non alia ratione quoque, quam perspicillo vitreo tenuiore, res maiores quam sunt, oculo repræsentante, emendari potest. Quod &, vt res minores videre, tractare, legereq; possint, continuo opus habentes, perpetuo illud secum ferunt: margineq; inclusa bina vitra, sic formantur, vt nasi dorso tale instrumentum affixum, eo, maximo Dei beneficio, ad res rectè cernendas, vti possint.

*Nyctalopia ab obscurioris re crystallino humore profecta, cui ratio.*  
Solidior aut obscurior crystallinus humor factus, si visus imbecillitatem eam, in qua tenebris parum ingruentibus, obscure aut nil vident, aut aliquando penitus illo indurato excæcantur, inducat: nec remedijs neq; perspicillis, cum claritatem illi adferre nequeant, corrigi potest.

*Nyctalopia.* Paruum nimis & angustum vueæ fora-

men, pupilla dictū, si nyctalopes faciat; Aut nimis amplum, si vt visus splendor nimio facile obfuscetur, & obscuriore loco rectius, videat, efficiat: quia hoc originale quoque est, nec medicamentis, nec perspicillis cum causa in membrana, non humore sit, emendari potest. Nisi quatenus illis, quorum visioni splendor obest, si lux nimia, oculis ex pane habitaculis, aut flammæ splendor, opposito obstaculo vitreo, noctu dum legunt, vel aliud intentè intuentur, ne visionem molestant, cauetur.

Licet hæc & alia iam dicta, in oculo minimè apparentia vitia, plerique (veram causam illorum ignorantes, & ad spirituum crassitiam & defluxiones omnia referentes) curare tentent, temereq; quæstus causa se id facturos, polliceantur; frustra purgantibus alijsque ægros excruciantes, & oxydorcica adhibentes. Quibus tamen, si ea quæ minimè nocere possunt, sed citra molestiam vsurpari, in omnem euentum experiri lubeat, vti licet. Cuiusmodi in remedijs multa inuenies, quæ tum in visus imbecillitate, cum nyctalopia, tum vespertina acie, & myopia, eadem ferè proponuntur. Quorum exempla hæc pauca nostra subijcimus.

Purgantia si aliquando, vel quia corpus alioquin euacuatione opus habet, vel ratione ventriculi, à quo vapores delati, visui quoque incommodant: vel alias ob causas potius, quam ratione morbi in oculo, qui per se purgantia minimè requirit, exhibere necesse sit; sunt pro ratione cacochymiae in corpore redundantis.

Præcipue tamen ea eligenda, quæ ex purgantibus, oculis appropriata sunt. Vti sena, quam tota proprietate visum reficere assumptam admotamque, superius diximus. Item fumaria, quæ visum clarificare scribitur.

E quibus talem compositionem parare possumus: additis alijs quoq; visui appropriatis: R. fol. Senæ ʒ. j. Fumariæ siccae ʒ. ʒ. Epithymi ʒ. j. Euphrasie, Chamædros ana ʒ. j. ʒ. semin. Fœniculi ʒ. ij. Sileris mont. ʒ. j. florum Anthos, Stœchados ana ʒ. j. ʒ. fiat decoctio in Sero caprino: infunde Rhabar-

*oxydorcica adhibentes. Quibus tamen, si ea quæ minimè nocere possunt, sed citra molestiam vsurpari, in omnem euentum experiri lubeat, vti licet. Cuiusmodi in remedijs multa inuenies, quæ tum in visus imbecillitate, cum nyctalopia, tum vespertina acie, & myopia, eadem ferè proponuntur. Quorum exempla hæc pauca nostra subijcimus.*  
*oxydorcica adhibentes. Quibus tamen, si ea quæ minimè nocere possunt, sed citra molestiam vsurpari, in omnem euentum experiri lubeat, vti licet. Cuiusmodi in remedijs multa inuenies, quæ tum in visus imbecillitate, cum nyctalopia, tum vespertina acie, & myopia, eadem ferè proponuntur. Quorum exempla hæc pauca nostra subijcimus.*  
*oxydorcica adhibentes. Quibus tamen, si ea quæ minimè nocere possunt, sed citra molestiam vsurpari, in omnem euentum experiri lubeat, vti licet. Cuiusmodi in remedijs multa inuenies, quæ tum in visus imbecillitate, cum nyctalopia, tum vespertina acie, & myopia, eadem ferè proponuntur. Quorum exempla hæc pauca nostra subijcimus.*



bari 3. ij. Cinamom. 3. j. Spicæ, Piperis longiana 3. β. vel in pituitosis, Agarici, Turbithana 3. j. β. Zingib. 3. β. Salis ammon. 3. β. fiat expressio, adde syrupi de Fumaria. & Rosar. fol. ana 3. j. β. fiat potio: Pro duabus vicibus.

Iuniores dilutum solum Senæ & Fumariæ recentis, cum semine Fœniculi in Sero caprino, bibant per aliquot dies.

Fortioribus etiam compositionibus vtuntur: ijsque phlegmagogis ferè, quia omnes illos affectus putarunt à defluxione pituitæ proficisci. Quæ si alioquin in capite redundet, & neruoso generi simul incommodet, vsurpari possunt: sicuti in visus imbecillitate & vertigine à pituita cerebri, superius diximus.

Eligen læ pilulæ Lucis, Arabicæ, El. indum, aliæq; visui præsertim accommodata.

Ex assumptis, quæ visioni appropriata sunt, & caput & ventriculum iuuant, sic formæ fieri possunt.

Quibus si inter alimenta vti velimus, cōdiantur cibi frequenter sequentibus pulueribus & salibus.

Puluis aromaticus vtilis, quo cibi, loco aliorum aromatum condiuntur; visui accommodatus: R. Cinamom. 3. iij. Gariophyllorum 3. j. Nucis mosch. vel Maceris 3. β. Piperis longi & nigri, Zingib. ana 3. j. misce.

Sal oxydorcicum dictum, quo cibi, loco salis, saliantur, sic interdum mensæ adhiberi potest: R. seminum Carui, Fœnicul ana 3. j. fol. Euphrasiæ, Maioranæ ana 3. β. Piperis longi & nigri ana 3. j. Salis 3. j. β. misce.

Nec Raphanus aut Sinapi adeo inter belaria meruenda sunt, cum visionem, vti in remedijs ostensum fuit, proprietate iuuent, eoque nomine assumptâ conferant potius quam noceant.

Raparum coctarum præsertim cum sem. Carui, vti nostri parare solent, vsus, cum sint appropriatæ, valde conueniet.

Vinum Euphrasiatum mirè ab omnibus commendatur. Quod vel simplex sit, folia illius arida in vino vel musto dum effervesceat, infundendo. Vel vt efficacius sit & gratius, Absynthium & radic. Fœniculi permiscendo: cum nostri vino absynthite potius

delectentur, & absynthium inter oxydortica referat Dioscor.

Aquæ stillatitiæ, interdum fumendæ quæ ad eâ rem vtilis, sic parari possunt: R. aquarum flor. Rosmarini, herbæ Fœniculi, Euphrasiæ ana 3. ij. aquæ Cinamom. 3. β. Aquavitæ 3. ij. Sacchari si voles, ros. tab. quantum placet, misce: capiat ab 3. β. ad 3. j.

Aquæ magis compositæ: R. rad. Raphani rec. 3. j. β. Fœniculi 3. j. Chelidonij, Gariophyllatæ ana 3. β. herb. Euphrasiæ, Verbenæ, Rutæ, Chelidoniæ, Chamædreos, Fœniculi ana 3. iij. Thymi, Saluiæ, Maioranæ, Satureiæ ana 3. ij. florum Anthos 3. ij. Stœchados, Hyperici ana 3. j. seminum Fœniculi 3. iij. Sileris mont. 3. ij. Carui 3. ij. Hepatis capræ incisi cum sanie & felle adhuc adhærente lb. β. Cinamom. 3. β. Gariophyllorum 3. ij. Nucis mosch. 3. ij. Piperis longi 3. j. conquassentur conquassanda, & irrorentur Vino albo: destillentur. Capiat portionem, per se, vel dilutam alia aqua, si nimis accendat.

Pulueres qui manè per se, vel cum crusta panis intincta in Vino sumuntur, vel etiam in introitu lecti, sic fiunt: R. fol. Euphrasiæ 3. ij. Maioranæ 3. j. Rutæ 3. β. flor. Rosm. 3. j. sem. Fœniculi 3. ij. Rapæ 3. j. β. Sileris mont. 3. j. Carui, baccarum Lauri ana 3. β. Cinamom. 3. j. β. Nucis mosch. Gariophyll. ana 3. β. Piperis longi & nigri, Zingib. ana 3. j. Corall. 3. j. cineris cap. Hirundinum vel Serpentum 3. β. Sacchari duplum pondus ad hæc omnia: fiat puluis.

Tabulæ ex hoc puluere fieri possunt. Si illius 3. j. cum 3. j. Sacchari dissoluti in aqua Fœniculi formes: addendo olei Fœniculi guttas aliquot.

Quæ & ex solo oleo Fœnic. cum Saccharo permixto factæ, hic conueniunt.

Electuarium ex eodem puluere fieri poterit, si melle despumato cum vino vel aquis conuenientibus, vel saccharo in formam syrupi cocto, cum aquis iisdem, eadem mensura vel copiosiore, (si quis sic palato gratius expetat) excipias.

Vel hac ratione ex succis, qui efficaciores sunt, quàm plantarum folia, paratum: R. succorum depuratorum, Fœniculi, Euphrasiæ,

fiæ. Verbenæ ana 3. j. β. Maioranæ, Rutæ ana 3. j. Mellis despumati cum vino 3. vj. vel Sacchari tantundem : decoquantur cū succis ad consistentiam : addendo conferu. flor. Rosmar. flor. Euphrasiæ ana 3. β. flor. Saluiæ & Stœchados ana 3. ij. Nucis mosch. condit. num. ij. Cinamom. 3. iij. Gariophyll. Nucis mosch. Maceris ana 3. j. Piperis longi, Cubeb. ana 3. β. seminum Fœnic. 3. j. β. Sileris mont. 3. j. rad. Chelidon. siccæ vel fol. illius 3. j. specierum Diambra, Ros. nouel. an. 3. β. misceantur : fiat electuarium.

Pulueres vel confectiones, post pastum vel cibum sumendæ, præsertim si vapores molesti quoq; sint, probantur; qui R. confectiones Saccharatas, seminum Fœniculi 3. j. Coriandri, Anisi, Carui, seminum Rapi vel Napi saccharo quoq; obduct. ana 3. β. seminis Eruæ 3. ij. misceantur : capit post pastum coh. j.

Vel addatur, radicum Liquiritiæ rasæ 3. β. Galangæ incisæ, corticis Citri tenuissimæ quoq; incisi ana 3. j. Cinamomi 3. j. β. fol. Euphrasiæ 3. j. Ros. rub. Maioranæ ana 3. β. Coralli 3. j. rasuræ Eboris 3. β. spec. Diacyton. sine speciebus 3. j. Sacchari pondus æquale cum illis, quæ non sunt saccharo obducta; fiat confectio sicca.

Oculis admouenda remedia, si non nimis eos afficiunt, illis induntur, si verò potentiora sunt, præsertim quando in omnem euentum, non habita causæ ratione, fiunt, ne nouus aliquis ijs præuocetur affectus, rectius foris palpebris imponuntur : & si eas commaculant, manè aquis Fœniculi & Euphrasiæ rursus abluuntur. Quæ sequenti modo fiunt.

Ex aquis folis hoc modo : R. aquarum Euphrasiæ, Verbenæ, Chelidoni, Fœniculi, Rutæ, inuicem permistarum, vel simul destillatarum, æquas partes. Indat frequenter oculis : vel abluat illos manè hisce aquis; addendo interdum parum aquæ Rosarum.

Aqua mellis si à tunicarum crassitie caligo fiat, plurimum competit:

Vel sic : R. herb. rec. Fœniculi, Rutæ, Euphrasiæ, Verbenæ, Chelidoniæ, Lactuæ syl. ana M. j. florum Rosmar. Saluiæ, Rosarum ana P. j. seminum Fœniculi 3. ij. Sileris môt.

3. j. granorum Iuniperi 3. ij. Gariophyll. Piperis longi ana 3. β. Sarcocollæ nutritæ, Aloës succocitr. ana 3. ij. Camphoræ. Vitreoli albi ana 3. β. Tuthiæ 3. ij. contundantur & aspergantur Vrina pueri, & Vino albo, donec in formam pastæ redigantur, addendo (præsertim in nyctalopis) Hepatis hirci vel capræ incisi, t̄b. β. relicto felle, Fellis gallinarum 3. j. Mellis anthosati 3. j. misceantur : destillantur ad vsum.

Aquæ vel liquores per macerationem longam, sine destillatione fiunt, hoc modo : R. succorum Fœniculi, Rutæ, Verbenæ, Chelidon. Granat. acidorum, Lactuæ syl. ana 3. j. Saniei quæ emanat ex hepate capræ, dum cum felle affatur 3. β. Fellis gallinarum vel perdicis 3. j. Sarcocollæ nutritæ succo fœniculi, Aloës succoc. ana 3. j. Mellis, Sacchari candi ana 3. β. Camphoræ 3. β. Vitrioli albi 3. j. Tuthiæ 3. j. β. Margarit. 3. β. Ducatorum aureorum num. ij. Piperis longi, Gariophyl. Ligni aloës ana 3. j. adde Vrinæ pueri & Vini albi ana 3. iij. in vase vitreo obturato, vel in sole, vel ad fornacem diu macerentur : postea seponantur ad vsum.

Succis ilinimus interdum palpebras: vel illos oculis indimus; hoc modo : R. succorum Fœniculi, Lactuæ syl. Granat. acidorum parum inspissatorum, & postea cum Melle subactorum : addendo interdum parum Fellis piscium vel auium.

Vel hoc, quod in nyctalopia conuenit: R. Saniei quæ emanat ex hepate capræ 3. ij. Sanguinis perdicis 3. j. Mellis parum: misce.

Liquoribus alijs vtitur sequenti modo. Mastice semen Fœniculi & grana Iuniperi, & salua postea oculorum palpebras illinat, & anhelitum oppositis manibus sursum ad oculos deriuat.

Vrina propria, mista cum Aqua Rosar. & Fœniculi, sæpè oculos abluat.

Mixturæ variæ, quæ colliria vocant, sic præparantur : R. Tuthiæ præpar. 3. ij. Antimonij sæpè abluti aqua Fœniculi 3. j. Coralli 3. j. Margarit. 3. β. Cacochymia auri 3. β. Sarcocollæ nutritæ aqua fœnic. 3. j. Myrrhæ, Aloës succocitr. ana 3. β. Pupillarum piscium induratarum coctione 3. j. cap. Hirundin. vstorum 3. β. stercoreis Lacerti 3. j. Salis ammoniaci,

moniaci, Vitreoli albi ana ʒ. j. Camphoræ ʒ. ʒ. Piperis longi ʒ. ʒ. Croci ʒ. ʒ. Sacchari candi ʒ. ij. fiat pulvis vt alchool, excipiat Mucilag. feminis Fœnigræci, facta cum Aqua Ros. fiant trochisci, ad vsũ. Dissoluatur vnus a quis Fœniculi, Rutæ, cum vti volumus, addendo Succos, nonnunquam & Fella.

Inunctio pro palpebris fieri potest hoc modo: R. Axungia serpentinis, quæ colligitur dum coquitur, vel Piscis thymalli, vel vtriusque, succi Chamædreos, Mellis ana æquales partes: pro illinitione. Possent & de trochiscis enarratis portio illi permisceri.

Pulueres qui oculis insperguntur, in maculis oculorum potius quàm hic vsurpantur. Possent tamen ex trochiscis descriptis fieri.

Vel hoc modo: R. fol. Chamædreos, Ephrasia ana ʒ. j. Margarit. Tuthia ana ʒ. ʒ. Auri foliorum numero iij. Sacchari candi ʒ. ʒ. fiat pulvis tenuissimus.

Fouentur nonnunquam oculi, vt oxydrica adhibita melius operentur. Eadem ratione vt in maculis dicitur.

Vel hoc modo: R. seminum Fœnigræci ʒ. ʒ. Fœniculi ʒ. ij. Sileris montani ʒ. j. fol. Ephrasia, Chelidon. ana ʒ. iij. rad. Raphani ʒ. ʒ. Paleæ auenæ ʒ. j. decoquantur in Vino & Aqua: Pro foru in spongia: vel in facculis.

Vapor quoque huius decocti, oculis exceptus oculum præparat. Vel alij quoq; profunt oculis. Vt nidor elixati Iecoris caprini, oculis exceptus in nyctalopia.

Panis hordeaceus cum semine Fœniculi & Carui coctus, & dum calet scissus, exhalatioque oculis excepta.

Intuitus rerum viridium oculos reficit; & politarum, vt speculi splendidi ex chalybe. Quo nomine & gemmarum & auri inspectio, potius quàm applicatio & visionem recreat, & spiritum vitalem roborat.

Amuleta multa prædicant, collo appensa, & in annulis gestata, prodesse, quæ studio omittimus.

Lapidem è felle, naribus inditum Matth. valde probat.

Spodium lentis magnitudine cum oleo

Violarum naribus inditum, nyctalopias cito sanare, scribit Rhazes.

Alba macula, plus minúsve in oculo apparens. Si ex vitrei humoris aut crystallini prolapsu in pupillæ foramen nata, visionem obliteret: quod ex oculi contusione, pupillæ foramine scisso, vel tunicis humores hosce suo loco continentibus, disruptis, accidere interdum solere diximus: vel ex acu in suffusione curada nimis profundè adacta: tunc visionis recuperandæ spe omni adempta, lefioni externæ, si quæ sit, curam tantum accommodabimus.

Si verò hæc circa pupillæ regionem alba macula sese offerens, ex aqueo humore, sensim & longo tempore in mucum, & tandem in pelliculam dictam conuerso, sit Suffusio, hallucinationem visus ab initio, postea verò cum induratur, perfectam cæcitatem adferens: Vel si ex corneæ nimia exiccatione & induratione profecta sit Albugo: aut ex vulnere vel punctura consolidatis, relicta sit Cicatrix: quæ duo postrema prout lata vel angusta sunt, visioni plus minúsve officiunt: tunc quid omnibus tribus prædicendum & agendum sit, quia non admodum inter se differunt, simul explicabimus.

Difficulus autem & suffusio, & albugo, & cicatrix, cum curentur, non est temerè quicquam promittendum. Cum si cicatrix superficialia tantum, corneæ laminulam occupet, in iunioribus saltem, & tamen ægrè tunc quoque extergi, si autem paulò profundior, auferri minimè possit: nisi ea erasa, continuum de nouo soluere, quod refricare vulnus esset, vellemus.

Quod idem de albugine, si altius radices egerit, asserere possumus. Præsertim si cornea omninò indurata in senibus caliginem dictam pepererit: Vel in lucida saltem illius parte, aliqua exiccata, albuginem causet. Quod quàm difficile sit emendare, in lamina alicuius cornu, pestinis vel vnguis, simili modo affecta, quàm vix extergi possit, videre licet. Si tamen portio aliqua nutrimenti crassioris, sub cornea relicta, hoc faciat, cum ea nonnunquam locum mutet, & à pupillæ regione in oculi album feratur, visioni tunc non amplius nocet: quod spontè ple-

Visionis defectus ab obfcuritate corneæ maculis albis, & obstructione mucus, in Caligine, Albugine, Cicatrice, Suffusione inditi, curatio.

tumque potius, quam medicamentorum vfu accidit.

Suffusio pertinax quoque est affectus. Quæ confirmata & indurata cum est, excæcat, nullisque remediis amplius, nisi acu auferri potest; quod tamen cum sit, etiam non in omnibus, sed certis duntaxat suffusionibus, vt mox dicetur, succedit, aut iuuare potest, & sæpius malo cum successu tentatur. Incipiens quæ nubeculas tantum visioni offundit, vix dum, ne cum tēpore augeatur, præcaueri potest.

Nilominus tamen in hisce casibus remedia non sunt negligenda, & in cicatrice, albugine & suffusione, cūratio hac ratione instituenda. Vt nimirum generatim corpus ad curationem meliorem faciendam recte disponamus: & topica oculo applicemus, quæ suffusionem discutiendo absumere queant: quæ & in albugine conuenire possunt. Quæ tamen vt simul ex corneæ lamina extergere valeamus, validioribus detergentibus auferre tentabimus: magisque adhuc, si cicatrix sit, in qua detergentia in suffusione confirmata adhiberi solita, discutientibus permixta vsurpada. Ita vt hæc remedia eadem ferè omnibus competant, sic tamen distributa, vt tenuioribus in suffusione incipiente, crassioribus validioribusque albugine, cicatrice, & confirmata suffusione, vtamur remediis; sicuti externum panniculum adhuc fortiora requirere mox audiemus. Quæ tamen ita temperanda sunt, ne oculus illorum vsu penitus exiccet, aut etiam inflammetur. Hæc omnia, si non inuent, ad sectionem deueniendum.

Vt corpus mundum & purum ab excrementis sit, bona victus ratione & euacuationibus, pro ratione plethoræ vel cacochymię, si quæ adsint, institutis procurabimus: sic enim omnis curatio rectius procedit. Et licet hic plerique Practici, multis euacuationibus corpus mire, in suffusione, præsertim, quam existimarunt aquæ descensum in oculos, & idè catarrhacis nomine appellandam, macerent, tam per aluum, quam per sudores, & per os & nares factis purgationibus: item scarificationibus, cucurbitularum applicationibus & frictionibus; dein & per caute-

ria, setones, factis reuulsionibus & deriuationibus, sicuti hæc in vertigine pituitosa, quomodo fieri debeant, docuimus: Nos tamen, qui causam horum in oculo consistere, & defluxionem aquæ in oculi capacitatem ferri minimè posse, demonstrauimus, hæc sine fructu, nisi quatenus corpus purum, vt diximus, seruare possunt, in corporibus administrari, multoties vidimus & experti sumus. Sufficiat itaque hæc corporis per idoneam diætā & euacuationes decenter præparatio, ex iisdem remediis, quæ in vertigine pituitosa explicata sunt, parata: leuiora fortiorave prout opus est, eligendo, corporisque constitutioni accommodando.

Sed neque oxydorcica remedia, quæ tantopere in hoc casu commendantur, per os assumpta, vel appensa, aut etiam admota, nisi vim illam discutiendi & extergendi maculas habeant, sicuti multa ex illis ea prædita sunt, hic singulare aliquid præstare possunt: cum visio hic non alia ratione, quam quod externa luce & lumine oculus, propter oblatum impedimentum, priuatus sit, labefactetur. Quod si visum acutius remediis emendare vellemus, deberent illa splendorem extrinsecus irruentem, quod certe nemo præstare poterit, oculis adferre: aut velum oculis obductum retrahere.

Topica itaque remedia in hisce casibus conuenientia, hoc ordine, vt leuiora primum, mox fortiora, tandem fortissima, quæ & in panniculo conueniunt, describantur, selectiora proponemus. Quæ vel oculo indantur, si illa ferre possint: Vel palpebris applicantur, vbi & minori impedimento & noxa, noctu præsertim, dum clausas habent, diutius retineant; & licet vis illorum non tam cito, vt cum oculo indantur, se exerat, tamen continuo vsu, quia per tenuem palpebram facillè facultas ipsorum penetrat, tandem sic apposita, operantur, cum quæ oculo imponuntur, cum lachrymis mox iterum effluant, vel oculos irritent, & molestiam aliquam pariant.

Aqua mellis destillata, valde utilis, & conseruata: Quæ oculo instillatur.

Aqua quoque vini seu Vitæ dicta, egre-



giè discutit: *contemperabitur autem cum aqua Mellis, & Fœniculi, æqua cum illa addita portione.*

*Efficacior sic fiet: R. Vrinæ pueri 3. iiii. Vini albi 3. j. Mellis 3. j. Fellis 3. 8. eliciatur aqua.*

*Vel adhuc fortior: R. Vrinæ pueri 3. iiii. succorum Fœniculi, Chelidoniæ ana 3. ij. Vini albi 3. j. Fellis piscium (vt salmonis vel carpionis) vel auium, vel aliorum 3. ij. Mellis 3. ij. Terebinthinæ 3. 8. Sulphuris viui 3. ij. destillentur. Si Vrina antequam huic compositioni addatur, in vase æneo per dies aliquot steterit, vas postea egregiè illa ablundo, erit efficax magis adhuc præparatio: quæ si mordicet, Albumine oui contemperata, & inspissata, palpebris illinatur.*

*Pulvis insufflatur nonnunquam talis: sed subtilissimus vt achool esse debet, ne oculus exasperet: R. Ofsis sepia, de fungosa materia, Pumicis ana 3. j. Pompholygis albæ (quæ fuligo est) 3. 8. Sacchari candi 3. ij. farinæ Fabarum 3. 8. fiat pulvis.*

*Succus è Salicibus exudans, oculo instillatus, valde commendatur.*

*Ex acidis succis, valdè hi conueniunt: R. Omphacii spissi, succi Granator. acidor. inspissati quoque, excipiantur Mucilagine seminis Fœnogr. Applicentur palpebris.*

*Vel sic magis digerens: R. succorū Centaurij min. Fœniculi, Chelidoniæ ana 3. ij. Fellis piscium 3. j. Aloës, Sarcocollæ, Myrrhæ ana 3. 8. Sacchari candi 3. j. Mellis q. s. fiat illinitio.*

*Vel sic egregiè abstergens: R. Stercoris lacerti 3. j. Ofsis sepia, Cornu cerui vsti, Mafacumiæ ana 3. 8. Mellis q. s. fiat illinitio.*

*Vel sine pulueribus, sed valdè efficax: R. succorum Fœniculi, Chelidon. Granatorum acid. ana 3. 8. Cæparum, Raphani ana 3. j. Fellis 3. j. Stercoris lacerti 3. 8. Mellis q. s. misce.*

*Vel fiat illinitio vinctuosa talis: R. Axung. thymalli 3. j. Fellis 3. j. Stercoris lacerti 3. j. gummi Ammon. dissoluti in aqua Vitæ 3. j. Sarcocollæ 3. 8. fiat vinctio.*

*Liquores acres vehementer operantes sic sunt: quos si oculus non ferat, Lacte vel Aquis eousque donec ferre possint, contem-*

*peramus: vel mucilag. seminis Fœnogr. vel Album. oui excepta, palpebris adduntur: R. Antimonij 3. j. Marchasitæ 3. 8. pulueriscentur & infundantur in aqua Rosar. & Fœniculi ana 3. iiii. per philtum sèpè transfundendo: Ad vsum.*

*Ex Vrina sic: R. Vrinam pueri, stet in Vase æneo per dies aliquot, radendo vel fricando sèpè vas: Ad vsum.*

*Vel pannus linteus in scutella vel lamina stannea vel ferrea accenditur, & succus qui scutellæ adhæret, ad vsum sumitur.*

*Ex fortioribus adhuc, sic fit: R. Vitreoli albi 3. j. Æruginis æris gran. vj. puluerisfata misceantur cum Albumine oui vnus: conquaassentur diligenter, & supra papyrum fusa, aquaque per inclinationem collecta subviridis, sumitur ad vsum, & eousque quoad ferre possit, aqua Rosar. vel Lacte contemperatur.*

*Efficacissima illinitio sic fit: R. Vitreoli albi 3. j. Æruginis æris 3. 8. Antimonij 3. 8. Marchasitæ 3. 8. Tuthiæ 3. 8. Stercoris lacerti 3. 8. Ofsis sepia 3. 8. Camphoræ gr. ij. Fellis piscium 3. 8. Mellis 3. ij. Sacchari 3. j. cum mucilag. seminis Fœnogræci: fiat iniectio.*

*Fomentatio oculi, interdum facta ante horum vsum, vt rectius operentur efficit, atque oculum ad ea suscipienda melius disponit: & per se quoque discutit.*

*Quæ simplex talis fieri potest: R. seminū Fœnogr. 3. j. Fœniculi 3. ij. florū Chamomil. Paleæ auenæ ana p. j. rad. Altheæ 3. j. decoquantur in Aqua & Vino: Pro foru.*

*Suffitus ex hoc decocto, si oculis excipiantur, erit loco forus.*

*Inhalare in oculos, post masticationem seminis Fœniculi, idem facit. Et in infantibus, si nutrix illud faciat, illorum suffusiones delet, si Ammoniacum gummi masticient prius; & similia.*

*Inter Amuleta, radix Allij, serpentini appensa, à Chirurgis magni fit.*

*Manuali operatione vel chirurgia, in suffusione, quando in pelliculam aut Telam, vt vocant, concreuit, eam ab ambitu pupillæ, cui accreuit, liberare & secernere, immissa acu per corneam, & hanc sedè vsq; sensim propulsa, extremum est remedium. Quod si suc-*

cedat, & visus adhuc, vt chirurgi loquuntur, sit in oculo, hoc est, propter diurnam illam cæcitatem, quæ tot annis durauit, spiritus visorij, vt superius dictum est, otiosi, non extincti sint, aut nerui optici inertes facti; patefacta hac via, & illius obstaculo oblato, lux oculum rursus subiens, & illuminans, facit vt in eo ipso momento, quo tela detracta est, visum rursus recuperent.

Antequam verò operatio incipiatur, hæc prius consideranda erunt. Primum, vt si vtroque oculo tela obdueto, penitus cæci rediti sint, eo facilius tentetur, cum peius illis euenire, etiam si non succedat operatio non possit, cæcis tuncillis, vti prius erant, manentibus. Quod si verò vnus oculus tantum affectus sit, altero incolumi, cum is ad visionem sufficiat, nec maior vrgeat necessitas, minus temerè negotium aggrediendum.

Dein vt non antequam integrè concreta sit pellicula absolutaque, & vt vocant, matura existat, eam aggrediamur: quod interdum annorum trium, interdum quinque, vel etiam plurium spatio vix perficitur. Et ex colore illius, qui tunc exacte albus, pelliculæ qui cocti albumen ambientis instar, existit, cognoscitur. Licet interdum subcinereum colorem repræsentet: tuncque quia iudicium non nihil fallit, magis nos, quod illius maturitatem attingit, incertos reddit: quæ tamen ex eo quod non mutatur, sed talis diutissime persistit, perfecta iam esse cognoscitur. Et licet plerique non absolutam illius, sed mediocrem concretionem requirant, experientia tamen comperimus, minus peccari faciliusque tractari, vbi perfecte concreuerit. Nam quæ immatura est, cum mollis & mucosa adhuc existat, apici acus non resistit, proin nec integra potest remoueri, sed scissa diuisaque rursus concreuit, spissiorque tunc facta, & callosior, & aqueo humori perfusa, facit, vt tunc non tantum nil videant, sed & omnis spes sanationis, per nouam operationem, cum bis si fiat, frustra ferè fiat, auferatur.

Quod & accidit, si profundè nimis adacta acu, crystallinus humor vel vitreus, illarumve tunicarum lædantur, aut etiam vtea ipsa in ambitu foraminis laceretur: tunc enim

confusis humoribus, cæci remanent, & albedo cum tumore, in nigro oculi apparet.

Proin anceps admodum remedij est genus, in quo faciendo faciliè peccatur, vel si rectè succedat, tamen ob diurnam cæcitatem, vt iam dictum, visio aliquando non redit. Quare nihil temerè, vt faciunt Oculistæ circumforanei, quos pudor, licet promissa non perficiant, nihil mouet, modò spes lucri sit, erit promittendum.

Necessitate tamen vigente, si penitus cæci sint, Dei implorato auxilio, & diligentiam omnem potius, quam salutem promittendo atque adhibendo, sic operatio erit perficienda, sicuti ego toties vidi, & ipse quoque ex parte manum adhibui, cum res alioquin, si industriam spectes & artem, non adeò sit, vt eam faciunt, ardua & perdifficilis.

Sedeat æger in sedili, & ex opposito illius faciei chirurgus, adeò propinque, vt ægrum diductis cruribus cum sella excipiat, illiusque manus vtrinque femoribus suis innitentes, sustineat: caput verò erectum minister à tergo ægri stans, firmum ambabus manibus teneat, & si oculus alter sanus sit, & videat, eum fascia, ne videat, obuoluat.

Quo facto, fricetur primum oculus æger, palpebra ipsa supra oculum tensa, pollice chirurgò eum hinc inde aliquamdiu ducente. Et in oculum apertum, masticato prius semine fœniculi, aliquoties inhalet.

Acus dein sumitur, quam argenteam, splendoris magis quam utilitatis causa esse volunt, eoque magis, si apex ipsius sit deauratus. Quæ longa & manubrio intorto, vt firmitus apprehendi queat, esse debet, versusque apicem acuta & sensim attenuata. Sed & vulgaris acus ferrea, mediocris magnitudinis, manubrio infixæ, vt retineri possit, æquè ad hæc peragenda accommodata est, nec rubigo, vt putant, in breui hac mora est metuenda.

Hæc itaque dextra manu, si sinister oculus, vel sinistra, si dexter oculus affectus sit, apprehensa, manuque iuxta oculi sedem innixa, in latere oculi externo, mediam pupillæ sedem respiciente in albo oculi, nonnihil ab iride distante, in corneam imprimi, &

non violenter, sed sensim eam contorquendo, donec corneam penetret, intrudi debet. Quod sine omni dolore cum fiat, facile etiam perferunt, quietique manent: & quia oculus acui affixus est, ab ea firmus retinetur, & quo minus volutari possit, cauetur.

Intrusa acus mox versus pupillam dirigitur, atque eousque, ut in margine ubi pellicula accreuit, prodiens, pelliculae mediae sedi anteriori praeponatur, propellitur; quod eo commodius fit, cum illic acus per corneam videri, recteque ob id dirigi possit. Eo adacta; retrorsum blandè ut pelliculam ab ambitu vuae foraminis abrumpat, aliquoties, si non prima vice succedat, premitur: & si liberata alicubi erit, acu penitus à foramine, ubi adhuc hæret, separatur, deorsumque à pupillae regione in obscuram oculi infimam sedem deprimitur. Alij verò à superiore illius sede illam primum liberare acu studentes, sensimque deorsum procedendo, ad inferiora hac ratione propellunt. Quae utroque modo rectè sic fieri possunt, & prout pellicula sequitur, aut hoc illòve modo facilius fiunt, institui debent: Imprimis cauendum, ne pertrusa tela in plures partes scindatur, sic enim portiones illius, licet depressae, facile rursus sursum ante pupillam delatæ, illic fluctuando, visionem obfuscarent. Quod & integra pellicula detrusa, si faciat, rursus deprimenda erit, ne si acu extracta id fiat, de novo punctura repetenda sit, quod incommodè, & sine successu ferè perficeretur.

Quibus ritè peractis, si bene successit, pupilla nigra rursus apparet, & statim vident: sin minus, exigua spes erit. Vt ut autem sit, acus, palpebra prius depressa, & oculo clauso, sensim rursus exarahenda, nec dum aquei humoris effluxus, cum forame in crassa hac tunica, mox post acus exemptionem rursus collabatur, metuendus erit.

Oculi dein, quæ inflammationem reprimant, cum panno quadruplicato intincto in albumine oui, cum aqua rosarum prius agitato, aliisque in inflammatione dicendis, applicanda. Ea quæ ter in die, spatio quinq; vel sex dierum semper renouanda erunt, priorque applicatio, quæ si firmiter hæret, prius eodem humore ubi fuerit mollita, detrahen-

da, nouaque apponenda: cui si lac addas, minus adhærebit.

Quo tempore, ne subitanea & multa luce visus nondum assuetus, obruatur, in tenebris moram trahere, & sensim luci assuescere debent. Et ne spiritus, vi ad oculos propellantur, ab omni motu vehementi corporis, ut tussi, sternutatione, clamore, conatuve vehementi in excrementis reddendis, aliisque similibus sibi cauere debent.

Panniculus incipiens impediri nonnunquam potest, ne augeatur: auctus ægrè medicamentis cedit; licet validissimis. Per sectionem, si non corneae connatus sit, amputari potest. Si induratus sit, vnguis instar, nullis praesidiis cedit. In elephantice uti neque morbus ipse, sic nec hæc illius morbi pars, in oculorum membranis residens, tolli potest: aliquando tamen ne omnino excutatur, quod illis inter omnia, quæ alioquin patiuntur, miserrimum est, prohiberi potest.

Causam, quæ est sanguinis affluxus, mox ab initio, ne augeatur malum, Venæ sectione, Scarificatione, Setonibus, Cauteriis, educere, reuellere, deriuare, studebimus: tenui quoque Victus ratione, & Sudoribus multis, Purgationibusque, impuri corpori conuenientibus.

Topica remedia vehementer exiccantia, & nisi hæc iuuent, erodentia tandem esse debent. Eligenda fortissima ex illis, quæ albas maculas extergere diximus, palpebrisque applicari debere iussimus, hic supra ipsum panniculum adhibendo. Et pulueres cum validius siccent, ipso panniculo imponendi. Non neglectis liquidioribus mixturis, quas oculo instillamus. Palpebris interim quædam ut successiue iuuent adhibentes; & fomentationem ad præparandum oculum, interdum etiam, ut illic dictum, applicantes.

Puluere uti possumus supradicto in albis maculis, ab initio; inde ad fortiorem progrediendum, qui tamen adhuc citra morbum exiccet: & sæpè proin repeti debet. Qui sic parabitur: R. Coralli, Tuthiæ ana ʒ. j. Pumicis, testarum Ouorum ana ʒ. ʒ. ossium Dactylorum & Myrobal. ana ʒ. ij. fiat puluis subtilissimus. Si Aceto asperga-

visionis defectus à tunica corneae obducta, in Panniculo & Vagula, curatio.

tur, vel Vrina, & ficcetur, efficacior erit.

Vel sic potentior adhuc: R. pul. Nabatis 3.j. ofsis Sepiæ vsti, Stercoris lacert. ana 3.ß. Hematitidis 3.j. Saccharicandi 3.j. fiat puluis.

Adhuc vehementior: R. Plumbi vsti, Antimon. lap. Calamint. ana 3.j. Tuthiæ, Cerusæ ana 3.j.ß. cineris Equiseti, ofsis Sepiæ vsti ana 3.j. fiat puluis: lauetur aqua Fabrorum astringente, & ficcetur, ad vsum.

Mixturæ sic fiunt: R. Aquam compositionem in maculis albis, cum vrina in æneo vase macerata destillatam, descriptam, & 3.vj. adde pul. Nabatis, Stercoris lacertæ, ofsis Sepiæ ana 3.ß. puluerisati prius, excipe mucilaginem fem. Fœnogr. in prædicta aqua facta: & vttere.

Vel spissior hoc modo: R. succorum Omphacij & Amurcæ, & Granatorum acidorum, exiccator. ana 3.j. adde pulu. ofsis Sepiæ & Stercoris lacertæ ana 3.ß. misce.

Vel sic: R. pulu. Nabatis 3.j. Tuthiæ præpar. Cerusæ ablutæ ana 3.j. ofsis Sepiæ vsti & loti 3.ß. Sarcocollæ, Myrrhæ, Aloës, Licij ana 3.j. Fellis auium vel piscium 3.j. excipiat Mellis & Album. ouis: Pro illinitione.

Ex erodentibus compositionibus conuenit illa quæ in maculis albis ex Vitreolo, Ærugine æris, Antimonio, Marchasita paratur.

Vel collyrium ex calcantho, sed cautè adhibendum, quia omnium est potentissimum, & sic paratur: R. Æris vsti, Calcanthi ana 3.ß. Æruginis æris 3.j. Salis Ammoniacy, Nitri, Arsenici, Sublimati añ. 3.j. fiat puluis subtilissimus, diu multumq; puluerisando: excipiat mucagine gummi Tragach. fiant trochisci: de quibus vnus dissoluatur cum mucagine, & cautè applicetur.

Præcipitati puluerem laudat Rodeletius. Ego cauterio meo vsus sum, quod prima vice vrit, sed mox remittit.

Manualis operatio duobus modis fit, ligatura & sectione.

Si venæ quæ panniculum nutriunt, circa radicem vinciantur, tunc carnis illius prouentum impeditur, vel si iam nata sit, eam marcescere necesse est. Quod fiet curuata acu venæ submissa, filum subducendo & ligando. Hoc si ex serico factum sit, vel ex seta, aut

capillo mulieris, quia tunc vix putrescit, commodius erit.

Si secantur venæ illæ quoque, vt sanguis profluat, sæpeque repetatur, idem efficitur.

Amputatur panniculus hac ratione, sicuti fieri vidi: collocatur æger in sella, & oculus prius præparatur, vt in suffusionis sectione dictum fuit. Dein acus, filum fortè continens, sub panniculo, ita tamen ne corneam lædat, transmittitur, filique sub eo ducti, vtrinque extremitatibus apprehensis, à cornea sursum aliquousq; trahendo eleuatur, & postea ab ea, acuta nouacula vel cultello, sensim & cautè, ne cornea lædatur, secatur. Quo facto, si nigrum oculi clarum apparet, visio reddit: sin minus, aut panniculus corneæ ita cõcreuerit, vt ab ea penitus auferri nequeat, irrita erit operatio.

Sectione facta, dolor eadem ratione, vt in suffusionis sectione dictum fuit, sedabitur. Et ne de nouo rursus generetur, venas adnatæ tunicæ incidendo, si rursus turgeant, & impositis ficcantibus, cauebitur. Sed & ne oculus, palpebræ, si exulcerata fortè esset, conuascatur, frequenter oculum mouendo, impedire oportet.

Humore alieno si corneæ lucida sedes occupetur, ita vt visionis sequatur vel deprauatio, vel obfuscatio: tunc si bilis, quæ in idericis album oculi tingere solet, & quod rarius fit, eousque deferri, flauum rerum omnium aspectum faciat, spõte ea euanescente, hoc vitium cessat: aut abstergente aliqua ablutione, vt in i. c. ero dicitur, aufertur.

Sanguine verò in corneæ diaphanâ partem effuso, si deprauatio visus ea, in qua omnia rubra vel liuida apparent, in hypophagmate dicto, accidat: aut si corneam quoque penetret, & sub ea iuxta pupillæ foramen concreascit: vel in pus conuersus in hypopyo dicto, visum obfuscet: tunc curatio sic erit instituenda.

Si dolor adsit atque inflammatio propter ictum, à quo serè hæc procedunt, metuatur: tunc venæ sectione, & repellentibus dolorumque sedantibus, ab initio mox vtendum erit. Quod & si diu retentus suppuretur, & dum pus generatur, cornea, & per consensum etiam adnata, tunc affecta, dolor suboritur,

Visus obfuscatio, vel deprauatio, à bile sanguinis, vel poisse phagmate, Hypopyo, et ratio.



riatur, metu inflammationis faciendum. Alioquin si nullus adsit dolor, à repellentibus, cum sanguinem magis condensent, abstinendum. Et ad eum sanguinem digerendū & dissoluendum, mox curam adhibere debemus. Quod etiam si in pus conuertatur, nihilominus agendum, si portio illius absumi queat: cum resoluta puris maiori parte, quod reliquum est, à pupillæ foramine subfidens deorsum, visioni tunc non amplius incommodare possit, & tandem vel sponte, vel medicamentorum vsu absumatur.

Discutitur autem hoc modo: sumendus sanguis columbarum, turturum, vel aliarū auium, isque dum adhuc calet, in oculum mittendus. Vel si ad manum pullus columbinus sit, ex ala illius pennam, cuius radix adhuc, quia recenter creuit, tumida, sanguine repleta est, illicque in propria vena veluti intestino continetur, euellenda, atque ex ea sanguis premendus, & in oculum instillandus. Nam quantam vim sanguis in sanguine discutiendo habeat, in hæmorrhagiis per eiusmodi sanguinem sistendis, alibi docuimus.

Possent & validius discutientia, si hisce non cedit, oculo indi. Qualia in suffusione discutienda explicata sunt: ex aquis, succis, lachrymis, fellibusque parata.

Quibus & hæc effectū comprobata adiucimus: R: aquæ Vitæ (quæ suggillationes etiam alibi mirè discutit) aquæ Raphani ana 3.ß. dissolue Camphoræ (quæ idem quod aqua vitæ, discutiendo facit) gr. v. Instilletur.

Vel sic: R: aquæ Raphani 3. j. maceretur in ea Croci 3.ß. donec flauescat; coletur: dissolue in ea Thuris 3. j. Fellis piscium 3.ß. Vtatur per se, vel cum mucilagine applicetur.

Vel spissius pro inunctione palpebrarum fiet: quod & in oculos poni potest: R: succi Raphani 3. ij. Fellis piscium 3.ß. Myrrhæ, Thuris ana 3. j. Croci 3.ß. Mellis q. l. excipiantur.

Vel sic in declinatione potissimum: R: Omphacij, Amurcæ ana 3. ij. Myrrhæ 3.ß. Croci 3.ß. cum Melle misce.

Vel vt penitus discutiatur, Aquæ compositæ in suffusionibus expositæ, per se, aut cum mucilagine applicatæ, competent.

Fomenta simul adhibebuntur, quæ plurimum discutiunt. Qualia in suffusione præscripsimus.

Vel hoc, quod admodum potens est: R: radic. Raphani 3.ß. sem. Fœnogr. 3. j. Fœniculi, Seseleos ana 3. ij. herb. Fœniculi, Chelidoniæ, Euphrasiæ ana M. j. flor. Chamom. Meliloti, Sambuci, Liliorum, Paleæ auenæ incisæ ana P. j. fiat decoctio in Vino & Aqua: Pro foru.

Emplastra supra oculū discutionis causa posita valent: inter quæ hoc est optimum. Si Pulmo vel Hepar columbæ, cruenta adhuc & tepentia, supra oculum posita ligentur. Quæ & si dolor & inflamatio adessent, eo nomīne quoque plurimum iuuarent, vt in ophtalmia diceretur.

Fit & emplastrum ex Pomo putri, ad discussionem vtile.

Vel hoc modo compositum: R: Raphani incisi 3. j. pulpæ Pomi putris 3.ß. pulpæ Pasfular. 3. j. Stercoris columb. 3.ß. mucilag. semīn. Fœnogr. q. l. contendantur omnia: misce cum Lacte: & applicentur.

Suffitus ex decocto fomenti præscripti, plurimum quoque discutiet.

Manualis operatio hic locum etiam habet, si pus genitum, discutiuntibus minimè cedat, illiusque magna sit copia, pupillam obliterans. Quod Punctura vt in suffusione dictum, sed maiori acu, cum aliàs nihil efflueret, tentari potest: & si non succedat, maiorem adhuc, sed in eodem puncturæ foramine, intrudendo: Vel cauum canaliculum, ita acutum vt foramen illud subire possit, imponendo, & pus sic exsugendo, eoque donec pupilla ab eo liberetur aliquomodo: nam si totum pus exhaurire vellemus, timendum, ne & aqueus humor sequatur. Pro suctione ista, canalis ille seu tubus ventre amplo constabit, vt pus suctum, in illum, non in os sugentis feratur; cuiusmodi chymici pro sugendis aqua

vel oleo, in separatione horum  
ab inuicem, ysurpare  
solent.



DE AVDITVS

# DE AVDITVS

## LÆSIONE.

### CAPVT VIII.

#### Genera.

*Surdi-  
tas.*



**B**OLETVR omnino auditus interdum, adeo vt vel nulum penitus sonum exterioriorem audiant: Vel si sonum aliquem auribus hauriunt, illius tamen differentias discernere nequeant, proin & quid significet, diiudicare non possunt: diciturque Surditas, Cophosis. Hi & sæpè muti sunt, si ab ortu surdi nascantur: estque tunc surditas originalis. Ex surdis tamen aliqui seipsos loquentes aliquomodo, alios verò audire minimè possunt. Sed & inuenti fuerunt, qui surdi alioquin existentes, dentibus musico instrumèto, sonum edente, presso, & parte illius aliqua, vel saltem alia illi contigua admorsa, sonum illum apprehenderent. Quod non saltem fistulam ore continentibus & fistulatis, sed & illis qui alterius instrumèti quod fidibus constat, dum pulsatur, partem mordicè apprehendunt, contingere potest. Et sanis etià, auribus diligenter obturatis, vt per hanc viam nihil audire queant, si idem faciant, simili modo, vt quilibet experiri potest, euenit.

*Graui-  
auditio,  
Bary-  
coia.*

Imminuitur verò saltem, quando ægre sonum percipere vel discernere possunt: in Graui auditu, Barycoia appellato: cum non audiunt aut intelligunt sonum, nisi altus atque eleuatus admodum sit: vnde qui cum illis loquuntur, vocem extollere coguntur, & nonnunquam clamare. Alij verò ne sic quidem vocem percipere possunt, nisi colloquentes, in aures ipsis loquantur & vociferentur:

*Obaudi-  
tio, id est,  
sonus in  
auribus.*

Deprauata auditio, siue Obauditio, fit cū sonum externum falsè percipit. Idque propter internum sonum in ipsis auribus præternaturaliter excitatum, huicque externo obstrepentem, vel illi se immiscentem eumque confundentem: idque vel continuò, vel per vices saltem. Præter quod impedi-

tum, molestiam quoque homini non leuem parit, atque inquietum reddit.

Variat autem hic sonus, in aurium cauo fuscitatus, admodum, atque vt sonus exterior, ita & hic varius quoque est: cuius diuersitates, vt nec illius, nisi comparatione, rectè alioquin explicari possunt, & per onomatopœam ferè nomina illis sunt indita.

Estque species vna illius frequentior que **Tinnitus** aurium dicitur: quando sonus ille, in auribus tintinnabuli, acutum plerumque sonum, dum pulsatur edentis, resonantiam exprimit, & vt nomen sonat, tinnit.

Altera; Sibilus est aurium: sonus qui vt (Si) nominis prima syllaba sonat, & qualis cum flatus per angustum foramen pertransit coactus, necdum rectè resonans, auditur.

Tertia species; Pulsus vel pulsatio est in auribus: Sonus qualis dū res leuiter ex ictu vel casu guttæ per vices pulsatur, sese offert; & syllaba nominis prima (PVL) quoque illum nonnihil designare videtur.

Quarta; Fluctus vel fluctuatio est in auribus: sonus huic qui fluctuum allisioni mutæ, vel ad alia, interpolatis factis vicibus, non absimilis: quem & principium illius nominis (FLVC) eleganter exprimit.

Qui præter hosce sonos, alio modo se offerunt, vel ex cōmixtione horum fiunt, generali nomine, Strepitus auris, appellantur.

#### Cause.

**O**Mnis auditionis defectus & deprauationis causa est: Vel in parte mandante cerebro: vel in instrumento recipiente, auris cavitare.

Cerebri vitium generale, vt reliquis sensibus, sic & auditui noxā infert. Et si speciatim circa nerui auditorij exortum, aut progressum in auditus cameram, oriatur, auditui potius, quàm cæteris incommodat. Acciditque hoc ei, vel vitio proprio, a morbo aliquo, vel imbecillitate illius: aut per cōsensum, ratione vaporum, vel obiecti proprii.

Morbus grauis & vehemens cerebri, ab intemperie frigida; repletionem; læsione insigni pfectus, sicuti reliquos sensus, ita & auditū vel abolet, vel debilitat. Quod & ab imbecillitate cerebri, spiritibus, causa senij, vel euacuationis magnæ, aut morbi grauis vel diutur-

*Tinnitus  
aurium,  
Obaudi-  
tionis spe-  
cies.*

*Sibilus,  
Obaudi-  
tionis spe-  
cies.*

*Pulsatio  
in aurib.  
Obaudi-  
tionis spe-  
cies.*

*Fluctus  
tio in au-  
ribus, Ob-  
auditio-  
nis spe-  
cies.*

*Strepitus  
in auri-  
Obaudi-  
tionis  
species.*

*Sedes af-  
fecta.*

*Cerebri  
vicio,  
Auditus  
læso.*

diuturni, absumptis & dissipatis, frequenter accidit, ut quemadmodum visio hac occasione læditur, ita & auditus labefactatur. Quæ omnia qua ratione fiant, in mentis imbecillitate & consternatione dictum fuit. Calida quoque illius intemperies, uti mentem & visionem depravare solet, sic & in delirijs, non tantum oculis varia spectra offert, sed & auditui sonos, quos se audire existimant, representant: præsertim uti mox dicetur, arterijs tunc in auribus vehementer pulsantibus.

A vapore nondum in auditus cameram irrumpente, uti mox significabitur, sed cerebrum afficiente, sicuti mens depravatur, & visioni falsæ imaginationes offeruntur: ita & si eam sedem, ubi nervus auditorius prodit, infestet, sonos falsos, eadem ratione ut in visus hallucinatione dictum est, auditui representare potest.

Obiecto proprio uti visionem affici diximus, ita & sono violento & nimio, subito & affatim per aurem ad cerebrum usque penetrante, offenso nervo, spiritibusque dissipatis, surditas nonnunquam secuta est. Vel redeuntibus spiritibus, non tamen sufficienter, tinnitus aurium relictus est. Qui tamen sonus, si impetu maiori fiat, etiam auditus organum, uti mox dicetur lædendo, noxam inferre potest.

*Auris vitio, Auditus læsio.* Instrumenti auditorij sonum illum exteriorem suscipientis vitio, auditus varijs modis læditur: cum & organum hoc, quod auris nomine appellamus, ex pluribus partibus ut membranis, ossiculis, nervoque auditorio sit constructum: quorum omnium vitia varia auditui incommodare possunt. Quæ nos non ut in oculo fecimus, à singulis partibus incipientes, singulis sua vitia adscribemus, sed totum auris ductum, in duas cavitates distinguentes, exteriorem scilicet & interiorem, quinam morbi in utrisque occurrentes auditum lædant, explicabimus.

Exterior auris cavitas, quam meatum auditorium vocant, extrinsecus aperta, patens & conspicua, ad tympani membranam usque, qua occluditur, desinens, nihil alioquin in se præter aerem continens, & sonum externum intromittens; si à causis externis varijs occurrentibus: vel internis humori-

bus, aut tumoribus obturetur vel obstruatur: siue penitus: siue tantum ex parte, aut alioquin lædatur, auditum tunc lædi contingit. Quæ etiam causæ hic occurrentes, à sensibus duntaxat nostris percipi, vel si penitus lateant, stylo immisso explorari, & si quid inde exeat, ab excretis cognosci possunt.

A causis externis, si auris exterior cavitas penitus occlusa sit (quæ aliàs naturaliter uti oculus, claudi minimè potest) ut fit, pressa auris posteriore pinnula vel cartilagine: aut adhibitis manibus, alijsve corporibus: aut aqua, dum per natationem in ea caput occultatur. Vel obstructis auribus ab intrusa vel illapsa aliqua crassiore materia: ut nucleo; vel etiam animali: quæ earum cavitates penitus occludant; aut aqua, quæ illapsa, omnino oppleat: auditus adeo impeditur, ut exteriores sonos vel omnino non, vel non rectè, prout plus minusve vel una auris, vel utraque obturantur, possint percipere. Ni forte, alia via, alioque artificio, uti per os, apprehenso dentibus instrumento, sonum edente, fieri diximus, sonus ille non nihil percipiat. Quod duplici nomine accidere putamus. Tum propter dentium substantiæ in duritie quæ penè lapidea est, & læuitate, cum ossibus auditus cameræ (quæ ossa dentium substantiæ persimilima, & ut in ea melius sonus fieret, durissima atque lapidea sunt) similitudinem & consensum, atque adeo cum ipsius auditus ossiculis, eadem substantia præditis. Dein & propter nervos dentibus substratos, qui à linguae nervis eò derivantur, nervique linguae cum auditorio nervo, propaginibus (uti inferius, ubi qua ratione surdi etiam muti nascantur, explicabimus) mutuo coniunguntur: quo consensu accidit, ut cum sonus per aerem ex contactu dentes pulsatur, continuatione hac, per interiora facta, auribus percipiat. Sicuti & ore exactè clauso, dentibusque inuicem collisis, vel lingua in oris aliquam partem impulsam, sonum, etsi extrinsecus auris non audiat, per anteriora tamen percipimus. Sed & ob consensum illum dentium cum auditus organi substantia, videmus à sono aspero, facto ex confractione rerum asperarum, etiam citra contactum

*Obturbatio auris, causa Auditus læsionis.*

dêtes offendi. Huc fortè aliquid facit quòd, sicuti pulsatis fidibus instrumento alicui obductis, animaduertimus chordas ad eundem tònũ intensas in alio instrumento, etiam præcul dissito moueri, adeò vt si aliquid illis imponatur, vel tremat, vel si leue sit, vt palea, decidat: vt & tympanum tensum, ad omnes sonorum impulsus excipiendos, continuatione per intermedios dentes & neruos facta percussum, sonum auditui repræsentat. De quibus multa disputari possent, sed ad rem.

Et si verò aure penitus obturata, sonus exterior minimè percipiatur, sonus tamen aliquis nihilominus aliquando in aure sentitur. Quod primùm aëris causa, qui in auris hac ciuitate remansit, & tympanum impellere ac percutere plus minúsve potest, solet accidere: sitq; eò maior, quòd auris, licet obturata sit, minus tamen aliena materia repleta, copiosorem adhuc in se continet aërem; vnde fluctuationis sonus, aëre in aure se volutante & veluti inundante, percipitur. Hinc videmus, si illud quod cauum est, aëremque ob id in se continet, auri adhibeatur, sonum hunc vehementiùs in aure sentire: quod vola manus caui auri adhibita experimur: vnde & pueri concham auribus apprimentes, fluctus marinos in ea se audire, referre solent: aëre tunc propter conchæ anfractus, maiorem strepitum edente. Quod & aquæ immerso capite, ita vt ab ea penitus aures obturatæ sint, accidit, aëre tunc remanente, qui fluctuationis sensum offert: & si sub aqua commotis lapidibus, strepitus fiat, illum quoque, instar tintinabuli sonantis percipi: licet sonus extra aquam, etiam à sclopeto exploso, summus editus, nullo pacto audiat, multoties cum puer natatione delectaret, obseruauit. Verum & ob pulsus arteriarum in auribus, pulsans in illis sonus aure occlusa, non nihil sentitur, qui aure aperta ob sonum exteriorum, cum maior sit & minorem hunc obscurat ac deleat, non obseruatur; quem & notauit, si aures cucupha nimium stringant, & puluino obruant, se audire, præsertim si caput illis calidius existens, pulsus vehementiorem moueat, multi narrant; & in mor-

bis, præternaturaliter molestiam parere, mox explicabimus.

Cæterum si iam dictis de causis externis, *Ex illis* auris *cauitas* nō penitus occlusa sit, ita vt sonus exterior nihilominus eas subiens, audiatur, tamen auditus sit læsio: non tantum quòd diminutè fiat, sed deprauatè quoque, cum auris ab omni contactu interiore, non tantum tympani, sed & reliquæ illius cavitatis, sonum illum in aure factum, obstrepentem audiat, qui prout cōtactus sit, varius est. Nam qui in ductu sit extra tympanum, fluctuationem quandam vel strepitum refert. Si verò insectum aliquod irrepens, vt pulex, aliæve, ad tympanum vsq; ferantur, illud quo contingant, dum mouetur, sonus in aure volitantis papilionis instar strepens admodum molestus auditur. Si gutta vna aquæ vel plures eousq; etiam defluant, ac si caput cauum esset, & in eo sonus talis exurgeret, persentitur. Quemadmodum & sonus hi vel alij, si vermis, salamandra, aut aliud qd aurē non penitus obturans, sed nihilominus molestans, in ea contineatur, percipiuntur.

Ab humoribus internis si auris repleatur, *Repleta* idem accidit, vt auditio vel tollatur, vel impediatur, vel deprauetur. Vt si sordibus aurium biliosis, quas Ceram vocant, diu retentis, *exterioris* *in auris* *cauitate* *ab humoribus internis,* *causa* *auditus læsionis.* incrassatis induratisque auris obstruatur; maximè si, quod incuria interdum fit, dum eximere eas student, auriscalpio ad tympanum vsque propellantur: quæ postea illic hærentes, cum non facile amplius cedant, auditioni magnum impedimentum adferunt. Quod & à sanguine concreto post læsionem auris, pureq; post abscessum, retentis aliquamdiu, potest accidere: quæ tamen cum diutius minimè hæreant, sed sponte effluant, non tam auditui obsunt, quam alia ratione auribus, vt in aurium doloribus ostendemus, incommodant.

A tumore præter naturam, obstruendo, *Tumor* *in auris* *exterioris* *cauitate* *causa* *auditus læsionis.* potius quam intemperie auribus nocente, auditio lædi potest: idq; perseveranter, si sarcosis vel callus post exulcerationem aliquam auris, quod rarum est, relinquuntur.

Læsio exterioris huius meatus, nisi tympano noceat, vti dicitur, auditui vix dum obesse, nisi excrescentiam post se relinquat, *vti di-*



vti dictum, potest. Et ab vlcere non bene consolidato, pulsum in auribus remanere interdum, scribit Fernellius: quod, quia non bene amplius cute tecta est arteria, sed nuda, ob eamq; causam validius vicina pulsat, accidere in exterioris huius camerae, cutanea arteria, quæ eò defertur, necesse est: sicuti in aurium vlceribus explicabitur.

*Spiritus, vapor, flatus, in interiore auditus camera, causa, sonitus in auribus.*  
Interior auris cavitates, ab exteriori dicta, tympano interueniente distincta, admodum anfractuosa, ossicula, neruumque & arteriolam continens, à spiritu, vapore, flatu, humoré illic contentis affecta; vel si conformationis vitio ipsa, ipsiusq; partes, aut intemperie laborent, auditui quoque detrimentum adferre possunt. Quæ vitia cum abstrusa sint, nec sensibus nostris assequi, sed signis tantum cognoscere possumus.

Spiritu, si arteriola, quæ hanc sedem subit, copioso vel calidiore impleatur, velis in ea nimium agitetur, validiore tunc pulsu facto in auribus, pulsans in auribus fit sonus: qui tamen manifestius aure clausa, vti superius dictum est, sentitur; eaq; aperta, si vehementior sit, sonum exterius irrumpentem quoq; deprauat. Quod vt calore vehementi corporis in reliquis arterijs, sic & hic in auris arteria, pulsum intendi contingit: vti post exercitia valida, in balneis aliquando sentitur: & in morbis item acutis, cephalalgij, pulsatio hæc in auribus molestiam parit. Motu insuper & agitatione violenta spirituum, idem euenit: vti videmus in syncope incipiente, refugientibus spiritibus, & eadem desinente, rursus illis remeantibus, pulsum & tinnitum in auribus sentiri; ex quo, referente ægro, instare syncopen cognoscimus. Quod & in multis animi affectibus eandem ob spirituum commotionem, accidit.

Vapor tenuis & subtilis, vti minutissimos meatus subire, sic & per angusta foramina ( quorum sex in interiorem hanc cameram auditus desinentia, vasaq; transmittentia esse, in opere Anatomico ostendimus ) interdum huc vsque penetrare, sine dubio potest. Et sic quoq; non tantum cerebrum, vti prius dictum est, afficiendo deprauare ( vti verò visionem à vaporibus tantum ce-

rebrum petentibus, nec oculum subeuntibus, cum nulla illic sit via, deprauata, superius ostendimus ) sed etiam propter dicta foramina, quorum aliqua è caluariæ interioribus huc desinunt: alia extra caluariam occurrentia, huc quoq; pertinent, cum multæ sint viæ, etiam ad auditus organum peruenire posse, certum est. Quod cum sit, sibilum, tinnitum & strepitum auditui offerri necesse est. Atq; hæc frequentior quam humoris influxus, vti mox dicitur, huius soni præternaturalis causa, cum in ebrijs aut alijs, & in morbis quoq; multis à vaporibus, nunc tenuioribus & biliosis, vt vocant, nunc etiam crassioribus, sæpe euenire soleat, vt aures eam ob causam tinniant, vel alium sonum edant; qui, vaporibus aliquamdiu persistentibus, diutius perseverat; vel mox illis dissipatis, euanesceat. Estq; hæc potissima causa, quare post crism in acutis morbis, quos præsertim cephalalgia, inter reliqua symptomata, comitatæ sunt, auditus in conualecentibus labem aliquam, diu sæpe duranti patitur: materia, tunc quæ morbi cõiuncta causa erat, è venis in vapores resoluta, & per sudores insensilemque transpirationem euacuata, portioneq; illius è capite in auditus capacitatem, per vias dictas irrumpente, aliquandiu subsistente.

Flatus aut aer, idem potest efficere. Quid si in interiorem hanc auditus cameram irrumpat, & per angustam viam veluti coactus feratur, sibilum edit. Si per aliud foramen, sic instructum vt in fistula formari solet, tinnitum efficit. Si verò per ampliores ductus & per anfractuosos illius loci cuniculos discurrat, strepitum alium aliquem facit. Hoc sæpe, si per vim eò propellatur, euenit: vt cum naribus compressis & spiritu siue aëre vehementer impulsio, nasum emungere volumus, interdum accidit, vt illius portio per foramen è narium amplitudine ad auditus organi canalem geminum ( sicuti in Anatomico nostro opere demonstrauimus ) irrumpat, & sibilum vel tinnitum, diu, sæpe perseverantem excitet, interdum mox, aëre rursus eadem via erumpente, quod sæpius deglutiendo, citius fieri, ego ipse cerebro expertus sum, cessantem. Ab interna etiã causa, flatus hic in auditus camera excitari po-

test, si ab excrementitijs humiditatibus circa perioſtia cranij collectis, inq; flatus conuerſis, illic colligantur: vnde in cephalæis antiquis: & capitis & circa oſſa doloribus in lue Venerea, tinnitus aurium admodum eſt moleſtus.

*Humor in interiore auditus camera, causa Auditus defectus.* Humor à capite in interiorem hanc auditus cavitatem, per foramen quod neruum auditorium admittit, deſluens, vel expurgatus, vti ſi copioſus, ſurditatem facit, vel grauem auditum: ita ſi ſubtilis ſit & paucus, auditum deprauat. Et ſi ex deſluxu illius hoc accadat, ſubitò ſit: ſi ſenſim illic congeneratur, ſenſim quoq; hæc noxa ingruit. Quæ omnes diuturnum & perſeuerantem ſerè, cùm humor ægrè hîc diſcutiatur, affectum gignunt. Prouenit autem hoc à catharro, qui & ad alias partes, & ad hanc quoq; à capite interdum delabitur. Et ex illius indi-  
cijs non ſolùm in ealæſione, ſed & alijs apparentibus cognoscitur. Quod & ſenſcentibus propter excrementorum copiam familiare eſt, & quibuſſiam naturis etiam à teneris conſuetum, vt auditus organum moleſtet: vti ratione regionis accidere poteſt, ſicuti in Alpinais regionibus, hæc de cauſa multos difficilem auditum ab ortu, vel mox in ætatis progreſſu, vnà cum ſtrumis, illis ob ſimilem cauſam familiaribus, habere cernim⁹. Sed & in acutis morbis per criſim potiſſimum, vti ſuprà dictum eſt, morbi cauſa non tantùm in vaporem conuerſa, hanc cameram ſubit, ſed & ſæpè humoris ipſius excrementitijs vel bilioſi, nunc puri, nunc cum ſanguine adhuc, vt aliqui voluerunt, permixti, portio in eam illabitur, pertinaciorque læſionem, quàm ſi à vapore fieret, parit.

*Conformationis vitium in interiore auditus camera, illiusque partibus, causa Auditus defectus.* Conformationis & cõſtructionis auditus organi vitio, auditus quoq; læditur. Quod cùm in interiore hac camera ex neruo auditorio, tympano, oſſiculisq; tribus & cameræ huius labyrinthis conſtatum ſit, in quocunq; illud accidet, auditui nocere poteſt. Nerui auditorij non rectè formati, aut duri, ab ortu, cauſa nonnunquam euenit, vt ſurdi naſcantur. Cognoscimusq; nerui cauſa eueniſſe, quòd & muti quoq; pleriq; exiſtant: cùm lingua, quæ ad ſenſum guſtus,

tactus & motum vehementem edendum, pluribus neruis indiguit, non tantùm proprios neruos obtinuerit, ſed & aliũ in ſuper, à neruo auditorio, eam ob cauſam ex auditus camera erumpente, cuius gratia lingua cum illo continuatur, acceperit: quo læſo, lingua, eſſi ſenſus maneat, ſufficienter tamen non moueri, ad loquelam edendam, cùm ad motum maior vis, quàm ad ſenſum perficiendum, requiratur, contingit. Nec dum obſtat, quod ſenſorius tantùm ille neruus ſit, quo hîc lingua priuatur, cùm iam ſæpè probauerimus, omnem neruum vim mouendi ſentiendique in ſe habere, quam etiam ad inſtrumentum conueniens delatus, exierit.

Tympani cauſa frequentius auditus læbefactatur, ſi, vt in corio tympano militari obduſto accidere videmus, non integrum, aut non ſufficienter, vel nimium tenſum exiſtat.

Vulneratum tympanum, cùm non amplius reſonet, ſurditatem parit. Quod cùm abſtruſum ſit, rarò ſit, niſi per vim intruſo auriscalpio. Vulgus à ſalamãdra infecto (quod *Drenmettel*. quaſi auris. vermẽ aut lumbricum, quod facilè in hortis irrepere poſſit, vocant) accidere poſſe autumat: ſed cùm ſi vel illa, vel aliud quid, quod nocere poſſit, irreat, facilè ſuccurratur, vix dùm hoc fieri poteſt. Vti neq; à pure retento, cùm illud mox ſoleat profluere, plurimumq; ſæpè effluxiſſe ſine noxa, viderim: Niſi fortè vlcus aurium tam profundum ſit, vt abſceſſu factò, tympanum quoq; lædatur.

Laxius nec conuenienter tenſum ſi fiat tympanum, ſonum non amplius poteſt edere. Quod vti per vim à ſono violento, clamore in aures factò, vel ab iſtu bombardæ ad aurem exploſæ, nonnunquam accidet: Sic & diuturnitate tẽporis, longo uſu multaq; auditione, præſertim altiorum ſonorũ, toties pulſatum laxiusque factum, auditum difficiliorem in ſenibus, (quæ videtur frequens eſſe cauſa, grauiſiſſorum auditionis) facit. Quod & à madore multo, vel vntuoſitate, ſi oleum ſæpè auribus inſundatur, aut alij liquores, quod auditus reſtitutionis cauſa, aliunde deperditi, diu aliquando fieri ſolet, poteſt contingere.

Nimium quinetiam tensum, atque ita astrictum, ut ab aëre externo pulsarum, nihil penitus cedere possit, inutile fit. Acciditque hoc, quando vel ætatis causa, vel post morbos acutos, nimium exiccatur induraturque. Quod ut reliquis omnibus membranarum contingere potest, sic & huic: eoque facilius & frequentius, cum in propinquo nulla corpora humida habeat, aut adipe, uti reliquæ multæ membranæ, inungatur, sed libera, nisi ubi in circuitu adnascitur, existat. Estque fortè hæc non minima, difficilis auditionis, quæ senescentibus ingruere, & in convalescentibus relinqui, post morbos sæpe solet, causa. Quam tympani exiccationem, post vigilias & ieiunia accidere posse, scribit Rhazes.

Ossiculorum trium mutua constructio, & coarticulatio, vel conformatio vitata, auditui nocumentum adfert. Quod ab ortu à causis infitis euenire potest: Vel aduentitijs violentis, ictu, casu, sonituque vehementi: tympano ferè, cui adhærent, simul affecto.

In ictibus varijs, cavitatibus & cuniculis illic occurrentibus, si quid non rectè ab ortu se habeat, sine dubio auditionem etiam offendit.

*Intemperies frigida uti nervis, membranis & ossibus inimica, sic & auditus organi structura, ex hisce conflatur, admodum noxia est: eoque magis, quod aëri externo frigido, aures apertæ & nudæ semper pateant, faciliusque sic ab externis, ut vento frigido, præsertim per meatum auditorium, ad tympanum usque penetrante, illicque partes etiam abditas, & nervum ipsum refrigerante, lædantur: unde surditas nonnunquam, & auditus impedimentum frequenter subsequuta sunt. Quæ quoque una ex præcipuis causis existit, quare in locis frigidis, ut alpebus, & ventosis, citius defectum auditus communiter sentiant. Quod & ab aqua frigidissima, in aures casu, vel inter natandum illapsa, accidere potest.*

*Et narcoticorum usus nimius in aures, quandoque, non quidem refrigerando, sed nervum nimium obtupefaciendo, adeo afficit, ut ad se redire non amplius possit. Quæ nova causa, ad imbecillitatem referenda est.*

### Curatio.

**C**uratio auditus læsionum omnium, quæ sunt, surditas, grauis auditio, tinnitus, sibilus, pulsatio, fluctuatio, strepitus, causæ primùm accommodatur. Quam diximus esse, vel in cerebro affecto, vel per se, vel per consensum, à vapore vel obiecto: aut in auris cavitare exteriori, obturationem, obstructionem, à causis externis, vel illapsis, aut internis humoribus, tumoribus: Vel in interiore auditus camera, à spiritu, vapore, flatu, humore, repletionem aut molestiam: vel conformationis vitium aut constructionis: vel intemperiem: De quibus singulis quid sperandum, & quid agendū, dicemus.

Cerebri affectus causa, si auditus una cum alijs sensibus lædatur, causaque illic, nec dum in instrumento lateat, eadem ratione, uti in visus læsionibus, à simili causa dictum fuit, procedendum erit. Uti & si à vapore cerebri per consensum afficiente, hoc fiat, non alia remedia, quam quæ in vertigine, in visus depravatione, conuenire diximus, adhibebuntur.

A sono impetuoso externo, si auditus defectum patiat, spontè nonnunquam ad se redeunt. Alias ægrè, alias nunquam: quando nimirum spiritus adeo dissipati sunt, ut remeare non possint amplius, vel non sufficienter, unde tinnitus perpetuus relinquitur. Vel si tympanum vi aëris impulsus, læsum laxatumve nimium existat, surditas vel grauis auditio, homini semper deinceps molesta est.

Nihilominus tamen adhibitis cucurbitulis iuxta aures: & frictionibus circa aures, alijsque calidis extrinsecus, & intrinsecus, auribus appropriatis, spiritum retrahere studemus: habita corporis constitutionis ratione: de quibus mox agemus.

Ab occlusis auribus extrinsecus, si auditus intercipiatur, remouendo ea quæ impediunt, siue adhibita saltem extrinsecus, vel aliquousque intrusa sint, facillè corrigitur.

Illapsa verò vel intrusa corpora, penitus cavitatem subeuntia, vel si animalia irrepserint, non tam facillè cedunt, quocirca ut auferuntur, maiori arte opus est: ea vel eluen-

*Auditus læsionis si cerebri vitio fiat, curatio.*

*Auditus læsionis à sono violento, curatio.*

*Auditus defectus ab occlusione aurium, curatio.*

*Auditus defectus ab illapsis in*

*aures, cu  
ratio.* do, aut excutiendo, aut extrahendo, vel allieciendo, aut enecando.

Eluendo nonnunquā hæc cedunt, si non adeò firmiter hæreant. Quod fiet, infundendo quæ viam hanc lubricam reddunt, & humectant, dilatantque. Vti olea: commune, amygd. dulc. butyrum, lac. Vel decoctum aliquod relaxans lubricansque.

Excurimus impetu quodam, Sternutatione mota: sic enim spiritus impulsu, concussis illis partibus, sæpè profilit illud quod illapsum est, vel saltem ad anteriora propellitur: quod eò citius fiet, si prius via, vti dictum, dilatata fuerit. Saltu & impulsu pedis illius lateris, in quo auris affecta est, contra terram facto, tenendo interim caput manibus, & inclinando in illam sedem, excutiuntur quoque res ex auribus. Qua ratione aquam aliaque liquida in aures fluxa, comòde eijciuntur: vti pueri post balneum in profuente, si quid auribus influxerit, excutere solent.

Extrahimus si hæc non succedant, instrumento ad hoc idoneo, cauendum tamen studiosè, ne dum intromittitur, illud quod inhæret vterius propellatur, vnde postea maiori difficultate eximi potest. Fit hoc auriscalpio, quo sordes auferri solent, cuius cochleare admodum tenue sit, vt illic contentis postposito, ea commodius extrahi possint. Vel forcipe ad id accommodata, vtrinque acuta & aspera, illa apprehendi & eximi debent. Vel si neque hoc succedat, alio instrumento apprehensa, si corpora dura sint, vt nucleus vel lapis, confringimus, & dein, vti dictum, humore infuso eluimus.

Allicimus interdū animalia quibusdam, quæ illis grata sunt, vt extrorsum repât, sicque tunc apprehendi possint. Vt si Lac cum saccharo, in spongiola auri adhibeamus, vel leuiter intrudamus: aut Ficum inuersam: Vel crustam Panis: aut Pomum, & similia: Vel Lardum, quo vermiculi citius eliciuntur, idque præsertim si, dum hæc in auribus retinent, eas foli obuertât. Sanguine immisso in aures, hirundines casu ingressæ, alliciuntur.

Necamus viua animalia, si in auribus hæreant, neque cedant: tuncque mortua non amplius auditui obstrepunt, & facilius eluuntur, vel excutiuntur. Idque fit suffocatione il-

lorum, si liquores infundantur: Sic saliuam, quam mox noctu ad manum habentes, digito exceptam, auribus instillare solent, si pulices in eas irrepserint, quæ tenacitate sua mox illorum spiracula occludit. Idem vrina propria infusa præstat. Amara si sint quæ infunduntur, infecta citius enecant: vt Centaurij, Absynthij succus, vel decoctum, vel Vinum, succus Nerij quoque occidit infecta: item Fella, & Aloës. Acrida idem faciunt: Accetum, succus Pomi & Cæparum: & reliqua quæ in aurium vermibus explicabuntur.

A fordibus, bile, sanguine concreto, aut pure, si aures obturantur: extrahere ea auriscalpio, vel alia arte, vti dictum, oportet. Et si adeò crassa vel tenacia sint, vt non facile cedant, tunc abstergi, dissolui atque elui debent: sæpè immisis rursumque emissis liquoribus: quales in pure abstergendo, in aurium vlceribus etiam explicabuntur. Confertque imprimis Aqua mulsa vel Hydromel. Vel si potentius abstergendum, decocto vel succo amaro, iam dicto Absynthij, Centaurij, Lupinorum, id erit faciendum, addito Melle vel Felle, quod præ cæteris omnibus, vti sæpè dictum, ea quæ viscosa sunt, fluida facit, & in cera biliosa aurium dissoluenda, cui propter similem cum illa naturam, se egregiè insinuat, magnas vires habet.

Tumor carnosus, si aures occludat, tollitur, cum secari non possit, & caustica vel septica, cum periculo tympani, intromittantur. Callus relictus vix emollitur, tamen emollientia remedia tentari possunt.

Post vicus, si pulsatio in auribus relinquatur, eam perpetuam esse scribit Fernellius: quod tamen impedimentum, fortè cute vulneri obducta, spatio temporis magis crassescente, minuitur vel cessat.

Pulsationis arteriarum vehementioris in auribus causa, si sonus in auribus sentiatur, ea remittente, sicuti diuturna non esse solet, etiam sonus ille desinit. Si à sensu exquisito nimis id fiat, tunc vel semper, vel ex leui pulsus intensione sentit; & ætatis decursu, remittentibus sensibus, mitigatur: Vel immisissis narcoticis, si admodum molester, corrigitur: vt si succus Hyoscyami, cum Oleo vel Aceto instilletur.

*Auris  
defectus  
à reple-  
tione au-  
rium, cu-  
ratio.*

*Pulsatio  
nis in au-  
ribus, ar-  
teriarum  
causa,  
cura.*



*Audi-  
tus la-  
tis, & re-  
pletione  
interio-  
ris audi-  
tus came-  
re, curat  
tio.* Ab humore vel flatu, vel etiam vapore in  
auditus camera contentis, si auditus lædatur:  
tunc si materia tenuis admodum sit & vapo-  
rosa, spontè tandem dissipatur. Vel si cras-  
sior, hæreatque, diuturnum sæpè malum  
producit.

In quo sanando, siue surditas, aut grauis  
auditio, aut obauditio inde facta sit, præcipuè  
euacuantia eodem modo, vt in vertigine &  
visus imbecillitate, ab aqueis, serosis & pitui-  
tosis humoribus factis, descripta sunt, vsur-  
pantur. Atque alterutra quæ in oxydorcicis  
descripta, illis quoque competent. Topicaq;  
remedia, ad & intra aures, quæ materiam il-  
lic contentam absumere, dissipare, & discu-  
tere possunt, & proprietate auditum resti-  
tuunt, adhibebuntur. Quæ omnia sequenti  
ordine methodicè instituentur.

Fæces intestinorū, ante omnia eluuntur:  
suppositorijs vel clysteribus, vel ectoprotico  
exhibito, vti locis enarratis dictum est, & in  
alijs excrementijs cerebri morbis dicitur.

Venæ sectio, si plethora adsit, vel biliosa  
materia, vnà cū sanguine ad aures defluens,  
in morborum crisis surditatem fecerit, vti  
dictum, competet.

Præparantur humores, si pituita in cere-  
bro abundet, eodem modo. Vel hac ratione:  
dando aliquot matutinis, & noctu cubitum  
ituro, si magna præparatione opus sit, se-  
quentia: R. syruporum de Betonica, de Stœ-  
chade ana ʒ.β. Oxymel. squill. ʒ.ij. aquarum  
Saluæ, Rosmar. Maioranæ ana ʒ.ij. fiat iulep  
pro vna vice: aromatizetur: vel tabulas post-  
eaumat: Repetendus, vt dictum.

Vel decoctum hoc paretur, quod & effica-  
cissime est: R. radic. Acori veri Ireos ana ʒ.β. E-  
mulæ camp. ʒ.ij. Liquiritiæ ʒ.ij. herb. Saluæ,  
Rorismar. Maioranæ ana M.j. Thymi, Rutæ,  
Melissæ ana M.β. florum Betonicæ, Lāuan-  
dulæ, Stœchados ana p.j. semin. Feniculi ʒ.ij.  
Carui, Rutæ ana ʒ.ij. baccarum Lauri ʒ.ij. fiat  
decoctio, & in colaturæ ʒ.β. dissolue Mellis  
optimi ʒ. viij. coquantur ad mediā consisten-  
tiam syrupi: atq; in eo suspendatur nodulus,  
paratus ex Cinamom. ʒ. ij. Cubeb. Spicæ a-  
næ ʒ.ij. Piperis longi, Zingib. ana ʒ. j. Capiat  
ad ʒ. iij. pro vna vice.

Ex iisdem & plantis & aromatibus infusio

in Vino vsurpari potest. Addito, si delectetur  
amaris, Absynthio, Camæpith. & Marrubio,  
vt tanquam vinum absynthites bibatur.

Si biliosus humor in corpore redundet; il-  
le potius præparandus: vti decet.

Purgetur dein eodè modo, vt in visus læ-  
sione à pituita cerebri dictum, pilulis impri-  
mis Coccij, Sine quibus, Lucis, Vel electua-  
rijs, vt Indo, alijsve: vel si biliosa fuerit mate-  
ria, illi humori expurgando accommodatis.

Et per vices pilulas leuiiores, interdū for-  
tiores assumendo: vel alijs formis: sicuti in  
remedijs hæc explicata sunt.

Sudores valdè hic conueniunt, quia ab o-  
mnibus partibus etiam abditis excrementa  
tenuiora euocant, & flatus vaporesq; discu-  
tiunt. Quare conciliandi, corpore prius pur-  
gato, calore balnei sicci, vel humidii, artificia-  
lis vel naturalis: inter quod thermas certas  
auditui cōferre vulgò creditur: sulphureasq;  
imprimis aliqui commendant, easque adeo  
efficaces in surditate sananda existimant, vt  
si æger dum in balneo sedet, spongia ampla,  
quæ totum caput comprehendat, aquam cal-  
lidam per epistomium effluentem excipiat,  
idque bis in die, præstantissimum illius esse  
remedium. Sed & exhibitis sudoriferis, ad-  
hibitaque si necesse sit, diætæ dicta, in cor-  
poribus repletis, aliquandiu promoueri pos-  
sunt: quod extremum sæpè in surditate est  
remedium: faciendo nimirum, vt appellare  
solent, diætam.

Per nares & os excrementa cerebri sunt  
euocanda, eoque allicienda vnde magna sæ-  
pè ab auribus fit revulsio, & quædam inter-  
dum expurgatio. Nam per masticatoria, non  
tantum dum excremeta educuntur cerebri,  
ne ad aures adeo fluant, reuelluntur, sed &  
per frequentem expuitionem, per forami-  
na dicta, in basi caluariæ auditus organum  
fubeuntia, expurgatio hoc impulsu, non-  
nunquam & humorū & flatuum facta, hanc  
sedem ab obturatione liberat: vti experien-  
tia ostendit, valida deglutitione; frequenter  
reperita, aliquando vapores & aërem, qui in  
auditus cameram, dum nasus impetu emun-  
gebatur, irrupit, sonitum illic causans, per  
eandem per quam subijt viam, rursum veluti  
extrahi, & sicuti subito factus erat, ita subito  
sonum

sonum illum aurium cessare. Quare & deglutitio, pressis interim extrinsecus auribus, ad flatum illic educendos, remedium est non aspernandum.

Idem quoque errhina præstare possunt; & valida per nasum emunctionem aeris excussio: ubi tamen, si nasus dum emungitur ita comprimatur, ut aer egredi commode nequeat, sed sæpe recurrens, per foramina dicta in aurium cameram, uti ostensum, irrumpit, sicq; auditum depravat: ob quã causam ita mungendum est, siue manibus aut strophio id fiat, ut aëri per nares liber pateat exitus.

Longè vehementius hoc facit sternutatio, quæ sæpe ab auribus confestim flatum vel humorem, per eandem viam, excutit: sed ita facta, ne aëris impetus sistatur, ea cautione sicuti modò in emunctione declarauimus.

Scarificatio in carpo facta, multum ab auribus deriuare creditur. Proderit autem magis, si circa iugulares venas in collo fiat, unde statim sæpe leuantur. Cucurbitulæ quoque adhibita hisce locis, vel scapulis, profunt. Postremo & cauterium.

Capiti applicatur remedia, superius enarrata, siue extrinsecus adhibeantur; vel in situ per nares introruantur. Inter quæ remedia, quæ varia sunt, singulare hoc præsidium, quod ex embrocatione aquarum sulphurearum fit, ut superius dictum, esse existimatur.

Assumpta remedia eadem, quæ dictis locis explicata sunt, & caput roborant, humores, flatum, vapores, alterant, absumunt, discutunt, hinc quoque: tam in victus ratione decet; in qua Vinum vetus & validum à Rhazi probatur, quàm alijs medicamentis & confectionibus, à ieiuniis & post pastum assumendis, competunt.

Quæ auribus in dictis causis induntur remedia, Acouistica dicta, varia sunt. E quibus selectiores formas correctioresque, hic explicabimus.

Aqua vitæ dicta simplex confert.

Appropriata magis sic fit: R. aquæ Origani ex sicca herba, macerata in Vino albo, exstillata: Vtatur.

Aqua composita magis: R. rad. Raphani, Porri, Cæparum ana 3.j. Cyclaminis 3.β. Hel-

lebori albi 3.j. herbarum siccarum, Origani 3.ij. Rutæ, Maioranæ ana 3.ij. florum Lauandulæ 3.j. seminum Fœniculi, Cimini ana 3.j. baccarum Lauri numero xv. contundantur omnia, atque adde, Fellis vaccini 3.j. Vini albi q.s. ut veluti in pultem redigantur: destillentur.

Decoctum sic fiet: R. rad. Hellebori albi, Cyclaminis ana 3.j. herb. Origani 3.ij. seminum Cimini 3.j. decoquantur in Aceto albo: colentur ad vsum: si Acetum squilliticum sumas, efficacius erit.

Alterum decoctum adhuc excellentius & valdè commendatum: R. rad. Hellebori albi 3.β. Croci, Castorij. Nitri ana 3.j. conqassentur: bulliant in Aceti 3.β. Aquæ vitæ 3.ij. colentur, ad vsum.

Ex succis multi vsurpantur: ut Cæparum, Porri, Raphani, Rutæ: item Fraxini, & Vitium dum amputantur lachrymæ, maxime in causa calida.

Olea in aures frequenter vsurpari solent, secus ac in oculis. Communia magis sunt Amygd. am. & Nardinum.

Per destillationem elicita olea, sunt efficacissima præ omnibus alijs medicamentis: ex calidis odoratis plantis & seminibus imprimis extracta: Ut Rosmarini, Maioranæ, Saluiæ, Rutæ, seminum Cimini, Carui, Fœniculi, baccarum Lauri: & quod ubiq; inuenitur, oleum Spicæ: Vel aromatum olea, præcipuè Gariophyllorum: quæ omnia sola vix, propter nimiam vehementiam adhibentur, sed dissoluta liquore aliquo, vel permixta alijs foelicissimè immittuntur, uti dicitur.

Composita olea sic fiunt: Inter quæ hoc excellens est: quod R. olei Amygd. amar. 3.β. succorū Origani depurati 3.j. Aceti albi 3.ij. bulliant ad consumptionem: ad vsum.

Vel sic: R. oleorum Amygd. amar. Nardiniana 3.β. succorum Porri, Rahani, Aceti ana 3.ij. coquantur ad succorū consumptionem: Vtatur: si addas Castorij 3.j. Euphorbi 3.β. efficacius erit.

Vel pluribus additis fiet efficacissimum hoc modo: R. oleor. Nardini, Amygd. amar. ana 3.j.β. succorum Raphani, Porri, Cæparum & Rutæ, Acetiana 3.β. Aquæ vitæ 3.j. adde puluerum radic. Helleb. albi, Cyclami-

nis ana 3.j. pulpæ Colocynth. 3.j. fol. Origani, feminis Cimini ana 3.j. Piperis longi 3.β. Castorij 3.j. Euphorbij 3.j. Nitri 3.j. coquantur ad consumptionem: Pro vsu.

Vel excauato Cæpam magnâ, aut Squillam, aut Raphanum magnum, atque imple Oleis enarratis, vno vel pluribus, addendo etiam alia, & coquendo sub cineribus, illoq; vtere: quod in pomo Colocynthidis factum, potentius erit.

Mixturæ ex enarratis fiunt; qualis hæc est valde accommoda: quæ R. aquæ Vitæ 3.ij. in qua dissolue Camphoræ gr. ij. Olei spicæ gut. j. vel ij. vel aliorum oleorum chymicorum guttas, & si nimis efficax esset, dilue parum aqua Origani.

Alia mixtura ex oleis & succis: R. oleorum Nardini & de Origano eadem ratione factum ana 3.β. olei spicæ gut. ij. Aceti gut. vj. Album oui parum, agitentur optime, vt omnia confundantur, & fiat instar lactis: & cum vti volueris, rursus agitentur.

Vel sic, vt fiat instar vnguenti: R. olei de Castorij pingued. Anseris ana 3.j. Fellis vacchini 3.β. Castorio 3.β. resinæ Laricæ parum, misceantur: illinatur turanda & immittatur. Possunt & oleorum chymicorum guttæ aliquot, vt Gariophyl. vel Cimini quoque permisceri, eritq; efficacius.

Trochisci ad vsum asseruandi sic fieri possunt: R. radic. Hellebori 3.j. Cyclaminis 3.β. pulpæ Colocynth. 3.β. Croci 3.β. Nitri 3.j. Ladani 3.j. Euphorbij 3.β. Mosci gr. vj. contendantur & cum succo Porri excipiantur: siccantur. Dissoluatur vnus in Aceto vel succo aliquot vt Porri vel Raphani: ad vsum.

Suffitus in aures ante horum vsum intromissi, & postea quoque, plurimum iuvât, & ad intima vsque penetrant.

Qualis hic esse potest: R. rad. Helleb. 3.j. herb. Lauri, Maioranæ, Serpilli, Pulegij, Calaminthæ, Rutæ, Melissæ, Hysopi, Aborrani an. m. 3.β. Origani m. j. flor. Lauandulæ, Anthos an. p. j. baccarū Iuniperi & Lauri an. 3.β. sem. Cimini, Carui, Fœnic. an. 3.ij. conquassentur, adde pulpæ Colocynthidis 3.β. Nitri 3.j. fiat decoctio in Vino & Aceto. Excipiat vaporem vel fumum, factum extinctis in decocto lapidibus, per embotum, in aures.

Vel hoc, quod magis efficax est: R. ol. Nucum 3.ij. Aceti 3.j. Aquæ vitæ 3.β. Sulphur. 3.j. coquantur: & dum bullit, fumum excipiat.

Fomentari quineatiam auris potest supradicto decocto pro suffitu descripto. Vel spongia in eo intincta, dū calet, auribus adhiberi.

Panis ex fursure vel farina factus, & cum semine Carui subactus antequam coquitur, dein post leuem coctionem, dum calet adhuc, disruptus, & auri laboranti adhibitus, mirabiliter in sonu aurium iuvat.

Sacculus auribus in hosce vsus ex enarratis adhibetur. Ac puluinus auri affectæ noctu subijcitur. Et cucuphæ ea sede qua aurem tangit, talia insui poterunt.

Quæ sic fieri possunt: R. rad. Cyclaminis, Ireos, Azari ana 3.ij. herb. Calamenthi, Ocimi, Pulegij ana 3.j. Origani 3.ij. florum Lauandulæ, Stœchad. Anhos ana 3.j. feminum Carui 3.ij. Milij parum conquass. 3.ij. Spicæ nardi 3.β. Ligni aloës 3.j. Storacis 3.ij. Salis 3.ij. misceantur: impleatur sacculus, vel puluinus.


Tabula Cupressi vel Iuniperi calefacta, adhibita, prodest. Imprimis si Origani puluere prius conspergatur: secretumque mul-torum est remedium.

Conformationis vitio ab ortu, si auditus læsio processerit: siue sit in neruo, vnde surdi & muti plerumq; simul nascuntur: aut tympano, aut ossiculis illic positis: aut cavitatibus & cuniculis, variè istic deductis, malè formati aut constructis. Tunc irrita omnis illic, etsi varia acouistica remedia tententur, erit curatio.

Læsio tympani insignis, ab externa causa, vt vulnere, incurabilis. Et si ob eandem causam laxius nimiumve tensum fiat, ægrè ad naturalem statum reducitur. In laxato tamen nimium, auditum restituentia remedia etiâ competent. In astricto verò propter senium, aut post morbum laxantia. Quo nomine victus & viuendi rationem reficientem, & humectantem, in senibus & conualescentibus, vti aliàs, sic vel hoc nomine vtilem, imperamus. Atq; auribus lenientia, humectantia tepida infundimus. Qualia sunt: Lac tepidū mulieris præsertim, & olea temperata, Amygd. dulc. Butyrum, & similia.

*Audi-  
tu d se-  
flu ab  
intem-  
perie frigi-  
da, cuius  
est.* Ab intemperie frigida extrinsecus, ab æ-  
re vel aqua auribus noxam inferente, si au-  
ditus fiat imbecillitas, remedia quæ in frigi-  
da internâ causa competere diximus, hîc  
quoque auribus imposita, vel per suffitum  
intromissa, proderunt.

*Audi-  
tu defe-  
ctu nar-  
corum  
causa, cu  
ratio.* Quæ si à narcoticorum in aures immisso-  
rum usu hoc acciderit, locum similiter ha-  
beant, ea præcipuè quæ Acetum assumunt,  
quod narcoticorum vim infringere sæpius  
diximus, præcæteris seligentes.



## DE OLFACTVS LÆSIONE.

### CAPVT IX.

#### Genera.

*Olfactum  
defectum.*



**A**BOLETUR olfactus omninò,  
quando rerum non tantum di-  
stantium, sed & naribus admo-  
tarum, assumptarumq; odorem  
nullum penitus sentit.

Immpuitur verò saltem, cum nō nisi pro-  
pinqua admodū naribus, & quæ vehemen-  
tem odorem expirant, olfactus sentit. Quò  
& referri potest casus ille, cum res non nisi  
ori intrusas oderantur: quod aliquando ac-  
cidisse quidam scripsit, cum tamen hac via o-  
dor alioquin rerum ori ingestarum, natura-  
liter minimè percipiatur.

*Olfactus  
deprava-  
tio.*

Deprauatur olfactus, cum rerum odores  
non quales reuera sunt, sed aliter odoratas,  
falsò esse dijudicât; Vt cum quæ grato odore  
alioquin prædita sunt, ingratum odorem ex-  
pirare sentit. Vel quæ bene olent, foetere exi-  
stimat: quod plerumque gustu simul deprau-  
ato accidit, cum indicium assumptorum ex  
parte ad odoratum pertineat. Vel cum ali-  
menta & odore ingrata esse iudicantur. Huc  
autem quæ reuera foetida sunt, etsi olfactum  
offendant, uti neque dolorem ad tactum de-  
prauatum, cum id quod reuera sic se ha-

bet, rectè sentiat, minimè  
referimus.

#### Causa.

**I**N parte mandante, cerebro nimirum, ea-  
dem quæ & gustus & tactus sensus lædit, *Cerebri  
vitiol.  
factus  
defectus.* huius læsionis causa esse potest, sicuti illic  
explicatum fuit: quod & ex eo, quod hî sen-  
sus simul lædantur, cognoscitur.

In parte recipiente odorem, si causa læsio-  
nis olfactus consistat, cum ex pluribus con-  
stet, illa vel extra caluariam, in nasi cavitare,  
vnâ cū naso prominente & patente erit; vel  
profunda & abstrusa: aut intra caluariam, in  
foraminibus olfactus, & illius organo.

Prominentes nasi canales duo, quos na- *Obtura-  
tio nari-  
um, cau-  
sa olfa-  
ctus de-  
fectus.* res vocant, odorem extrinsecus haurientes,  
si compressis vtrinq; alis narium, vel adhibi-  
tis alijs, occludantur, sensum olfactus tanti-  
per auferunt. Quod quomodo casu fiat, cum  
noxâ quam tunc respirationi adfert, maior  
sit, quàm quæ olfactum tollit, illic explicabi-  
tur. Et quando studio & voluntate hoc fit,  
idque ne foetores externos olfaciamus, tunc  
pro vitio cum minimè habeatur, non neces-  
se est explicare. Vti & si præter nostram vo-  
luntatem, mucus vel tumor refertæ sint, nisi  
hoc in vtraque nare simul fiat, eaq; penitus  
obturentur, vnde olfactus impeditus esset  
(quod tamen vix fieri potest, ut illic tanta co-  
pia muci diutius hæere possit, & polypus v-  
nam tantum narem occupare soleat) quia  
inspirationi potius, quàm olfactui id incom-  
modat, eò etiam hæc causa erit referenda.

In profunda narium amplitudine, non ea,  
quæ à naribus transuersim ad palatum fer-  
tur (cum per illam odor, non solum qui ex-  
trinsecus occurrit, sed & qui ab illis, uti di-  
ctum, quæ ori induuntur, expirans ob trans-  
uersum hunc situm, arcetur, minimè ascen-  
dat, nec nisi alia aliqua accedat causa, perci-  
piatur) sed quæ proxima est caluariæ, ossi  
cribroso, & fungosis narium ossibus, si reple-  
tio ibi tanta, vel circa ossis cribrofi dicti fora-  
mina, talis obstructio fiat, quæ odorem re-  
rum, quo minus penetrare possit, impediat,  
olfactus defectus frequenter accidit.

Quod à pituita crassa, illuc ex cerebro ex-  
stillante, diutiusq; retenta, & mucosa sum-  
meq; viscida interdum facta, sæpè euenit, ol-  
factusq; eo nomine impeditur: & cum putre-  
scens



scens foetere incipit, aut aliena graui odore prædita materia permiscetur, deprauatur: donec excussa illa materia, quod vehementi emundatione, aliàs sternutatione efficitur, eo affectu liberentur.

Hoc à gypsea materia & tophacea; vel calculo in angustijs illis genito, aliquando accidisse, hæc tandem reiecta patefecerunt.

Et quod rarum est, vermem illic natum diuque retentum, & post multos annos, pilosum reiectum in mulierè Bernensi, huic vitio occasionem præbuisse, Medicus illius loci mihi significauit, iconemque illius vermis transmittit.

A pure id fieri quoque posse retento docent, verum nisi aliud quid accedat, vt ab vlcere callus aut excrescentia, pus tam diu retineri, aut crassescere adeò minimè potest.

Sed & his quibus nasi ossa, ea sede collapsa sunt, hic defectus nonnunquam accidit: Vele ex morbo exesis ossibus, vt in elephanticis, aut ozænà laborantibus: Vel casu & ictu in ea sede factis, & confusis ossibus. Quod ab ortu etiam nonnullis contingit, vt depresso naso circa radicem, non bene olfaciant.

*Oclusio foraminulorum olfactus organi, causa Olfactus defectus.*

Foraminula exigua olfactus, in crassæ meningis cerebri sede, quæ ossi cribroso similiter perforato obducta est, si humore aliquo impleatur, cum p ea nihil naturaliter, quam odor ferri debet, olfactui defectum adferunt.

Vti fit, cum tenuis pituita, vel serosa cerebri excrementa, ad hanc partem elatiorem in caluaria defluxa, & per angusta foramina transeuntia, & è naribus exstillantia, coryzam dictam procreant, tunc remanens aliqua huius materiei portio, in dictis foraminibus, eaque obstruens, olfactus, qui coryzam comitari, vel subsequi solet, defectum adfert. Quod & ab alia materia illic congesta posset contingere.

Sed & conformationis vitio ab ortu euenit, vt foraminibus hisce, tam in membrana, quam osse absentibus, & defectu naturæ ommissis, vel cæcis admodum existentibus, originale hoc homini, vt nihil olfaciat, sit vitium: sicuti è contra illos, quibus hæc ampliora contigerunt, qualia in canibus, qui odore præualent, esse videntur, acutiùs & rectiùs olfacere, credibile est.

*Repletio olfactus organi à pituita, causa Olfactus defectus.*

Olfactus organi seu nerui vitio, id quoque, accidere potest, si à tenui, vt iam dictum est, humore ad hæc foramina, quibus olfactus organum incumbit, defluente, nimium irrigetur, vel alterius humoris affluxu, vti de reliquis sensorijs organis seu neruis dictum est, prematur. Quod & ab ortu, quod vel illi desunt, vel situ & figura peccant, ex conformationis vitio illis potest contingere.

#### CURATIO.

**C**uratio pro diuersitate loci, primum vbi morbus illiusve causa latet, proponenda. Quam in cerebro, vel narium cauitatibus: aut olfactus foraminibus: aut organo, consistere docuimus.

Cerebri causa si fiat, tunc vt in reliquis sensibus, simili ratione, vnà cum olfactu læsis, explicatum fuit, hic succurrendum.

Narium cauitas patens abstrusaue, si muco, aut pituita crassa, viscosa oppleta vel obstruata sit, tunc, Expurgando si remoueri sic possit: vel Emugendo, eam sensim auferre tentabimus. Et Sternutatione, irritando facultatem expultricem potissimum, si ad excretionem iam preparata sit, excutere studebimus.

Immissis in nares, si non facile cedat, aut profunde lateant, quæ ea emollire, si dura, vel incidere, si crassa sint, vel abstergere, si pertinaciter hæreant, possint, & simul facultatem expultricem stimulent, vnde facilius postea, vt dictum, vel eximuntur, aut emunguntur, aut sternutatione excutuntur. Quod errhinis attractis; vel infusis in nares commodissimè efficiemus.

Emollientia errhina & abstergentia, ex Sero lactis, Hydromellite & similibus fiunt. Incidentia & abstergentia, ex Vino, Aceto, Lixiuio, & alijs eiusmodi parantur.

Abstergentia & stimulantia ex herbis nitrosis, amaris, & acribus alijsque, inter quæ Fel imprimis viscosa dissipat, fiunt: quorum omnium formæ variæ passim exponuntur.

Vaporè à decocto aliquo calido, pituitam incidente, & præparante, naribus excipiendo, eam ad faciliorem expulsionem præparamus. Qualia, quæ in auditus defectu auribus admissa, conuenire supra docuimus, hic etiam, illisq; similia, competere possunt.

Odore solo acrium, vt Sinapis, Raphani, materia illa aliquomodo inciditur, & ad excretionem concitatur. Et si vehementi odore prædita, tam grata, vt Moschū, Ambram: quam foetida, vt Castoriū, Assam foetidā, &c. sæpè olfacere iubeamus, non tantum pituitam incidemus & prouocabimus, sed facultatem olfaciendi, ob olfactus intermissiōnem, sopitam excitabimus, & in actum rursum revocabimus.

Quòd si corpus aliud tophaceum, aut calculosum, vel vivum, vt de verme dictum est, in cauitatibus illis lateat, quod rarum est, tunc quia vix coniectura assequi hoc valeamus, etiam remedia illis vix accommodare licebit. Et si adsint, locoq; cedere possint, iisdem quibus humorē crassum prouocari diximus, hæc etiam per sternutationem, cum admiratione nonnunquam, reijciuntur. Si vermem adesse ex eo, quòd prius talis cie-

tus fuerit, & nunc iterum eadem, quæ tunc antequam prodiret, appareant symptomata, conijciamus. amara, Fella, succos Absynthij & Aloës, &c. item Acetum, errhinis, vt illum enecemus, permiscebimus.


Olfactus foramina, & organum si pituita tenui molestata, coryzam cum olfactus defectu procreent, cura in illo symptomate quod grauius est, explicabitur: quomodo nimirum corpus expurgandum, & capitis ratio habenda, fluxusq; illi sistendi aliòve deriuandi sint.

Quòd si verò organicum sit ab ortu malum, emendari tunc minimè poterit, naturæque totum illud, quæ aliquando per se in magnis mutationibus illius, aliquid præstat, committendum. Vti & si ob nasum impressum, ab ortu, vel à morbis, aut ictu hoc fiat, figura hæc vitiata, corrigi nunquam poterit.

*Olfactus defectus à pituita organi auditus, curatio.*

*Olfactus defectus cōformas tionis vitiatio, curatio.*

### LIBRI PRIMI FINIS.



DE

## FVNCTIONVM LÆSIONIBVS,

### LIBER II.

#### MOTVVM LÆSIONES TRACTANS.



MOTVVM, quorum operationes sensibus deprehenduntur (de illis enim tantum functionibus agimus) alij sunt voluntarij, qui volūtate nostra fiunt, vel reguntur: alij inuoluntarij, qui sponte vi naturæ, non nostro arbitratu perficiuntur.

Voluntarij motus omnes sub sensu cadunt. Quorū alij peraguntur, dum pars de loco in locum mouetur, qui & à nostro solummodo arbitrio dependent: quod simpliciter Voluntarios vocamus. Alij fiūt aërem attrahendo & reddendo: idq; partim voluntario, partim inuoluntario motu, diciturq; Respirationis motus. Alij verò perficiuntur materiam aliquam assumendo, præsertim verò

excernēdo: vtroq; etiam motus modo, quos Excretionum motus appellamus. Vnde tria præcipua motuum læsionum exsurgent genera: voluntariorum, respirationum & excretionum. Quæ ipsorum noxæ ex accidenti nonnunquam fiunt: idq; vel ob sensuum internorum læsionem illam, quæ & motus hi simul offendantur: de quibus iam in sensuum internorum læsionibus dictum est. Vel ob vitalis motus cessationem, vnde & hos quiescere necesse est, vel illius imminutis debilitari: de quibus in vitalis motus defectu tractabitur. Aliàs verò non dictarum læsionum causâ, sed per se hi motus læduntur: sicuti nunc in tribus hisce generibus ostendemus.

Voluntarij simpliciter dicti motus, membrorum sunt externorum corporis; illique vel validissimi, illarum partium, quæ ossibus firmatae, validius eos sustinere possunt: quales sunt, corpus dorsi beneficio, & cum illo caput flectere, vel erigere: brachijs illiusq; manibus & digitis res apprehendere tractareq;: cruribus & pedibus stare vel incedere: mandibulâ, (quæ sola in capite ossibus firmata, motus robustissimos edit) mordicis res assumere, dentibusq; diuidere. Debiliores hisce sunt, qui membris carnis & membraneis in facie positis tantum perficiuntur: vt sunt, os seu labia, palpebras seu oculos, aperire & claudere: oculos item mouere. Quorum motuum læsionum duæ præcipue occurrunt differentiae: quod vel deficient, vel deprauantur.

Deficiunt voluntarij motus, cum per se debilitantur, vel abolentur. Nam ex accidenti quoque, quando ob dolorem partus, motus illius, eo quod dolorem exacerbat, omittitur, improprie tamen, moueri non posse dicitur: qui casus ad dolores, vbi & explicabitur, referendus.

Motus  
debilitatus.

Debilitantur autem motus voluntarij, validiores præsertim, quando cum imbecillitate quadam fiunt: in varijs illius generibus: quæ sunt *Pigritia, Defatigatio post labores. Lassitudo spontanea*: quæ simul explicabimus in MOTVS DEBILITATE CAPITE I.

Motus  
impotentia.

Abolentur motus voluntarij, tam validi quam debiliores, cum omnino non, vel saltem non quantum opus erat, perficiuntur: vti in diuersis illius generibus fieri solet: quorum præcipua ex illis sunt, *Paralysis, Spasmus, Contractio, illorumq; diuersæ species, vt Spasmus flatulentus, Trismus, Oris tortura, Cynicus spasmus, Gibbus, Strabismus, &c.* de quibus simul agemus, sub titulo de MOTVS IMPOTENTIA, CAP. II.

Motus  
deprauatus.

Deprauantur voluntarij motus, validiores imprimis, sed cum illis etiam debiliores, cum non recte, aut nimium quam par erat, procedunt: sicuti in aliquot illius generibus euenit: quæ sunt præsertim, *Inquietudo, Tremor, Palpitatio, Rigor, Horror, Pandiculatio, Oscitatio, Nictatio*: quæ tractabuntur in MOTVS DEPRAVATO, CAP. III.

Respirationis motus omnes quoque sensibus patent, & diuersis organis thoracis, colli & faucium perficiuntur: idque duobus modis, inspirando & expirando aërem: quæ motum voluntate nostra intermittere nequimus, cum eum natura molitur: vnde Respiratio naturalis vocabitur. Alter expirando aërem tantum obitur, cum sono, quem cum voluntate nostra omittere possumus: Expiratio voluntaria dici potest, vel quia vocem edit, Expiratio vocalis: quæ duplex quoque; quatenus vocem simpliciter profert. Vox dicitur: quatenus verò vocem articulatam facit, Loquela: Quæ tria, respiratio vox & loquela, in eo variant, quod vel deficient vel deprauantur.

Deficiunt, cum non, aut non sufficienter fiunt: in multis illius generibus: quæ sunt *Strangulatio, Suffocatio, Dyspnaea, Asthma, Verru-  
suffocatio, Incubus, Vocis & Loquela defectus, Balbuties*: quæ simul describemus in RESPIRATIONIS DEFECTU, CAP. IV.

Deprauantur, cum vel non naturaliter, aut violenter fiunt: in varijs generibus: vt *Citare respiratio, Suspirium, Oscitatio, Singultus, Sternutatio, Tussis, Raucedo*: quæ explicabuntur in RESPIRATIONE PRAVA, CAP. V.

Excretionum motus (sub quibus non tantum eos quando aliquid e corpore excernitur, sed & in corpus immittitur, comprehendimus) qui à ductibus corporis, ad illud destinatis, naturaliter perficiuntur, sub sensum cadentes, & voluntate nostra fiunt vel saltè reguntur, sunt, transitus per gulam: deiectio: mictio: partus. Qui motus quatenus functiones sunt corporis, deficient nonnunquam: quando non fiunt, aut non quantum conueniebat: interdum deprauantur, quando non retinentur ad destinatum tempus: quod fit, quando intempestiua fit excretio, vel nimia, sed quia in omnibus aliquid reijcitur, in reiectis omnes eiusmodi excretiones naturales cum præternaturalibus describemus. Hic autem de illis, quatenus hæ functiones deficient, vel non obeuntur, tractabimus.

Transitus per gulam seu œsophagum, v-  
nus est: qui fit naturaliter introrsum, in de-  
tus per

*gulam  
defectus.*

glutione: alter verò coactè extrorsum, per vomitionem: de vtriusque defectus generibus: nempe *Transglutiendi, & Vomendi difficultate*, agemus in TRANSITVS PER GV-LAM DEFECTV, CAP. VI.

*Deiectionis  
defectus.*

Deiectionis, quæ partim natura partim voluntate obitur, defectus vnum genus, scilicet *Alui constipatio*, explicabitur in DEIECTIONIS DEFECTV, CAP. VII.

*Mictionis  
defectus.*

Mictionis, quam partim voluntas & potissimum, adiuuante tamen naturâ, efficit, defectus qui sunt *Ischuria, Dysuria*, describuntur in MITIONIS DEFECTV, CAP. VIII.

*Partus  
defectus.*

Pariendi, qui motus naturæ vi, adiuuante voluntate nostra fit, defectus duo genera; quæ sunt, *Pariendi difficultas, & Partus imperfectus*, explicabuntur in PARTVS DEFECTV, CAP. IX.

Inuoluntarij motus, non omnes sed aliqui tantum sensibus sunt conspicui. Quos natura sola, vel ad vitæ conseruationem molitur, Vitales dicti motus: vel ad nutritionem, Nutritionis motus appellantur, vel ad propagationem generis, & Generationis motus nominantur. Vnde & tria motuum inuoluntariorum læsionum prodeunt genera: vitalium scilicet, nutritionis & generationis.

Vitales motus in viribus nostris. & motu cordis pulsusq; arteriarum se manifestant: Qui in eo quod vel deficient vel deprauantur, læduntur.

*Vitalis  
motus de  
fectus.*

Deficiunt cum hæc abolentur vel imminuuntur: in sequentibus generibus. *Virium lapsu, Animæ defectu, Agone mortis*; quæ simul explicabimus, in VITALIS MOTVS DEFECTV, CAP. X.

*Vitalis  
motus de  
prauata.*

Deprauantur cum nimium aut sinistrè fiunt motus cordis & pulsuum: in duobus hisce generibus *Cordis motu & pulsu deprauato, Cordis palpitatione*; de quibus agemus in VITALI MOTV DEPRAVATO, CAP. XI.

Nutritionis seu qui nutritionis causa fiunt motus quatuor, attractrix nimirum, retentrix, concoctrix, & expultrix, non omnes sensibus possunt percipi, neque enim quomodo retentrix aut concoctrix agat, senti-

mus, aut quando læduntur, ex propria illius motus læsione, sed alijs quæ inde sequuntur, cognoscimus: sed in attractione motum illius, quando natura cibum & potum appetit, manifestè experimur: & in excretionem quando natura aliquid vi propriâ, è corpore expellit, sicuti in alijs excretionibus; in quibus voluntas nostra illi suppetias fert, motum ipsius apertè obseruamus. Vnde læsionum motuum nutritionis sub sensum cadentium, duo tantum occurrunt genera, Appetentiæ & Excretionum.

Appetentiæ motus in cibi potusq; desiderio læduntur, cum deficient vel deprauantur.

Deficit appetentia, cum nullius vel exiguus est horum appetitus: de quibus vitijs, quæ præcipue sunt *Anorexia, Nausea, Apostria, Fastidium certorum ciborum*, agemus in APPETITVS DEFECTV, CAP. XII.

Deprauatur appetitus, cum vel nimium vel illud quod conueniens non est, appetit: de quorum generibus, quæ sunt *Boulimos, Canina appetentia, Sitis immodica, Pica*, tractabimus in APPETITV DEPRAVATO, CAP. XIII.

Excretionum quas natura sola perficit, necessariorum, nutritioni inferuentium motuum manifestorum: alius est sanguinis, alius verò feri, alius lactis. Quorum trium humorum excretionum generum læsiones in eo consistunt: quod vel deficient, cum non fiunt, vel non sufficienter: vel deprauantur, cum immoderatè, aut intempestiue fiunt: in quibus duobus cum semper aliquid effluat, in excretis, eiusmodi excretiones deprauatas, vnâ cum reliquis omnibus tam naturalium, quam præternaturalium, quæ non defectu, sed quod fiunt etiam, quocumq; modo id fiat, peccant, excretionum læsionibus, explicabimus. Hic autem quatenus hæ functiones deficient, de illis agemus.

Sanguinis naturalis effluxus cessatio & diminutio, quorum genera sunt *Mensium & rhaia Hemorrhoidum suppressio, Purgationis post partum defectus, vti & Hemorrhagiarum aliarum eius*, tractabuntur in HÆMORRHAGIÆ NATVRALIS DEFECTV, CAP. XIV.

Seri exudationis defectus vnum genus, Sudoris defectum, expli-

*Appetitus de-  
fectus.*

*Appetitus de-  
prauat.*

*Hæmorrhagiarum  
defectus.*



explicabitur in **SVDORIS DEFECTV**,  
CAP. XV.

*Lacta-  
tionis de  
fectus.* Lactis deficientiæ genus vnum; explica-  
bitur in **LACTATIONIS DEFE-**  
**CTV**, CAP. XVI.

Generationis, seu qui procreationis cau-  
sâ sunt motus inuoluntarij, quorum læsio-  
nes conspicuæ sunt versantur circa actum  
venereum, & conceptionem tantum: nam  
de partu, cum voluntas illum adiuvet, iam  
prius est dictum.

Actus venereus, qui motu naturæ appe-  
tente, & membra ad illum exercendum, a-  
pta reddente, semenq; excernente, perfici-  
tur in vtriusq; tam mare quam feminâ, aliàs  
deficit, aliàs deprauatur.

*Actus  
venerei  
defectus.* Deficit interdum ita, vt obiri nequeat in  
*Impotentia, Languiditate, venere Imperfecta, vel*  
*Impedita, aut Extincta:* de quibus agemus  
in **VENEREI ACTVS DEFECTV**,  
CAP. XVII.

*Salaci-  
tas.* Deprauatur, cum eum nimium appetunt:  
in *Lasciuiâ, Furore venereo, Priapismo*, de qui-  
bus in **SALACITATE** tractabitur, CAP.  
XVIII.

Conceptio, quæ naturæ motu semen at-  
trahente, retinente & formante, peragitur,  
in muliere tantum deficit, vel deprauatur.

*Conce-  
ptus de-  
fectus.* Deficit, quando non fit, vt in *Sterilitate*: vel  
non vt volumus, in *Mares vel Feminas procrea-  
di defectu*: de quibus agemus in **CONCE-**  
**PTVS DEFECTV**, CAP. XIX.

Deprauatur quando malè fit: qui affe-  
ctus, cum vix cognosci possit, nec sub sensus  
cadat, donec illud quod malè conceptum e-  
rat, rejiciatur: in reiectis potius de eo, vnâ  
cum abortu, & cæteris excretis, agemus.

~~~~~

DE MOTVS DE- BILITATE.

CAPVT I.

Genera.



MOTVS debilitatem vocamus,
quando motus voluntarios cor-
poris, atque inter hos validio-
res præsertim qui vt perficiantur

robore opus habent, vel pigre, vel tar-
dè, vel ægrè, & cum molestia aliqua exer-
cent: nam si aliâ ratione defectus illis acci-
dat, vt non sufficienter obeantur, licet non
omnino sed fere aboleantur, cum ab eadem
quoq; causa, vnde immobilitatem accidere
dicemus, accidunt, illic explicabuntur. Hæc
autem de qua hic agimus: vel consueta est
pigritia: vel post labores superueniens de-
fatigatio: vel spontanea morbos præcedens
lassitudo.

Pigritia, segnitie, tarditas, ignauia, ad ali-
quid agendum, imbecillioribus, vel à natu-
ra, toto vitæ tempore: vel ratione ætatis, in-
fantibus & senibus: vel post morbum con-
ualefcentibus, aliquandiu vel semper postea
consueta est. Et robustioribus alioquin,
quoq; propter otium, quo magis delectan-
tur & pigrifici assuescunt, familiaris existit.
Qui omnes vix grauioribus labores sustinere,
nec diu in illis oboeundis perseverare pos-
sunt: quieti & somno potius intenti.

Lassitudo post labores seu defatigatio, fa-
cit vt non tantum ad eosdè quos prius sub-
ierunt labores, & alios etiâ suscipiendos ine-
pti sint, sed & molestiâ non tantum quando
aliquid agunt, sed & cum quiescunt adhuc a-
liquandiu remanentè sentiant, stuporis ni-
mirum illi in mèbris nimium agitatæ sen-
sum, quem fornicatione vocant: & tensione
quandâ, ac si illa arida seu assecta potius ef-
sent, ideoq; ægrè & cum molestia fluctuantur
aut extenduntur: vnde squalidam lassitudi-
nem eam alicubi Galen. vocauit: Aut si caco-
chymici sint, sensum illi dolorificum, de quo
mox in spontanea lassitudine dicemus, per-
cipiunt. Hæc prout vniuersum corpus par-
tesve illius validè exercitatæ fuerunt, plus
minusve se exerit. Cum aliquâdo totum illud
ex defatigatione adeo prosternatur, vt & in
quiete vel etiâ decubitu, cū & in eo per mu-
sculos membrorum aliqua attractio vel exten-
sio fiat, lassitudo non penitus cesset: vnde no-
cturnum corpus volutare variè, vt situm aptum cor-
pori, quo quiescere & dormire comode pos-
sint, inueniant, coguntur. Interdum verò
certæ partes, quæ laborem sustinent, eum
tantum sentiunt: vt pedes post itineratione
longam: brachia post ictus diu continuatos:
manus

*Pigri-
tia.*

*Defatis
gatio
post la-
bores.*

manus non tantum post validiores motus, sed & vt sæpè expertus sum; diu multumq; scribendo: sicuti & mandibulam multum loquendo defatigari posse obseruau. Debiliores etiam palpebrarum, labiorum, oculorū motus, defatigari, vel hoc ostendit, quod lassis palpebræ ægrè attollantur, somnolentiæ & defatigationis certum indicium.

Lassitudo spontanea. Lassitudo spontanea, hoc est, non à labore profecto, sed spontè eueniens, qualè morbos minari vel præcedere, docet Hippoc. eū sensu quodam doloris se in membris manifestat. Qui vel in superficie cutis, & subiectæ carnis sese offerens, contactu exacerbatur, sensum aliquem exprimens in partibus; eumq; vel vlceris, diciturq; Vicerofa, elcodis lassitudo. Vel inflammationis, vocaturq; Inflammatoria, phlegmonodis lassitudo. Alij sensum illum dolorificum, in profundo sentiunt: idq; vel circa articulos, ac si tensi essent, quia ægrè mouentur, vocaturq; Tensiuæ, tonodis lassitudo. Vel circa ipsa ossa ac si contunderentur, Contundens lassitudo, quam Gal. ostiocopum nominauit. Sed & plures horum sensuum molestorum species simul occurrentes, lassitudini huic copulantur.

Causa.

Causa omnis mouendi debilitatis est, aut viriū imbecillitas; vel nimia motus seu exercitij intermissio, seu ocium: aut exercitatio seu labor: vel humorum copia.

Imbecillitas, causa motus debilitatis. In imbecillitate, vti omnes functiones labefactantur, ita præsertim motus voluntarius, cum ad ipsum edendum maior vis requiratur. Accidit autem hæc ob caloris natui defectum, vel ætatis causa in senibus succedentem, qui proin pigri sunt, & mox defatigantur: Vel à causa morbifica prodeūtem, vt post nimias euacuationes: Vel à morbo profectum, ob diuturnitatem illius, vel acutiem, vel malignitatem vires prosterrente, remanente etiam in conualescentibus à morbo adhuc imbecillitate illa aliquandiu: vel semper, quando ex morbo senium, vt vocant, contraxerunt.

Ocium, causa pigræ. Qui otio, vel ex consuetudine peruersa, nimium indulgent; vel corporis mole vel

plenitudine impediti, minùs exercentur; ad labores vel leuiore subeundos pigri sunt, statimq; lassantur.

Labor, causa defatigationis. Labore seu exercitio, cum diuturniore tum validiore quàm singulis naturis conueniat, corpus & pigrum & lassum fit. Cum enim quod alternà requie caret durabile non fit, accidit, vt qui longius quàm par est exercentur; aut qui iter longum conficiunt: & tota die laborant, lasi fiant. Ita etiam, si validum & vehemens opus, in quo faciendo, robore, vel velocitate opus est, diutius peragant, defatigantur. Idq; quia tenduntur muscoli, nerui & tendines, cum membra flectuntur, extenduntur & circumducuntur articuli, tuncq; etiam quando quiescunt, similis manet sensus & affectio, qualis per motum fieri solebat, tensiuæq; sentitur lassitudo. Dein & quia incallescunt membra motu, lassæ fiunt: sic enim consumptio quædam fit humoris viscidii, quo ad motum faciliorem edendum articuli illinuntur: non adipis (quo articuli penitus destituuntur) vti voluerunt, colliquatio: quo humore consumpro, tanquam arida facta membra difficilius flectunt, eaquetendi veluti videntur. Ob calorem quoque illum, motu in membris suscitatum, sanguis in extimam carnem & cutem prouocatus, inflammationis sensum illic mouet: Vel si acris sit & tenuis, vlceris sensum aliquem præbet: Vel si crudior, saltem grauat & tendit.

Humorum copia si oneretur corpus, non tantum cum laborat statim defatigatur, sed & sine exercitio, spontaneâ dista lassitudine infestatur, quæ & morbos ex illa humorum redundantia mox sequuturos prænunciat. Ita in plethora sanguinis, tensiuæ & inflammatoria sentitur lassitudo. Et in cacochymia humorum bilioforum, acrium, falso-rum, vicerofa. In crudorum, frigidorum, contundens & grauans.

Curatio.

IN curatione defatigationis post labores facta, non adeo laborandum, cum spontè ad se redeant. Sed in spontanea, quia morborum est prænuncia, non tam ad corrigendam lassitudinem, quàm ne morbi sequantur,

*Pigritiei
& lassitudinis
post labores
facti et spō
tanea, &
quacūq;
causa, e-
menda-
tio.*

tur, prospicere oportet. Pigritia, quia corpus enervat & languidum facit, non est tolleranda: quæ à caloris nativi penuria oritur, vix, aut nunquam tollitur. Ad quorum tamen omnium emendationem, utimur vel restoratione virium, per quietem; exercitia; victus rationem; balneum; aliasve applicationes vel evacuationes.

Quies defatigationem post labores sanat, cessante tunc labore. Maxime verò per somnum facta, cum per eam melius membra quiescant: idq; potissimum si eo situ collocentur, & formâ quæ media dicitur, musculis omnibus relaxatis, ita ut nullam vim patiantur, siue curua, siue recta, singulis tamen membris competens sit figura: sed & cum per somnum humores, per motum nimium prouocati, discutiantur, idèd melius lassâ corpora, hac ratione refocillantur.

Exercitium, ab otio pigritiam natam corrigit; si illo, quod ijs maxime iucundum est, vel necessarium ad vitæ sustentationem, corpus exercere consuecant. Imbecilliores, vel qui ob molem corporis vehemētiorem, non possunt perferre negotia, vel exercitia, leuioribus, quæ vel ipsi obeunt, vel quibus ab alijs exercentur, ut frictionibus, ad labores tollerandos, aptiores fiunt. A labore quoque vehementi contractam defatigationem emendat; si mitius sit priore: si enim melius quam omnimoda quies, lassâ corpora ad requiem reducit, cum omnis subita mutatio obfit: uti sit eundo, deambulando post cursum, aliaque validiora opera, potius quam sedendo. Ita & lassitudinem tollere inquit Galen. si hesternæ par postridie adhibeatur. Contrarius etiam priori motui, defatigata reficit corpora: ut si quis montem scandendo lassus fiat, descendendo rursus, citius leuabitur. Dein & quia discutit exercitium leuius humores, à vehemētiore euocatos, eo nomine quoque dolorificas lassitudines sanat. Quo nomine frictione veteres non tantum corpora ante labores, quos sanitatis plerumq; causâ subibant, ad partes laxandas, & excrementa fundenda disponebant, quam Præparatoriam vocabant; sed & post labores, ad partes magis laxandas, excrementaq; attracta repurganda, denuò eam

adhibebant, eamq; Apotherapiam appellabant: fiebatq; leuis frictio, per quam corpus leuiter incalefcebat, ad soluendum & laxandum, quam mollem & paucam vocabant: vel fortior, in qua pars amplius accendebatur & dilatabatur, quam duram & multam appellabant: hancque minuere, illam constringere asserebant: vel mediocris, quæ & qualitate & quantitate & viribus media inter hæc erat. Cui manuum operi, inunctionem simul, ut melius illud perficeretur ex oleo Communi, vel Sabine adhibebant: cuius loco nos Chamomelinum vel Amygdalarum oleum, sumere possumus.

Balneum humidum & calidum frictionis vsum præstare potest, nostroque seculo magis consuetum est: siue maior corporis pars, vel partes lassæ tantum in eo, ut pedes post cursum, mergantur, quod mirè lassâ corpora reficit: calore actuali moderato, vel magis minusve aucto, uti frictio resoluens, humores prouocans, astrictasque partes relaxans. Quod ex Aqua simplici paratur: cui interdum Malua, Chamomilla, Betonica, Hyssopus, Origanum, Pulegium, Salvia, Chamæpithys, Artemisia, aliaque ad vires augendas incoquantur. Post cuius vsum inunctio, uti in frictione, conuenit.

Applicationes aliæ: ut Inunctio per se, siue balneo administrata: per spinæ præsertim longitudinem, vel partes defatigatas facta, lassitudinem, uti & frictio & balneum, sola potest mitigare: leuius tamen, cum minor inunctione fiat frictio, calorque actualis in vnguento minor sit, Artemisiam cum Axungia, pedibus applicatam, fatigationem ab itinere tollere docet Diosc. Et si Artemisiam secum gestet viator, non defatigari iter faciendo, aliqui docent. Idem accidere si axungia Anseris pedes vngantur, aliqui pro comperto referunt.

Cibus & potus reficiens, corpora lassâ egregiè reficit, idq; præsertim vini exhibitio: quod lassos vegetos reddit & recreat. Imbecilliores quoq; ad omnes operationes seniores, hisce rebus aliquod assument.

Euacuatio in spontanea lassitudine ab humorum copia progressa, eos auferendo, illam tollit, & ne corpora in morbos incidunt, præ-

cavet: quod sanguinis educatione in pletho-
ra, & purgantibus in cacochymicis corpo-
ribus, redundantiae excrementorū accom-
modatis, præstabitur.

~~~~~

## DE MOTVS IM- POTENTIA.

### CAPVT II.

#### Genera.



**M**OTVS impotentiam, quam & Immobilitatem vocare possu-  
mus, appellamus, quando mo-  
tus illos qui voluntate nostra fo-  
a sunt, vel omnino non, aut non sufficien-  
ter possunt perficere. Qui cum multi & varij  
in corpore occurrat, multa quoq; & diuersa  
immobilitatis se offerunt genera. Qualia  
sunt, in validiorum motuum defectu, non,  
aut difficulter posse se erigere aut flectere: sta-  
re vel incedere: apprehendere & res tracta-  
re: mordicus res sumere, & dentibus com-  
minuere. Ex debiliorum verò motuum de-  
fectu; non posse aperire aut claudere os vel  
labra: oculos vel palpebras: aut circumdu-  
cere oculos. Quæ primùm in eo potissimùm  
differunt: quod in eiusmodi immobilitati-  
bus; Alias membrum quod moueri debe-  
bat, relaxatum & languidum est: diciturque  
Paralysis, resolutio, quæ veluti particularis  
est apoplexia, quando citra apparentem læ-  
sionem id fit: si verò cum læsione, prout illa  
est, nunc fractura, nunc luxatio, nunc vulnus  
appellatur. Alias verò membrum attractum  
est, seu convulsus aliquandiu: tuncq; dici-  
tur vel Spasmus, seu convulsio particularis,  
ad differetiam generalis convulsionis, quam  
epilepsiam & catalepsim vocauimus, quo-  
rum spasmus hic propriè dictus, pars est: cum  
spasmus impropriè quoq; dicatur ille, quem  
Germani Krampf Arabes Alzuzen vocant,  
cuius tamen longè alia est causa, quam veri  
spasmi, vnde & hic convulsus appellatur.  
Alias verò cum membrum attractum est,  
Contractio tantum nominatur, perseverans  
quædam membri alicuius rigiditas. Præ-  
terea Gibbus si in dorso fiat, dicitur. Quæ

nomina posthac hoc significatu vsurpabi-  
mus. Hisce autem immobilitatis generibus,  
alias plures simul motus deficiunt: alias si-  
gillatim duntaxat aliqui.

Simul plures ex enarratis motibus inter-  
dum tolluntur in Paralyfi, generali ob id di-  
ctâ: resolutis, languidis & impotentibus sine  
dolore membris, quæ hosce motus edere de-  
bebant: sicuti quomodo hoc in singulis mo-  
tibus fiat, in particularibus resolutionibus  
ostendemus. Quod interdum in vtriusq; late-  
ris membris illorumq; motibus accidit: quæ  
species paralyseos Paraplegia dicitur. Non-  
nunquam verò hoc in vno tantum latere dex-  
tro vel sinistro contingit: quam speciem He-  
miplegiam vocant: in qua tamen frequen-  
tius hoc euenit, vt resolutio corporis trunci  
alterutro latere, illiusque motibus abolitis,  
motus reliquarum partium in facie posita-  
rum, salui & integri remaneant: interdum  
aliqui tantum detrimentum accipiant: vti  
motus labiorum. Sed & prædictis motuum  
voluntariorum immobilitatibus, reliqui mo-  
tuum respirationis & excretionum defectus  
aliqui, vti suis locis explicabuntur, accedunt  
interdum. Inter quos loquela sæpenumerò  
deficit. Sed & contingit vt & vox & respira-  
tio simul labem patiantur: vt cum clare ali-  
quid effari volunt, vel validam exspiratio-  
nem, clamando, ridendo, plorando, tussien-  
do, edere, vehementer angantur, & in suffo-  
cationis versentur periculo. Hisce accedit  
nonnunquam, vt mictionem retinere ne-  
queant, aliasq; excretiones profundant.

Verum & præter hosce motuum defectus,  
sensus tactus in membris resolutis aboletur.  
Nonnunquam is quoq; remanet, cum motus  
potius quam sensus, paralysis sit symptoma.  
In alijs verò stupor potius cum sensu formica-  
tionis, vel caloris aut frigoris, vt in stupore  
dictum fuit, deprehenditur. In peculiari, sed  
nostris temporibus perfrequenti paralyfi, quæ  
colicos sequitur dolores, præter resolutionem  
quarundam partium, quæ cum tremore mem-  
bri sæpe incipere & perseverare solet, dolor  
gravis & atrox membra resoluta insuper ex-  
acer: quæ paralysis in convulsiones plerumq;  
abire solet, hominemq; iugulare.

Omnes ex voluntarijs motibus simul abo-  
leri,

Immobili-  
tas plu-  
rium si-  
mul par-  
tium, seu  
genera-  
lis.  
Paraly-  
sis seu re-  
solutio.  
Immobili-  
tatis ge-  
neralis  
species.

Spasmus



*seu Con-*leri, membraque omnia conuelli seu potius  
*uulso* rigere & veluti congelari posse, in spasmo di-  
*particu-*cto, sicuti in epilepsia vel catalepsi, aliqui vo-  
*laris, Im-*luerunt, ita vt ab illis, catalepsi præsertim,  
*mobilita-*non aliter differat, quàm quòd hic, quia se-  
*vis gene-*cus ac in illis sensus remanent, atroces dolo-  
*ralis spe-*res in membris sentiant: quem affectum Cel-  
*cies.*sus tetanon vel rigorem vocauit, Galenusq;

*Tetanus* seu Ri-  
*gor, Spas-*  
*mi spec-*  
*ies.*inter peracutos, quòd quatuor dierum spa-  
tio hominem enecet, affectus retulit, rarum-  
que eum admodum esse prodidit, cum cau-  
sam quæ eum excitat, non nisi magnam, vt  
ait, quæ tam graues dolores pariat, vel ad-  
mirandam, quod non potius veram epilep-  
siam aut catalepsim causet, esse oporteat.

Frequentius tamen fit, vt spasmus non om-  
nes, sed aliquas tantum partes, quas alio-  
quin, vt dicitur, sigillatim exercere solet, si-  
mulinuadat, & in dorso & artubus, & faciei  
aliquibus partibus sentiatur: aliquando quo-  
quo loquelæ & voci, eadem ratione, vt para-  
lysis, resolutione, sic hic contractione, in-  
commodet. Quæ certè particulares pluribus  
in locis se manifestantes convulsiones, mox  
subsecuturæ generalis convulsioni seu epi-  
lepsiæ sunt prænuntiæ, & veluti præludia, non-  
nunquam & initia, aliquando verò post epi-  
lepsiæ paroxysmum prægressum, illo soluto,  
remanentes reliquæ: sicuti in epilepsia hoc  
dictum fuit. Sed & vidimus in quodam spa-  
smum quendam membrorum ad annos vi-  
ginti perseverantem, nunc nonnihil remit-  
tentem; nunc dorsum, pedes, brachia, con-  
trahentem, doloreque insuper discurrente,  
ægrum mirè affligere; ita vt ex leui conta-  
ctu alicuius rei exclamaret, dolorque eo in  
loco incipiens, maculaque lutea, quæ mox  
nascebat se prodens, nunc in extremos  
digitos, nunc nasi apicem aliasque extimas  
fedes, quarum contactu exclamabat, veluti au-  
ra discurreret. Verum & spasmus ille quem  
flatulentum vocant, plures partes simul sæ-  
pè infestare solet, certisq; hominibus per pa-  
roxysmos molestus esse, qui à verò spasmo  
non adeò & causa & periculo differt.

*Spasmus*  
*flatulen-*  
*tum.* Separatim motus voluntarij etiam non-  
*Crampsi* nunquam deficere possunt, resolutis vel con-  
*Germ.* vulsis vel contractis, aut alio modo læsis il-  
*Spasmi* lorum partibus: sicuti hæc nunc in singulis,  
*species.*  
*Immobis*  
*litas pri-*  
*uatarum*  
*partium*  
*seu par-*

qua ratione hoc contingere possit, exposi-  
turi, varia motus impotentiaè particulari sta-  
tuemus genera.

Erectio vel flexio corporis nonnunquam  
perfici nequit, resolutio dorso: quod vix sepa-  
ratim hisce dorso motibus, sed alijs aliquot  
simul sublati, vt in generali paralyfi dictum,  
euenit. Ex spasmo hoc in dorso nonnunquã  
accidit, vt conuellatur, sicuti integris sensi-  
bus hoc modo eum diu sursum è lecto incur-  
uare, sursumq; relaxando lectum percutere,  
aliquoties vidimus. Quod & ex contractu-  
ne sine spasmo euenire potest: Primum in  
genere, vt flecti nequeat, corpusque rigidum  
& erectum in Tetano seu rigore vocato, ma-  
neat (quod nomen etsi convulso dorso tan-  
tum accommodent, nos tamen si ex contra-  
ctione fiat, illi accommodare quoque possu-  
mus) vel vt erigi non possit, corporeque in-  
curuato incedant, & vel in anteriora in Epi-  
stotono, vel in posteriora in Opistotono ap-  
pellatis, aut latus alterutrum inclinet. Parte  
tantum quoque aliqua dorso contracta, illius  
motus alicubi sistitur: vel retrorsum dorso  
parte aliqua protuberante, in Gibbo appel-  
lato: vel in latera: aut quod rarius euenit an-  
trorsum inflexo: idque in singulis plus mi-  
nusve, & maiore minoreve illius portione  
eò delatâ: vnde corpus erigere nequeunt, il-  
ludq; breue, incurvum, cum thoracis incon-  
cinna figura, ostentant: pectore præsertim  
admodum prominente, & dorso impresso:  
capiteq; retrorsum inclinante, si dorsum ad  
anteriora curuatum sit. Sed & alio modo  
dorsum immobile, illo per contusionem seu  
vulnus motum amittente, apparet.

Incessus & statio, apprehensio rerum, ea-  
rundemq; tractatio peragi interdum mini-  
mè possunt. Idq; frequenter resolutis cruri-  
bus, brachijs, præcipuè verò manibus, pedi-  
bus, ipsorumque digitis, separatim, aut plu-  
ribus simul motibus, vt in generali paralyfi  
ostensum fuit, sublati: & tunc pars vna plu-  
resve sic affectæ languent, pendulæque sunt,  
nec nisi sanæ partis adminiculo, loco moue-  
ri possunt: & quia otiosæ sunt, frigide & mol-  
les contactu deprehenduntur: interdum &  
insensiles vel stupidæ, diuersimodè, vt supra  
dictum fuit. Motus quoque aliqui ex ijs per

*ticularis*  
*Paraly-*  
*sis Spas-*  
*mus, con-*  
*tractio.*  
*Erigendi*  
*& flecten-*  
*di corpo-*  
*ris impo-*  
*tentia.*

*Tetanos,*  
*Episto-*  
*tonos, O-*  
*pistoto-*  
*nos, Con-*  
*tractio-*  
*nis spe-*  
*cies.*

*Gibbus,*  
*Contra-*  
*ctionis*  
*species.*

*Inceden-*  
*di & ap-*  
*prehen-*  
*dendi Im-*  
*potentia.*

spasmodum nonnunquam impediti sunt, certæque ipsos efficientes partes, vel plures vel pauciores eo molestantur: nō tantum eo qui flatulentus dicitur, qui adeo frequenter digitos pedis, interdum & alias partes summo cruciatu conuellit: sed & veri spasmi rudimenta quædam, eadem ratione uti flatulentus, molestiam hisce locis pariunt: qualem à sumpto pharmaco violento, aliquando se manifestare, in epilepsiæ causis diximus. Sed & motus qui artubus obeuntur, cessant, si hæ partes, quod separatim ferè si fit, vni alicui contingere solet, contractæ subsistant: unde incuruæ, flexæ, vel rigidæ apparent. Quod in pedibus & manibus ipsorumque digitis permanens, & frequens est malum, in illis: quos Contractos, vulgus vocat, licet & his partibus resolutis, sic eos appellare soleant. Sed fit quoque, ut manus, circa carpum resolutæ & pendulæ in digitis astrictæ & contractæ sint: accedente atrophia in super manuum, maxime inter pollicem & indicem, absumpta illic carne: & fouea apparente conspicua: frequentissimum post colicos dolores remanens malum. Cum vitio alio quoque in forma sitque partium enarratarum hoc accidit, ut moueri nequeant, quando vel abbreviatæ aut aliter curuatae, flexæ vel læsæ, in ipsorum longitudine, vel iuxta articulos, situm mutasse deprehenduntur: idque cum dolore loci, præsertim dum hæc membra mouere conantur: accedente interdum calore cum tumore: & sinu nonnunquam in vna parte, præsertim iuxta articulos, & in opposita illi sedē protuberantia quadam apparente: sicuti fractis luxatisque ossibus accidere, in causis ostendimus. Vbi, & quomodo cum vulnere alijsque manifestis læsionibus immobilitas harum partium contingat, explicabimus.

*Mordendi et mandendi im-*  
*potentia.*  
Mordicus res assumere dentibusque diuidere interdum nequeunt, quando oris interior cavitās claudi minimè potest, sed aperta, dentibus ductis, & pendente mandibula, manet. Idque fit sine dolore, illā resolutā: quod rarius priuatim illi, longè minus in generali paralyfi accidit: Vel cū dolore & molestia, illā luxatā, ore recto vel curuo, si in vno tantum latere hoc fiat, existente. Interdum

læsio alia adest insignis, aut soluta continuitas. Alias verò aperiri nequit mandibula, iunctisque dentibus, exactè, vel vno tantum latere constricta est: nec cibū aut aliud quid intromittere sinit, estque vel spasmus, peculiari nomine, si huic parti contingat, Trismus *Trismus*  
*Spasmi*  
*species.* appellatus, vel alia ab hac contractio. Quandoque dentibus stupentibus, molestia hac, in ciborum masticatione impeditur.

Claudere vel aperire os, vel labia coniungere & disiungere decenter interdum nequeunt: quod suctioni & sorbitioni potissimum incommodat. Et tunc labia vel desunt. Vel resoluta in generali potissimum, rarius in particulari huius solum partis paralyfi, dependent: frequentius autem, ut nō omnino hic motus pereat, in resolutione vnus tantum lateris accidit, cum oris tam dextra quam sinistra sedes inuicē coniuncta, vnum os efficiat, cuius latere vno læso, alterum mobile permanens, immobile latus trahit, & tunc in vno latere tantum labia cum buccis dependent. Vt etiam si in vno latere conuellantur vel contrahantur, illa simul illic sursum trahuntur. Et quia tunc in vtraque specie, oris vna parte deorsum pendente, vel sursum tracta, os obliquum & intortum, uti in plorantibus apparere solet, redditur, siue ex resolutione aut convulsione aut contractione fiat. Oris torturam appellarunt. Quod si verò utroque latere labia cum buccis in spasmo simul trahantur, tunc os transversim diductum, vel uti ridentibus hominibus, vel in canibus cum irati hiant, conspici solet, Cynismus *Cynismus*  
*Spasmi*  
*species.* quodque spasmodum vocant. Vt reuera quoque risus & ploratus, spasmi particularis cuiusdam, cum inuoluntariè adeo os distorquent, sicuti mox in causis dicetur, sint generat.

Tegere atque occultare oculos palpebris interdum quoque nequeunt: oculusque nudus & apertus manet, iniurijsque externis magis est expositus: quod malū Gesse aliqui vocant, & quibus hoc accidit, per somnum, qui rectius oculis clausis sic visione occultata perficitur, minus commodè quiescunt. Quod incommodum & per resolutionem, quoque fieri potest: nam & si resoluta esset, nihilominus in superiore oculi sede collecta maneret (sic enim se palpebra cum non

trahi-

trahitur naturaliter habere debet, unde etiam mortuis oculi aperti manent) sed vix dum hoc nisi paralyfis omnino generalis sit, sicuti apoplecticis oculi aperti manent, euenit. Sicuti verò ex tumore, qui & tunc simul apparet, hoc nonnunquam contingit. Et frequenter, vt supercilium & palpebræ cum buccæ resolutæ deorsum dependent, nonnihil exteriore latere quoque dependentia, apparent. Aperiri verò oculus si omnino nequeat, tunc palpebræ oculo obductæ, atque collectæ, visioni obstant. Quod si verò leuiter tantum diducantur, tunc oculis conuiuere dicuntur, quod tamen quibusdam visionem rectius dirigit, quam impedit. Vix quoque hoc spasmo vt oculus omnino obtegatur (nisi hoc cum oculi motus impedimento, vt iam dicetur, eueniat) accidit, sicuti autem fit, vt supercilium cum buccis nonnihil detrahatur. Aliquando tamen priuatim ex læsione, aut tumore illius, illud quoque fit. Quæ in palpebris aut oculo interdum occurrentia, sicuti illic dicetur, impedimentum tale adferunt. Ex sopore conuiuent naturaliter.

*Oculus volutatio-  
tandi  
Impo-  
tentia.* Volutatio aut commotio oculi, vix dum diutius, nisi in apoplexia, aboletur, quâ correpti, vt illic dictum; oculis sunt fixis, eodemque semper intuitu: & in conuulsionibus quoque conuulsi, contorti & vt vocant fracti apparent.

Interdum tamen & brevis quidem spasmus, sicuti & alia membra, ita & oculos cum dolore aliquo conuelles; eos non volutari tamdiu, vt nec palpebras aperiri finit.

Quod aliquibus à somno profundo excitaris accidit, vt dum oculos aperire mouereque nituntur, cum veluti spasmo astricti sint, non nisi cum labore & dolore facere id tandem possint.

Nonnunquam & ex contractione potius, ab ortu quàm conuulsione oculo nonnihil peruerso, Strabismus fit, atque oculo inuerso nonnihil huc illucve, non rectè sed obliquè aliquem aspiciente, toruum aspectum potius præbet, quàm quod visus oblit:

cum pupilla vix eousque vt palpebris occultetur, seratur.

### Causa.

Causa omnis voluntariorum motuum generum, cum validiorum, tum debiliorum (quæ Impotentias nominamus) est vel in organo mandante, aut vim communicante mouendi, non principe cerebro; tunc enim & sensus interni simul cum motu, vt in ipsorum læsionibus dictum fuit cessarent, quod hic non fit, sed neruo vel in instrumento, quod mouet, musculo: vel in parte quæ mouetur: sicuti nunc explicabimus.

Nerui (quo nomine & dorsalem medullam & nervos comprehendimus) cum cerebri sint portiones, spiritu animali vndique pleni, qui partibus propriam substantiam cum spiritu conferendo, vim mouendi & sentiendi communicant; si ita lædantur, vt illud amplius præstare nequeant; tunc musculo vno vel pluribus, quibus inferuntur, vim illam mouendi amittente, nec amplius membrum quod mouere debebat, attrahente, illius sequitur resolutio seu Paralyfis; id est, ad motum fit languidum & ineptum; parte tunc sanâ, vt aiunt, agram trahente. Et si vehemens læsio fuerit, sensus tactus quoque simul vel tollitur, non solum in musculo, sed & illi obductæ cute, quæ nervos sensorios ab eodem neruo læso accipit; Vel si læsio non adeo sit magna, cum maior vis ad motum edendum, quàm sensum tactus conferendum requiratur, sensus hic vel integer, vel diminutus, motu tamen sublato, potest subsistere. Sicuti & si alia insuper accedat causa, dolorem vel molestiam simul in parte (etsi immobilis sit, aut ægre moueatur,) sentiri: quem admodum nunc, & quis nam neruus, & à quo morbo affectus, diuersas paralyseos species procreet, describemus.

Dorsalis medullæ læsio hæc frequenter contingit, cum externis iniurijs admodum sit exposita; & quia cerebro substrata est, excrementis illius suscipiendis idonea. Quæ si in ductus ipsius, à cerebro per spinam facti, initio, cerebro proximo, afficiatur, omnes nervos, qui ab illa oriuntur, priuando vi animali, generalem facit paralysem: in qua omnes voluntarij motus, tam validio-

*In Ner-  
ui causa  
Paraly-  
seos.*

*Strabi-  
mus, Co-  
ntractio-  
nis spe-  
cies.*

res, corporis, quàm debiliores faciei partium, cessant: & præter hos respiratio, vox, & loquela, deglutitioq; item, excretionū aliqui motus, si cerebro vicina magnaque sit læsio, labem aliquam, vti dictum, patiuntur, cum & coniugationes neruorum illic à dorsalis medullæ initio prodeant, & tunc quoq; vti mox dicetur lædantur. Si verò in progressu reliquò ipsius per spinam talis contingat læsio, tunc illis tantum neruis, qui illi subsunt, facultatem auferendo, membra, quibus illi inseruntur, resoluta reddit. Ex quorum læsionibus, vbi nam in dorsali medulla causa lateat, facile cognoscitur. Quæ quocunq; loco, si in vtroq; latere fiat læsio, vtriusq; lateris, si in vno tantum (sicuti reuera distincta esse dorsalis medulla cernitur) illius tantum lateris causa paralyfim, eoq; generaliore, quò illa magis circa originem affecta est.

Paria neruorum à dorsali medullâ profecta si lædantur, tum prout generalis neruus multis partibus, vel specialis alicui tantum parti neruos comunicas, morbo tenetur, plures, vnâve pars resolutionem patitur. Ex quo etiam, quinam nerui affecti sint, si qui singulis partibus comunicentur sciamus, facile indagabimus. Hincque multæ particulares fieri possunt resolutiones in membris, quæ à dorsalis medullæ partibus neruos acceperunt, non tamen omnibus, cum thoracem mouentes muscoli, septum præsertim, & abdominis quoq; necessitate respirationis compulsi, præsertim cum naturali etiam motu iuuante fiat respiratio, nihilominus officium suum in resolutis, in respiratione, & excrementorum egestionem, præstent: huc facit etiam quòd septum neruos non tantum à dorsali medulla, sed & à neruorum coniugationibus, vt dicetur, accipiat: sicuti in respirationis defectu hæc amplius declarabimus: præter quas partes, reliquæ quæ musculis aguntur, resolutionem pati possunt.

Coniugationes neruorum à cerebro deductæ, motum comunicantes, si morbum pariantur, tunc pars cui neruus læsus peculiaris est, læditur: & ex resolutione partis neruus affectus cognoscitur. Vti si secunda dicta neruorum coniugatio ad oculi muscu-

los deducta, affecta sit, oculi sit resolutio: quod tamen vix in hoc neruo potest fieri, nisi cerebrum vicinum, simul, vti in apoplexia sit, lædatur. Sicuti verò frequenter neruorū coniugatione ad faciem, in labra, palpebras, temporalemq; musculum deducta, affecta, labrorum, & palpebrarum, rariùs verò maxillæ inferioris, cum temporalis musculus plures neruos accipiat, sit resolutio. Et si linguae neruus, tertia dicta coniugatio, patitur, lingua resoluta, loquela labæ patitur: tuncq; ferè, propter illius cum auditorio neruo communicationem, si læsio tenta sit, vt muti penitus sint, etiam surdi existunt. Idem in neruorum eâ coniugatione, quam sextam & septimam vocant, potest accidere: quæ ex cerebro procidens, coniunctaq; in vnum neruum, descendente, & multis partibus interioribus sensum tactus comunicantem, & musculis quoque laryngis, linguae, faucium, septo; item musculis vesicæ, podicis, motum simul contribuentem, si circa exortum, aut quoq; progressum alicubi lædatur, partium, quibus inseritur, resolutiones, si mobiles sint, in alijs stuporis quendam sensum parit. Hincque si recurrentes nerui affecti sint, vocis & loquelæ defectus: si nerui qui faucium accedunt musculos, lædantur, cum ab illis, non villis, vti putarunt, oesophagi fiat deglutitio, difficultas trāsglutendi sequitur. Sed & respirationis impedimentum aliquod, si, qui septum accedunt nerui, læsi sint, accedit, idq; præsertim in validâ exsufflatione, cum intensam vocem edere volunt, vel tussire coguntur: tunc enim eam non valentes exprimere, in suffocationis quoddam periculum veniunt; cum alioquin ad moderatam respirationem perficiendam, septum, quod eam efficit, cum à dorsali quoque medulla, vti dictum, neruos accipiat, munus suum, etsi hi illius nerui læsi sint, nihilominus aliquo modo obire possit. Quibus motuum læsionibus, sensus tactus accedente offensâ, ardoris & fornicationis ille sensus, circa stomachum, vbi maiores sunt nerui, potissimum, aliasque interiores partes, vti dictum, ægrotantes tantopere molestat. Sed & si generalis quædam dictæ coniugationis sit læsio, cum & sphincter vesicæ



vesicæ & podicis, reliquique illius musculi tunc resoluantur, mictio in super inuoluntaria, podicisque relaxatio, cæteris paralyseos speciebus copulatur. Sicuti hæc omnia prolixius, in respirationis & excretionum defectu & deglutiendi difficultate, explicabimur.

*Morbi nervorum, ut de Paralyseos sit.*  
 Morbus verò, quo dorsalis medulla seu nervus tenetur, is est, qui illum spiritui animali, quo ad functionem edendam opus habuit, priuat. Sic enim affectus, musculo vim nec mouendi, nec sentiendi partibus sensibilibus, si omninò nervus eo destituatur, communicare amplius potest: ipsiusque reliqua, à loco affecto ad partem usque cui inferitur, portio, sit inutilis. Sicuti accidit, si illius continuitas cum parte solvatur, tunc enim via hæc interrupta est. Vel si nervus ita angustetur, ut spiritus animalis, qui liberum per ipsos transitum requirit, ipsos non amplius, vel non sufficienter peruadere, aut adimplere possit; cum, licet tenuissimus sit, & subtilissimus, solisque radiorum instar nervos illustret, nihilominus tamen, uti & solares radij, impediri possit. Vti hoc, si in parte aliqua illius ita comprimatur, ut ipsius substantia penitus subsideat, accidit. Vel si ipsius substantia adeò condensetur, ut & hac ratione spiritui via interclusa sit. Sed & idem, si portio aliqua nervi ita intemperie laboret, ut functionem suam obire minimè possit, euenire potest. Quemadmodum quomodo hi morbi, soluta nimirum continuitas, nervorum angustatio, condensatio, atque intemperies simplex, vel cum humoris affluxu, & repletionem, aut tumore præter naturam, aut organi aliquo vitio: à causis internis, externisve: humore nimirum pituitoso, vel sanguineo, vel ab intemperie, vel lésione aliqua per compressionem ligaturas, aut à vulnere, icturne alio proueniant, nunc explicabimus.

*Pituita nervos occupans, causa Paralyseos.*  
 A pituita, seu excremento cerebri aqueo, seroso, frigido, humido, cerebrum irrigante, vel nervorum omnium principium premēte, uti apoplexiam, quæ totius corporis est, resolutio, generari, sic si hoc in nervis accidat, Paralysem fieri, in apoplexiæ causis explicatum fuit. Talis enim humor, à causis illic quoque assignatis, in capite copiosius con-

gestus, & à cerebro in apoplexia, quæ prius procrearat, excussus, vel sine ea, à capite defluens, non per dorsalis medullæ aut nervorum substantiam, sed vel per cavitatem dorsi vertebrarum dorsalem medullam continentē, descendens, illicque, vel circa principium aut progressum illius subsistens, vel ulterius per ductus, quos nervorum paria à dorsali medulla progressa, circa omnem connexū, undique in corpore permeant, delabens, aut etiam à capite, nervorum coniugationum, similes ductus sequens, alicubi que circa nervos hærens, quocunque loco, siue hoc circa dorsalem medullam, siue nervorum paria aut coniugationes accidat, ea comprimendo, vel irrigando, uti si hoc in cerebro fiat, apoplexiam, sic, si in iam dictis locis accidat, paralysem, plurium pauciorumve partium, prout generalis, particularisve nervus afficitur, procreat. Cum si copiosus humor eò affluat, angustis illis in locis pondere suo nervos comprimendo, uti supra dictum, spiritui animali viam quoque intercipere possit: eoque diutius, si crassior & mucosus longiore mora detentus, euadat. Præcipue verò, quòd humiditate sua, nervorum substantiam continuò irrigans, & adimplēs, refrigeransque, eo in loco propriam ipsorum temperiem destruat, & quo minus spiritu animali impleri eoque perfrui possint, impediat: unde & propter inutilem hanc interpositam nervi affecti portionem, reliquo qui ad partes deducitur nervi ductu, ad functionem edendam simul inepto facto, resolutionem perfectam, si magna sit læsio, partium quibus nervi hi communicantur, sequi necesse est: eamque eò diuturniorem & pertinaciorē, quò maior nervi offensa existit. Quam veram paralyseos pituitosæ causam esse, in tumescēte ex aqueo humore dorsali medullā, sectione deprehendimus: ut non opus sit, obstructionem quandam in nervis hinc, qui solidi sunt, aut ex filamentis confecti, nec cavitatem ullam, quæ humorē illum crassum, uti quidam scribunt, admittere possit, excogitare: Vel si nervorum hanc humectationem quidem concedant, id tamen hac ratione, quòd nervi longiores laxioresque facti, ad motum edendum inepti fiant, cum, ut iam

vt iam prius dictum est, nerui minimè partem attrahant, fieri, afferere; longeq; minùs ab eadem pituita, vti neruos obstruente, paralyfim: sic implente cõuulsiones, quas nos contractiones vocamus, peruenire necesse est, contendere, eandemq; vtrisque ob eam causam curationem, assignare.

*Humor  
res aliq  
neruos  
occupan  
tes, causa  
Paraly-  
seos &  
Spasmi.*

Sed & aliunde, quàm ex cerebro excrementitius talis humor ad neruos partiũ quarundam delatus, aut illic congestus, partibus quibusdam propriam inducit Paralyfim. Qui sæpenumerò alijs quoq; acribus humoribus & biliosis perfusus, vel aliàs putrescens, neruos non tantum irrigando, sed & irritando, dolores cum resolutione partis sese offerentes, & in conuulsiones interdum desinentes, vti hoc in conuulsionibus dictum est, causat: qualem paralyfim in colicis cruciatibus quoq; euenire, cum dolorib. membrorum, ardore, fornicatione, alijsq; molestijs, in generibus explicatum fuit.

A sanguine extra vasa in hasce cavitates neruorum illapso, retentoque diutius, idem fieri posset; sed cum ille mox putrescat, inflammationem citius, vti & si in neruorum substantiam se insinuet, vnde alia potius quàm resolutionis accidentia sequuntur, parit. In venis verò, si ex plethora vel situ membri non naturali (vt si brachium diu in altum eleuatum teneatur) sanguine delato in vnum locum copiosius, quia tunc neruũ vicinum, cum venarum ductum sequi semper nerui soleant, aliquo modo premit, stuporem potius leuem aut fornicationem, quàm perfectam, aut diurnam causat paralyfim: sanguine facile iterum remeante nec ita subsistente: vti verò in cerebro affatim effusus in illius ventriculos, apoplexiã, vti illic dictum est, potest efficere.

*Tumor  
nerui  
causa  
Paraly-  
seos.*

A tumore nerui duro; Vt callo vel cicatrice post vulnus, aut contusionem in neruo excrecente; Vel tuberculo, ex proprio nerui nutrimento tenaci nato, coarctatio, illius spiritum animale sustens, fieri quoque potest. Ab œdemate verò, quod simul illius causam statuunt, illud fieri nequit, nisi irrigationem illam neruorum, & tumescen-  
tiam, vti supra dictum aliquis œdema vocare velit. Ab aliarum partium tumoribus

neruum vicinum prementibus, idem etiam potest accidere.

Conformationis vitio, ab ortu, neruis nõ rectè formatis, aut alioquin ductis, id quoq; accidere potest. Quod sæpè in neruo lingue, vti mox in loquelæ defectu explicabimus, accidit, vt muti & surdi, sicuti in auditus læsione dictum fuit, nascantur.

*Confor-  
mationis  
vitium  
in ner-  
uo, causa  
Paraly-  
seos.*

Ab intemperie frigida, seu refrigeratione nimia (sicuti mox in musculis explicabim⁹) si non tantum musculi, sed & nerui ipsi cum musculo cui inferuntur, vel sine illo in ductu ipsorum extra muscolum, cum frigidum ipsis admodum inimicum sit, ita afficiantur, vt vel frigore constringantur & condensentur, vnde spiritu animali non amplius libera patet via: vel aded lædantur, vt ipsorum pereat functio, tunc quoque Paralyfis partium, quarum nerui affecti sunt, sequitur.

*Frigida  
intem-  
peries  
nerui,  
causa  
Paraly-  
seos.*

A siccitate & caliditate resolutionem aliquam fieri Trallianus docet: quod certè, si talis quæ nerui substantiam aded induret, vt spiritus eam permeare nequeat, sic accidere necesse est: sicuti idem à causis in musculo-  
rum exiccatione explicandis, fieri potest.

*Siccitas  
nerui,  
causa  
Paraly-  
seos.*

Pressio membri vehemens & perseuerans, ab onere graui, vel vi aliã facta, præsertim eo loci vbi maiores sunt nerui, vel nudi sub cute occurrunt, primum spiritibus repulsis impeditis & discurrentibus, fornicationis sensum in stupore dictum, mox motus abolitionem, tandem & stuporem perfectum in parte, cui neruus compressus inferitur, inducit. Fit hoc frequenter cum pars parti per quietem, somni præsertim tempore, vt corpus brachio, pes pedi incumbens, diutius, eademq; premens, partem immobilem & insensilem, & vt vocant, dormientem reddit. Quod si verò hæc compressio cum valido nerui ictu subito fiat, tunc stupor tantum aliquis; cum dolore tamen & sensu fornicationis permixtus, sentitur: sicuti hoc in illusione cubiti, illic vbi neruus nudus ferè lateret, & in annulari, & minimo digito, sæpè casu euenire solet.

*Compres-  
sio ner-  
ui, causa  
Paraly-  
seos.*

In ligaturis membrorum vehementioribus, maximè si neruus vinculo excipiat, motus & sensus tactus partis cessant, quem admodum & ex recurrentib. neruis vinctis,

vocem

vocem perire, mox in loquelæ defectu ostendimus.

Luxatis vertebriis, aliorumque articulo-  
rum ossibus, si illic nervi vicini premantur,  
paralytis sequitur. Quod tamen quia facile  
cedunt, vixdum fieri potest: uti verò alia in-  
commoda, sicuti luxatis vertebriis ceruicis,  
impedimenta respirationis & deglutitionis,  
ut in illorum læsionibus explicabimus, se-  
quuntur. In reliquis verò dorso vertebriis,  
nisi tanta fiat luxatio, quæ dorsalem medul-  
lam vehementer premat, paralytis minimè  
fit. Sicuti gibbosos, in quibus multæ simul  
vertebræ luxatæ curvitatē dorso, quæ me-  
dulla illi indita, circa comprehensionem se-  
quitur, efficiunt, resolutos tamen minimè  
videmus: nisi fortè una aliqua vel duæ ver-  
tebræ vehementer propulsæ, angulum acu-  
tum dorso afficientes, eam premant; quod  
tamen ægrè propter dorso firmitatem potest  
fieri.

*Læso  
nervi,  
causa Pa-  
ralyticos.*

Amputato ex vulnere nervo, quia tunc  
continuatio hæc cum parte penitus sublata  
est, membrum resolutum fit, & insensile quo-  
que, nisi ab aliis nervis illæsis adhuc, sensum  
accipiat. Quod & illius contusio sæpè facit,  
læso aded nervo, & sanguine impleto, ut in-  
utilis quoque fiat: unde dorso medulla ex  
casu sic affecta, generalis sæpè sequitur pa-  
ralytis: aliàs verò alibi nervis contusis, par-  
ticularis resolutio. Sæpè quoque post con-  
tusionem, callo post se relicto, illud, sicuti di-  
ctum, evenit.

*In Ner-  
vis causa  
Spasmi  
particu-  
laris.*

A nervis affectis convulsiones seu spasmi  
particulares membrorum etiam fieri pos-  
sunt: non pituita repletis (sicuti voluerunt,  
& ab eodem humore in nervos illabente,  
diversum effectum produci, & paralytim &  
spasmodum fieri posse, scripserunt) sed irritatis  
& molestatis, ab iisdem causis, sicuti in epi-  
lepsia explicatum fuit; nondum tamè aded  
grauiter, ut cerebrum in consensum trahât,  
offensis, tunc enim generalis convulsio seu  
epilepsia fieret, sicuti hæc aliquando parti-  
cularem hunc spasmodum, si maiores præser-  
tim nervi afficiantur, & noxa gravis sit, se-  
quitur. In quo particulari spasmo etiam, sicuti  
in paralyti, prout generaliores vel priua-  
ti nervi afficiuntur, ut illic resolutio, sic hæc

convulsio plurimum pauciorumve partium  
contingit: & se hic, dorso paribus affectis, in  
dorso, brachiorum, & manuum moribus in-  
ordinatis, manifestat. Qui vel admodum  
hæc membra convellit & attrahit, in vero  
illorum spasmo dicto: vel saltem digitos, ma-  
nus, brachia, aliave membra leuiter allicit,  
rursusque relaxat, in Palpitatione convul-  
siva ob id dicta, quia convulsiones veras mi-  
natur, & Germ. Zupffen vocant. Frequenter  
quoque nervorum coniugationibus mole-  
statis, oris curvitatē & distorsionem illam  
morbosam, quam Cynicum spasmodum vo-  
cant, causat: Vel eam etiam leuem spasmi  
speciem, quæ plorantibus & ridetibus in-  
voluntariè accidit; idque ex nimio animi af-  
fectu, spiritibus cum lachrymis ed profusis,  
nervosque impellentibus: sicuti quomodo  
hoc fiat, & à sola hac causa etiam grauior  
convulsiones oriuntur, in epilepsia & cata-  
lepticos causis explicatum fuit. Licet & hæc  
ab aliis genita, spasmodum non saltem illum  
per affectus animi in ore concitatum, & mox  
illis remittentibus cessantem, sed & perse-  
uerantem, & periculosum gignant; qualis  
Sardonius ille risus erat, à Cicerone descri-  
ptus, homines iugulans: qui & in generali  
convulsione una cum aliis superueniens, pro-  
pessimo habetur signo, sæpèque soluto pa-  
roxyismo, ob mentis alienationem, uti in e-  
pilepsia dictum, adhuc remanet. Sed & par-  
ticularis hæc convulsio non tantum in enar-  
ratis motuum læsionibus se offert, verum &  
in aliis, & respirationis, & excretionum mo-  
tibus, si nervi ipsis destinati, afficiantur. In-  
ter quos difficultas transglutienti ea, quam  
spasmodum stomachalem Chirurghi vocant, &  
in vulneratis tantopere metuunt, aded fre-  
quens esse solet. Sicuti hæc suis locis rectius  
explicabuntur.

Musculus cum sit instrumentum motus  
voluntarij, quod membrum mouet, si ita af-  
ficiatur, ut membrum attrahere amplius ne-  
queat, illius tunc fit resolutio, seu paralytis.  
Vel si talis illius sit morbus, ut membrum  
contra nostram voluntatem trahatur, tunc  
illius sequitur non convulsio propriè dicta,  
quam tantum nervorum causâ fieri diximus,  
sed vel improprie convulsio dicta, spasmodus

*In Mu-  
sculis il-  
lorum ve-  
l edunt,  
causa Pa-  
ralyticos,  
Spasmi  
particu-  
laris, al-  
tali spe-  
ciem.*

nimirum flatulentus appellatus; vel contractio à nobis vocata, permanens membri & valida, quam certe neruus, tam exilis chorda, si cum membro adeò graui conferatur, vti verò tendo musculi adeò validus, efficere minimè posset. Læduntur autem hac ratione musculi ferè, singulis partibus proprii, vnde & particulares tantum resolutiones, vel contractiones partium illarum sequuntur; vel vnus solummodò partis, si illius peculiaris musculus læsus sit, vel plurium, si vnus musculi pluribus demandet tendines: interdum tamen pluribus quoque simul affectis musculis, generaliores etiam hæ læsiones partium, quas mouent, sequuntur: quod ob musculorum vicinitatem, & quod plures inuicè collecti, veluti vnà membranà inclusi sint, in quibusdam locis, vti dicitur, potest accidere. Quæ siue vnus siue plurium musculorum læsiones, ab hisce causis dependent. Si nimirum humore vel flatu occupentur: aut tumorem præter naturam patiantur: aut exiccari inaniantur: vel intemperie frigidam patiantur: aut alio modo lædantur: vel vitium organicum contraxerint.

*Humor  
pituitosus  
tendines  
occupat,  
causa. Pa  
ralysicos.*

Ab humore musculos replente, vel imbuente, vel illorum spaciis se insinuante, rarius paralysis, vti verò frequenter si neruus occupet, sicuti prius dictum est, gignitur. Nam si pituitosus, serosus, aut excrementitius humor, ad musculorum corpora defluat, vel illic congestus sit, tunc dolores, & illius causâ, vt membrum ægrè moveatur, potius quam illius languorem, aut insensibilitatè parit: sicuti in doloribus, ex defluxionibus natis, explicabimus. Quod & si sanguis illuc è vasis effundatur, vnà cum inflammatione partis accidit. Fit tamen interdum, humore aqueo musculorum tendines diu alluente, atque irrigante, vt illis nimium laxatis, & elongatis, illius partis, quam attrahere debebant, sequatur resolutio. Quod illis tantum in locis ferè accidit, vbi plures tendines excarni angustoque in loco iuxta flexuras articulorum, ligamentis, veluti annulis, vincti, vt in carpi, & pedij regione, simulq; coniuncti, feruntur: vbi retentus interdum ob loci angustiam humor, tendinesque humectans, & relaxans, facit, vt manus, vel pedes

resolutæ, toto vitæ tempore, in quibusdam maneant, & cessante quoque reliquarum partium, harum tantum paralysis relinquatur; absumpto etiam humore, tendinibus longioribus, quam par erat, remanentibus. Vnde toto vitæ curriculo manus & pedes pendulas gerunt, & cum aliquid attollere vel apprehendere conantur, quia digitos nihilominus mouere, vel incedere possunt, cum id musculorum beneficio facere nequeant, eas in altum sublatas, impulsu brachij, vel cruris, proijcere solent. Quibus & eminentia, veluti tumor quidam, in carpi superficie plerumque apparet, ortus ob extenuationem, quæ comes eius esse solet, ossibus illic prominentibus, vel ob callum, aut nodum, qui frequenter hic nascitur, à causis postea dicendis: quos Contractus nostri Germani, cum resoluti tamen sint, appellant. Idq; fortè, quia, vt supra dictum, cum resolutione ipsarum circa carpum factâ, digitorum accedit simul interdum contractio: quod fit, quia in manibus atrophiam simul laborantibus, ob compressionem venarum, quæ circa carpi angustias, à tumore, aut humore premuntur, & refrigeratæ sunt, in partibus illis exsanguibus, ita vt ob eas causas, sanguini non pateat transitus sufficiens, ligamenta & tendines quoque absumpti & siccati, faciunt, vt articuli illi digitorum tandem sistantur: minimè verò articuli per quos manus mouetur, qui iam prius resoluti erant. In eademque sic sede partes resolutæ, & contractæ, & emaciata inueniuntur.

Ab eodem humore pituitoso, seu aqueo, aut excrementitio, musculi corpora, aut tendines adeò implente, vt distensus breuiorq; factus, partem, cui inseritur, attrahat, contractionem quoque fieri posse videtur. Verum cum humor ad musculos defluxus, spacia ipsorum, quibus inuicem iunguntur, occupet; dolor potius, eoque nomine difficultas illa membrum mouendi, quam contractio partis, & si tendines aut neruos irriget, paralysis potius, sequuntur.

A flatu eadem ratione, non in musculorum corpora, sed in illa spacia, quæ musculi inuicem iuncti, vel vicinis partibus annexi, efformant, irrupente, suæque copiâ muscu-

*Flatus in  
musculo-  
rum spa-  
ciis causa  
Spasmi  
flatulentis*



lum vnum vel plures distendente, adeò vt breuiores facti, partem ad se violenter aliquamdiu trahant, spasmus illū, quem proin flatulentum vocant, oriri pleriq; prodiderunt. Quæ tamen validissima membri extensio, à solis flatibus vix fieri potest: vt verò palpitationem flatulentam quoq; dictam inde frequenter euenire, ostendemus: nisi alia accederet causa insuper, de qua mox in attractatione nimia musculorum dicemus. Quod vt in varijs corporis partibus sæpè, sic in digitis pedum frequentissimè euenit: musculis suræ carnosus, tunc cum summo dolore, ob distentionem, & protuberantiam ipsorum, affectis.

Flatulentum autem hunc spasmus, flatuum efficit copia, adiuuante præsertim, viarum, seu spaciolorum dictorum inter musculos, amplitudine, flatibus suscipiendis idonea. Quæ vel à natura quibusdā accidit: qui & huic malo magis sunt obnoxij: Vel à vehementi musculorum motu euenit; sic enim ab inuicem & à vicinis partibus veluti auulsi, spacia, quæ ipsos intercedunt, latiora sensim, præsertim si sæpe tales motus repetantur, euadunt: in quæ postea flatus facilè & leui ex causa, præsertim cum musculi in motu admodum contracti, viam illis faciunt, vt mox dicetur, illabuntur: sicuti & in excoriatis tergoribus eiusmodi flatus inter membranas & carnem latere, ex bullis illic apparentibus, facilè cognoscimus.

*Tumor in musculo tendinæ, causa Contractio dictæ membræ.*

Tumor præter naturam durus in musculis natus, vt membra ad se attracta, sic astricta retineant, interdum efficit. Veluti scirrhus, aut nodus, ab excrementis in musculis genitus, & præsertim circa tendines, vbi plures in articularum regione conueniunt: vt prius de carpo dictum: & in genu accidere aliquoties vidi, pede tunc adeò fursum attracto, vt calcaneus podici vicinus esset. Callus item in musculo tendinæ post vulnus, quo vulnerati nondum tamen penitus abfecti erant, relictus, contrahensque vulneris labra, quia musculi corpus caudamve tunc abbreviat, vt pars, cui inferitur, plus minúsve astringatur, facit; quod & in temporali musculo læso accidisse, osque adeò constrictum tunc fuisse, vidi, vt

vix liquidissimos cibos intromitteret.

Exiccatis musculis ipsorumve tendinibus, & cum illis nerui interdum ipsis inserti, eousq; vt veluti indurati & callosi facti, corrugati & astricti, vterius extendi flectique nequeant: tunc quo situ firmi manent, eodem quoque membrum fixum & immobile, & plus minúsve contractum, cui implantantur, retinent. Sicuti senij vel laboris nimij diuturnique causa, partes aliquas, easque maximè quæ nimium operando diuturnumque exercitæ fuerunt, rigidas & diuersimode curuatas existere, sæpè cernimus; dorsoque flexo incedere, nec se rectè erigere posse, illos qui onera diu grauià gestarint: digitosque incuruos & manus habere, qui illorum operâ nimium sunt vsi: aut tetano vel alijs contractionum speciebus senes laborare. Quod non semper articularum, vt postea dicetur, sed & musculorum iam dictæ exiccationis causâ accidere potest: absumpto tunc à causi enarratis ipsorum humore, adeò vt macie confecti, (quæ & manifestè in membrorum illorum musculis, maioribus præsertim etiam extrinsecus patet) ex fibris potius quàm carne ipsorum corpora & tendines constare, chordasque aridas, non molles neruos, repræsentare, videantur. Quam ariditatem pinguedinis defectus, quæ primum à causis dictis absumi solet, adiuuat; cum & extrinsecus illorum membranis adnata, tum intrinsecus quorundam maiorum præsertim musculorum fibris innata, illos vt facilius in motu extendi contrahique possint, inungens, si eâ priuentur, ineptiores ad motum reddens. Item glutinis illius, quo tendines eodem nomine obliniri solent, ab ipsdem causis, quibus & humor & adeps deficiunt, consumptio. Quam exiccationem ab atrophia dependere, superius iam in humore pituitoso, carpi tendines occupante, demonstrauimus. Quæ quoq; à calore vehementi extrinsecus, per æstus magnos, si vel diu perseuerent, vel adeò potentes sint, vt ferè vrant, astrictis tunc inde tendinibus & musculis membranosis potius, quàm carnosus, accidere possunt. Vix autem ab interno calore, etiam in febribus ardentissimis talis musculorum fieri potest

*Exiccatio musculorum illorumve tendinum, causa Contractiois membræ.*

exiccatio, cum nec in heceticis febribus, corpore alioquin in marcorem penitus redacto, membra ob id contracta appareant, nisi forte hoc in septo transuerso, & in lingua, quae arefacta, vti mox dicetur, ipsius functione quoque labefactatur, sicuti in respiratione laesa dicemus, accidat. Nam & conuulsiones, quas à contractione plurimum differre diximus, febres hasce sequentes, non ab exiccatione neruorum, vti voluerunt, proficisci, sed illorum irritatione, in epilepsia explicatum fuit.

Refrigeratio musculorum, causa Motus impotentiae.

Refrigeratis à modum musculis à causa externa, adeo vt calore nativo sopito, functione ipsorum labefactetur, tunc vel non recte membrum mouere vel ægre possunt. Vti in manibus & pedibus, iniuriis magis expositis partibus, aëris, venti, aquae, frigoris, causâ sæpe euenit, vt digitis tunc recte res apprehendere nequeant: illis vel simul stupentibus, vel dolore summo iuxta radices vngu. um se manifestante, vti alibi dictum, affectis. Sed & à frigore spasmus illum, qui in aqua frigidissima natantibus euenire solet, musculos tendinesve astringendo, fieri existimant: cuius tamen causas alias nos exposuimus, quas tamen hæc adiuuare potest.

Solutio motus musculorum tendinum, breuiter, Motus impotentiae.

Absectis musculis, vel illorum tendinibus, aut saltem transuersim aliquousq; vulneratis, membri illius quod trahere debebant, sequitur languor vel resolutio. Quod vt in variis corporis locis accidens, multas parit resolutionum species: sic & si in temporalis musculo fiat, maxilla inferior resoluitur.

Longitudo motus impotentiae, causa Motus impotentiae.

Extensis insuper nimium, per motum violentum, musculi tendinibus, adeo vt veluti distracti, longiores quam par erat, fiant, accidit, vt membrum postea sufficienter eleuare nequeant, & quia tunc ægre rursus se colligunt, perseverans sit malum. Quod in manibus, grauius opera subleuando, ex valido illo nixu quandoque euenit. Vti & in genu articulo accidere vidi, per impetum adeo impulsu, vt multi qui illic occurrunt tendines, ex illo subito & violento motu distracti, longioresque facti, aut à connexu vinculorum liberati, postea partem recte flectere amplius non potuerint, claudicantesq; ægre postea perueniant.

Sed & attractis etiam cum impetu musculis illorumque tendinibus, sæpe contingit, vt nimium illis etiam vltra terminum contractis, vel alioquin distortis seu inflexis, aut à situ naturali nonnihil declinantibus, adeo vt mox iterum relaxari nequeant, membrum vltra mediam figuram trahant, fiatq; spasmus ille, qui toties homines, cum violenter aut inordinato motu membra extendunt, aliquamdiu detinet: vti in pedibus cum caligas cum labore induunt, vel natando in aqua, illos non consueto more agitant, frequentius accidit. In quo spasmus, prominentia musculi apparens, dolorque vehemens, eum ex contractione conuolutum, & in sese nimium coarctatum, satis ostendit. Flatu tunc quoque in spacium illud, quod eleuatus efficit, vti supra dictum, irrumpente, illiusque distentionem adiuuante. Idque tam diu, donec rursus musculo relaxato, spasmus iterum cesset: quod citius opposito musculo, partem quam musculus illi affixus sequitur, trahente, perficitur. Qui tamen, si pars, vt supra in statu dictum, disposita sit, flatuumq; adsit copia, citius faciliusque redire, atq; aliquando non vno aliquo tantum, sed multis in locis homines molestare solet. Quam veram spasmum improprie dicti adeo violenter & cum dolore membra extendentis causam esse, quilibet, si recte rem consideret, cognoscere poterit. Cum qui neruorum causâ verus spasmus, in hisce vel aliis partibus interdum fit, adeo violenter, sicuti quando musculorum causâ oritur, membra extendere, aut dolorem tantum inferre nequeat.

Verum & ab ortu, organici morbi vitium hoc, si ab insitis causis, musculis illorumve tendinibus accidat, in pluribus paucioribusve locis, vt longiores breuioresve sint, membrorum illorum sequitur vel languor, vel strictio. Sicuti aliquos rigido dorso vel inflexo aliisve partibus contractos, vel etiam resolutos natos, vidimus.

Partes quæ in motibus voluntariis mouentur, sunt membra externa, ossibus firmata; validos motus, vti dictum, obeuntia: in quibus si causâ immobilitatis consistat, in ossibus ipsorum plerumq; vel ligamenti & arnaginis existit. Licet partes faciei, debiliores

Attractio nimis musculorum, tendinum, causa spasmus, flatulenti.

Organici morbi vitium musculorum, causa Motus impotentiae.

biliores motus edentes, labia, palpebre, oculus. Quorū vitia, quæ motibus ipsorum incommodant, nunc in singulis explicabimus.

*In Offi-  
bus, cau-  
sa Mo-  
tus im-  
potentia.* Offa si afficiantur, ut loco moveri nequeant, tunc nec pars, quæ ex illis componitur & stabilitur, sequi potest. Quod fit ex læsione ipsorum insigni, fractis aut amputatis, vel contusis, aut alioquin pondere pressis: vel si in articulis quibus ad motum edendū inuicem iunguntur, dislocentur.

*Fractura ossis, causa Motus impotentia, vel alia Læsio ipsorum.* Fractis itaque vel abscissis, aut contusis aut pressis ossibus partium mobiliū (de aliis enim eorum læsionibus alibi agemus) fit, ut, primū si contracta sint & penitus abrumpan-  
tuntur, tunc etsi pars ossis fracti, cui muscoli & tendines implātati sunt, attrahatur (quod tamen ob dolorem qui adest, & vel leuissimō illius motu exacerbatur, fieri nequit) cū abrupta pars non sequatur, pars moveri recte minimē possit. Quod in partiū quæ mouentur longis ossibus & tenerioribus citius fit: quæ & facilius franguntur, si vno tantum osse constent: & tunc si fractura tanta sit, ut abruptæ ossium extremitates ab inuicem recedant, ossis portione quæ tendinibus, qui semper tensi sunt, adnata est, sursum tractā, cū nihil resistat, partis sequitur abbreviatio. Ut in femoris, humeri, digitorumque sæpe fit ossibus. In partibus vero, quæ duobus longis firmantur ossibus, ut hoc fiat, vtrumque frangi & hoc modo diiungi oportet, cū si vnum tantum rumpatur, alteram adhuc partem sustentet, nulla-  
que proin illius sequitur breuitas, nec motus illius, nisi dolor hoc impediret, tunc tolleretur. Sicuti in binis tibiæ & cubiti hoc nonnunquā contingit ossibus: & in distinctis maxillæ inferiori ossibus latis, in vtroque latere, vel vno saltem potest accidere. Quod si verō ex pluribus ossibus longis, veluti pedij & postbrachialis, pars sit composita, cū omnes simul vix abrumpan-  
tuntur, dolor potius, quamdiu is durabit, quam organi vitium, motum tunc impedit. Breuia item & crassa ossa, si frangantur, tunc etiam doloris causā, motus tamdiu præpeditur: Ut cū vertebrarum spinæ, sicuti semel obseruauimus, abruptæ sunt, cū corpora ipsorum vix penitus confingi possint, vti nec alia ossa ex-

minoribus. Talo tamen contracto, quem per medium penitus diuulsum, ex casu vidi, motus quoque per se, non solum doloris causā, aufertur. Et si hoc in mola fit, quam in aliquibus sæpius in duas partes admodum separatas & distantes, contractam notavi: tunc, cū articulū genu minimē constituat, sed quia tendines errantes, quos tantum mola, ne defleant, retinet, motus illius articuli labem patitur.

Quæ omnia ossa enarrata tam longa quam breuia, per vulnus simili ratione dissecta, similem in motu impotentiam eadem ratione procreant.

Vti ex contusione illorum, quamdiu dolor molestat, ob illum potius, quam alia ratione, nisi fractura adsit, motus præpeditur. Quod in dorſi vertebris nonnunquā & brachialis, aliisque minoribus: pedis ossibus, solet contingere.

Quæ omnia, tam fracturæ, quam vulnera & contusiones, à causa violenta, ab ictu vel casu, extrinsecus illata, illis accidunt. Ex corruptione itidem per sphacelum ossium, non tantum minorum, sed & maiorum, portiones aliquas adeo exesas & corruptas vidimus, ut ossa, ac si fracta essent, conciderent, & ad motum inutilia redderentur, idq; tum ob luem Veneream, aliàsve causas. Sicuti & ex cancro gingivarum, maxillæ inferioris partem aliquam cum dentibus, in vno latere exemptam, & puellam quæ hoc passa fuerat, nihilominus masticare potuisse, obseruauimus.

Sed & ossa pondere carne, aut pinguedine grauata, ad motum segnius sequuntur.

Dislocatis ossibus duobus, quæ mutuo iuncta, ligamentisque constricta, ad motum articulum formant: si hoc in articulis, qui apparente motu, per diarthrosin mouentur, fiat: tunc & hæc immobilitas manifestior erit, magisque incommodabit, præsertim si magna sit luxatio. Quo fit, si caput ossis è suo sinu penitus excidat, & tunc exarthrema vocant: nam si ad supercilium illius tantum feratur, leuior tunc fit luxatio, & pararthrema appellatur; quā aliqui separationem tantum vocant. Quarum vtraque, si contingat in articulis, per enarthrosin iunctis, vti se-

*Dislocatio ossis articuli, causa immobilitatis.*

moris cum coxa, & caput è suo acetabulo elapsum & in superiora detrusum, illic subsistat, ligamento laxo retentum, crus quoque abbreviatur, prominentiaque in eo loco apparens sit: quod &, si in posteriora vel exteriora feratur, accidit. Nam si ad interiora vel anteriora ducatur, cum circa supercilia subsistat, pes longior tunc potius euadit. Et si in humeri cum scapula articulo hoc fiat, uti propter sinum planum, citius fieri potest, in inferiora sub scapulam plerumque humerus delabitur, eminentiaque tunc summi humeri deperditur, illiusque loco concavitas se manifestat. Et si maxilla hoc modo luxetur, os apertum, fixum & curvum, si in vno tantum latere fiat luxatio, efficit. Idem in articulis per ginglymum compositis, recedentibus ipsorum capitibus sinibusque ab inuicem, in hoc illudve latus, accidere potest. Vt in tibia cum femore & pedibus: cubiti cum humero & brachiali, digitorumque ossium articularum, luxationibus. Qua ratione & mola, si è sinu suo excidat, tendines diuertendo, uti in fractura illius dictum, motui non alia ratione incommodat. In trochoide vero articuli specie, quæ caput supra vertebrae mouetur, cum cardo ille, quem prima vertebra cum secunda efficit, adeo sursum attolli vix queat, ut è suo sinu procidat, sitque tam firmiter ligamenti constrictus, euenire vix potest, ut caput, luxationis causâ, motum amittat.

Quod si verò luxatio in articulis qui obscuro motu per synarthrosin mouentur, eueniat; fiatque hoc in ea specie, quem nexum seu coalitum mobilem vocauimus, quo dorsi vertebrae inuicem construuntur, tunc laxa quæ vertebrae simul conglutinat cartilagine, in pluribus illarum spacijs, maxime circa mediam dorsi sedem, & superiorem lumborum, cum illic copiosior inueniatur, aliquid remittente, accidit, ut plures vertebrae (cum vna sola vix adeo extrorsum ferri possit, illiusque quæ nectitur cartilago, adeo relaxari) ab inuicem plus minusve succedentes, curuitatem in dorso, & cum se erigere nequeat, breuitatem quoque illius, & cum eo totius corporis in gibbosis appellatis, procreent. Atque prominentia tunc inde nata,

ad exteriora potius quam interiora, cum spinæ vertebrarum illas èo adeo detorqueri non sinant, protuberet, & pro diductionis vertebrarum modo vario, nunc acutum nunc obtusum, & maiorem minoremve gibbum efficiat. Nonnunquam ad latera inflexæ vertebrae, alio modo corpus intortum & breue efformant. Et in omnibus illis dorsi curuitatibus, cum costæ dorso adnexæ sequantur, pectus quoque vel elatum vel depressum, vel aliter deformatum apparet. Vnde & difficilis, si thoracis structura admodum vitietur, sequitur respiratio: vel periculum quoque suffocationis, si ceruicis vertebrae luxatæ sint, quod tamen, cum pauca illic intercedat cartilago, non nisi summa vi fieri potest: uti verò nonnunquam prima vertebra, quæ per arthrodiam laxè iungitur, si luxetur, sextam anginae speciem ab Hippoc. vocatam, efficit.

In reliquis verò paruorum ossium mutuo copulatorum structuris, ut brachialis, pedij, tarsique ossium, cum valide inuicem constrictæ sint, rarius hoc euenit; & si eueniat, cum singulæ admodum obscure moueantur, impedimentum in motu non adeo magnum adferre possunt.

Situs autem naturalis articularum hæc peruersio tanta, ut articulus immobilitatem amittat, nec cardo ille, uti dicitur, verti possit, à varijs causis proficiscitur. Ab impetu nonnunquam in ossibus facto, & conjunctiones hæc ossium dirimente: uti si alterutrum os, quod articulum format, ictu casuue, ab alterius conjunctione impellatur, vel trudatur: quod ut in plerisque articulis, sic in humeri, naturaliter aliàs illic prominente, ex casu facile, & frequenter fieri, videmus. Ex attractu quoque ossis supra modum facto, vel ad locum, quod minime duci debebat, idem contingere potest: ut in pandiculatio- ne, ore nimium vel incuruè distento, maxillæ luxatio: vel aliorum ossium, gestiendo, vel serio in tortura, contorsio. Sed & sensim hoc accidit, si in eandem partem sæpè pars mobilis inclinetur, eoque situ diu retineatur, vnde tandem continuo vsu, laxati articuli diducuntur, & cum ad naturalem situm reduci nequeant, immobilitatem membri, cuius



cuius & figuram vitiant, causant: qua ratione in vertebriis dorsi gibbus nasci solet in puellis, quando ex consuetudine curvæ nendo sedent, & in infantibus, cum situ corporis non decenti cubant. Quo modo etiam principium curvaturæ dorsi, siue ab ortu, siue casu factum, se eo inclinando, tum in incessu, tum decubitu, nec opposito motu resistendo, augent. Sponte autem quoque non ossis vitio, sed ligamentorum, luxatio accidere potest, sicuti nunc explicabimus.

*In Ligamentis ofsum articularis, causa Motus impotentia.* Ligamentorum articulum obuoluentium & retinentium causâ, articulus luxari, motusq; illius sic cessare, vel alias citra luxationem fisci & impediri potest.

Ob solutam continuitatem ligamentorum, quæ utraque ossa in articulo, ne dislocarentur, retinere debebant, luxatio ipsorum, vel elongatio membri saltem sic à quibusdam appellata, fieri etiam potest. Quod tamen ex ruptura eorum, cum validissima sint hæc vincula, vix potest accidere, nisi tereti ligamento, quod femoris caput acetabulo nectit, ab ossibus per vim abrupto, hoc eueniat. Ex vulnere verò, ad ligamenta membranæ quæ extrinsecus articulum ambiunt penetrante: illaq; dissecante, idem contingere potest: sed quia in abditis sedibus hæc latent, rarius illud contingit. Ex di à pure, suppuratione illic factâ, ligamenta quoque possunt, quod in femoris cum coxa articulo, nonnunquam euenire solet: ob sinuosa vlcera, quæ illic circa membraneas sedes nata, iuxta nares & coxam, continuo pus album, viscosum fundunt, & intrinsecus ligamenta hæc corrumpunt. Quales multos sic affectos, luxato & abbreviato crure, claudos perpetuo mansisse, vel saltem, non luxato, pede longiore quàm par erat, claudicasse vidimus. Interdum quoque distractis nimium ligamentis, articulos ambientibus, & ex parte ab ossibus cui connascuntur, veluti dilaceratis, per impetum violentum articuli, in tortura, aut casu alio, motus articuli non nihil impeditus relinquitur, cum dolore ab initio diu sæpè molestus. Sicuti in genu articulo, & humeri aliisque accidisse, aliquando obseruavi: & ex violenta attractione ocrearum, cum induerentur, co-

xendicis articulum sic læsum sibi fuisse, Casparus Wolphius Medicus insignis, vetus amicus meus, mihi narrauit.

Sed & ob laxitatem ligamentorum horum, sicuti in articulis qui manifesto motu mouentur, hoc naturaliter illis accidit, vt laxiora sint, nec articulum qui libentius moueri debebat, stringendo artius impediunt, fit, vt hi articuli facilius quàm alij dislocentur, sic, si & hæc, quæ per se cæteris laxiora sunt, & alia quoq; si lata sint, magis adhuc ampliuntur, & quæ teretia sunt, elongentur, tunc membrum longius quàm par erat prominet, & vt facilius leuioiq; ab impletu luxatio fiat, causam adiuvantem præbent. Quæ ab ortu quibusdam eueniunt, vnde & membra flectere, extenderé vltra naturalem ipsorum terminum aliquoufque possunt: Vel vnum membrum altero longius habent: vel, vt aliqui voluerunt, dislocatis membris statim crescunt. Vel ratione ætatis, ob mollitiem ligamentorum & ossium appendicium, articulum efformatium, qui cartilaginosi aliquandiu manent, accidit. Et pleriq; ab aqueo humore pituitoso, seroso, has partes adeo irrigante, id fieri posse putarunt: quod tamen verisimile non esse, vel inde est manifestum, quod in leucophlegmaticis alijsq; arthritidis speciebus, diu illic humore subsistente, nulla tamen partis sequatur luxatio.

Exiccatis quoque & induratis ligamentis, constrictisque, & callosis, aut tophis in podagra, aut nodis, impeditis, articulorum illorum motus fixus & immobilis manet: aut alioquin ægrè mouentur, & stridorem nonnunquam & fragorem, ac si rumperentur, si maiori vi vrgeantur, edunt: cuius tamen soni causa etiam est, si vterius quàm moderato motu articulus moueri debebat, vi impellatur. Talis autem ligamentorum exiccatio, ex senio & febre acutissimâ, ossa quoque & vngues, vti alibi dictum exiccante, nonnunquam proficiscitur: Vel alia læsione, vnde callus vel nodus illic nascitur: Vel humore in tophum iuxta articulos conuerso, vt suo loco explicabitur.

Cartilago quæ capita ossium mobilium in crustat, si lubricitatem & visciditatem amittat, & ab iisdem causis exiccetur vel ex aspe-

*Laxitas ligamentorum, causa Motus impotentia.*

*Exiccatio ligamentorum, causa Motus impotentia.*

*In Cartilaginibus ossium articularum.*

*causa Im-*  
*mobili-*  
*ta.*  
*In Labi-*  
*is, causa*  
*illorum*  
*Immobili-*  
*ta.*

exasperetur, motui etiam, sicuti cardo rubigine infectus, officit.

Labiorum os aperientium affectus causa, ipsorum motum labefactari, atque oris amplitudinem vitari contingit. Si illa amputata, vel ita dissecta, ut ad motum sequi nequeant, existant. At alioquin, ut in lue Venerea euenire vidimus, vlceribus depasta & corrupta. Alia autem vitia illorum, dolore potius, ut suis in locis ostendemus, incommodant.

*In Palpe-*  
*bis, cau-*  
*sa illoru*  
*Immobili-*  
*ta.*

Palpebrae vitio, oculum non posse claudi, vix euenit: Nisi tumor aut excrescentia aliqua illic nata, hoc impediatur. Aperiri vero oculum non posse, saltem palpebra superiore dissecta, vix autem aliis de causis accidit.

*In Ocu-*  
*lo, causa*  
*illius Im-*  
*mobili-*  
*ta.*

Oculi morbi causa, ipsius motus vix deficit: Nisi ob tumorem illius, quo minus libere volutari possit, hoc fiat, dolore tunc praefertim motum impediante, Strabismus autem musculorum oculi causa, ut dictum, licet ab ortu natus sit, potius oritur. Et si oculo vulnerato vel effosso, hoc fiat, non solum motum amittit, sed & inutilis fit oculus.

### *Curatio.*

**C**uratio omnium horum immobilitatis generum, siue generalis multarum partium, siue propria singularum mobilium, sit paralytis: aut spasmus: aut contractio; aut gibbus; luxatio; fractura; vulnus; aliave laesio: instituitur pro ratione causae. Quam diximus esse, humorem nervos occupantem, vel musculorum tendines: intemperiem frigidam musculorum & nervorum: distentionem musculorum à flatibus: siccitatem vel inanitionem musculorum, tendinum, ligamentorum: tumorem durum in tendinibus, ligamentis: compressionem nervi: vulnus vel contusionem in nervo, musculo, illiusve tendine, ligamento aut membro: fracturam ossium: luxationem articulorum: & tandem organicum vitium in omnibus ad motum facientibus organis. In quibus singulis nunc quid praedicendum, aut agendum sit, proponemus.

*Paraly-*  
*seos a pi-*  
*tuita ge-*  
*nerali cu-*  
*ratio.*

Ab aqueis, excrementitiis vel pituitosis vel serosis humoribus, simplicibus vel permixtis, nervos irrigantibus aut prementibus, aut refrigerantibus, si paralytis fiat, si-

ue ea generalis multarum, aut particularis quarundam saltem sit partium, curandi ratio sequens erit instituenda. Qualem quoque conuulsioni seu spasma speciali sanando, quem ab eodem humore fieri crediderunt, similiter conuenire existimant, & adscribunt: nos vero, qui easdem quas generalis conuulsioni causas diximus, particularium etiam conuulsionum esse statuimus, quod generalia praesidia attinet, eadem quoque, quae in epilepsia explicata sunt, usurpada potius censemus: topica vero quae hic in pituitosa Paralyti conuenientia describuntur, etiam loco affecto in spasma, si modo conuulsio inde facta, vel dolor illud urgeat, communi Medicorum consensui subscribentes, adhibita, prodesse iudicamus: quae tamen in spasma membrorum attractio, plerumque non adeo topica remedia requirit, sicuti periculum subsecuturæ mox epilepsiae, eorum quae illam praecauet usum adhibere, nos admonet, sicuti illic tam ea quae intrinsecus assumuntur, quam extrinsecus eo nomine adhibentur, explicata fuerunt. Quemadmodum & si ad musculos humor pituitosus delapsus, illic cum dolore distentiones pariat, in defluxionibus curatio explicabitur.

In paralyti itaque pituitosa, ut vocant, siue generali vtriusque, vel vnius lateris, siue haec apoplexiam sequatur, aut per se incipiat, cum morbus sit chronicus, atque egri tam diu inusu medicamentorum, & decenti regimine, vix persistant, difficulter admodum curatio procedit: praesertim si senibus aut alioquin viribus exhaustis accidat: aut si in quibusdam locis cesset, vitium interdum perenne, in loquela, vel manibus aut alibi relinquit. Nec minus particularis resolutio longam curam requirit, quae & in generalem, cuius praenuntia sepe est, interdum definit. Periculosa quoque nonnunquam paralytis est, quia apoplexiam minatur, in quam, nisi sanetur, saepe finiri & aegrum iugulare solet. Interim tamen, si in cura paralyseos recte procedamus, nec in morbo diuturno desistamus, aegrique obtemperent, nec aliud grauius obstat, ea feliciter nonnunquam succedit: vel ex generaliore humore non circa originem subsistente, sed procedente, in particularem commutatur.

Quam

*Qua*  
*Spasmo*  
*particu-*  
*lari, quae*  
*ab eodem*  
*humore*  
*fieri cre-*  
*dunt, ple-*  
*rique ac-*  
*commo-*  
*dant.*

*Praedi-*  
*ctio in*  
*Paralyti*  
*pituitosa.*

*Ante-  
dix cu-  
randi in  
paralyfi  
pituito-  
sa.*

Quam curationem ita instituemus, vt ratione causæ, humorem neruos occupantem, ab illis aliò reuellamus, deriuemus, vel è corpore expurgemus: aut aliquin in parte discutiamus, vel absumamus; & ne noua excrementa generentur, à quibus humores hi vel augentur, vel fouentur, caueamus. Morbi verò causâ, vt intemperiem frigidam & humidam in neruoso genere corrigamus; Symptomatum tandem occasione, vt partes imbecillas robaremus: & ad musculos vim & spiritus rursus alliciamus: viribusque totius corporis prospiciamus.

Quæ hoc ordine fieri debent. Primum ad ea quæ per aluum purgant, nos conuertimus, atque ante fortiorum vsum communia excrementa intestinorum & fæces, assumptis iniectisque eluimus; sic enim illuie hac prius depositâ, cathartecorum vires ab ijs non refractæ, melius sese exerunt. Postea humorem pituitosum calidis incidentibus, appropriatis præparabimus. Quo facto, purgantia, quæ naturam ad humores ab alto euocandos, & per hanc viam naturalem excrementis expurgandis destinata, excernendos, egregie sollicitant, & sic à parte affecta reuellant, exhibebimus. Quæ omnia in hoc morbo diuturno, si non mox iuant, sæpè erunt repetenda, vt continuò naturam, quò ed potius sese exoneret, assuefaciamus. Per alias quoque sedes euacuationes mollemur, prægressâ tamen eâ quæ per aluum fit. Vt per os & nares: quæ sunt: vel vt excrementorum noua collectio præcaueatur, quæ cum in prima concoctione non rectè facta cumulari soleant, vomitus eo nomine, tam assumptis quàm actu concitandus, vel præcipuè, vt cerebri excrementa, quæ naturaliter per has vias cerebrum expellere solet, huc alliciantur, & sic quò minus neruorum ductum sequantur, diuertantur: quod in os naresque immisis, præstatur. Per habitum corporis, insensili transpiratione, sudoribus manifestis humores quoque elicimus: exhibitis quæ eos mouere possunt: vel extrinsecus admotis: vel per motus corporis. Aut manifestis aperturis illud molimur. Calefacimus etiam partes & roboramus: exhibitis & adhibitis varijs re-

medijs, quæ siccando, humorem possunt absumere. Interim vires tam assumptis nutrimentis, quàm alijs, quibus corpus conseruatur, rectè administratis, conseruabimus.

Hæc autem quæ tum ratione causæ, tum morbi, tum accidentium administratur, perficimus, vel per assumpta, seu deglutita in stomachum: vel per immissa in podicem: aut oris & narium amplitudinem: vel per adhibita extrinsecus corpori, membris resolutis, spinæ, capiti: vel per ambientem ærem: vel per motus corporis & animi; vel per aperturas manifestas. De quibus hoc ordine agemus.

Quæ ægris assumenda & deglutienda proponamus remedia, licet plura simul sæpè præstent, potissimum tamen ad expurgationes faciendas, per aluum, per vomitum, per sudores, aut alias vias exhibentur. Vel ad nutritionem, virium causâ, quibus & medicamentosa permiscemus, dantur. Aut ad præparationem humorum ante purgationes. Vel ad calefaciendum & roborandos neruos.

Ad expurgandos per aluum humores & excrementa, exhibita remedia, quæ eadem operâ, & interdum simul alterant, alia leuiora sunt, quæ reliquis purgantibus illorumque præparationibus præmittuntur: & per vices vsurpantur: ad aluum, quæ per longum decubitus & torporem constipari facile solet, apertam seruandam: formæque pilularum præsertim exhibentur. Conueniunt ex vstatis pilulis, Assaiereth, quia stœchadem recipiunt, Alephanginæ, quia aromata multa continent: quæ addito agarico magis efficares erunt: & dum fluit materia si rhabarbarum addatur, mastix, & vt potentiùs calefaciant, castorium.

Hoc modo: R. pilul. Assaiereth ʒ.ij. Alephang. ʒ.j.β. Agarici, Rhabarbari ana ʒ.j. Masticis ʒ.β. Salis gemmæ ʒ.j. Castorij ʒ.β. cum syrupo de Stœchade: fiat massa: Capiat ʒ.ij. pro vice; per vices.

Vel ex alijs parentur: R. Terebinthinæ ʒ.β. Capiat per se, vel dilutam cum Melle & aquâ Iuæ; estq; purgans & appropriatū singulare paralyseos remediū: cui species Hieræ aliqua addunt: Et sæpè exhibent.

Ex liquidis eodem modo assumptis con-

uenientibus, sic quoque minoratio, vt vocant, fieri poterit.

Cathartica dein fortiora exhibenda, vix tamen ante 14. diem morbi inuasionis, quod tempus præparatione humorum consumitur, ne vti sæpe fit in morbis ex defluxione, dum fluit adhuc, magis concitetur horum vsu, præsertim si lachrymæ, quæ materiam fundunt, compositiones has, vti in pilulis sæpe fit, ingrediantur: quæ proin si citius purgandum, omittendæ, & astringentia potius quædam permiscenda.

Pilularum forma conuenientissima hæc erit: R. pilul. Fœtid. Cocciarum ana ʒ. j. de Oppopanace ʒ. ʒ. cum syrup. de Stœchade fiant pilulæ: si non satis operantur acui possunt trochif. Alhandal gr. v.

Pilularum Chamæpitheos ʒ. j. exhibita, idem magno successu præstabit: de quibus postea.

Potio talis loco pilularum sumi posset: R. el. Diaphæn. Indi mai. ana ʒ. ij. syrupi Diacnicu ʒ. vj. aquæ Cinamóm. ʒ. ij. aquæ Chamæpith. q. s. fiat potio.

Vel R. tab. Diacarthami tuæ descript. ʒ. j. ʒ. tab. de Citro sol. ʒ. ij. dissoluantur cum aqua Saluiæ, Pro vno haustu.

Decoctum loco horu fieri potest: R. sem. Carthami, fol. Senæ an. ʒ. iij. Hermodact. ʒ. j. rad. Liquirit. ʒ. ʒ. Passul. par. xx. Ficuū par. x. femin. Anisi ʒ. ij. flor. Rosmarini p. j. fiat decoctio: infunde Agar. troch. ʒ. j. ʒ. Turbith. ʒ. j. Zingib. ʒ. ʒ. Cinamom. ʒ. j. fiat expressio: dissolue Mellis ros. lax. ʒ. ʒ. fiat potio.

Per vices, purgantia repetenda erunt, si morbus perseveret, præsertim si magna humoris defluxi sit copia, vt in generaliore paralyti, & corpus plenum. Quod fiet de nouo humore præparato, rursusque purgato: vel exhibendo aliquandiu, per triduum, interpositis die vno vel altero, interim quiescendo, vel singulis mensibus: aut veris & autumnis temporibus: ex sequentibus parata.

Pilularum forma ad quæuis recipienda, conuenientissima est: comendanturq; præsertim pilulæ Chamæpitheos vel tuæ appellatæ, quos Matthiæolus præsentaneum statuit remedium, & Bened. Victor gloriosum vocat adiumentum, Si ʒ. j. ante somnū noctur-

num quotidie: vel saltem bis in septimana sumatur: quarū descriptionem ab vtroq; eodem modo prolata, sic magis accommodatam reddimus: R. colocynth. præpar. ʒ. ʒ. Scammoneæ præpar. ʒ. j. Turbith. ʒ. j. ʒ. Agarici ʒ. ij. Rhabarb. ʒ. j. ʒ. pul. Hieræ simpl. ʒ. ʒ. Zingib. ʒ. j. Spicæ, Salis fossilis an. ʒ. ʒ. fl. Lauandulæ, Stœch. ana ʒ. j. Oppopanacis ʒ. ʒ. Masticis ʒ. j. Castorij ʒ. ʒ. olei Maioranæ & Rosmarini perdestillat. ana guttas v. succi Chamæpith. rec. extracti & cocti instar extracti q. s. fiat massa.

Syrupus vsualis sic præparabitur, minori labore & sumptu; R. rad. Acori veri ʒ. ʒ. Saluiæ siccæ ʒ. j. Chamæpith. ʒ. vj. florū Stœchados & Lauandulæ an. ʒ. ʒ. sem. Carui ʒ. ij. fiat decoctio: & in colatura infunde Agarici ʒ. j. ʒ. fol. Senæ ʒ. iij. leuiter ebulliant: aromat. Cinam. ʒ. ij. Zingib. ʒ. j. adde Mellis quar. j. ʒ. fiat syrupus ad consistentiam coctus ad vsu: Tentando primum exhibitione ʒ. j. ʒ.

Vel compositus admodum sic parabitur: R. rad. Acori veri, Ireos an. ʒ. j. rad. Angelicæ vel Imper. Enulæ, Pyrethri, Peucedani, Aristol. rot. an. ʒ. ʒ. Galangæ, Cyperi, Valerianæ, Rubiæ an. ʒ. ij. herb. Saluiæ, Maioranæ, Betonicæ, Melissæ, Pulegij, Polij, Hysopi, Thymi, Serpilli an. m. j. Iuæ m. j. ʒ. flor. Stœchados, Lauandulæ, Anthos, Primulæ an. p. j. feminum Carui, Fœnic. Sileris mont. Pæoniæ ana ʒ. ij. Eruçæ, Rutæ, Viticis, Angelicæ ana ʒ. j. baccharum Lauri & Iuniperi an. ʒ. ʒ. rad. Liquirit. ʒ. j. Ficuū par. xij. Passul. par. xx. femin. Carthami ʒ. ij. fol. Senæ quar. j. ʒ. Turbith. ʒ. ʒ. Agarici ʒ. vj. Hermodact. ʒ. ij. rad. Serpentinae ʒ. ij. Mechoacæ ʒ. iij. fiat decoctio secundum artem, colatura aromat. Cinamom. ʒ. ʒ. Zingib. ʒ. j. ʒ. Salis gemmæ ʒ. ʒ. adde Sacchar. ʒ. ʒ. decoquatur ad consistentiam syrupi: Capiat pro vice ʒ. ij. vel plus.

Electuarium vsuale idem præstabit: R. el. Diaphæn. Indi mai. tab. de Citro sol. ana ʒ. j. ʒ. tab. Diacarth. tuæ descript. ʒ. vj. pulu. Hieræ colocynth. ʒ. iij. Masticis, Oppopanacis, Sagapeni ana ʒ. ʒ. Nucis mosch. Zingiberis, Cinamomi, Gariophyllorum ana ʒ. j. cum syrupo de Iuæ, vel de Stœchade: fiat electuar. Capiat à ʒ. iij. ad quatuor.

Per vomitum exhibitis etiam fortissimis, vt Stibio, aliqui expurgationes moluntur:



cuius tamen vsu resolutos subito factos, qui prius non erant, bis terve reuera notavi. Idcirco leuioribus potius (nisi sponte succedat, aut actu irritetur) propinatis, in consuetis citius, moueri debet.

Per sudores sæpe repetitos, decocti Guaiaei, Chinæ, aut aliorum exhibitione, cum alia ratione auferri nequit, hic morbus diuturnus sæpe sanatur: quod accommodum fiet, si in eodem Saluia, Camepithys coquantur: illudq; Galanga & Nuce mosch. aromatizetur. Veluti sic: R. Sarfæ parillæ ʒ.ij. Guaiaci ʒ.ij. rad. Ireos ʒ.j. rad. Enulæ ʒ.β. rad. Acori ʒ.β. fiat decoctum in Aqua secundum artem: Pro sudatorio & ordinario potu.

Sed & alijs exhibitis interdum sudores mouere, plurimum competet: vt rob de Ebulo ʒ.ij. dissoluantur cum aqua Chamæpith. & Saluiæ: Bibat.

Menses, Hæmorrhoides, assumptis hæc prouocantibus remedijs, si subsisterint, vtiliter promouentur.

Quæ ad nutritionem & sustentationem corporis necessariè assumenda illis conceduntur, parcius & rarius administrari debent. Parsimoniâ enim in cibo vti, atq; famem interdum tollerare, humorum prouentum admodum impedit. Quod fiet, si bis tantum in die cibum moderatè sumant: vel cœnam aliquando intermittat. Aut sudoribus aliquandiu continuatis alijsque euacuationibus, in diæta vt vocant, faciendâ, cibi detractionem coniungant. Vel si alioquin parcè, cibis illis administretur.

Qui si quoque euchymus sit, sufficere poterit, paucioraq; excrementa progignet: vt si Qua; & ex Auiculis, turdos, merulas, alaudas, fringillas, ficedulas, passeris comedat: vel ea quæ peculiari vi huic morbo resistere pleriq; scribunt: vt Columbas syluestres potissimum, Turtures, Hirundines, Leporis cerebellum, quod & confectionibus proinindunt. Quæ assa potius quàm elixa competent, fiuntq; insuper medicamentosa, si Saluia, Maiorana, Thymo, Serpillo, alijsq; odoratis & Aromatibus imprimis Nuce mosch. configantur infarcianturque.

Pani dum pistatur, si semina Carui, vel Fœniculi, vel Anisi vel Melanthij misceantur,

fiet conuenientior. Etsi interdum aromatico pane, Saccharato, vti eleganter parare solent, vel Mellito, quæ panem Vitæ, & Ebfuchen/ vocant, vtatur.

Pineæ nuces, Pistacia, hîc admodum laudantur, & neruosum genus corroborare creduntur.

Bellarium ex Sinapi, condimenti loco mensæ adhibitum, vehementer probatur: vti & Cappares salitæ

Sal, quo cibi saliantur, Theriacale & de Viperis factum, probatur. Vel sequens: R. Salis ʒ.j.β. Nucis mosch. ʒ.j. rad. Pyrethri ʒ.β. fol. Saluiæ, Maioranæ ana ʒ.j. misce.

Si parum bibant, proderit. Et à vini continuo vel meratoris vsu abstineant, illiusque loco Hydromel bibant: quod ex Aquæ mensuris decem & Mellis vnâ, decoctis ad consumptionem tertiæ partis, & in fine aromatizatis parabitur. Vel si illud compositum magis bibat, vti mox declarabitur.

Ad præparandos humores quæ exhibentur, purgationibus cathartics præmittitur, in principio morbi: & cum per morbi progressum purgatio reiterari debet repetitur. Sed & alioquin exhibita, quia humores simul absument & alterât, vti dicitur, iuant.

Fit hoc syrupis hoc modo: R. syruporum de Stœchade, de Hyfopo ana ʒ.j. Mellis anthosati ʒ.β. aquar. Saluiæ, Chamæpith. Hyfopi ana ʒ.j.β. fiat Iulep, aromat. pulu. Ros. nouellæ: Pro quatuor aut quinque vicibus.

Conueniunt & syrupi de Iua Nicolai, conseruationis Acori, Mel scylliticum: oxymelita etsi probent, omittimus: aquæ probantur Maioranæ, Betonicæ, Primulæ, Melissæ.

Horum loco Hydromel cum Acoro, Stœchade vel Lauandulæ floribus, vel cum Saluia decoctum, valde competit.

Decoctum quoque sequens horum loco propinari potest: R. radic. Acori veri, Ireos ana ʒ.vj. Cyperi, Enulæ ana ʒ.ij. herbar. Saluiæ, Maioranæ, Chamæpitheos, summitat. Thymi ana m.j. Hyfopi, Betonicæ, Pulegij, Calamenthi ana m.β. flor. Rosmarini, Stœchados vel Lauandulæ, Sambuci, Primulæ ana p.j. semin. Anisi, Fœniculi ana ʒ.ij. Rutæ ʒ.j. radic. Liquirit. ʒ.j. Passul. quar.β. fiat decoctio; addendo Mel vel Saccharum q.s. ar-

mat. Cinamom. vel pulu. aromatico aliquo: Vtatur loco iulepi.

Ad calefaciendum neruos inertes & frigidos, & simul humores absumendos, quæ propinantur remedia, admodum calefacere debent, adeo vt febrem accendere possint, cum sic ea superueniat, totum corpus tunc incalcescat, illiusq; humiditates egregiè absumantur. Quibus ea quæ neruoso generi appropriata sunt, & peculiari vi huic morbo resistunt, permiscuntur. Hæc aut post purgationes mox, totoq; morbi progressu vsurpantur: manè ieiunis, vel versus noctè semel iterum quæ exhibita: Formâ vel decocti, infusionis, aquarum, puluerû, electuariorum, pilularû, quarum singulariû selectiores proponemus.

Decocta, quandoq; eo nomine exhibentur, gratiora: cum ingrata, hac forma, fastidiant; Quale est Hydromel compositum, admodum efficax, si interdû in principio mensæ; vel alioquin quoq; bibatur; quod R. Aqua t̄b. xx. Mellis t̄b. j. rad. Acori, Saluæ siccæ ana ʒ. j. rad. Ireos ʒ. ʒ. decoquantur ad consumpt, tertiæ partis, aromat. in fine Cinam. Nucis mosch. ana ʒ. ij. Piperis ʒ. ʒ. fiat melicratum. Quod & cum Saccharo eadem ratione fieri potest.

Alia decocta medicata in formam syrupi reduci possunt, & vsurpari: quæ ex enarratis præparantibus & purgantibus, demptis ijs quæ purgant, decoqui possunt, vt illic dictum, & exhiberi.

Vel ex succis hoc modo: R. succorum Saluæ & Chamæpith. ana ʒ. j. ʒ. succi Maioranæ ʒ. j. aquarum Lauandulæ ʒ. ij. Vini præstantiss. ʒ. iij. Sacchari vel Mellis ʒ. vj. decoquantur ad consistentiam syrupi, aromat. nucis Mosch. & radic. Galangæ ana ʒ. j. Capiat sæpè cochl. vnum.

Infusiones in Vino præsertim factæ iuant. Et si enim vinum, præsertim si potens sit, minimè conueniat, tamen aliorum vires sibi concilians, easque vehiculi instar neruoso generi deferens, vtile fiet, medicamenti loco interdum sumptum. Paratur autem ex simplici infusione Saluæ, vel alterius conuenientis plantæ.

Vel compositum sequenti modo: R. rad. Acori ʒ. ij. fol. Saluæ siccæ ʒ. j. ʒ. Chamæpi-

theos, herbæ Paralytis ana ʒ. j. Absynthij ʒ. ʒ. nucis Mosch. ʒ. j. Zedoariæ ʒ. ʒ. Vini albi vel Musti recentis vel Vini parum cocti t̄b. xx. Si rasuræ Guaiaci, ad t̄b. j. addas, vinum erit efficacius.

Aquæ stillatiæ, vel per infusionem factæ, magni à plerisque fiunt. Quæ per se manè dantur: vel alijs permiscuntur, tum simpliciores, Rosmarini, Saluæ, Maioranæ, Thymi, Lauandulæ: præsertim si ex illis prius in vino maceratis aridis liquor eliciatur. Cinamomi aqua vti grata est, sic & efficax: Chamæpitheos aqua & Primulæ, imprimis appropriatæ sunt.

Compositæ multæ in hosce vsus fiunt, quales in apoplexia quoque descripsimus. Scopo rectè accommodata hæc quoque erit: R. rad. Acori veri, Angelicæ vel Imperatoriæ, Enulæ ana ʒ. vj. fol. Saluæ, Maioranæ, Rosmarini, iuæ, Rutæ, florum Lauandulæ, Primulæ ana ʒ. ʒ. Galangæ, Nucis mosch. Zedoariæ, Cinamom. Gariophylli ana ʒ. iij. pulueris infundantur in Vino forti, vel prius destillato: donec pulvis instar fiat: postea eliciatur liquor: Detur frequenter manè coch. j. Efficacior erit, si in portione illius paulum Castorij infundas & des: Vel si fœtor metuat, Mosci grana aliquot addantur.

Pulueres parantur accommodati varij. Qui vel per se à ʒ. j. ad ʒ. j. ʒ. bibuntur dissoluti in aquis Saluæ, Maioranæ, Lauandulæ, Cinamomi, Chamæpitheos: & Melle quoq; anthosato, vel anacardino, vel scyllitico, alijsve syrupis. Vel Sacchari octo partibus ad vnam puluerum additis, sic assumuntur. Vel prius dissoluto saccharo cum aquis dictis fiunt tabulæ: danturq; tunc maiori quantitate. Vel conseruis & electuarijs permiscuntur.

Ex vsitatis præcellunt pulu. Diamosci dulcis & amari, Diacameron. Pluris cū moscho, Rosnouellæ. Conueniunt & alij aromatici.

Quorum loco & sequentes parari possunt, simplicior de nucè moschata dictus, hoc modo: R. Nucis mosch. ʒ. iij. rad. Pyrethri ʒ. ij. fiat puluis: Cuius si ʒ. j. Cum aqua Saluæ & melle Anthosato detur aliquot matutinis, singulare erit remedium.

Alter de nucem moschata, cõpositus magis, talis erit: R. Noces moschatas, non assas, vt

volunt, num. iij. vel 3. β. rad. Pyrethri 3. j. fol. Maioranæ, Saluiæ, fl. Lauandulæ, Anthos ana 3. β. feminis Nigellæ 3. j. Cina n. 3. j. β. Gariophyl. Galangæ ana 3. β. fiat puluis. Ex quo si additis Sacchari 3. ix. dissoluris in aqua Saluiæ, fiant tabulæ, vices supplebunt tabularum de nuce moschata dictarum.

Tertius aromaticus appellatus sic parabitur: R. Cinamom. 3. ij. Nucis mosch. Galangæ ana 3. j. β. Gariophyl. 3. j. Piperis, Zingib. Zedoariæ, fem. Fœniculi, Anisi, Sileris mont. Pæoniæ, fol. Maioranæ ana 3. β. misce: fiat puluis.

Quartus compositus sic fiet: R. rad. Pyrethri 3. j. Azari 3. β. Angelicæ 3. j. β. seminum Ameos, Carui ana 3. j. Nucis mosc. Galangæ, Cinamom. Gariophyl. ana 3. β. trium Piperum, Cardamomi vtriusq; Cubeb. Zingib. Spicæ, Ligni aloës ana 3. j. Masticis 3. β. cinerum Hirundinum & cranij Hominis ana 3. β. Coralli 3. β. fiat puluis.

Ex conferuis & condituris. Conferua Chamæpithæos cum saccharo facta, si paralyticis noctu cubitum ituris detur, continuatis vicibus, certò iuuare dicitur. Conferua item Saluiæ cum Melle despumato & cocto parata, magnum adfert emolumentum. Conditura similiter vel conferua Acori, à plerisque probatur.

Ex commixtione plurium talis parabitur conferua: R. conf. Saluiæ, Chamæpith. ana 3. ij. cond. Acori veri & Nucis mosch. ana 3. j. β. confer. Primulæ veris 3. j. confer. Maioranæ, Anthos, flor. Stœchados vel Lauandulæ, Zingib. condit. ana 3. β. misce: Capiat manè & serò 3. j. β.

Additis pulueribus electuarium sequens conueniet: R. Confectionem hanc ex conferuis & condituris factam: adde confect. Anacardinæ 3. β. & Pulueris superioris præscripti, qui incipit: R. rad. Pyrethri, &c. 3. β. Mellis anacardini q. f. fiat electuarium. Utatur per se, superbibendo aquas Saluiæ, Maioranæ, Chamæpith. &c. vel dissoluatur cum illis: Bibatur.

Anacardinæ confectionis 3. j. sumpta prodest: præsertim si quotidie bis sumatur: à cuius vsu si febris accendatur, vti suprà dictum, duplici nomine proderit.

Opiatæ à Practicis admodum commendantur: quæ mihi propter opium, etsi antiquæ sint, suspectæ sunt in neruorum stupore & imbecillitate.

Dant autem Theriacam, Mithridatum Auream Alexandrinam: ad 3. j. cum aqua Saluiæ.

Aur hæ alijs permiscetur remedijs, hoc modo: R. Acori conditi 3. j. confer. Anthos, Stœchados, Saluiæ ana 3. β. Mithridati, Aureæ Alex. ana 3. ij. Pliris cum moscho 3. j. syr. de Stœchade q. f. misce.

Pilulæ ex ingratis, & quæ alijs formis difficulter assumuntur parandæ, sic fient: R. radic. Pyrethri, Piperis ana 3. j. Mumie vel Bituminis 3. β. Euphorbij, Castorij ana 3. j. olei Succini & Terebinthinæ ana gut. iij. excipiantur Melle anthos. vel scyllitico, fiat massa: formentur ex 3. β. pillulæ x. Capiat 5. noctu cubitum iturus, frequenter.

Olea chymica, Saluiæ, Maioranæ, Cinamomi, aliorumq; aromatum, Saccharo permixta & vsurpata: vel tabulata, admodum sunt vtilia.

In podicem suppositoria induntur: & clysmata infunduntur: tum ad aluum sollicitandam, & soluendam, tum ad calefaciendum quoq;. Quæ tum ante reliquorum catharticorum vsum, vt moris est, tum per morbi progressum vsurpantur: simili ratione parata, sicuti in apoplexia præscripsimus: inter quæ tamen leuiora cum sensus excretionis, non vt in apoplecticis, hic sit sublatu, plus quàm in illis, vti & fortiora adhuc amplius, operabuntur.

Suppositoria talia fieri possunt: R. Mellis, succi Mercurialis, vel Betæ, hyemis tempore ana 3. ij. coquantur parum, postea adde Fellis tauri 3. ij. iterum coquantur ad suffic. adde radic. Pyrethri 3. β. Salis gemmæ 3. j. fiant suppositoria.

Clysmata excretionem sollicitantia, & quæ simul alterant, valde conueniunt: cauendo à nimium emollientibus, quibus spina amplius relaxata potius lederetur, vt non temerè vulgus clysmata paralyti occasione præbuisse in colicis credat: quæ tamen rectè parata, & profunt, & si causa circa dorsi inferiora lateat, veluti topica sunt remedia.

Minus operosum enema sic parabitur: **R.** rad. Liliorū 3. ij. Maluæ, Betæ, vel Mercurialis, Saluïæ, Rutæ, Hyfopi, Origani, Chamæpith. ana M. j. fl. Chamomil. Lauandulæ ana P. j. sem. Carui 3. ij. baccarum Lauri 3. j. Furfuris P. j. fiat decoctio, addendo parum Lixiuij: dissolue Mellis 3. j. β. Butyri 3. β. Hieræ Gal. 3. ij. Salis parum: fiat clyster.

Si ex succis fiat, potentius operabitur: **R.** succorum Betæ vel Mercur. 3. ij. succi Rutæ, Hyfopi ana 3. j. Mellis 3. ij. olei Nucum vel Butyri 3. ij. dissoluantur Iure salito, vel decocto Saluïæ, vel Vrinâ pueri: fiat clyster.

Ex præcipuis, quæ in hoc casu competunt concinnatū tale fiet: quod & demptis quibusdam, nihilominus erit efficax: **R.** radic. Acori veri, (palustris enim uti vult Rond. non placet) Ireos ana 3. j. herb. Betæ vel Mercurial. Maluæ, Saluïæ, Maioranæ, Rutæ, Betonicæ, Chamæpitheos, Paralyfis herbæ, Hyfopi, Origani, Pulegij, Calamenti, Centaurij min. ana M. vnum paruum, vel maiorem, si pauciores herbæ sumantur, fl. Chamomil. Stœchados, Lauandulæ, Anthos, Primulæ ana P. j. sem. Carui, Fœniculi, Vrticæ ana 3. ij. seminis Carthami 3. j. Agarici 3. β. fiat decoctio: dissolue in f. q. Mellis anthosati vel communis 3. j. β. Hieræ Gal. vel Hermetis vel Logodij, vel el. Indi, Benedict. lax. ana 3. j. vel de paucioribus maiori dosi, olei Rutacei, Nardini vel Costini ana 3. j. β. Salis fossilis 3. j. fiat clyster.

Ori & faucibus quæ indi debet, hæc sunt: Vel actualis irritatio fit faucium, ad vomitum eliciendum, quod in consuetis, vel prius ingurgitatis, uti in exhibitis vomitorijs dictum, procedit.

Vel sunt masticatoria, pituitam elicientia & siccantia, simulq; alterantia; quæ valde conueniunt. Et in paralyfi à capite euacuât, & à neruorum principio reuellunt. In tortura oris simul deriuant, si sæpè matutino tempore vsurpentur.

Nux moschata frequenter manducata, excellens ab omnibus statuitur remedium.

Ex Sinapi bellarium paratum, ore retentum, potenter operatur.

Compositio vtilis sic fiet: **R.** Nucis mosc.

3. ij. radic. Pyrethri, seminis Sinapi ana 3. j. β. Cubebæ. Piperis, Galangæ, rad. Angelicæ ana 3. β. Masticis 3. j. ceræ parum: fiant masticatoria. Si Castorij tantillum addatur, & illius odorem non recusent, efficacissimum erit.

Gangarismata idem præstant: **R.** radic. Angelicæ, Pyrethri, Acori veri ana 3. β. herb. Saluïæ, Maioranæ, Thymi, Hyfopi, Origani ana M. j. seminis Sinapi 3. ij. Staphisagr. Piperis longi ana 3. j. Nucis mosc. 3. β. fiat decoctio in aqua: adde Mellis scyllitici vel anthosati 3. j. β. misce. Colluat vel gargariset os. Addi possunt seminis Carthami 3. vj. Turbith. 3. β. vel Esulæ 3. ij. sed si periculum sit ne deglutiant, omittenda sunt.

Errhina liquida in nares attracta, vel in resupinato ægro guttatim in nares infusa, pituitam etiam per has vias prouocant: **R.** succorum Anagallidis flore purpureo, radic. Betæ ana 3. j. succi Maioranæ, Rutæ ana 3. β. sem. Nigellæ, rad. Pyrethri an. 3. β. Castor. 3. β. Mellis scyll. 3. β. Vini 3. j. fiat errhinum.

Vel illinantur nares sequenti: **R.** succi Cyclaminis vel Anagallidis ana 3. ij. succi Maioranæ 3. j. trochif. Alhandal. 3. j. Pyrethri, sem. Nigellæ ana 3. β. Castorij 3. β. Mellis anacardini q. s. fiat linimentum.

Vel insuffletur puluis aliquando in nares: **R.** rad. Pyrethri, seminis Nigellæ ana 3. β. Castorij 3. β. Euphorbij gr. vj. fiat puluis tenuissimus.

Suffumigia naribus quoq; excipiuntur. Ut sunt suffitus, qui in balneo sicco parantur, de quibus postea. Et præcipuè adhibita, quæ cerebrum siccando, defluxiones nouas præcauent, atq; illud cum neruis roborauit.

Adhibentur extrinsecus corpori in paralyfi, tum partibus resolutis, tum spinæ, tum capiti: ea quæ calefacere quoq; admodum, ut neruorum calorem & membrorum reuocent, & quæ humores exiccare & exhaurire debent, & neruos, cerebrumq; rescire. Quæ & spasmo humoralis competunt. Hæcque tum per illinitiones vnguentorum, aquarū: vel admota emplastra, indumenta, cucuphas: vel balnea & fots administrantur.

Illinitiones autem præcipuè vsurpantur. Quæ circa neruorum regionem, illic ubi affectus



fectus in ipsis latet, adhiberi debent. Vt in generali paralyfi circa cervicis posteriorem regionem, nucham dictâ, vbi & si intra calvariâ malum lateat, quoque vires eousq; protendere possunt. Aut in alijs particulâribus partium resolutionibus, in dorfi, aut aliorum membrorum sede affectâ. Interdum & partibus resolutis non incommode applicantur, cum spiritus in eas alliciant, & vires per communicationem, ad ipsorum affectos nervos vsque demandent: quo nomine etiam manus & pedes ipsorumq; partes, si resolutæ sint, & buccæ in oris tortura, illis illinuntur. Quæ cuiusque partis, vel spinæ inunctiones, melius operabuntur, si actu calida sit illinitio: si validâ accedat per manus frictio: atque aquâ Vitæ manus quibus fricamus, vel pars quæ fricanda erit, prius madesacta fuerit. Hic quoque obseruandum, ut à leuioribus ad fortiora sensim in hoc morbo diuturno, progrediamur. Hæc autem remedia in forma vnguenti vel aquæ administrantur.

Vnguenta ex varijs fiunt oleis, maceratione, expressione, destillatione factis: quæ ad hosce vsus asseruantur. Imprimis oleû ex semine Trifolij asphaltitis, quod de Andacoca dicitur, pro singulari habetur præsidio.

Ex oleorum autem commixtione, talis fiat illinitio: R. oleorum, Rutacei, Costini ana 3. j. de Lateribus, Vulpini, Lumbricorû, ana 3. β. misce: fiat inunctio.

Ex adipe anserino singulare hoc præsidium fieri poterit: R. Anserem deplumatum, euisceratam, Vino albo ablutum: & configatur vndique Gariophyllis & Nucem moschatâ, incisis prius, ut intrudi possint: & infarciatur fol. Saluæ, iisdem folijs addendo, pingued. Vulpis vel Felis sylvestris 3. j. pulu. Myrrhæ, Thuris ana 3. β. Castorij, Euphorbij ana 3. β. Lumbricorum in aceto suffocatorum numer. xx. insuantur omnia: & torreatur anser in veru. Aceto albo supposito in sartagine, in quam ichor & pinguedo exsulantia, distillent: posteaq; refrigerato liquore, innatans axungia colligatur: ad hosce vsus præstantissima.

Alia inunctio magis efficax, sic fit: R. olei de Lateribus, Nardani ana 3. j. de Terebinth.

3. vj. de Euphorbio 3. β. Thuris 3. iij. sem. Nigellæ 3. j. β. Castorij 3. j. Croci 3. β. Ceræ parum: fiat linimentum.

Vel si potentiùs operari debet: R. oleorum Laurini, Sinapini per expressionem ana 3. j. β. gummi sequentium dissolutorum in Aqua vitæ, nempe Oppopanacis, Galbani, Ammoniâci, Serapini ana 3. β. Euphorbij 3. ij. misceantur, adde ol. Terebinth. 3. β. olei de baccis Iuniperi, & de Spica ana 3. j. ol. Gagatis vel Succini per destillatio. 3. β. rad. Hellebori albi, Pyrethri, feminis Sinapis, Piperis ana 3. β. Salis ammon. 3. ij. Castorij 3. j. Ceræ q. s. fiat vnguentum.

Oleum præstantissimum hoc erit: R. oleorum expressorum, oliuarum antiqui vel lucernarum: vel in quo extincti sint Lateres 3. iij. olei Nucum antiqui 3. ij. olei Laurini, Sinapini, ana 3. j. olei de baccis Iuniperi 3. β. Spicæ 3. j. de Terebinth. destill. 3. vj. Petrolei 3. iij. succorum Saluæ, Rutæ, Chamæpith. Ireos ana 3. j. aquæ Vitæ 3. ij. axungie Vulpis & Anseris ana 3. j. β. Lumbricorum terrestrium prius Vino ablutorum numer. xx. gummi Oppopan. Galbani, Ammoniâci Serapini, dissol. in Aceto squillitico ana 3. vj. Storacis, Myrrhæ, Masticis, Thuris ana 3. β. Euphorbij 3. j. β. radic. Pyrethri, Hellebori, Costi, Galangæ, Nucis mosch. Piperis, feminis Sinapi, Trifolij bituminosi, Nigellæ, flor. Lauandulæ, Castorij ana 3. j. Anacardi, Salis ammon. Sulphuris viui Bituminis ana 3. ij. croci 3. β. rite omnia præparata, puluerisata & permixta, coquantur ad succorum consumptionem, igne lento: seruetur oleum ad vsum, per se vsurpatum, vel alijs permixtum.

Olea stillatitia reliqua ex plantis, præter spicæ iam dictum, & iuniperi, quæ passim extant, magnaq; quantitate parantur, conuenientia sunt Saluæ, Rutæ, Aromatum item: quæ hisce linimentis addita, vires ipsorum admodum augent.

Vsitata vnguenta hic conuenientia sunt de Bdellio, Agrippæ, Arogon, Marciatum, & similia; per se vsurpata vel reliqs permixta.

Aquæ per infusionem diutinam in loco calido factæ, vel calore elicite, præsertim si cû illis oleû quoq; copiosius exstillet, egregie pe-

giè penetrant, & loco vnguentorum illitæ, plurimum profunt.

Simpliciores sunt si Saluia, Rosmarinus, Thymus, Lauandula, Stœchas, aliæq; appropriata, odorata in aqua Vitæ macerata, adhibeantur.

Ex compositis, Aquæ vitæ dictæ compositæ, multæ in hosce vsus fiunt. E quibus hæc admodum erit conueniens: R. radic. Ireos, Peucedani, Angelicæ, Acori veri, Galangæ vtriusque, Costi, Pyrethri, Hellebori ana 3. j. Cyperi, Zedoariæ, Zingib. ana 3. β. fol. Saluiæ, Thymi, Rosmarini, Rutæ, Maioranæ, Chamæpith. ana 3. vj. florum Lauandulæ vtriusque, Stœchados, Hyperici, Primulæ ana 3. β. semin. Sinapis, Nigellæ ana 3. ij. granorum Iuniperi & Lauri, ana 3. j. Nucis mosch. 3. β. Gariophyl. Maceris ana 3. ij. Piperis longi & rotundi, Cubeb. Spicæ, Ligni aloës, Santali citrini ana 3. j. Croci 3. β. Thuris, Myrrhæ ana 3. β. Storacis liquidæ 3. iij. Euphorbij, Castorij ana 3. ij. Lumbricorum terrestrium vino ablutorum num. xx. Salis nitri 15. β. præparata, puluerisata, irrorentur Vino generosissimo, donec fiat instar pulvis: destillentur f. artem.

Balsama dicta artificialia, quæ plus olei reddunt, varijs modis parantur.

Simplicius vnum sic paratur: R. Ebuli fol. & radic. Saluiam, Lauandulam, Rutam omnium cum folijs & floribus, recetiorum, contusorum, irroratorum, aqua Vitæ ana m. j. Castorij 3. ij. Terebinthiæ 3. β. Salis ammon. 3. ij. Lumbricorum lotorum vino albo, num. xij. eliciatur aqua igne cinerum; ad hosce vsus accommodata.

Compositum balsamum sic fiet: R. Thuris, Masticis ana 3. j. Storacis Benzoini, Myrrhæ, gummi Oppopan. Bdellij, Eleni, Serapini, Ammoniæ, Sarcocollæ ana 3. β. Euphorbij 3. iij. Aloës, Ladani ana 3. ij. Castorij 3. j. radic. Galangæ, Costi, Nucis mosch. ana 3. β. fol. Saluiæ, flor. Lauandulæ, Chamæpitheos ana 3. iij. baccarum Iuniperi 3. β. sem. Nigellæ 3. j. Terebinthinæ vel resinæ Laricæ, ad pondus omnium, nimirum 3. x. destillentur f. artem effluet aqua & oleum: quæ simul vel separatim inungi possunt.

Si spina quoq; confectioe Anacardina, & Aurea Alex. dissolutis in aqua Vitæ, in qua Saluia infusa fuerit, vngatur, efficax erit remedium.

Emplastra ex iisdem vnguentis, addita Pice & Resina, quæ & per se profunt, vel Cerata, auctâ ceræ quantitate, parata, idem præstant, & quia diutius hæerere possunt, potenter operantur. Quæ spinæ etiam vel parti affectæ admota, gestantur.

Ex vsitatis laudantur, de baccis Lauri, de Betonica, Ceroneum: Vt R. empl. Ceronei, de Baccis lauri, ana 3. j. Thuris 3. β. Castorei, Euphorbij ana 3. j. seminis Nigellæ, Nasturtij, Sinapis, rad. Pyrethri, Croci, Salis nitri ana 3. β. cum ol. de Lateribus vel Terebint. fiat emplastrum.

Pulvis Lumbricorum, cū Pipere & Melle, emplastri instar nuchæ applicatum, mirè prodest.

Integumenta atque indumenta, non tantum calorem in partibus retinendo & fouendo, profunt, pellicea, plumea: sed ex illis etiam quædam proprietate iuuare creduntur, si membrum resolutum illis inuoluatur, induatur vel integatur: vt Vulpinæ pelles & Leporing; Anserinæ plumæ, & Columbarum, Gruis, Auicularumque syluestrium. Quæ & vti & alia quæ corpus ambire debent, si Thure, Mastice, Storace, Benzoino, Aromatibus, alijsque odoratis, carbonibus iniectis suffumigentur, efficacius id præstabunt.

Capiti & ceruici, hæc formâ siccâ adhiberi possunt: R. radic. Acori, Galangæ, Ireos, fol. Saluiæ, Maioranæ, Melissæ, flor. Lauandulæ, Stœchados. Anthos ana 3. j. sem. Coriandri, Nigellæ ana 3. β. Nucis mosch. 3. ij. Cubeb. 3. β. Thuris, Masticis, Storacis calam. ana 3. j. β. fiat pulvis: Pro puluino. Vel sacculus qui subternitur capiti, & ceruici; Vel pro cucupha, quæ gestatur.

In Arena, vel Cineribus calidis, vel Vinaeis effervescentibus, aut Fimo calente mēbra immergere aut sepelire aliquandiu, plurimum iuuat.

Saluia vel sola manu gestata prodesse creditur, odore fortè potius, quàm contactu.

In balneo calefaciente & siccicante, si corpus

pus immergant, ita vt & membra resoluta & dorsi maiorem partem comprehendat, alterando atque euocando humores, interdum eadem ratione iuuare possunt. Quæ tamen efficacia esse debet: ne madore actuali plus humectent, quàm potentiâ siccent.

Quo nomine ad Thermas naturales, si reliqua remedia non iuuerunt, & morbus iam diu sit productus, & alioquin vitio alio non labore æger, nihilque impediatur, tantum extremum asylum relegantur. Quibus per mensem & vltius, donec cutis efflorescat, rursusque sanetur, vti iubentur. Conueniunt autem Aluminosæ & Nitrosæ potissimum, quia siccant. Sulphureas similiter laudant, sed valde emolliunt. Atramentosæ acidæ, quia acida nervis inimica, prodesse adeo non possunt. Salsæ, aqua maris, aut fontium calefactæ, quia siccant, sine dubio viles erunt.

Balnea artificialia idem præstabunt. Si Aquis, exiccationis causâ, Sal, Alumé, Tartarum vini permisceas, & in ea Ferrum vel Chalybem sæpe extinguas: qualis fabrorum est aqua. Aut cineribus Vitis samentorum, Ossium, item Calce, additis, lixiuij instar pares. Et vt appropriatum magis balneum fiat, & calefaciat, plantas mox, in sicca stupha, enarrandas, in aqua aliqua, ex modo dictis præparata decoquas, addito lixiuio vel aquâ fabrorum. Vel si easdem plantas in decoctione Vulpis integræ decoquas.

Sed & si priuatim partes resolutæ his immergantur, aut hisce foueantur, vel illis abluantur, vt manus, vel pedes, proderunt.

Ad quæ & hoc admodum competit: R. Saluiæ, baccharum Iuniperi & fol. Tithymalli maioris ana q. s. decoq; in Lixiuio. Quo partem foue vel ablue.

Liquidis eiusmodi oleis vel linimentis, si partes resolutæ immergi possint, vt manus, vel aliæ, illis foueri aliquandiu, erit conueniens. Ad quod præstandum cum bona requiratur portio, in ditionibus hæc potius fieri debent.

Per ambientem Aërem, non tantum vires conseruantur, sed & si purus sit; corpus minus impurum redditur. Atq; vti frigidus summè obest, cum alioquin paralyti-

corum membra sint frigida, & frigidum nervis sit inimicum: sic calidior & siccior, quia intemperiem emendat, plurimum prodest. Talis autem vel cœli causâ est, illicque vnde haberi potest intromittendus. Vel arte, ignibus, suffitibus paratur. Sed & si columbæ in eodem aëre cubiculi, cum ægro versentur, proprietate illum paralyti resistere produnt.

Si quoque adeo medicamentosus, nimium calidior, vaporosus seu fumosus, factus, vt per insensilem transpirationem, vel sudores manifestos, humores exhauriat, corpore prius decenter purgato, adhibeatur, remedium est; quod à parte affecta tam causam coniunctam, quàm antecedentem absumit, primumque in hoc morbo diuturno sæpe sanando, est remedium.

Sic autem in occluso conclaui, vel sub lecto aër calefit, idq; vel solo igne, vel vapore quoq; decocti alicuius: quod sponte dum feruet, exhalat, vel si in eo candentes filices aut metalla extinguantur, vaporem & fumum reddit. In quibus æger ieunus fudet nudus, repetatq; prout bene ferre poterit, frequenter.

Decoctum autem pro euaporatione hac, ex sequentibus parari poterit: quæ simul potenter calefaciunt & roborant: R. radic. Ebuli 3. iij. Acori, in diuitibus 3. j. Peucedani Dioscor. 3. ij. herbar. Saluiæ, Chamæpithæos, Primulæ, ana M. ij. Origani, Pulegij, Serpilli, Calamenti, Hyssopi, Maioranæ, Rosmarini, Thymi, Lauri, florum Chamomil. Sambuci, granorum Iuniperi, singular. vel quorundam M. maiorem minoremve, prout sumuntur: decoquantur in aqua, addito Lixiuio & Vino: Pro stupha vel balneo siccato, vt vocant.

Si membrum resolutum suffumigetur ante ignem Thure, Mastice aliisque odoratis, plurimum roborabit, atque calorem in eo excitabit.

Per motus corporis iuuabimus, exercitio decenti, quod humores egregie absumit, & partes sopitas excitat, spiritumque animale in eas reuocat, frigidassq; calefacit, mollesq; firmat.

Quod si sponte perficere illud nequeant,

ministrantium illis opera perfici debet. Eri-  
gendo illos & sustinendo, vt aliquo modo  
ambulare queant: ipseque æger membris  
languidis vti, & otiosas continuò agitare &  
exercere nitatur.

Frictio imprimis, tum diuersionis causâ,  
in partibus sanis facta: tum in ægris adhibi-  
ta, vtilitates dictas præstans, cum nihil po-  
tentius spiritus alliciat, conuenit. Quæ ab  
astantium manibus solis, vel etiam adhibi-  
to panno aspero & calido, perficitur: vel ipse  
æger sanis partibus, ægras fricando, id præ-  
stare poterit.

Quæ omnia decenti tempore, ieiuno exi-  
stente ægro, corporeq; prius purgato, me-  
liori successu administrabuntur.

Per motus animi, in Vigilij longioribus  
solitis, diutius continuatis, humores quoq;  
discutimus, & ne per somnum immodicum  
hi coaceruentur, præcauemus.

Per affectus illius aliquos corpus accen-  
dentes, modò non nimium debilitent, com-  
modum sentiunt; vti per iram: cum & fe-  
bris vti dictum, non noceat.

Inter aperturas manifestas, sectio venæ  
in plethoricis tantum locum habet, cum  
crudi sanguinis copiâ, humoris huius pitui-  
tosi abundantiam produci, vel ab ea foueri,  
cognoscimus: sed tunc quoq; parcè, in bra-  
chio partis sanæ erit facienda: neque Arabi-  
bus, qui tantam sanguinis copiam extrahe-  
re docent, cum per eam languidus illarum  
calor extinguatur, credendum.

Scarificatio quoq; a iumentum aliquod  
adfert, non propter sanguinis extractione,  
sed propter Cucurbitulas desuper admotas.  
Quæ tamen, sed sine scarificatione, parti-  
bus ægris, vt validius eò spiritum attrahant,  
commodius affiguntur. Et vt humorem à  
neruis eò occupatis, diuertant, obseruato di-  
ligenter loco, vbi causâ mali latet, præfer-  
tim si hoc circa dorsalem fiat medullam,  
paulò subdus cucurbitulæ affixæ, sensim ad  
membrum resolutum descendendo, ner-  
uum sæpè ab eo liberant.

Quorum loco Rubificantia, hisq; validio-  
ra Vesicatoria remedia, idem validiusq; præ-  
stant. E quibus & validiora Vesicatoria, vel  
horum loco Caustica & Serones, cervicis

posteriori sedi, quam nucham vocant, ad-  
hibere solent: quod tùm maximè conue-  
niet, si in generali paralyfi, causa cerebro  
vicina sit. Licet & si illic circa dorsalis me-  
dullæ initium, in hemiplegia, causa lateat,  
quia eam euocat, & loco mouet profit. Sed  
& brachio adhibita caustica, humores re-  
uellunt.

Ab humore aqueo pituitoso vel seroso, a *Paraly-*  
sibus, biliosis humoribus permixto, ner- *seos vel*  
uos non solum imbuente, sed & irritante, si *Spasmi,*  
paralyfis fiat: sicuti post colicos cruciatus, *ab alijs*  
eam frequentissimè nostro sæculo accidere *humori-*  
diximus, cum dolore & formicationis sen- *bus, cu-*  
su: tunc cura, quamdiu colicus dolor perse- *ratio.*  
verat, huic potius erit accommodanda, &  
humores illi pravi, sicuti illic dictum, expur-  
gandi. Eaque potius, quæ nervos lenien-  
do, conuulsiones, in quas faciliè terminari  
solet, impediunt, ad moueri exhiberique,  
sicuti in conuulsionibus dictum, debent.  
Nihil interim boni temerè, cum si conuul-  
siones superueniant, faciliè iugulare soleat,  
prædicendo. Quod si verò cessantibus alijs  
affectibus resolutiones hæc comitantibus,  
illæ in pluribus priuatisve partibus rema-  
neant, tunc cura eadem, quæ in pituitosa  
paralyfi explicata fuit, administranda.

A sanguine paralyfim, perseverantem  
præsertim, fieri non posse, ostensum fuit.  
Quod si fiat, vti Practici scripserunt, quia  
tunc sanguis in venis adhuc consistens, fa-  
ciliè in uersa parte, si situ illius peruerso fiat,  
retrocedit, mox iterum cessat. Vel si à ple-  
thora fiat, venæ sectione, alijsq; reuellentibus  
& deriuantibus sanabitur.

A refrigeratione nimia musculi & nervi, a *Paraly-*  
frigore externo (nam de ea quæ ab humo- *seos ex ra-*  
re pituitoso fit, iam dictum fuit) si non tan- *frigera-*  
tum stupor, vti potius accidit, sed & resolu- *tione, cu-*  
tio membri fiat, tunc sicuti in stupore osten- *ratio.*  
sum fuit, Calidis actu, sensim admotis, &  
Frictionibus emendatur. Quibus nisi ces-  
set, ea remedia topica, quæ in pituitosa pa-  
ralyfi explicata fuerunt, inunctiones scilicet,  
& fots & balnea, prout forma parti af-  
fectæ sese accommodat, hic quoque locum  
habebunt.

A flatibus spasmus, flatulentus ob id di- *Spasmi*  
stus, *flatulen-*



cia, à flex  
ribus cu-  
ratio.

Etus, si fiat: siue hi causam illi præbeant, aut si à nimia musculorum astrictione fiat, illam augendo, vehementiorem & diuturniorem reddant. Tunc si rarius hoc accidat, nihil mali significare potest, cum à causa manifesta, motu nimio vel refrigeratione procedat: proin & negligitur. Si verò sæpè repetat, quia grauem parit molestiam, & membra debilitat, cum causam internam comitem habeat, flatuum copiam, atq; musculorum minus decentem connexum, vti dictum est, non erit negligendus, cum interdum ægrè penitus auelli queat.

Quòd si non tantum in pedibus & artubus, sed & alibi, vt in dorso, vel maxilla inferiore, aut ore molestat, periculo non caret propensionis ad epilepsiam, proin, &, vt illic dictum, maturè prospiciendum erit.

In alijs verò causis, remedia tum ad præcautionem extra paroxysmum, si sæpè repetat: vel in paroxysmo si perseueret, sequentia erunt vsurpanda. Quæ status depellunt, musculos astrictos relaxant.

Exhibentur ad flatuum prouentum impediendum, eosq; discutiendos, tam in victus ratione, quam medicamentis purgantibus, calefacientibus, roborantibus, qualia in flatulentis casibus, ventriculi imprimis, suis locis explicabimus.

Adhibentur musculo affecto (quem ex protuberantia loci, & dolore cognoscimus) quæ in paroxysmo actu potentiaque calefacientia, status discutientia, partem leniendo & laxando, iuuant: extra paroxysmum verò, quæ & simul partem leui astrictione roborando, sæpè repetitum affectum præcauent. Eadem ferè vsurpando, quæ in paralyfi pituitosa, & in contractionibus veris, leuiora esse, ostendimus, illicque descripsimus.

Inunctiones fiunt ex oleis, Chamom. Liliolum, Anethino; Vel hoc modo, si pars simul roboranda sit: R. olei Chamom. vel alius ex tribus enarratis ʒ. j. Vulpini vel Lūbricorum, Masticiini ana ʒ. ʒ. misce: Inungatur pars, manibus vel parte prius aquâ Vitæ madefactis, calidè.

Oleum Guaiacinum, cum aqua Vitæ & Saluæ inunctum, mox iuuat.

Vel fiant emplastra: inter quæ & Marcia-  
tum conuenit.

Aquæ & Balsamælea in paralyfi explicata, competunt. Inter quæ aqua Vitæ simplex sola adhibita, statim iuuat, si calida sit.

Theriaca in aqua Vitæ dissoluta, potius quàm oleis, vti docent, & inuncta, valde proderit.

Fotus, infersiones, balnea in paralyfi & contractione recensita, proderunt, actu potentiaque calida. Inter quæ Lixiuum, sicuti in podagra dicetur, quia partes laxas, & quæ humores vel status recipiunt, firmat, præcautionis causâ, additis corroborantibus, adhiberi poterit.

Emplastrum hoc valde probatum est: R. Absynthij, Pulegij, ana M. j. baccarum Lauri P. j. Cimini ʒ. ʒ. terantur: bulliant in Vino forti & Melle; fiat cataplasma.

Sacculi irrorati prius in Vino etiam proderunt: in paralyfi præscripti. Vel sic quando præcauere malum corroborando volumus: R. flor. Chamomil. Meliloti, Rosarum, Furfuris, baccarum Iuniperi vel Lauri ana P. j. Myrtillorum P. ʒ. rad. Ireos ʒ. ʒ. sem. Fœnigræci, Carui, Cimini ana ʒ. iij. Salis P. j. Pro sacculo.

Ex solo Milio, Furfure, & Sale, sacculus citò ad vsum parabitur.

Pelles calidæ, aliæq; similia conueniunt.

Frictio item levis manibus, pannisve calidis.

Retrahendo partem affectam, paroxysmum breuiorem, seu vt mox cesset, faciemus: Si musculos iuuoluntariè violenter extensos, vel flexos, eoq; membrum trahentes, voluntariè contrario motu & nixu musculis qui ægris opponuntur, eos vnà cum membro retrahere nitatur: sic enim astricti vel deuij, rursus cum membris relaxantur, situmq; naturalem repetunt, & status, qui illorum contractorum spacia occuparant, quando muscoli in locum suum redeunt; ab ijs locis repelluntur & cedere coguntur. Quod in musculis suram constituentibus & pedes digitosq; mouentibus contractis, extensione contraria fieri, doloremq; mox cessare, indies experimur.

Ex siccitate vel inanitione, vti voluerunt,

musculorum illorumve tendinum membra trahentium, atque neruorum interdum vel ligamentorum articulos ambientium, si Contractio partis illius, cui hæc ad motum feruiunt, fiat, siue dorso aut alijs locis accidat, si magna illorum sit ariditas, immedicabile est malum, sicuti quando ratione ætatis, & laborum hoc eueniet. Sed & difficulter sanatur, si alijs de causis facta, diu perseuerauerit: sicuti manibus, pedibus contractos, & tetano laborantes, toto vitæ spacio contractos illis locis manere, plerumq; cernimus, aut leuiter saltem in melius mutari.

Nihilominus tamen cum successu, cura sæpe à principio, vtiliter adhibetur: hacque methodo, per adhibita extrinsecus loco affecto, humectantia & laxantia medicamenta, è quibus cum quædam refrigerent, calidis neruosque roborantibus illis permixtis curæ potissima pars perficitur: si ea musculo nimirum, illiusque tendini, & corpori, quod membro attrahenti, aliquando vicinum est, alias verò procul dissitum, & longo, quandoque longissimo tendine ad illud porrigitur; item articulo, si ligamenta astricta sint, admoueantur.

Inungitur itaq; dorsum cum spina in tetano, vel membra in alijs speciebus contractionis, hoc modo: R. olei Amygdal. dulc. recentiss. 3. j. β. Violarum, Liliorum, Chamomil. Lini, per expressionem facti, recentis, Lumbricorum ana 3. j. ol. Hypericonis, mucilag. sem. Psyllij & Lini, Axungia Anatidis, medullæ cruris Vituli ana 3. β. Terebinte. 3. ij. Sulphuris 3. ij. β. pul. Lumbricorum 3. j. sam. Thymi, flor. Hyperici ana 3. β. Croci 3. j. Cera q. s. fiat vnguentum.

Axungiam humanā magnificiunt in hoc casu: vt & Anguillarum, fortè quia illa appropriata, hæc, quia à piscibus desumpta, humidior censetur.

Balneum in tetano, vel in alijs, Irrigatio, aut Frotus loci affecti, ex hisce fieri possunt: tepidis adhibitis; ex Aqua dulci, Lacte, Brodio pingui capitis & intestinorum Veruæcis vel Vituli, Hydræleo, solo Oleo, Violarum præsertim.

Vel ex sequenti decocto: R. rad. Altheæ, Bryoniæ, Liliorum ana 3. j. rad. Ireos rec.

tb. β. herb. Maluæ, Violariæ, Lactuæ, Atriplicis, Brassicæ ana. M. j. Saluiæ, Chamæpith. ana M. β. sem. Lini, Hordei mundi ana P. j. decoquantur in aqua pro balneo: cui & reliqua permisceri possunt.

Thermæ sulphuræ, vim emolliendi magnam habent, cum nihil sit sulphure pinguius, sicuti alibi demonstratum est.

Emplastra parti adhibita, quia remanent, summè profunt: quale est de Meliloto, de Mucilaginibus, Resumptiuum, & similia ex enarrata illinitione parata.

Vel fiant etiam ex prædictis in balneo plantis cataplasmata: quæ præ cæteris iuant, diu gestata sæpeq; renouata.

Hoc etiam laudatissimum: R. radic. Altheæ Bryoniæ ana recentium 3. ij. Mandragoræ 3. j. fol. Hyosquiamini recentii (quæ mirè vt & mandragoram emollire, experientia cognoui.) Maluæ ana M. j. decoquantur in Lacte, contundantur, addendo farinæ seminis Lini 3. ij. Psyllij, Cytonior. ana 3. β. axungia Porci, Anseris ana 3. j. olei Amygdal. dulc. Butyri rec. ana 3. β. baccar. Lauri 3. ij. Croci 3. β. fiat cataplasma.

Omentum, Mesenterium, Renes cum pinguedine, tapefacta, parti laboranti imponuntur.

Pelles per se, vel oleo prius inunctæ recenter detractæ, Vulpinæ præsertim, profunt: atq; Anserinum corium cum plumis.

Per assumpta aut iniecta, hæc, nisi per accidens ratione illius affectus, vix aliquid singulare præstare licebit. Vt verò in conuulsione seu spasmo particulari multum iuuat.

Manuali operâ, membra contracta, si diduci possunt, tunc etsi mobilia non rursus fiant, quod tamen interdum fit: nihilo secius forma alia illis, quæ minus in motu impedimentum adfert, accommodari potest. Vt si digiti extensi sistantur, tunc si cōtrahantur, paulò minus in apprehensione incommodat: si spēs sursū tractus hæreat, ad terrā vsq; retractus, etsi articulus genu fixus maneat, tamē incessum qui prius sublatus erat, restituit.

Hoc autem manibus vel instrumentis adhibitis, non magnâ vi, sed sensum temporis aliquantum impellendo, successu temporis, astrictos tendines & ligamenta ita magis magisq;

magisq; relaxando, in quibusdam locis aliquando id possumus efficere. Idq; pro membri contracti ratione, varijs modis. Vt si propter genu articulū fixum, vt sæpē sit, pes sursum tractus sit, calceo induto, & alicubi alligato, continuū dum sedent, & aliquid agunt, eum detrahendo: Vel pondere appenso, sæpē eum deprimendo. Quod & eleganter perficitur, si laminis, duabus oblongis, in medio cauis, tibiae & coxae posteriori sedi accommodatis, & iuxta articulum iunctis, interpositā cochleā, eam inuertendo quamdiu ferre potest, pes à superioribus deorsum sensim propellatur. Vti & in alijs locis eādem ratione, cochleā strias habente, commodē perficitur: cum si vertatur, sensim ea quibus inferitur premendo, membrum fixum impellat, & cum cochlea inuersa sic immota maneat, eādem membrum, quousque protrusit, sustentet, & retineat. Quod ego in multis cum successu, ingeniosē fabricatis instrumentis, tentauī. Sicuti quoque, si digitus extensus maneat, annulo illi inserto, qui alij annulo, vicino digito adhibito, contiguus & affixus sit, dum hic digitus mouetur, alter fixus continuū impulsus, tandem cedere & flecti non nihil, cogitur.

*Contra-  
stimus  
vel Spas-  
mi à tu-  
more, cu-  
ratio.*

A tumore duro, callo, vel nodo, vel cicatrice, in tendinibus & ligamētis, natis, si membrum sistatur, vel si ea nervum occupando vel premendo, resolutionem pariant: non alia curandi ratio, quam per emollientia, quæ hisce, etiam alijs in locis prouenientibus, sicuti illic explicabitur, debetur, instituitur. Membra interim fixa, continuū, si eo situ admodū incommodent, in rectiorem minusq; incongruam formā, actuali operā, vti modo dictum, retrahenda.

*Paraly-  
ses ex cō-  
pressio-  
ne, cura-  
tio.*

A compressione nervi violentā, ab onere, siue vinculo, si paralytis fiat, tunc impedimēta hæc erunt remouenda, vinculaq; soluenda. Quibus ablatis, si stupor aut resolutio perseuerent: Frictionibus, alijsq; applicatis calidis, in pituitosa paralyti dictis, spiritus erunt reuocandi. Ab osse luxato, cum vix nervus prematur, sed alia potius inde sequantur incommoda, ea in illis explicabuntur.

*Paraly-  
sis ex so-  
luta con-*

A vulnere, dissecto tendine aut nervo, vel ligamento, si resolutio fiat, incurabilis est.

*tinuita-  
te, cura-  
tio.*

Sunt tamen chirurgi, qui tendines absectos consuere solent. Musculo per transuersum vulnerato, si hoc fiat, curatio eadem quæ in alijs vulneribus facienda: quæ & sæpē iuvat: si verò penitus amputatus sit, quia tunc vtrinq; retractus, ægrè inuicem iungitur aut retinetur, remanet curato vulnere nihilominus illius partis immobilitas.

A contusione, ab ictu vel casu, si paralytis fiat; si inflammatio in nervo sequatur, convulsio facile sequitur, quæ lethalis est. Ne itaque illa fiat, sanguis mox reuellendus, venā sectā, alijsque modis. Supra partem verò contusam, non astringentia frigida sunt applicanda, sed ea quæ simul digerant.

Quale hoc est emplastrū: R. Mastice, Thuris, gummi Hederæ an. 3.ß. Mumie 3.ij. pulu. Lumbricorum 3.j. flor. Chamomil. Rosarum ana 3.ß. olei Ros. Chamomil. Cheirini an. 3.j. Terebint. & Cera q. s. fiat emplastrum.

In fine cum nulla amplius inflamatio metuitur, vnguentis in pituitosa paralyti enarratis, inungatur. Si paralytis adhuc perseueret, vt nervi calorem reuocemus & partium resolutarum, erit hoc præstantissimum: R. rad. Pyrethri 3.iiij. Piperis 3.iiij. Sulphuris 3.v. pul. Lumbricorum 3.ij. Castorij 3.ij. Euphorbij 3.j. bulliant in olei 3.x. ad cōsumptionem medietatis. Inunge ceruicis & dorsi vertebrae, item emunctoria & loca affecta.

Si callus in nervo relinquatur, quomodo procedendū, in tumore duro dictū iam fuit.

Musculi contusio, aut partis quæ mouetur, non aliam à generali contusione, de qua suo loco agetur, curam requirit.

*Immobilitas à  
Fractura ossis,  
curatio.*

Fractura ossis si in causa sit, vt membrum moueri nequeat, tunc manuali operatione potissimum os abruptum, si ab altero declinet, membrumque abbreviet, reponere studebimus. Dein ea iam iuncta, vel ea quæ licet confracta sunt, adhuc tamen inuicem hærent, ne secedant, retinebimus. Postea medicamenta loco affecto, dolorem compescencia & inflammationem arcentia, si hæc vigeant, adhibebimus. Et quæ ossa simul, vt conglutinentur, & concrecant seu consolidentur, adiuvent: quod per accidens, impedimenta potissimum auferendo, fracturamq; nonnihil astringendo, & emplastica vi veluti

obliterando, faciunt: cum alioquin ipsa concretio ossium, succi ossa nutrientis beneficio, tanquam glutinis, vti de vulneribus dictum, naturæ tantum operâ perficiatur.

Reponimus & coniungimus os abruptum iterum (si nihil aliud obstat, vti spinæ ossium abruptæ, quæ prius, vti suo loco dicetur, repurgandæ) vel solis manibus, aut adhibitis insuper instrumentis, vti in luxatione dicitur, sensim eousque trahendo, donec ad extremum fracturæ sui ossis, cui iunctum fuerat, perueniat: tuncq; manibus trudendo, cum illo rursum decenter iungendū, idq; quoad fieri poterit planissimè, sic enim & subito & facile rursum cum illo connascitur: sin minus, & non rectè, vti prius se cum illo iungat, callo intermedio tam magno, quam distantia illa remansit coalescere tunc inuicè necesse est, ex quo, cum tã subito illud fieri nequeat, cura prolongatur, & membrū sæpè curuum, aut aliter malè formatum permanet.

Retinemus fracta ossa simul, si fascijs primum decenter inuoluamus: inde planicis circumpositis tenuibus, schindlen/ aut cortice, aut simili instrumento parti affectæ, fascijs iam inuolutæ, quæ suâ cavitatē se accommodet, sic colligemus, & ne ossa constrieta loco moueri facile queant artè constringamus: sicq; postea partē quietam retineant.

Fouemus quandoq; locum affectum antequam fasciâ inuoluatur, prout dolorem sedare vel astringere, metu inflammationis volumus. Vel Vini rurbro stiptico. Vel decocto fol. Vlmi & Myrthi. Vel Oleo, Vini & Aceto simul permixtis, cum Lana succida. Vel fasciâ ipsa madefit oleo Rosaceo vel Oxycrato antequam applicetur.

Vel vngitur locus affectus prius ol. Ros. Myrtine & similibus, doloris causâ, nã cum astringere volumus sequens forma vtilior.

Emplastris pars iam vineta, vti dictū, ambitur, quæ & nudæ parti, si necessitas exigat, interdum adhibetur, posteaq; primum pars vincitur, sed tunc frequētius mutanda erūt.

Simpliciora sunt: R. rad. Symphiti, radic. Geranij q. s. contundantur, & cum axungia Porci permixta, applicentur.

Aliud: R. Masticis, Thuris ana ʒ. β. Boli ʒ. j. Aloës, sanguinis Draconis vel Acaciæ a-

na ʒ. ij. gummi Tragac. Arab. ana ʒ. j. farinæ volatilis Molendini ʒ. ij. cum album. Ovi, fiat emplastrum.

Vel sic: R. farinæ volatilis Molēdini ʒ. β. farinæ Hordei & Fabarū an. quar. j. Boli ʒ. ij. Gypsi ʒ. j. lap. Hæmat. ʒ. β. Thuris ʒ. iij. radic. Consolidæ ʒ. β. cineris testarum Cancrorum ʒ. ij. fiat puluis, quem ad vsum chirurgi seruare possunt, vti tunc cum opus erit, eum cum album. Ouiorum subigant ad formam emplastri, addendo ol. Rosaceum, ne nimis sicceat & hæreat.

Propinata quædam ad ossium consolidationem, plurimum iuvare creduntur, sicuti de vulnerarijs dicemus potionibus. Sic Verbasci decoctum probat Diosc. Primulæ succum Matthioli. Recentiores, lapidis fabulosi Ostiocolli ʒ. j. pulu. cum Vini manè ter ad minimū propinant: cuius efficaciam mirè commendant, egoq; expertus sum.

Quod victus rationem attinet, aliaque generalia præsidia, vti corpus mundum & purum seruetur, & ne ex decubitu constipentur, procurandum. Et sanguis si inflammatio timeatur, detrahendus.

Luxatio articuli, vi, vel ligamentorum laxitatis causâ facta, si motum sistat: sitq; leuior tantum illius separatio: sponte, motu proprio membri, nonnunquã iterum in locum suum redit. Si verò omnimoda sit dislocatio, maiori vi ad os reducendum opus erit, illud trahendo, impellendo, premendo, & ne rursum excidat, retinendo, firmandoq; articulum, ne rursum labatur & impedimenta auferendo. Quod in quibusdam articulis facilius, in alijs maiori difficultate, in quibusdam minimè, si iam diu perseverauerit, & si bi os sinum alicubi fecerit, perficitur.

Trahimus os, quod in exarthremate ab alio osse, iuxta illud, sursum delatum, partem abbreviauit, donec rursum sub alterius ossis sinum, reductum sit. Quod vel solis manibus, si facile cedat, sin minus, fasciâ adhibitâ aliorum quoque operâ, vel instrumentorum etiam subsidio, perficitur: Vti in femore luxato, magno conatu, vti reponatur, opus est: maxillam verò luxatam, iuxta molares dentes apprehendentes trahentesq;, varijs modis reponimus. Retrahimus autem vertebra-

Immobilitatis ab ossi dislocatione, cura.



bras in gibbo, extrorsum introrsumve, aut ad latera curuato, & loco motas; contrario nixu; stando vel sededo dorsum ita flectetes, vt curuitas illius sensim erigatur, cum hoc vi adhibita fieri nequeat: quapropter per decubitus talem, in quo diutius moram trahere possunt, id rectius sit, maxime ope instrumenti, quo interim pars premitur, vti dicitur.

Impellimus, trudendo violenter os, quod in exarthemate attractu est, vel in pararthemate, a medio ad circumferentiam recessit: vti & in arthrodijis, si plura ossa secesserint. Illic comprimendo os, vbi eminentia ipsius prominet, versus oppositam sedem, quæ caua est, eousq; , donec rursus in suum sinum incidat, quod ex sono quem edit interdum cognoscimus; vel in suam sedem reponatur. Hoc autem manibus solis facile, si modo ad rectum locum propellatur, ferè fit. Alias verò maiori vi ad illud præstandum opus, quando humerus deorsum sub scapulam delapsus est. Tunc enim humero chirurgi supposito, interim dum brachium trahitur, eleuatur, vel alio artificio sursum magnâ vi premitur, quod non sine magno dolore; & veluti torturâ perficitur.

Sensim premendo vertebrae dorsî, in nexu mobili dislocatas, Gibbo dorsî retrorsum protuberante, curuitatem illius aliquando, dum adhuc in fieri est, nec dum confirmatus, in iunioribus ferè tantum emedamus. Quod cum non nisi longo tempore perficiatur, instrumento ad id apto, quod continuo parti adhærens, successiue eam premat, opus erit: quale est, thorax indutus, ex charta, vel corio picato, vel ferri lamina formatus, parte in gibbosam premens. Idem panneo thorace, cui lamina ferri vel plumbi insuitur, aut aliâ arte, efficitur.

Retinemus articulu rursus coniunctum, ne denuò separetur aut dislocetur, quiete, si illum immotum teneamus, idq; donec partibus quæ laxatæ erant confirmatis, articulus postea; quando rursus mouetur, suo loco possit subsistere. Quod rectius fiet membro suffulciendo, suppositis puluinis & culcitris: Vel etiam suspendendo fasciâ, in qua collo iniecta, brachio indito, humerum, ne rursus delabatur, sustinemus, Sed & in periculo lu-

xationis, elongatâ parte & laxâ, cum à motu semper abstinere nequeamus, saltem vt minus vehemens sit, cauebimus. Vti & à valida illa oris apertura per oscitatione, ne maxilla luxetur, illi, qui facile hoc patiuntur, abstinebunt. Et quibus gibbus crescit, ne corpus admodum inclinet, aut flectant, sed quoad fieri potest, erectum seruent, mouebuntur. Et vt instrumento iam enarrato, non tantum gibbus prematur, sed & dorsum erectum seruetur.

Ligaturæ quoque adhibentur, si os repositum difficulter subsistat, & pars nonnihil vinciri queat.

Remedia extrinsecus insuper nonnunquam adhibentur, si dolor vrgeat, qui tamen mox, si membrum rectè repositum sit, cessat: Vel si aliud quid accedat, vt inflammatio, fractura vel vlcus, quod iuxta coxendicem, vti dictum, sinuosum pus interdum profundit; quorum cura suis locis explicabitur.

Ad confirmandum articulum, cum metus est luxationis, aut si facta fuerit, rursusq; reposita, ne facile redeat, astringentia adhibentur illi remedia, quæ siccando humiditates illius loci, maxime si causam huic quoq; præbeant, absumant.

Tela ceratâ vtilissimè sic articulus inuoluitur, dolores sedante & iuncturâ firmante: R. Sæui arietini, ceræ albæ an. ℥. β. dissoluantur, permisce farinæ volatilis Molendini ℥. ij. Thuris, Masticis, Boli, Sanguinis draconis an. ℥. j. rad. Consolidæ ℥. β. & dum hæc calent, inuicem agitentur, & intingatur tela, donec illi hæc materia accrescat: Applicetur.

Emplastra qualia in fracturis descriptimus; hic quoque competunt. Vel sequens: R. Thuris, Masticis, Colophonix, Resinæ, Picis ana ℥. j. Ceræ & olei Rosati q. s. fiat emplastrum: Gestet.

Cataplasma, si necessitas requirat, sic fiet, maxime urgente dolore: R. radic. Personatæ (quam dolorem admodum sedare in luxatis, docet Dioscor.) Narcissi ana ℥. β. fol. Plantag. Vrticæ ana M. ij. coquantur in Vino rubro, adde mucilag. radic. Consolidæ ℥. ij. farinæ feminis Foenogræc. ℥. j. Mellis ℥. ij. Salis ℥. ij. olei Myrtill. vel Mastic. ℥. ij. contundantur pro cataplasmate.

Cauterium quoque vel Vescicatorium super partem dhibitum, potenter resoluit, & elicit humiditates, quibus articuli occupati, facile luxantur.

Per os, succū Primulæ aliqui exhibitum, iuvare in luxationibus scribunt.

*Immobilitati Or-  
gani vi-  
tio, cura-  
tio.*  
Organicum vitium, si immobilitate causet, fitq; ab ortu, incurabile existit: quia partes aliter formare nequimus. Si vero à causa aduentitia, laxatis nimium & elongatis tendinibus, vi aliquā vel humore, eadem quæ in paralyſi dicta, pituitosa præfertim, topica proderunt. Quod si astrictis illis nimium, spasmus ille flatulentus fiat, in flatibus cura explicata fuit. Sin vera contractio & permanens sit, eadem, quæ à siccitate factæ cura, vti dictum, competet.

## DE MOTV DEPRAVATO.

### CAPVT III.

#### Genera.



**M**OTVM deprauatum vocamus, quando motus, voluntarij præfertim, vel immoderate vel intempestiue, aut alias non decenter exercentur. Vti fit cum membra, motus hosce obeuntia, irrequieta sunt: vel conuelluntur: vel tremunt, vel palpitant, vel concutiuntur per rigorem: aut extenduntur per pandiculationem & oscitationem, aut aliter aguntur per nictationem.

*Inquietudo.*

Irrequieta dicuntur membra esse, cum nimium aguntur, nec quiescunt. Vt cum mente capti, maniaci & phrenitici motus tam varios & violentos edunt: atq; irati, furibundi, adeo præcipitanter res peragunt: imprimis verò hi, qui saltu Viti appellato, laborant, pedes cursu & saltu supra modum defatigant: de quibus in mentis alienatione dictum fuit. In alijs quoq; morbis decumbentes, tam vigilantes quam dormientes, admodum interdum inquieti sunt, & propriè inquietudo dicitur, quique eā laborat, Affodis appellatur, symptoma est multorum morborum vires prosterbens. Quo affecti corpus nunc variè,

huc illucve, iactant, vnde & Iactationem, aliqui Iestigatione, vocarunt: nunc se frequenter erigunt, nunc pedes manusq; continuò exercent, retrahunt, mutant: alias ad pedes deuoluuntur, quod in morbis acutis (quibus familiare hoc est accidens) inter lethalia signa Hippocr. recensuit. In sanis etiam eiusmodi inquietudo tam vigilantibus, quam dormientibus molesta esse solet, & morbos minari. Quò & referri potest, intempestiua illa nocturna per somnium ambulatio: de qua in vigilijs dictum fuit.

Conuelli membra dicuntur, quando motus illos inordinatos edunt, sicuti in convulsione generali seu epilepsia dictum fuit. Et in particulari quoq; spasmo accidit: præfertim eā specie, in qua membra adhuc agitantur, neq; adhuc per convulsionem illis attractis, motus ipforum sistitur: sicuti in convulsua palpitatione appellata, in particulari spasmo ostensum fuit.

Tremere membra dicuntur, cum motu inæquali sursum deorsumq; agitantur; Tremorq; appellatur: qui tunc maximè fit, cum illis vti volumus: quæ aliquando magis, aliquando minùs tremunt. Quod in manibus frequenter accidit, cum aliquid apprehendendum vel retinendum est. Nonnunquam & in pedibus, qui stantibus tremunt. Interdum & capiti, quod continuò huc illucve agitur. Maxilla inferior quandoq; fit tremula: quod & ante vomitum, quem præſagit, sæpe euenit. Vidimus, omnibus hisce partibus, simul, iam inde ab ortu continuò ad senium vsque tremere, ciuem nostrum, Zitterhans / ob id appellatum: brachijs, manibus, digitis, pedibus, quibus inter eundem veluti saltabat, capite item, quod agitabat, & maxillà quæ veluti masticabat.

Palpitare membra dicuntur, non quando aliquid actura, vt in tremore, concutiuntur, sed cum inuoluntariè non nihil attrahuntur, rursumque relaxantur. Sicuti in convulsua palpitatione eodè modo illud accidere, priùs diximus. Ad cuius speciem illam, quam spasmus flatulentum vocant, hæc palpitatio, eandem penè causam habens, vti dicitur, referri potest, & proin Flatulenta palpitatio appellari, mitius tamen membra exercens potius,

potius, quàm firmiter, vti alia, ea alliciens. Cum propriè palpitare membra dicantur, quando muscoli, atq; instrata illis cutis, attolluntur non nihil, rursusq; subsident, idq; cum dolore plerumq; & molestia, non attractis interim, vel admodum parum, membris.

Rigor.

Concuti membra per rigorem dicimus, quando concussio quædam sit totius corporis, aut illius partium, sicuti ferè trementibus accidit, sed cum frigoris quodã sensu, & penitus inuoluntariè, vnde Rigor appellatur. Vti in febrium intermittètiũ paroxysmorum initijs, hoc modo corpus vniuersum extenditur, curuatur, concutitur, ad eò sæpè validè, vt dentes collisi, strepitum edant, quem Stridorem dentium vocant. Atq; febres continuæ, cū eiusmodi rigore quoq; inuadunt, atq; interdū cum crisis futura est, illius prænuncius est. Aliàs leuior est agitatio, & Horror tunc appellatur: in quo maior frigoris sensus corpus peruadit, stantque erectæ comæ, & pori constricti, cutem asperam reddunt. Quod & aliquando frigus solum, vti in febribus dictum, hominem molestat. Sed & extra morbos à frigore externo, metu, rigor vel horror, hisce similis, corpus non nihil concutit. Aliquando & rigor sine frigore, à causis externis nascitur.

Pandiculatio.

In Pandiculatione appellata, admodum, brachia præsertim cum dorso extenduntur atq; curuantur, cū oris vehementi apertione seu diductione, quam Oscitationem vocant. Quæ & separatim fieri potest. Hæc duo si citra occasionem sæpè molestet, morbos præfagiunt: vel febrium paroxysmorum incipientium sunt præludia. Aliàs verò extra morbos, pigritiæ signa sunt: vel ex concepta imaginatione, sicuti dicitur, nascuntur.

Nictatio.

Nictationem vocamus, quando oculi nictare coguntur, hoc est palpebræ labuntur, illisque obducuntur vixque aperti retineri queunt. Sicuti cum somno pleni & graues sunt, in pigris accidit. Interdum quoque in morbis euenit.

### Causæ.

**C**ausæ horum diuersorum motus deprauati generum, in cerebro, neruis, musculis & membris variæ esse pos-

sunt. Vel spirituum agitatio, perturbatio, vel irritatio, distentio, imbecillitas.

Spiritus agitati per animi affectus cerebri calorem: vel perturbati per commistionem humorum, vaporũ, mentem alienando, variasq; imaginationes offerendo, vt ad eò inquieti sint, variæque tentent & peragant, efficiunt: sicuti in mentis alienatione explicatum fuit.

Irritatio in neruis facta, quâ ratione vt corpus couellatur, seu inordinatis motibus excitetur, efficiat, in convulsione dictum fuit. Cæterum ab irritatione & molestia quoque, alij motus vt nimium vel non rectè fiant, diuersimodè pro causâ variâ impelluntur. A calore enim inquietudo dicta sæpè fit, nõ tantum quia actiones promouet, & in actum deducit, aut in cerebro accenso delirium parit, sed quando totum corpus eo æstuat in febribus, & quia molestiam magnâ facit, corpus inquietum reddit: estq; febricantiũ symptoma, maximè continuarũ, continentium, ardentium: intermittentiũ etiã, tunc, quando in paroxysmo calor summus, præcipuè affligit: sicuti in febribus ostèdetur. Dolo-

Calor causa Inquietudinis.

Dolor causa Inquietudinis. Humores acres causa Rigoris, & Pandiculationis.

gravi offensum corpus & eo veluti ab hoste affictũ, nullo loco potest subsistere aut quiescere, in eoq; propulsando, mitigando, omnes actiones intendit. Ab humoribus acris, biliosis vel falsis, vel putridis, partes sensiles, & carnem musculorũ permeantibus, easq; veluti pungentibus & irritantibus, quia repellere molestiam, facultas illorũ expultrix, nititur, fit concussio illa corporis in rigore dicto. Sicuti hoc in febrium initijs, à materia eiusmodi exhalante, & corpus peruadente, accidere, eoq; nomine pandiculationes & oscitationes primũ, mox & horrores vel rigores subsequi: nonnunquam ea quoq; ante crism se manifestare, in febribus dictũ fuit. In euacuationibus alijs, in quibus similia acris excrementa profunduntur, vt in mictione, alui redditione, sudore, rigor vel horror non nihil, dum hæc fiunt, corpus vel vniuersum, vel certis in locis concutit. Quod & antequam hæc euacuationes fiunt, sæpè accidere solet, & instantes præfagire, naturâ iam ad has moliendas incitatâ. Sicuti sudorum instantiũ horror aliquis, in crisi & extra illam interdum est prænuntius. Et maxilla inferior

ante vomitionem plerumq; tremere solet, & veluti iam os ad apertionem naturali facultate voluntariam sic impellente, sollicitare.

*Vapores.*  
*Halitus*  
*si, causa*  
*Pandicu*  
*lationis.*  
*Lassitu*  
*do, causa*  
*Pandicu*  
*lationis.*  
*Ex Ofci*  
*sationis.*

Ab halituosis, vt vocant, vaporibus, in spatijs musculorum collectis, copiâque potius, quàm vehementiore acrimoniâ naturam ad excretionē sollicitantibus, motus ille distentionis artuum seu pandiculatio quoque provenit. Cùm in ea musculi, qui maximè ijs occupantur, ad eos propellendos constricti, membra sic trahant. Idq; maximè, quia tunc accedente simul lassitudine, vel spontaneâ, quæ ab excrementorū horum circa musculos collectorum copiâ nascitur, vel ex labore profectâ, à quo etiâ circa musculos, halituosorum vaporum fit cōgestio, per constrictionem hanc musculorum, in pandiculatione, non tantum quia vapores tunc propelluntur, à lassitudine non nihil recreantur, sed & quia musculi motu nimio & diuturno relaxati, & quando quiescunt, lassitudine illam sentientes, iterum constricti cùm aguntur, lassitudinem minùs sentiunt, sicuti lassitudinem lassitudine, sanari, superiùs dictū fuit, leuamen aliquod laborum per pandiculationem acquirunt, & proin in lassitudine ad eam edendam inuitantur, & inuitati impelluntur. Estq; hæc causa, quod naturalem defatigationem & pigritiam, ante somnū ferè pandiculatio comitetur, donec corpus postea per somnum rectè quiescendo, à lassitudine liberetur, & post somnum quoque tamdiu, quoad illud, quod de halituoso vapore restat, adhuc corpus extendendo, expellatur. Et quod in spontanea lassitudine morbos præcedente, tum ob vaporum copiam, tum corporis hanc lassitudinem, ea quoque sese manifestet. Sicuti eadem lassitudo & vaporum copia, oris illam diductionē & efflationem, in oscitatione dictâ, causat; operantibus simul & veluti consentientibus reliquorum musculorum conatui, musculis thoracis, & maxillæ inferioris, & buccarum si pandiculationi oscitatio iungatur. Vel separatim hisce musculis ad illorum defatigationem mitigandam, & vapores discutiendos agentibus, oscitatio nascitur. Quæ & ex imaginatione, si quis alium oscitantem videat, vel de ea cogitet, sic ad eam quoq; faciendâ veluti

inuitatus, oritur: facilius tamen in pigris & somnolentis, seu dispositis, quàm alijs. Sed & eadem causa à lassitudine musculorum, oculos palpebrasque mouentium & vaporibus, circa eos, collectis, dependens nictationem dictam, oculorum parit: quæ non tantum pandiculationi & oscitationi aliquando copulatur in pigris, sed & per se semper, cùm somnus inuitat, oritur; idq; quod ob continuū oculorum motum, semper illi lassii sunt, tum quod oculorum occlusio, quam oculorum hæc grauedo adeo impellit, vt etiâ dormientibus clausi maneant, ad somnum rectius capeffendum, necessaria sint.

Ab iisdem halituosis vaporibus dictis, sed *Vapores*  
*halituos*  
*si, causa*  
*Palpita*  
*tionis.*  
crassioribus & copiosioribus, in habitu corporis collectis, atq; exitum quærendo, hinc inde discurrentibus, palpitatio dicta, fit. Qui si sub catem erumpant, atque inter illam & subiectorum musculorum membranas vagentur, cutem hinc inde, vno aliquo vel pluribus locis attollentes, variegq; locū mutant, apparentem illis palpitacionem, cum doloris interdū sensu efficiunt. Si verò sub musculis, illorumq; discurrant spatijs, & inquieti sint, faciunt vt membra non nihil quoq; attrahantur, non tamen validè aut perseveranter, sicuti in spasmō flatulento dicto, fieri diximus, sed per interualla saltem, tunc quando status quasi in vnum locū se colligentes, musculum impellunt, partem allicientes, sed mox eandē, refugientibus & cedentibus iterum flatibus, mittentes. Ita vt non immerito, si ab hac causa membrorum hæc agitatio fiat, sicuti dictum est, flatulentæ convulsionis mitior species, vel Palpitatio flatulenta dici possit: vti illa quæ nervorum irritatione fit, sicuti declaratum, Convulsiva palpitatio. Cuius quoque flatulentæ palpitacionis causæ, siue status aut vapores sint, non aliam originem, quàm eam quæ in spasmō flatulento, proposita fuit, habent.

Imbecillitas musculorū ea, propter quam ipsorum actio non penitus cessat, sed tantum non sufficienter perfici potest, non omnimodam mouendi impotentiam, sed diminutam duntaxat efficit, deprauatē & cum tremore sese manifestantem. Idque quia dum membrum musculus attollere nititur, hocq; diu-

*Imagina*  
*tio, causa*  
*Oscita*  
*tionis.*



341

tius ob imbecillitatem retinere nequit, eo quidem ob gravitatem motu naturali relabente, musculo verò sursum motu voluntario retrahente; vicissitudine hac, & veluti contentione motuum inter se membro sursum deorsumque agitato, Tremor appellatus nascitur: qui tantò maior erit, si membrum quod mouere debet, graue existat, vel minùs sequatur, & musculus ad mouendum aliquo modo etiam inuoluntarie incitetur: uti obseruamus aliquibus, etiam si membra quiescunt, nihilominus tremere.

*Spiritus animalis defectus, causa Tremoris.*

Accidit autem hæc ipsorum debilitas nonnunquam, ob spiritus animalis defectum, non absolutum, ut in paralyti, sed talem saltem, quo sensus tactus adhuc quidem communicatur, sed musculis vis mouendi non sufficiens, subministratur: cum maior ad motum, quam sensum tactus illius portio requiratur. Quod absumptis illis interdù accidit, vnde tremor perseverans oritur. Idq; vel ratione ætatis, vnde senes fiunt tremuli: vel morbi grauis & diuturni causâ, post quos sæpè diu tremunt: vel euacuationis immodicæ, per venerem præsertim, sanguinis profusiones purgationes, laboresq; magnos. Aliàs verò dissipatis duntaxat spiritibus, donec illi redeant, tremunt. Ut per animi affectum vehementem vel subitaneum, in tremore, timore, ira, gaudio, aliquandiu tremunt. Et in motu valido vel celeri, ut cum grania onera gestant, vel aliud aliquid, quod supra ipsorum vires est, agunt, tremunt: & cum labores graues perpessi, quiescunt, aliquandiu membra nimium defatigata tremunt. Impeditis quoq; spiritibus, nondum tamen penitus interceptis, ut in paralyti, vnde resolutio musculi perfecta sequitur; sed ex parte duntaxat, imbecillitas quæ in musculo nascitur, tremorem causans, qui & tunc veluti diminuta quædã est paralyti, ab iisdem causis nervum, ut in paralyti, nõ tamen adeo potenter afficientibus, nata: præsertimq; ab humoribus excrementitijs nervos occupantibus, profecta. Sed & alij nervorum affectus, nõ spiritus intercludendo, sed nervos aliã ratione labefactando, lædendove, tremorẽ inducunt. Vti si ab humoribus excrementitijs, sicut dictũ, non tantum spiritus interceptando,

*Nervorum læsio, causa Tremoris.*

imbecillitas hæc in musculo tremorem causet, sed & irritando nervum ad motum, qui in tremore fit, nonnihil impellat, vnde & aucta causâ vel perseverante, tremor in convulsionem sæpè definit.

Quod si nervi quoq; narcoticis nimium aut sæpè assumptis, ex stupore illo, tandẽ eam imbecillitatẽ contrahant, ut & musculi ipsorum causa labefactentur, tremor etiã ab hoc ipsorum affectu nascitur: Sicuti non tantum ex opij, aliorumve fortiorum usu, sed ex suffitu hyosquiami, aliquibus accidit. Et ex vini vi narcoticâ, illos qui ebrietati indulgent, tandem tremulos fieri, obseruamus: quod tamẽ ab aquæ frigidæ potu, quã ebrij mane ad sitim ex vino conceptâ, restringendam, bibunt, proficisci, ne à vino abstinere cogantur, sibi persuadent: quam ipsorum suspensionem illud quoq; auget, quod cum ieiuni adhuc sunt & sobri, tremunt, & postquam vino rursus incalperunt tremor cessat, vel saltem minus se exerit: quod tamen non, quasi vinũ in causa nõ sit huius tremoris, accidit: sed quod dum vinum calorem corporis adaugens, actiones ipsius vegetas reddit, ut quamdiu ex vino calet, & veluti reficitur, eam imbecillitatem, quæ aliàs semper remanet, minus sentiat, eã ratione, ut cibo vinoq; refecti, robustiores facti, minus tremant in causa existit.

A Venenatis alijs, nervis potissimum insidiantibus assumptis admotisq; eadem ratione tremor aliquando nascitur. Vti ex hydrargyri suffitu (non contactu, uti aliqui voluerunt) aurifabris in inaurandis vasis, si sibi non caueant, sed illũ hauriant, interdũ contingere solet. Ob quam causam etiam in lue venerea cinnabari suffumigati, præsertim si tunc quoq; vinũ bibant, quo facillẽ imbecilliores iam prius facti nervi, læduntur, in tremorem sæpè incidunt. Quod & illis frequenter evenit, qui in eodẽ affectu hydrargyro inuncti, tremorem inde adipiscuntur. Quæ ab hydrargyro profectæ læsiones nervorum, vel ab antipathia illius cum nervis, proficiscuntur: vel à proprietate illius aliã illi ferẽ propriã, quã humores commouens, eos ad fauces propellendo, expuitionẽ copiosam mouet, ac ad superficiẽ & extremitates corporis propulsando, nervos quoq; afficit; eodẽq; grauius, si

humores qui promouentur, prauī existant, nec per sudores decenter expurgētur, à quibus etiam, si vehementius nervi patiantur, convulsiones, quæ curas hæc, hydrargyri vsu factas sæpè sequuntur, post tremores patiuntur.

Ab ortu vitium aliquod in nervis esse potest, vnde trementes aliqui nati sunt. Sicuti exemplo cuiusdam prius demonstratū fuit. Quod quale fuerit, egre explicari potest, cum nihilominus tremens, sua munia longo vitæ curriculo peregerit, vxoremq; duxerit.

### Curatio.

**C**urationem pro diuersitate generum diuidimus: & in singulis quid faciendum sit, explicabimus.

**Convul-**  
**sionis cu-**  
**ratio.** In convulsionetām generali, quā particulari, quid agendum sit, in convulsionibus edoctum fuit. In convulsua quoque palitatione dicta, quatenus hæc convulsiones veras minatur, iisdem adhibitis præsidijs eam præcauere, studēbimus: illius verò motus causā, nihil peculiare, cum non adeo vrgeat, membrīs adhibetur.

**Inquietu-**  
**dinis ex-**  
**me,** per  
**tu-batio-**  
**ne, curas-**  
**ratio.** In inquietudine, si illa ex mentis perturbatione nata sit, quid tum ratione morbi, tum huius etiam symptomatis, cuius causa, quomodo soporiferis compesci, & vi adhibita coerceri debeat, in mentis alienatione explicatum fuit.

**Inquietu-**  
**dinis ob dolo-**  
**rem, cura-**  
**ratio.** Si ob dolorem inquieti sint, tunc anodynus dolorem mulcendo, & soporem, ac si vehementius vrgeat, stuporem inducēdo, vnā cum dolore inquietudinem, emendamus.

**Inquietu-**  
**dinis propter**  
**calorem,**  
**cura.** Ob calorem verò non solum cordis & cerebri, sed & totius corporis in febribus, si inquietudo oboritur, tunc symptoma hoc, quia vires deijcit, ad se curam trahit. Quæ tamen non aliter quā quæ febribus in restringendo incendio adhiberi solet, vsurpatur, nisi quod hîc remediorum vis augenda, eoq; nomine cum vrget cura, Sanguinis euacuationem & diuersionem, nisi quid obftet, copiosiores molimur, vel eam reiteramus. Refrigerantium itidem qualitatem, tum internis externisq; remedijs augemus: atq; quæ calorem augere possunt, vt nimia integumenta, auferimus, & conclauia occlusa, a-

perimus. Et symptomatis præcipuè causā, fricando corpus, vapores qui inquietudinē causant, vel augent, à nervoso genere diuertendo, & postea illud iunctione spinæ, oleo Viol. Amygd. dulc. &c. leniēdo, iactationem illam corporis emendamus. Quod & fit, si ægros, ne nimio motu se debilitent, aut denudando sudores impedian, admoueamus: atque vt illos non nihil compescamus, somnum conciliemus.

In tremore pro ratione causæ procedendum erit. Et si ab animi affectu tremant: vel ob laborem viribus imparem, cessantibus illis, cessat & tremor.

Si verò spiritibus dissipatis vel absumptis **Tremoris ob spirituum de-**  
**secum,**  
**cura.** ob senium, vel venerem, aliasq; profundas euacuationes, aut post morbos graues sequatur, tunc facilius est dissipatas, difficile verò admodum amissas vires reparare. Quod tamen tentandum, curā Resiciente dicta, quæ potissimum perficitur: Somno decenti & medio-cris; Exercitio moderato & tempestiuo; quod & si à labore vehementi tremor inductus sit, plus proderit, si leuiter obeatur, quā omnimodum ocium: Animo læto; vel si ab affectu illius aliquo tremor remanserit, affectu animi contrario emendatur: Aëre sereno temperato, puro, odorato: Alimentis euchymis beneq; nutrientibus: spiritus item reficientibus, & calorem augentibus, vt Vino, quod moderatè sumptum adeo reficit, vt & à vino inductum tremorem, vi dictum, si assumatur, reficiendo, corrigat.

Quod si verò à neruorū affectu procedat, **Tremoris à neruorum affectu, cura.** sitq; veluti imperfecta vel diminuta paraly-sis. Et ab ortu fiat, vel alias à graui affectu, incurabilis nonnunquā est. Si verò ab humore excrementitio nervos occupante procedat, non alia curandi ratio, quā quæ in paraly si dicta fuit, & alijs cerebri neruorumq; morbis, ab excrementis genitis, inter quos & convulsio est, huic affectui curando adhibetur. Quæ si maturè vterentur, in eaq; perseuerarent, sine dubio citius quā paralytici sanarentur: sed quia, nisi maximus sit tremor, eam negligunt, aut paucis contenti esse volunt, sit vt tremor non tantum non cesset, sed & superueniente senio augeatur.

Sicuti itaq; in paraly si dictum fuit, ira hîc quoque

quoque procedendum, Corpusq; primum generatim est purgandum, idque si persistat malum, certo tempore repetendum: Particularesq; euacuationes & diuersiones instituendae: Alterantia quoque eadem propinanda: Atque extrinsecus similia sunt applicanda: Thermaeque, si non alijs cedat, imperandae: Imprimisque cauendum, ne manus tremulae frigori exponantur: aut aqua frigida abluantur. Cuius loco decocto Saluiae florum Lauandulae, & similibus abluui possunt: inter quas lotiones, si Urina partes abluantur manè, plurimum iuuare docent.

A veneno si tremor originem sumpsit, quae huic resistunt alexipharmaca, usurpanda. Et si, quod frequentius fit, ab hydrargyri usu hoc fiat, Theriacam exhibet, vel Cordialia medicamenta, quibus Aurum limaturam permiscet; cum aurum tantam affinitatem cum argento viuo habere dicant, ut si in corpore sit, aurumq; propinetur, illud adeo secum trahat, ut postea per secessum excretum, purum in excrementis auro adherere deprehendatur: quam ipsorum cognationem ex eo, quod in deuratione aurum non metallo, nisi interueniente argento viuo, adglutinari possit, desumpsit.

Sunt qui sudoribus hydrargyrum e corpore se elicere posse, ut manifestè instar arenae cuti adhæreat, & postea aqua ablutum, splendere iterum appareat, hac arte docuerunt: Si alternis in stupida diebus, vno die vino decoctionis Saluiae & Absynthij effuso in lateres ignitos, altero vero Thure carbonibus iniecto, corpus suffumigantes, sudorem eliciant: & quoties balneo egrediuntur, Aquam vitæ cum Melissâ destillatæ, corpus perfricent; idq; per dies 12. vel 14. continuent. Postea sex diebus oleo Sesamino & Vulpino se mungant, donec, ut inquit, arena prædicta cuti adhæreat. Nos vero qui argentum viuum in substantiâ, nec per suffitum illius nec per inunctiones corpus subire, uti neque alia medicamenta profitemur, sed viribus tantum eò usque deductis, id quod præstant, moliri, falsam hanc vulgi & Medicorum quorundam opinionem esse, licet admodum mentibus homi-

num impressa sit, & impostores supposito clanculum argento viuo, in emplastro, eam in vulgo confirmant, iudicamus. Et in simili casu, ut aurifabri dum inaurant, extradomum in aëre libero sedeant, sicuti plerunque facere solent, ut ventus ab illis fumum procul arceat, imperamus. Et si argento viuo in cura opus est, ut illud decenter & moderatè administretur, iubemus. Quod si tamen tremor inde nascatur, eadem præsidia, topica præsertim; in paralyti dicta, quæ nervos roborando potius & non nihil constringendo, ut vult Rondel. quam insigni calore afficiendo iuuant, imperamus, partesq; tremientes, decoctis supradictis abluimus.

A narcoticis, si tremor suboriatur, & illorum vis adhuc operetur, quomodo illa sit infringenda, in stupore dictum fuit. Si vero tremor remanserit, eadem topica dicta tentanda erunt, quæ roborando quoque calefaciant: non quod refrigerati sint à narcoticis nervi, uti putant, sed quia stupidi cum sint, calore excitantur. A Vino vero ebrietas si tremorem causerit, vel sponte cessat, si illa non adeo sit consueta: si vero iam diu fuerit continuata ebrietas, tremor inde natus ægrè amplius tollitur, præsertim, cum tam peruersum habitum ebrii contraxerint, ut nisi se vino iterum impleant; eoque uti in causis dictum, incalescant, tremore magis diuexentur. Interea tamen temperantiâ & sobrietate vige, hoc genus peruersum emendent: remedia quoque nervos roborantia, tam exhibita quam admota, proderunt.

In rigore dicto, si levis sit, vel horror tantum, cum non adeo molester, aut diutius perseueret, in eo emendando non est laborandum. Et si quoque vehemens sit, cum natura per illum in principijs febrium noxiam nitatur expellere materiam, nec tunc facile compescendus, aut naturæ motus impediendus, uti neque si crism præcedat: cum, ut inquit Hipp. à causone rigore superueniente, fiat solutio.

Quod si vero adeo corpus exagitet, vnâ cum frigoris sensu molesto, ut ægri eum cum magna molestia patiantur, ab eoque debilitentur, tunc mitigandus potius, quam peni-

*Rigor  
ab  
humoribus  
acribus,  
cura.*

tus impediendus erit, cum hoc non sine detrimento fieri possit, rigoreq; omnino sublato, totius febris decursus sistatur, vel ut non decenter fiat, procuretur: ita ut licet ea remedia, quæ rigorem non sinunt erumpere, febrem sanare credantur, ea tamen potius retardando, ut postea deterior sequatur, vel in grauiora accidentia commutetur, faciant. Nisi forte rigor ille inutilis, ex consuetudine potius quam causâ morbificâ, quæ iam sublata sit, persistat; tunc enim omnino quoq; præcauendus. Sicuti hæc in febribus copiose explicata sunt.

Quâ ratione autem totius febris paroxysmus, cum rigore impediatur, in febribus similiter edoctum fuit. Ad mitigationem verò sufficientia sequentia.

Si actu corpus nonnihil calefiat; nam dum frigori prospicitur, etiâ rigor placatur. Quod in pedibus innoxie magis fit: eos calefaciendo pannis alijsve modis: ut Aquâ calidâ in vase æneo: vel Lapidibus aut tegulis calefactis, & panno inuolutis.

Frictionibus & ligaturis extremitatum materiam diuertendo, rigore emendamus.

Imprimis inunctionibus spinæ id præstat: oleis quibuscunque calefacientibus & neruoso generi accommodatis: ut R. ol. Chamomell. Anethini, Hypericonis ana ʒ.β. Inungatur: manib. prius irroratis Aquâ vitæ.

Vel hoc modo: R. flor. Chamom. Hyperici, fol. Abrotani, siccorum, pult. ana ʒ.ij. Pyrethri ʒ.j. affunde olei Nucum q.s. ut integatur, Aquâ vitæ ʒ. ij. coquantur, exprimantur. Inungatur spina.

Vel ex succis & oleis: R. succorum Artemisiæ, Abrotani, ana ʒ.β. olei Anethini, Rutacei ana ʒ.j. Aquæ vitæ ʒ.ij. Croci ʒ.β. coquantur parum: fiat illinitio.

Theriacam permiscet aquæ Vitæ & oleis, & inungunt spinam pleriq;. Alij, si magnum sit frigus, aromata immiscet.

Inunctio ex Araneis, ex febribus exposita, vii & alia illic explicata, id quoque præstant. Quibus & plantæ pedum fricantur.

Sunt qui stuphas, si febrilis calor non impediatur, & rigor summè noceat, probant, ex decocto Pulegij, Calamenti, Rutæ, Abrotani, Artemisiæ & flor. Chamomil. & Meliloti.

In pandiculatione & oscitatione, cum hæc damnum inferre minimè possint, sed potius iuuent, nullâ curâ illic opus erit: nisi quatenus, si hæc vnâ cum lassitudine spontaneâ, tanquam signa morbus prænuncient, ut hisce occurramus, remedia nos adhibere admonent.

Si ex oscitatione maxilla inferior facile luxetur, ut eam nonnihil reprimant, nec ad eò patulo ore oscitent, imperamus. Vti & in pandiculatione, cum nimis membra extendere inciuile sit, eos membra nonnihil cohibere, ciuilitatis causâ potius, quam utilitatis, docemus.

DE RESPIRATIONIS DEFECTV.

## DE RESPIRATIONIS DEFECTV.

### CAPVT IV.

#### Genera.

**D**EFFECTVS respirationis, cum vel aboletur, vel difficulter fit, dicitur. Quodd & respirationi naturalis; & expirationi voluntariæ siue vocali, in voce & loquelâ edendis, accedere potest.

Respiratio quæ inspirando & expirando naturaliter continuè cordis causâ obitur, perseveranter omnino aboleri, viuentis homine minimè, sed ad tempus cessare penitus potest, in Syncope verâ, & eâ quæ Vteri strangulatum dictum, comitatur. In quibus casibus, quamdiu animus, ut vocant, seu vita, aut vitalis motus potius; in illis deficit, tamdiu nulla penitus in illis sentitur respiratio; vel adeò obscura est ut nullam aëris efflationem pennâ etiam naribus admotâ, aut motus vestigium in poculo aquâ pleno pectori imposito animaduertere liceat, sed mortuorum instar, sine omni motu & sensu iaceant.

Difficulter autem respiratio sæpè procedit, quando cum magno labore & impedimento, eam ducunt. Et si hoc cum intenso conatu fiat, ita ut in suffocationis versentur initio. Suffocatio & Strangulatio appellatur, quæ etiam nisi cessaret, sequeretur. In quo periculo, quia cum decumbunt magis versan-

Pandiculatione  
an & O  
scitatio  
nis ab  
haliu  
sis vapo  
ribus, cu  
ra,

Respiratio  
abole  
ta in  
Syncope.



349

versantur, vt illud auertant, erecti, thorace eleuato, rectâque ceruice spirare coguntur: tuncq; Orthopneumatici vocantur, & quia si corpus mouent, concitatiores factâ respiratione, magis anguntur, quieti esse coguntur. Aliâs verò minori angore, difficulter tamen quoq; spirant, Dyspnœaq; simpliciter appellatur: expiratione interdum, in spiratione quandoque, plus laborantibus, aliâs ambo-  
*Strangulationis*  
*ab exterioribus.*

Diuersimodè autem dyspnœa vel strangulatio se offerunt. Aliâs enim concurrente aliquâ causâ manifestâ, à qua etiam vt in causis dicemus, nascitur, & se prodit.

Interdum catarrhum comitem habet spirandi difficultas: in quo & nonnunquam, respiratione omni subito interceptâ, suffocantur; diciturque hoc malum Catharrus præfocans aut suffocans.

*Asthma.* Frequenter cum pectoris affectibus, tussi, stertore, copulatur in Asthmate dicto; in quo cum difficultate, crebram, ac si nimio motu fatigati essent, ducunt respirationem, vnde Anhelosi & Suspendiosi dicuntur, tussiuque sed nihil purulenti expuunt: & in pulmonibus interdum fistulatio quædam vel stertor auditur: hocq; malum vel continuè vel leui ex causa ipsos inuadit, repetitque & suas habet exacerbationes, diuturnumque est, & pertinax.

*Angina.* Cum difficultate transglutiendi dyspnœa nonnunquam iungitur, doloriq; vel molestia in faucibus & collo simul adsunt, præsertim in Angina dicta, vel Cynanche, quia ob impeditam respirationem, ore aperto canum instar hiant; quem affectum febris aliquando comitatur.

*Suffocatio ex dyspnœa in Apoplexia, Paralyfi, Spasmo.* Aliâs quoq; cum resolutione totius corporis: in apoplecticis, respiratio summè laborat, & egri suffocantur, vti illic dictum est. Dein & aliquando cum paralyfi, vel spasmi aliquâ specie, sicuti illic dictum, dyspnœa iungitur. Vt tunc cum validè expirare volunt, quod ad vocem altam edendam requiritur, & ad risum, ploratum, clamorem, vel ad tussendum impulsî, potenter exsufflare coguntur: quod, quia ob causas illic explicatas facere non possunt, in suffocationis incidunt periculum.

Vterini affectus, Suffocationis veteri seu Suffocatio Strangulationis aut Præfocationis dictæ, eam speciem, interdum præcedunt, quâ subito præhensi, respiratione aliquando penitus sublatâ, aliâs admodum impeditâ ita anguntur, ac si fauces vinculo stringerentur, quas sic affectas Hystericas vocant.

Ventris tumor, distentio dyspnœæ quoq; adfunt, in naturalium partium vitijs: maxime verò in Hydropicis, quibus dyspnœa admodum molesta est, ita vt erecti orthopneumaticorum instar, spirare cogantur, & decubentes in suffocationis versentur angore.

Est & nocturna quædam; dormientibus eueniens suffocatio, Pignation dicta, vel Incubus, quia à re aliqua incumbente & comprimente, se suffocari putant & somniant, & vigilantes postea illud ab hoste, vel venefica, vel dæmone se passos, ab illisq; se inuasos & oppressos, vnde Ephialten vocant, existimant, & nonnihil, aliquamdiu delirantes, sibi persuadent.

Vox, siue exspiratio vocalis, quam ex arbitrio nostro penitus omittere possumus, non tamen reddere, nisi exspiratio accedat, aboleri respirationis causâ diutius, cum nec respiratio diu cessare possit, minimè potest. Obscurè tamen eam edi, illius causâ contingit, si respiratio admodum sit exilis. Frequētius verò vt clara & elata admodum vox proferri nequeat, in dyspnœa euenit. Verum non impedita expiratione, vox nihilominus à nobis interdum exprimi nequit, vel aliâs quoque tacere & demisere tantum proferri. Quæ ambo in paralyfi nonnunquam accidunt, alijs quoq; tunc motibus, vti illic explicatum, simul læsis. Aliâs verò citra hanc, vox aliquamdiu deperditur, rursumque redit: sicuti memini excellentem Medicum, Theodorum Zwingerum; comitem meum & collegam, cum in schola parentis mei Thomæ Plateri; communis nostri præceptoris versaremur, aliquoties ita obstupuisse, vt ne verbum quidem; etiam cum comminatione interrogatus, respondere potuerit, & sic mutum & attonitum domum rediisse, sensibus alioquin integris: quam speciem Apolipsin, Hippoc. Aphomiam, vocant; aliqui ad Catalepticos species.

*Vocis defectus cum dolore faucium.*

species referre voluerunt. Interdum & in voce deperdita, vel debili, dolor in faucibus tumor aut aliud vitium sentitur; nonnumquam & apparet.

*Loquela defectus, deficientis Vocis.*

Loquela, sive articulata vox, studio & voluntate nostrâ intermitteri potest. Loqui verò, nisi vocalis accedat respiratio, minime possumus. Et proin vocis defectus, vt iam dictum, causâ, loquela vel aboletur, vel non sufficienter editur. Verùm & citra vocis impedimentum, loqui interdum non possunt, & Muti dicuntur, in resolutione vel privatâ linguæ, aut cæteris quoque partibus communi. Interdum & Muti & Surdi simul ab ortu existunt. Frequenter verò certas syllabas aut literas, eas præsertim, quæ vt efferrantur, linguæ varia inflexionem requirunt, vt in R. & S. cum stridore vel sibilo efferendis, cum non exactè possint exprimere, balbutiunt, Blesiq; dicuntur. Quod & cum labiorum vel dentium aut faucium vitijs aliquibus accidit.

### Causa.

*Cerebri causâ, suffocatio in Apoplexia.*

Causa omnis sublatae vel diminutæ respirationis, vocis & loquelæ, quomodo sensibus omnibus sublatis in apoplexia, ratione cerebri affecti, & in epilepsia etiam; hæc deficient, in mentis consternatione explicatum fuit.

*Cordis causâ, respirationis abolita in Syncope.*

Qua ratione quoq; quamdiu cordis motus cessat, tamdiu & respiratio cessare possit, cum ea tunc non opus fuerit, vt verò si illa impediatur, cordis motu non prius desistente, hominem mori necesse sit, in syncope ostendimus.

Verùm si citra partium principum, cerebri & cordis affectum, hæc deficient. Fit hoc ratione nervorum, vim deferentium; Vel musculorum mouentium; Vel instrumentorum aliorum, motum efficientium & adiuuantium.

*Nervorum linguæ affectus, causâ, quod Muti interdum & surdi fiant.*

Nervorum affectorum occasione loquelam vocem, & respirationem labefactari posse, in motus impotentia, prius explicatum fuit, resolutis tunc vel contractis ipsorum musculis, à causis illic enarratis. Vt loquelam priuatim interdum aboleri, coniugatione tertiâ, quæ linguæ nervum efficit,

affectâ, & si noxa magna sit, præsertim ab ortu conformationis vitium auditum tunc ferè simul tolli, ob illius cum ramo dicto communicationem. Idem etiam fieri, si sextæ & septimæ coniugationis nervi, recurrentis dicti, rami musculos linguæ implicantes, patiantur. Et si hoc in eorundem nervorum recurrentium propaginibus, laryngem implicantibus fiat, vocem tunc quoq; cessare, factum Anatomicorum, qui experiundi gratiâ, recurrentes vinculo in porco exceperunt, manifestè declarat. Quæ aphonia, nervorum recurrentium causâ, à causis internis nata, rariùs priuatim voci accidit: & si fit, vel à vapore tantum aliquo crasso, vt voluerunt, vel defluxione eò solummodo delapsâ, proficiscitur. Frequentiùs verò hoc vitium voci & loquelæ in paralyysi, à causis dictis, vnâ cum alijs quoq; motuum impotentijs, accidit. Quibus & respirationis impedimentum illud, quale in voce validâ, vociferando, ridendo, eiulando, tussiendo, stertutando, edendâ, sese offerre diximus, interdum accedit, si reliqui rami, intercostales musculos implicantes, affecti simul sint. Rariùs enim respiratio sola, & separatim citra alias læsiones, nervorum causâ, defectum patitur: cum septum transversum, cuius motus ad moderatam respirationem sufficit, nervos; vt illic explicatum fuit, non solum à coniugatione nervorum dictâ, sed & à dorsali medullâ insignes vtrinque; nervos, à primis illius paribus inuicem iunctis, progressos, & ad septum descendentes, acceperit. Quam ob causam, non nisi & dorsali medullâ & coniugationibus simul læsis, quod vix, nisi circa exortum in cerebro, vt in apoplexia dictum, fieri potest, respirationem cessare contingit. Vt neque in paralyysi impediri, nisi læsio vtriusque, & paribus & coniugationibus nervorum accidens, & ad septi quoque pertingens nervos, pluribus motibus incommoedet. Fit tamen etiam, vt maiores præsertim nervi septi, à dorsali medullâ progressi, defluxionibus aut alijs motibus separatim & soli infestati, dyspnœam quandâ pariant: qualem in astmaticis, nullis alijs pulmonum affectorum indicijs apparentibus, continuò egrotos infestare, obseruauimus.

*Nervorum recurrentium defectus & Vocis causa.*

*Nervorum 6. & 7. coniugati, affectus, causa dyspnœæ cum Paralyysi.*

*Septimi nervi defluxione molestati, causâ asthmæ occultum.*

*Musculorum* Musculorum causâ, respiratio naturalis & vocalis deficit. Veluti loquela, si musculi linguam mouentes; (nam de linguæ vitiis, quatenus instrumentum est, quod mouetur, postea agemus) vox si laryngis musculi, defluxionibus molestati, officium suum, illi linguam mouendo, hi rimulam laryngis, pro diuersimodâ voce edendâ, dilatando arctandoque, facere minimè possint. Vel si hoc ex inflammatione ipsorum aut tumore alio, functionem ipsorum impediante, accidat.

*Thoracis musculorum* Respirationis verò naturalis defectus, thoracem constituentium & mouentium musculorum morbi causâ, interdû accidit: nec tantum, cum validam exfufflationem facere volumus, quod potissimum hi musculi præstant, respiratio detrimentum capit, sed & si causa magna sit, naturalis quoque inspiratio impeditur. Idque ferè à defluxione, in musculos thoracis atque intercostales, defluente, vnde magna sæpè pectoris angustia, cum dolore sequitur. Quod & fit, si hi musculi contusi vel inflammati sint, vnde tumores & dolores extrinsecus sese offerunt: & si abdominis musculis, qui thoracem etiam mouent, excrementaque exprimunt, hoc accidat, conatum illum vehementem, qui ex spiritus retentione, & musculorum horum pressione, in excrementorum egestionem, requiritur, edere amplius nequeunt.

*Septum transversum* Septum transversum, cum naturalis respirationis præcipuum sit organum, si lædatur, non solum per consensum neruorum illius, sicuti prius declaratum est, sed per se, tunc respirationis læsæ potissima causa existit. Fit autem hoc, præsertim si defluxio, quæ in neruos illius decumbit, vel in intercostales musculos delabitur, ad septum quoque pertingat; vnde vehementer aliquos angivimus. Aliis verò morbis si petatur, septi motus potius deprauatur, quam debilitatur, sicuti illic explicamus. Licet & fieri possit, vt septo transuerso, quia liberum in interioribus latens, interno calori vndique expositum est, in causa exiccato & constricto, eo nomine dyspnœa, quæ in febribus hinc sæpè euenit, oriatur. Frequentius autem motus illius impeditur, si à vaporibus, flatibus, humoribus, aut visceribus vicinis, molesteretur.

Vapores quantitate aut qualitate manifestâ vel malignâ & venenatâ, in ventre inferiore suscitati, & circa hoc interstitium transuersum seu septum collecti, illicque donec ulterius ferantur, aliquamdiu subsistentes, & illius liberum motum, qui in respiratione requiritur, variis modis, præsertim si copiosi sint, impediunt, nunc dyspnœam, nunc suffocationis metum inducunt, aliâque insuper accidentia: Tum quod septum magnum consensum cum corde ob pericardium, tum cum cerebro, quia nervosa est pars, neruosque insignes possidet, habeat. Vnde fit, vt si molesteretur, non tantum respirationi obsit, sed & cordis & cerebri quoque accidentia sequantur: eoque magis, si vapores ulterius ab eo ad hæc quoque partes principes pertingant: quod, si maligna aut venenata illis inlit qualitas, facile potest contingere: quemadmodum & hæc septo non offenso, hisce partibus aliâs incommodare solent: vt in sensuum internorum læsionibus diximus, & cordis affectibus ostendimus. Quæ tamen accidentia, vaporibus, septi motu, repulsis, aut alioquin discussis & dissipatis, aut refugientibus, mox cessant; nisi ex continuo causæ appulsu, septum adeo molesteretur vel inficiatur, vt vel permanens aliquis sequatur affectus, vel mentis functionum, quæ septi vitio lædi solent, (sicuti eo inflammato phrenitidem sequi videmus, vnde phrenas, id est, mentem septum vocant) grauissima accidentia sequantur; vt epilepsia, mania, & tandem cerebro diu multumque percusso, apoplexia: quæ mala, hæc suffocationis symptomata, per paroxysmos aliquoties inuadentia, præcedere & præagere solent.

A venoso autem genere, eiusmodi vapores, vt à sanguine crudo, impuro, prauo & maligno, nondum tamen putrido; (alioquin febris fieret) plerumque suscitari, in mania & epilepsia ostensum est. Quemadmodum enim illic, diuersimodè hinc inde in corpore, à sanguine in venæ portæ & causæ ramis collecto, tales excitati vapores, cerebrum molestantes, enarrata procreant accidentia; sic & in ventre inferiore potissimum, tantquam sentina excrementitij sanguinis, col-

lecti, sursumq; magnâ copîâ, affatim septum petentes, illudque molestantes, vel suffocationem tantum, vel alia insuper, vti dicitur, procreant incommoda.

*Vapores  
à venis  
miserabilibus  
in septo  
afficientes,  
causa  
Incubi.*

A venis autē miseraicis, maioribus præfertim, vndique, circa præcordia ad viscera, dispersis, & in quibus, propter primæ concoctionis multa excrementa, sanguis impurus facilius colligitur, vapores eiusmodi aliquando exurgentes, & circa septum subsistentes, suffocationem, quam Incubum vocant, procreant. Qui noctu potius, tunc cum concoctio fieri debebat, inuadit: quod eo tempore vapores prauillic collecti, plerunque, accedentibus cruditatibus, augeri mouerique, & sursum ferri, & propter decubitus magis angere soleant. Vnde per insomnia, angustias hæc sentientes, causas varias, vnde hæc proficiantur, somniant, sæpeq; si mens ab illis insuper non nihil affecta sit, excitati, in eadem manent persuasione. Et licet excitatis erectisque, discussis tunc vaporibus cesset malum, sæpe tamen, si fomes mali remaneat, repetens, tandem cerebro grauiora, vti dictum, minatur atque adfert accidentia. Cuius certè mali causa, à prauâ victus ratione, eaq; diu continuatâ, vti in aliis affectibus, à vaporibus illic quoque pronatis, potissimum in melancholiâ hypochondriaca & febribus intermittentibus, quemadmodum in illis ostendimus, dependet. Pueris proin & adultis, qui in victu citius & diutius delinquant, consuetus hic affectus.

*Vapores  
ab vteri  
venis, se-  
ptum af-  
ficientes,  
causa suf-  
foatio-  
nis vteri.*

Ab vteri venis hoc frequentius in foemineo sexu proficitur, in strangulatu vterino ob id dicto. Quæ cum à venæ causæ ramis deductæ, & plures & magnæ, vterum illiusque membranas perreptent, si in illis illuies sanguinis, quæ à tota illius massa, in impuris corporibus eo repurgari solita est, vti stato tempore per menses expurgaretur, subsistat, quod suppressis mensibus in nuptis frequentius, nuptis non tam facile, eo congressum fieri solet, vaporesque inde septum petant, suffocationis vteri diuersa producunt genera, prout septo, & vicinis, aut illi consentientibus partibus incommodat, & vaporum illorum copia naturaque diuersa existit. Nam si septo tantum noceat, vel dys-

pnoeam solummodo si minor sit copia aut offensa, vel si maior, suffocationis tantum agonem parit. Quod si verò ventriculo, septo per stomachum continuato, simul noxam adferat, tunc cum dyspnoea & compressione orificij ventriculi, quod cor vocant, nausea, vomitu, vertigine, & capitis dolore per consensum factis, hysterica accidentia sese proferunt. Quæ in gravidis mulieribus, in primis mensibus, foetu nondum adaucto, nec sanguinem retentum absorbere valente, maxime si impurus sit, euenire solent pathemata: à quibus & se grauidas esse indicium desumunt. Longè grauius afficiuntur foeminae hystericae, si cordi simul ob communionem, vti dictum, vapores hi, venenati præsertim, comunicati, detrimentum quoque adferant. In qua specie penitus cessante cordis motu, omnis quoque cessat respiratio, & veluti syncope prehensæ, sensim ad terram labuntur virgines, & in eâ accessione, aliæ breuiore, aliæ horæ etiam spacio, antequam ad se redeant, detinentur. Alias verò septum, ob consensum quem cum cerebro, vti dictum, habet, vel vtrumque simul, ab hisce vaporibus affectum, cum strangulatione vterinâ dictâ, furor vterinus appellatus, vel conuulsiui motus, aliæque cerebri offensi læsiones, sese manifestant.

Quæ omnia non solum ratione partium affectarum, sed si venenata simul accedat causa, pro veneni diuersâ naturâ, quæ huic illivæ parti potissimum insidiari solent, variare quoque possunt. Quemadmodum sanguinem vitiosum, vapores eiusmodi expirantem, à causis diuersis generari, & circa vterum colligi, in vterinis aliis affectibus exposuimus. Inter quas & semen retentum corruptumq; non minimam causam in virginibus, quibus hic affectus familiaris est, esse crediderunt: quod tamen, quamdiu in propriis vasis continetur, vix potest fieri, & si ex illis effusum, retentum sit, erosionem potius illius loci, quàm talia procreat accidentia, sicuti alibi explicabimus.

Flatus abdominis capacitatem implentes, quia illud vt & septum, quod illius superiora occludit, distendunt, dyspnoeam causant. Quod & ventriculi & coli, ventriculi

*flatus*



succumbentis, à flatibus inflationes, ob vicinitatem & adhærentiam cum septo efficiunt: atque inde proficisci, murmure & tensione illius loci, cognoscunt. Incubum verò ab iisdem flatibus aut crassis vaporibus, vt scribunt, minimè fieri, vti voluerunt, longè grauiora, quæ tunc eueniunt atq; inde sequuntur mala, satis declarant.

*Humor*  
*septū occupans,*  
*causa*  
*dyspnæ.* Humor aquosus abdomen quoque distendens, thoracisque inferiores costas diducendo, septum extendens, in hydrope ascite, spirandi difficultatem parit: sicuti in hydrope declarabitur. Humorem verò qui in thoracis cauitate colligitur, pulmones impediendo potius quàm thoracem, dyspnœa causare, mox in pulmonibus ostendemus.

*Viscera*  
*septū im-*  
*pediētia,*  
*causa*  
*dyspnæ.* Viscera septo substrata, & adnata vel appensa, si molem nimiam acquirant, pondere suo septum trahendo, liberè moueri non sinunt. Vel in decumbentibus, illi incumbentia, illud premendo, impediunt. Sicuti cum hepar, lien, obstructa, indurata, & in molem aucta, in hydropicis, summam illam respirationis difficultatem, quæ hydropem antequam tumor appareat, diu sæpè ante prodit, quæ recumbentes infestantur, erectiq; ob id sedere coguntur, causant: adaugente simul eam ventris tumore, sicuti iam dictum fuit.

A' ventriculo, cibo nimium impleto, dyspnœa etiam euenire potest, quæ tam diu angit, donec assumpta digerantur, vel vomitu reddantur, aut ructu leuentur. Quod cum non succedit, sitque magna repletio, suffocari possent. Quod vt ab ingestorum quantitate, sic qualitate quorundam ciborum, vt fungorum qui suffocare solent, potest accidere.

Instrumenta per quæ respiratio, vox & loquela obeuntur, vel reguntur, sunt Cavitates oris, narium & faucium, aërem ad omnia tria præstanda continentia. Partes in ore positæ ad vocem articulata, seu loquelam edendam: motu suo, lingua: vel modulatione, columella & dentes. Ductus seu fistula à faucibus ad pulmonē delata, vocem edens, respirationiq; in aëre deducendo inserviens, aspera arteria. Viscus seu follis, motu naturali ad respirationem aërem suscipiens & exprimens, pulmo. Thorax, cum

pulmone cui se accommodat, motu voluntario idem præstans.

Oris, narium & faucium amplitudinis causa, hi defectus contingunt. Si os & nares simul ab externis corporibus, vel aqua obturata sint. Vel alioquin, dentibus constrictis, os aperiri non possit, naribus interim mucosum oppletis; quo nomine in suffocationis periculo versantur interdum apoplectici, & epileptici, præsertim cum alioquin obscura in ipsis fiat respiratio. Quod si verò nares tantum mucosum, aut aliis occludantur, cum ore aperto spiritum haurire queant, impedita tantum tunc, cum aër non sufficienter introritti possit, non nihil est respiratio: seu potius, quia cita tunc fit, deprauata, voxque inconcinna editur. Faucium posteriore amplitudine similiter obturata, præsertimq; circa ipsius angustias, in quibus vel minimum hærens, negotium facessit, idem euenit. Idq; præsertim, si tumore in succingente tunica aut musculis faucium, & laryngis, aut glandulis, vel columella nato, vel ab uvulâ delapsa, introitus in fistulam & gulam occupatus, obstruatur. Vel si luxatis ceruicis vertebra introrsum (quod in primâ, quæ laxè cū capite articulatur, & ob capitis pondus magnos motus sustinet, frequentius fit) hæ viæ arctentur: maxime si tunc nerui simul & aspera arteria comprimantur. A' quibus accidentibus nec respirare sufficienter, aut vocē edere vel loqui, vel deglutire, interdum accedente quoque dolore, possunt: sicuti hæc in angina, cuius etiam, si à luxata vertebra fiat, species esse dicitur, aliisque dolorificis faucium morbis explicabimus.

Lingua occasione loquela defectum patitur: si illa, quatenus instrumentum musculosum est (nam de reliquis ipsius musculorum læsionibus iam diximus) nimium à causis, in gustus læsione explicatis, exiccetur & induretur: cum enim tunc in certis literis efferendis (quæ vt planè exprimi possint, magis variam illius flexuram requirunt) sufficienter volutari nequeat, dum verba formant, balbutiunt. Quod & tumore sub enato; Vel si illa intumescat, aut inflammetur, accidit. Aut alioquin si ab ortu molem nimiam adepta sit, quæ sæpè tanta est, vt loqui

*Oris*  
*causa*  
*obtura-*  
*tio, causa*  
*suffoca-*  
*tio.*

*Faucium*  
*angustia*  
*occlusa,*  
*causa*  
*suffoca-*  
*tio.*

*Lingua*  
*exicca-*  
*to, causa*  
*Balbu-*  
*tio.*

*Lingua*  
*nimium*  
*addu-*  
*cta, cau-*  
*sa loque-*  
*la impe-*  
*dita.*

Lingua  
diminuta,  
causa  
Loquela  
defectus.

omnino non possint. Familiare vitium factis quibusdam, qui ab ortu stulti & muti nascuntur, sicuti in mentis alienatione dictum fuit. Quod etiam si nimis parua formata sit, accidit: Vel si amputata sit, aut mutilata: ex supplicio, vel casu alio, & in convulsionibus linguâ mordicus prehensâ, ac dentibus præmorsâ. Ligulæ etiam illius causâ, quâ nequitur, si ea nimium astricta sit, nec sufficienter modò natis soluta, ita ut linguæ liberio rem motum impediât, idem sæpè euenit.

Ligula  
sub lin-  
guâ a-  
stra-  
cta, cau-  
sa Loque-  
la defe-  
ctus.

Columella  
in defe-  
ctus cau-  
sa Loque-  
la defe-  
ctus.

Dentium  
defectus,  
causa  
Balbu-  
tes.

Columella cum plectrum vocis sit, si illa desit vel mutilata sit, voci incommodat. Vti & cum Dentes anteriores absint, cum linguæ motui in pronuntiatione quarundam literarum resistere debeant, idque in ipsorum penuriâ fieri nō possit, balbutiunt non-nihil.

Asperæ arteriæ, quæ fistula est, per quam respiratio naturalis & vocalis editur, morborum causâ, respiratio, vox & loquela deficiunt. Nam si capitis illius, laryngis dictæ, rimula nimirum astricta sit, quod membranæ occasione, in quâ illa scissa est, euenit, quando plus iusto ab aëre frigido, vel aquâ frigida, aut astringentium vsu, exiccata corrugataque est, tunc vox exigua, vel rauca editur. Quod & vocis impedimentum, ex diutius adherente mucro crasso accidit. Nam si penitus eo, vel alio aliquo illapso, vel per inspirationem attracto corpore illicque diutius persistente obstruatur, quod tamen cum tussi, quam subito mouet, nisi propter acumen, res illic hærens infixâ sit, cedere cogatur, rariùs euenit, ægrum suffocari necesse est: quemadmodum à musca in fauces inuolante, Adrianum Pontificem interiisse, historiæ testantur: nosque ab aureo floreno deglutito, infantem suffocatum, obseruauimus. Quid quoque patiantur illi, quibus aqua in hanc asperæ arteriæ fenestram, casu influit, & quam angustiam pariat, ac quomodo magnâ vi tussis eam inde per os, & per narium amplitudinem excutiat, sæpè videmus in aliis, & in nobis ipsis interdum experimur. Vix autem alio affectu laryngis, rimula laborat, nisi quando per consensum à vicinis impeditur, aut premitur, vt à luxatis

Laryn-  
gis rimu-  
la a-  
stri-  
ctio vel  
obstru-  
ctio, cau-  
sa Vocis  
defectus.

cervicis vertebriis, de quibus iam dictum est. Nam vt relaxetur plus iusto, ab humore, cum conueniens illi sit perpetuò madere, ægrè contingere potest: dilacerari illam cum crassa sit membrana, impossibile: Vt & vulnerari, valde arduum.

Ductus asperæ arteriæ à capite: illius ad pulmones vsque, si vi externâ, vt in œsophago dicetur, collo constricto, intercludatur, strangulationem adfert: & si luxatâ vertebra primâ cervicis, prematur, dyspnœam, quam sextam anginae speciem Hippocr. vocauit, parit. Vix aliâs ab illapsis, ita aspera arteria impleri potest, nisi circa rimulam, sicuti dictum, hoc fiat, vt spiritui viâ intercipiatur. Et qui submerguntur, non tam ob aquæ influxum, quàm impeditum omnem aëris transitum, suffocantur. Et si quid in ductum hunc illapsum, respirationi incommodat, id quia firmiter adhæret, tussim sine intermissione mouendo, respirationem impedit, eaq; ratione nocet.

Asperæ  
arteriæ  
fistula con-  
strictio,  
causa  
Suffoca-  
tionis.

Pulmonum morbi dyspnœam causantes, sunt illorum connexus & obstructio. Connexus pulmonum cum connexo thoracis per fibras strictior, eos liberè, quod verò requireretur, moueri non sinit, anhelososque, præsertim dum se mouent, reddit. Quod quibusdâ ab ortu, aliis post casum, vel pleuritidem euenisse, sectio tandè patescit, cum alioquin hoc non liceat, nisi coniecturis, assequi. Obstructis pulmonibus intrinsecus, in asperæ arteriæ ramis, per pulmonum substantiam disseminatis, quia tunc aëri liber transitus interclusus est, difficilis sequitur respiratio. Hoc autem si frequenter ab humore pituitoso aqueo, à capite, præsertim, dormientibus, & recumbentibus, sensim sine sensu manifesto, per asperam arteriam ad pulmones defluente, prodire solet; qui in ramis illius angustioribus subsistens, & mucositatem acquirens, suâque visciditate vias obturâs, respirationem, cum stertore & stridore, tussisque aliquâ, difficilem parit. Et si propter tenacitatem excreari nequeat, affectum diuturnum, Asthma appellatur, facit: qui & nouâ accedente defluxione, eo tempore cum hæc sit, vt noctu præsertim, & tempore humido, ac post crapulam, suas habet

Pulmo-  
num con-  
nexus cum  
thorace,  
causa  
Dys-  
pnœæ.  
Obstru-  
ctio pul-  
monum,  
causa  
Asth-  
matu.

exacerbationes: Et si defluxio magnâ copîâ, subito vias iam priûs occupatas, impleat, Catharrum suffocantem dictum efficit. Ab excrementis pulmonum pituitosis, illic continuo congestis retentisque & incrassatis, idem fieri potest. Sicuti enim cerebrum ob sanguinis copiam, qui sinus ipsius membranarum implet, si crudus sit, excrementa continuo colligit; ita & pulmones, quorum vasa sanguine plena sunt, si ille excrementitius sit, copiam illius coaceruat: vt non necesse sit omnem pituitam quæ expuitur, à cerebro, vt plerique purant, eò defluxisse. Vtraque autem hæc causa, ex pituitosa constitutione corporis, pituitæque redundantis indiciis & stertore, cæterisque enarratis læsionibus, facile deprehenditur. Gypsea materia alba, dura, ex succo crasso pulmones nutriente, potius quam pituitâ, quæ adassata viscida, & visci instar tenax est non friabilis, vt verò hæc est, nascitur, obstruendo intrinsecus ramos, diuturnum asthma, in quo pituitæ nulla sunt indicia, parit: nisi fortè accedens defluxio congeminet malum, atque, vt dictum, suffocet. Quod & calculus ex ferroso pulmonum excremento, in pulmonum angustius natus, nunc friabilis, nunc durus, nunc planus, nunc inæqualis, & pro ratione vasorum, topi instar formatus, eadem ratione facere potest: quales aliquando sectione deprehensi; alias tussi post diuturnum & immedicabile asthma reiecti, quæ fuerit causa, ostenderunt.

Thoracis affectus respirationi nocentes, præter enarratos ipsius musculorum, sunt, qui motui ipsius, vel pulmonum, vel vtriusque, cum ambo hi motus ad respirationem faciendam requirantur, obfunt. Quod sit, si thorax extrinsecus illi incumbētibz comprimatur aut restringatur, cum motui illius hæc adferant impedimentum: quod & astringentium vsu, foris pectori ad motum fieri posse, vulgus Medicorum credit. Cartilagine costarum, quæ ad motum faciliorem edendum, circumferentiam pectoris ex parte componunt, si indurata in substantiam osseam, reliquis costis similem conuertantur, quod senij causâ aliquibus, aliis citius, idque ferè mulieribus, mamarum sustinen-

darum causâ euenit, quia tunc thorax sufficienter dilatari non potest; suspiriosos, accedente præsertim pondere mammarum, si mammosæ mulieres dorso incumbant, efficit. Ex costis, vna vel plures confractæ, introrsumque detrusæ, quia pulmonum dilatationi obstant, & thoracis motui quoque detrimentum adferunt, respirationi etiam incommodant. Quod & luxatis costis, & vertebris dorfi introrsum flexis, eadem ratione euenit. Quæ duæ læsiones, vt per vim externam costis accidere possunt, sic à valida corporis palpitatione confractam costam, quam ego potius luxatam crediderim, testatur Fernelius. Cavitatis thoracis si pure re-

*Costa thoracis introrsum delata, causa Dyspnœæ.*

*Cavitatis thoracis repleta, causa Dyspnœæ.*

*Curatio.*  
Si cordis causâ, animo seu viribus delinquentibus, respiratio sublata sit, tunc cessante syncope, sponte rursus ad se redeunt. Quid autem syncopis causâ agendum sit, in virium defectu explicabitur.

*Respirationis sublata in Syncope, curatio.*

Cerebri affecti occasione, si apoplectici periculo suffocationis laborent, quid faciendum, in mentis consternatione expositum fuit. Vt & si conuulsis respiratio aliquomodo impedita sit.

*Respirationis defectus in Apoplexia, curatio.*

Neruorum causâ, si in resolutione & conuulsione particulari, respirationis, vocis vel loquelæ, fiat defectus, non alia cura, quam quæ paralyti, & conuulsioni conuenit, hic debetur.

*Respirationis defectus in Paralyti & Spasmo, curatio.*

Si à spasmo fiat, exhibendo ea atque adhibendo præcipue, quæ ne conuulsio generalis sequatur, quo nomine maximè particularium harum conuulsionum cura dirigitur, præcaueant: sicuti hæc in conuulsionibus sufficienter descripta fuerunt.

*Particularibus affectibus, curatio.*

Et si ex resolutione proficiatur, proce-

*Thoracis compressio causa Dyspnœæ.*

*Cartilagine thoracis induratio causa Dyspnœæ.*

dendum sicuti in paralyfi explicatum fuit, per assumpta immissaque, corpus purgando & alterando.

Imprimis verò in hisce casibus, quæ ori & faucibus induntur, si loquela & vox perditæ sint, remedia, cum sic ad partem affectam, linguam, laryngem illorumque nervos affectos, virtutem rectius transmittere queant, sintque tunc non tantum remedia, pituitam per hanc illi destinatam sedem elicientia, sed & quæ, cum parti affectæ proxima fiant, alterando & absumendo humorem in loco affecto, plurimum iuuare possint. Vnde & peculiariter hinc competunt masticatoria & gargarismata: non quæ pituitam eo allicient, sicuti verò in paralyfi aliarum partium conferunt, sed quæ siccando, ut dictum, potius humorem iam eo defluxum, exhauriat.

Masticatorium proin tale erit vtile: R. nucis Mosch. 3.ij. Piperis longi, Cubebæ, Galangæ, feminis Nasturtij, Sinapis ana 3.j. Salis, gummi Eleni ana 3.ß. Masticis 3.j.ß. Terebinthinæ (quam valde prodesse docet) & Cera q.f. fiant formulæ, si Castorij 3.ß. addas, erunt efficacissimæ.

Pilulæ hæ sub lingua tota nocte retentæ, magni sunt usus: R. baccharum Lauri 3.j. Euphorbij, Castorij ana gr.vj. cum infus. gummi Tragachant. factâ in aqua Lauandulæ: fiant pilulæ.

Mitridato, addito Castorio, si lingua perfricetur, præstantissimum erit remedium.

Collutiones oris ex Muria profunt. Item ex Vino rubro, in quo Salvia maduerit, & Sal additum sit.

Vel sequens: R. rad. Acori veri 3.j. Galangæ, Cyperi, Costi, Nucis mosch. ana 3.ß. herb. Salviæ, Maioranæ ana M.j. fiat decoctio in Aqua & Vino: adde ad gratiam Mellis anthos. q.f. fiat gargarismus.

Aquam Ceraforum nigrorum, magni facit vulgus in loquela perditæ, cum exhibitam tum ori inditam, sed efficacior erit: R. aquarum Ceraforum nigrorum, Lauandulæ, Salviæ, Pulegij ana æquales partes; Colluat os frequenter.

Hic quoque priuatim, si succus Vrticæ auribus indatur, loquelam amissam restituere, aliqui scripserunt.

Inter externa remedia, eadem quæ in paralyfi dicta sunt, competunt. Et quæ inunguntur & peculiariter nervorum affectorum origini applicantur, hinc in nucha, seu cervicis posteriore regione adhibentur: lateraque insuper maxillarum nonnunquam simul inunguntur.

Metasyncritica verò remedia, sinapismi, dropaces, vesicatoria, cauteria, capitis posteriori sedi potius adhibentur.

Sanguinis è venis sub lingua extractio, in linguæ paralyfi, in latere sano, probant, si adsit plethora; & cucurbitularum sub mento applicationem. Quæ tamen occipitio adhibitæ etiam iuvant.

Exercere linguam motu multo, & nitendo loqui, iubemus: nam citius ad loquelam rectius proferendam, sic impellitur.

Musculorum causâ, si à defluxione in illos procumbente, illosque distendente, vel inflammationem simul efficiente, vox, loquela, & nonnunquam quoque respiratio labem patiantur, siue hoc in faucium angustis positis, vel septo ipso defluxione molesto, aut thoracis aliis fiat musculis, in defluxionibus & doloribus hæc aliis in locis explicabuntur.

Si verò hoc septi causâ accadat, vaporibus adeò molestati, ut suffocatio illa nocturna vel vterina sequatur, tunc quia hoc symptoma præ cæteris vrget, cura hoc loco explicanda erit.

Si itaque à præcordiis vapore exurgente & septi impediante, somni tempore, strangulationis periculum in Inbubo dicto, virgeat, perniciosus interdum hic est affectus, cum obesos & pueros nonnunquam suffocet: alias verò, si perseveret, ad cerebrum vapores eiusmodi tandem transmittendo, graviora accidentia, melancholiam hypochondriacam, vel veram, vel maniam, vel epilepsiam, cum eadem illorum quæ & Incubi sit causa, sede quam afficit tantum differentiâ, inducat; atque in apoplexiam, si gravius inde cerebrum lædatur, terminari possit.

Idcirco maturè prospiciendum, & cruditas & cacochymia illa & repletio in primis viis facta, tollenda & cauenda. Vapores quoque, ne inde elevari, septum aliasve partes offen-

Respira-  
tionis de-  
fectus mu-  
sculorum  
causâ,  
curatio.

Incubi  
curatio.



offendant, tūm in paroxysmo, tūm extrā hunc impediendi, diuertendi, atque discutiendi, eodem ferè modo, sicuti in melacholia, epilepsia, catalepsi & similibus affectibus, ab eadem causa genitis, dictum.

Quod fiet, si crassioribus primū expurgatis facibus, per assumpta aut iniecta, sanguinem redundantem, vel aliās impurum extrahamus. Dein cacochymiam illam per secessum & vomitum expurgemus: assumptis vel immisis, quæ pro ratione humoris redundantis instituantur, cathartici, præsertim eligendo ea, quæ melancholicis affectibus adhiberi solent, quibus & ea quæ flatu pellunt, capiti conferunt, & epilepsie contraria sunt, cum quā hic affectus affinitatem habere creditur, permiscant. Dein particulares euacuationes instituendo: hæmorrhoides, menses, si substituerint, prouocando. Atque per nares apophlegmatismis excrementa capitis, si redundant, educendo. Interim quoque assumptis admotisque ventriculo, vt bona fiat concoctio, omnisque vitetur cruditas, & excrementorum ac flatuū prouentus, prospiciendo; Capiti item, cum imaginatio hic quoque læsa videatur; Et cordi, propter terrorem quo concutuntur; Thoraci etiam quod angatur. Quæ omnia extraparoxyssimum successiue administrantur. In paroxysmo verò, clysteribus iniectis, aliisve extrinsecus admotis, actu potentiæque agentibus, vapores reuellere studebimus: quæ & postmodum cum à paroxysmo liberi sunt, præcautionis loco continuari possunt. Quomodo autem hæc diuersis remedium formis fieri possint, nunc ostendemus.

Inter ea itaque quæ assumuntur, poterit tale præmitti medicamentum, alui facies eluens, nisi hoc clysmate fiat, de quo postea: R. Catholici 3.vj. Diasenæ sol. 3.j. misce: Detur per se, vel cum aqua Absynthij.

Pilulæ: R. spec. Hieræ Gal. 3.β. Aggregatiu. 5.j. cum syrupo de Stœchade: fiant pilulæ.

Præparetur humor hoc modo: R. syrapi de Hysopo (propter pectus & caput) Stœchados vel Lauandulæ, mellis Anthosati, de Buglossa ana 3.j. Oxymel. simpl. 3.β. aquarū Absynthij, Menthe, Cichorij, Buglossi, Pæo-

niæ ana 3.ij. arom. Nuce mosch. Pro tribus vel quat. vicibus.

Vel sic: R. rad. Fœniculi, Asparagi, Liquiritiæ ana 3.j. Pæoniæ, cort. Cappar. ana 3.β. herb. Betonicæ, Hysopi ana M. j. Endiuie, Cichor. Buglossi, Eupatorij, summit. Lupulorum ana M. β. flor. Buglossi. vtriusque ana P. j. Passul. enucl. 3.j. seminum Anisi, Fœnic. ana 3.ij. Cuscutæ 3.j. Squænanthi 3.j. fiat decoctio, & in tē. j. colat. dissolue Oxymel. 3.ij. Sacchari 3.j. aromar. puluer. Diarrh. abb. 3.j. Pro quatuor vicibus.

Vel in cruditatibus, per vinum: R. radic. Fœniculi 3.j. cort. Cappar. 3.β. Galangæ 3.ij. Absynthij, Chamæpith. Chamædreos ana 3.ij. flor. Cordialium ana 3.ij. seminum Fœniculi, Petrosel. ana 3.j. infundantur in vino: & vtatur.

Postea purgetur: R. rad. Liquiritiæ 3.β. Passul. 3.j. sem. Anisi 3.ij. fl. Cord. ana P. β. Epithymi, Senæ ana 3.β. fiat decoctio in col. infunde, Rhab. el. 3.j. cortic. Hellebori nigri præpar. 3.β. (si robustus sit, vel illius loco augseat senæ dosis) Zingiberis, gran. Paradisi ana 5.β. fiat expressio, dissolue Syr. ros. sol. 3.β. Bibat.

Vel vtatur aliis potionibus ex electuariis solutiuis, vt Diasena, vel pilulis, vt Cocciis, aliisque, in aliis similib. affectibus explicatis.

Per interualla, euacuationes repeti debet prædictæ: vel fiant per syrupos magistrales, electuaria, aliisve formis, alibi in supradictis melancholicis affectibus propositis.

Vel pilulæ ad vsum tales præsto esse debent, quæ R. spec. Hieræ Archig. 3.j. Hellebori nigri præpar. 5.j. Agarici, Rhabarbari ana 3.β. Epithymi 3.β. medullæ seminū Pæoniæ & rad. ana 3.β. cum melle scyll. fiat massa; Capiat pilulas tres vel quat. vel plures, maiores minoresve, prout operantur: vtatur frequenter ieiunus ante prandium vel cœnam, horis aliquot.

Hiera Archigenis sola, id potest aliquando sumpta præstare.

Inter ea quæ assumuntur remedia, frugalitas in cibo, & præsertim si à cœna interdū abstineant, plurimum iuuabit, & paroxysmum præcauebit vel mitigabit: & si à crapula malum hoc oriatur, præcipuum erit remedium.

dium. Dein à crudis flatulentisque, quibus venter distentus, dyspnœam maiorem causat, sibi caueant. Utanturque potius euchymis & eupeptis cibis, conditurâ ad caliditatem aliquam inclinantibus.

In potu vinum, quod mentem perturbet, aquam quia inflat, improbant, & Aquæ mulsæ vsum suadent: cuius tamen continuus vsum in iuuenibus propter mel, quod faciliè in bilem vertitur, conuenire minimè potest. Nos vinum cum concoctionem iuuat, si moderatè, quod debilius est vel dilutum bibatur, nocere minimè posse, sed vt aliis melancholicis affectibus, sic hîc quoque prodere existimamus.

Melicratum, quod interdum seniores & pituitosi, loco medicamenti, in hosce vsus bibere possunt, tale decoqui potest: R. rad. Liquiritiæ ʒ. j. Fœniculi ʒ. ʒ. Passul. enucl. ʒ. ij. sem. Anisi ʒ. j. fl. Buglos. p. j. fiat decoctio, & in ʒ. ʒ. ʒ. dissolue Mellis & Sacchari ana ʒ. ij. iterum parum bulliant & colentur.

Vinum medicatum Absynthites, vt in præparantibus dictum, etiam ad roborandum manè per vices bibi potest.

Pulueres qui post pastum sumendi ad concoctionem iuuandam, & vapores impediendos præscribi solent, hîc valdè conuenient, præsertim si huic affectui accommodentur: hoc modo: R. seminum Coriandri præp. ʒ. ʒ. Anisi ʒ. ij. pul. Arom. ros. ʒ. j. Diamarg. frig. ʒ. j. Cinam. ʒ. ʒ. Maceris ʒ. j. seminum Pœoniæ, Coralli ana ʒ. ʒ. Sacchari ros. tab. ad pondus omnium: capiat post cibum coch. j.

Vel mixturâ hac post pastum vtatur: R. Carnium cyt. cort. Citri saccharo conditi, conf. Ros. ana ʒ. ʒ. conf. Maioranæ ʒ. ʒ. spec. Aromat. ros. Diamoschi dulc. Diamarg. ana ʒ. j. sem. Pœoniæ ʒ. ʒ. Coralli rub. ʒ. j. Sacchari ros. tab. q. s. fiat mixtura: capiat coch. j.

Tabulæ Arom. ros. Diarrhodon. Diamoschi conferunt: si noctu cubitum iturus vnam sumat.

Vel de sequenti electuario: R. conf. Ros. Borr. Maioran. ana ʒ. j. ʒ. cortic. Citri ana. & Myrobal. Zingib. condit. ana ʒ. ʒ. rad. Enulæ, Galangæ ana ʒ. ʒ. sem. Pœoniæ ʒ. j. Coralli, ras. Eboris ana ʒ. ʒ. specier. Diarrhodon, Dianthos ana ʒ. ʒ. spec. Cordial. ʒ. j.

cum syr. de Betonica: fiat electuarium. Superbibat parum Vini diluti aqua Lilij conuallij.

Theriaca vetus, semel in hebdomada mediâ nocte sumpta proderit.

Infundimus clysmata, ad alui fæces eluendas; antequam purgantia dentur, tùm postea quoque, ad flatum hac ratione discutiendas, & aluum soluendam. Quibus in ipso paroxysmo iniectis, admodum leuatur. Quorum exempla passim descripta sunt in aliis similibus affectibus.

Naribus & ori indita caputpurgia, post purgationem, ad cauendos capitis grauior affectus, in quos faciliè hic morbus abit, vt dictum, iisdem modis, vt illic præscriptum fuit, administrata, conducunt.

Per admota succurrimus huic affectui, Capiti cucuphas & puluinos applicando, sequenti, vel similibus pulueribus infarcta. R. rad. Cyperi, Angelicæ ana ʒ. ʒ. herb. Maioranæ, flor. Anthos, Lauandulæ, Rosarum ana ʒ. j. sem. Coriandri ʒ. j. ʒ. Gariophyl. ʒ. ʒ. fiat puluis.

Cordi & pulsibus sacculi applicentur in ipso paroxysmo: irrorati Vino & aquâ Melissæ, Rosarum & flor. Arantiorum: R. rad. Galangæ, Cyperi, cort. Citri ana ʒ. ij. sem. Citri, Ocimi ana ʒ. j. fol. Melissæ, fl. Cord. ana ʒ. ʒ. Gariophyl. ʒ. j. fiat puluis.

Ventriculus & thorax inungantur, dum angitur æger: R. oleorum Anethini & Chamomel. ana ʒ. j. Vini albi ʒ. j. Aquæ vitæ ʒ. ij. coquantur ad vini consumptionem: inungantur.

Extremitatum ablutio frequens, reuellit quoque à sepro & à capite vapores.

Frictiones eadem ratione competunt, ab inferioribus ad superiora, donec ad caput perueniatur, factæ. Et si caput pectine eburneo vel cupressino versus posteriora dicto, pectinetur.

Cucurbitulæ cruribus, in furis primum, mox & in humeris, applicentur.

Dropaces applicati competunt, ex Pice & oleo Masticino: qui & calidi capiti, interposito tamen linteo, emplastri instar adhibentur, si caput simul affectum sit.

Sanguinis euacuatio in plethoricis & cachymicis

369

cochymicis fiet, secando venam brachij aliquam conspicuam, aut illius lateris, quo magis se grauari sentiunt: postea quoque eam quæ in pede est, alijsve in locis, ad revulsione ab ea sede faciendam, ad quam vapores maximè tendunt

Excitandi subito, cum per somnū anguntur: & ne perturbentur animi pathematibus, cauendum.

Et cum dormiunt, non nihil erecto capite in latus decumbentes iaceant: imprimisq; à decubitu supino sibi caueant, cum præter angustiam etiā turbulenta pariant insomnia.

*Vteri suffocatio-  
nis cura.* Si verò circa vterum collectus vapor malignus, hysterica pariat accidentia, cum varia illorum se offerant genera, quorum vnum veluti cardialgiam, aliud velati syncopen, tertium furorem, quartum convulsiuos motus, cum illa suffocatione copulata, producit, in illisq; affectibus, curatio illorum partim sit exposita, hic tamē ex professo, cum in omnibus speciebus spiritus impeditus sit, omnesque proin vteri suffocationis nomen obtinuerint, de illis agemus.

Periclitantur autem non parum illæ, quas hic affectus inuadere solet, præsertim si, ac si animio defecissent, spiritum omnino non ducant, sed mortuorum instar iaceant, cum in accessione interdū extinguantur, frequentius verò ad se iterum redeant. Dein & si maniam & convulsiones comites habeant, eo nomine metuendus hic affectus, quod in hocce casus quandoque degeneret. Plerumque tamen aliquoties accidentia eiusmodi passæ, aut certotempore sponte, vel post decentem curam, ab eo liberantur.

Methodus curandi est, excrementa circa vterū collecta, euacuare, & menstrua retenta profiterare; flatus, vapores ab vtero eleuatos, reprimere, reuellere, discutere, & absumere. Idq; varijs modis; Inter quæ, aliqua etiam in paroxysmo vsurpata, eum solvunt.

Propinantur euacuantia, qualia in sanguine viciato & melancholico picto vsurpari solent; pro ratione corporis constitutionis, & humorum redundantium: quæ repetenda si non desinat malum; addendo semper quæ menses simul prouocant. Imprimis autem hæc laudantur exhibita,

Ad vomitum confert Agarici ʒ.j. β. cum Oxy mellite exhibere.

Ad deiectionem verò potio talis utilis est, singulis septimanis repetita: R. Agarici troch. pulu. Tryphera magnæ sine opio ana ʒ.j. dissoluantur Vino albo & Aquâ Artemisiæ & Matricariæ: Bibat.

Vel hoc modo: R. Agarici, rad. Bryoniæ ana ʒ.j. β. Zingib. Cinamom. ana ʒ.β. infundantur in Vino albo præstantissimo, & post macerationem debitam exprimatur, adde syrup. de Artemisia ʒ.j. Bibat.

Terebinthina admodum commendatur: cuius loco, hoc purgās exhibebitur: R. Agarici troch. ʒ.ij. Zingib. ʒ.j. infundantur in Vino & exprimatur: permisce Laricæ, in Melis ʒ.vj. & Vitello oui dissoluta ʒ.ij. Bibat.

Pilulæ vsuales sic parabuntur: R. sp. Hieræ colocynth. ʒ.j. Agar. troch. ʒ.j. β. feminum Dauci, Viticis ana ʒ.j. Myrrhæ, Castorij ana ʒ.β. Diacrydij ʒ.β. Laricæ quant. suff. fiat massa: capiat, à ʒ.β. incipiendo.

Quæ nutritionis nomine sumuntur, moderata esse debent, & laudata. Et quia Vinum paroxysmum mouet, vti aliquando facit Aquam coctam cum semine Anisi, vel aquam Mulsam bibant.

Quæ alterationis causa potissimum sumuntur medicamenta, vteri status & vapores eleuatos discutere debent, menses mouere, vterum & partes principes roborare, item venenato humori resistere: quæ hisce formis administrantur.

Aqua conueniens hæc erit: R. aquæ Mellisæ & Menthæ ana ʒ.j. β. aquæ Cinamom. ʒ.ij. misce: Bibat: Si addas parum Castorij efficacior erit. Vel destilletur ex sequentibus simplicibus aliquibus, vel omnibus, addito Castorio.

Decoctum hoc propinari poterit: R. rad. Sigilli Salom. Valerianæ vel Mei ana ʒ.j. β. herb. Melissæ, Pulegij, Origani, Calamenti, lap. Gagatis ʒ.j. fiat decoctio in Vino, addédo parum Acetis scyllitici, coletur, adde syrupi de Artemisia ʒ.β. Bibat duabus vicibus.

Aut paretur syrupus ad vsu: R. rad. Sigilli Salom. Bryoniæ, Valerianæ, Mei, Tussilag. Vitis albæ, Imperatoriæ, Angelicæ ana ʒ.β. herb. Plantag. Melissæ, Pulegij, Calamenti,

Conizæ, Nepetæ, Betonicae, Menthae, Artemisiae, Thymiana M. j. flor. Anthos, Lauandulae ana P. j. femin. Cimini, Dauci, Pastinacæ syl. Acetosa, Pæonia, Anisi ana 3. j. baccarum Lauri, Iuniperi ana 3. ij. fiat decoctio, & in colatura, adde succi Plantag. 3. j. β. Sacchari 4. j. β. decoquantur ad consistentiam aromatis. Cinamom. & Gariophyll. ana 3. j. β. Vtatur 3. j. per se, vel dissolut. cum liquore conuenienti.

Potio quoque talis, sic paratur: R. Mithridati 3. j. β. pulu. Diamoschi dulc. 3. β. syrupi de Artemisia 3. β. aquarum Melissa q. s. & aquæ Cinamom. parum: fiat potio.

Pulueres cum liquore bibendi, vel per se cum Saccharo, vel tabulato sumendi, aut electuarijs permiscendi.

Paratu facilis: R. sem. Cimini 3. j. gr. Iuniperi num. xj. terantur: Bibatin Vino vel aquâ Cinamom. vel Plantaginis & Rosarum.

Additis alijs efficacior sic fiet: R. sem. Cimini, Pastinacæ syl. Dauci ana 3. j. Gariophyll. 3. β. Bibatur vt prior.

Ex pluribus compositus: R. sem. Cimini, Pastinacæ syl. Dauci, ana 3. j. Nigellæ, Viticis, Rutæ, Pæonia, rad. Dictamni ana 3. ij. Succini, Crystalli, Gagatis an. 3. j. Gariophyll. Cinamom. Piperis, ligni Aloës ana 3. β. Moschi gr. v. fiat puluis: Detur 3. j. per se cum liquore, vel additis 3. iij. Sacchari fiat, vel tragema; vel eo dissoluto, tabulæ; aut cum Melle aut syrupo Artemisiae electuarium.

Pilulae ex foetidis præparantur, valde efficaces: R. Castorij 3. j. Assæ foetid. 3. β. Myrrhæ, Galbani, Sagapeni an. 3. j. Mellis scyllit. q. s. fiant pilulae: capiat frequenter 3. β.

Vel ex vehementer odoratis: R. Moschi gr. vj. Benzoini 3. β. Sacchari 3. j. cum aqua Cinamom. fiant pilulae: capiat 3. β.

Immissa suppositoria reuellunt vapores & flatus, educunt etiâ in paroxysmo supposita: R. Mellis 3. j. β. coquatur ad consistent. adde spec. Hieræ sem. Cimini, Nigellæ an. 3. j. Salis gemmæ 3. β. fiant suppositoria magna.

Idem facit iniectum Clystere: R. baccarum Lauri, Iuniperi, ana 3. j. Pulegij, Calamenti, Rutæ, Sabinæ an. M. j. sem. Cimini 3. ij. fiat decoctio, dissol. Hieræ colocynth. 3. ij. olei Cheiriani, Rutacei ana 3. j. Salis 3. j. fiat clyster.

Ori intruso digito vel pennâ, vomitum sæpè mouemus.

Ad sternutationem mouendam in ipsa accessione, naribus indatur puluis Sinapis, & si non mouet, addatur parum Hellebori albi. Rhabarbarum aliqui cum successu insufflant; Vel aliâ irritatione narium, moueri potest: & si sternuter, bonum; ex quo etiam eos, si dubitemus, viuos adhuc esse cognoscimus.

Adhibentur naribus graui odore prædita & foetida, in ipso paroxysmo, quibus vterum ascendentem, ad inferiora retrò cedere putant, cum illâ ea mox sentire, & proin auersari, credant. Quæ nos potius, quia vapores dispergunt, & vires subito in partibus principibus cerebro & corde, quò mox penetrare suâ subtilitate possunt, exerunt, & quia facultatem expultricem sopitam excitando, vt citius ad se redeant, faciunt, iuvare existimamus: eoque nomine & odores & fumos aduersos, naribus ipsorum adhibemus. Atq; extra paroxysmum quoque aliquando olfacere iubemus.

Castorium quia grauem odorem expirat, præcipuè in vsu est, naribus admorum.

Item Assa foetida, deterrimi odoris, Galbanum, Oppopanax, Bitumen, & quæ bituminis odorem referunt, vt Trifolium asphaltite, Petroleum, Ruta item, & Cimices leuallarij, atque illi Maiores, qui in plantis inueniuntur, odoris adeò horrendi.

Cepæ, Allia item, acutum & pungentem odorem exspirantia.

Acerum etiam, acerrimū, naribus in spongiâ adhibitum; Vel suilli Castorium & Sulphur permisceas, & nares postea illinas.

Fumus foetidus, naribus exceptus, id potentiùs adhuc præstat, excrematis Pennis, Corio, Cornibus, Ungulis, ellychnio extincto Candelæ sebaceæ, excitatus.

Vel si hoc modo trochisci fiant: R. Castorij 3. j. Assæ foetidæ 3. β. Picis 3. β. cum Terbinth fiant trochisci. Accendatur vnus & vapor per canalē naribus admoueatur, non tamen nimium spissus, ne suffocet.

Vtero verò contraria hisce, nō ingratis, sed grarum odorem spirantia admoueantur: vt eo, sicuti putant vterus allicitus, cum eo



delectetur, deorsum rursus remeet. Nos verò, quia penitus subeundo, vapores citius discutiunt, cum calida sint, id efficere potius existimamus.

Suffitus eo nomine in vteri orificium per infundibulum, aut aliâ arte intromittuntur: R. Styracis cal. Benzoini ana 3.j. ligni Aloës 3.ß. Moschi gr.v. cum infusione gummi Tragach. fiant trochisci, & sicci imponantur carbonibus.

Vel hoc modo: R. trochif. Galliæ Mesuæi, & mosch. Nicolai: Vtantur.

Suauem odorem hæc reddent, si in aqua Ros. bulliant in vasculo, & vapor admittatur, vt in Cassioletis dictis fieri solet.

Inungi quoque debet pudendum odoratis intrinsecus ab obstetrice, Zibetha.

Vel hoc linimento: R. Galliæ mosch. Mes. 3.j. pulueris Diamoschi, Diambræ an. 3.ß. Zibethæ gr. aliquot. Croci gr. vj. cum oleo Amygd. dulc. vel de Been, fiat linimentum.

Vel imprimitur bombax Moscho, Ambra vel Zibethæ permixtione, odoratus. Vel hoc puluere cōspersus: R. Storacis, Benzoini Galliæ mosch. ana 3.j. Gariophyl. Cinam. ligni Aloës ana 3.ß. Croci 3.ß. fiat puluis. Qui & aquâ Rosar. irroratus, sacculoq; exceptus, pessarij modo intrudi aliquousq; potest.

Vel tale pessarium, quod non solum odore, sed & aliâ proprietate, & quia menses mouet, operabitur: R. fol. Melissæ, Maioranæ ana 3.j. Gariophyl. Maceris ana 3.ß. Piperis, Croci ana 3.j. lapid. Gagatis, Picis ana 3.ß. Salis nitri 3.j. Aliptæ mosch. cum & camphoram recipiat 3.ß. excipiantur oleo Laurino & Lilliorum, supponatur addendo parum Storacis liquidæ.

Quod alia pessaria & iniectiones in vteru attinet, quæ menstruorum prouocandorum causa sunt, alijs locis explicabuntur.

Qui à seminis retentione fieri putant, acria adhuc ampliùs & stimulantia subdunt, semenq; varijs artibus proritare docet. Quibus omisiss, cum causam aliam huius affectus statuamus, legitimum tamen concubitum in viduis & virginibus, non improbamus: sed cum & hic reuellat & menstruorum fluxum faciliorem reddat, mulierisque natura tunc admodum immutetur, pluri-

mum prodesse quoque posse concedimus, præcipuumq; ferè in illis esse remedium.

Ex admotis, vmbilici, & sub eo pectinis pudendiq; regioni, commodè sequentia admovent.

Cataplasma hoc vniuersæ iam enarratæ regioni vtilissimè applicatur: R. fol. Filicis, fol. Leuistici cū radicibus ana M.j. Rutæ M.ß. coquantur in Vino, contundantur: adde Axungia parum: Applicetur.

Vel sic: R. Mellis, Ficum ana æqu. partes, bulliant in Vino & Aquâ & contundantur, addendo ol. Nardini & Anethini parum; Admoueatur vt prius.

Filum cannabeum, à fufis deductum, & more consueto, in longum simul multipliciter iunctum, si coquatur in Lixiuio, & expressum applicetur, plurimum iuvare creditur, eoq; magis, si prius oleo Anethino feruenti imbuatur.

Laudant aliqui folia Hyoscyami contusa, & oleo Nardino subacta, vmbilico admotâ.

Emplastrum pectini admotum sequens proderit: R. Galbani 3.j. Styracis liquidæ 3.j. malaxentur oleo Nardino, & conspergantur puluere Gariophyllorum.

Vt ex vñtatis: R. emplastri Ceronei, vel pro Matrice 3.j. trochif. Aliptæ mosch. 3.j. Styracis liquidæ 3.ß. cum oleo Nardino: fiat emplastrum.

Pedum lotiones quia diuertunt & vires vtero communicant, conueniunt, hoc modo: R. rad. Ireos, herb. Leuistici, Filicis, Matricariæ, Calamenti, Nepetæ, Pulegij ana M.j. flor. Chamomil. P.j. gr. Iuniperi & Lauri ana P.ß. semin. Dauci, Carui, Pastinacæ fyl. Viticis ana 3.j. Coriandri 3.j. bulliant in Aqua, addendo parum Vini.

Infessio ex iisdem facta, si in ea sedeant interdum, & continuent aliquandiu, corpore purgato prius, sanare potest hunc affectum. Et si post multa tentata non succedat, ad Thermas mittantur.

Inter actualia remedia, quæ reuellendo in paroxysmo vsurpata eum tollunt, sunt, Frictiones tibiarum & plantarum pedum, adhibito interdum Sale & Aceto, vel ol. Laurino.

Vellicatio item aurium, narium, & pilorum circa pudenda tractio.

Ligaturæ item ad dolorem vsq; factæ, co-  
xarum supra genua; & Hypochondriorum  
cingulo vel fasciâ aliquâ constrictio.

Cucurbitula magna, sub vmbilico cum  
multa flamma posita, & minores quoque  
coxis affixæ.

Dropaces, Sinapismi in lumbis & pectine,  
adhibita.

Cauterium postremò, si caput affectum  
sit, in syncipite futuræ coronali admotum  
proderit.

Sectio Venæ, si menstrua substerint, in  
pede facta, ea prouocat. Quo nomine & Scar-  
rificatio sub poplite sit; & talo Hirudines af-  
figuntur.

Reliqua quod attinet: Aërem vitet frigi-  
dum, in inferioribus præsertim partibus &  
pedibus, quæ calida semper retineri debent.  
Exerceat decenter corpus; Dormiat mode-  
rate; Nec animo perturbetur.

*dyspnœa  
à flatib⁹  
humori-  
bus, visce-  
ribus in  
abdomi-  
ne, cura  
tio.*

Quod si verò septū transuersum, flatuum,  
humorum aut partium adiacentium causâ  
impeditū, in alijs morbis dyspnœam pariat,  
etsi interdum admodum virgeat; quia tamen  
curatio morbis illis potissimum accommoda-  
tur, idèò illa in ventriculi & coli inflatio-  
ne, repletionè, tympanite, hydrope, visce-  
rum duritiæ & scyrrhis explicabitur.

*Suffoca-  
tionis à  
fungis fa-  
cta, cu-  
ratio.*

Fungorum tamen nimia ingurgitatione  
& malitiâ, si strangulatio angat, Vomitus  
concitari debet, dando decoctum Raphani,  
vel Stercus gallinæ exiccatum puluerisatum  
cum Oxy mellite, Vel R. Oxy mell. ʒ. j. ʒ. S.  
Sallis nitri ʒ. ʒ. Dein sequentia propinanda: R.  
Absynthij, Melissa, infusa in Vino & parum  
decocta: Bibat.

Instrumentorum per quæ respiratio, vox  
& loquela fiunt vel iuantur, nimirum oris,  
narium, faucium, columellæ, linguæ, asperæ  
arteriæ, pulmonū & thoracis læsionis causâ,  
si hæ functiones deficient, pro ratione morbi  
procedendum, vel prædicendum erit: sicuti  
in singulis explicabitur.

*Balbu-  
tiet ab a-  
riditate  
linguæ,  
cura.*

*Anhe-  
læstia  
causa.*

Ariditas & induratio nimia linguæ, si lo-  
quela officiat: aut faucium, voci, quâ ratione  
subueniendum, in gustus læsione dictū fuit.  
Quod si cartilagine costarum induratae, in  
senibus aut mulieribus anhelosos faciant, in  
illis quibus integrum pectus esse dicitur, vi-

tium hoc curari minimè poterit: cogunturq;  
qui sic affecti sunt, sedendo vel leuissimos sal-  
tem motus edendo, ne respirationem conci-  
tatam faciant, quod reliquum est vitæ tem-  
poris, in quiete transigere.

Magnitudo adaucta, vel imminuta lin-  
guæ, vel aliàs quia non rectè formata est, si lo-  
quela obfit nec hoc vitium, cum originale  
sit, curari poterit. Fit tamen & vsu, vt qui lite-  
ras aliquas pronunciare nequeant, magno  
tamen nixu, eas continuò effari conantes,  
quodammodo posse postea exprimere: sicuti  
Demostheni accidisse legimus. Quod si intu-  
merit, aut aliàs tumore præter naturam pa-  
tiatur lingua, cura in tumorib⁹ explicabitur.

*Loquela  
defectus  
ob vitium  
in magni-  
tudine  
linguæ,  
cura.*

Defectus partium si in causa sit, cum pars  
reparari nequeat, nullum erit remedium. Vt  
si ob linguam mutilatam, loquela sit deper-  
dita: & ob columellam consumptâ, vel am-  
putatam vocis defectus, aut dentium inciso-  
riorum absentiam, loquelæ vitium; quod ta-  
men arte, dentibus ex ebore vel ossibus fa-  
bricatis, ita vt in spacio dentium inserti, hæ-  
reant, aliqui apprimè norunt corrigere.

*Loquela  
impedi-  
mentum,  
linguæ,  
columel-  
la, vel de-  
ntium de-  
fectus  
causa, cu-  
ra.*

Solutio continui magna; Veluti absecta  
aspera arteria, si spiritui viam intercludat,  
nullum est remedium, cum plerumq; suffo-  
centur: Aliquando tamen curâ diligenti,  
qualis vulneribus debetur, curatos aliquos  
fuisse, legimus.

*Strangulatio  
absecta  
arteriæ,  
cura.*

Ob fracturam costæ, si introrsum delata,  
pulmonum liberum motum impediat, ea re-  
trahenda & in locum suum reducenda erit:  
quod varijs ingenijs eam apprehendendo,  
pellendo, prout diuersus illius situs hoc ef-  
flagitat, perficiendum; dein, sicuti in fractu-  
ris dicitur, cura instituenda. Quod &, si lu-  
xata fuerit costa, eam primùm reponendo,  
mox retinendo, curandoque, vt in luxatione  
explicabitur, faciendum.

*Suspirio-  
rum ob  
connexum  
pulmonum  
causa, cu-  
ra.*

Connexus pulmonum per fibras cū tho-  
race, suspiriosos faciens, cum organicum sit  
vitium & proin inemendabile, curacionem  
nullam admittit: sed coguntur, & qui sic af-  
fecti sunt, vti & illi, qui anhelosificatiliū  
indurararum causâ sunt, abstinendo à mo-  
tibus validis hunc defectum mitigare.

*Loquela  
defectus  
causa.*

Si verò ligula linguæ, nimis astricta, &  
non rectè soluta loquelam impediat, si adhuc  
solui

lingua  
astri-  
cta, seu  
causa, seu  
ratio.  
dyspnea  
à reple-  
tione tho-  
racis, cu-  
ra.

solui possit, pressione digiti, vel sectione cu-  
rabitur. Si verò iam induratum sit ligamen-  
tum, vix dum amplius emendabitur.

Repletio thoracis à pure, aquâ vel sangui-  
ne, cum tussim continuò movendo, potius  
quàm spiritum impediendo, incommodet,  
& per eam talis materia interdum rejiciatur  
vnâ cum cæteris excretis, in reiectis rectius  
explicabitur.

Suffoca-  
tionis ob  
obtura-  
tione o-  
ris, na-  
rii, fau-  
cium cu-  
ra.

Suffoca-  
tionis ob  
constri-  
ctam a-  
speram  
arteriâ  
vel im-  
pediâ,  
cura.

Obturationis oris, narium, faucium, si respi-  
rationi incommodet, fiatq; ab externis iniu-  
rijs, vt submersione in aqua, vel constrictione  
gutturis, aut pondere incumbente pecto-  
ri, sublata causâ, mox etiam libera iterum e-  
rit respiratio. Si verò dentibus constrictis,  
& naribus mucò oppletis suffocationis adsit  
metus, in apoplexia & epilepsia, quomodo  
dentes dirimendi & quid præterea facien-  
dum, illic fuit explicatum. Si verò suffoca-  
tionem sentiat aspera arteria à luxatâ verte-  
brâ, vti voluerunt, compressa, quod tamen  
ægrè fit, sicuti verò facilius, vt à gibbo in-  
trorsum respiciente asperâ arteriâ & pulmo-  
nibus angustatis, suspiriosi fiant: tunc si lu-  
xatio sit suffocans, nisi sponte vertebrâ re-  
ducatur, faciliè interimit: si gibbus anhe-  
los faciat, cum & ille ægrè reducatur, ine-  
mendabile est malum. Si ab illâ lapsa in aspe-  
ram arteriam, strangulationis adsit pericu-  
lum, non aliâ ratione, quàm tussi, illa rejici  
possunt: quæ cum sponte, aliqua re inciden-  
te, conciteretur, non opus est aliâ ratione eam  
mouere. Interim tamen sternutatio excita-  
ta, valde iuvat illius excussionem; & si dorsî  
superiora percutiantur, eò facilius hæc cede-  
re, vulgò creditum, atque proin facere vñta-  
tum est. Ejicitur autem illud quod incidit,  
post multam tussim. Aliâs quoq; adhærente  
pertinaciter illa materiâ, tussis & angustia  
sic angunt, vt & suffocari possint: sicuti in  
causis id ostensum fuit, aliquando accidisse.  
Si tumor præter naturam in faucibus, amy-  
gdalis, obturando, difficilem pariat respiratio-  
nem, in doloribus & tumoribus explicabi-  
tur. Nam de illis qui musculos occupant, in  
musculis iam dictum fuit.

dyspnea  
à tumo-  
re fau-  
cium, cu-  
ra.

asthma-  
tis cura-  
tio.

Obstructio in pulmonibus à crasso, lento  
& pituitoso excremêto, si Asthma procreet,  
& diu perseueret, aut in senibus fiat, curari

nequit: in alijs non sine labore, præsertim  
si nihil de materia obstruente rejiciant, &  
nouâ sæpè accedente defluxione, malum  
augeatur & foueatur. Quæ si in paroxysmo,  
in quo iam prius in suffocationis labore exi-  
stunt, superueniat multa & magna, illos  
nonnunquam subito suffocat. Si verò à gy-  
pseo vel tophaceo corpore asthma fiat, etsi  
vno tantum in loco subsistens, non aded atq;  
asthma à pituita plus spacij occupante, pro-  
fectum suffocet, nisi accedente defluxione,  
conduplicatâ angustia, id fiat, tamen nec hoc  
sanari faciliè potest; nisi longo impetu tussis  
propulsum, aliquando rejiciatur, sicq; subito  
à malo inueterato liberentur.

Methodus curandi in eo versatur, vt im-  
pactam illam materiam in pulmonibus, si  
tenax sit humor, vt loco cedere possit, inci-  
damus, abstergamus, angustiasque illas pe-  
ctoris, vt liberiùs propelli & expui possit, di-  
latemus: quod & in tophacea materia com-  
petit & assumptis pectorique adhibitis, situ  
motuq; corporis variè administrandis, per-  
ficitur. Dein, vt catharri nomine, si hunc  
morbum procreârît, vel foueat, corpus eua-  
cuemus: caput siccemus, & humorem de-  
fluentem à capite varijs artibus aliò reuel-  
lamus. Flatuum quoque occasione, si ven-  
triculû & intestina distendendo, angustia  
augeant, eos educamus, dissipemus. Quæ  
omnia quâ ratione per assumpta: per suffi-  
tus: per admota: per attrahentia: per vren-  
tia: sectiones & motum corporis perfician-  
tur, nunc describemus.

Exhibentur purgantia extra paroxysmû,  
si defluxiones asthma procrearint vel foueat,  
illarum causâ, cum è pectore aliâs nil edu-  
cant: & in alijs causis, vt corpus ab excre-  
mentis purum, commodius tractetur. Vbi  
tamen non nimis temerè, nisi corpus impu-  
rum admodum sit, sunt affligendi: & leuio-  
ra potius exhibenda, & successiuè sunt pur-  
gandi: nisi defluxio admodum molester, cuius  
causâ quid faciendum, obiter hic quoq;  
recensebimus: asthmatis verò præcipue  
causâ, sic procedendum.

Leuiora purgantia, quæ simul expecto-  
rant, sunt, cassia, manna & polypodium, sic  
exhibita: R. rad. Liquiritiæ ʒ. ss. Passul enucl.

Ficum ana 3. j. Iuiubar. 3. 8. Polypodij ficcati 3. vj. fiat decoctio, dissolue Mannæ 3. iij. vel Cassiæ 3. j. 8.

Ius Galli decrepiti ab omnibus commendatur, quo dissolui Cassia vel Manna, vt dictum, potest: vel si fortius purgandum, alia electuaria phlegmagoga.

Vel hoc modo vsurpari potest: R. Gallum aliquot annorum, iugulatum, deplumatum, euisceratum: dein fume, Passul. Ficuum, ana 4. 8. conquassentur in pastam: semin. Carthami, radic. Polypodij ana 3. ij. Senæ 3. j. Agarici 3. ij. seminum Anisi 3. j. Turbith. 3. j. 8. Zingib. 3. 8. contundantur & misceantur cum pasta, quâ infarciatur gallus, & coquatur in Aqua. Sume huius decocti pro tribus vicibus, & si primâ vice non operatur, misce sequentibus aliquid de Cassia, vel Manna, vel vtrisque. Possent & in iure iam prius à gallo decocto, prædicta incoqui, & sic vsurpari.

Aliter sic præparatum diuq; exhibitum, pro præcipuo habent remedio: R. Gallum præparatum ad veru: infarciatur sequentibus, Pulmonis Vulpis frusto recenti, vel præparati & ficcati 3. j. Passulis enucl. & Ficubus ana 3. ij. radic. Porri recent. mundati 3. ij. Liquirit. 3. j. Enulæ 3. j. herbar. Hyssopi, Satureiæ, Marrubij, Thymi, Calamenti, Pulegij ficcata ana 3. j. seminis Fœniculi, Anisi ana 3. j. seminis Carthami conquassat. radic. Polypodij, ana 3. 8. Tartari albi 3. j. Salis 3. 8. Vitellis otor. num. ij. Butyri rec. 3. 8. puluerisanda puluerisuntur, & incisa, contusa, mista in pastam, insuantur gallo decoquatur donec caro ab ossib. cedat, multâ Aquâ in vase amplo, ne opus sit nouam affundere, dein eâ colato, & in tb. x. adde tb. j. Mellis depumati, ne citò corrumpatur. Capiat scutellâ vnâ, in quâ dissolue Mannæ & Cassiæ rec. ana 3. 8. manè, continuando ad multos dies, & mensem & amplius. Quod eò melius iuuabit, si mox etiam Terebinth. 3. j. cum Penidijs, in formâ boli aut aliter assumat.

Trochisci de Violis sine scammonæa, pectori appropriati & pituitam purgantes, hic probantur, 3. iij. quantitate exhibit, cum decocto vel aquâ pectorali dissoluti, insuper adiectis alijs si minùs sint efficaces.

Validiores sic parabuntur, in pituitosioribus vsurpandi: R. florum Violarum nondum omnino exiccatarum 3. vj. Turpethi 3. iij. Agarici 3. iij. succi Liquiritiæ, Mannæ ana 3. ij. Scammon. 3. j. cum syrupo de Violis: fiant trochisci: Dantur 3. ij. vt suprà.

Potio hæc competet: R. Agarici 3. j. 8. Turpethi 3. j. Zingib. 3. 8. puluerisata infundantur in Oxymel. simpl. vel Hydromellitis 3. j. Vini albi tantundem, aquarum Hyssopi, Fœniculi ana q. s. exprimantur & colentur: dissolue Diaphœn. vel Diacarthami 3. j. 8. Mannæ 3. j. syr. Viol. 3. j. fiat potio.

Pilulæ conuenientes sunt: R. pilul. de Agarico, Cocciarum, ana 3. j. trochif. Alhandal. gr. vj. cum Oxymell. scyll. fiant pilulæ.

Vinum hoc valde proderit, præsertim si flatus, qui angustiam augent, vt sæpè fit, adsint: R. Senæ 3. ij. Agarici trochif. 3. 8. Turbith. trochif. 3. ij. radic. Scyllæ 3. ij. Absynth. 3. iij. baccarum Lauri num. x. sem. Anisi 3. j. Fœniculi, Carui ana 3. ij. infunde in Vini mens. j. 8. & poculo vno Mellis depsum. Bibat aliquoties manè.

Colocynthidis pulpa infusa in Vino, & vinum exhibitum, in deploratis, magnum censetur remedium.

Electuarium vsuale: R. Mannæ, Cassiæ rec. ex. ana 3. ij. Diaphœnici, Diacarthami tab. ana 3. j. syrapi Viol. Oxymel. scyll. ana 3. 8. fiat electuarium: capiat à 3. ij. incipiendo, ad plures procedendo.

Purgatione factâ, postridie reficimus Mithridato, & idoneâ aliquâ cõseruâ, exhibitis.

Vomitoria quandoq; exhibentur in consuetis, si fortè hoc impetu è pectore cedat materia, sed extra paroxysmum, ne nimio conatu suffocationis periculum augeatur.

Præparantia humorem pituitosum, ante purgationes exhibentur, tum etiam post eas, quia simul ad expectorationem, impaetum humorem præparant.

Per syrupos & aquas hoc modo: R. syrapi de Liquiritia, de Hyssopo, ana 3. j. 8. Oxymel. simpl. vel scyll. si tenax sit materia 3. j. aquarum Hyssopi, Fœniculi, Vngulæ cabal. ana 3. iij. fiat Iulep. per triduum sumendum, aromat. pulu. Diarisi: vel dando tabulam postea.



Perapozema sic: R. Liquiritiæ ʒ. j. β. Enulæ, Ireos ana ʒ. β. herb. Marrubij, Capill. Ven. Hyfopi, Vngulæ cabal. ana M. j. florum Scabiosæ, Stæchados, Violarum, Maluæ ana P. j. femin. Anisi, Fœniculi ana ʒ. ij. Passul. enucl. Iuiub. ana ʒ. j. β. Daſtylorum enucleat. num. iij. Ficuū num. x. fiat decoctio, dissolue in colatura Oxymell. ʒ. ij. aromat. pauco Cinam. Vtatur loco Iulepi.

In cibo eadem, quæ in incubo, dicta, vt tenuis, euchymus sit & facilis concoctionis, minimeq; flatulentus, crudus, astringens, obseruanda.

Inter reliqua, Ius senum Gallorum probat Dioscor. Cochleæ comestæ à quibusdam laudantur.

In condimentis Crocus pectori prodest: & bellarium Synapis cum Melle, egregie expectorat.

Faba, Hordeum, Orobus, Amygdalæ, Pineæ, laudantur, si flatulenta vis, addito semine Carui & Fœniculi, corrigatur. Ficus, Passulæ, Daſtyli, probantur.

Ferculum valde conueniens: R. Porrorum mund. incis. ʒ. ij. coquantur in Aqua vel Iure galli decrepti, donec mollescant & & dissoluantur: tunc adde Vitellum vnius ouis, Butyri ʒ. ij. Sacchari ʒ. j. iterum parum coquantur. Comedat mediam partem in prandio, alteram in cena.

Bibat Melicratum seu Aquam mulsam, quæ indies coquitur ad vsum: vel Hydromel, quod certo tempore, caniculæ imprimis, præparatur, & asseruatur diu ad vsum: quo nomine hæc duo differunt. Hisce Hyfopus si incoquatur, efficaciora fient.

Vel Prisanam, quæ sic gravior fiet: R. Hordei P. β. Liquiritiæ baculos duos longos coquassatos, Passul. enucl. num. xx. Ficuū num. xv. decoquantur in mens. xj. donec redeant ad viij. si catarrhus vrget, addantur Iuiubæ, num. xij.

Medicamenta alia, quæ assupta, leniendo vias & detergendo, incidendo materiā in pulmonū vasis inſarctam, & expulsionē per rufsim idoneā reddunt, aut saltem ne in angustijs hæreat, sed rursū in ampliores vias remeet, procurant, vnde & in qualicunque causā conueniunt, varijs formis exhibentur.

Decocta eiusmodi sæpè bibita, manè & vesperi, proderunt: R. rad. Liquirit. ʒ. j. Enulæ, Ireos ana ʒ. β. Capill. Ven. Hyfopi ana M. β. Passul. enucl. Ficuū ana ʒ. j. Croci ʒ. j. decoquantur: adde Mellis q. s. Bibat.

Vt sic: R. Marrubij fœci, Chamædreos, Hyfopi ana M. j. flor. Stæch. P. j. decoque in Aqua & Melle: Bibat.

Vel sic: R. rad. Ireos ʒ. ij. fol. Marrubij, Rutæ, Calamenti, ana ʒ. j. sem Vrticæ, Fœnogr. ana ʒ. ij. Passul enucl. ʒ. j. bulliant, addito Melle, vel etiam permiscendo Oxymel scyll. Vtatur.

Vel magis compositum: R. radic. Liquiritiæ ʒ. ij. Ireos, Enulæ ana ʒ. j. radic. Equiseti cum tuberositatibus ʒ. j. β. Valerianæ, Scyllæ ana ʒ. ij. herbar. Trichomanes, Vngulæ cabal. Betonicæ, Veronicæ maris. Hyfopi, Satureiæ, Marrubij, Calamenti, Thymi ana M. j. flor. Stæchados, Anthos, Scabiosæ, ana P. j. femin. Fœniculi, Anisi, ana ʒ. β. feminum Vrticæ, Erucæ, Nasturtij ana ʒ. j. Ficuū, Passul, ana 4. j. Iuiub. Sebesten ana num. x. fiat decoctio in Aqua & Melle; q. s. aromat. Piperis & Spicæ ana ʒ. j. Bibat sæpè: vel auctâ dosi mellis aut sacchari, additaque Mannâ fiat syr. ad vsum fumendus: vel dissoluendus & bibendus.

Syrupus alius admodum efficax: R. radic. Raphani rec. ʒ. iij. Porrorum iij. Ireos rec. ʒ. ij. Enulæ, Dracunculi vel Ari, recent. ana ʒ. j. Scyllæ ʒ. β. Liquirit. ʒ. j. β. herb. Satureiæ, Pulegij, Hyfopi, Sabinæ, Marrubij, Chamædreos ana M. j. Caulium rec. Vngulæ cabal. ana M. ij. flor. Stæchad. P. j. femin. Fœnogr. Carthami ana ʒ. vj. baccarum Lauri ʒ. β. Spicæ ʒ. β. Croci ʒ. j. fiat decoctio, addito Saccharo, vel Melle: fiat syrupus.

Vinum ex maceratione sequentium hoc vtile erit: R. rad. Liquirit. ʒ. j. β. Ireos ʒ. j. Enulæ ʒ. β. Angelicæ, Scyllæ præpar. ana ʒ. ij. Marrubij, Hyfopi ana ʒ. iij. feminum Anisi, Fœniculi ana ʒ. ij. Vrticæ, Nasturtij ana ʒ. j. Mellis despum. ʒ. vj. Vini albi, mens. j.

Mille pedes, vel Afelli dicti, si panno lintheo inuoluti in Vino macerentur, & expressio potui detur, magnum in asthma remedium, aliqui se expertos esse prædicant.

Vinum, Acetum, Mel, Oxymel, cū Scylla præ-

la preparata, in paroxysmo data, valde iuuat.

Succus Scabiosę & Sonchi, per se, vel cum Melle, exhibiti.

Vel: R. succorum Enulę, Hyfopi, Marrubij ana ʒ. j. aquę Hyfopi, Vngulę cab. ana ʒ. iij. Sacchari q. s. decoquantur: capiat frequenter.

Vrinę proprię potus, plurimũ iuuare creditur.

Aqua sequens sensim sumpta, cochleari, vt ad pulmones penetret, multũ proderit: R. radic. Scyllę præpar. ʒ. ij. radic. Enulę ʒ. ʒ. Porrorum ʒ. j. femin. Sinapis & Nasturtij ana ʒ. j. Cinamomi ʒ. iij. contundantur, addito Vino forti, eliciatur aqua, ad vsum cui misce Mellis scyll. vel anthosati, donec dulcoretur.

Oleum Amygdalarum recens bibitum, plurimũ confert. Vel Butyrum recens affatim sumptum.

Comeſta ſequentia proderunt; Caricę parum aſſę, & in Aqua vitę maceratę, & eſitatę conueniunt.

Cęparum vel Porrorum radices coquantur ſub cineribus, & comedant pauperes, cũ Melle & Butyro. Vel Ari & Serpentarię radices ſic toſtas: ſed ſi fauces nimium inflamment, contundantur, & cum oleo Amygdal. ſumantur, & Saccharo vel Melle: vel coquantur prius, & aquã abiectã, vſurpentur. Scylla autem toſta cum Melle.

Fortę commodius ſic: R. succorum Porrorum ʒ. ij. ſucci, radic. Ari vel Serpent. ʒ. j. ſucc. Scyllę, Raphani ana ʒ. ʒ. succorum Hyfopi, Enulę ana ʒ. j. adde Mellis optimi ʒ. ʒ. coquantur ad conſiſtentiam electuari. De quo vtatur.

Conferuam Enulę & rad. Ireos frequenter ſumat.

Laricę ʒ. j. cum vitello Oui & melle ſumpta.

Sulphur præparatum, id eſt, ſepẽ ablutum aquã Vngulę cab. cũ rad. Ireos & pauco Sale in Ouo forbili; ſingulis ſumat matutinis.

Quę lingendo ſumuntur, ex vſitatis ſunt ſyrupis præcipui in aſthmate conuenientes, de Hyſopo, Marrubio, Oxymel ſimplex, ſcyllit. & præcipuẽ Damocratis Et looch de Pulmone Vulpis, de Caulibus, de Farſara,

de Carthamo, de Pino, de Mucilaginibus, Sanum & expertum, de Scylla. Et ex ſpeciebus, Diaridis ſimpl. & Salom. Pliris arcot. & Diahyſopi.

Eclegmata alia hac ratione fieri poſſunt: R. gummi Ammom. diſ. in aqua Vitę ʒ. ij. ſem. Naſturtij & Nigellę ana ʒ. j. Salis ammom. ʒ. ʒ. Sulphuris præpar. ʒ. j. Croci gr. v. Pulmonis vulpis præpar. ʒ. j. ʒ. excipiantur Mellis ſcyll. vel Syrupi conuenientis ʒ. ij. fiat looch.

Vel ſic: R. rad. Althę ʒ. ij. Ireos ʒ. j. ʒ. Enulę, Ariſtol. rot. Azari, Bryonię ana ʒ. j. Gentianę, Ari ana ʒ. ʒ. fol. Sabinę & Tuſſilag. ana ʒ. j. ʒ. ſeminum Fœnogr. Lini, medullę ſeminis Carthami ana ʒ. ij. baccarum Lauri ʒ. j. ſem. Naſturtij, Vrticę ana ʒ. ʒ. Pulmonis Vulpis præpar. Gummi Ammon. in Aceto diſſol. ana ʒ. ij. Sulphuris viui abluti aquã Vngulę, Laricę coctę ana ʒ. j. Styrcis ʒ. ʒ. ſucci Liquirit. ʒ. j. cum Melle ſcyll. aut Syrupo aliquo ex prioribus vel Looch: fiat eclegma.

Permixtis alium laxantibus, ſic fiet conuenientius expectorans, ſi aliud aſtricta ſit: R. mucilag. Althę & Lini ana ʒ. ʒ. Manne, Caſſię ana ʒ. j. Agarici, Turbith ana ʒ. j. ol. Amygdal. vel Butyri rec. Penid. ana ʒ. j. miſce: capiat.

Pulvis hic conueniet: R. rad. Liquiritię, Polypod. ſicci ana ʒ. ij. Ireos, Enulę ana ʒ. j. Ari ʒ. ʒ. ſeminum Naſturtij, Vrticę ana ʒ. j. Cinamom. ʒ. j. ʒ. Croci ʒ. j. Pulmonis vulpis præpar. ʒ. ij. Sacchari ad dimidium ponderis: fiat pulvis: Vel cum aqua Tuſſilag. auſtã Sacchari quantitate: ſiant tabulę.

Laudatur & hoc admodum: R. Croci ʒ. j. vel ʒ. Moſchi granum, detur cum Vino albo.

Pilulę ex ſequentibus lachrymis ſunt eſſicaces: R. gummi Ammom. diſſoluti in Aceto ſcyll. ʒ. ij. Styrcis, Sagapeni, Myrrhę ana ʒ. ʒ. Laricę coctę ʒ. j. Spicę ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. excipiantur Melle: ſiant pilulę: capiat frequenter ʒ. ʒ.

Si catharrus adſit, ad deſſuxiones ſiſtendas, ſenſum peſtoris obtundendum, increſſantia & ſtupeſacientia interdum propinatur: de quibus in catharris dictum.

Hic autem vti poſſumus Hordeato ſequenti, ſic

ti, sic parato: R̄. Hordei mūdi selecti q. s. macerentur per sex horas, postea coquatur perfecte, vt dissolui possit, passetur, dein accipe Amygdal. dulc. extort. ʒ. iij. sem. mundat. Cucurbitæ ʒ. j. β. Melonum ʒ. j. Papau. albi, Lactuæ ana ʒ. β. contusis omnib. cum aquâ Hordei eliciatur lac, quod cum t̄b. ij. pulpæ hordei permixtū, coquatur parū, adde Sacchari portionem. Bibat ad ʒ. x. aliquot matutinis superdormiēdo, & nonnunquam in introitu lecti. Vsitatū Italis & Gallis ad defluxiones sistendas & mitigandas remediū.

Ex narcoticis verò, dantur per interualla opiata, Theriaca, Mithridatum, Philonium cum puluere Liquiritiæ, etiam in ipso paroxysmo: vel cum Diapenid. & Looch de pulmone Vulpis.

Teneat in ore Diatragach. Vel: R̄. pul. Diatrag. frig. ʒ. ij. Thuris ʒ. j. succi Liquirit. ʒ. β. Croci ʒ. β. cum syrup. de Violis fiant formulæ.

Suffimigium sequens ore excipere conueniet, ad exiccandum, non tamen affatim, ne suffocet: R̄. fol. Tussilag. ficcor. ʒ. j. Thuris, Masticis, Styracis ana ʒ. β. Sulphuris ʒ. j. excipiantur puluerisata, Terebinthina: fiant trochisci.

Iisdem integumenta capitis ad catharrum siccandum suffumigari possunt, & cubiculū.

Extrinsēcus pectus inungi debet relaxantibus, vt liberiūspirent, & concoquētibus, vt materia præparetur: exempli gratia: R̄. oleorum Amygdal. dulc. Liliorum ana ʒ. j. succi Hyfopi ʒ. j. β. coquantur, ad succorum consumpt. adde Butyri rec. Mucilag. semin. Fœnogræci & rad. Lilij cocti sub prunis ana ʒ. j. β. axungię Anatis ʒ. β. Croci ʒ. j. Cerae albæ parū. Vngatur pectus.

Vel vnguento Resumptiuo illud fiat.

Ventriculo etiam foris remedia adhibentur, si flatibus distentus, malum augeatur.

Vti & capiti, ea quæ catharros sistunt, caputq; siccant & roborant, si inde oriatur vitium & exacerbetur, admouenda.

Lotiones capitis eiusdem gratiâ sunt. Et crurum lotio calida à capite & pectore plurimū reuellit; facta ex decocto Saluiæ, Lauandulæ, fl. Chamomil, Sambuci, aliisq; odoratis calidis.

Frictiones extremitatum eodem nomine competunt.

Cucurbitulæ scapulis affixæ, cruribus item, repetitæque diebus aliquot, humorem ad pectus fluentem, reuellunt: & si perseuerante morbo sub mammis nonnunquā affigantur, etiam materiam è pectore discutiūt.

Cauteria in brachijs, cruribus inusta, si à catharrho fiat, reuellunt. Vesicatoria in carpo vel palma manus, aut etiam post aures adhibita, idem potenter præstant. Et si pectoris mediō quoque apponantur, in omni asthma magnum adferunt adiumentum. Quam partem & vrere iubet Aëtius: alij Dropaces etiam adplicant.

Sectio venæ, si plethora adsit, prodesse poterit alioquin inutilis.

Injiciantur clysteres potissimū in constipatis, flatibus discutientes & aluum soluentes: tunc enim flatibus & facibus deorsum subsidentibus atque erumpentibus, leuantur. Quo nomine & suppositoria induntur.

Vt si ructus & crepitus emittere possent, simili ratione prodesset sed cum hoc solâ voluntate, nisi natura prius impellat, vix fieri possit (licet aliqui aërem deuorando, illum rursus eructare, & decubitu in genua, podice sursum eleuato, crepitus reddere possint) natura vt illud molietur, prædictis erit stimulanda. Quo nomine & vomitus digito immisso, vel pennâ sæpè stimulatur.

Quieti, cum paroxysmo laborant, sint, nec corpus admodum moueant, aut multum loquantur, quia hisce concitatiores facta respiratio, magis angit. Et si decumbant, capite & thorace in altum, suppositis puluinaribus, collocatis, cubent.



## DE DEPRAVATA RESPIRATIONE.

### C A P V T V.

#### Genera.



tariè fit.

ESPIRATIONEM deprauatam vel prauam dicimus, quando nimium, aut sinistrè, non tantum inuoluntariè, sed & volun-

Inuoluntariè nonnunquam fit respiratio, & precipuè inspiratio frequentior, vel maior quàm par est. Aliàs, exspiratio præsertim cum valida, & vel interrupta nonnihil & brevis, vel diutius continuata, exsufflatur. In varijs speciebus; aliàs cum sono diuerso, aliàs etiam cum excretionē aliquā manifestā, se patefacientibus. Quæ in sanis aliquin, à causis leuibus excitatæ, tantum leues sunt affectiones: aliàs verò grauiorēs & morbos præfagientes, affectus sunt permanentes, morborumq; symptomata, ad prauam respirationem pertinentia; licet si in illis quoq; excretionēs fiant magnæ, ad excreta tunc potius referri debeant.

*Citarespiratio.* Respiratio frequens & cita est, cum aer subito inspirando attractus, statim etiā rursus expiratur; in Concitata vel cita dicta respiratione. Quæ magna vel parua, vel mediocris simul esse potest: nondum tamē impedita; sicuti in dyspnœa accidere posse diximus. Quod sanis nonnunquam euenit, & morborum quandoq; est symptoma.

*Suspirium.* Respiratio magna in suspirio dicto fit, in quo magno nixu & conatu aer attrahitur, rursusq; exsufflatur, cum sono quodam lachrymabili. Sanis etiam consuetum, & in morbis accidens.

*Ofcitatio.* Magna quoque respiratio in Ofcitatione appellata perficitur, in qua ore aperto admodumq; diducto, aerem primum essatim haurientes, mox halituosum iterum copiosè efflant, cum sono lamentabili. Eamq; Pandiculatio ferè comitatur. Quæ vt sanorum sunt affectiones; ita morborum nonnunquam symptomata: sicuti in pandiculatione dictum fuit.

*Singulatio.* Exspiratio interrupta & brevis in Singultu fit; aëre cum sono aliquo veluti in momento erumpente. Sanis sæpè contingens, & in ægris graue interdum accidens & periculosum, repetitis continuè vicibus illos per horas vel dies etiam plures nonnunquam affligens.

*Sternutatio.* Maiore impetu & vociferatione, corporisque rotius concussione, aëris fit exsufflatio subita, per nares præsertim, sed mox iterum abrupta, in Sternutatione; quæ pluribus aut paucioribus vicibus, contingit, lachrymas simul, & si quid in faucibus aut na-

rium amplitudine hæret, excutiens. Atque catharras & grauiorēs etiam morbos, vt epilepsiam, interdum præcedit & præfagit; vnde hæc benè precandi sternutantibus consuetudo nata est, sicuti in epilepsia dictum. Sed & hoc symptoma morbos interdum sequitur, quandoq; finit: aliquando etiam sanis leui ex causa euenit.

Simili vi & validitate, vocisq; contentione & interruptione, cum corporis agitatione, aer, sed per os potissimum, excutitur in Tussi, quæ nonnunquam diutissimè durat, quandoq; cessat & certo tempore redit. Humorem plerumq; per os excutiens; aliàs in fauces vel os propellēs, vnde postea excreatur vel expuitur, quæ & Humida ob id tussis, vt illa in qua nihil rejicitur, Sicca dicitur, & si leuis tantum fit, Tussicula appellatur. Sed & si vehemens sit, vomitionem sæpè commouet, lachrymas exprimit, nimioq; clamore raucedinem parit, vel vocem penitus auferit: & si diuturna sit, dolorem in pectore & abdomine, ob nimiam illorum concussionem, parit. Quæ tussis, & sanis, à causis externis aliquando accidit, senibus verò adeo familiaris, vt naturalis illis excretio esse videatur: in pluribus morbis molestū, & præcipuum interdum quod affligit, symptoma.

Valida magisque continuata efflatio fit, cum crepitu oris in Ructu seu Eructatione, dictis: In sanis & ægris sæpè contingens flatuum excretio; nunc nidorosum quid, nunc foetidum, aliàs aliud quid, vel etiam nihil redolentium.

Vehementiore adhuc conatu, cū clamore & voce raucā, fit efflatio in Vomitu: qui aliquando conatus tantum est, materiam aliquam è ventriculo egerendi, aliàs verò eā simul profundit, Symptoma multorum morborum, diu multumq; sæpè affligens.

Voluntate nostrā & studio, exsufflatur quoq; ex ore & naribus aer validè, non tantum ad Vociferationem, sed & ad alios vsus, vt per Anhelationem calida exspiratio; per Exsufflationem frigida. Quæ tamen nō præternaturalia sunt, nec nocent, nisi coactis ad hoc ultra modum, hæc etiam fiant: vt in morbis quandoque euenit, tūm doloribus



359

excruciati, aut mente capti, nimium vociferantur, aut alijs de causis nimium exsufflare aut anhelare coguntur.

*Emunctio.* Cum impetu & strepitu, voluntate quoque; nostrâ, excretionum causâ, aer & cum eo humor per nares propelluntur, in Emunctione, compressis naribus, vt coarctato. non nihil loco validior fiat eiectio, vel etiam apertis illis exsufflando expelluntur.

*Expul-  
tio.* Sed & voluntariè, ore collecto, vt spiritus coniunctus fortius impellat, per vehementem exsufflationem in Expultione, humorem rejicimus: atque è faucibus eadem vi, angustias illas non nihil coarctâtes, per Screatum in os propellimus, & veluti per sphyringam eiaculamur. Quæ duo, symptomata interdum sunt morborum: aliâs sanis, vel ob copiam humoris in faucibus; vel ex consuetudine vsitata; quando hæc tanquam pausam inter loquendum, vt interea aliquid meditari possint, orationi frequenter intermiscent oratores, & screatu atque expultione partes orationis distinguunt.

Sinistrè potius, quam nimium obitur inter voluntariam expirationem, ea, quæ vocalis est, vox scilicet, cum rauca editur, nec planè, sed cum inæqualitate quâdam & sono aspero permixta, profertur, in Raucedine dictâ: idque vel voce simul imminutâ vel clarâ nihilominus, sed vt dictum asperâ: quod vitium huc pertinet, vti illud ad defectum respirationis.

*Balbuties cum  
stridore.* Vox articulata, seu locutio etiam male obitur, cum in efferendis certis literis, balbutiunt: verum cum eas tunc nec exactè nec planè proferre possint, ad imminutam loquelam potius, sicuti in defectu respirationis dictum, refertur. Quando verò nullus defectus adest, sed certas literas gemino sono efferunt, sicuti R. aliqui duplicando, cum stridore pronunciant, tunc etiam hoc vitium ad deprauatam loquelam pertinet.

#### Causa.

**C**ausæ omnium deprauatæ respirationis generum enarratorum, cordis, vel organorum respirationis occasione procedunt.

Cordis causâ) cum propter cor, ad spiri-

tus vitalis generationem, respiratio fiat) respiratio & præsertim inspiratio intenditur: si aer sufficiens illi non subministratur, vel spiritus illius vehementius agitentur.

*Animi  
affectus,  
causa Sin-  
teriorum* Aëre, quo ad generationem spiritus vitalis, continuè cor dum mouetur opus habet, si ob intermissam respirationem aliquandiu cor priuetur, tunc vt illud quod omisum fuit, refarciatur, in inspiratione magnâ per suspiriū ducta indiguit: quæ aer affatim attractus, defectum hunc illius reponit. Intermittitur autem, quando animus per illius affectiones alijs rebus adeo intentus est, vt respirationis quasi oblitus, ad eam ducendam tandem non impellat, donec necessitas rursus eam excitet, & vt maior fiat, incitet.

Spirituum cordis nimia, per mentis perturbationes commotio, & cordis veluti quidam dolor, oppressio & suffocatio, qualem per animi affectus sentimus, inspirationis illius magnæ, quæ per Suspiria ducitur, causa est, cum per eam cor oppressum euentiletur & refocilletur; sicuti apertè cordis dolores, vt vocant, alleuari per suspiria sentimus. Quæ potior sanè suspiriorum causa est: nec enim tantum ob intermissam respirationem, animo alijs intento, hæc fieri, ex eo patet, quod & noctu quiescentes, animo tunc penitus veluti sopito, nihilominus sufficienter respiremus.

*Motus  
rebe-  
mens,  
causa Ci-  
ta respi-  
rationis.* Motu vehementi vel valido totius corporis, qualis currendo, vel prærupta loca scandendo, alijsve obitur, quæ spiritus admodum dissipant, vitales præsertim, quod & ex debilitate, quæ mox subsequitur, satis patet, ne illi deficiant, sed continuè refarciantur, multâ inspiratione opus fuit, non ob necessitatē cordis refrigerij, cum & respiratio ex motu, corpore nondum calefcente, solo quoque; intendatur. Proin non hæc, sed quæ dicta fuit, quod citam respirationem & frequentem, eiusmodi exercitia commouent, causa est.

*Calor,  
causa Ci-  
ta respi-  
rationis.* Eoque; concitator oritur respiratio, si corpus nimio labore simul incalescat, vnde spiritus magis adhuc absumentur; maxime, si tantus sit calor, vt & cor simul incalescat: quod non tantum motu valido, sed & per æstuarium fit: item animi nimios motus, per iram, gaudium: & præsertim perseveranter

in febribus, in quibus cita respiratio vnum ex illorum symptomatibus existit.

Organorum respirationis causâ, exspiratio vehementior exsurgit, si illa vel grauentur; vel irritentur: Vel sinistrè fit, si illa exasperentur; aut vitiū aliud instrumenti adsit.

*Vapor, Lassitudo, Imaginatione, causa Oscitationis.*  
Grauata illa organa halituosis vaporibus, atque ex lassitudine se relaxare cupientia, quomodo Oscitationē & nonnunquā cum eā Pandiculationem faciant, in motu deprauato exposuimus. Vbi & quomodo ex imaginatione oscitatio fiat, ostendimus.

Irritata seu molestata organa respirationis exsufflationem concitant, si pars ipsorum fumine sensibilis iniurijsque exposita magis, qualis est succingens ea tunica, non tantum eo in loco vbi illa succingit, vt in aspera arteria, pulmonibus sed & alibi quo se extendit & se inserit, vt in naribus, ore, faucibus, gula, ventriculo, intestinis, septo, propter cōtinationem offensa, vt illud expellant, aliqua ex illis, aut simul omnia quæ exspirationem faciunt, insurgant, illudq; per exsufflationē excutere nitantur. Tunc prout irritatio maior minorve est, & parte aliquā illius plus minusve sentiente & nobiliore afficitur, diuersa deprauata exspirationis genera exsurgūt. Quod quomodo à causis diuersis, splendore, vapore, aëre humorib. alijsve corporib. externis vel ab internis, aut vaporib. alijsve à causis & morbis fieri possit, nūc ostēdemus.

*Splendor solis, causa Sternutationis.*  
Splendor solis, vel lux magna oculis oblatā, sicuti lachrymas, oculos vellicando, mouent; ita vicinam narium sensilem tunicam, cum qua palpebrarum sensibilis tunica quandam habet communionem, per consensum afficientia, Sternutationem mouent; in iis, qui ad eam propter humores tenues & fluxiles sunt prompti, vel ob exquisitum harum partium sensum facile patiuntur.

*Odor vellicans, causa Sternutationis.*  
Vice versâ, odor seu vapor acris; veluti ab allio, cæpis, sinapi, raphano, naribus adhibitis, vel assumptis, vt nares pungens sternutationem facit, sic & oculis vellicando, lachrymas elicit.

*Aër & aqua frigida, causa Tussis & Raus exsiccationis.*  
Aër frigidus affatim attractus, faucium asperæq; arteriæ tunicam molestando, & vti frigidū partibus sensilibus facere solet, mordicando, Tussim mouet siccam, cum rauce-

dine coniunctam, si cōstringendo & siccitate suâ partes has, quæ leues & lubricæ esse debuerunt, exasperet: quod si admodū fiat, vox quoque deperditur. Sed & defluxiones mouendo, humidā ex accidenti tussim causare potest. Aqua frigida affatim bibita, raucedinem simili ratione parit.

Quod quoque ab astringentium vsu fieri potest.

Humores aliæve corpora crassiora, si in asperam arteriā incidunt, cum illa exquisitissimo sensu prædita, vel solum horum contactum ferre non possit, mox tussim mouent; eamq; admodum validam, si ab illis ob acutiem aut asperitatem, simul irritetur aut acredine pungatur. Vti fit, si ex assumptis cibis aut potu, dum deglutiuntur aut bibuntur, aliquid à rectâ viâ declinans, in laryngis rimulam feratur. Sicuti loquentibus, eā dilatata, quando simul deglutire volunt, sæpè contingit, vt aqua, vel vinū, vel mica panis, aut aliud quid in asperam arteriam illapsa, tussim moueant, cuius vi & mox iterum per os excutiantur, & nonnunquam etiā in narium amplitudinem propulsa, per nares rejiciuntur, vel si magna copia fuerit, liquores illapsi effunduntur. Potest & alio casu aliud quid, vt pulueres, per aërem præsertim attracti, in hæc vias ferri & tussim mouere.

Sed & à similibus, si in nares spiritu duccantur, sintque acria & nares vellicent, Sternutatio concitatur: vt ex piperis, pyrethri, hellebori pulueribus atque succis acribus, in errhinis attractis, euenit. Quæ si casu per narium amplitudinem, cum aëre in asperam retracta, eam subeant, tussim vehementem simul excitant.

Verum & fauces accendentia, tunicamq; succingentem illic stimulantia, si masticeantur, aut ore contineantur, saluā & pituitam prouocando. Expuitionem mouent: vt pyrethro, staphisagria alijsq; similib. in caput-pürgijs appellatis, eā promouere solemus.

A capite humor defluēs, aqueus, excrementitius, serosus, aut pituitosus, tenuis vel mucosus, simplex aut alijs salsis, biliosis, acribusve humorib. pmixtus, in catharro dicto, si in asperam arteriam illabatur, Tussim cōcitāt, eò vehementiorem, quod materia quæ illapsa

*Illapsa in asperam arteriam, causa Tussis.*

*Attracta narium, causa Sternutationis.*

*In ore cōtenta, causa Expuitionis.*

*Humor à capite defluens, causa Tussis.*

393

illapſa eſt, acrior copioſiorve exiſtit, diuturnioremque, quò diutius perfeuerat deſtilatio, aut deſluxus humor tenuitatem per tuſſim potius diſpergitur quàm reiſcitur. Quæ omnia mitiora ſiunt, ſi humor aqueus & pituitoſus tantùm exiſtat; qualis & citra ſtimulum ad tuſſim, à capite per aſperam arteriam, noctu præſertim, ſenſim deſcendens, in pulmonibus ſæpè coaceruatur, manequè aliquot ſaltem tuſſiendi conatibus cedit, facileque reiſcitur.

*Humor à capite deſluens, cauſa Sreatus & Expuitionis & Raucedinis.*  
Sed & idem humor in fauces à capite deſluens, aut ab aſpera arteria in illas propulſus, illicque moleſtando Sreatum mouens, per illum eiſcitur, vel in os protrufus expuitur. Qui ſi tenax & mucoſus ſit, illisq; diutius adhæreat, Raucedinem parit: voci impedimentum adferens, quia inæqualitatem in illis locis efficit ſuâ adhæſione, vel quia ſub tunica latens vt intumeſcant ea loca, facit. Ab vniuerſo quoque corpore ſcæda illuvies huc propulſa, Excreationem atque expuitionem indefinentem cauſat: qualem ex hydrargyri inunctione, diu ægros moleſtare videmus. A quibus omnibus etiam vlcera in hiſce locis fieri poſſunt, vnde vox rauca efficitur.

*Humor à capite deſluens, cauſa Sternutationis.*  
Verùm & humor à capite deſluens, ſi acris ſit & tenuis. & ad nares feratur, eas vellicando, Strenutationem mouet, & ad frequentem ſimul Emunctionem nos ſollicitat. Quæ repetitis vicibus, nec parua moleſtiâ, in affectu qui Coryza dicitur, ſæpè moleſtat; etſi deſluxio perſiſtat, naribus quandoq; inflammatis & exulceratis, calidoq; & acri humore è naribus exſtillante, diu perfeuerat.

*Sanguis à ſuperioribus deſcendens, cauſa Tuſſis & Sreatus.*  
Sanguis etiam à ſuperioribus in fauces deſcendens, Excreatur, & ſi in pulmones illabatur, Tuſſim ad ſui excretionem ſollicitat. Et ſi acris calidusque in venis circa nares colligatur, pruritus illic faciendo, Sternutationem ſæpè mouet, ſecuturæ hæmorrhagiæ narium, prænuntiam.

*Pituita vel Tophi in pulmonibus, cauſa Tuſſis.*  
Congeſtus in pulmonibus humor pituitoſus, à crudiore illorum nutrimento natus, Tuſſim quoque mouere ſolet, eò magis perfeuerantem, quò tenacior eſt: vt in aſthmaticis eam cum dyſpnœa cōcurrere diximus. Quod quoque ſi tophi vel calculi illic geniti hæreant, ſolet accidere; maximè ſi materia

hæc obſtruens, ad maiores aſperæ arteriæ ramos, vbi ſenſus magis eſt exquisitus, perueniat, exitumque illic quærens, ad tuſſim impellat.

*Pus in pulmonibus, cauſa Tuſſis.*  
Pus in pulmonibus collectum, ſimili ratione ad vias dictas progreſſum, Tuſſim commouere frequenter ſolet. Quale nonnunquã ex pituitâ diu retentâ, & veluti maturatâ, aut ſuppuratâ expuitur. Aliàs ex ſanguine excrementitio etiam citra exulcerationem gignitur. Quâ ratione in pleuritidis quoque & peripneumonicis, inflammatis pulmonibus potius coaceruari, quàm à thorace per pulmones tranſudare, tuſſimq; concitare, illic oſtendemus. Aliàs verò à pulmonum vlcere & abſceſſu hoc procedit, & in phthiſicis continuo tuſſiando redditur. In quibus omnibus, ſi pus album, coctum, temperatumq; exiſtat, mitiorem faciet tuſſim: pertinaciorẽ verò, ſi ex humorum permixtione aut corruptione, flavum, ſubuiride, ſubatrum, acre & foetidum exiſtat.

Sanies in pleuritidis, & peripneumoniæ principijs, mox exſudans, Tuſſim quoque excitat.

*Sanies in pulmonibus, cauſa Tuſſis. Sanguis in pulmonibus, cauſa Tuſſis.*  
Vti & ſanguis in hæmoptoica paſſione copioſe profuſus.

*Vapores maligni, cauſa Tuſſis.*  
Vaporibus malignis, ſi ſeptum in febribus pernicioſis irritetur & moleſtetur, vt illos excutiat, in ſe contractum ſubitoq; relaxatum, (vti in conuulſionibus neruorum fieri diximus) veluti conuulſum, ſonum illum interruptum edit, qualẽ in ſingultu in hiſce morbis diu perfeuerante & lethali, accidere videmus. Vix enim ob ſiccitatem illius, etiam in cauſone arefactum, hoc, vti voluerunt, accidit, vnde dyſpnœa potiùs, ſicuti dictum, quàm deprauatus illic & concitatus motus ederetur.

Ventriculi læſionibus, ſi ſeptum illi conſentiens offendatur, ſimiliter ad motus deprauatos, per exuſſilationem edendos, concitatur. Cum enim non tantùm ventriculo propinquum ſit, illiq; incumbat, ſed & eandem cum ventriculo cōmunem ſortiatur tunicam, eoſdemq; neruos in orificium ventriculi & ſeptum inſertos acceperit, non mirum ventriculi incommoda, ſeptum perſentire, & cū ventriculus, vt illa excutiat, in-

*Irritatio Ventriculi, causa Singulæ.*  
 surgit, sed; aperit, septum quoque motu suo ventriculum, ut illud rectius præstare possit, impellere; adiuvantibus si magnâ vi opus sit, reliquis thoracis musculis: & quemadmodum septum opitulantibus abdominis musculis, intestina, cum excrementa deiectura sunt, premendo, excretionē illorum promovere solet, sic & ventriculū motu suo, ad exturbandas noxas iuvare: eoq; vel leuiore, si vi minore, fortiore, si maiore conatu opus sit.

Si enim intrinsecus tantum à ventriculi lateribus offensa excutienda est, motus ille, qui per singultū fit, sufficit, per quem septum ventriculum concutit, illiusq; facultatē expultricem adiuvat, ut adhærentem materiam quæ illum irritabat, in illius cavum deturbet, reliquisq; contētis permisceat, vnde mox stimulo illo cessante, quo facultas expultrix sollicitabatur, septi motus, qui singultu perficiebatur remittit, vel si materia rursum ventriculo se agglutinet aut ab eo ægrè recedat, singultus repetit, diuq; sæpè perseverat. Irritatur autem hoc modo ventriculus, vel ab acribus, adurentibus, aut alioquin illi aduersis. Ut ab assumptis, pipere, cæpis, catharticis, veneno rancidis: vel ab humoribus illic genitis aut in ipsum effusis, biliosis, malignis, &c.

*Cardialgia, causa Sternutationis.*  
 Fit etiam ut ventriculo offenso, per consensum tunice illius interioris, validiore motu & efflatione, per Sternutationem natura hanc illius molestiam nitatur excutere: quā & hi qui cardialgias aliquas patiuntur, subito quandoque leuantur, per hanc vim materiā in ventriculo ita concussa, ut minus se illi insinuet, eumq; molester.

*Ventriculi, Intestini, notus, causa, Tussis & Sternutationis.*  
 Sed & per eundem consensum, nō solum ventriculi, sed & intestinorum & viscerum illi adiacentium, septo consentiente, illis offensus & irritatis laborantibusq; Tussis sicca nonnunquā affligit: Vt à lumbricis ventriculū, & colon illi vicinum infestantibus, tussicula pueros diuexare solet, nonnunquā & sternutatio, prodit: quā pruritus narium, quo nomine & eas fricant, eiusdem tunicæ consensu, solet præcedere. Et in alijs horum viscerum obstructionibus, septo molestato, ipso pondere, vel molestiā, Tussis sicca ægros offendit.

*Flatus, causa Rustus.*  
 Validiore motu, quā per singultum fieri solet, qui per ructum fit, septum interdum ad excutiendas hasce illius offensas, ventriculum adiuvat, præsertimq; quando flatibus impletur, aut illis offenditur, septo tunc adeo illum pulsante & impellente, ut & flatus & aer simul per os cum crepitu erumpant; qui odorem materiæ illius, à quā flatus gignitur, redolent.

*Modestia ventriculi, causa Vomitionis.*  
 Longè vehementiore adhuc motu septi, thoracisq; musculorū, cum materia solidior in ventriculo contenta, cibis, potus, humores, excrementa, ex eo profundi debent, Vomitio perficitur: quā ventriculus non tantum impellitur, sed & veluti evertitur, ut & materiam illam cum aëre, magno impetu & vociferatione, sursum, per viam alioquin hisce excretionibus minimè destinatam, euomat. Quam vomitionem, eorum quæ in ventriculo continetur, nimia quantitas vel qualitas molesta, aduersa & nauseosa, causare solet. Sicuti hæc, quæ ventriculi hasce excretiones, attinent, in excretionibus & reiectionibus, alijs locis quoque explicabimus.

*Morbi aliqui, causa Singulæ.*  
 Inflammatio ventriculi & septi, alijsq; grauioribus illorū morbi has partes lædentes. Singultum malignū procreant: Vt & subiectarum partium morbi magni, in consensum has partes trahentes, singultum inferre possunt.

*Morbi, causa Rauceus.*  
 Tumores præter naturā, & Ulcera in faucibus, Rauceus in pariunt; vti in varijs eiusmodi morbis, ut leprā, & lue venereā eam fieri cernimus.

*Lingue vitium, causa Balbutis ei cū stridore.*  
 Instrumenti vitium aliud, ab ortu ferè vitium hoc loquelæ causat, in quo geminato RR. cū stridore verba, quæ ex R. componuntur proferunt. Quod quale in lingua sit, non satis patet, nimium ea vel inflexā, vel aliter formatā. Causas verò quare Blesi fiant, in defectu respirationis iam exposuimus.

#### Curatio.

**E**Am singulis generibus, quid prædicendum vel agendū sit, docendo primum, accommodabimus, cum in quibusdam curatione non adeo opus sit, & quorundam cura, alijs in locis potius sit explicanda.

Cita respiratio, si à motu corporis valido procedat, quiete sponte ad moderationem redit;



397

*re-  
dit.* re-  
dit: quod & motu fit priori opposito, ut si montem ascendendo hoc contingat, si sursum descendat. Si ab animi motu vehementi hoc accadat, remittente eo, remittit & hæc cordis agitatio. Si ab externo calore, refrigerio sanatur. In febribus, curâ generali quæ febribus debetur refrigerante & humectante corrigitur, neq; huius symptomatis causâ, priuatim aliquid tentatur.

*Suspi-  
rio.* *rum com-  
sideratio.* Suspiria si frequenter hominem fatigent ob mentis perturbatione, si animus affectus ad se redeat vel mitigetur, ea remittunt. In mente captis & delirantibus, morbi magnitudinem denuntiant. In alijs morbis grauib; constante mente, crebra suspiria, vel pusillanimitatem vel virtutē prostratam, quod nihil boni portendit, significant.

*Oscita-  
tio.* *hominis  
tracta-  
tio.* Oscitatio si non ob defatigationem & somnolentiam fiat, quod naturale est, frequenter repetita, quomodo morbos venturos in quibusdam, & paroxysmi initium in febricitantibus, præfagiat, in pandiculatione, quæ eam plerumque comitatur, iam dictum fuit. Ex imaginatione facilius in pigris, quàm vegetioribus naturis, commouetur.

*Singultus  
curatio.* Singultus in febribus acutis si accadat, diuque perseveret, cum septum tunc grauius afficiatur, convulsiones minatur, mortemq; sæpè præfagit. Ventriculi vitio si fiat magna; illius sit offensa, uti ab helleboro, veneno, aut erodentib; & similibus procedes, aut morbo alioquin graui, ut inflammatione, eadē prædicere & inferre solet. Alijs verò à causis eueniens, faciliè emédatur, aut spontè etiâ cessat.

In curatione, quod causam attinet; huic potissimum summoquendæ, curâ adhibebitur. Ut si ab inflammatione, febris acutâ vel malignâ fiat, hisce accommodabitur: si à ventriculi irritatione, ut illud quod eum molestat, auferatur: ventriculi molestia leniatur. Et in omnibus causis, ut septi motus inordinatus, qui per singultum fit, sistatur. Quæ sequentibus, nunc his illisve, prout causa calida, hoc est acris; biliosa, mordax, maligna: vel frigida, hoc est, pituitosa aut aliàs excrementitia existit, vtendo perficitur.

Vomitus, si causa in ventriculo lateat, conuenientissimus: cum enim per singultum, septum, ventriculum in exturbanda causa,

adiuvet, eamq; ob causam alleuiet, quò validior fuerit ille motus, & septi & thoracis musculorum, qui vomendo fit, per quem ventriculus adeò impellitur, ut vel offensam penitus reiiciat, vel saltè ab ipsis lateribus non nihil separet, eò plus hic adiumenti adferet.

Dantur itaque vomitoria, quæ humorem adhærentem abstergant: & si acris, biliosus, quæ illius effervescentiam simul retundant, hoc modo: R. Syrupi Acetos. simpl. Oxymel. simpl. an. 3. vj. ol. Amygd. dulc. 3. ij. dissoluantur aquâ Nucum vel decocto Raphani: Propinetur.

Reiteranda vomitio si alletiet, & tamen singultus non cesset, etiam fortioribus exhibitis: sicuti in remedijs varia habentur.

Expurgatio per inferiora conuenit, si perseveret humor. Qui & si tenax sit, prius præparari debet incidentibus & abstergentibus: fumendo Iulepos vel vinum Absynthites, quod & in bilioso & pituitoso humore proderit: quæ dum materiam præparant, ut & sponte postea facilius euomatur, vel ut rectius dein deijciatur, efficiunt.

Exhibentur eo nomine purgantia stomachica, ut Hiera & similia in ventriculi noxis explicata. Ut in causa calida: R. fol. Absynthij 3j. Senæ 3. ij. Rhabar. 3j. infundantur in Vino, bulliant parum, colentur: & bibat.

In frigida verò causa: R. Agarici, Turbith, ana 3j. Zingib. 3. β. Salis gemmæ gr. vj. sp. Hieræ 3. ij. Diacrydij 3j. cum Oximellite fiat massa: capiat 3j.

Repeti possunt eiusmodi euacuationes, aliæve, si perseveret malum, aut faciliè redire soleat.

Quæ aliàs singultus compescendi causâ assumuntur, ut humorem vel abstergant, aut sedent, ventriculum offensum leniant, illiq; postea robur addant, sunt sequentia:

In calida causâ, hoc est, acri vrente humore, vel intemperie seu inanitione, ut illi vocant, conducunt sequentia:

Iusculum affatim & sæpè exhibitum. Præsanâ, item Aqua frigida vel calida copiosè bibita. Oleum item Amygd. dulcium.

Vel: R. succi malorum Punicorum 3. β. Aceti 3. ij. Masticis, fol. Menthæ sicc. ana 3. β. misce: Bibat.

Vel

Vel Syrupi alij acidi exhibeantur.

In causâ verò frigida seu pituitosâ: R. Galangæ, Zingib. ana ʒ. ʒ. vini Maluatici ʒ. j. ʒ. aquæ Cinamom. ʒ. ʒ. Bibat. Vel sic: R. radic. Galangæ ʒ. iij. fol. siccorum Absynthij, Menthæ, ana ʒ. ij. Spicæ celt. Maioranæ, semin. Anethi, Carui ana ʒ. j. Cinamom. Gariophyll. ana ʒ. ʒ. macerentur in Vino: & de illo bibat.

Item: R. aquæ Vitæ ʒ. j. infunde Cinamomi, Galangæ ana ʒ. j. passetur sæpè: capiat de hoc liquore.

Vel utatur hoc electuario: R. Acori veri, id est, calam. aromat. & Zingib. conditi ana ʒ. j. confertur. Maioranæ ʒ. ʒ. pulu. Diagalangæ ʒ. j. cum syrupo de Menthâ: fiat electuarium.

Pilulæ sequentes exhibitæ profunt: R. Castorij ʒ. ʒ. Mumie ʒ. j. Mastice ʒ. ʒ. cum Melle scyllitico fiat massula; capiat duabus vicibus.

Sensum ventriculi etiâ obtundimus non nihil, vt sic minùs noxas sentiens, minùs afficiatur. Quod fit dândo Theriacam, Mithridatum, quibus Tormentillæ puluis vtiliter permiscetur: quæ, etiam si à veneno singultus fiat, profunt: vti alia multa antidota. Sed & alia narcotica, si necessitas urgeat, & singultus somnum impediat, dari possunt.

Inijciuntur Clysteres ad reuellendum, vt materia citiùs deorsum vergat. Suppositoria; induntur, vt natura illic sollicitata, huc potius, quàm ad superiora, noxam detrudat.

Naribus adhibetur odor Anethi decocti cum Mastice, quia singultum corrigere creditur.

Sternutatio singultum curat, cum maiore illa vi, quàm quæ in singultu fit, citiùs offensa à ventriculo, vel etiam septo, dissipetur; eoq; nomine hares, ad eam promouendam, irritantur.

Oris ablutiones & gargarismata ex aquâ Frigidâ, singultum compefcunt.

Extrinsecus anteriori & posteriori, interdum vtrique simul, ventriculi regioni, adhibentur varia. Vti focus hic: R. radic. Enulæ ʒ. iij. herbari Menthæ, Absynthij, Spicæ celt. Anethi, Pulegij, Calamenti ana M. j. flor. Lauendulæ, Anthos, Chamomil. ana P. j. semin. Cimini, Carui, Anethi ana ʒ. j. baccarum Lauri, Iuniperi ana ʒ. ʒ. Mastice ʒ. ij. coqua-

tur in Vino: Pro fotu stomachi, anteriore sede.

Item Cineres calidi irrorati in Vino maluatico, & aquæ Vitæ, in sacculo vel vesica positi; Applicentur ventriculo.

Fotus cum spongia in Aceto ros. in causâ calidâ, competit.

Inungatur ventriculus oleis relaxatibus, antè, retroque: mox astringentibus.

Vel Sacculus sequens illi apponatur: R. semin. Carui ʒ. ʒ. semin. Ameos, Anethi ana ʒ. ij. rad. Galangæ, Gariophyll. ana ʒ. j. Menthæ sicc. ʒ. ij. Mastice, Thuris ana ʒ. j. irrorentur Aceto ros. Applicentur.

Aliaq; emplastra conuenientia, vt in causa calida, Cerati Santalini, vnguenti Rosacei ana ʒ. j. Mastice ʒ. ʒ. cort. Citri & carnis Cyton. ana ʒ. j. cum succo Semperuiui & paucâ Lariceâ, fiant emplastra duo; quorum vnum anteriùs, aliud posteriùs stomachi sedi applicetur.

Manus & pedes Aquæ calidæ immergere, in singultu prodest. Vel si omnino in eâ fideant.

Ligaturæ extremitatum iuant.

Cucurbitulæ scapulis & vmbilico primum, postea ventriculi sedi, antè retroque affigendæ.

Spiritus seu respiratio, si aliquandiu continueatur, quia tunc septi motus sistitur, facit vt singultus minùs infestet.

Vel contrario modo, clamore & vociferatione, cursu, respirationem concitare, quia & reliqui thoracis muscoli, tunc vnâ cum septo ventriculum in excutiendâ noxâ iuant, singultum compefcit.

Animi motus subitanei, spiritus reuocando, singultum tollunt. Commouentur autem, Perterrefaciendo, clamore, alijsve: & imprimis aspersione Aquæ frigidæ ex improuiso in faciem.

Alysson manibus gestatum, singultum soluere docet Diosc.

Sternutatio interdum minimè obest, bonumque est, vt vulgus dicere solet signum: in sanis illud quod molestare solebat excutens: aliquando in declinationibus morborum illorum finem præfagiens. Malum quoque interdum indicium, venturam destillationem,

Sternutatio  
curatio.

401

tionem, vel epilepsie paroxysmum, in dispositionis, prænuncians, è quibus tamen nulla impediri debet. Sicuti quando nocet, in male affectis: vt in hæmorrhagia narium, quia eam commouet; in rupturâ, quia intestinum propellit; in oculorum affectibus, quia lachrymas excutit, sanguinemque eò propellit; aliisque dolorosis affectibus, in quibus dolorem exacerbat, compescenda erit. Vti & si adeò immoderata sit & continua, vt capitis dolorem pariat, spiritus dissipando nocumentum adferat.

Corrigitur tunc propinatis iis, quæ capitis excrementa expurgant, si ab illorum in nares influxu fiat, vt in Coryza dicetur.

Exhibitionem decocti Basiliconis, cõferre in sistenda sternutatione, prædicant.

Nares irritatæ demulcentur, Vapore aque tepidæ, si eum admittant. Tingendo vel inungendo eas similiter Lacte, Butyro, Oleo præcipue ol. seminum Cucurbitæ, Papau. Hyosquiami. Item Albumine Oui & Mucilaginis: omnibus tamen recentibus.

Odor narcoticorum vt Opii: item olei Rosacei & de Salicibus, humoribus acrimoniâ reprimendo, sternutationem emendat. Vti verò acrium stimulantiumq; odor eam excitat, & proin vitari debet.

Auribus immittuntur eandem ob causam olea, vt Amygdal. dulc. Anethinum, Chamomil. Rosaceum, Salicum, Cucurbitæ; succus item Basiliconis.

Caput quoque si decocto Basiliconis lauetur, proderit. Et si flores Chamomillæ in puluino substernantur.

Pectus si fomentetur, roborando illius loci mûsculos, sternutationem mitigat, hoc modo: R. flor. Chamomil. p. ij. flor. Meliloti, fol. Ocimi, Furfuris ana p. j. decoctis stuppa indatur, & leuiter expressa tepidè applicentur.

Extremitatum ligaturæ, seu frictions iuant. Item si Aures, Oculi premantur, aut fricentur: Nasus trahatur, Palatum digito fricetur, Caput pectinetur.

Spiritus retentionem vt singultum curare diximus; sic sternutationem emendat: quam rectius præsis naribus oreque constri-

Si perterrescant, citius à sternutatione, vt & à singultu liberabuntur.

Sed & spiritus valida attractio iuuat, quod cum odorando panem facere imporent, odore panis illud fieri vulgus credit.

Somnus eandem sedat.

Tenebræ ad idem profunt, cum luce & splendore facile ad sternutandum, vt dictum, impellantur. Quâ de causâ quibus tela oculi, in illius punctura detracta est, in obscuro loco aliquamdiu collocantur. Quod & in aliis morbis, quibus sternutatio obest, facere, proderit.

Resupinatus, puluinari capiti subiecto, collocetur.

Tussis, si cum grauioribus iungatur affectibus, illic tractanda. Vti ea quæ fit cum dyspnœa in asthma: quæ fit cum reiectione sanguinis, saniei, puris, in hæmopticâ, pleuritide, peripneumoniâ, phthisi. Et quæ partium naturalium vitio accidit, in aliis locis. Quæ verò per se affligit, pro causarum diuersitate, iudicanda & curanda est. Si enim ab illapsis in asperam arteriam fiat, tunc nisi suffocentur, vt in dyspnœâ aliquando accidisse, dictum fuit, illis denuò excussis, sponte postmodum tussis remittit: vel si remanserit quædam faucium irritatio, lenientibus mox dicendis emendatur. Quod si à frigidityte solâ fiat, actû potentiaq; calefacientibus, & simul lenientibus, cum exasperatæ tunc quoq; sint fauces, facile iterum curatur. Si verò à defluxione fiat tenui, acri, falsâ, admodum molesta est tussis, quia valde irritat, atque ob tenuitatem, per aeris impulsû in tussi non propellitur, sed tantum dissipatur. proin nec cessat, donec catharrus remittat, & materia defluxa, crassa, & veluti suppurata seu maturata & cocta fiat; tunc enim minore labore excutitur, sensimq; tussis remittit. Quod si verò à pituitâ crassâ, defluxâ vel congestâ, fiat tussis, ægrè cessat, si ea cõtinuè in locû excretæ de nouo defluat aut congeratur: facilius autem, si hæc non perseuerent.

In curatione autem vtriusq; tussis, ab humoribus eiusmodi excrementitiis profectum causæ antecedentis ratione, humores ne coaceruentur, prohibemus, & fluentes sistimus: coniunctæ verò in pectore latentis

causâ, tussimque mouentis, eam expectorare, vt vocant, studemus; eum si tenuis sit in-  
crassando, si crassus incidendo; vtrunque  
concoquendo, & stupefacientibus sensum  
illius exquisitum, retundere nonnihil solemus:  
quæ & præcipuè hoc symptoma, tussim  
scilicet, corrigunt. Hæc omnia, hoc modo  
exhibitis admotisque perficiuntur.

Exhibentur præparationis nomine ante  
euacuationem humorum, quæ & postmodum  
expectorationis causâ, prodesse possunt,  
si tenuis sit humor & acris, Iulepi, per triduum  
fumendi: ℞. syrup. Iuiubini, Violarum ana  
℥. j. β. mellis Rosacei, syrupi de Papauere ana  
℥. β. aquarum Vngulæ caballinæ, Viol. ana ℥.  
iij. fiat iulepus.

Vel decoctum hoc: ℞. Iuiub. Sebesten  
ana numer. xv. Prunorum dulc. num. x. Hor-  
dei mundi ℥. β. rad. Liquirit. ℥. j. flor. Viol. p.  
ij. Ros. p. j. feminum Myrtillorum ℥. j. fiat deco-  
ctio: adde Sacchari penid. ℥. j. Pro tribus  
vicibus.

Si crassior sit humor frigidus: ℞. syrupi  
de-Liquiritia ℥. j. β. de Hyfopo, Oximell. f. a-  
na ℥. j. aquarum Betonice, Marrubij, Hyfopi,  
ana ℥. iij. fiat Iulep.

Vel decoctum hoc: ℞. rad. Liquirit. ℥. j.  
rad. Enulæ ℥. ij. Passul. enucl. par. xx. Carica-  
rum num. x. Dactylorum num. v. feminum  
Anisi ℥. ij. Fœniculi ℥. j. fol. Hyfopi sicci ℥. ij.  
Capill. Vener. Vngulæ caballinæ ana ℥. j. fiat  
decoctio: adde Mellis ℥. ij. Ter sumenda vel  
quater.

Cathartica, si à defluxione tussis fiat, ex-  
hibentur: cauendo tamen ne nimium illis ir-  
ritando, catharrum augeamus: cuius causâ,  
astringentia quoque permiscuntur.

Si tenuis & calida sit defluxio, hoc modo:  
℞. cort. Myrobal. citrin. ℥. ij. Rhabarbari el.  
℥. iij. Agarici troch. ℥. j. Spicæ gr. xj. infun-  
dantur omnia in Vino albo, exprimantur,  
dissolue in express. el. de Succo ros. ℥. j. syrupi  
Ros. sol. ℥. j. Bibat.

Velumat pilul. Aggregat. ℥. β. Aurearum  
℥. j. cum Vino: fiant pilulæ.

In crassiore & frigidiore humore sic pur-  
gandum: ℞. Agar. ℥. j. Turbith. ℥. β. Spicæ ℥.  
β. Zingib. ℥. j. infundantur in Vino & Mel-  
le, exprimantur, dissolue Diaphænic. ℥. ij.

Mellis rosacei solutui ℥. j. β. Bibat.

Vel per pilulas: ℞. pilul. de Agarico ℥. ij.  
Cocciarum ℥. j. cum Vino, vel aquâ Cinam.  
fiant pilul.

Si corpus maiori purgatione indiget, de-  
tur decoctum tribus vel quatuor matutinis:  
quod ℞. rad. Liquirit. ℥. ij. Ireos ℥. j. Enulæ ℥.  
β. herb. Marrubij, Vngulæ caball. Hyfopi, Be-  
tonicæ ana m. j. feminum Anisi, Fœniculi,  
ana ℥. ij. Passul. num. xx. Ficuum num. x. Da-  
ctylorum num. v. Carthami, Sennæ ana ℥. j. β.  
fiat decoctio in Aqua & paucio Vino, infun-  
de in finē Agarici ℥. iij. Turbith. ℥. ij. expri-  
mantur: adde Mellis ros. 4. j. decoquantur  
adhuc parum; colentur: Bibat.

Per vices alius laxa seruanda; atque suc-  
cessiuè, vt corpus purum sit, euacuandum.

Ex lenientibus confert electuarium se-  
quens: ℞. Passul. maior. ℥. j. β. minorum ℥. j.  
Sebesten numer. xv. Ficuum num. xij. Da-  
ctyl. num. v. Calsiæ è cannâ sumptæ ℥. j. β.  
Tamarindorum ℥. j. macerentur, & bulliant  
in Vino albo: extrahatur pulpa: cui adde  
Mannæ el. ℥. iij. syrupi Viol. & Rosar. sol. ana  
℥. j. bulliant adhuc parum: capiat cochl. j. vel  
ij. ante coenam.

Quando leniter euacuare & catharrum  
simul sistere volumus: ℞. Agarici ℥. j. Masti-  
cis, Thuris añ. ℥. β. cū succo Hyfopi, fiat mas-  
sula: capiat ℥. β. noctu cubitum iturus. Vel lo-  
co horum capiat ℥. j. pilul. Masticinarum.

Aut si validiores esse volueris: ℞. pilul. Af-  
saiaeth, Agar. troch. Rhabarb. elect. ana ℥. j.  
Thuris, Masticis ana ℥. j. Croci ℥. β. cum sy-  
rupo Papau. fiat massula: capiat ℥. β. in introi-  
tulecti.

Sudores mouentia, in perseverantibus de-  
fluxionibus exhibita, corpore purgato, plu-  
rimum profunt.

Alterantia, tum ad sistendum catharrum,  
si ille tussim foueat, emplasticâ & siccante  
potius, quàm astringente vi id præstantia;  
tum ad expectorandum, in crassando si tenuis  
sit humor, incidendo, si crassus, abstergen-  
do, si adhæreat; tum ad vias leniendas, &  
stupefaciendas, diuersis formis, vnum ali-  
quod ex hisce vel plura simul efficietia, qua-  
lia multa, præcipuè quæ materiam tenacem  
incidunt & abstergunt, in asthma expofui-



mus, hæc quoque quæ præsertim in tussi conueniunt, & hæc, & alia, in selectioribus formulis, nunc ostendemus.

Solidiores formæ, in tussi potissimum, ut diutius sic in ore retineri, antequam omnino diffuant, possint, vsurpantur: quod & ad catharro viam præcludendam illic in faucibus, ne in asperam arteriam delabatur, & ut sensim quoque aliquid sputo mixtum, ad asperam arteriam perueniat, illicque operari possit, conuenientissimum existit. Quo nomine multa dantur masticanda, vel in ore retinenda: & formantur trochisci aut orbiculi lupinis similes, lupinares ob id dicti; vel tabulæ formâ siccâ, vel humidâ, sed durâ pilularum instar, ut sub linguâ vel in buccis retineant, unde & pilulas sub linguâ vocât, noctuque cubitum ituris exhibent, quia inter dormiendum rectius retinentur, nec statim quod ab illis liquefit, deglutitur, sed ut dictum, remanet, & sensim capite præsertim in decubitu declinui, in fauces illabitur: licet & interdum illa in buccis retinere possint, ubi loquelâ minimè impediunt, atque inter loquendum, apertè laryngi se facilius insinuant.

Sic Glyzyricæ radix dulcis ore retineri, sæpeque masticari solet: quæ leniendo & abstergendo iuuat, vsitatumque tussis est remedium. Eodèque modo succi illius spissi & nigri, aliunde aduecti, portuncula vsurpari, qui tamen ingratus non nihil si solus sumatur, potest.

Saccharum candum dictum, præsertim quod in syrupo Viol. vel Ros. concrefcit, & vasis adhæret, ita quoque buccis includitur.

Ex vsualibus trochiscis, Becchici Albi communes in vsu sunt, & ad catharrum sistendum, leniendum & expectorandum, conueniunt.

Magis autem catharrum sistunt Rubri dicti, idque propter bolum additum; Vel tales fingi possunt: R. Boli rubri pinguis & puri 3.j. Masticis, Amyli ana 3.ß. Spicæ nardi, gummi Tragach. Arab. ana 9.j. Camphoræ gr. ij. Sacchari penid. & candi ana 3. ij. cum mucilag. sem. Psyllij: fiant orbiculi.

Compositi sunt Nigri appellati; ob succum liquiritiæ additum, quo denigrantur: quibus & plura adduntur expectorantia, stypticaque ad catarrhum sistendum.

His & Flauî addi possunt, grati & efficaces, sic à me parari, soliti: R. Amyli 3. ij. Liquirit. 3. ij. rad. Enulæ, Ireos an. 3.ß. rad. Angelicæ 3.ß. Croci gr. vj. Sacchari candi & penid. ana 3. ij. cum inf. gummi Tragach. fiant trochisci: adde ol. Anisi guttas ij.

Tabulæ vsitatae sunt, Diatragach. frigidum, Diapenidion sine speciebus, Saccharum ros. tabulat. in causa calida: in frigida, Diapireos simpl. & Salomonis, Diatragach. calidum, & similes.

Linctus seu eclegmata, ut cum lambendo sensim descendant, vires in pectore etiam exerant, consueta in tussi sunt: sumendo de iis cum baculo radic. Liquiritiæ.

Vsitata multa sunt: in causa calida præsertim, looch de Psyllio, de Althea, de Mucilaginibus: in aliis, looch Sanû, è Pino, de pulmone Vulpis, de Farfara, de Caulibus, &c.

De nouo quoque varia componi possunt: primum sine pulueribus, quia magis leniunt.

Vinctuosa quædam, quia fauces veluti inungendo admodum leniunt, valde tussim corrigunt, quibus & aliâ vi operantia, simul adduntur: quæ forma infantibus quoque, quia alimentum redolet, & dulcis, non ingrata est.

Bellarium ex Butyro, Maiale dictum, Germanis valde consuetum, vtile, si sensim comedant vel lambant: R. Amyli 3. j. dissoluatur in Lacte, coquatur parum ad pultis formam, adde Butyri recentis 4. j.ß. Sacchari bonam partem: cum refrigeratur, condensatur & firmum habet.

Ex oleo paratur eclegma, tussientibus valde vtile: R. olei Amygdal. dulc. recentissimè expressi 3. j. Sacchari candi 3.ß. mucilag. sem. Psyllij extractæ simul cum aqua Rosar. 3. j.ß. misce: Lambat frequenter.

Ex mucilaginibus hoc admodum lenit: R. mucilag. sem. Lini, Fœnogr. Psyllij, Cytonior. extractæ simul cum aqua Rosar. ad 3. j.ß. Penidiarum, infus. gummi Tragach. factæ in aqua Cinamom. 3.ß. Sacchari candi, penid. ana q. s. fiat linctus.

Ex aluum & fauces simul lenientibus & laxantibus, hoc vtile, si tussientes constipati sint, iuniores præsertim: R. Caseiæ, Mannæ

ana 3.ij. Sacchari penid. candi ana 3.ij. ol. Amygdal. dulc. vel Butyri recentissimi ana q. s. ut fiat looch: De quo multum lambat, si alium liberiores esse vult.

Ex resina hoc valde cōmendatur: R. Laricæ, vel Terebinth. 3.j. vitellum vnum Ovi, Butyri rec. 3.ij. Mellis 3.β. misce, agitentur: Lambat.

Ex decoctis & succis parantur syrapi & rob. quæ eclegmatum loco vsurpantur, ad lambendum vel sensim deglutendum.

Vsitati sunt syrapi, Myrtheus, qui plurimum cōmendatur, Viol. Iuiubinus, in causâ calidâ: in reliquis, Liquiritiæ, Capill. verner. Hyfopi, syrapi.

Rob. ex fructibus decoctis inspissatum, mellis loco sumimus, quod in tenui fluxione nimis eam mouet, nisi corrigatur; cuius loco compositum sic fit: R. rad. Glizyricæ rasa, Siliquarum è granis mundat. ana 3.ij. Passul. mai. & min. Ficum ana 4.j. Prunorum dulc. num. x. Iuiub. Sebesten an. par. xij. coquantur donec fructus omnino dissoluantur, exprimantur optimè & coquantur ad consistentiam rob. vel syrapi: capiat frequenter.

Vel sic ex succis: R. succorum Tussilag. Caulium rub. Portulacæ ana 3.j. suc. Marrubij, Hyfopi, Saluiæ ana 3.β. succi Liquirit. inspiss. 3.ij. Sacchari & Mellis ana 3.ij. coquantur ad spissitudinem syrapi.

Vel ex decocto in materia frigidâ: R. rad. Liquiritiæ, Althææ ana 3.j.β. Enulæ, Ireos, Fœniculi ana 3.j. Angel. 3.ij. Consolidæ 3.β. herbar. Capill. Ven. Hyfopi, Pulegij ana m.j. Marrubij m.β. sem. Anisi 3.j. Fœniculi 3.β. sem. Lini 3.ij. Fœnogr. 3.ij. flor. Violæ. Anthos añ. p.j. Siliquar. repurg. à granis 3.ij. Passul. enucl. 3.ij. Ficum num. xij. Iuiub. Sebesten an. par. x. fiat decoctio, & in colatura adde Mellis & Sacchari ana 4.j. clarif. & aromat. Cinamom. coquantur ad consistentiam syrapi.

Quæ pulueres recipiunt eclegmata, nisi admodum leuigentur, vel leui asperitate aut inæqualitate, tussim commouent: Parantur ex variis.

Ex seminibus & rad. hoc modo: R. sem. Lini, Fœnogr. ana 3.j. feminum Vrticæ, rad. Bryoniæ, Althææ, Ireos, Enulæ ana 3.β. gum-

mi Tragach. 3.j. succi Liquirit. diff. in Oxy-mel. 3.j. misce; fiat instar looch.

Vel ex fructibus nucleatis: R. Amygdal. dulc. Pinear. excortic. añ. 3.j. sem. Cucurb. & Melonum excortic. ana 3.β. Sacchari penid. & candi ana 3.j. Mannæ 3.β. syr. Viol. vel de Liquirit. q. s. fiat looch.

Ex sulphure probatur hoc: R. Sulphuris puri 3.j. rad. Ireos 3.β. Sacchari candi 3.j.β. fiat puluis; Lambat, vel sumat cum Ovo forbili.

Ex compositis vsitatis additis, varia fieri possunt. In causâ calida: R. pulu. elect. Diatragach. frigid. Diapenid. sine speciebus ana 3.j. looch de Psyllio, de Farfara añ. 3.β. Sacchari penid. & candi ana 3.vj. feminis Maluæ, Bombacis ana 3.β. sem. Lini 3.j. rad. Liquiritiæ 3.j.β. cum syrupo de Iuiubis: fiat looch.

In causâ frigidâ: R. pulu. Diaireos simpl. Diatragac. calidi vel Diaireos Salom. ana 3.j. looch Sani & expert. de Præfio ana 3.β. rad. Enulæ, sem. Anisi, Fœniculi ana 3.j. cum syrupo de Iuiubis: fiat eclegma.

Quæ verò, inter assumendum vel deuorantur, vel bibuntur, tussis remedia, etsi minus operentur, eò quod non diutius in faucibus subsistat, quia tamè dum fauces transeunt, illis adhaerentia saluæque permixta, vires suas quoque deponunt, non inutiliter exhibentur.

Ficus & Passulæ, Pruna dulcia comesta, profunt.

Ficus si in aqua Vitæ madefiant, indeque torréantur vel accendantur, & postea comedantur, cōsuetum est vulgi in tussi remediū.

Amygdalæ; Pineæ, Pistacia eduntur vel per se, vel Saccharo obdusa.

Martius panis, & similia multa cōdimentata dulcia, senibus præferim in tussi vtilia. Vti & Bellarium ex butyro superius dictū.

Hordeatum, Auenatum quoque competunt, & Fabarum esus, Dioscor.

Imprimis Hordearum cum lacte Amygdalino, ad catharros sistendos, valde conuenit: cuius præparatio in asthma descripta fuit.

Cuius loco, huius ferculi cochlearia aliquot, sub vesperam cubitum ituri, comedat:

R. far-

R $\mathfrak{x}$ . farinæ Hordei, Amydi ana ſcutell. ſ. albu-  
minum Oui agit. num. ij. coquantur parū  
cum Lacte, adde Sacchar. q. ſ.

Capa elixa ſub cineribus toſta, & cū Bu-  
tyro & Saccharo deuorata. Porrum item in  
uſculis, proſunt.

Raphanus cum multo oleo recēti & pau-  
co Aceto & Melle vilis.

Oua ſorbilia in Butyro recenti frixa, ſed  
leuiſſimè ſalita: quia ſal tuſſim irritat.

Spinachia & Eruca cum Butyro comeſta.

Edulium ex Ouis, Sapa & Butyro. Vel O-  
uis, Vino, Saccharo & Butyro, vtile, quod  
Weinwarm vocant.

Lac potum tepidum, permiscendo Sac-  
charum candum & penidia, valde prodeſt.

Decoctum aliud leniens: R $\mathfrak{x}$ . Paſſul. Sili-  
quarum à granis mund. rad. Liquirit. ana ʒ.  
ij. Iuiub. Sebeſten ana par. x. Hordei mundi  
ʒ. j. decoquantur: colentur & clarificentur;  
Bibat ſæpè hauſtum: poteſt & Saccharum &  
Mel addi.

Aliud expectorans: R $\mathfrak{x}$ . Hyſopi, Pulegij,  
Capill. Ven. Caulium ana m. j. Ficum num.  
x. Mellis q. ſ. decoque, ſpumâ ablata, cole-  
tur: Bibat.

Vel ſic: R $\mathfrak{x}$ . ſem. Lini, Fœnogr. parum con-  
quaſſ. ana ʒ. ij. ſem. Aniſi, Vrticæ añ. ʒ. j. ſem.  
Ocimi ʒ. ſ. rad. Liquir. Altheæ, ana ʒ. ſ. Pule-  
gij, Politrici ana m. j. ſi. Maluæ, Viol. ana p. j.  
Ficum num. x. Daſtyl. num. v. bulliant, ad-  
dendo Mel. cum ſyr. de Liquiritia.

Et hoc laudatur, præſertim ad catharros  
ſiſtendos: R $\mathfrak{x}$ . Thuris, Maſticis ana ʒ. j. radic.  
Liquiritiæ ʒ. j. Paſſul. enucl. par. x. Ficum  
par. v. Iuiub. Sebeſten ana par. vj. decoquan-  
tur, colaturæ adde Sacchari penid. q. ſ. Bibat  
parum, frequenter.

Vina per inſuſionē vel decoctionem; com-  
petunt: ex vſitatis, vinum Enulatum, inſtar  
ſapæ coctum, bibitum.

Vinū in quo Iuniperi baccæ ebullierint,  
bibitū, infantium tuſſim ſanat. Potētius ſit,  
ſi Hyſopum & Serpillum ſimul decoquas.

Item ſi in Vino flores Cucurbitarum ſicci  
coquantur, & colatura bibatur, probatur.

Ex amaris, quæ in decoctis cum dulcibus  
confuſa, ingrarium faciunt medicamentum,  
vina ſic commoda parabuntur: R $\mathfrak{x}$ . rad. Enu-

læ ʒ. ſ. Ireos, Scyllæ præpar. ana ʒ. ij. Marru-  
bij, Cardui bened. Chamædreos, Saluiæ, Pu-  
legij, Veronicæ ana m. j. macerentur vel de-  
coquantur in vino; Bibat ſæpè.

Zingiber pulueriſatum cum Vino calido  
datum ante ſomnū, ad tyſſim hyemis tem-  
pore arcendam, bibere ſolent aliqui: quod ſi  
à frigore tuſſis fiat, non poteſt non prodeſſe,  
& quia inflammat fauces, & per conſenſum  
vis illa ad pulmones perfertur, ſic quoque  
expectorat: Vti & Piper delinctum conferre  
docet Dioſcor.

Aqua ex Vino deſtillata, cum Saccharo  
cando dulcorata, vtiliter ſumitur.

Veronicæ aqua cum Saccharo bibita, tuſ-  
ſim ſanat: cui interdum pulvis ipſius plantæ  
miſcetur.

Oleum Amygdal. dulc. recens ſumptum.

Quæ præter quā quod catharrum ſiſtunt  
& expectorāt, præſertim quia ſtuporē indu-  
cendo, irritationem quæ in tuſſientibus ſit,  
mitigant; valde etiā in pertinaci tuſſi iuuāt.

Suntque vſitata præcipuè, Diacodium, ſi  
cubitum ituri illud lambant, vel ſyrupus de  
Papauere: vel looch de Papauere.

Vel ſic: R $\mathfrak{x}$ . ſyrupi de Papau. vel Diacodij  
ʒ. j. ſyrupi Iuiubini ʒ. j. ſ. mucilag. ſem. Pſyl-  
lij ʒ. ſ. miſce; capiat lambendo.

Valde vtile hoc eſt: R $\mathfrak{x}$ . cap. Papauer. hor-  
tenſium, penè maturorum ʒ. iij. Siliquarum  
repurgat. à granis, Liquirit. ana ʒ. j. decoquā-  
tur, in colatura adde Sacchari penid. & candi  
ana ʒ. iij. decoquatur iterum ad conſisten-  
tiam: Vtatur loco diacodij, noctu lambendo.

Vel: R $\mathfrak{x}$ . looch de Papau. ʒ. j. looch de Pſyl-  
lio ʒ. ſ. pulu. Diatragach. frig. ʒ. j. ſeminis Hy-  
oſquiami ʒ. ſ. Boli ʒ. j. Sacchari penid. ʒ. ſ.  
miſce.

Aquam Papaueris erratici cum Saccharo  
cando noctu bibitam, valde prodeſſe in tuſ-  
ſi, pro ſecreto aliqui ſcripſerunt: illius aquæ  
vncias aliquot exhibentes.

Pilulæ itē Cynogloſſæ vel Styracis, val-  
dè in vſu ſunt. Sumendo vnā aut duas pon-  
dere gr. vj. cū lectum intrat.

Vel ſi frequentius illis vti cōmodum vi-  
debitur, ſic parabuntur: R $\mathfrak{x}$ . Styracis, Myr-  
rhæ, Thuris, Galbani, Spicæ celt. ana ʒ. j.  
Crocij, Opij ana gran. v. excipiantur Melle:

**Nant pilulæ.** Teneat in ore vnam ponderis ʒ.β. & si non iuuat, sequenti vespere sumat ʒ.j.

Induntur naribus Errhina, catharri causâ, quæ illum ne ad pectus fluat, ad nares deriuent. Iniiiciunturq; nonnunquâ clysmata, vt & hæc aliquo pacto reuellant: quorum exempla in catharris traduntur. Masticatoria verò & Gargarismata, pituitam capitis euocantia, quia humorem ad fauces promouent, in tussi competere, nequeunt.

Suffitus ad cerebri exiccationem præscribuntur, quales alibi in destillationibus explicantur: hîc verò in tussi, qui simul ore naribusq; excepti, & ad pulmones inspiratione, & ad cerebrum odoratu attracti, vtrisque exiccâdo prodesse possunt, tales cōueniunt.

Vaporem decocti sequentis calidum ore excipiat patiens: ʔ. Masticis, Thuris ana ʒ. j.β. Salis ʒ. ij. Sulphuris ʒ. j. rad. Acori ʒ. iij. fol. Tussilaginis, Marrubij ana m. j. decoquantur in aqua, Vaporemq; per embotum hauriat.

Fumus ab accensis validiùs operatur, modò non nimîâ copiâ, angustiam pariat aut acrimoniâ tussim moueat, sitque talis: ʔ. fol. Vngulæ caball. sicc. ʒ.β. Schoenanthi, Styrcis ana ʒ. ij. Masticis, Thuris, Myrrhæ ana ʒ. j. feminis Hyofq. ʒ.β. cum Laricæ vel infusione gummi Tragach. in aqua Ros. fiant trochisci. Pro fumo.

Pectori extrinsecus applicantur quædam ad illud dilatandum, vt liberiùs in hoc vehementi motu, moueri queat, & ad illius dolores, quos ex concussione hac in tussi sentit, mulcendos, materiamque in eo contentam concoquendam.

Inungitur hoc modo in causa calida: ʔ. olei Violacei ʒ. j. ol. Amygd. dulc. Butyri lori in aqua Viol. axungie Gallinæ, mucilag. semin. Psyllij extractæ aquâ Tussilaginis ana ʒ.β. misce: Pro linimento.

In causa frigida hoc modo: ʔ. olei Liliorum, Cheirini ana ʒ.β. mucilag. sem. Lini & Fœnigr. ana ʒ.β. rad. Ireos ʒ.β. Croci ʒ. j. Cera parum: fiat linimentum. Reliqua vide in Asthmate.

Vnguentum resumptiuum horum loco quoque sumi potest.

Emplastrum, ex bulbis Liliorum & Cæparum coctis sub prunis, confusisque Butyroq; mixtis, pectori applicatum conuenit.

Epithema item sequens, tepidè adhibitur: ʔ. olei Chamomil. Viol. ana ʒ. j.β. Lactis seu emulsionis Amygdal. factæ cum decoctione Hordei mundi perfectè cocti ʒ. iij, intingantur panni, expressi parum, applicentur.

Præsertim verò pectus diligenter pectoralibus à frigore muniendum: quæ & calefacienda, si à frigore tussis nata sit.

Capiti etiam catharri causâ, pulueres siccantés & caput corroborantes in cucuphâ applicantur, vel etiam capillis insperguntur.

Crura quoq; ad defluxiones diuertendas, abluuntur Aquâ calida: vel in quâ herbæ capirales decoctæ sint, calefacientes. Sed & nonnunquam refrigerantes incoquantur, in tussi calidâ & vigiliis.

Allium, sæuo Vrsino permixtum, plantis pedum inunctum, ad tussim tollendam, certum quorundam prædicatur remedium.

Ligaturæ, Cucurbitulæ, Cauteria, reuulsionis causâ in catharro conueniunt: sicuti hæc omnia, quomodo parari administrariq; debeant, in catharro diximus.

Spiritus retentione, vt i singultum & sterutinationem compescere diximus, sic & tussim mitigare, non quòd sic calor in pectore maior excitetur, sed ob causam in singultu explicatam.

Aër calidus tussientibus conuenit, præsertim si à frigore tussis nata sit, tunc illius sola inspiratio eam sanare potest.

Dein & in balneo sicco, quia sudores mouet, qui corpore tamen prius purgato, vtilis sunt, conuenit.

Caueant autem sibi à frigidâ aëris constitutione, flante præsertim Boreâ, ab humidâ item, vt aëre nocturno & cum fiat Auster: sed & Aquilo stringit: quæ nocent, si à defluxionibus malum fiat; easque promouent radij solares, si caput iis petatur.

Decubitus supinus, quia per illum humor in fauces citiùs descendit, obest, nisi propter becchica assumpta; vt ea simul eò ferantur, illum concedamus.

Ieiunare aliquando, vel cibo parciùs vt: exercere cōuenienter corpus: Somnus moderatus,



deratus, ad prouentum humorum impediendum, conueniunt.

*Raucedi* *in cur.* Raucedo, si à tumore aliquo aut ulcere fiat faucium, illis cura sicuti suis locis ostendimus, adhibebitur. Cum enim integrè sanata sunt, raucedo cessat: si verò ea non curentur, aut ita curentur, ut remaneat nihilominus inæqualitas, raucedo relinquitur incurabilis: sicuti ex leprâ, lue venereâ aliisq; faucium affectibus, raucos totâ vitâ permansisse multos vidimus. Si verò à frigiditate & siccitate accidat, calore, humiditate & lubricitate loci sponte cessat, aut vsu illorum emendatur. Quod si ab humoris defluxu in fauces eueniat, excreatione factâ, cessat: si repetat defluxio sæpè, aut humor pertinaciter adhaereat, eadem remedia, quæ in tussi cathari nomine conuenire diximus, hîc quoq; conuenient: & ex illis quæ sumuntur expectorantibus, hîc potissimum abstergentia lenientiaque conuenient: qualia multa illic exposita fuerunt: quibus & sequentia selectiora in raucedine curanda addenda.

Myrrha electa ore contenta, dum sponte dissoluatur, magnum adiuumentum in raucedine adfert.

Tragacanthæ gummi mucago, ex infusione Viol. vel Rosarum, odoris causâ, aqua, valde quoque prodest.

Mucago feminis Psyllij & Cytoniorum, cum Saccharo cando & penid. vel Melle, vel syrup. Violarum permixta, & linctâ.

Lac tepidum, in quo albumen Oui conquassatum, dissolutum est, vel Mucagines, gargarizatum conuenit.

Ouum crudum comestum, vulgus pro experimento habet: Sorbile cum Butyro esitare vel forbere non minus efficax, & minus nauseosum, cum nihil quod crudum est, præter Lac ab animalibus desumptum, citra nauseam, comedamus.

Cochleæ costæ comestæ, ob lentorè fortè, sed ægrè sine sale, sicuti & oua comeduntur.

Porrum, Brassica, Attriplex cocta & cum Butyro sumpta.

Portulaca cruda esitata, mirè asperitates lenit, non solum denarium, vnde hæmodias sanat, sed & faucium: cocta etiam prodest.

Cubebæ cum Passulis contritæ & masticatæ,

raucedinè sanât, præsertim si à frigore fuerit.

Succus Liquiritiæ ore retentus iuuat.

Succus Cauliû cum Melle coctus & linctus.

Oleum amygd. dulc. Butyrum recès sumpta.

Aquam Phyllitidis laudat Matthiolus.

Coposita ex his vtilia sunt medicamenta: R. Myrrhæ, Thuris, Sacchari candi ana par. æqu. cum mucagine gummi Tragacanthi: fiant trochisci lupinares; teneat in ore.

Vel sic: R. resinæ Laricæ 3. ij. dissoluatur in vitello vnius Oui minoris (nā magna nūc gallinarum inueniuntur) addendo Ireos, Myrrhæ ana 3. β. Cubeb. 3. j. farinæ Orobi & Amydi ana 3. ij. Sacchari penid. 3. β. Mellis q. s. fiat looch.

Pilulas de Benzoino, Rondel. pilulas Auicenna 5. Canone Helidæus, ore retentas, mirè commendant.

Syrupo hoc, decénio raucedine laborâtes iuuenulas se sanasse, Lobelus testatur, lōgo & continuo vsu: R. Erysimi totius recentis M. j. rad. Enulæ, Tussilaginis, recentiû, Glycyrrhiæ ana 3. ij. Borrag. Cichorij, Capill. Ven. ana M. j. β. flor. Cord. Anthos, Stœchados vel Betonica ana M. β. femin. Anisi 3. vj. Passul. mundat. 3. ij. fiat decoctio in decocto Hordei, Hydromelite, addito succi Irionis ad 3. vj. & in col. tñ. ij. vel iij. adde Sacchari q. s. coquantur ad formam syrupi.

Huius loco & hic fieri potest. R. rad. Liquiritiæ 3. ij. Althææ rec. 3. iij. Ireos, Galangæ ana 3. β. Erysimi M. iij. Tussilaginis, Caulium, Attriplicis, Maluæ, Portulacæ, recent. ana M. j. fl. Maluæ, Violarum ana P. j. seminum Cucurb. & Melonum ana 3. β. sem. Bombacis 3. j. Hordei mund. Fabarum ana P. j. Passul. enucl. part. xx. Cubeb. 3. j. fiat decoctio, coletur, & cum Melle vel Saccharo fiat syrupus.

Gargarismus hic confert: R. rad. Liquirit. Althææ ana 3. ij. Maluæ cum toto M. j. Hordei integri, Fabarum, Orobi, conquassat. ana P. j. Passul. enucl. par. xx. Ficum, Iu. iub. Sebesten ana par. vj. Myrrhæ, Thuris ana 3. iij. fiat decoctio, adde Sacchari & Mellis q. s. pro gargaris.

Eructatio, Vomitus, Emunctio, Expuitio, Screatus, si præternaturaliter infestent, quia in illis excretio potius nimia, quam praua respiratio, incomodat, in excretis quomodo cu-

Altorum  
generum  
Depre-  
uata re-  
spiratio-  
nis curat.

do curanda, explicabitur: vbi & rectius quoque describentur, quæ hîc ordinis duntaxat gratiâ, vt collatione cum cæteris factâ, melius illorum causæ, explicarêtur, adiecimus.

Vociferatio, Anhelatio, Exsufflatio, per se vix incommodant: proin, vt nec in causis, sic nec in curatione hæc vltcrius persequemur: quorum in generibus, vt nihil omitemus, quod à respiratione naturali alienû est, obiter meminimus.

## DE TRANSITVS PER GVLAM DEFECTV.

### CAPVT VI.

#### Genera.



**T**RANSITVM per gulam seu œsophagû deficere dicimus, quando res per hanc viam deorsum, quod semper: vel sursum, quod interdum necesse est, propellere nequeunt.

*Transglutitiendi difficultas.*

Deorsum cibum potumque ex faucibus ad ventriculum deprimere, seu vt vocât deglutire, interdum omnino non, aliàs difficulter possunt, diciturq; Transglutitiendi difficultas; sed maius impedimentum adferens, quodd hæc naturalis vsitataque sit. Tuncque aliquid vel in faucibus apparet: aut dolor illis in locis sentitur. Aliàs verò, nullo horum se manifestante, nihilominus deglutiendi defectus adest, paralyfim vel spasnum comitatus, vel horum species, quem mox etiâ alij sequuntur: sicuti in motus impotentiâ dictum fuit.

Sursum è ventriculo per eundem ductû, res expellere aliquando non, vel cum labore, possunt. Quod etsi non aded sit naturale, aut vsitatum, tamen cum quandoque necessarium sit, si tunc non fieri possit, quoque incommodat. Fitque duplici modo, quando eructare aut vomere, naturâ impellente, non possunt.

*Eructandi impedimentum, Sordidum Germ.*

Eructandi conatus aliquando infestat, & cum non succedit, molestiam parit. In eo potissimum affectu quem Germani Sordidum vocant: in quo ad eructandum aliquis im-

pellitur, sed tamen cum sensu viæ quasi in medio interclusæ & ardoris cuiusdam, quæ impediunt, quò minus ructus possit erumpere: sicut in cardialgia explicabitur.

Vomendi conatus, Nausea dicitur ea, in qua non certa quædam fastidiunt, quâ quoque nauseam vocant, sed in qua se iam ad ad vomendum sentiunt impelli, ventriculûque conturbari, pituitamque tenuem ad os vsque propelli, neque tamen cibos aliudve ventriculum grauans possunt effundere. Qui defectus vomendi, in quo vomitio vrget, sed non succedit, illis quibus cõsuetum est certo tẽpore vomere, eo nomine incommodat, quodd veluti hæc ipsorum naturalis exceptio suppressa est: aliis quoq; in quibus per vomitionem natura aliquid expellere vult, sed non potest, eâ ipsam ob causam nocet, & correptione, vti dicitur, opus habet.

*Vomendi difficultas.*

#### Causa.

**C**AUSA horum motuum, qui in transitu per gulam fiunt, defectuum, vel in partem vim mouendi communicante: vel in instrumento, œsophago, stomacho aut ventriculo, consistit.

Nervorum sextæ & septimę coniugationis ramorum, ad faucium musculos (quos primû Fallop. deglutitionem perficere, nõ villos œsophagi ostendit) pertingentiû causâ, si illi resoluantur vel conuellantur, deglutitionis difficultatem sequi, & ab iisdẽ morbis à quibus & reliquarum partium paralyfes & conuulsiones fiunt, proficisci, atque si in vulneratis hoc symptoma eueniat, spasnum ad stomachum, appellari à chirurgis, in motus impotentiâ declaratum fuit: estque paralyseos tunc vel spasmi species, illic explicata. In quibus deglutiendi impotentis, hoc accidere interdum experientiâ comperi, præsertim si à paralyfi fiat, quod liquida difficilius sorbere & bibere, quàm res solidiores deglutire possunt. Sed & eorundem nervorum affectionum causâ, in resolutionibus quibusdam, vt difficulter vocem claram edere & tussire posse diximus; ita & longè minus vomere, naturâ licet impellente, & non nisi cum periculo suffocationis, possunt.

*Nervorum affectus, causa Transglutitiendi difficultatem.*

417

Oesophagi causâ, transitus ille præclusus, & præsertim deglutitio interdum impedita est. Quod & relaxatis vel resolutis ipsius villis, vti de ipsius musculis diximus accidere, scripserunt: verum, cum oesophagus non sponte proprijs villis, sed faucium musculis moueatur, vti iam ostensum, hoc minimè concedere possumus. Causæ autem deglutitionem impediennes sunt; si ille nimium excicatus, commodè relaxari non possit, & cibos transmittere; vti in febribus ardentissimis nonnunquam euenit: Vel si obstructus sit à deglutitijs, illicq; vel ob magnitudinem, vel tenacitatem, vel asperitatem, aut acutiem retentis, aut alioquin se affigentibus, vti ab hirudinibus accidisse, scribit Rhazis; à quibus inhærentibus, si magna sint, vel dura, vt nuclei, ossa, quia asperæ arteriæ latus membranofum, oesophago cõtinuatum premunt, eamque sic ardeant, respiratio vnà cum deglutitione impeditur. Quemadmodum & si ab externis iniurijs, vinculis aut luxatâ vertebrâ hoc fiat, vterque ductus interclusus vel angustatus idem patiuntur, & cum morte, si absceantur, euanescent. Intrinsecus quoq; tumore colli ab inflammatione aut defluxione angustatus, cibum ægrè & cum dolore transmittit. Vt & quando excoriatus aut erofus, præ dolore assumptorum transitum non patitur: quod ab acerbis assumptis vel vaporibus, vel humoribus interdum illi accidit. Ex enarratis causis, aliquæ quoque vomitioni, si illa faciendâ esset, impedimentum adferrent, non tamen omnes, cum vomitio maiori impetu motu naturali & voluntario facta, sibi viam citius faciat, quàm deglutitio, quæ ex solo nostro arbitrio dependet. Præter quos oesophagi morbos, si ille in angustiore loco positus, admodum dilatari nequeat, vomitioni præsertim impedimentum adferre, & deglutitioni etiam in crassioribus rebus deglutendis obstare, non tantum probabili ratione, sed ex eo etiam colligimus, quod eos qui angusto sunt pectore, colloq; breui ad vomitionem ineptos esse, communis sit opinio: quam constitutionem thoracis & colli, hac ratione, vti iam dictum, id efficere potius quàm aliâ, censemus.

Ventriculi occasione, vomitio præcipuè, Colli an- ægrè succedit. Si ita constitutus sit, vt non nimis laxus, nec dextrum illius orificium seu stomachus nimis amplus & patens existat: quod cum naturale sit in bene formato ventriculo, idcirco qui cum sani sunt, ventriculum rectè constitutum habent, & benè concoquunt, etsi postea ægrotantes, ab assumptis vel illic collectis excrementis ad vomitum concitentur, vix tamen, & non sine magno labore vomunt: Vti è contra hi, qui multâ crapulâ stomachum & ventriculum plus quàm par erat, dilatârunt, faciliè etiam ex leui irritatione vomunt. Sicuti & illi, qui vsu frequenti vel ob ebrietatem, vel cruditates sæpè vomere consueuerunt, ventriculumque sic ampliârunt, sibi ipsis vomitionem facilem, & consuetam excretionem reddiderunt.

Humor acris & calidus, in ventriculo veluti bulliens, sicuti in cardialgijs ostendimus, & è bullis, quas excitat, disruptis, flatum vel vaporem flammæ instar ardentem, sursum ad os ventriculi demandans, conatum eructandi illum, qui in affectu Sordidit sentitur, cum sensu ardoris parit: sed quia: flatus antequam per oesophagum irrumpat, dispergitur, ructum nullum edere potest.

Si quoque pertinaciùs humor in ventriculo hæreat, etsi ad vomitionem sollicitet, tamen cum egeri non possit, vomitus fieri non potest, vel si fit, imperfectus est, cum per illû assumpta tantum, cibis & potus egerantur. Licet frequentius aliàs hoc fiat, vt humores pituitosi euomantur, cibisque interea in ventriculo remaneat, etsi iam pridem sumptus fuerit, naturâ veluti vitiosum ab vtili segregante atque rejiciente: sicuti in vomitu inmodico hæc explicabuntur.

## Curatio.

**Q**uid agendum in difficultate transglutiendi, vomendi, & eructandi, vt constet, de singulis speciatim agemus.

Si itaque, ob neruorum affectum, resolutis musculis faucium, difficultas transglutiendi, in paralyfi generaliore, accadat, eò grauiorem paralyfim esse, quod non tantum

paralyfi  
est spe-  
cies, cu-  
ra.

paria dorsaliū neruorum, affecta sint, sed & sexta septimaq; neruorum coniugatio, significat. Nisi particulari tantum huius partis hæc sit paralyfis, & vicinarum illi partium, vt linguæ, quæ tamen est satis pertinax, generalioremq; sæpè minatur.

Cura autem illi non alia, quàm quæ in paralyfi explicata fuit, debetur, pro ratione causæ procedendo; quæ si sit ab humoris aquei defluxu ad neruos, expurgando, reuellendo, absumendo humorem, & partem confirmando.

Inter reliqua, Sinapi ore contentum, varijs modis, vt in caput purgijs in paralyfi explicatum, huic affectui sanando, conuenit.

Gargarismata item, quia faucium attingunt musculos, qui hîc affecti sunt, admodum profunt: quale illud esse potest: R. radic. Acori veri ʒ. β. herbar. Saluiæ, Rosmarini ana M. j. fl. Lauandulæ P. j. nucum cupressi numero iiii. nucis Mosch. numero ij. Gariophyl. ʒ. j. coquantur in Aqua & parte quar. Vini, & in colaturæ Tb. j. β. dissolue, Mellis anthos. & squillit. ana ʒ. ij. Aceti squill. ʒ. β. pro Gargarismate.

Vel sic: R. Diamoron, Oxytel. scyll. ana ʒ. j. β. aquæ Saluiæ & Lauandulæ ana ʒ. iiii. fiat gargaris.

Inunctiones externæ in lateribus colli faciendæ, quales multæ in paralyfi explicatæ sunt: quibus & hæc idonea adiungi potest: R. olei Masticini ʒ. j. ol. Nardini ʒ. β. ol. Spicæ gutt. v. Ladani, Thuris, & Styracis ana ʒ. β. Cera parum: fiat linimentum.

Trans-  
glutien-  
di diffi-  
cultas  
quæ spâ-  
smi est  
species,  
cura.

Quod si verò difficultas transglutienti quæ à neruorum affectu procedit, spasmi sit species, eandem prædictionem & curationem cum cæteris spasmi speciebus, vt illic dictum, requirit. Topica quoq; illis locis, vt in paralyfi dictum, accommodanda. Imprimis verò periculosum & lethale, si à vulnere fiat, quemadmodum hæc omnia in spasmo explicata sunt.

Trans-  
glutien-  
di diffi-  
cultas  
ab  
exicca-  
tione  
oesophagi,  
cura.

Si verò ab exiccatione oesophagi, causâ intensi caloris in febribus, hoc fiat, cura potissima in febris incendio resingendo adhibetur: eoque nomine, vti varia tentantur, sic & imprimis epithemata hepatis adhibentur: & topica in gargarismatibus, lin-

ctibus, ea ipsa quæ in raucedine, ab exasperatis faucibus procedente exposita fuerunt, hîc etiam conueniunt. Exhibenda simul, quæ & nitantur deglutire, vt Cibus humidus, vinctuosos, brodia, Hordeatum, emulsionem Amygdalarum sem. Cucurb. Melonum. Atque inungendum totum collum vel fouendum sequenti: quod R. Lactis recentissimi partem j. olei Violacei, succi Lactucæ ana partem ij. mucilaginis seminis Psyllij, factæ cum aquâ Viol. par. j. misce.

Si ab illapsis in oesophagum, via hæc ob-  
turata, deglutitionem impediat, sintq; cor-  
pora crassiora, aut tenacia, aut alioquin quæ  
facile adhærent, vt membranæ, illic subsistē-  
tia, sursum deorsumve propellere studebi-  
mus, varijs artibus.

Trans-  
glutien-  
di diffi-  
cultas  
ab illa  
psis in  
oesoph-  
ago, co-  
ra.

Potu aquæ vel alterius liquoris assatim bibito, magno haustu, sæpè res propelluntur: vel si adhæserint, abluuntur.

Panis buccellâ, aut alio solidiore deglutito, res hæc plerumq; cedunt.

Sternutatione factâ quoc; excutiuntur: Maioreq; impetu per vomitionem: faciliusque si multam aquam & oleum prius haurire possint: & vt vult Rhazis, ægri ceruicem interim concutiamus.

Instrumentis ad id accommodis, obstaculum hoc auferemus, si pateat & apprehendi possit, illudq; forcipe idoneâ extrahemus.

Vel alio instrumento flexili, quod gula ductui, se accommodare possit, intruso, illud deorsum deturbabimus. Bacillo crassiore betulæ ex scopa, quæ semper ad manum inuenitur, illud commode præstabitur, cum citra fracturam facile flectatur, si recens sit; vel si aridus, in lixiuio feruenti prius emollitus non nihil fuerit, atque oleo inunctus. Plumbeo ad hoc vtitur Rhazis. Quod & cereâ candellâ, in oleum prius intinctâ commodissime efficitur.

Deglutiendo spongiolam paruam, siccâ, filo alligatam, posteaque mox aquam superbibendo, vt intumescat, eamq; gula hac arte euelli posse, docent: quod in acutis vel tenuibus, oesophagum molestantibus potius, quàm deglutitione penitus impredientibus, cum nisi spongia deglutiatur, nullus sequatur eff-



tur effectus, locum habebit. Fortè & globulus precarius, filo transmissio alligatus, cum facilius deglutitur, commodius illud, vel vnâ vel repetitis vicibus deglutitus extractusq; præstabit.

Ad lubricam viam reddendam, vt facilius cedant, Oleum, Butyrum bibendum vel sumendum damus. Et vt dilatetur, collum inungimus.

Hirudo in fauces irrepens, si œsophago adhæserit, cum sigillatim illius curam Rhasis doceat (etsi id rarum, vti verò frequens est, lumbricos per œsophagum ad os & nares vsq; serpere) sic nos instituemus. Euellitur forcipe, si apprehendi possit, quod, caudâ adhuc illius prominente, fieri potest. Vel sursum prouocamus calidâ aquâ bibitâ, & postea frigidâ in ore retentâ. Aut deorsum, vti & reliquos vermes pellimus, exhibitione eorum, quæ illis ingrata sunt: vt si Acetum bibant: Si salsa edant; Cæpas, Allia, cruda comedant; Sinapi bellarium lambât; aliaq; multa, quæ lumbricis aduersa esse, suo loco explicabimus.

*Transglutien- di diffi- cultati à tumore in faucibus, cura.*  
A tumore, ab inflammatione, aut defluatione, progresso, obstructus intrinsecus aut angustatus aliâ ratione œsophagus; aut alioquin ab illis vel assumptis vel acutis illapsis, vti dictum, læsus, si deglutitionem difficilem & cum dolore pariat, cura in doloribus colli explicabitur.

*Transglutien- di diffi- cultati ab œsophagi compressione, cura.*  
Si extrinsecis iniurijs aut luxatâ vertebrâ prematur, cum respirationi, maiori periculo, obsit, illic quid agendum sit, expositum fuit.

*Vomitio in diffi- cili, cura.*  
Vomitio, si utilis sit ad præcautionem morborum, vt aliquando fiat; vel semel in mense, quod bonum esse Auicenna censuit, vel etiam frequentius: vel si alioquin necessaria in morbis ad excernenda ea quæ ventriculum molestant, si ægrè procedat, ob constitutionem talem quæ ad vomendum inepta est, ob colli breuitatem & pectoris, atque orificij ventriculi angustiam, eam per vim sollicitare, plurimum sæpe incommodat. Quod si tamen etiam in naturis hisce ægrè vomentibus, sit summè necessaria: vel his causis non obstantibus, alioquin non inuitet: aut etsi conatus adsit, non tamen succedat: quâ ratione vomitum prouocare de-

beamus, fauces & gulam irritando, ventriculumq; implendo, & vt vocant, subuertendo, passim hinc inde in affectibus, in quibus vomitio requiritur, docetur. Affectum etiam illum, in quo eructatio imperfecta cum ardore ventriculi sit, in cardialgijs explicabimus.

*Eructatio de diffi- cultate in cura.*



## DE DEIECTIONIS DEFECTV.

### CAPVT VII.

#### Genera.



**P**er defectus excretionis illius naturalis excrementorum, quæ per aluum seu podicem fieri solet, idoneo tempore: & dicitur Constipatio seu Astrictio alui. In quo, vel nihil omnino egerere possunt, ventrisq; minimoda est suppressio; Vel rariùs, vel minus quàm par erat; vel magno cognatu & labore dejiciunt.

*Alui constipatio.*

Hoc sanis alioquin interdum euenit quibusdam, quorum natura talis est, vt raro deiciant: Vel ex mutatione ætatis, secundum Hippoc. contingit, vt quibus iuuenibus aluus humecta est, senescentibus exiccetur, & viceuersâ. Alijs ex malâ consuetudine, vel viuendi ratione, sicuti declarabitur, accidit, morborumq; sæpe causa est.

In varijs morbis hoc symptoma occurrit. Tum ventris inferioris, cû cardialgijs, cû colicis cruciatibus, iætero, hernijs, alijsq; accidentibus, copulatû. Tum in capitis affectibus, cum cephalalgia, vertigine cæterisq; cõiunctum. Et in febribus, hoc symptoma familiare admodum est. Vti & in alijs morbis adeo consuetum, vt primum ferè sit in morborum initijs, & vltimum in conualescentibus, de quo ægri conqueruntur symptoma.

#### Causæ.

**I**ntestina, cum excremeta alui contineant, eaq; transmittant, in omni constipatione affici necesse est; idq; vel primario affectu, cû n angustantur vel obstruuntur; aut secundario, si stimulum amittant.

Angustatis intestinis adeò, vt transitus excrementorum impeditus non nihil sit, ea retineri, aluumq; minimè respondere contingit: quod ab illorum & astrictione & conuolutione accidit.

*Exiccatio intestini, nonnihil causa alui constipationis.* Astringi dicimus, quando exiccata, corrugata, lubricitatem, quæ ad faciliorem transitum necessaria est, amittunt: aut constricta angustiora quàm par erat, euadunt. Sic ab assumptis siccantibus, astringentibus, acerbis & auferis præsertim, sicuti œsophagum constringi videmus, & fauces corrugari, ita si immoderatiùs, præcipuè si ventriculus ieiunus est, assumantur, intestina, illorumq; ductus constringendo, alui sistunt. Quod & ex longa inedia & nimia intestinorum euacuatione, vt illa veluti exiccata & collapsa & constricta, idem patiantur, proficisci potest. A calore intestina exiccante, idem fieri potest, quod tamen fæces potius exiccando accidere, mox ostendemus. A tumore aliquo in mesenterio, vti voluerunt, intestina premi ac occludi posse, aliqui docent, quod tamen vix fieri, ex eo colligimus, quod nec vteri moles magna in gravidis, nisi aliud accedat, illa obturando, constipationem pariat.

*Conuolutio intestini, nonnihil causa constipationis alui.* Conuoluuntur interdum adeò intestina tenuia, in affectu, qui Conuolutus ob id dicitur, vt contorta & occlusa, fæces descendere non sinant: vnde illic retenta collectaq; per superiora tandem euomunt: idque vel cum dolore, Ileodictio, inflammatis tunc intestinis; vel etiam sine inflammatione adeò repletis & distentis ab excrementis, intestinis, vt illa contorqueant: sicuti in doloribus explicabitur. Sed frequentius hoc intestinis, ex abdominis cavitatis, rupto peritoneo, in scrotum delapsis, in hernijs, ob situm intestinorum peruersum illis conuolutis vel contortis, solet contingere.

*Obstructio intestini, nonnihil causa constipationis alui.* Obstructa intestina à facibus proprijs quæ continent, constipationi frequenter occasionem præbent, non solum ob copiam illorum, sicuti modò dictum, sed quando sicca & dura, vel crassa & tenacia, sciuala dicta, eaq; præsertim magna vel copiosa, in intestinis subsistunt, infarcta que non solum non procedunt, sed & ea quæ sequuntur excre-

menta, retinent. Quod potissimum circa orificium, quo se tenuia intestina in crassa aperiant, ob loci angustiam solet contingere, vbi ea hæsisse diu, lethalemque constipationem causasse sectio quibusdam patefecit. Sæpè verò hoc in colo intestino, circa magnam illius anfractum, quo antequam rectum fit, flectitur, accidit, retentis illic sciualis, & spiras illius loci opplentibus; & cum dolore colico aluum supprimentibus. Sed & in podice ipso eiusmodi sciuala nonnunquam subsistunt; & vix dum maximo conatu exprimuntur, quæ quandoque certâ arte vt reddantur, promouere necesse est.

Indurantur autem & crassescunt eiusmodi fæces; si materia ex qua generantur, cibus nimirum, solidior sicciorque sit, vnde similia excrementa progignuntur: sicuti in canibus ossa rodentibus, videmus accidere. Præsertimq; si ob potus liquidorumq; parciolem vsu, minus diluta sint. Idem fit, si exiccantur siccantium admodum incibus continuo vsu, vel etiam calefacientium. Aut calore partium vicinarum & hepatis præsertim, vt volunt, in naturis calidioribus; in quib. si excrementa non indies reddantur, sed ob causas aliquas, & præsertim longam sessionem in conuentibus, in equo, aut decubitu longiorem retineatur (cum facilius dum corpus mouetur erectumque est, quàm cum quiescit, procedant) calore interiore ea exiccante indurescunt. Hincque fit, vt senatores, equites, & senes otiosi, de constipatione maxime conquerantur: quod vti calore corporis moderato adhuc sic euenire potest; ita in morbis calidis harum partium, vel etiam totius corporis in febribus, hæc fæcum exiccatio, à calore illo vehementiore citius procedit, constipationemque parit. Ob inediam quoq; non tantum intestina, vt dictum, sed & fæces, si quæ relictæ sunt, exiccari indurari que possunt: neque tantum dum eam patiuntur ægri, sed & post eam, cibum rursus sumentes, præsertimq; si tunc admodum famelici sint. Idq; quod naturâ exhaustâ, vt defectum hunc resarciat, quicquid ferè chyli & humoris in cibo sumpto consistit, per venas meseraicas exsurgit, excrementaq; sicca duraque tantum

tantum relinquit: quò sit vt post acutos morbos conualescentes, auidèq; comedentes, de constipatione adeò conquerantur; & qui benè nutriuntur alium siccam potius, quàm humidam habeant. Ab alijs quàm sœcibus, causis, intestina obturari adeò vix possunt. Nam quæ deglutiuntur dura corpora, etsi magna sint, si esophagum pertransire potuerunt, etiam intestina facile peruadunt, nisi in ipso pœdice aliquando subsistant: & quod de calculo intestinorum scribitur, rarum est, vixq; tantus qui intestina obstruat, esse potest, nisi scialum, vti accidisse scribunt, in calculum conuertatur.

Stimulum si intestina amittant, cum facultas ipsorum expultrix tunc minimè sollicitetur ad excretionem, eaq; quiescente, voluntas nostra minimè admonita, quoq; quiescat, deiectionis etiam nulla sequitur. Hoc, si intestina nihil vel obtuse sentiant, quia ad deiectionem non excitantur, accidit: idq; nervorum sextæ vel septimæ coniugationis, à quibus intestina nervos accipiunt, vitio: quibus vnà cum cæteris ferè nervis, in generali torpore & obstupescentiâ, affectis, cum reliquis functionum læsionibus, etiam deiectionis non procedit: quod & speciatim hic potest accidere, vt ob sensum stupidiorem intestinorum, rariùs deiciant. Idem excrementorum causâ potest accidere; si, cum nulla vel pauca admodum colliguntur, quantitate suâ intestina ad ea exturbanda minimè excitât: ob quam causam, qui à cibis diu abstinent, aut parcius illis vtuntur, sicuti in morbis plethoricis ob appetentiam deiectionem euenit, nihil vel raro sponte egerunt: & quibus intestina à nimij purgationibus inanita admodum sunt, non prius alium reddunt, donec illa sœcibus denudò impleta sint, quod dierum aliquot spacio interdum vix dum perficitur. In excrementis quoque ventris, si acrimonia illa desit, quâ naturaliter etiam intestina ad conatum illum deijciendi irritare debent, quàm à bile hancce ob causam, intestinis infusam, excrementisq; permixtam accipiunt, cum, nisi alijs de causis hoc fiat, natura tunc non moueatur, constipatio quoq; sequitur: sicuti in obstructionibus, bile non ad intestina, sed aliò delatâ, in ictericis alijsq;

similibus morbis constipatio etiam abest: atque in excrementis non coloratis, sed subcineritijs bilis hic defectus cernitur.

### Curatio.

**C**onstipatio alui non omnis, correctio-  
ne opus habet; vti ea in quâ rariùs deijciunt, quia hoc illis naturale & consuetum est; vel quia moderata & temperata victus ratione vtuntur, cum paucitatem excrementorum significet, corpusq; benè nutriti: quod & in conualescentibus aut alioquin in ediam passis, si postea minus ad excretionem aliquamdiu sollicitentur, corpora illorum ob suctionis vehementiam egregiè refici denotat: nisi ob diu intermissam vsum omnis cibi, intestinis reficcatis & collapsis, omnimoda sequatur alui suppressio: quæ cum periculosa, curatione opus habet, & sæpè ægrè perficitur. Quod si verò ab assumptis cibis siccantibus, astringentibus, calidioribus, procedat constipatio, abstinentiâ horum, & vsum contrariorum, emendatur. A calore nostro exiccata excrementa, quia diutius ob sessionem, aut otium retenta fuerunt, si laboriosam aliquomodo deiectionem pariant, neque hæc, cum diuturna minimè sit, curâ maiore opus habet. Vti & si ob temperaturam & constitutionem calidiorem, id eueniat. In morbis verò si constipatio quoque illorum sit symptoma, ratione caloris in febribus; aut intestinorum obstructionum & conuolutionum, in conuululo & hernijs, (vbi si excrementa per os reddantur, mortale signum est) aut ob stimulum amissum in stupore, ictero & similibus affectibus, quid causæ occasione faciendum sit, in hisce affectibus indicabimus.

Cæterum ipsius potissimum constipationis causâ, quæ vsurpantur remedia, assu-  
menda, iniicienda, aut alter adhibenda, hic tantum quædam proponemus: reliquorum exempla passim in affectibus, in quibus constipatio adest, proponuntur.

Inter ea quæ exhibentur ex leuioribus, quæ humectando, emolliendo sœces duras emolliunt; lubricando & laxando vias laxant, stimulandoq; naturam sollicitant, sunt ex alimentosis.

In Alui  
constipa-  
tione à  
quacūq;  
causâ,  
pradic-  
di & a-  
gendi p-  
cessus.

Aluum  
soluentia  
Remedia.

Caro iuniorum animalium elixa, vitulina imprimis, pinguis item & mucilaginosa.

Butyrum affatim comestum, vel Oleum.

Herbæ pleræq; temperatæ esui aptæ, comestæ & crudæ; Spinachia, Beta Attriplex sativa, Buglosū Brasicæq; imprimis: hisq; validiora Malua & Violaria: aliarumq; plantarum teneritates, vt Lupulorū Asparagorum.

Fructus omnes humidi alvum laxat, temperati, dulces. Sed & acidi, conturbando tamen magis ventrem, quàm laxando.

Aquæ potus fluida facit alvū; Vel Lactis.

Ex medicamentosis Caisiæ pulpa prodest.

Manna in iusculis sumpta. Rosarū succus vel Syrupus, aqua Fontis dissolutus & bibitus.

Ex fortioribus, quæ cathartica vi & purgando, alvum movent. Infusum sol. Senæ cū Absynthio & seminibus, valde est utile. Reliqua in purgantibus & diuersis affectibus, in quibus constipatio adest explicantur.

Quæ in podicem immissa, naturam ad deiectionem movent, sunt Suppositoria, varijs modis concinnata.

Clysmata, quæ stimulando dura excrementa simul dissolvunt, emolliunt; & veluti abluunt, viasq; patefaciunt. Quorum præcipuus in constipatis est vsus: formæq; horum diuersæ, in colicis cruciatibus, proponuntur.

Extrinsecus ventri emollientia & laxantia applicata, nonnihil iuvant. Si inunctiones fiant ex oleis id præstantibus, & cataplasmata ex clysterum residentia, apponantur.

Balnei idem præstantia, vt aquæ dulcis, & ex decoctis similibus parata, idem efficiunt.

Exercere & movere corpus eundo, vt facies commodius descendant, opitulatur: & medicamenta alvum moventia citius, si illis sumptis obambulent, operantur.

Et cum assellatio, vt vocant, idonea fieri non possit, nisi conatus adsit, qui voluntate nostrâ, spiritu retento, & musculis contractis perficitur; nec tamen sola voluntas aliquid facere possit, nisi expultrix naturæ vis simul accedat; studendum ita naturam assuefacere, vt voluntati nostræ, in deiectione faciendâ, consentiat: quod fiet si certo tempore, & si fieri possit etiam horâ, post & ante somnum manè & vesperi, excrementa reddere studeamus: cum natura suum ordinem,

non solum in mensibus, diebus, sed & horis, vt in appetitu cibi, sic & in deiectionibus observare soleat: quem si seruemus, & tempore ad hoc cōmodo, naturam voluntate nostrâ, ad deiectionem sollicitemus, & in eo perseveremus, ad deiectionem facilius faciendam, multum adferet adiuventi.

~~~~~

DE M I C T I O N I S

D E F E C T V.

C A P V T I I X.

Genera.



ST excretionis illius naturalis, quæ in vrinâ reddendâ stato tempore perficitur, defectus.

Hæc in totum aliàs suppressa est, dicitur quæ Ischuria: in quâ, ne minimum quidem vrinæ, diuq; nihil mingere possunt: idq; cum distentione ferè magnâ, in pectinis regione, & tumore illic apparente, ob vesicam ab vrina adedò impletam. Interdum vero nihil horum se manifestante, mictio est abolita, vesicâ inani: quæ tamen improprie Ischuria dicitur.

Aliàs verò non sufficienter mictio fit: tum quando rariùs, vel minori quantitate, si cum potu æstimetur mingitur; asciticis peculiariter. Aliàs autem difficulter redditur, quando dum meijtur non continuò, vt par erat, fluit, sed vel cessat, antequam vesica penitus inanita fuerit, in Dysuria seu difficultate mingendi: vel interruptis vicibus cum molestiâ excernitur: vel stillatim & guttatim emanat, in Stranguria seu Stillicidio, appellatis affectibus: quæ tamen ambo; si cum ardente dolore, qui inter mingendum sentitur, fiant, cum dolor tūc magis quàm difficultas mingendi vrgear, ad dolores referuntur, illicque explicantur.

Hæc per se interdum, in prius sanis contingunt. Aliàs verò cum alijs morbis, vt cum dolore colico, nephritico, hydropo, febribus, &c. concurrunt.

Causa.

Causa defectus mictionis, dependet; Vel à materiâ, cuius portio excrementitia vrinâ

Mictio abolita, vesicâ plena. Ischuria.

Mictio abolita, vesicâ inani. Mictio paucæ & rara.

Mictio interruptis vicibus Dysuria.

Mictio stillatim facta Stranguria.

rina est, sero scilicet, si illud non generetur copiosè, aut aliò feratur, aut transitus illius impediatur; Vel ab instrumentis mictionis, renibus, in quibus vrina à sanguine secernitur; & vteribus, per quos in vesicam destillat: Vel vesicà, quæ eam excipit: & ceruice illius, per quam redditur.

*Seri pau-
citas, cau-
sa Mi-
ctionis
pauca et
rara.
Serum
aliò ra-
ptu, cau-
sa Mi-
ctionis
pauca et
rara.*

Serum si parua quantitate generetur, cum vrina tunc pauca colligatur, rariorem & paucio-rem mictionem quoq; sequi necesse est; in illis qui minus bibunt, siccioribusq; vtuntur. Quod & si feri pars, quæ à renibus attrahi debebat, ad habitum corporis rapiatur, illicq; calore absumatur, vel sudore manifestè exhaustiatur, euenit: vt illi, qui multum sudant, parum mingant; quod & accidit si per diarrhoeas, vnà cum fecibus per aluum serum simul copiosè profundatur, in morbis eiusmodi, aut ob cathartica sumpta, vt tunc mictio diutius differatur, aut parum admodum reddatur. Quæ parcius & rarius facta mictio, vt naturalis adhuc nec nociua: sic illa præternaturalis est & morbofa, si ab obstructio-

*Seri tra-
stus im-
pediunt,
causa
pauca et
rara mi-
ctionis.
Seri cras-
sitiei, cau-
sa Mi-
ctionis
pauca et
rara.*

nibus viscerum, hepatis imprimis, transitus feri impeditus, mictionem facit tardio-rem & paucio-rem: & sero aliò effuso hydrops ascites sequatur, in quibus tam pauca est mictio. Verum & serum, si tenuitate decentem non habeat, cum ob crassitiem tracta à renibus, difficilius tunc à sanguine segregetur, & vt vocant, coletur, illorumq; ductus penetret, mictionem rariorem facit. Quod ex assumptis ijs, quæ sanguinè & serum simul incras-
sant, proficiscitur: sicuti ex vini rubri stiptici vsu, alijsq; fieri putant; quorum vsu veluti vrinas minui, sic contrarijs attenuantibus calidis, diureticis, vrinas prouocari videmus.

*Consum-
ptio, ob-
structio,
viciatio*

Renum atque vterum causa, rarius mictio suppressitur. Cum enim gemini sint, renè vno debilitato: ita vt in eo secretio illa cessat, vel diminuta sit; vel aliter læso; aliter nihilominus cum suo vterere, illud munus obire potest. Vtrumque verò renem, illorum vterere, cum procul ab inuicem distiti sint; simul aded affici, vt vtriusque pereat functio rarius contingit, nec nisi à maximâ causâ, proficisci potest. Qualis fortè est, vtriusque renis substantiæ, omnimoda consumptio, à me sectione semel deprehensa. Vel ob-

*vtriusq;
renis vel
vteris,
causa
Mictio-
nis sup-
presse ve-
sicæ ina-
ni.
Absen-
tia aut
contorsio
vteris
altero af-
fecto, cau-
sa Mi-
ctionis
suppres-
sæ, vesicæ
inani.
Vulnus
vesicæ,
causa
Mictio-
nis sup-
presse,
inani ve-
sicæ.
Frigidi-
tas, cau-
sa Stran-
guriæ.
Compres-
sio cerui-
cis vesicæ
ductus,
causa I-
schuriæ
vel Dy-
suriciæ.*

structio in vterum initio, vel progressu à sanguine, pure, calculo, in vtroq; rene simul, quod tamen vix fieri potest, facta. Vel si fortè in febribus ardentissimis, ambo vtereres exsiccati constrictique essent: aut vnus lateris, vitio conformationis, vterere absente, aut in-
torto, sicuti quoque in anatome videmus, al-
ter morbis prædictis afficeretur. Quorû causâ si fiat vesicâ inani existente, nullo distentionis dolore, nullaq; mingendi cupiditate vr-
gente, mictio nulla fit.

Vesicæ fundi seu amplitudinis causâ, mingendi defectus vix accidit, nisi illa vulnerata, vrinam profundat: sicuti in piscatore nostro illud iam multis annis fieri solet, quod vrinam nullam per penem, sed per foramen relictum ex vulnere circa inguen emittit: Præcipue verò, illius ceruicis ductusque occasio-
ne, mictio deficit, si illa aded astringantur, aut obstruantur, vt ea, vrina in mictione, permea-
re nequeat: quod, cum angusta sit via, eò facilius & à varijs causis, fieri potest. Strictior fit hæc via, à frigore, sed inde potius, cum dolore mictio difficulter redditur, sicuti il-
lic dicemus. Angustatur etiam, compres-
sione extrinsecus factâ, si sedes illa inter po-
dicem & penem, quam in viris peruadit, se-
ssione aut aliâ vi, prematur, tamdiu & mictio solet subsistere. Intrinsecus, cum re-
cto intestino, ductus hic incumbat, fecibus
aut flatibus illic retentis pressus, vesicam
exonerare rectè aut sufficienter non possunt,
donec prius status emiserint, aut excremen-
ta delecerint. Ab inflammatione partium
vicinarum, vel tumore summo, idem po-
test contingere. Occluditur diutius, atque
vrina tunc penitus intercepta est, quando
ex longiore vrinæ retentione, vesica immo-
dicè distenta, trahendo ceruicem aded con-
stringit, vt relaxari & ad molem incumben-
tis vrinæ, exitumque quærentis, patefieri
nequeat: Quod illis sæpè contingit, qui ob-
pudorem in conuiuijs potantes, nec surgere
ausi, aut alibi; loco ad vrinam reddendam
idoneo destituti, mictionem diutius con-
tinendo, postea cum occasio est, & reddere
volunt, non possunt. Delirantibus hoc etiam
nonnunquam accidit, vt dum intenti sunt
cogitationibus, suis functiones vt alias, sic
& mi-

*Deliriu,
causa I-
schuriæ.*

& mictionem, quæ magis ex voluntate nostrâ dependet, edere obliuiscantur, & tale incommodum postea patiantur. Cæterum inflexâ seu contortâ vesicæ ceruice, sicuti in intestinorum conuolulo accidere diximus, vrinam penitus suppressam fuisse, in supranominato piscatore obseruauimus: cui vesica, factâ rupturâ in inguine, in scrotum descenderat, vbi admodum distenta latebat, nec vrinam, vel cathetere immisso reddere potuit, donec chirurgus incius vesicam esse, dum sectionem tentat, vesicâ vulneratâ vrinam profudit, ægroque statim leuamen, sed summum periculum peperit: à qua tamen liberatus, vti prius dictum, fistulâ illic relicâ, per eam vrinam adhuc hodie, quando vult, extracto petaceo, quo eam alioquin retinere & formam obturare solet, emittit. Ab obstructione huius vesicæ ductus si fiat, à calculo hoc frequentius proficiscitur, qui in vesicâ latens, si magnus sit, quotiescunque in ceruicis vesicæ initium prolabitur, illique se insinuat, vrinam retinet vel impedit eousque, donec inde recedens vel repulsus, viam rursus aperiat. Sed & calculus si parvus sit, in masculis, vltcrius nonnunquam in ductum hunc progressus & alicubi, vel eâ sede antequam penem subit, vel illic vbi sub pene fertur, subsistens, viam hanc obturando, mictionem impedit: quemadmodum in nephriticis doloribus hæc omnia explicabuntur.

Excreta in ceruice vesicæ, causa I. ischuria vel Stranguria.

Humores ceruicis vesicæ obstruentes, causa I. ischuria vel Dysuria.

Stupor Stimulum vesicæ amissum, neruorum il-

lius affectorum causâ, facultate expultrice tunc non agente; sicuti hoc intestinis, alui constipationis, sic hic, mictionis impotentia, causam esse censuerunt. Verum cum nullo quoque stimulo impellente, vesica nec plenâ nec vrinæ acrimoniâ adhuc irritatâ, mictio nihilominus ex voluntate nostrâ, pressâ vesicâ per abdominis musculos, fieri possit, secus ac in alui deiectione, quam, nisi stimulus accedat, facultasq; expultrix adiuuet, perficere arbitrio nostro solo nequimus, cum sæces crassæ vt egerantur, longè maiore vi quam humor, opus habeant, eumq; è vesica sponte effluere, stercus verò ex intestinis à lanijis exprimi, cum exenterantur, videamus, sit; vt licet vesica, illiusque ceruix & sphincter obtusè sentiant, hoc, quod minus vrina reddi nihilominus possit, nullum aut paruum saltem adferat obstaculum. Vnde & paralyticis, si vesicæ neruis quoque affectis, stupor adsit vesicæ, nullum aliud meiendi accidit incommodum: aut si sphincter resolutus sit, inuoluntaria potius mictio, cum illius functio sit vrinam retinere, non expellere, quàm illius suppressio, sequitur. Verum tamen illud quoque est, si vesica non nihil stuppeat, rariorem tunc esse mictionem: vt si exquisito sensu prædita sit, frequentior: cum facultas expultrix tunc voluntatem nostram ad vrinam reddendam, sæpe impellat, sicuti in frequenti mictione explicabitur.

Curatio.

SI, quia parum bibunt, siccioreq; viuendi ratione vtuntur, aut quia multum sudant, aut per sedes purgatur, vrinâ minori copîa rariùs reddatur, emédatione, cum nihil incommodet, minimè opus habent.

Si verò obstructis visceribus in hydropicis hoc accadat, retento fero, vt minus minuantur quàm bibant, cum hoc causâ sit ventris tumoris & non minima pars curationis illius in eo sita sit, vt vrina copiosè reddatur, quomodo eam promouere debeamus, in hydropice explicabimus.

Quòd si ob feri crassitiem, assumptorum causâ, idem accadat, victus ratione contrariâ & præsertim potu tenuiore, corrigitur.

Renum vterumq; vtriusq; lateris simul affecto-

vesica
causa
Pauca
vel rara
mictio
nu.

In Mi-
ctionis
defectu
a qua
que cau-
sa, quid
predic-
tum vel
agendum.

affectorum causâ, quod rarissimum est, si nulla omnino vrina, nec in vesica deprehendatur, nec mingatur, cum causam maximam esse oporteat, mortale plerumq; & immedicabile existit.

Quod & si vulneratâ vesicâ, in abdomen, vel per vulnus vrina profundatur, euenit, & vel moriuntur, vel fistulâ factâ, vti diximus per eam potius, quàm viam naturalem vrina excernitur: quod tamen insolitum; vti & illud, vesicam in scrotum delabi; ac nisi in casu modo dicto successisset, sine dubio mortem attulisset.

A frigore si difficultas mingendi fiat; quia cum dolore sit, illic cura explicabitur.

Compressione factâ colli vesicæ; si vrina subsistat, mox causâ sublata, vel fecibus flatibusq; egestis; facile iterum redditur.

Diutius retenta & cumulata vrina, vesicâ distendens, si supprimatur, ab inflammatione aut tumore, hisce curatio adhibenda. Si à calculo, carunculâ, aliòve tumore, aut humore ductus ipsius obstruatur, impedimentis illis ablatis, rursus vrina profluit.

Si stupidior vesica tardiozem faciat mictionem, nec in eo laborandum est, cum impleta admodum, sponte exitum quærat, & dum alius excrementa reddit in illo conatu etiam propellatur.

Verum quæ ad vrinam promouendam faciunt medicamenta, interna externaq; quâ ratione in quibusdam causis, & præcipue cum serum crassum est, viæ, circa viscera, renes, vesicam & ductus, obstructæ, vsurpari debeant, nunc explicandum.

Quæ autem eo nomine assumenda exhibentur medicamenta, mictionem copiosam facientia, vel illam accelerantia, Diuretica dicta, id præstant: vel quia feri copiâ gignendo vrinas augent: vel quod illud attenuando fluxile reddunt, & vt facile permeare possit, & vt vocant à sanguine segregari, & sic à renibus ad vesicam penetrare: vel etiam quod dum serum, & per consequens vrinam calidiora acrioraq; efficiunt, vt illud à facultate expultrice, quâ magis tunc sollicitat, citius, tum ad vesicam, tum extra hanc in mictione propellatur, occasionem præbent: sicuti hæc in remedijs vterius demonstrabuntur.

Pulueres sequentes, 3. j. vel ij. pondere exhibebimus, cum Vino, Cereuisiâ, Lacte, aut Liquore alio conuenienti, copiosè additis, vel superbibitis: qui, si diu asseruari debent, in trochiscos prius rediguntur.

Primus: R. seminis Nasturtij 3. j. .ß. fiat puluis, datur vt dictum.

Secundus: R. Glandium, Auellanarum exiccat. in furno ana 3. j. .ß. fiat puluis: Bibat cum lacte caprino, mane & vesperi.

Tertius: R. rad. Rubiæ mai. Azari, sem. Fœniculi, Petroselin. Nasturtij, Nigellæ, Alkekengi ana 3. j. Valerianæ 3. .ß. fiat puluis.

Quartus: R. radic. Azari, Phu, Mei, Acori, seminum Fœniculi, Apij, Petroselin. Dauci, Seseleos, Thlaspeos, an. 3. j. fol. Sabine, Squellanthis, Spicanardi, Cinamom. Piperis ana 3. .ß. Croci 3. j. fiat puluis.

Quintus: R. Succini, gummi Prunorum, Ceraforum ana 3. j. resinæ Laricæ costæ 3. .ß. lap. Iudaici, semin. Alkekengi, Petroselin. radic. Azari ana 3. .ß. Cinamom. 3. j. fiat puluis.

Sextus: R. testæ Ovi è quo pullus extractus est, relictâ membranâ interiore 3. j. Vel Vesicæ harengorum, quas ipsorum animas vocant, num. 9. fiat puluis; Detur.

Septimus: R. cineres, à combustis, vel pulueres ab exiccatis sensim, aut citò in furno, si necessitas expostulet, Lumbricorum, Cancrorum fluuiatil. ana 3. j. Millepedum 3. .ß. Cantharidum vel Cicadarum, ablatis prius alis tenuioribus, vel Scorpionum si haberi possunt 3. .ß. Cinamomiz 3. j. Gariophyll. 3. .ß. Sacchari 3. ij. Detur.

Octavus valde efficax, citò parandus necessitate urgente: R. Cantharidum num. ij. Sacchari Candiz 3. j. diu inuicem terantur: Detur cum aquâ Mulsâ copiosâ, vel decocto Linij, vel Lacte.

Decocta sequentia conueniunt: R. radic. Raphani 3. ij. rad. Asparagi, Anonidis ana 3. j. rad. Azari 3. .ß. Maluæ, Parietariæ ana m. j. semin. Alkekengi 3. ij. semin. Nasturtij 3. j. sem. Apij 3. .ß. decoquantur in iure Cicerum rubr. Et bibat haustum.

Vel hoc: R. bulborum Cæparum & Allij an. j. decoquat in iusculo: & colaturam bibat.

Oxymel diureticum, in hocce vsus vsitatum est medicamentum: Cuius 3. j. cum a-

qua convenienti, vel vino ad vrinās cindas, propinquantur.

Vinum absynthites affatim bibitum, vrinās movet. Item si quis ieiunus Maluaticum bibat.

Compositum tale fit: R. radic. Petroselin. Foeniculi, Anonidis, ana 3.j. radic. Asari, Enulæ ana 3.ß. Absynthij, Rutæ, Fragariæ, Sabinæ, Hyssopi ana M.j. florum Genistæ, Sambuci, Chamæmeli odorati ana P.j. feminum Apij, Petroselin. Leuistici, Erucae, Nigellæ, Nasturtij ana 3.j. gr. Iuniperi 3.ß. infundantur in Vino albo ad vsum: Bibendo poculum.

Lixivium sequens potum vtile est: R. ligni Iuniperi, & caulium Fabarum cum corticibus filiquarum, omnium aridorum: de singulis fasciculū combure & cineribus permisce Vinum album, & sæpè colando fac lixivium: De quo bibat cyathum. Si cineres ramentorum Genistæ, vel Dulcamaræ reliquis cineribus permisceas, erit efficacius.

Potiones aliæ sic sunt: R. olei Sulphuris gutt. ij. spiritus Vitreoli gutt. j. cum Vino diluto aqua convenienti, Bibat.

R. olei Scorpion. 3.ß. Bibat cum Lacte vel Vino.

R. olei Amygdal. dulc. ad 3.ij. Bibat cum copioso Lacte.

Succus Mali punici, è malo recenti pressorexuctus, vel è granis comestis deglutitur, aut alioquin expressus & bibitus, copiosam mictionem parit.

Vel sic: R. radic. Raphani recentis incisi, vel rasi & contusi: irrotetur Vino fortissimo vel maluatico, & exprimatur succus: Bibat 3.ij.

Vel sic: R. succi Parietariæ 3.ij. vel ij. succi Nasturtij 3.j. depurentur, adde Vini q. vol. addito Saccharo vel Melle: Bibat.

Aquæ, quæ egregiè penetrant, hic præsertim conveniunt: dādo aquam Parietariæ, Alkekengi, Limoni, & Nucum, vt affatim bibant. Vel aquam flor. Genistæ, addendo parum aquæ Cinamomi. Sunt & efficaces aquæ, Raphani, Nasturtij, & Foeniculi marini.

Alia aqua ad vsum: R. rad. Raphani 16.ß. rad. Anonidis, granorum Alkekengi recent. amarorum ana 4.j. nucleorum Cerasorum

& Persicorum ana 4.ß. flor. Genistæ & Sambuci ana 3.j. semin. Foeniculi 3.ij. resinæ Laricæ 3.ß. contusis & incisis affunde Vini Maluatici vt digito vno superemineat, eliciatur aqua: Detur ab 3.j. ad ij.

Asparagorum turiones noviter erumpentes, comesti, cocti, longeq; magis crudi, vrinās foetidas reddunt, & ad sæpè vrinam reddendam, vrgent.

Acetarium paretur ex folijs recentibus integris, Portulacæ, Nasturtij, hortensis & aquatici, Cerefolij, & Petroselini, addendo Cæpas iuniores cum radicibus evulsas, vti solent; permiscendo talleolos Raphani quam plurimos, si tempus sit idoneū, & fructuum Cucumerum, affundendo Acetum album & oleum q. f. De eo comedat, mictionemq; admodum movebit, præsertim si tunc parum cænet aut ferè nihil.

Bolus talem deuorare possunt: R. resinæ Laricæ, vel Terebint. 3.ij. femin. Alkekengi 3.j. Succini 3.ß. cum Saccharo: fiat bolus.

Pilulæ ex ingratissimis parantur: R. gummi Galbani, Bdellij, Myrrhæ ana 3.ß. ol. Sulphuris gutt. iij. resinæ Laricæ vel Terebint. q. f. fiant pilulæ parvæ: capiat 3.ß. pro vice.

Permiscantur aluum laxantia & cathartica interdum diuretica; cum sacculis expulsi, facilius vrina reddatur, dein & quia stimulando facultatem expultricem intestinorum, vesicæ quoque eandem vim non nihil impertiuntur.

Bolus sequens hoc præstabit: R. Calsiæ recent. extractæ 3.ß. Benedictæ lax. Agarici troch. ana 3.ß. semin. Alkekengi 3.j. Sacchari q. f. fiat bolus.

Resina Laricea vel Terebinthina, cum vtrumq; præstet, convenientissima: R. Alterutrum 3.ij. dissolue in Melle & Vitello oui cum Vino maluatico: Exhibeatur.

Vel sic: R. el. Indi mai. 3.ij. Catholici 3.ß. aquæ Alkekengi q. f. fiat potio.

Per os pecuniaria, si à grumo sanguinis fiat, quæ concretum sanguinem dissoluant, exhibentur; inter quæ Succinum cæteris in hoc casu præfertur, reliqua alibi explicantur.

In aluum clysmata injiciuntur, tum eandem ob causam, tum vt topica, vesicæ proximè adhibita sint remedia.

Simplicior hic erit: R. Maluæ cum toto, Parietariæ ana M. j. flor. Chamomil. p. j. fiat decoctio; dissolue Cassiæ, Benedict. lax. ana ʒ. β. resinæ Laricæ dissolutæ in vitello oui & Melle ʒ. β. ol. Chamomil. & Scorpionum ana ʒ. ij. fiat Clyster.

Alter ex pluribus: R. radic. Altheæ, Raphani ana ʒ. ij. bulbos Ceparum, Allij, Porri ana ʒ. j. herb. Parietariæ, Nasturtij, Petroselin. ana M. j. flor. Chamomil. Meliloti ana p. j. sem. Paludadij, Leuistici ana ʒ. ij. baccarum Iuniperi ʒ. β. fiat decoctio in Aqua & Vino: dissolue eadem quæ supra.

Vel ex succis: R. succorum Maluæ, Mercurialis, Parietariæ, Rutæ ana ʒ. j. β. Nasturtij ʒ. β. Vini albi ʒ. ij. Butyri ʒ. j. β. Mellis ʒ. j. Salis ʒ. j. fiat clyster.

Extrinsecus, vesicæ regioni in pectine, varia quoque adhibentur, vesicam dilatantia & ad mictionem sollicitantia remedia.

Fotus & infusiones ex sequentibus: R. rad. Valerianæ ʒ. ij. herb. Maluæ, Artemisiæ, Petroselini, flor. Chamom. Meliloti, Anethi, ana p. j. semin. Lini, Foenogr. ana ʒ. j. seminis Apij ʒ. ij. fiat decoctio, adde Vinum. Eadem, si ab impletâ vesicâ distetâ urinare nequeant, conueniunt. Adduntur grumos dissoluentia, si inde fiat. Ex refrigerantibus sunt, si adfit inflammatio.

Vel emplastra: R. rad. Altheæ, Raphani & herb. Parietariæ, coq; parum, contundantur, misce Butyrum: Applica.

Vel R. Raphanum, Nasturtium, hortense & aquaticum Allium, baccas Iuniperi, contundantur & frixentur cum vino: addendo Butyrum & ol. Scorpionum: Vtere.

Stercus bouinum calidum cum Cimino, & ol. Scorpionum admotum, iuvat.

Filum crudum ex cannabi, modò filatum, decoctum in aquâ & Lixiuio, additâ Artemisiâ & Chamomillâ in decocto applicatum in stranguria prodest.

Inunctiones unâ cum prædictis, vel solæ adhibentur: R. ol. Scorpionum, axungia Cuniculi ana ʒ. β. Vngatur.

Vel: R. succorum Nasturtij vtriusque, Petroselin. herbæ, Ceparum ana ʒ. j. Fœniculi mar. si haberi possit, ol. Scorpionum ʒ. ij. coquantur ad consumptionem, adde ol. Te-

rebinth. ʒ. ij. axungia Cuniculi q. s. fiat linimentum.

Vinum, Acetum & Mel, si simul coquantur ad Mellis spissitudinem, miscendo, far. semin. Lini, pectenq; eo vngatur vel emplastretur, mictionem promouet.

In vesicam infunduntur per syringâ, quæ vias laxant, vt Oleum amygdal. dulc. vel in quo Maluæ ebullierit: & nonnihil stimulant, vt oleum Scorpionum: si fortè facilius sic vrina efflueret, aut calculus si obstruit, progrediretur. Vel etiam Serum lactis, aliaq; abstergentia, vt Mel & Aloës, si humor tenax aut grumus obturet, & quæ illum dissolvunt inijciuntur: sicuti & lithontripica, si calculus adfit. Imprimis verò si caruncula adfit, aut durescit, ad eam emollienda inijciuntur, & ad excrescentiam illam abstergendam, vnguenta, vt Ægyptiacum, & postea ad valide exiccandum, illud quod ex Lymphargyrio, Tuthia, Antimonio, Cerusa & Aloë, paratur, candelæ cereæ extremitati inuncta & intrusa adhibentur.

Intruditur catheter, si vrina suppressa vesicam adimpleat, nec vlllo modo reddi possit, quod & in omnibus causis conuenit, meatum obstruentibus; cum calculum repellat, carunculam disrumpat, grumos aliaq; tenacia dissoluat: & si ob vrinæ retentionem vesica distenta, retineatur, viam rursus aperit: qui tamen cavus esse debet vt per eum etiam antequam extrahatur, vrina effluat.

Glandis in viro foramini yrinario, cimices, pulices, pediculi, viua induntur, vel pili minutim incisi intruduntur, vt irritando partem summè sensilem, facultatem meiendi excitent.

Si grandi illic ubi perforata est Galbanum emollitum emplastri instar apponas vrinam prouocare creditur.

Quod & suffitum ex pelle Ericij & Agarico factum, & ex Locustis, in foeminis facere scribitur.

Compressio vesicæ leviter facta, eâ sede ubi tumet, si ab eâ distentâ nimium, vrina profluere nequeat, sola sæpè hunc affectû sanat. Et in calculo, aliquouq; sub penis ductu iam progresso, si sensim premendo, versus extremitatem illius pellatur, eum sæpè expellit.

Sectione frequenter calculus vel aliud subsistens, aut caruncula quoque nata; si non alijs cedant, vt eximantur, & via aperiatur; necessitas cogit: quem modum in calculo demonstrabimus.



DE PARTVS DEFECTV.

CAPVT IX.

Genera.



EST defectus excretionis illius naturalis, per quam mulier, illud quod in vtero conceptum erat, siue foetus sit formatus cum suis inuolucris, aut informis mola, tempore idoneo, per eandem viam rursus excludit.

Deficit autem partus, cum difficulter fit: quod non solum præter naturam, sed & naturaliter potest accidere. Vel quando non fit tempore & termino naturaliter ad id destinato: Aut etiã ante hunc, si necessitas prius exigat: Aut si non sufficienter partus fiat, remanente conceptus portione aliquã.

Difficilius partus naturalis.

Cum difficultate & dolore, etiam naturali modo, fit omnis partus foetus ad maturitatem adacti: quorum præudia paulo ante partum sentit mulier, illisque ad conatum per retentionem spiritus & compressionem abdominis musculorum, sicuti in alijs per inferiora deiectionibus fieri solet, edendum sollicitatur. Augenturque hæc omnia foetu iam erumpente. Et post partum quoque dolores aliquandiu remanent, qui dolores post partum dicuntur; quos, cum naturaliter pariendi functioni copulentur, in huius functionis læsionibus potius, quam in doloribus, tractamus.

Difficilius partus præternaturalis.

Præternaturali modo, ob impedimentum præternaturale, maiori difficultate adhuc tardiusque partus interdum procedit, in partus seu Pariendi difficultate dicta: in qua, cum summo conatu, labore, calore & sudore, dolores vehementes parturientem angunt, foetu in claustris oblique vel transuersum hærente, (vbi & ab obstetrice immissa manu tangi potest) vel etiam manu vel pede po-

rius, quam capite, (cum si capite in vteri cervice feratur, reliquis tunc facile subsequētib; partus rectius procedat) prominente: vnde non nisi cum summo periculo & matris & infantis vitæ; cum in partu sæpe alterutrum aut ambo moriantur, tandē prodit.

Terminum naturalem partui destinatum, qui frequentius decimus est mensis (non autem decimestris solum sed & septimestris partus est legitimus) si prætergrediantur, & maturus foetus non excludatur, aut si mola quoque diutius retineatur, nec reijciatur, tunc partus nullus dici solet. Et tunc, vel enarratis accidentibus in partu difficili modo explicatis perseverantibus, ob dolorem & laborem, accedente sæpe hæmorrhagiã magnã, viribus deiectis, in syncopen cadunt, in quã, si foetus subsistat, citius quam in alijs omnibus animi defectus causis, moriuntur. Fit tamen etiam, vt conatus pariendi eo tempore sese manifestent, mulierque paritura videatur, & ad partum ab obstetrice disponatur, aquaque iam, sicuti ante partum fieri solet, effluerit, sed his omnibus rursus cessantibus atque euanescentibus, nullus partus sequatur, & nisi denuo hæc redeant, vti aliquando fit, foetus extinctus, nunc in vtero, nunc extra hunc, hæreat, qui tandem cum inuolucris putrescens febres animique defectus, & si nihilominus retineatur, vterum partesque vicinas simul inficiendo, matri exitium parit, sicuti in quibusdam accidisse (inter quas vna quinque, supra decimum, menses, foetum mortuum, antequam ipsa exspiraret, profluente sedã interim illi vix, & venã vmbilicali propendente; vtero inclusum gestauit) aliquoties vidimus, tantã corruptione intrinsecus, factã, vt & vterus simul cum foetu, & abdominis musculis illius loci, ex putredine nigricantibus, summe foetentia, post mortem sectione factã, deprehensa fuerint: priusque viuente matre, interdum tum pellucidus vesicæ instar, circa vmbilicū elenatus, subiectæ putredinis character, per quem foetus vertebræ ternebantur, eoque rupto, eximebantur, sese obtulerit.

Quæcumque ita, foetu in vtero extincto, accidunt, illeque putrescens exhalatione putri & corruptione, vti dictum, nisi maturè excludatur,

Partus omnis impediens, vel nullus.

datur, matri mortem adferat, cum hoc etiā in foetu nondum perfecto, ante pariendi, tempus naturale; accidere possit; si tunc moriatur, ut per partum mox rejiciatur, opus est: sicuti hoc si paruus adhuc est embryo, sponte & citò fieri solet, si grandiusculus verò, & qui iam viuebat & se mouebat, nonnunquam retinetur: quod cum sit, partum quoque deficere, tunc possumus dicere: Vti & si conceptus præternaturalis, ut mola gestetur, cum, quò citius illa rejicitur, eò minori hoc fiat periculo; proin cum de his certi sumus, nisi sponte hoc natura tenet, medicamentis partum accelerabimus.

Constat autem de foetu mortuo; si illius, qui prius mouebatur motu mater non amplius percipiat; ventris nihilominus tumore (qui nonnunquam in illis, quæ se gravidas esse putabant, neq; sunt, & tamen intumuerunt, mensibus erumpentibus, subito subfidet) remanente, qui tamen tunc circa illa magis propendet: si vteri regio frigida deprehendatur, & Mamillæ; quæ prius turgabant, nonnihil flaccescant, tandemq; si diutius pfeueret, aqua, sanies, virus; pus effluat: aut portiones aliqua; sicuti superius dictum, præsertim inuolucrorum, promineant, febriiles horrores, cardialgiæ, syncopes matre exerceant. Molam verò non foetum retineri quomodo cognoscere oporteat, in conceptu deprauato explicabimus.

Partus imperfectus.
Imperfectus aliquando fit partus, quando foetu excluso, secundina vel integra aut lacera, vtero adhuc connata, vti ferè fit, aut alioquin impedita subsistit, matremque infusum periculum adducit: cum febris tunc quoque, viriumq; prostratio subitanea atq; interitus, nonnunquam superueniant.

Cause.

Peccata, causa Partus difficultatis.
Partus naturalis difficultatis, causam in muliere peccatum originale esse, propter lapsum Euzæ in paradiso, cuius occasione, creatori visum est, ut cum dolore pareret illi poenam infligere, sacræ testantur literæ. Nos verò etiam naturalem, & illius & præternaturalis partus difficultatis, & quod deficit aut imperfectè fit, causam indagamus. Quæ vel à foetus magnitudine, vel situ, vel imbecillitate: aut à matris imbecillitate: vel il-

lius vteri structuræ, trium orificiorum, vel ductus seu ceruicis angustia dependet.

Magnitudo foetus maturi ad partum, (qualis est, si eo vsq; adauctus sit, ut iam in vtero locum amplius habere nequeat, tuncq; solidius nutrimentum, & ærem externum ad vitam requirens, exitumq; quærens ad partum sollicitet) si cum viarum, quas in partu peruadere debuit angustia conferatur, partum non sine illarum violenta dilatazione, & proin dolore laboreq; magno fieri posse, etsi naturaliter hoc fiat, satis demonstrat: eoq; magis, si foetus patris causâ magnus, à matre gestetur parua, quæ magno vitæ periculo pariunt & in partu sæpè succumbunt: Vti & illæ quæ supra modum adauctum conceptum, aut aliter monströse formatum, aut plures simul vtero gestant.

Quod si quoq; decente conceptus rotunditate dissoluta in partu (qua globi instar oblongi foetus, membris rite compositis, cum suis inuolucris in vtero continetur) foetus, ruptis inuolucris, aquaq; profliente, extensus, non capite primum ad exitum, sed pedibus, aut transuerso situ feratur, aut manus pedesve, quæ prius corpori exactè applicata erant, nimis distendant, ut partus vel nullus aut difficillimus fit, in causa quandoque existit.

Et, ut foetus validus & viuus, cum pariendi tempus instat, naturam seque ipsum impellens & mouens, partum faciliorem, sic imbecillis vel mortuus languidiorem, & si ad iustam magnitudinem excreuerit, & moriatur, difficiliorem parit.

Et cum ad partum edendum, conatus matris validus requiratur, vti fortiores & animosæ, strenuè laborantes, partum promouent; sic debiliores naturâ & ætate, & iuuenicula omnino, vel senescentes, & quæ pusillanimes sunt, animoq; ob metum deiecto, pigre in opere, vel labore diu in conatu parienti defatigatæ, seipsas retardant, & in periculum adducunt.

Vasa quibus foetus inuolutus membranis, intermedrà carneâ placenta, vtero adheret, si immatura adhuc, hoc est, non ita disposita sunt; ut quemadmodum fructuum ma-

Magnitudo foetus, causa Partus difficultatis.

Situs foetus peruersus, causa Partus difficultatis vel nullus.

Imbecillitas foetus, causa Partus difficultatis.

Imbecillitas matris, causa Partus difficultatis.

Vasfructus in vtero, conexus nondum dissolutus.

Intero-
ris orifi-
cium angu-
stia, cau-
sa Par-
tus diffi-
cultatis.

turorum pediculi, à ramis arborum citra læ-
sionem & lacerationem, facile abscedunt:
sic hæc connexio cum maturus est partus,
citra vim magnam & læsionem aut sangui-
nis profusionem (neq; enim quæ partum se-
quitur expurgatio, ab hisce venis, vti mox
dicetur, prouenit) facile dissoluitur: tunc,
cum adhuc valide hæc vasa inuicem cohæ-
rent connataq; sunt, & ante tempus ad par-
tum muliere impulsæ, per vim separentur,
partus difficilior maioriq; dolore, & cum
magnâ sanguinis profusione, vterique non-
nunquam inflammatione, febre continuâ
comite & vitæ periculo, procedit. Vel secun-
dinâ adhærente, penitus vel ex parte, aut la-
cerâ, eadem symptomata sequuntur. Sicuti
fit, cum ex casu, ictu, vel sumpto violento
medicamento, mulieres intempestiuè pa-
riunt: aut in quo maius frequentiusq; erra-
tum committitur, si impulsæ ab obstetrici-
bus, vti nimis citò sæpè, vt se expediant, eas
solicitare solent: aut aliàs leuibus vterinis
doloribus falsæ & persuasæ, tempus pariendi
instare, quod tamen nondû adest, mulieres
fœtum vi quadâ & conatu maximo, vt parie-
tes strenuæ esse dicantur, extrudere conan-
tur fœtû, remanente interim secundinâ, nec
membranis secedentibus, in discrimen, vti
dictum, nimis nunc consuetum, veniunt.

Intero-
ris orifi-
cium angu-
stia, cau-
sa Par-
tus diffi-
cultatis.
Cervicis
vteri ori-
fici angu-
stia, cau-
sa Partus
difficul-
tatis.

Orificia tria, vteri interiorius, & cervicis il-
lius exteriorius, cum rimâ pudendi, quæ fœtus
tanquam tres portas peruadere debet, pa-
riendi difficultatem nonnûquam & impos-
sibilitatem causant. Cum enim vteri inte-
rius orificium, tempore quo fœtum vtero in-
clusum gerit fœmina, adeo angustum & oc-
clusum sit, vt ne minimum quidem admit-
tere, aut emittere possit, & cervicis orificiû
exteriorius non sit amplius, quàm quod colem
possit excipere, eaq; in partu adeo dilatari
oporteat, vt fœtus possit per illa egredi, non
mirum difficilem partum, illorum causâ,
fieri: eoque magis, si naturâ sint angustio-
ra aut duriora, sicuti in illis quæ diu non
pepererunt, & senescentibus, vnde & tanto
labore pariunt, accidit. Vel si alioquin
sicciora & aridiora nec humectata sint, pro-
pterea quod aqua in partu erumpere solita,
quâ irrigantur & laxantur hæc viæ, diu ante,

quàm sit sequutus, effluxerint. Rimæ quo-
que pudendi causâ (licet in ea penetranda
cum in cute longo ductu scissa ampla que sit,
minus infans occupetur) fieri potest, si &
illa breuior sit, mirusque lata, vt illic fœtus
subsistat, cum non ita, vt orificia ampliari
queat, atque intumescere; sicuti in cani-
bus fieri videmus, quibus pudendum cum
calent, valde intumescit & ampliatur: in
muliere verò semper eandem seruat ampli-
tudinem, nec ita vti interiora orificia, cum
mulier apta est ad conceptum, & parere de-
bet, increscit; quemadmodum in conceptu
ostendetur.

Ductus ab vtero ad pudendum vsq; pro-
gressus, qui ceruix illius dicitur, causâ, diffi-
cultas hæc etiam oritur, etsi enim amplitu-
dinem insignem habeat, quia tamen fœ-
tum, nisi admodum quoque distenderetur,
transmittere nequiret, sit vt & ex hac di-
stentione, vnâ cum ea, quam in orificijs
fieri diximus, dolor pariendi laborque, au-
geantur. Quod verisimilius, quàm sicuti
Rondel. voluit, ob secundinâ à matrice a-
uulsionem in partu dolorem accidere, vt et-
iam secundinâ adhærente fieri, vt sine dolo-
re mulier pariat, falsò opinatus est. Cum
hanc separationem citra molestiam, si recto
tempore pariat, fieri, supra demonstratû sit,
sæpèq; obseruari, remanente secundinâ,
dolores in partu nihilo leuiores fuisse. Sed
& hemorrhagia post partum aliquâdiu fluit,
apertis ex distentione illâ venis menstruis
cervicis vteri, vt alio mēstruo tempore cum
aperiuntur permanens. Imprimis verò ceruix
vteri, eò potissimum loci, in fœtus transitu,
angitur patiturque vbi pubis ossibus subie-
cta, in sede illâ angustiore, rectum simul inte-
stinû continente; latet: etsi in muliere lon-
ge amplior quàm in viro sit; & ob laxam
cartilaginem, quæ pubis ossa illic simul con-
glutinat, illis nonnihil cédentibus, non ta-
men ab inuicem vti voluerunt diuulsis: sed
imprimis coccyx subiectus articulatus, vim
illam sentiens retrorsum cedendo, vt via
hæc minus impedita sit, efficiunt: modò nō
angusti lumbi, & breues in muliere breuis
staturæ, hanc viam angustiolem reddentia,
difficultatem eam augeant. Quod & fit, si
rectum

Rima
pudendi
angu-
stia, cau-
sa Par-
tus diffi-
cultatis.

Cervicis
vteri an-
gustia,
causa
Partus
difficul-
tatis.

rectum intestinum fœcibus plenum, maiorem huius cavitatis sedem occupant, aut coccyx dum sedet mulier pressus, obstaculum huic rei adferat.

Pinguedo, an causa Partus difficultatis.

Obesas mulieres, & præsertim circa vteri regionem, difficulter parere docent, cum tamen contrarium testetur experientia, nec pinguedo vllâ vteri interiora illiusve ceruicis, occupet: dein & quæ extrinsecus abdomini intrata est, adeo hic impedire minime potest, nisi fortè quia tardiores sunt obesæ, hoc obstat partui.

Curatio.

Prædictio.

SI ob magnitudinem, fœtus excludi nequeat, diuque iam subliterit, & præsertim si ex vtero nondum descenderit, vel illic in angustiis hæreat, suffocabitur, materque periclitabitur, & si fortè succedat, eumque pariat, periculum ne in partu secundo vel tertio, si tam grandes infantes parere soleat, vti sæpè fit, succumbat. Sicuti & frequenter accidit. Et cum transuerso situ, aut alio exitum præpediente, infans in lumbis, vt vocant, sublitit: Aut ob orificiorum & ductuum angustiam ægrè transit. Quamplurimæ etiam ex illis, quibus secundina adhæsit, extinguuntur. Si molam gestent, quid tunc prædicendum & agendum, in conceptu deprauato explicabitur. In omnibus autem causis, si vires admodum prostratæ sint, animusque deficere incipiat, in syncopem cadant, hæmorrhagias magnas patiantur, febre acutâ corripiantur, periculosum.

Partus difficultatis præcautio & curatio.

Interea tamè cum eiusmodi pericula metuimus, etiam ante tempus prospiciendum; idoneam viuendi rationem, toto quo grauida mulier est tempore, instituendo; nihil tamen, quod partum promouere possit, ante postremum mensem, præsertim si validum sit remedium, administrandum est.

Parcè itaq; cibo vtatur, parumq; nutriente, si consuetæ sit magnum fœtum edere, & obesa sit. A Vino vel abstineat, vel eo diluto vtatur: Sanguinem circa medium vteri gestationis tempus detrahat: idq; si plethorica sit, postea repetat, somnoq; non nimium indulget.

Reficiente verò viuendi ratione, statim à conceptu, refocillandæ sunt imbecilliores.

Humidiore victu & potu, lubricanteque vtantur, quæ angustioribus orificijs sunt præditæ, Balneoq; sæpè temperato.

Vltimo verò mense appropinquante, ad ea quoque quæ iam ad partum faciliorem mulierem præparare, non tamen antequam conatus sentiat, admodum impellere possunt, accedendum. Exhibendo, ex leuioribus partum iuuantibus, quædam. Balneo imprimis & inunctionibus vias laxando; sensim vires horum medicamentorum augendo, quò tempus pariendi propinquius est, & præludia quædam illius sentit mulier: quibus iam præsentibus, ad ea quæ naturam simul sollicitant, & si non succedat partus, ad fortiora, fœtum expellentia, & si magna exigat necessitas, & iam de fœtu extincto certissimus, aut secundina nondum eiecta sit, etiam ad forissima, quibus prius fœtu adhuc viuentē, quia eum perimere possent, vti non licebat, transeundum, & extremis extrema adhibenda remedia. Quæ omniatū in partu, tum ante hunc, partum actu vel à viro, vel à matre ipsâ, vel ab obstetrice aut chirurgo, vel a medico, per remedia exhibita, indita admotaque, præstantur.

Vir maritus, si sæpè ante partum, vel iam instante partu, cum vxore se commisceat, partum faciliorem reddere, multumque vt leuius fiat, adiuuare pleriq; docent, veritatq; consentaneum est.

Matris operâ partus accelerabitur, si vltimo mense sæpè erecta stet, sæpè deambulet, locaq; edita scandat, idq; præsertim tempore partus præsentis.

Conatus matris ad fœtus exclusionem omnino est necessarius, cum natura sola eum qui aduictus est, propellere nequeat, sed constrictione ventris non minus ad fœtus exclusionem, quàm alui excrementorum opus est, idque voluntas matris omnino efficiat. Eo nomine, cum naturæ stimulum, & dolores parturientiū perferat, eosque vteri & fœtus causâ, nō aliunde provenire, ab obstetrice edocta, certò nouerit, tempusq; adesse; (neque enim prius, ne fœtu excluso per-

vim, secundina remaneat, vti prius dictum, sollicitanda) tunc puerpera, retento spiritu, & constrictis musculis abdominis laborandoq; vt vocant, foetum ad expulsionem promouere, sensimq; conatus intendendo, quantum vires ferre potuerunt, extrudere conatur, & ab obstetrice astantibusq; vt strenue agat, admonebitur. Dumque in labore est, in sella quae amplo foramine peruia sit, vt occygem quod minus retrorsum cedere possit minime impediat, sedeat, illiq; dorso innitatur: Vel si maiore vi opus est, erecta, lumbis innixa, aut sub brachijs sustentata, laboret. Et si obasitas impedimento sit, prona, vultu in terram demisso, & ad genua inclinante, opus peragat. Sed & sensim praefertim conatus labore defatigata, circumducenda, vtq; passibus distatioribus ambulet, pedibus terram nonnihil pulset, & si secundina retenta sit, aut foetus aliquousque progressus, non cedat, validius terram concutiat, monenda, quâ ratione Pfaltziam conceptum excussisse, scripsit Hippocr.

Sternutatio. cum conatum validum licet breuem efficiat, subito & violenter, musculis constrictis abdominis, magnum ad foetum vel secundinam, propellenda, adferet emolumentum; maxime si ore clauso, naribusque constrictis nonnihil fiat, admodum impellit, & proin cum opus est, eam prouocare oportet.

Obstetrix, vbi primum foetus, progredi incipit, eum excipiat: si verò cedere nolit, sensim & placide trahendo, ventrisque partem superiorem comprimendo, extrahere conetur: aut, si profundius lateat, inuersusq; sit, immisis digitis manûve, prius inunctis, in rectum situm, vt caput deorsum spectet disponendo, vel membra distracta colligendo, vt egredi possit, adiuuare debet.

Quibus minime succedentibus, maxime si foetum extinctum cognoscat ipsa obstetrix medica, vel chirurgus adhibet, speculo matricis orificium dilatare tentent: & si nec sic quidem progrediatur, certis instrumentis illum apprehendere & extrahere studeat, vel etiam in partes dissectum per portiones eximere.

Omni demum aliâs salutis spe sublata, a-

liqui cum successu, foetum mortuum sectione in matris abdomine factâ, extraxerunt, matre nihilominus manente superstiti: cui rei fortè primâ occasionem, vt illud tentarent, praebuit, vesica illic, si foetus putrescat, vti superius dictum, eleuari nonnunquâ solita, quâ aperta, si foetus putruerit, mox in conspectu sedat: sicuti hoc aliquando feliciter successisse variâ testantur historiae, egoq; ocularis huius rei testis esse possum. Quod tamen dum viuus adhuc est foetus, vix aggrediuntur, nisi in tale discrimine mulier venerit, a quo si non mox liberetur, periculum illi & foetui imminet. Tutius tamen & sine calumniâ, extinctâ, partus difficultate, matre, si foetum adhuc viuere suspicio sit, vt illi succurramus, maturare, sectioneq; factâ in abdomine, foetus eximendus: quâ ratione multos liberatos fuisse experientia testatur, Caesariq; nomen inde quoddam casu vtero matris excisus fuerit, impostum, scribunt Historici: vnde & si caesim partus eximatur Caesarius dicitur. Sectione quoque rimam pudendi, si illa non satis pateat, foetiq; exitum praeccludat, dilatamus, vel nummo in acutiem redacto, vel nouacula. Orificiû autem ceruicis vteri sectione aperire periculosum, & fortè quia eandem quam ductus habet amplitudinem, inutile.

Exhibentur quæ vteri vias aperiunt, & facultatem ipsius excitant atq; sollicitant, vnde & menses prouocant, & vt foetus expellatur, adiuuant: quod & proprietate quadam faciunt. E quibus leuiora mature, validiora cum partus instat, validissima verò quæ foetum non solum promouere, verum & illi nocere possent, non nisi iam foetus mortuus, vel secundina retenta sit, vsurpantur.

Aquæ stillatitiæ conueniunt Sabinæ, Artemisiæ, Tappi barbati, fol. Iridis, flor. Liliorum alborum & Chamomillæ odoratæ.

Decocta in vino profunt, Pulegij, Artemisiæ, Sabinæ, herbæ Fabarum, flor. Cheiri.

Vel hoc: ℞. rad. Dictamini ʒ. β. rad. Aristol. Rubiæ mai. cort. Cassiæ fist. an. ʒ. ij. herb. Artemisiæ, Pulegij, Sabinæ ana M. j. flor. Lauandulæ, Chamom. Cheiri ana P. j. Cinnamon. ʒ. iij. Croci ʒ. j. decoquantur in Vino albo: Bibat de eo hauustum.

Efficacius hoc erit: ℞. rad. Aristoloc. ror. Cyclam.

Cyclaminis ana 3.j. fol. Sabinæ, Tamaricis ana 3.ij. decoquantur in vino : & bibat dilutum vno haustu vel duobus.

Succi competunt, earundem plantarum, ex quibus electuarium hoc parabitur, quo instate partu & paulò ante, se ad facilius pariendum, mulier disponat: R. rad. Enulæ, Consolidæ, Altheæ ana 3.iiij. herb. Pentaphylli, Betonicæ, Hysopi ana m.j. contundantur omnia recentia, exprimatur succus, qui depuratus, addito Saccharo coquatur ad spissitudinem, permisce Cinamomum, fiat instar electuarij: capiat duo cochl. ter in die, manè ante cenam, & cubitum itura: cōtinuando.

Vel necessitate virgente, succum Sabinæ vel Artemisæ, Porri, & imprimis rad. Cyclaminis, si haberi potest, separatim vel permixtos iniucem, cum vino bibant.

Pulueres sequentes sumat cum vino, vel aquis enarratis: vel ex iis saccharo permixto, puluerem aut tabulas formet.

R. cort. Cassiæ fist. rad. Diætami albi ana 3.j. Cinamom. 3.ß. Croci 3.j. fiat puluis: capiat vt dictum.

Vel sic: R. sem. Lauendulæ 3.ß. sem. Plantag. Endiuivæ ana 3.ij. Cinamom. Piperis ana 3.j. Croci 3.ß. fiat puluis: Sumat vt supra.

Lutei apices è staminibus flor. Liliorum alborum, vtiliter bibuntur in hoc casu, per se, vel alijs permixti, Italæ mulieres in oleo maceratos insolant, hocque oleum bibunt.

Succinum 3.j. pondere, si cum retentâ secundinâ fluor adsit sanguinis, prodest, cum eum cohíbendo, secundinas nihilominus pellat.

Vel hic puluis: R. rasuræ ofsium Dactylorum & cornu Cerui, cort. Cassiæ fist. ana 3.j. nucleorum Persicorum 3.j. Cinam. 3.ij. Sacchari 3.j. capiat cochl. ij. vel iiij. superbibendo aquas idoneas.

E' fortioribus hic est: R. Boracis 3.j. vel 3.iiij. Cinam. Croci ana 3.j. Zingib. 3.ß. Bibat cum aqua Cinam. vel vino Maluatico, vel fiat bolus cum confect. Alkermes, & detur in summâ imbecillitate.

Alter: R. Boracis, Myrrhæ, Aristol. añ. 3.ß. Croci, Piperis ana 3.j. fiat puluis: Bibat.

Ex inuolucris & vasis foetus remedium, aliqui admodum commendant: quod sic re-

ctius parabitur: Asseruata ab obstetricibus chorda vmbilicalis cum vracho, vna vel tres, in clibano siccantur, & puluerisatis 3.j. addunt Cinamom. Piperis ana 3.ß. Croci 3.ß. & cum succo Sabinæ in trochiscos formant, & cum vsus postulat, 3.ij. illorum puluerizata, vel solæ vel mixtæ cum precedenti puluere aliquo exhibentur.

Secundinam sic vstam & exhibitam, dolores parturientium eos qui partû sequuntur, mirè mitigare docet Rondel.

Trochisci de myrrhæ & Galliæ mosch. vtiliter quoque exhibentur à 3.j. ad 3.ß. cum vino Saluiato, sed rectius pilulæ inde formatae, propter ingratiam, dantur.

Pilulæ ex summe amaris & foetidis valde efficaces tales fient: R. Galbani, Myrrhæ ana 3.j. rad. Aristol. rot. Diætami, Gentianæ, ana 3.ß. Castorij (si assam foetidam addas erunt efficaciores) Croci, ana 3.j. cum succo Sabinæ, fiat massa: capiat à 3.ß. ad 3.j. procedendo.

Dantur & aluum laxantia per os, quæ si laxa sit, facilius pariunt, imprimisque Cassia conuenit & Tryphera: dein & simul stimulent alui facultatem expultricem, per consensum etiam vim vteri commouent; vnde & gravidis ne abortiant, cathartica minime exhibemus.

Resicientia varia quoque propinantur ad vires sustentandas, quibus hic in conatu maximè opus est, & lassas ex labore erigendas, tum in victus ratione, tum medicamentis, quibus & partum acceleratâ cōmiscemus. Confectio Alkermes valde probatur, præterquam enim quod cordialis, sopitam etiam facultatem excitat; datur cum vino, addito interdum borace. Vel: R. pulu. Diamoschi, Diamarg. cal. añ. 3.ß. Dentur cum Vino vel aquis: vel capiat Tabulas horum.

Suffitus & odores subtus facti, inter ea quæ hanc ob causam vtero adhibentur, cum in eum penetrent, primas tenent; si à vehementer odoratis vel foetidis fiant, & per embotum in vterum dirigantur.

Ex odoratis: R. Ladani, quod valde confert 3.j. Styracis 3.ß. Moschi, Ambrae ana 3.ß. Sacchari 3.j. fiat puluis vel trochisci, vrantur in carbonibus.

Oleum spicę vehementi odore expirans, orificio ceruicis vteri eam ob causam illinatur: quod aliqui infusum in pane, & applicatum admodum commendant.

Ex foetidis, Succini vsti, vti & Vngulę asini vel equi fumus, probantur.

Vel sic: R. Vngulę asini puluerisatę & cum pinguedine equi misce; Vre.

Vel: R. Galbani, Myrrhę, Asphalti ana 3. ß. Castorij 3. j. cum Felle vaccino fiant trochisci; Vrantur.

Sulphuris accensi fumum, si foetus iam mortuus sit, probat Dioscor.

Decocti Dictamni, & Botrys herbę suffitus exceptus, prodest.

Odores quoque suauis naribus, cum vires recreent, eo nomine adhibetur: nec metuendum, ne vterus foetū grauis, his allicitus sursum feratur, cum alio modo hoc in vteri suffocatione, vti dictum, accidat.

Immittuntur in sinum vteri, quę illū relaxent, lubricum faciant, & ad excretionem stimulent.

Ex relaxantibus potissimum decoctum hoc infunditur: R. rad. Altheę 3. j. femin. Lini, Foenogr. ana 3. ß. Sabinę 3. iij. fiat decoctio, colaturę adde olei communis vel Butyri 3. j.

Vel oleum per se iniicitur Amygdal. dulc. Chamomil. Vel in quo semen Foenogręci coxerit, addito pauco Irino. Lac item pingue infusum.

Vel intrudatur in collum vteri Lana succida, immersa prius in Butyro, Melle, mucilag. femin. Lini, ping. Anseris, inuicem mixtis, addito pauco Croco.

Ex foetum prouocantibus, succus Porri cum Croco & Myrrha, permixta, cū Lanā vel Spongiolā intinctā in illis, intruduntur.

Aut sic: R. Galbani, Oppopanacis, emollientum in Aceto ana 3. iij. Myrrhę 3. ij. Croci 3. ß. cum oleo Irino malaxentur, & formetur instar suppositorij.

Quod si foetum extinctū sciamus, infundimus succum Pulegij, Cetaurij min. Porri, Mercurialis, separatim inuicemve pmixta.

Vel suppenimus rad. Dictamni, vel Rubię, vel Bryonię, recentia in formā pessis fectę, oleoque inuncta & intrusa.

Vel: R. Mercurialis contusę cum Petrofelino, quantum pro pessario sufficit, semin. Nigellę & rad. Cyclaminis ana 3. j. impletur sacculus.

Fortius adhuc sic fiet: R. Agarici 3. ij. rad. Aristoloch. Azari, ana 3. j. Hellebori albi 3. ß. Colocynthis (quę venas admodum aperit) 3. j. Myrrhę 3. iij. succi Mercurialis cocti cum melle in formam syrupi, subigatur, impleantur sacculi pro pessariis.

Suppurantia, secundinam diutius retentam, si hisce non cedat, iniicimus, vt sic in pus conuersa sensim effluat, & ab vtero secedat, quod citra vteri noxā potest fieri, naturā partes corruptas a sanis sponte segregante.

Tale maturans infundatur: R. Amydi 3. j. dissoluatur in decocto Maluę & sem. Lini, addendo Vitellos ouorum numer. ij. Terebinth. discolata 3. ij. iniiciatur sæpè: addendo tandem etiam Mel ad deterisionem.

Vnguentum Basilicon dissolutum in Lacte, vel Oleo communi, infusum, maturatiuum est vsitatum.

Ægyptiacum vnguentum, vbi secundinā putrescere ex pure emanante cognoscimus, dissolutum in Lixiuio & iniectum, potenter abstergit & naturam ad expulsionem sollicitat.

In aluum quoque suppositoria indita, aluum soluendo, non tantum faciliorem partum reddunt, sed & stimulado, conatum augendo, qui in foetus expulsionem requiritur, præsertim si is cessarit, & tamen necessarius sit, & quia vicinum vterum quoque mouet, plurimum iuuant. Imprimis autē Clysmata infusa vtrumque præstant, & veluti topica vtero proximè adhibita sunt remedia: quę potentiùs adhuc, quàm extrinsecus admota operantur, de quibus nunc agemus, ex quibus & Clyster parari poterit, sicuti illic dicitur.

Infectiones ad relaxandas vias vltimo mense, si difficulter parere soleat, sæpè vsurpandę. Ex aquā calidā; addito interdum decocto emollientium, posteaq; axungis, butyro & oleo venter inungendus.

Præsertim verò, cum in partus est difficultatibus, si in balneo sedeat, vel eo fomententur ventris inferiora, ad dilatandum; fecundumque

tumque promouendum, magnum adfert ad-
iumentum.

Quod cum laxare præcipue volumus, sic
fiat: R. bulborum Liliorum, rad. Bryoniæ,
recentium ana ꝑ. ꝑ. Altheæ, Maluæ, Parieta-
riæ, Caulium ana M. j. femin. Lini & Fœnogr.
ana ꝑ. ꝑ. fol. Chamom. Meliloti ana ꝑ. j. fiat
decoctio pro infusione vel fotu. Vel sum-
atur illius ꝑ. j. atque additis Melle, Oleis, suc-
co Mercurialis, Hiera: fiat clyster.

Si verò vrgere fœtum volumus aut secun-
dinam: R. rad. Bryoniæ rec. ꝑ. ꝑ. rad. Dicta-
mni, Aristolochiæ vulg. ana ꝑ. j. Pulegij, Sa-
binæ, Rutæ, Artemisiæ ana M. j. Lupinorū,
baccarum Lauri, Iuniperi conquass. ana ꝑ. j.
flor. Lauandulæ ꝑ. iij. fiat decoctio in aquâ,
addito Vino: Utatur vt dictum est: Vel Cly-
stere adhibitis prædictis, ex eo fieri poterit.

Pannus intinctus in decocto rad. Aristo-
loch. rot. herb. Pulegij, Satureiæ, factæ cum
Vino, ventrique applicatus, ad secundinas
educendas probatur.

Lotiones pedum & crurum ex enarratis
quibusdam; vel omnibus, cum balneo non
vruntur, quoque adiuuabunt.

Vntiones post balneum, vel per se factæ,
idem præstant, quibus venter imus totus an-
teriore fede, & inferius cum pudendo, lum-
bique posterius cum coccyge inungi debet.

Relaxans sic fiat linimentum: R. ol. Li-
liorum, Cheirini, Anethini, Butyri, axung.
Anseris & Gallinæ, mucilag. semin. Lini &
Fœnogr. ana ꝑ. j. misceantur, adde Croci ꝑ. ꝑ.

Vnguentum resumptium id præstabit.

Ad fœtum verò promouendum hoc mo-
do: R. olei Cheirini, Rutacei ana ꝑ. j. ꝑ. succi
Sabinæ, Artemisiæ ana ꝑ. j. ꝑ. succi Porri ꝑ. ꝑ.
coquantur ad succorum consumptionem:
adde Myrrhæ, Galbani dissol. in Aceto ana
ꝑ. ꝑ. Stryacis liquidæ ꝑ. j. rad. Azari, Aristo-
loch. Cyclaminis ana ꝑ. j. Cinamom. ꝑ. ꝑ. Cro-
ci ꝑ. j. Cere q. s. fiat vnguentum.

Emplastra præsertim vmbilico, pectini,
pudendo adhibita, validius adhuc operan-
tur. Efficacissimum hoc est: R. recentium o-
mnium, rad. Porri, Polypodij ana ꝑ. j. Ari-
stoloch. vulg. ꝑ. j. Artemisiæ, Caulium, Ori-
gani, Tanacetii, Satureiæ, fol. Iridis ana M. j.
contundantur, addendo farinæ Lupinorum

ꝑ. j. applicetur instar cataplasmati, renouan-
do cum arescere incipit.

Cucurbitulæ, Frictiones, Ligaturæ in co-
xis & pedibus adhibita, deorsum reuellen-
do, partum quoque accelerant.

Amuletis plurimum vulgus tribuit, præ-
sertim in partus difficultatibus, quæ si non
viribus, saltem, quia dum spem bonam illo-
rum vsu mulier concipit, animum addendo,
iuuare possunt.

E multis probata magis sunt, si exuiæ
seu spolio serpentis cingatur.

Crocus collo appensus. Magnes manu
retentus.

Lapis ætites, coxæ aut plantis pedum al-
ligatus.

Polypodium elixum pedibus admotum.

Superstitiosa verba, Intuitus, & vt certa
quædam à marito mastificentur antequam
applicentur, omittimus.



DE VITALIS MO- TVS DEFECTV.

CAPVT X.

Genera.



ITALEM motum, operationem
illam vocamus, quâ omnes to-
tius corporis partes viuunt. Vi-
taq; dicitur: cuius defectum, quæ
& Virium defectum nominamus,

in partibus quæ mouentur, non solum in
motu voluntario, tunc quoque, sed aliis de
causis, quàm in motus impotentia dictum
fuit, quæ, viribus vitalibus nihilominus per-
sistentibus, accidit, labefactato cognosci-
mus, sed quod & reliquæ omnes functiones
vitales & naturales, in partibus tam mobili-
bus quàm immobilibus, sublata vel immi-
nutæ sunt. Quod aliàs generatim toti corpo-
ri, interdum speciatim certis accidit partibus.

Totius corporis virium defectum, non so-
lum ex functionum omnium distarum la-
psu, sed & ex motus cordis, & arteriarum pul-
sus remissione deprehendimus & iudica-
mus: variatq; quod vel debiliora hæc sunt,
vel omnino cessant.

Imbeci-
litas vi-
rium ge-
neralis,
schwach-
heit Ger-
man.

Debiliores si sint vires in vniuersum, motusque dicti segrè procedant, Imbecillitas generalis dicitur, Germ. *Schwachheit* vocat. Estque imbecillitas hæc nunc maior, nunc minor; aliàs ab ortu homini connata; aliàs postea superueniens; quandoque morbos præcedit; interdum in morborum principis vel progressu, aut circa finem inuadit.

In quâ corpus vniuersum egre & difficulter actiones obit, non vt in motus impotentia membris resolutis, aut ipforum actionibus alio modo impeditis, sed languidis ac veluti conuassatis: idq; plus minusve, prout maior minorve debilitas existit.

Arteriarum motus seu pulsatio aut pulsus, vt vocant, tunc quoque imminutus est. Et vel arteria non quantum oportebat dilatatur, paruusque pulsus dicitur: Vel mox, cum premitur remittit, pulsusque minor fit, qui Languidus vocatur: Vel tardè arteria extenditur, qui pulsus Tardus appellatur. Vel ex longis intervallis pulsus fit, qui Rarus nominatur: Vel nunc vnum, nunc duos; nunc plures ictus intermittit, qui Intermit-tens pulsus dicitur: Vel admodum est ob-scurus, in duobus vel pluribus iam enarratis generibus, delinquens, quales plures inueniuntur species, sicuti pulsus Miurus, Formicans, & Vermicularis appellati.

Extr-
ma imbe-
cillitas in
Agone
moris.

Cordis motus imbecillis similiter existit. Et tunc remissius & tardius, vel lentè admodum mouetur. Reliquas verò differen-tias, quas in pulsibus obseruare solent Medici, in corde vix annotant, neq; describunt, cum sufficiat arterias tangendo, vires vitales quo pacto se habeant, æstimare, præsertim cum pulsui, cordis motus, nisi aliis concite-tur, plerunque respondere soleat: & ex res-piratione quoque, cordis defectus aliquo modo cognoscatur.

Summa viriū est prostratio in Agone dicto, qui mortem, vitæ & virium omnium terminum & finem, proximè anteire, & bre-uis longiusve durare, grauius mitiusve ante obitum ægrum exercere solet. In quo, et si iam ob conflictum illum, quo mors cum vitâ luctatur, aut ob conuulsiones, quæ aliquando superuenire solent, membra adhuc exagitantur, vires tamen extremè deiectæ

& collapsæ sunt. Et pulsus aliquoties inter-mittere & sensum desinere incipit; flammæ instar, quæ deficiente nutrimento, cum ferè extinguitur, tamen paucillum residuum veluti lambendo, rursus se erigit, quo mox absumpto, penitus deficit; sic pulsus nunc se recolligens non nihil, mox remittens, donec omnino quiescat, inæqualiter se habet. Vti & cordis motus & respiratio, quæ antequam deficient, prius in illo agone laborantia, valde concitata sunt; ita vt & thorax vniuersus concutiat, alæque narium motu agitentur: sudorque è corpore crepitusque per inferiora (vnde animam eos cacare Poëta ludit) erumpunt, & morte iam proximâ sensum exteriora, quæ calor primum deserit, vt pedes, manus, nasus, postmodumq; cæteræ partes, saltem pectore adhuc aliquamdiu calente, refrigerantur. Donec iam omni cessante respiratione, ore oculisque apertis permanetibus, & colore corporis in luteum conuerso; quibus certis signis illos iam extinctos cognoscimus, vitæ finem faciant, animaque corpus derelinquat.

Sublatæ sunt aliquamdiu, viuente nihilo-
minus homine, vires omnes, functionesque
totius corporis, estq; præceptum virium lapsus, *Virium la-
sus, Syn-
cope.*
cessante & motu & pulsu arteriarum, vel pe-
nitius, vel saltem eatenus, vt amplius tactu
non deprehendi possint, in affectu qui Ani-
mi seu virium defectus, Deliquium, Lipo-
thymia, Lipopsychia Græcis, German.
Omacht, quasi sine viribus, & si grauius affi-
ciat, Syncope appellatur. Respiratione tunc
quoque omni abolitâ, adeo vt ne minimum
quidem illius, pennâ naribus admotâ, aliis-
ve indiciis explorari possit, quæ & in hoc so-
lo casu tamdiu, quamdiu ille perseverat, &
cordis motus sistitur, cum tunc respiratione
minimè opus habeat, nec eâ etiam frui pos-
set, citra hominis interitum, cessare potest:
sicuti verò dum comouetur, quia eâ conti-
nuò, ad spiritus vitalis generationem indi-
guat, illâ diutius, citra extinctionem carere
minimè potuit, & si tunc interelusa sit respi-
ratio, hominem mori necesse est. Corruunt
quoq; & labuntur subito & inopinatò, præ-
cedente saltem, interdum aurium tinnitu &
sibilo, illico amissis viribus, si grauis sit syn-
cope,

cope, vt in apoplexiâ; à quâ tamen, quòd illic pulsus cordis & arteriarum, & respiratio, licet difficilis & obscura sit, persistant, quæ sicut dictum, in hoc casu omnino desinunt, distinguuntur. Sudor frigidus, quem Syncopiticum vel Diaphoreticum vocant, sic prehenfis emanare solet: non ob digestam, vt volunt, solidorum substantiam, sed potius ob conflictationem naturæ & spirituum dissipationem; quæ & tanta est, vt non tantum tenues in ea humores erumpant, sed & excrementa crassiora sterces & vrina profundantur. Et quia tunc calor in exterioribus corporis quoque euanescebat, exteriora illorum, cum sudore adhærente, frigida existunt; palloreque vniuersum corpus occupans, illis locis quæ naturaliter rubere deberent, vt labiis potissimum, se primum manifestat.

Imbecillitas particularis. Particularis virium debilitatio, priuatis organis tam internis, quam externis nonnunquam accidit: quæ se in functionum illorum omnimodâ imbecillitate prodit, atque Imbellitas illius partis dicitur; non quæuis à morbo progressa, sed illa, quæ ob viuidam illam vim quâ viuunt, labefactatam, sicuti in causis explicabitur, euenit. Qualis, exempli gratiâ, ventriculi, hepatis, cerebri, oculorum, artuum vel membrorum nonnunquam occurrit imbecillitas: quæ, cum alia secum quoque adferat accidentia, quibus melius cognoscitur, illis in locis tractabitur.

Causæ.

In spiritu vitali insito, quòd spiritu in fluente non foueatur, aut humido visco non citatur: aut quòd alioquin absumatur, causa est omnium defectuum. Causa virium totius corporis lapsus, animi deliquij & partium priuatarum imbecillitatis, à partium similium spiritu illis connato & insito, vt vocant spirituosam partium substantiam constituyente, & vim viuificam seu vitam, vires & calorem, vt vocant, natium illis conferente, dependet. Qui insitus spiritus seu calor, singulis partium substantiis ingenuus, vt & cordi ipsi, (qui ei etiam alias spiritu etiam abundet, nihilominus ad vitam fuit necessarius) cum à spiritu vitali dicto, in cordis sinistro ventriculo genito, & per arterias omnibus corporis partibus, vt & ipsius cordis substantiæ per arterias coronarias communicato, atque influente, vnde Influens spiritus dictus, vt

continuo foueretur, viribusque nouis instrueretur, opus habuerit, vt influens spiritus illius insiti tanquam materia ex qua sustentatur, copiose generaretur necesse fuit, qui, cum facile rursus dissipetur, magnâ copiam corpus vniuersum singulasque illius partes perfundere debuit. Atque inde est, quod cor generationis illius spiritus officina materiæ requisitâ, aëre scilicet & sanguine è quibus eum format, perpetuo indiguit: quamobrem si illis destituatur, vel hæc parcius illi offerantur, causa vna, quare vires deficiant, existit. Vt fit si respiratione interclusâ, aëre cor diutius priuetur: tunc enim si cordis motus non prius ob alias causas, sicuti in animi deliquij causis dicitur, cessarit, sed perseueret, suppressâ respiratione homo extinguitur; cum cor, per motum dilatatum aliquoties, si non materiâ spiritus vitalis impleatur, concitat atque extinguatur: quod illi dum non mouetur, accidere minime potest, cum spiritu proprio uti & reliquæ partes adhuc aliquamdiu frui, viuere & subsistere possit: sicuti per syncopes accidere, & ob eam causam in eâ satis longo spatio respiratione abolitâ, nihilominus tandem ad se redire iterum, docuimus. Verum cum & sanguis, aëri in pulmonibus permixtus, materiam spiritui animali gignendo idoneam præbeat, si ille adeo per magnam atrophiam absumatur; aut in vasis obstruatur, vt illius ibi sit penuria, viribus hoc quoque plurimum incommodabit: quod tamen viuente homine, vt adeo exanguis fiat, & vt pulmones tantam sanguinis in se continentes copiam, ita inaniantur, aut vt vasa illius tam ampla, per quæ sanguis à corde cum aëre rapitur, adeo obstruantur, euenire vix potest. Cæterum non tantum ex eo, quod hi spiritus influentes non generentur, sed & quod geniti, admodum subitoque dissipentur, cum nec tunc insiti diutius persistere queant, vires concidunt. Idque quando vel omnino euanesce-re, corpusque deferere incipiunt, in agone mortis; illudque in morte postea penitus derelinquant: Vel saltem ad tempus à corde recedentes, mox iterum redeunt, in animi deliquio: Vel alias pauciores quam oportebat existunt, in imbecillitate. Verum, cum

hic spiritus insitus, præter influentem quo fouetur, etiam humido primogenio appellato, in quo residet, nutrirî & tanquam pabulo pasci, & cum continuò deperdatur, sic conseruari debuerit, illiusque humidi, substantifici etiam nominati, penuria se offerat vel defectus, vires quoque collabi necesse est: atque sic prout vel in corde; (nam & illius spiritus insitus proprio illic humido sustentatur) vel pluribus paucioribusve partibus accidit: occasionem vel mortî, vel generali aut particulari imbecillitati præbet. Sed & si insiti spiritus seu spirituosâ dicta partium substantia absumatur, vel, vt loquuntur, calor natiuus extinguatur, vel languidior fiat, aut, vt quoque dicere solent, pars refrigeretur, tunc si illud in corde fiat, (quod & proprium suum spiritum insitum, vt modo diximus, habet; præter vitalem, quo illius ventriculus redundat, alioquin enim propriis arteriis coronariis non indiguisset) illaque consumatur, mors, vel si imminuatur, generalis languor totius corporis, vt particularis membrorum imbecillitas, si in illis hoc accidat; sequuntur. Verùm à quibus causis, hæc spiritus insiti influentisque, à quo ille sustentatur, fiat dissipatio, illiusque humoris quo alitur, consumptio contingat, & quomodo ab insitis causis, aduentitusque proficiscatur, non indagandum.

Actus decursu humidi viuisfici consumptio, causa imbecillitatis virium.

Insitis de causis accidit, vt quibus copia spiritus insiti, seu caloris natiui, & humidi primogenij contigit, robustiores & viuaciores existant: quibus verò minimè debiliores sint, & ad mortem citius properent. Et cum viuידus ille humor, olei instar à calore spiritus illius sensum absumatur, tandemque consumatur, fit ætatis decursu, vt per senium debiliores fiant, demumque extinguantur.

Morbi, spiritum influentem fixum dissipantes, causa imbecillitatis virium.

Inter aduentitias causas, externæ internæque & morbi omnes, quæcunque vel admodum & vehementer infestant, vel quæ diu affligunt & perseverant, spiritus vitales dissipare, ac tandem etiam insitos cum humore in quo tanquam subiecto hærent, absumere possunt, sicque prout agunt, virium lapsus plus minusve, grauiorem causare. Quales sequentes potissimum, quæ id agunt, causæ existunt.

Euacuatio spiritus influentis fixum dissipantes, causa viriis defectuum.

Euacuationes nimix & frequenter factæ, vel casu vel studio, vel in morbis contingentes, spiritus exhauriendo vel dissipando, vires deiciunt: præsertim si vtillum humorû, vt seminis in gonorrhæa, vel per venerem sint excretiones, quæ immoderata admodum spiritus & humorem spirituosum absumendo, vires labefaciunt, & vt vocant, eneruât: Vti & sanguinis profusæ hæmorrhagiæ. Sed & excrementorum immodicæ deiectiones, ob spirituum tunc quoque agitationem, summpere virtutem prosternunt: vt in diarrhœis: sudoribus nimis frequenter: & mictu copioso, interdum euenit. Cum & eorû quæ præter naturâ sunt; vt aquæ in hydro-picis, & puris in empyemate, subitanea & omnimoda effusio, debilitet. Quæ excretiones violentæ, si cum dolore iungantur, veluti in dysenteria, vt vires magis corruant, præcreabunt.

Dolor spiritus exagitantis, causa viriis prostrationum.

Dolor grauis, cum admodum spiritus exagitet, illos, vt ad partem quæ eo affligitur, affatim cum sanguine feratur, & veluti suppetias in hoste abigendo ferant, comouendo; Imbecillitatem quoque & si vehemens sit dolor, animi defectum parit. Imprimisque si pars quæ patitur, cum corde magnam hæbeat affinitatem: vnde & qui cardiacâ laborant, ob oris ventriculi hunc consensum, tantopere prosternuntur, animoque facile deficiunt: peculiariterque hæc animi defectio Cardiacâ appellatur. Sicuti in aliis etiâ morbis, quod dolore vehementi conflictantur, vel eo diu infestantur, virium prostrationis causa existit.

Animi affectus spiritus exagitantis, causa imbecillitatis & synopes.

Animi affectus subitanei & magni, quia in illis spiritus extrorsum introrsumve cum impetu, feruntur, debilitatem causant, quandoque lypothymiam; sæpè mortem accersunt. Sic gaudio nimio profusis spiritibus ad exteriora, aliquos syncope corripit vidimus, mortuos alios legimus. In irâ quoque; etsi spiritus admodum efferantur, adeo vt rubore irati suffundantur, cum tamen mox iterum remeant, vti pallor mox subsequens ostendit, vix in vitæ periculum veniunt, admodum tamen eos quoque subitâ hac mutatione debilitari, tremor quem patiuntur, ostendit, & lassitudo, quæ licet ira iam deferbuerit,

rit, remanet. Neq; autem, quòd ob iram, vti ex gaudio, non moriantur, causa hæc, quod robusti tantum irati fiant, vti putarunt, existit, cum & senes & ægri simul ad iram proni, facillè commouentur. Terrore verò magno, spiritibus vehementer commotis, aliquos extingui, frequentius verò admodum debilitari, contingit. Quod pudor & verecundia eandem ob causam facere possunt; quibus & Homerum è medio sublatum scribunt. Sed & perseverantes diuturniq; si validi sint affectus, tristitia aut metus aliive, cogitatione indefinente, spiritus exagitant, tandem eosdem absumunt, & vti inquit, ossa exiccant: sic hanc spirituum consumptionem appellant.

Calor, spiritus dissipans, ipsorumque pabulum absumens, causa imbecillitatis.
Calor intensus & perseverans, spiritus non solum dissipare, sed & eos ipsorumque nutrimentum absumere potest. Si ab æstu, igne, labore, corpus calefactum debilitatur, animoque interdum deficit. Quod & in febribus continuis atq; intermittentibus, calore in summo existente, aliquando accidit, & in causone hominem nonnunquam conficit. Sed & in febribus hæsticis calor cordis extraneus, licet non magnus, perseverans tamen, humidum primigenium non cordis solum, sed & partium solidarum depascens, spiritusque absumens: vires deijcit hominemque tandem consumit.

Frigus, calorem nativum refrigerans, causa imbecillitatis.
Frigida intemperies calorem nativum extinguit, vel remissiorem facit. Ita refrigerato uniuerso corpore in aëre frigido, aliqui mortui sunt: quod & in aqua frigida moram trahentibus, potest accidere. Et partes quoque certæ corporis frigore inteso, interdum siderantur, & emoriuntur, vel ita debilitantur, vt postea rectè ad se amplius redire nequeant: Quod ex frigida potu, ventriculo etiam euenire potest. Quod & referre possumus, si ob intermissionem exercitij & otij, partes frigidiores, calore nativo non in actum deducto, & torpidiores fiant. Ab aliorum potentia refrigerationis vsu, intrinsecus vel extrinsecus adhibitorum, imbecillitatem quoque partes contrahunt, vix autem omnimodam, sicuti ab actuali frigore, caloris nativi extinctionem patiuntur. Licet hoc, à narcoticorum summâ frigiditate, fieri posse, hæc

nus creditum sit; quæ nos non refrigerando, sed cerebrum stupefaciendo nimio ipsorum vsu mortem inferre, alibi docuimus. Sed neque obstructis frigore corporis, calorem tunc, quod non eueniretur, suffocari, vt vocant, concedimus: cum sicuti alibi docuimus, cuius non vt aërem intromittat, sed è corpore aliquid potius emittat, perforata sit.

Qualitas maligna, tota substantia cordi infensa, si illud inficiat, aut spiritibus illius permisceatur, vt illius vis & calor nativus, & per consequens omnium corporis partium extingatur, vel diminuat, efficiens, mortem vel syncopen vel imbecillitatem, prodiuersitate illius qualitatis, procreat. Ita ex pestiferâ illâ aurâ, peste correpti, subito viribus deficiunt, animo delinquant, citoq; moriuntur. Aut aliâ noxiâ qualitate cordi aduersâ infecti, morbo contracto, adeo prosternuntur, & periclitantur: sicuti in febribus syncopalibus, ob id, dictis, quod semper cum syncope inuadant, accidit. Et ex veneno sumpto, vel ictu, corpus subeunte, aut in corpore genito, cordi insidiane, in vitâ discrimine veniunt, aut virium lapsum patiuntur. Quod & partibus singulis accidere potest, vt venenum quod illis potius quam cordi totâ naturâ contrarium, illarum quoque vires vel omnino, vel ex parte pessundet.

Solutio continui ex vulnere in corde facto, si ad ventriculum sinistrum vsque penetret, quia tunc spiritus subito euanescent, omnium virium prostrationem & mortem subitanæ inducit. Si verò ad dextrum illius ventriculum permeet, aut in superficie illius venas coronarias discindat, & tunc ob hæmorrhagiam magnam, vitâ mox priuantur. Euadere aliquos vix puto posse, etsi sola ipsius substantia diuisa sit, cum pars princeps tales læsiones perferre nequeat. Ex vlcere tamen illic à causis internis genito, ægrum sensim contabuisse, antequam extingueretur, se obseruasse Fernell. scribit. Quod & ex rumore, si cor illud pateretur, forte contingeret; quæ tamen & rara, & cum cor non sentiat, cognitu, homine non aperto, sunt difficilima. In partibus aliis corruptio magna & putredo, calorem illarum viuificum quoque extingunt.

Qualitas maligna cordi infensa, causa virium defectus.

Vulnus in corde, causa virium lapsum & Mortis.

Corruptio partium, causa imbecillitatis partium.

Curatio.

Virum im-
becillita-
tem & la-
psum: vi-
& Syn-
copes cu-
ratio.

Hæc qua ratione in virium defectibus di-
uerfis, & potissimum in generali imbe-
cillitate, & summâ virium prostratione, atq;
animi deliquiis & syncope, institui debeat,
hic explicabitur: quæ & priuatis partium
debilitatibus conueniet, licet in illorum a-
liis symptomatis, quæ illas comitari solent,
quâ ratione vires quoque ipsorum reparari
debeant, explicemus. Pro causæ autem va-
rietate, quæ virium defectum parit, hic & a-
gendum & prædicendum. Quæ si ob aëris
penuriam, respiratione sublatâ, procedat,
quomodo respiratio reuocanda sit, in illius
defectu explicatum fuit. Si ab ortu vel senij
causâ, quod aliis citius, aliis tardius superue-
nit, debiliores sint: cum neque insitas causas
mutare, aut humidum radicale, vt vocant,
successu ætatis amissum, reparare queamus,
aut mortem auertere, frustra laboramus. Ab
euacuatione nimîa vires deiectæ si sint, noxa
grauior erit, si à Venere aut hæmorrhagia id
fiat, quam imbecillitatem hydrops fere ex-
cipit: à sudoribus si deficient, reprimendi: vt
suo loco dicitur. Si à dolore debilitentur,
causa illius primum auferenda, dolorq;
mitigandus est, imprimisq; si cardialgia synco-
pen aut imbecillitatem pariat, illius causâ
vomitum prouocamus, euacuamus, ventri-
culumq; roboramus, sicuti in cardialgia ex-
plicabitur. In animi affectibus, gaudio ali-
quos subito extinctos, docuimus: imbecilli-
tas, quæ ab alijs mentis dolorib; gignitur, si
diutius perseverarit, & præsertim à terrore
impressa maneat, ægrè quoq; reparatur. Si
ab intemperie calidâ vel frigidâ id fiat, con-
trariis emendanda. Qualitas maligna, pesti-
lens, venenata sæpè interficit: quorû nomine
euacuationes instituimus, ipsorumque vim
antidotis refringimus. Solutio continui in
corde facta, lethalis est; & corruptio omni-
moda viscerum aut partium, inemendabilis.

Hiscæ obseruatis, nihilominus, etsi desper-
atum sit malum, vires restaurâtibus & cor-
dialibus illos aliquamdiu adhuc etiâ in ipso
mortis agone, ad extremum spiritum vsque
sustentare studebimus. Vel si adhuc spes ali-
qua, aut imbecillitas non aded impressa sit,

vt curari possit: vt si fiat ab euacuatione aut
dolore, animi affectu, aut post morbum reli-
cta sit debilitas, illis ed audaciùs cumq; me-
liori spe successus vtemur: & si syncopen in-
ducant, quæ illos à paroxysmo mox liberare
possunt, hocq; finito, quæ ab eo præseruare,
exhibebimus & adhibebimus. Quorum om-
nium exempla quædam hic proponemus.

Nutrientur alimentis, quæ bonû succum Reficim-
& copiosum etiam minimâ quâtitate gene- tia vires,
rant, quæ facîle concoquuntur, ea sæpè pa- Cordia-
rumq; de illis exhibendo: potissimum senes lia dista-
& qui à morbo debilitati conualescunt, & remedia,
ex magnis euacuationibus vires amiserunt.
Et si in summâ debilitate crassiora digerere
nequeant: dentur iuscula, confusa, expressa,
congelata; sicuti hæc variis artibus paratur.

Iusculi forma hæc est conueniens: R. iu-
sculum Gallinæ vel Caponis, & in eo deco-
que parum Oryzæ & fol. Borraginis tenera,
recetia, adde in fine vitellum Oui, Aceti ros-
parum, vel succi Pomorum acidorû aut Ci-
tri vel Vini, parum, Maioranæ & Nucis mo-
schæ: Croci tantillum, Salis q. s. Detur.

Vel pulpa cocta carnî Caponis, vel Galli-
næ sumatur, contundatur & cum iure dis-
soluatur, additisque prioribus, exhibeatur.

Ex vitello Oui, Vino, Saccharo & Buty-
ro, edulium Germanorum, valde vires re-
parat.

Succus qui ex Capone asso exprimitur,
vel dum torretur, emanat in sartagine, si
ablata pinguedine, oui vitello permisceatur,
additâ Nuce mosch. & Sale, & coquatur, ef-
ficax erit restauratiuum.

Congelata ex succis hoc nomine varia
sunt. Sumendo Caponem præparatum, in-
cisum cum paucâ Vitulinâ leuiter salitâ & a-
romatizatâ, nullo liquore vel paucò Vino
saltem addito, eaque diu admodum vase in-
clusâ, in aquâ bulliente coquendo, succum
que postea, qui ab illis separatur sensim ef-
fundendo, & à pinguedine colando, & do-
nec congeletur in frigore seruando: qui per
se reliquisque permixtus exhibebitur.

Vinum præcæteris subito vehementerq;
reficit, cuius effectum veluti actu agentis, in
momento ægri experiuntur, eoque refocil-
lantur, etiam hi qui animi deliquium passi
sunt.

sunt. Datur per se, fragrans subdulce; interdum saccharo dulcoratum: interdum etiam aromatizatum cinamomo alijsve.

Panis micâ intinctâ in Vino præstanti, rescimus eos qui animo deliquerant: addito interdum succo Pomorum, Limonum vel Granatorum & Cinamomi.

E medicamentis quæ exhibentur ad spiritus, humoremque, pabulum ipsius, conferuanda & recreanda, sequentia sunt.

Aqua Cinamomi stillatitia propinata hîc valde iuvat.

Vsitatum hoc est: R. Iulep Rosacei ʒ.ij. aquæ Cinamom. ʒ.ʒ. Capiat frequenter.

Vel sic: R. succi Pomorum fragrantium acidulorum ʒ.ʒ. Vini maluatîci & aquæ Cinamom. ana ʒ.ij. Bibat.

Aut hoc modo in cardiacâ passione: R. aquarum Melissæ & flor. Lauandulæ ana ʒ.ʒ. aquæ Cinamom. succi Limonum vel Pomorum, vt dictum. Vini maluat. ana ʒ.ij. Bibat.

Iulepis frequenter vtuntur, præsertim in febribus & siti: R. syrup. Viol. Buglosi, Nenuph. ana ʒ.ʒ. Iulep Rosacei ʒ.ʒ. aquar. Ros. Buglosi vtriusque, Melissæ ana ʒ.ij. Cinamom. ʒ.ʒ. misce: Bibat ad ʒ.ij. vel iij.

Destillatum instaurans dictum, sæpè exhibendû: sic paratur: R. Iuris Capi & cordis Bouis vel Cerui, simul perfectè cocti mens. j. Vini Maluatîci tb. j. pomum Arantium vel Limonium, vel aliud, vt dictum, dissectum in partes, vnum vel duo, rad. Galangæ, fol. Melissæ ana ʒ. j. Cinamom. ʒ. ʒ. Gariophyll. ʒ.ij. femin. Coriandri, Ocimi, florum Rosarum, Scabiosæ, Buglosi vtriusque ana ʒ. j. Croci ʒ. j. rasuræ cornu Cerui, Eboris ana ʒ. j. misce; eliciatur aqua: quæ per se datur, vel cæteris commixta.

Vel sic: R. cort. Citri sicci, rad. Angelicæ, fol. Melissæ, flor. Borrâg. sem. Ocimi ana ʒ.ʒ. Cinamom. ʒ. iij. Gariophyl. spec. Diamargarit. frig. ana ʒ. j. infundantur in Vino destillato: Detur infusi, coch. j. vel ij. cum Sacharro ros. tab. vel Vino albo.

Cordiales dictæ potiones, quibus in agone quoque mortis, ægrum letho eripere studemus, sic fiunt: R. confect. Alkermes ʒ. j. pulu. Diamarg. frig. ʒ.ʒ. syrup. de Acetof. Citri ʒ.ʒ. syrup. de Papau. ʒ. iij. cum aquâ Rosar.

Buglos. & Cinamom. fiat potio. Hæc & in doloribus hominem prostermentibus utilis, autâ præsertim syr. Papauerini quantitate.

Vel sic, quæ & in veneno sumpto conueniet: R. confect. de Hyacintho ʒ.ʒ. vel si non habetur, spec. Diamarg. frig. Diamoschidulc. ana ʒ.ʒ. syr. de Acetof. Citri ʒ. j. aquarum Scabiosæ, Melissæ q. s. fiat potio.

Theriaca aliaque Antidota opiata, si à veneno aut cathartico violento, animo deficient, conueniunt.

Tabulæ Manus Christi appellatæ, & Diamargaritonis frigidi, in vsu sunt frequent.

Vel tales fiant: R. spec. Diamargar. frig. spec. Cord. vel el. de Gemmis ana ʒ.ʒ. ol. Cinamom. gut. iij. Sacchari dissoluti in aqua Ros. ʒ. ij. fiant tabulæ.

Vel: R. Coralli ʒ. j. fragment. Lapidû pretiosorum, Margarit. rasuræ Eboris ana ʒ.ʒ. sem. Citri, Acetof. Ocimi ana ʒ. j. Cinamom. Maceris ana ʒ. j. ligni Aloës ʒ. j. Moschi gr. ij. cum Saccharo: fiat puluis, vel tabulæ.

Olea Corallorum, Perlarum & similia hisce addi possunt.

Auro potabili, aliorumque elicitis spiritibus, vt vocât, elixirque appellatis, Chymistæ se non solum vires, sed & vitâ conferuare, seniumque impedire posse, satis friuolè pollicentur.

Odore suauis prædita, admodum refocillant, & syncope præhenso, vt ad se citius redeant, efficiunt. Qualia permulta sunt, odoramenta, suffitus, & quæ per cubiculum, lectumque sparguntur: nos quædam quæ in animi defectibus, naribus adhibentur, & subito parari possunt, tantum proponemus.

Acetum rosaceum spongia vel panno exceptum naribus adhibetur: efficacius erit, si Pulegium contusum cum Aceto admoueas, vel Ocimum. Vinum item olfactum.

Gariophyllos mandere solent, & halitum postea in nares & os, animo delinquentium, insufflare.

Vel sic: R. Gariophyllorum, Santali citrini (quod valde commendant) Rosarum ana ʒ. j. Camphoræ ʒ. j. contundantur cum Aceto, adhibeantur naribus.

Aliter: R. aquæ Ros. ʒ. j. aceti Rosacei, succi Pomorum ana ʒ.ʒ. Gariophyl. ʒ.ʒ. ol. Spicæ gut. j. Admoue.

Ciueta illinantur nares, vel Oleis chymicis odoratis, Gariophyl. Cinamom. cera albâ subactis.

Cordis & pulsuum regioni epithemata vel alia apponuntur. Vt: R. aquæ Ros. ʒ. iij. Vini odor. ʒ. ij. Aceti ros. ʒ. j. succi Pomorum redol. vel Limon. ʒ. ʒ. Gariophyllorum ʒ. j. Croci ʒ. j. misce.

Vel sic: R. aquæ Ros. Melissæ, Scabiosæ ana ʒ. ij. Aceti ros. succi Pomorū ana ʒ. j. spec. Diamarg. frig. ʒ. j. Camphoræ ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. misce: fiat epithema.

Pulueres in sacco positi & decocti in Vino, loco illorum, pulsibus alligari possunt: R. Gariophyll. ʒ. ij. Galliæ mosch. ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. feminis Ocimi ʒ. j. Camphoræ ʒ. ʒ. puluerisuntur. Vtatur vt dictum.

Vel inungantur pulsus: R. ol. Gariophyl. ol. Cinamom. per destill. ana gut. iij. Ceræ parum, misce: Vngantur pulsus.

Liniatur quoque cordis regio vnguentis in palpitacione cordis explicandis, vel oleo Iasmini: vel vnguento Nenuph. Citrino hisce vsibus destinato.

Vel huius loco: R. olei Nenuphar. ʒ. ij. succi Citri, aceti Ros. ana ʒ. ʒ. coquantur ad consist. adde Santal. omnium, Rosarum, feminis Acetosæ an. ʒ. j. Coralli ʒ. j. Margar. ʒ. ʒ. Camphoræ ʒ. ʒ. Ceræ q. s. fiat linimentum.

Vel applicetur hoc emplastrum: R. Theriacæ ʒ. j. ʒ. Cerati santalini ʒ. ʒ. ʒ. Diamoschi, Diambrae ana ʒ. j. ʒ. misce: Applicentur.

Sacculus cordialis: R. Santalorū omnium ana ʒ. j. ligni Aloës ʒ. j. cort. Citri sicci, fl. iij. Cordial. Scabiosæ, fol. Melissæ ana ʒ. ʒ. rasura Eboris vel ofsis de corde Cerui ʒ. ij. spec. Diamoschi ʒ. j. fiat sacculus, irroretur Vino & aqua Rosac. vel illorum vapore imbuatur. Postea cordi applicetur.

Facies si irroretur vel aspergatur aquâ frigidâ: cui Rosacea vel Acetū aut Vinum permisceri possunt, citius à paroxysmo in animi deliquio, liberabitur.

Quod & frictions ad dolorem vsq; factæ; ligaturæ item extremitatum, faciunt.

Compressio etiam narium & tractio, Orisque patefactio, Linguaeque frictio.

Excitantur quoq; citius clamore & strepitu; & si ad sternutationem cōmoueantur.

Si capite declinui, corpore altius collocentur, citius ad se redeunt.

Quieti extra paroxysmū maneant: nam qui debiles sunt, ex leui commotione animo deficiunt.

DE VITALIS MOTVS DEPRAVATIONE.

CAPVT XI.

Genera.



VITALIS motus, quem in functionibus tam voluntarijs, quam inuoluntarijs partium, motuq; cordis & pulsu arteriarum spectari diximus, si deprauatur, non vt in defectu illius in functionum dictarum defectu, sic hîc in deprauatis functionibus, in illis obseruamus: cum nimium vitâ frui, vel corpus vniuersum aut partes illius nimis robustæ esse minimè possint, & si quæ motu voluntario aguntur partes, nimium aut sinistrè moueantur, hoc ad deprauatū ipsorum motum voluntariū, de quo diximus, pertineat. Verum deprauationem vitalis motus hanc, in pulsu cordis & arteriarū potissimum notamus, cum vel frequentior vel vehemēior hæc pulsatio, quàm naturaliter esse debebat, existit: vel aliàs inordinatè procedit.

Frequentior, quàm par erat cordis arteriarumque pulsus sæpè fit, tam in sanis aliisquin, quàm ægris; respiratione tunc quoq; vel citâ, vel minimè concitatâ: quem & si magnus simul sit, cū molestiâ aliquâ qui hoc patiuntur in thorace, collo, & in capite, & in ipsis auribus, cum dolore in cephalalgijis sentiunt: atq; contactu non tantum si frequens & magnus, sed & parvus & citus sit, in locis non solum dictis, sed & in omnibus in quibus pulsus se manifestant, deprehenditur, & a Medicis in carpo tangitur.

Vehemens & immodica pulsatio seu agitato & concussio cordis & arteriarum, symptoma est, sæpè per se, aliàs in cæceticis puelis, præsertim antequam menses erumpant; vel melancholiâ hypochondriacâ laborantibus, eueniens; quod cordis Palpitationem & Tre-

Cordis et arteriarum citâ pulsatio, siue magna, siue parua sit.

Cordis palpitatio.

Aneurisma.

& Tremorem, quia cum inæqualitate aliquâ hic fit motus, appellant. Hæc quia semper valida est, manifestè in pectoris sinistrâ regione pulsare sentitur, sæpè & in iugulo, nonnunquam & sub hypochondrijs, sinistro præsertim; molestiam magnam ægro parit, eumque admodum, si perseveret, debilitat. Aliquoties quoque vi & impetu, costas thoracis vicinas impellens, interdum etiam, teste Fernelio, confringens vel potius laxans aut loco pellens. Quandoq; etiam arteriam ita dilatans, extrorsumq; propellens, ut tumor, quem aneurisma vocant, inde magnus in sede aliquâ corporis apparès & pulsus nascatur. Remittit quandoque hoc symptoma, citiusque vel tardius rursus redit, aliàs leui ex causâ; aliàs alio tempore. Duratq; paroxysmus quoque diutius interdum; vel brevius mitiusve vel gravius, ut dictum, afficit: aut statò tempore exacerbatur.

Pulsus inordinatus et inæqualis.

Inordinatus & inæqualis pulsus, in prædictis, ut dictum, etiam observatur, molestiamq; parit. Qui verò leuius pulsât, non ut symptoma, sed signum tantum, morbum & vires declarans, consideratur, eamq; ob causam à Medicis tactu exploratur.

Causæ.

Sedes affecta.

Cor & arterias suo motu pulsationem hanc depravatam efficere, cum non aliud pulset, certum est. Quorum motum & pulsus, cum moderatè & decenter fiunt, sani minimè sentire debuerunt, idque ne impedimentum hic sonus & strepitus corpori nostro adferrent: sicuti accidit, quando vehementius, ut dictum, pulsantibus vicinasque sedes quatientibus, pulsus hunc ægri cum molestiâ sentiunt, & nonnunquam audiunt: illis præsertim in locis, ubi arteriæ sunt maiores pluresque, liberæque nec musculis immersæ, ut in sinistrâ pectoris regione, non tam ob cordis sinistrum sinum & auriculam quoque se mouentem, quam arteriam magnam, illic à sinistro cordis sinu prodeuntem, & per sinistrum vertebrarum latus descendentem. Dein & in iuguli utraq; sede, quam arteria magna ascendens diuisaq; perrepat, illicq; soporales & brachij arterias profert. Sicuti & sub hypochondrijs, si-

nistro præsertim, tum quia arteria magna illic descendens, sinistro potissimum lateri adhuc insistit: tum quia magnas ibi arterias, quæ venæ portæ ramos, sinistrum potissimum, ad viscera naturalia & lienem propagatos, comitantur, promit. Ob quas causas, illis præcipuè in sedibus, cum arteriæ vehementer pulsant, pulsus sentitur molestiamq; parit. Alijs autem in locis, ubi minores sunt arteriæ, aut absconditæ, non adeò, etsi validus quoque ipsarum sit pulsus, observatur: nisi ob dolorem partis vicinæ, quæ vel leui contactu exacerbatur, arteria suo motu eam percutiente, pulsus, eumq; cum dolore sentiunt. Vti in capitis doloribus, ob sinus cerebri magnos pulsantes, & in inflammationibus, pulsantem hunc dolorem ægri experiuntur, vel si ob vicinum nervum, in loco angusto, arteriolâ vel minimâ validius pulsante, eum afficiat: sicuti in auribus hoc accidere, pulsusq; hunc si concitatus sit, auditui obstrepere, scimus. Sed & in nudis & excarnibus corporis locis, quod arteria defertur, pulsus tam naturalis quam deprauatus, contactu explorari, & qualis sit dijudicari potest: quod uti in corpore maximè fieri solet, ita & in alijs locis quoque observatur. Causæ verò, quarum occasione, cor & arteriæ tantoperè ad pulsus illos edendos, concitentur, veriores sunt: spirituum vitalium dissipatio: & arteriarum repletio atq; dilatio: quibus alias quoq; minus probabiles adiungunt Medici: de quibus singulis nunc iudicium nostrum interponemus.

Spiritus vitales influentes dicti, si subito aut nimium dissipentur, ita ut insiti illis frui & gaudere continuè & sufficienter nequeant, cum necesse sit, semper novos à corde vniuerso corpori subministrari; idq; per hanc pulsationem cordis & arteriarum fiat: non mirum tunc motum quoque illarum intendi, celerioremq; & si causa magna sit, vehementiorem fieri, respiratione tunc simul concitatâ, quæ spiritui vitali, sicuti dictum est, gignendo materiam semper suggerit: quod & spiritibus cum sanguine agitatis, illisq; cum corde & arterijs vehementius calescatis, accidit.

Agitatis nimium spiritibus, subitoq; huc

Spiritus

nimis ad illucve propulsis & dispersis, nec æqualiter
 gitatio, corpori communicatis, vt noui mox repo-
 nantur, pulsatio hæc cordis & arteriarum ci-
 ta insurgit, respiratioque intenditur: quæ
 nisi suppetias ferrent, vires mox, sicuti di-
 ctum est, collaberentur. Quod à motu cor-
 poris & animi, sicuti in respiratione, quam

quoque promouet, citâ, ostensum fuit, pro-
 dire solet. Vnde per affectus animi, iram, gau-
 dium, terrorem, metû, pudorem, spiritibus
 commotis, pulsatio hæc ad eod. incrementum so-
 let: quod cognoscens Erasistratus, ex pulsus
 illa subitâ, propter intuitum nouercæ, quam
 deperibat, commotione, hoc ex affectu ani-
 mi, amore scilicet prodire, deprehendit &
 coniecit. Quæ & causa est verior, quare ex
 motu corporis valido vel celeri, nō solum re-
 spiratio, vt in respiratione citâ dictum est,
 sed & pulsatio hæc, intenduntur frequentio-
 resq; hant. Quod & citius in debilioribus vel

dispositis accidit: vnde & vel leue exercitiū
 cordis palpitatiōe, in ijs qui huic malo ob-
 noxij sunt, commouet: sicuti eam, in veneris a-
 ctu sibi statim superuenire solere, quidā mihi
 fassus est, ab eaq; ad eod. se angere, vt nisi desiste-
 ret, suffocaretur; quod & tandem illi accidit.
 Sed & spiritibus alijs de causis dissipatis,

& vt in agone mortis iam euanescente inci-
 pientibus, concitior, etsi summa interim
 adsit debilitas, est hæc pulsatio: per quam na-
 tura, in extremo periculo posita, hoc motu,
 spirituumque recollectione, adhuc suppetias
 ferre nititur.

Incaleſcentibus quoq; spiritibus vnâ cām
 sanguine, non tantum quod tunc efferue-
 scentes inquieti sint, sed & quia tunc citius
 absumuntur, fit vt & cordis motus arteria-
 rumque pulsus, vt quod citò deperditur, citò
 iterum refarciant, augeantur. Siue hoc ab
 externis causis, calore solis aut ignis, inter-
 nisve fiat; eoq; magis, si & cor simul incale-
 ſcat: diutiusque perseverat, si calor ille in eo,
 sicuti in febribus contingit, diutius impres-
 ſus hæreat. Vel si à motu corporis calor ille
 suscitetur: aut dum caleat, corpus exerceat,
 gemitū tunc accedente causâ. Aut animi ta-
 lis sit affectio, quæ non solum spiritus exagi-
 tet, sed & accendit: qualis ira existit. Aut o-
 mnia hæc tria simul concurrant; sicuti in

exercitio pilæ paruæ, nobilem admodum
 calentem, iraq; correptum, tantopere in pul-
 satione hac & respiratione commotum fuisse
 vidimus, vt cum recolligere se non am-
 pliùs posset, nec motus hi remitterent, ex-
 tinctus subito fuerit.

Repletis arterijs nimiumq; dilatatis à san-
 guine, copiâ suâ arterias implente & disten-
 dente, (cum, vt spiritui vitali locum minimè
 præoccuparet, non ad eod. sanguine, vt venæ,
 turgidæ & impletæ, cū naturaliter se habent,
 sicuti apparet, esse debeant) quia tunc am-
 plioribus illis factis, pulsus illarum, quem
 prius cū moderatus erat non sentiebant,
 maior pleniorq; factus, ab ægotantibus per-
 cipitur; vehemens illa & apparens circa cor
 & arterias maiores præsertim diastole, in cor-
 dis palpitatiōe distâ, suboriri solet: tunc po-
 tissimum infestans, seq; manifestans, cū af-
 fluente hoc sanguine admodum, vel in sini-
 strum cordis ventriculum illique connatam
 auriculam, quæ admodū dilatari potest, vel
 arteriæ magnæ exortū aut progressus illius
 sedem aliquam, nimium eæ adimplentur
 distendunturque. Et tunc iterum remittit,
 quando ab illis locis aliquomodo refluens,
 non amplius ad eod. illas attollit dilatatve. Vel
 perseverat quoc; molestat, sicuti alicubi ar-
 teria, sicuti Fernellius se obseruasse scribit, di-
 latetur, vt tumor magnus, aneurisma dictus,
 inde sequatur: quod intrinsecus, in magnæ
 arteriæ aliquâ sede, in pectore, iugulo, hypo-
 chondrijs, vel etiam in ipsâ cordis auriculâ,
 quæ & ipsa valde ampliari potest, natū, non
 minus quàm externum aneurisma, perpe-
 tuo pulsantem sensum, in eo loco vbi est, mo-
 uet: illiusq; cordis palpitatiōis dictæ, quæ
 tamdiu durat, hominemque tandem confici-
 cit, causam aliquando esse, sectio nobis, si in
 illis, qui hoc morbo extinguuntur institue-
 retur, sicuti à quibusdam obseruatum est, si-
 ne dubio patefaceret. Ex copiâ autem san-
 guinis arteriosi, hæc proficisci potissimum,
 cum non aliud arteriæ in se contineant, satis
 patet, Galenusq; eo, quod omnes sanguinis
 emissionem sanari vel iuari scribit, etiam vi-
 detur innuere. Quæ & pulsatio eod. maiori vi
 fit, quod sanguis & spiritus illi confusus, ar-
 terias implentia feruidiora existunt. Qualem

Sanguinis arteriosi copia & feruor, arterias replens, causa Cordis palpitatiōis.

sanguinem in arterijs, summo ex calore veluti retorridum, biliq; atræ comparatum, seprehendisse testatur quoque Fernelius. Quem nos sanguinem biliosum feruidumq; præcipuè, nunc inquinatum & impurum in arterijs meseraicis collectum, maioribusque arterijs infusum esse, hisce demonstramus. Quòd eiusmodi succus, qualem in venis meseraicis frequenter nasci ab esculentis potulentisq; alibi docuimus, sicuti ex venæ portæ ramis in cauam venam translatus, sanguinem illic accendere & contaminare solet: ita quoque in meseraicas arterias, singulis venis meseraicis annexas, quandoque se insinuat, indeq; in maiores arterias per latus, illarum sanguini confunditur, & cum eo vndiq; etiam ad cor vsq; diffusus, sic illas implet, modoq; enarrato afficit: eoque facilius, quòd arteriæ hæc meseraicæ, propagines magnæ sint arteriæ, venæq; meseraicæ à venâ cauâ minimè proficiantur, nec illi nisi intermedio hepatis substantiæ, continuentur. Hincq; adeò frequens hic affectus virginibus, causâ suppressorum menstruorum, malum acquirentibus habitum, melancholiaq; hypochondriacâ laborantibus, existit: in quibus, vbi venarum, & arteriarum sanguinis plenitudo vitiumque, cacexiæ & melancholiæ; sic cordis & arteriarum pulsationi, occasionem præbet.

A flatibus autem, sicuti aliqui voluerunt, arterias implentibus, hoc quoq; fieri posse, cum neque venas ijs repleri, aliquis obseruarit, approbare minimè possumus. Vt neque vapores circa præcordia aut lienem aut vterum collectos, arterijsq; vel cordis sinui insertos; Vel crassum vaporem cordi inclusum, aliundève eò importarum, sicuti scripserunt, adeò illa implere posse, vt talis pulsatio sequatur, concedimus. Quod alias causas cordis palpitacionis, quas describunt, attingit, atq; inter eas præcipuè aque vel etiam flatuum in pericardio, redundantiam, nec eam, tanquam veram huius cordis pulsationis causam, assignandam censemus; sed potius fluctuationis alicuius, tunc saltem, cum corpus mouetur, se in pectore, vt palpitatio dicta, sed longè aliter, nimirum cum fluctuationis sono potius, vt dictum, quam in pulsu

manifestantis: sicuti de hoc vitio, quod caceticis simul cum iam enarratis potest accidere, in sonitibus præternaturalibus, qui in corpore audiuntur, suo loco dicemus.

Cordis affectus alij præter enarratos, inter quos & calorem cordis spiritus agitantem & dissipantem esse diximus, illiusque à sanguine arteriarum nimiam repletionem, si tales sint, qui illud ad vehementiorem motum edendum sollicitant, eius quoq; motum inordinatum vel concitatiorem reddere possunt. Eiusmodi hi fuerint, qui adeò illud offendunt, vt dum noxam, quam naturali sensatione potius percipit, quam sensu tactus, quo cor destituitur, excutere nititur, sic commouetur. Qualitas scilicet venenata ab externis causis, internisve humoribus, vaporibusve prodiens, & cor petens, illudque hoc modo exagitans: aut alias maligna, in sanguine iam dicto arterias implente, impressa, qui sanguis tunc non solum arterias distendendo, sed & cor simul hoc modo sollicitando, pulsationi huic duplicem causam præbet. In quodam diuturno cordis tremore è medio sublato, osseum quid vel cartilagineum in corde deprehensum fuisse intellexi.

Curatio.

QUæ à vehementi motu corporis vel animi, aut calore nascitur, cordis motus arteriarumque pulsus nimia commotio, sponte rursus cessantibus causis externis, & calore represso, remittit, sicuti in citâ respiratione, quæ interdum comes esse solet, ostensum fuit. Sed & pluribus concurrentibus causis, hæc adeò inualescunt, vt in periculum, sicuti superius declaratum est, hominem adducant.

Cordis verò illa arteriarumq; molesta pulsatio, à sanguinis, vt dictum redundantia nata, pertinax est, nonnunquam & periculosus affectus, non solum molestiam pariens: continuo suo motu & pulsu, sed & spiritibus per eum vitalibus exagitatis & dissipatis, & corde quoque offenso tandem prosternens, adeò vt hoc malo, aliqui è medio tollantur, alij quam diutissimè eo affligantur, plurimi tamen quoque resituantur, sublata vnde hæc affectio oriebatur, causâ. Quæ cum

Qualitas maligna cor excitans, causa Cordis palpitacionis.

Cordis motus & arteriarum pulsus nimia commotionis, curatio.

Cordis palpitacionis, curatio.

plerunq; circa vasa meſeraica, partibus naturalibus diſtributa, ſuam habeat originem, illicq; arterijs plethora & illuuias hæc infeſatur, cura eadem ferè, quæ in melancholiâ hypochondriacâ & cacexiâ & cacochymiâ adhiberi ſolet, quæ & hunc affectum ferè comitantur, hîc inſtituetur. Nimirum cauendo prouentum nimium ſanguinis, aliorumque humorum & flatuum, eaq; quæ hîc poſſiſſimum redundare cognoſcimus, bilioſos præcipuè ſuccos euacuando, ventriculum partesq; naturales roborando, omnibusque cordialia permiscendo; & vt, cum coniunctam cauſam quæ in arterijs & corde continetur, ægrè euacuare queamus, illas tamen partes cordialibus diſtis confortemus. Quæ omnia hac methodo, ſequentibus ferè remedijs perficiuntur.

Sanguinis detractio, niſi quid obſtet, plurimum conuenit, quâ omnes iuuari Gal. teſtatur. Quæ ſi ex ipsis arterijs fieri poſſet commodè, cum cauſam ipſam hunc affectû inducentem, auferret aut minueret, ſine dubio magnum adferret adiumentum: ſicuti & vertiginem à tali repletionem arteriarum factam, arterotomiâ ſanari diximus. Verum & è venis emiſſo ſanguine, nihilominus proderit, tum ad cauſam antecedentem minuendam, tum quod venæ inanitæ, è vicinis arterijs sæpè rapiant ſanguinem. Quapropter magna & generalis vena tundi debet in brachio, humeralis ſeu baſilica, dextro ſinistrove latere, prout pulſus hoc illôve magis inquietus eſt. Quæ & repeti ſi emolumentum inde ſentiant, poteſt. Crurum quoq; venas aperire, vt à ſuperioribus deorſum deriuemus, conferet: idq; præfertim, ſi menſtrua, vti ferè in ſœminis accidit, ſubſtiterint.

Hæmorrhoides prouocare in hoc caſu, magnum adfert adiumentum, cum non aliâ viâ à vasis meſeraicis, ſanguinem rectâ emittere queamus.

In euacuatione cacochymię, melancholię aduſtæ, hanc plerunque accommodant, cordialibus ſemper additis.

Præparatur humor, viæq; obſtructæ aperiantur ante purgationem (primis vijs prius repurgatis, exhibitis, & imprimis Clyſteribus, qui in hoc caſu probantur cum materia

in illis locis hæreat) iulepis, decoctisq; per triduum vel quatrimum ſumendis, hoc modo: R. ſyr. de ſucco Citri vel Limonum, vel de Pomis acidis redol. de Acetoſa, de Bugloſſa ana ʒ. j. aquarum Fumarię, Bugloſſę, Endiuię, ana ʒ. iij. miſce.

Vel ſi obſtructio præualeat: R. ſyr. Capill. ven. de duabus Radicibus, de Bugloſſa ana ʒ. j. aquarum Meliſſę, Roſmarini, Bugloſſę ana ʒ. iij. miſce.

Vel decocto hoc: R. rad. Aperitiuar. macerat. in vino ana ʒ. ʒ. herb. Meliſſę, Saluſę, Fumarię, Lupul. Ceterach, Capill. ven. ana m. j. fl. Anthos, Viol. Bugloſſi vtriuſq; an. p. j. ſem. Cuſcutę, Acetoſę, Aniſi, ana ʒ. j. fiat decoct. adde ſucci Pomor. ʒ. ij. Sacchari q. ſ. clarif. & arom. Cinam. pro iij. vicib. vel quat.

Vel hoc vino: R. rad. Aperitiuar. añ. ʒ. ʒ. cort. Tamaricis, Abſynthij, ſummit. Meliſſę, Fumarię ana ʒ. iij. fl. Cord. ſem. Citri ana ʒ. j. macerentur in Vini debitâ quantitate: & vtatur.

Purgetur dein non violentis, ſed moderatis, niſi neceſſitas exigat: sæpè tamen repetitis, vt potionem ſequenti: R. Rhabarbar. el. ʒ. iij. Myrobal. citrin. ʒ. ij. contundantur, irrorentur parum ſucco Citri vel Pomorum, donec molleſcant, poſtea inſundantur in Vino & aqua Meliſſę & ʒ. ij. aquę Cin. expreſſioni adde ſyr. Roſar. ſol. ſimpl. vel Mannę ʒ. ij. Bibat.

Vel ſi malit potionem amaram: R. Rhabarbari el. ʒ. iij. Myrobal. citrin. ʒ. ij. Agarici troch. ʒ. j. Cinamom. ʒ. ʒ. ſol. Senę ʒ. ij. macerentur in Vino abſynth. q. ſ. Expreſſionem bibat.

Vel ex compoſitis ſic: R. Catholici ʒ. ʒ. el. de Citro ſol. ʒ. ij. ſyr. Roſar. ſol. ʒ. j. ſucci Pomorum dulc. ʒ. ʒ. aquę Meliſſę, Roſarum q. ſ. fiat hauſtus.

Decoctum pro pluribus vicibus vel ſyrupus ſic fiet: R. rad. Cichoreę, Acetoſę ana ʒ. ij. cort. Tamaricis ʒ. ʒ. herbar. Bugloſſi vtriuſque cum toto, Fumarię, Lupul. Thy-mi, Meliſſę, Capill. Ven. ana m. j. flor. Cord. Scabioſę, Nymphę, Anthos ana p. j. ſem. Aniſi, Portulacę, Citri ana ʒ. j. Paſſul. Tamarind. ana ʒ. j. rad. Polypodij ʒ. ij. ſol. Senę ʒ. j. ʒ. fiat decoctio & in colatura ſeruente adhuc,

te adhuc, infunde Myrob. citrin. emblic. ana ʒ. iij. Turb. el. ʒ. ij. vel Agar. ʒ. β. Zingib. Spicæ ana ʒ. β. fiat expressio: adde syr. de Buglofs. & Ros. fol. simpl. ana ʒ. ij. pro trib. vel quat. maturinis: vel addito Sacch. q. s. coquantur in formam syr. quo vitatur per vices aliquot.

Pilulis si vti malit, ex extracto Myrobal. & Rhabarbari formata, dari possunt: Vel R̄. Rhabarbari ʒ. j. Myrobal. citrin. ʒ. j. β. Agarici, Turbith ana ʒ. j. sem. Ocimi ʒ. j. Spicæ ʒ. β. cum succo Ros. & Absynthij: fiat massula: capiat ʒ. j.

Victus ratio imprimis sit temperans & tenuis, potius quam plenior; quâ obseruatâ, & sanguine interim detracto, plerisque sanitati restitutos esse, Galeñ. testimoniū præbet. Imprimis autem quæ crudelitatem & flatus gignunt vitanda.

Corda animalium quadrupedum & volatiliū comesta sæpe, proprietate iuuare creduntur in hoc casu: præsertim assa, Gariophyllis prius fixa.

Aqua cordis hæc est efficacissima: R̄. cor Cerui, si haberi potest, vel Bouis vel Porci ad ʒ. j. quibus corda auium imprimis Perdicum addi possunt: incidantur minutim, adde pulueres sequentes, flor. iij. Cordialium, Anthos, fol. Maioranæ, Melissæ, Ocimi, Phyllitidis ana ʒ. ij. sem. Ocimi, Citri ana ʒ. j. cort. Citri ʒ. iij. Gariophyll. ʒ. ij. Cinamom. Santali mosch. ligni Aloës ana ʒ. j. Maceris, Zedoariæ, ana ʒ. β. Croci ʒ. j. Moschi vel Ambre ʒ. β. irrorentur omnia Vino maluatico, donec fiant instar pultis, eliciatur aqua: Detur ab ʒ. β. ad ʒ. vj. per se, vel cum iulepo Ros. Viol. vel syrupo Acetos. Citri & similibus, sæpe.

Oleum Corallorū & Perlarum, arte chymicâ elicatum, per se guttatim, vel cum Saccharo exhibitum, valde commendantur.

Syrupus hic est efficax: R̄. flor. Cordial. ana p. j. Gariophyl. hort. p. ij. herb. Melissæ, Ocimi ana m. j. Gariophyl. arom. ʒ. ij. decoquantur in Vino & Aquâ, clarif. & aromat. Cinam. additoq; Saccharo: fiat syrupus.

Vel ex succis: R̄. succorum Pomorum redol. Granatorum, ana ʒ. iij. succor. Bugl. Rosarum ana ʒ. ij. succi Citri vel Limonum, & Plantag. ana ʒ. j. aquæ Rosacæ, Melis-

sæ, ana ʒ. ij. Sacchari ʒ. β. decoquantur in formam syrapi, aromat. Cinamom. & Gariophyl. pulu. Capiat ʒ. j. per se, vel dissolu. cum Vino, aut aquis conuenientibus.

Vinum laudatissimum sic fiet: R̄. radic. Angelicæ, Enulæ, Tormentillæ, Distamni albi ana ʒ. β. Zedoariæ, Galangæ ana ʒ. ij. cort. Citri sicci ʒ. j. Gariophyl. ʒ. β. Cinamom. ʒ. ij. flor. Cord. ana ʒ. j. flor. Anthos, Lauandulæ ana ʒ. j. β. fol. Melissæ, Saluiæ, Ocimi ana ʒ. ij. sem. Ocimi, Maioranæ, Citri ana ʒ. j. baccarum Myrthi ʒ. ij. conuasentur omnia, affunde Vini præstantis. lib. xij. vel xv. feruetur in dolio, prius Vino feruenti, cum puluere Gariophyl. permixto, imbuto; Bibat de eo manè, cum iusculum sumit, vel in principio mensæ, hauustum.

In substantiâ puluerizata, multa varijs formis exhibentur, dando pulueres cum aqua flor. Gariophyl. hortens. Melissæ, Ocimi, Acetosæ, Plantag. Scabiosæ, bibendos: vel formando Tabulas & exhibendo. Sunt autem sequentes.

Primus: R̄. sem. Ocimi ʒ. j. rad. Galangæ ʒ. j. Gariophyl. ʒ. β. fiat puluis.

Secundus: R̄. rad. Angelicæ, Galangæ, Zedoariæ, cort. Citri sicci, fol. Melissæ ana ʒ. β. sem. Ocimi, Gariophyl. ana ʒ. j. sem. Portulacæ, Maceris, Cinamom. Santali mosch. ana ʒ. j. Croci, Camphoræ ana ʒ. β. Coralli ʒ. j. fiat puluis: Vsurpetur ʒ. j. vt dictum.

Tertius: R̄. Coralli, Margarit. Crystalli, rasuræ Eboris, vel ossis de corde Cerui, vel Vnicornu ana ʒ. β. sem. Ocimi ʒ. ij. Gariophyl. ʒ. j. fiat puluis.

Vel dentur tabulæ Diamarg. frigid. Diamoschi Diambreæ.

Vel sic: R̄. spec. Diamarg. frig. ʒ. j. spec. Diambreæ, Diamoschi ana ʒ. β. trochisc. de Camphora ʒ. β. Sacchari dissol. in aqua Rosar. ʒ. iij. & Melissæ ʒ. ij. aquæ Cinamom. ʒ. j. fiant tabulæ, deurentur.

In forma electuorum hæc quoq; vsurpari possunt, si syrups excipiantur, vt syrupo de Bugloflo vtroque, Violar. Rosar. Citri, de Acetosâ, Pomorum & similibus: vel Conseruis horum.

Vel sic fiant: R̄. conseruarum iij. fl. Cordial. conseru. Acetosæ, Melissæ ana ʒ. β. con-

dit.cort. Citri, Myrobal. chebul. an. 3.j. con-
dit. Zingib. Nucis mosch. ana 3. ij. pul-
verum prædictorum 3. ij. cum syr. de Pomis
redol. fiat electuarium : capiat 3. ij. superbi-
bendo de Vino supradicto velaquis.

Confectio Alkermes, de Hyacintho, &
multæ aliæ cordiales comperunt: de quibus
in Virium defectu egimus.

Pilulæ hæc convenientissimæ quoq; sunt:
R. Charabe 3. β. Smaragdi, Hyacinthi ana
3. ij. Margarit. 3. j. sem. Ocimi 3. j. Campho-
ræ 3. β. cum succo Citri: fiat massula : Da 3. β.
cum hoc affectu premuntur.

Sacculos cordi applicatos gestent, in syn-
donerubrâ interpassatos, qui Vino albo &
aquâ Melissæ & Rosar. aliquando irroran-
tur: qualis hic est: R. cort. Citri, fol. Melis-
sæ, Spicæ celt. Lauri, flor. Ros. rubr. Rosma-
rini, Lauandulæ, Borrag. ana 3. j. sem. Oci-
mi 3. ij. sem. Citri, baccarum Myrti ana 3. j.
granorum Tinct. 3. β. Santal. omnium, ligni
Aloës, Gariophyl. Maceris ana 3. β. Corallo-
rum 3. j. lap. Preciosorum 3. β. si velis trochis-
de Camphora, spec. Diambæ ana 3. j. misce:
fiant pulvis pro sacculo.

Vnguento sequenti cordis regio manet &
vesperi illinatur & pulsuum: R. succi Car-
diacæ, ol. Nardini ana 3. β. coquantur pa-
rum, adde ol. Gariophyl. 3. β. Camphoræ
3. j. Croci 3. β. Cerae albæ quantum suffi-
cit, fiat linimentum. Si addas tantillum
Moschi, efficacius erit.

Vel Epithemate hoc cordiali sæpe uta-
tur: R. aquæ Ros. 3. iij. aqua Melissæ, Lau-
andulæ, Vini albi od. ana 3. j. β. Camphoræ
3. j. fiat Epithema.

Si Melissa calefiat supra laterem calente,
Vinoq; maluatico aspergatur, & applicetur,
singulare est præsidium.

Odoramenta cum rectâ cor petant, vtilia
in hoc casu, præsertim hoc: R. fol. Melissæ,
Ocimi, rad. Gariophyllatæ sicc. ana 3. ij. ra-
dic. Angelicæ, cort. Citri sicci ana 3. j. Croci
3. β. Camphoræ gr. vj. misce, ligentur in no-
dulo, irrorentur aquâ Ros. & Melissæ, & Vi-
no maluatico: Odoretur.

Hypochondrij sinistri focus convenit, cū
spongiâ in hoc decocto madefactâ: R. flor.
Chamomil. Meliloti ana p. j. sem. Anisi, Fœ-

niculi ana 3. ij. Fœnogr. 3. β. decoquantur in
Vino albo mediocri: Pro fotu.

Frictiones extremitatum, cruris præfer-
tim & lateris sinistri, conferunt.

Cucurbitulæ item sinistro hypochondrio
affixæ.

Quies palpitationem cordis mitigat, v-
ti motus eam auget, & quiescentem pro-
uocat.

Camphora appensa in collo, valde iuua-
re creditur.

DE APPETI-

TVS DEFECTV.

CAPVT XII.

Genera.



PPETITVS defectum voca-
mus, quando non esuriunt, vel
non sitiunt: aut quando certa
quædam, quæ alias comedun-
tur aut bibuntur, fastidiunt.

Non esuriunt aliqui tempore convenien-
ti, hoc est ventriculo inanio, appetentiaque
cibi vel omnino vel maxima ex parte, vel
longius quàm par erat deiecta & prostrata
est, diciturque Anorexia, & si simul cibum
fastidiant, ingratumque, etsi gratus sit, esse
iudicent, Cisti fastidium, Nausea. Hoc sanis
alioquin accidens, nisi causam manifestam
habeat, morborum futurorum est præsa-
gium, cum omnes qui rectè constituti sunt,
suo tempore, cuilibet naturæ accommodo,
cibum expetant. In plerisque quoq; morbis
sympoma consuetum est: ex quo etiam, vt
in brutis animantibus, sic in infantibus cum
ægotant, nec tamen illud verbis aliisve in-
dicijs declarare possunt, si cibum respuant,
eos malè habere cognoscimus.

Si non sistant, potumq; omnem respuant,
Apositia dicitur: quod rariùs euenit: Nam
etsi ex illis qui sani adhuc sunt, aliqui natu-
râ parum bibant: aliqui etiam sine potu,
humidioribus tantum cibis sustentati, vixe-
rint, quod licet rarissimum; frequentissi-
mum tamen hoc est, vt qui cibum minimè
cupiant, potum nihilominus appetant, &
qui

Anore-
xia, seu
Appe-
tentia de-
fecta.

Fastidium
ciboru,
seu illo-
rum Nau-
sea.

Apositia.

qui cibum expetunt eoq; fruuntur, mox potum quoq; requirant. In morbis quoque licet appetentia cibi plerumq; deiecta sit, tantum tamen abest, ut interim non sitiant, ut potius siti premantur immodicâ, adeo ut & cibos qui illis obtruduntur, liquidos tantum, quos bibere potius, quam edere possint, admittant.

Fastidium ciborum quorundam.

Accidit verò frequentius, ut ex illis quæ aliàs consueta sunt, & gustui inter edendum & bibendum grata sapidaq; esse solent, qualia sunt alimentario sapore prædita; item dulcia & vinosa (sic enim acidodulcia vocamus) eaq; rectè præparata & munda, certa quædam, aliqui fastidiant. Idq; vel à naturâ adeo quædam auersantes, ut & ab illis abhorreant, illorumq; vsu lædantur. Sicuti à caseo multis accidere videmus, quem tantopere etsi lac & butyrum comedant, fastidiunt. Aliquos etiam ex suâ naturâ vinum non bibere, qui proin Abstemij, quasi abstemeto esse velint, dicuntur. Alios verò alios cibos odisse. Quod in illis, qui morbis obnoxij sunt, vel iam ijs detinentur, valde est consuetum, certos cibos fastidire, & ex illis plerumq; alimentosos, quorum non tantum sapor carnosus, pinguis, vntuosus, sed & odor quoq; nauseam parit. Dulcia quinimò, omnibus alioquin grata, in morbis quibusdam: uti in alijs quæ vinosa sunt, vinumque ipsum adeo auersantur, ut & alia, etsi talia non sint, si offerantur, hoc sapore prædita esse existimantes, sicuti in gustu deprauato dictum fuit, respuant.

Causa.

Cum ventriculus is sit, qui suo sensu naturali cibum potumq; appetit, huc in omnibus appetentiæ defectuum generibus affici necesse est, adeo ut sensum illum seu appetitum, famem scilicet aut sitim penitus, aut aliquomodo amittat: vel sensu potius contrario affectus, nauseâ nimirum, cibos vel in genere, vel aliquos saltem respuat. Quæ cum ex plerisq; ventriculi affectibus, vel leuioribus etiam possint accidere, cum ut rectè appetat ventriculus, benè constitutus esse debuerit, sit, ut tam frequens hic defectus, tam in sanis quam ægris eue-

niat: cuius causæ vel à constitutione quadam illius; aut repletionem; aut offensione; vel intemperie aut imbecillitate dependent.

Talem ab ortu sæpè constitutionem seu *Constitutionem* temperaturam accepit ventriculus, ab infinitis causis dependentem, ut certa quædam, alijs naturis non abominabilia, ut caseum vel vinum aut alia, fastidiat: quæ explicare qualis sit, non magis possumus, quam eam eius temperiem, quæ certis cibis delectatur: aut quæ quædam animalia, illa quæ homo non potest, uti aues, lapides, sturio ferrum, possunt concoquere. Huic tamen à semine parentum prouenienti causæ, occasionem sæpè præbuit impressio in eo facta, ab apprehensione matrum, dum grauidæ sunt, ex nausea certorum ciborum, præsertim dum picâ laborant, in foetus deriuata: quos & quæ primum nati sunt, eos cibos, ut caseum vel alia renuere videmus, quorum fastidium secum in lucem attulerunt. Sed & ex apprehensione, in alijs causis quoq; ventriculi constitutionem adeo nonnunquam immutari videmus, ut quos cibos prius sumere soliti erant, postea respuant: Idq; quod illis aliquando vel immoderatè aut indecenter vel immundè vsi sint. Vel quod in morbis adeo illis displicuerint, ut postea sanitati restituti, nauseâ adhuc ventriculo illorum impressa maneat: sicuti post febrem, hanc ob causam, postea ab omni carnis vsu aliquos diu, alios semper abstinuisse, obseruauimus.

Constitutionem ventriculi causam fastidij certorum ciborum.

Apprehensione, causam fastidij certorum ciborum.

Consuetudo, cum sit altera natura, facit, ut ex osculentis & poculentis ea potissimum appetamus, illisq; delectemur, quibus à teneris vei assueti sumus, & insueta, vel quorum vsus rarus est, etsi sapida interim existant, fastidiamus: quæ & causa est, quare certorum animalium carnes, nisi summa famè urgente, in ciborum ysum minimè veniant, & quod qui consueuerunt, ranas, limaces, similiaq; cum voluptate edant, quæ non consuetis nauseâ pariunt; & quod crudæ carnes, & quæ immunda sunt, similiaq; hominibus mundis, aduersa sint.

Defectus, causam fastidij certorum ciborum.

Repletio ventriculi, à qua sensus hic illius appetendi obtunditur, appetentiam tollit: quæ illi à chylo quem conficit diutius illic retento nonnunquam euenit: sicuti enim

*Distributio
chyli
causa
appetentia
natura*

inane ab eo, ad alium conficiendum, nouum cibum appetit; sic quamdiu ille subsistit, tamdiu non famescit. Quod illi ex distributionis chyli defectu accidit: quod vti ab obstructionibus venarum meseraicarum, contingere potest; sic & ob sanguinis, in venis meseraicis & praesertim in ventriculo dispersi, redundantiam, ob quam, cum nulla vel exigua fiat suctio, appetentia quoque nulla vel pauca existit. Et praesertim quod ventriculus sanguine plenus, eoque veluti saturatus, nouum succum minimè appetat. Sicuti in plethoricis, illisque qui otiosi non se exercent (cum tardius substantiae corporis assumptio, & proinde pro restitutione illius, non tam subito alio succo opus habeant, tardiusque illius fiat distributio) ut tardius minusque esuriant, contingit: nisi forte famem sibi praeternaturalem, ex nimia crapulae mala consuetudine, conciliauerint.

*Entor-
pingue-
do, Hu-
mor in
ventri-
culo, cau-
sa, Ap-
petentia
deiecta.*

Humore alieno, si ventriculus refertus sit, idem accidit. Vt si lentore illo, quo, ut lubrica essent, ventriculus & intestina, naturaliter alias inunguntur, lanisque; dum ea abluunt, abradere solent, nimium abundet. Tunc enim hoc limo illi obducto veluti incrustatus, sensus illius retunditur, & ventriculus eo, cum dulcis sit, nec ita adhuc alienus, ac si chylus esset, satiatur: cui cibi glutinosi & pinguis, immoderatio vultu occasione praebet. Quod & à pinguedine, si illa, ut in valde obesis fieri potest; sinistro illius fundi latere, ubi plerunque inuenitur, vel circa illius orificium, ut vult Fernel copiosius accreuerit, eadem ratione euenit. Et si humor alius vel excrementum crudum, insipidum, aqueum, vel lentum, atque pituitosum ex cibo & potu natum, aut ed defluxum, ventriculum adimpleat, vel illi pertinaciter adhaereat, eodem modo appetentiam deiecit: atque si ventriculus eo humectetur continuò, ut & minimè sitiant, efficit.

*Fame-
latio
ventri-
culi, cau-
sa, Apo-
stia.
Offensio
ventri-
culi, cau-
sa, Fisti-
di certu-
rum ci-
liorum.*

Offensio seu irritatio ventriculi, sicuti cum grauis est, eum ut illam excutiat, ad vomitionem excitat, sic si leuior sit, propensionem ad vomitionem, quae nausea dicitur, parit: per quam & ea quae continet, & quae assumere debebat, fastidit. Quod illi tum ab assumptis cibis acerbis, medicamentis irri-

tantibus, catharticis, venenatis, accidere potest. Praesertim verò biliosus humor, & flauus & viridis & ater, ex cibis genitus, vel in ventriculum effusus, in varijs, qui inde sequuntur, morbis, illum molestando, cibi fastidium cum nausea aliisque quae inde sequuntur accidentibus, parit. Quod & alij prauis humores illic collecti, vel eo delati, suam malignitatem possunt efficere.

Intemperies calida ventriculi, non tam relaxando illum, quam, quod sitim parit, famemque tollit, appetitum prostermit: cum diuersi hi ventriculi sensus, sitis nimirum & famemes, vix possint simul concurrere, vnoque praevalente alter quiescat: sicuti de hoc alibi disputatum est. Ita si ab externis internisque causis, corpus adeo incalcescat, ut & ventriculo accenso sitiant, potum tunc citius, quam cibum expetunt: & si cibis calidioribus vtantur, ieiunio praesertim adhuc ventriculo, ut si in principio mox mensae vina generosa bibant, vel dulcia aut aromatizata comedant, appetitum edendi amittunt. Et in omnibus morbis calidis, in quibus vel solus ventriculus, vel cum illo vicina viscera, vel totum corpus in febribus incalcescit, appetentia prostrata est.

Imbecillitates ventriculi aliae, quae functiones illius, concoctionem & distributionem, labefactant, etiam hunc illius sensum, appetitum, qui illis inseruit prostermit, & si illae recte procedant, quoque suo hoc munere fungitur. Quod ut ab ortu quibusdam, aut ob aetatem senibus accidit, sic & ex diuturnis morbis & grauib; ventriculo tandem debilitato contingit, ut sicuti tardius cibos digerit, ita & minus & rarius appetat. Et cum affectus animi aliqui cardiacam causent, sit, ut qui marent, & ex dolore animi circa praecordia anguntur, appetitum omnem amittant: & cum ventriculus propter eximium sensum, tot partibus consentiat, accidit, ut in tam diuersis etiam aliarum partium morbis & doloribus consentiente ventriculo, symptoma hoc appetentiae deiectae, reliquos affectus comitetur.

Huc & referimus, si ob stuporem ventriculi, sensu tactus illius, qui etiam gustatus est particeps labefactato, nihil appetat: quod ab ex-

*Calor
ventri-
culi, cau-
sa, Ap-
petentia
prostra-
ta.*

*Imbecil-
litas ven-
triculi,
causa, Ap-
petentia
deiecta.*

*Stupor
ventri-
culi, cau-
sa, Ap-*

ab ex-

*peritum
defectum*

ab exhibitis narcoticis accidere posse, vt in aliis experimur, sic in solani furiosi radice infusione in vino factâ, propinatâque fieri, & ab eâ etiam famelicos mox omnem ciborum appetentiam amittere, testatur Matthiolus. Quam & non minimam causam, quod ebrios parum comedant, & multum bibant, non tantum ex calore vini, vt superius dictum, sed & narcoticâ illius vi, profectum esse existimo.

Curatio.

*Anorexia, seu
appetentia
deiecta, Fa-
stidij ci-
borum,
& Ap-
petitua cu-
ra.*

Cum appetentia in illis qui alioquin sani sunt deficit, quia de eâ deiecta conqueruntur, & hac voluptate, quam edendo percipiunt, cum molestia carent, huic potissimum reparandæ cura adhibetur: vt & si in morbis diuturnis hoc accidat. In aliis vero morbis, cum grauiora tunc adsint accidentia, hoc non adeo curatur, præsertim cum, si multum appeterent, plus illis obesset, quàm prodesset, & curato morbo sponte redeat appetitus, licet illud ferè postremum sit, ex quo etiam conualescentiæ signum petimus. Sitis defectus, cum non per se incommodet, non aliâ ratione, quàm causam quæ ventriculo etiam alias noxas adfert, auferendo, si præternaturalis sit, curatur. Nausea ferè tam in sanis quàm in ægris, quia molestiam parit, illius rationem habemus, & si iam ad vomitum inclinât, sicuti in vomitu explicabitur, sanabitur. Certorum ciborum fastidium ab ortu, vix emendatur. In omnibus tamen hisce generibus, à quacumq; causâ dependentibus, in diuersis medendi modis, sic nos gerere debemus.

Consuetudo ad appetitum ita conseruandum, vt decenti tempore exsurgat, magnū adfert adiumentum. Quod sit, si ordinem rectum in cibis sumendis tum in prandio tum cœna, certâ horâ semper eos capiendos, seruemus: sic enim naturam, vt tunc semper appetat, assuefaciemus: cum, si temporis nulla habeatur ratio, naturæ opus in hisce vt in aliis operationibus, confundamus. Et cum consuetudo in causa sit, vt à teneris certa quædam appetamus, alia fastidiamus, sicuti in causis dictum, eadem consuetudine efficere possumus, vt quædam, quæ omni-

no prius auersabantur, & tamen illis vtilia esse censemus, sensim eis offerendo, persuadendo, fallendo, postea familiaria reddamus: vt abstemios aliquos, & eos qui caseum aut aliud quid non comedeabant, assuetos, tandem sumpsisse, vidimus.

Ieiunium, moderatè & strictius nonnunquam etiam obseruatum, quia ventriculum ob penuriam alimenti ad appetentiam excitat, in anorexiâ conuenit, si à repletionem ex cibo, chylo vel sanguinis aut pinguedinis redundantia, nata sit. Aut ex eo, quod humore lento ventriculus sordidus sit, vel humore copioso madeat: cum omnia hæc, si diu ieiunus maneat, sponte absumat, eaque à venis meseraicis, quæ vix ociosæ sunt, tandem quoque rapiantur. Quod tamen, si bilis in causa sit, præter quam quod non prodest, etiam quia inedia acuit, magis obest.

Exercitium decens & validum in illis, qui hoc ferre possunt, cum omnes functiones acuat, etiam ventriculi appetitum, distributionem ciborum potius, quàm concoctionem promouendo, prouocat augetque. Quod & ante cibum fieri debet. Hinc sanos opera validiora exercentes, etiam terquaterve, cibum appetere in die, videmus, ociosos è contra, vix semel auidè eum expectere. In ægris verò si exercere se nequeant, etiam frictiones id præstant.

Somnum nauseam depellere scribunt, sed appetentiam minimè prouocare ex eo constat, quod distributio chyli per vigilias potius fiat, eaq; factâ, primum appetitus redeat, nisi ex accidenti hoc somnus faciat. Proin & vigilantes citius esurimus: spaciumq; illud, quod inter prandium & cœnam vigilantes obimus, etsi breue sit, nos ad cibum iterum capiendum æquè inuitat, atque longum illud, quod inter cœnam & prandium sequentis diei, cui horæ somni septem vel octo accedunt, intercedit.

Vomitus, si à recrementis vel ab humoribus pituitosis, aut biliosis, aut aliis quibuscunque, ventriculum replentibus, vel offendentibus fiat anorexia aut nausea, competit. Quæ si tenaciter adhæreant, vomitorio abstergente & incidente prouoca-

ri debent, Oxymel. simplex & syrupum Acetosum simpl. liquoribus permiscendo.

Expurgandus quoque eadem ratione repletus stomachus, si vomitu non cedant humores, vel ægrè vomant: cathartici huic illi humori expurgando destinatis, & imprimis amaris: quæ quia simul abstergunt, ventriculo accommodata sunt. Quo nomine Aloe stomacho amica dicitur atque vsurpatur: sicuti in pilulis de Hiera, Alephang. & similibus.

Quorum loco vsuales hoc modo facere possumus, in quocunq; humore redundante: R. Rhabarbari, Myrobal. citrin. ana 3. j. spec. Hieræ 3. ij. Masticis, Santali albi od. ana 3. ss. cum syr. de Absynth. fiat massula: cuius 3. j. datur: vel potest acui Diacrydio si validius purgare volumus.

Vinum Absynthites in quo infusa sint Rhabarbarum, Myrobalani, Sena, & in pituita, Agaricus, loco pilul. dari potest.

Quæ aliâ vi & qualitate, ex assumptis causæ contraria, appetitus defectum corrigunt: faciunt illud, vel quia refrigerant ventriculum, quorum vsus, si à caliditate illius anorexia procedat: quod vel actu faciunt vel potentiâ: atque inter ea imprimis quæ acida sunt, quæ & si bilis in causa sit simul illius acrimoniam quâ stomachum vellit, retundunt. Alia quia ventriculum leuiter stimulando, illius hunc sensum mouent & torpidum excitant, appetentiam prouocant: uti acida imprimis, quæ proin non tantum in supradictis causis, qualitate illâ, sed & in alijs quoque multis aciditate suâ & tenuitate, ventriculum obiter vellicando, accedente insuper proprietate quadam, uti in deprauato appetitu dicitur, ut appetat, impellunt. Sicuti naturaliter à melancholici succi aciditate; in ventriculum ob eam causam, ut appetentiam faceret, à liene, uti voluerunt, infundi soliti, fieri scribunt: nos verò à chyli aciditate, quam ex sua natura in se habere, & ab assumptis sibi asciscere, & sic veluti fermentari, ex eo quod omnis vomitus etiam in illis qui vinum non biberunt, sit acidus, conijcimus proficisci, ab eoque ventriculum ita sollicitari putamus; eoque magis, si acida, sicuti iam dictum, assuman-

tur: quæ & stupente omnino ventriculo ex narcoticorum vsu, eum reuocant, viresque stupefacientium assumptorum, sicuti alibi dictum, infringunt. Alia quoque abstergendo ventriculum à sordibus, id præsertim præstant: qualia sunt salsa, à limo & dulci succo ventriculum abstergendo, appetitum conciliantia, & fortè quod eundem quoque inertem, stimulo suo, uti dictum de acidis, excitent: amara abstergendo easdem sordes & pituitam & bilem, si hæc appetentiam dejiciant, eadem ratione illam reuocant. Alia, proprietate quadam incognitâ hoc faciunt. Imprimis quæ gustui grata sunt, si exhibeantur, appetitum excitant, nauseamq; corrigunt, præsertim si insuauitatem reliquorum emendent: quo nomine in febribus & morbis calidis, ubi dulcia tantoperè respuunt, acida appetunt: & insipidos, si sale sapida facta, expetunt. Sed & quæ ventriculum roborant, sicuti alias illius functiones, ita & appetentiam inuuant, & nauseam quoque emendant: quæ in illius imbecillitate potissimum conueniunt: quod & astringentia calidaque faciunt: quæ calida in apostitia, si interdum fiat, exhibita, ut & rursum potum appetant, procurant. Cæterum quibus formis hæc vsurpentur, obiter nunc in præcipuis quibusdam ostendemus.

Esculentia poculentaque actu frigida propinata si à calore appetitus deficiat, iuuant.

Quo nomine & Aquæ frigidaë porus laudatur: potentiùsque operatur, si ante cibum bibatur.

Et qui loco vini Aquam bibunt, auidius cibum expetunt. Quæ & non minima est causa, quod animalia quæ crudis continuò vescuntur, adeò voracia existant.

Cibi si acidorum fructuum succis, qui fructus & eo nomine eduntur, condiantur, appetitum excitant: imprimis Omphacio & Agrestâ.

Et si panis bene fermentatus, salitusque edatur, appetentiam auget.

Vinum acidulum in naturis calidioribus consuetim bibitur, ut maiori appetitu edant, facit.

Acetum appetentiam valde excitat, insculis in-

lis inditum, aliòve modo vsurpatum, in acetarijs. Vel aliàs per se ante pastum bibitum. Quo pacto & si bonâ quantitate bibatur, fastidium illud cibi à vini potu, in quo radices solani furiosi maceratæ fuerint, vt in causis dictum, profectum, vt scribit Matthiol. iterum tollit. Et si ab alijs narcoticis sumptis appetitus sublatuſ esset, idem faceret.

Perſica in principio menſæ ſumpta appetentiam provocare, ſi à cauſa calida ablata ſit, docent: quod gratâ quoque aciditate, niſi alia accedat proprietates, faciunt.

Mala arantia; limonia, acida, diuiſa aſperſaq; aquâ Roſaceâ, & Saccharo, condimenti loco menſæ appoſita, iuant.

Brasſica capitata, Rapæ, coſta & condita donec aceſcant, ſicuti Germani ſolent, comēſta in principio menſæ, appetitum mouent.

Acetoſa ſi edatur, prodeſt; & Portulacæ Aceto condita.

Oliuæ & Capparum fructus, Sale condita, cum Aceto, ad appetitum excitandū communiter menſæ apponuntur & eduntur.

Allium appetitum excitare docent, atque ex eo tale ferculū parant. Allio contuſo mortarium & piſtillum inficiunt, eoq; abiecto, micam Panis & Amygdalas in eodem mortario, vt odorem allij hauriat; contundunt, poſtea q; cum iure carniū miſcent & propinant: quod quibus gratum eſt, fortè gratâ magis quàm aliâ vi appetitum mouet.

Vinum Abſynthites in principio menſæ bibitum, ſi modo non à calore proficiſcatur, aliàs in quibuſcunq; excrementis & pituita & bile eriam redūdantibus, in ventriculo appetitum deiectum reuocat.

Syrupū conueniunt de ſucco Perſicorum: de ſucco Citri, Granatorum, Ribes, de Agreſtæ, Acetoſus, Oxyſacchara. Syrupus de Abſynthio quoq; datur, qui ſi Aceto addito, coquatur, magis illud præſtabit.

Compoſitus ad eodem vſus ſic fit: R. ſucci Perſicorum acidulorum ℥.j. ſucci Granatorum vel Pomorum acidulorū 4.j. ſucci Cytonior. 4.℔. coquantur, addito Sacchari q.ſ. addendo Acetum album, vt aciditatē decentem acquirat: coquatur: capiat ℥.j. vel plus.

Ethoc electuarium, abſtergendo ventriculum à limo appetentiam excitare comper-

tum eſt: R. Mellis ℥.j. deſpumetur, adde ſucci Abſynthij, Parietariæ ana ℥.iiij. coquantur in formam decentem: capiat manè & vespere inſtar caſtaneæ.

Conſeruæ & condituræ fruſtuum acidulorum, ſi modo non nimia ſacchari additione aciditatem amittant, ſic quoq; dantur: tum per ſe, tum inuicem permixtæ hoc modo: R. conſeru. Roſarum, Acetoſæ, rob de Ribes ana ℥.j. Vtatur.

Aqua Chamæmeli bibita, appetentiam excitare creditur.

Quæ ventriculum corroborando iuant, alibi explicantur: inter quæ Piper eo nomine fortè comēſtum, appetitum iuvare docuit Dioſcor. Vti & alia multa quæ concoctionem iuant, appetitum quoq; reparare ſcribunt: quæ tamē nauſeam potius impediunt: qualia ſunt, Panem ex vino Maluatico ſumere: Aromatibus cibum condire, Menthâ, Calamenthâ alijsq; ſimilibus vti. Quæ & Apoſitiam, vt ſupra dictum, emendant.

Inieſta clyſmata abſtergentia, appetentiam excitant, ſi ſordibus, pituitâ, aliſve recrementis, vnâ cum ventriculo etiam inteſtina ſcateât. Quale ex Vrina pueri paratum laudatur: vel ex Lixiuio non nimis acris.

Item quod R. Betæ albæ cum toto, Mercurialis, Caulium, ana M.j. Hordei P.j. Agarici ℥.j. Senæ ℥.ij. ſem. Carui ℥.j. fiat decoctio, addendo parum Vrinæ pueri vel Lixiuij ad ℥.iiij. diſſolue in colatura ſucci Mercurialis vel Betæ ℥.j. Mellis ℥.j. ℔. Salis ℥.j. Detur, ſine oleo, quia potenter tunc abſtergit.

Si à calore nauſea vrgeat in febris, ex refrigerantibus Clyſmata aliqui ad eam emendandam iniiciunt: quale hoc eſt: R. aquarum Laſtucæ, Endiuie, Viol. ana ℥.iiij. ſucci Portulacæ, Laſtucæ ana ℥.j. ol. Nenuph. Violacei ana ℥.j. ℔. fiat clyſter.

Odores ſuaues nauſeam corrigunt. Sicuti quando, quomodo vomitus impediri debeat, docebimus; oſtendemus: vt Aceti, fruſtuum Acidulorum, Abſynthij, &c.

Extrinſecus, ventriculi regioni eum corroborantia applicantur, calida frigida ve aſtringentia, pro cauſæ diuerſitate: cauendo ab vnctuoſo odore prædiſtis, ingratuſ, quia nauſeam excitant. Qualia multa eiufmodi

aliorum ventriculi affectuum causâ potius, quàm ratione appetentiæ, in alijs symptomatibus illius; describuntur.

Epithemata quæ hepar refrigerant, si à calore fastidium cibi procedat, tum huius quoque affectus, tum aliorum inde prosectorum causâ, in febribus vsurpantur.

Corporis refrigeratio externa appetitum excitat in calidiore causa. Vt si in aëre frigidiore versentur, rectius esuriunt quàm si in calido moram trahant. Balnea, Pedum lotiones ex aqua frigida, idem præstant. Quò & indusiorum frequens refertur permutatio, vnde appetitus egregiè promouetur.

Sanguinis detractio in illius plethora conuenit: si morbus, cuius appetitus defectus symptoma est, eam requirat.



DE APPETITV DEPRAVATO.

CAPVT XIII.

Genera.



APPETITVM deprauatum vocamus, si immoderatiùs, quàm per famem aut sitim naturalem fieri solet, cibum potumve appetant, hoc est, esuriant, sitiãtve: Vel si vitiosus sit, hoc est, aliud quid quàm cibum potumque expetant.

*Bouli-
mos, Ap-
petentia
nimia.*

Esuriunt immoderatè, cum auidius cibum quàm par est, appetunt, eoque vel vix dum satiari possunt, vel vix priore concocto, novum expetunt. Quod sanis alioquin nonnunquam contingit: aliàs morborum quorundam est symptoma: Appetentiaque seu Appetitio immodica, Boulimos, & si magis vigeat, Fames insatiabilis, dicitur: alia quoque interdum adferens accidètia, in illis qui hoc patiuntur: aliàs enim ob cibum nimium ingestu, qui illos grauat, compressiois dolorem in regione ventriculi sentiunt, tamdiu donec ille concoctus digestusque fuerit.

*Canina
appeten-
tia, Bou-
limi spe-
cies.*

Alij ventriculo non ferente onus, cibum nimia copiâ ingurgitatum mox iterum euomunt, &, vt canis ad vomitum, vt prouerbium habet, sic & illi à cibo ad vomitum se

conferunt, ob eamque causam Caninam appetentiam aut famem, hanc speciem appellat. Alijs dyarrhœa potius quàm vomitus superuenire, & repletionem illam deorsum potius quàm sursum excutere solet. Aliqui nisi famem mox sedare possint, animo deficiunt, & syncope graui, quam mors nonnunquam subsequi solet, corripiuntur: quod tamen quibusdâ debilitato primùm ventriculo, & dolente ob hanc immoderatione, appetentiâ iam potius prostratâ, quàm auctâ, ex cardialgia illa contingit: cum in illis qui hoc malum aliquandiu passi sunt, tandem summa stomachi imbecillitas & ciborum fastidium subsequi soleant.

Sitiunt immoderatè, cum intempestiue, hoc est, extra tempus quo cibum capiunt (quo tempore primùm sitire deberent) sitis ipsos admodu vrget: aut alioquin adeo magna est, vt largo potu vix dum expleri sedarive possit, diciturque Sitis immodica: & sanis & ægris frequentissimè accidens, atque intollerabilem adferens molestiam, magisque quàm fames immodica, affligens: cum eorû, quæ citò nos fatiant, summamque voluptatem subito adferunt, penuria, maiorem adferat dolorem, quàm illorum, quæ id tardius præstant. Ob quam causam, sitim tam ægre ferunt, & cum valida est, de eo potissimum symptomate in morbis & maxime in febribus, conqueruntur: & qui hac premuntur, alba spumosaque sæpè expuunt, ægreque cum lingua palatui aut faucibus, vt aiunt, hæreat, loquuntur, balbutiuntque, & nisi potu reficiantur, interdum animo deficiunt.

Aliena à cibi potusque natura quando appetunt, Vitiosam vel alienam appetentiam vocamus, quam Picam quoque appellant. Rariùs viris, sed frequenter mulieribus vterum gerentibus, quibusdam primis mensibus eueniens, tuncque Malacia præsertim nominatur. Interdum & puellis caecæticis accidens.

Huius varietas, pro diuersitate illorû quæ appetunt, exurgit. Cum aliæ crudas partes animalium, & carnem edere anthropophagorum instar, gestiant: cuius inordinato appetitu adeo commotam quandam fuisse narrant, vt bestiarum instar in hominem sæuieret, illiusque brachium morderet. Aliæ verò, ea quæ

*Sitis im-
modica.*

Pica.

*Malacia, Pica
species.*

493

ea quæ per se non fumuntur; sed condimenti loco tantum cibis adhibentur, sola magna; copiâ citra noxam deuorant: sicuti illa quæ libras zingiberis innoxie comedit: alia quæ acetum fortissimum affatim bibebat, alia; similia. Plerumque autem sicca, ut farinâ, cineres, cretam, lutum, testas, pannos attritos, coria putrida, cum voluptate comedunt. Nonnunquam & noxia ex illis, ut calcem viuam: cuius insignem portionem quandam citra noxam deuorasse, testatur Fernelius.

Causa.

Omnis fames aut sitis immodica procedit aliquando à causa naturali, eâ scilicet, quæ si moderata sit, naturalem appetitum, si immoderata, præternaturalem causat. Qualis est sensus ventriculi: penuriâ nutrimenti vel madoris. Interdum verò à præternaturali causâ appetitus hic nimius, uti & alienus, nascitur: quæ est vel intemperies frigida & sicca ventriculi: vel alia qualitas.

Sensus ventriculi exquisiti, causa appetentia nimia.
Sensu suo, ex tactu & gustu permixto, uti ventriculus appetit, sic, si exquisito admodum ventriculus præditus sit, cum tunc facilius afficiatur, sit, ut & defectum citius sentiat, & ad appetentiam magis sit procliuvis. Quod alijs naturâ ab ortu euenit, ut à teneris voratiores sint ceteris. Alijs à consuetudine vitiosâ contingit, ut dum ob crapulam continuam, illum sine intermissione adimplent & vacuum esse non sinunt, ita assuefaciunt, ut non nisi distentus & plenus esse velit, ob eamque causam, nisi talis sit, perpetuo esuriat, & ut vocant, latret: sicuti helluonibus hoc consuetum esse, eosque veneri dies noctesque inferuire, non tantum voluptatis, sed & huius innatæ vel acquisitæ voracitatis causâ, videmus.

Nutritio penuria, causa famis immodica.
Nutrimenti penuria, quæ indies eo absumpto accidit, uti famem naturalem excitat, si sic diutius perseveret per inediam diuturniore, nimium famelicus facit. Acciditque hoc vel propter ciborum longiorem defectum: vel quod illis qui pauci sunt nutrimenti aut facillime digeruntur, diu vsi sint: vel quia diebus aliquot vel multis, in morbis diuturnis, præsertim ob appetentiam prostratam, nihil omnino vel saltem quod alere satis po-

tuerit, comederunt: unde postea conualescentes tam auidè cibos appetunt, & licet cibentur, cum natura exhausta, subito chylum confectum rapiat & exugat, unde & constipari facile illos superius, in deiectione alui suppressâ, diximus, mox iterum esuriunt, & nisi sibi temperent, se ipsos grauiter lædunt, accidentiaque supradicta boulimo superuenire solita, morbi; recidiunt, interdum patiuntur. Si quoque alia ratione citius quam par erat in distributione nimis citò factâ, chylus è ventriculo rapiatur, propter exercitia, euacuationes, sudores, idem accidit: vel si ex humidiori cibo, aut naturam sollicitante & detergente, ut vult Rondel. sæpius vsurpato, vel potu nimium dilutus chylus, in ventriculo moram non trahat, sed statim descendat: vel si à lumbricis, uti scribunt, ventriculo subripiatur: quos sanè, cum magna consumptio chyli, ut boulimos inde sequatur, fieri debeat, plures numero, si illud faciant, esse oportet. Unde alij à lato lumbrico, cum longissimus sit, illud potius fieri autumant: quod si sit, illud non ea ratione, quod chylo pascantur, cum vivus non sit vermis, sicuti alibi ostendimus, sed quod ex chylo generetur & nutriatur hæc fascia, contingit.

Madoris illius defectus, quem nisi ventriculus eo madeat & refrigeretur, mox per sensum illum sitis denuò expetit, uti sitim naturalem parit; sic si diutius magisque eò destituatur, sitim accrescere necesse est. Quod eadem ratione, uti fames ob defectum cibi, quando potu diutius caruerunt, aut ille frigidus actu minimè est, quod ad sitim sedandam naturaliter requiritur, euenit. Item si frequenti expuitione, multâ humiditate, quâ fauces semper madere debuerunt, absumptâ, & fauces, & per consequens ventriculus madore priuentur. Unde & multam locutionem, per quam frequenter expuunt, sitim conciliare docent.

Frigidam intemperiem ventriculi appetentiam immodicam excitare, plerique statuerunt: idque cum viderent eos qui in aere frigido versantur, aut aquam frigidam bibunt, quam voracem ob id vocat Hippocr. auidius cibos sumere. Verum cum frigus sensum non acuat, sed potius obtundat, aliam huius rei causam.

Distributio chyli nimis citò facta, causa appetentia nimis citâ.

Madoris ventriculi defectus, causa sitis rebe-

Refrigeratio ventriculi calidioris, causa voracitatis re-

causam proponimus, quod nimirum, si calidior sit ventriculus, indeque appetentia prostrata, sicuti in appetitus defectu dictum, frigiditas calerem illius corrigendo, & ventriculum ad temperiem naturalem reducendo, potius quam intemperiem frigidam in illo excitando, appetentiam prouocet. Et quod ob frigus externum hyemis tempore, & in locis frigidioribus calore ad interiora repulso, illicque collecto & abundante, & ut inquit Hippoc. quia ventres tunc sunt calidissimi, copiosiore alimento indigentes, illud audiunt tunc appetunt, ita ut caloris natui abundantia, sicuti idem Hippoc. in illis qui dum crescunt plurimum calidi innati habent, fieri docet, appetentiam potius augeat, & frigiditas ventriculi illam est contra imminuat. Quod cum ita sit, neque acidus humor quia refrigerat, etsi in calidioribus ventriculis appetentiam deiectam hac ratione reuocet, & ventriculum nonnihil excitet, ut in appetitus defectu ostensum est, immoderate illius appetentiae, quam caninam vocant, causa esse poterit. Vti neque melancholicus humor aut pituitosus, quemadmodum voluerunt, sua frigiditate aut aciditate, ob supra dictas causas, illud poterit efficere.

*Siccitas
ventriculi
in causa
Sitiu praeternaturalis.*

Siccitas seu ariditas ventriculi interioris tunicae, quae quoque per oesophagum & fauces expansa est, si in ventriculo, aut simul etiam iam dictis in locis oboriatur, sitis praeternaturalis causa est: sicuti solius madoris illius defectum naturalem, sitim efficere, prius dictum est: quae exiccatio quod maior erit, eo sitim grauiorem procreabit. Hanc autem calor, madorem hunc absumens, interdum excitat, tuncque sitis eo maior fit, quod incalescente simul ventriculo, non tantum humiditatem, sed & frigiditatem, quam ex potu actu frigido consequitur, expetat, ideoque magis bibere cupiat. Vti fit, si vniuerso corpore a calore accenso, illoque ventriculum occupante, per aestus solis, balneorum, per nimios motus corporis aut animi, & in febribus, ut tantopere sitiant, & si ardor magnus sit, sitim intollerabilem patiantur. Vel si priuatim ventriculus incalescat ab assumptis calidioribus: ut vino meraciore vel dulcibus, vel aromatibus, aut alijs acribus,

herbis, caseo putri & similibus: quae omnia intemperanter sumpta, sitim enormem causant. Ita ex catharticorum medicamentorum caliditate, dum purgantur, sitis plerumque urget. Et bilis in ventriculo ex cibis genita, vel in eum, in varijs morbis effusa, sitim excitat: eo vehementiore quod haec magis est ardens. Quod & a vaporibus calidis eo delatis, potest fieri. Sed & ea quae tantum exiccant, nec dum ex sua natura calorem adferunt, assumpta, sitim conciliant: Vti salsa omnia, aridaque & suffumigata. Aer quoque ore patulo attractus diutius, quia fauces & per consequens ventriculum exiccant, sitim parit. A tracheae arteriae & pulmonum caliditate & siccitate, in illis partibus, ut in ventriculo, sitim quoque oriri posse, aliqui scripserunt. Verum, cum pulmones sensu hoc, uti & tactus destituantur, si illorum, uti & thoracis morborum causa, sitis fiat, illud non hac ratione, sed quod per consensum tunicae, ventriculi, oesophagi & asperam arteriam simul succingentis, ventriculus quoque afficiatur, vel ob multam in illis morbis expuitionem, aut quia febris comes est, euenit: nec salua alba, quam sitientes expuere solent, a pulmonibus hoc proficisci, ostendit, cum & in ore, in ariditate illius, salua tenacitatem acquirens, aeris confusione albedinem illam & spumositatem adipiscatur.

Qualitas alia & proprietas rei alicuius, sic ventriculum alterans, ut in eo appetitus excitetur, potius quam deijciatur, uti alia contraria vi praedita id faciunt, appetitus immodici vel etiam vitiosi causa esse potest. Qualem, in humoribus, quos melancholicos vocant, nonnunquam inueniri putamus: qui in venis meseraicis interdum nati, sanguinique permixti, nec tantum, uti credunt, a lienis venis, sed & alijs venae portae ramis ad ventriculum desinentibus, in illum effusi, boulimum illum possunt efficere. Quod non tam ab aciditate illorum aut austeritate, quae in melancholico naturali humore esse dicitur, vel ab atra bile, aut etiam pituita acidis, ut putarunt, quod ea ventriculum constringendo appetitum excitent proficisci, quam ab occulta illius proprietate, quam sensum hunc immoderatum excitat, euenire, ex eo conijcimus: quod neque talis ab acidis,

Qualitas oculi in ventriculo, causa Boulimi & Canisinae appetentiae.

ventriculi conftrictio, aut sicuti nos volumus, extimulatio, aut frigiditas, vt supra dictum, aut alia qualitas manifesta, adeò functionem illius, quæ potius à causis hisce proflernitur, quàm augetur, possit intendere, vt tam insatiabilis fames sequatur, nisi abstrusa quædam in humore esset vis, illud efficiens. Sicuti humores eiusmodi, quos passim Medici melancholiæ & atræ bilis nomine designant, nuncque corruptos, adustos, ac incineratos vocant, venenatas qualitates diuersas induere possunt, atque effectus tam varios & incredibiles, inter quos & certa quædam qualitas est quæ caninam hanc appetentiam facere potest; alia verò vitiosum illum alterius rei aduersæ & abominabilis ahiæ appetitum, qualis in pica occurrit, proferre. Et proin appetituum horum præternaturalium causam non aliam, quàm venenatam & malignam vim, quæ ex effectu potius cognoscitur, quàm describi potest, in humoribus in ventriculum, vt dictum, effusis, vel etiam nonnunquam ex cibo in illo genitis, statuere possumus. Sicuti venena quoque quædam esse, quæ extrinsecus illata vel assumpta, talia accidentia appetitus deprauati producant, Diosc. docet. Veluti & alia sitim potius intollerabilem, vt ex morsu dispersadis serpentis euenit, aliisque, excitant. Qualia in corpore quoque nasci, humoresq; in venena conueri, Gal. sæpius monet: vt non sit mirum, in mulieribus grauidis, aut puellis cacecticis, sanguine retento menstruo, in eo talem qualitatem exsurgere, quæ picā, in quā pro diuersitate huius qualitatis tam diuersa appetunt, in illis excitet. Quod & nonnunquā aliis de causis cacochymia talinata, in aliis appetitum prauū potest efficere.

Curatio.

Boulimi seu appetentia nimia, sitis immodica, & Picæ curatio.
EX tribus generibus prauæ appetentiæ. Si adeò immoderatè esuriant, aut sitiant, vt vix famem explere vel sitim restringere queant, & si hoc faciant lædantur, vel cardialgias sentiant, vel vomitu aut diarrhœa infestentur, quinimò si appetitui satisfacere nolint, grauius afficiantur, imbecillitatem & lipothymias patientes, succurrendum erit. Quod longè facilius in fame quàm siti,

cum modum excedunt, perficitur, sicuti & famem nimiam minori negotio tollimus, quàm reparamus. Quando aliena à cibis appetunt, vitium hoc negligi minimè debet: idque quia causam præternaturalem in corpore delitescere significat: tum quia aduersa alioquin corpori ingerentes, etsi se illis, quibus delectantur, lædi minimè posse putant, tandem tamen, eoque citius si noxia sint, afficiantur. Quibus omnibus hoc modo occurrimus.

Temperantiam in cibo & potu sumendis adhibere imprimis oportet. Non nimium abstinendo, nec immoderatius se implendo. Præsertim si post longam inedia prægressam, aut corporis cōsumptionem vehementer esuriant. Tunc modicā quantitate sed sæpius, benè nutrientibus facilibusque concoctis datis, sensim refici debent. In alijs verò causis, etiam illis, quæ multum satiant, & solidiora cum sint, minus citò conficiuntur & digeruntur, quantitate tamē moderatio-re, cibandi sunt. Et sic famem sitimque decenter compescere, assuescere debent. Nam vt consuetudo peruersa, eos qui crapulæ & ebrietati dediti sunt, voraces bibulosque facit, vt nisi pleni sint, rectè minimè se habeant; sic & decens, immodicos illos & inordinatos appetitus ad veram redigit mediocritatem & ordinem conuenientem.

Vomitibus probatur, si humor prauus in ventriculo latens, appetentiam nimiam vel vitiosam causet. Qui, nisi sponte superueniat, conciliandus. In canina appetentiā quoque etsi vomant, in principio præsertim, antequam vomitio nimium inuauerit, vt per eam non saltem assumpta, sed & humor noxius educatur, promouenda. In alijs verò causis vomitus non conuenit. In siti vomitus etiā potius auget, quàm minuit, nisi bilis eam excitari: in cuius tamen etiam euomitione, sitis concitatur, quæ tamen mox bile euacuata, cessat.

Purgatio per inferiora facta, in iam enarratis causis, tam famis quàm sitis præternaturalis, in alijs minimè cōpetit, nisi diarrhœa spontanea, sicuti interdum fit, accedat: in qua nihilominus tamen, vt per eam humor prauus educi queat, natura cathartici est adiu-

uanda, ex leuioribus & astringentibus paratis. Præparator prius humore si illud opus sit. Quæ omnia nos, alia potius obseruantes, quam melancholiæ vel pituitæ aciditatem, eligimus & dextrè exhibemus. Quæ & in siti, licet eam cathartica moueant, ad bilem exturbandâ, si ab illa fiat, cōmodè exhibentur. Et si à vermib. fiat, vt illi deorsum simul pellatur, ex amaris cōcinnata propinantur.

Calefacientia & siccantia vetriculum remedia; in boulimo ab humoribus genito, plerumque post expurgationem illorum vsurpantur: quæ non tã, quod illis stomachus refrigeratus alteretur, quàm quod ventriculus hisce accensus atq; exsiccatus magis sitiat quàm esuriat, famè sic compescunt. Hoc autè præstant; Assumptus cibus calidus actu & potentiâ: aromatibus conditus, & dulcis factus: quæ validius operantur, si ieiuno adhuc ventriculo; vel nondum admodum cibis impleto, assumantur. Quod & citò valdeque, potus Vini meracioris; à naturâ dulcis, vel alioquin potentis, aut arte aromatizati & dulcorati facit, imprimisq; Aqua Vitæ, quam vt famem diutius ferre possint, rustici ieiuni bibere solent. Idem medicamenta alia vetriculum calefaciētia: qualia sunt dulcia & acria & adurentia, item vehementer odorata, præstant. Vel si extrinsecus calidis actu potentiâve vetriculus foueatur, vngatur, emplastretur: aut corpus vniuersum exercitiis aut balneis incalescat.

Relaxantia vetriculâ, pingua, & viscosa, quia illum veluti subuertunt, & illinendo sensum illius nōnihil retundunt, appetitum deiiciunt: quo nomine vnctiosa, Butyrum, Oleum, Adipes: & glutinosa, Extremitates vituli, agni, hœdi; similiaque dantur, è quibus si quæ nauseosam in se vim habeât, tantò magis appetitum prosternent; vti de Glirium pingui carne assâ exhibita, scribunt.

Proprietate quæ appetitum tollunt immoderatum, faciunt illud vel ob vim aduersam, quam nauseosam vocamus. Quâ ratione fortè Glirium pinguium caro assâ deuorata appetitum prosternere dicitur. Vinum in quo Anguilla suffocata fuerit, propinatum, vt abstemij postmodum omnino fiant, facere scribitur: quod tamen, cum hoc etiâ igno-

rantibus se eiusmodi vinum bibisse, accadat, si modò verum est illud, aliâ proprietate facere ostendit. Quod alia qualitate alexiteria præstant, si à venenatâ causâ procedat. Alia verò narcoticâ vi sensum vetriculi nōnihil retundentia, sicuti in appetitus deiecti causis dictum, illum tollunt: Quæ & fortè Vinū præstās, illiusq; aqua stillatitia, adhuc efficacius, si ieiunis detur, vti suprà dictum, non tam calefaciendo quàm stupefaciendo famem tollit: & infusio radicū Solani furiosi in vino facta, & bibita, vti superius quoque explicatum, subito omnem appetentiam, etiam in summè famelicis euertit. Et cum Theriacâ, Mithridatū cum vino exhibita caninâ appetentiam sanare scribunt, illud eadem vi narcoticâ, tanquā opiatas, facere putamus. Adiuuante etiam alexiteriâ, cum sint simul antidota, si à malignis perniciosisque, vti ferè fit, hæc prodeant humoribus. Quod & alia Opiata medicamenta, etsi antidota minime sint, aut admodum calefaciant, similiter facere, ex eo conijcimus, quod post horum vsū, etiam alterius rei causâ, appetitū inde minui experiantur; illeq; aceto, quod illorū vires infringere diximus, dato, reuocetur.

Refrigerantia & humectantia, sitim quacunque de causâ genitam, emendant: sed & famem nimiam, frigore vehementi, vt aquæ frigidissimæ magno haustu, fortè quia vetriculi actiones lædit: & aeris quoque frigidissimi inspiratione, tolli docet Rhazes.

Hoc potissimū potus, vetriculum aridum egregiè madefaciens, facit: eoq; magis si actu quoque frigidus sit; & adhuc validius, si potentiâ etiam refrigeret. Sicuti varias eiusmodi potiones, hinc inde in morbis conuenientes, quæ sitis causâ vsurpantur, suis in locis explicabimus: hic verò quasdam saltem adiiciemus.

Aqua madore suo atque actuali frigiditate (nam potentiâ eam temperatam esse alibi docuimus) id præsertim præstat, potusq; est, sitis pellendæ graciâ, omnibus animantibus cōmunis, & tantopere expetitus ab ægris sitientibus. Quæ & cruda; vel si quid obstat cocta, ne cruditatem & flatu procreet, exhibetur. Vel si magis refrigerare volumus, tantillo Aceti, alijsve succis acidis acetositatem

illi concilians, propinamus. Cui guttulas spiritus Vitreoli eo nomine addūt Chymici.

Aquæ atramentosæ acidæ naturales, sic bibuntur, & qui diu siti afflicti fuerūt, si diutius illas bibant, liberantur.

Vinum, vti vsitatus est adultis sitis sedandæ causâ potus, sic & ad præternaturalem sitim extinguendam, in assuetis præsertim, concedi potest. Cum si vinosum sit, vti fere nostra esse solent, non adeò calore suo, præsertim si diluatur aquâ, nocere, moderate sumptum in certis morbis, queat.

Lac iuuenibus & consuetis idem præstat, & in quibusdam affectibus, illiusque serum in constipatione nonnunquam permittitur: in quibus verò morbis facillè corrumpitur, improbat.

Emulsio amygdalarum dulcium, cum aqua crudâ vel coctâ extractâ, quam Lac amygdalinum vocant, ad sitim restinguendâ in egrotantibus, communissimus est, quem Medici docent, ægriq; non respuunt, potus.

Decocta varia sunt ad sitim pellendam: vti Aquæ decoctum cum paucis Hordeo. Item cum pane, ex Siligine, Rogga dicta, præsertim pisto. Item cum seminibus Cucumerū excorticatis, vel alijs frigidis maioribus dictis. Vel si fiat cum Prunis, Cerasis, Passulis: cum Cinamomo: Vel seminibus Anisi, Fœniculi, alijsve, cum flatu timentur.

Iuscula huc referuntur ex decocto Carnium, vel Caponis, quæ colata primùm, frigida, vt pinguedo separetur, sitis causâ, cum magna restauratione opus, dantur.

Consueta & in vsu sunt Ceruissia, Ptisana, pro cuiusq; naturæ & morbi ratione parata.

Alia aliter sunt, vt addito succo: R. Aquæ mens. ij. succi Granat. vel Agrestæ 3. ij. Sacchari 3. b. coquantur parum.

Vel ex aquis stillaritijs: R. aquarum Acetosæ, Endiuia ana ʒ. ij. succi Ribes, vel Agrestæ, vel Granat. 3. ij. succi Limonum vel Pomorum acid. parum, coquantur, addito saccharo, vel sine eo.

Iulep Alexandrinum dictum vsitatum ad sitim: R. aquæ Ros. ʒ. j. Sacchari ʒ. ʒ. coquantur ad consist. Diluatur ad vsu, aquâ fontis vel coctâ.

Vel sic: R. aquæ Fontis ʒ. j. aquæ Rosar.

3. iij. succi Cerasorum vel Agrestæ 3. ij. Sacchari 3. iij. coquantur parum, vel ad consistentiam, si dissolui debet.

Syrupi varij acidij imprimis de Ribes, de Agrestæ, de succo malorum Medicorum, vel etiam vulgariū, de Cerasis, Prunis, de Granatis, de Acetosæ. Vel ex aceto parati, vt Acetosus, Oxyfaccharum, sic dissoluta in aqua fontis, vel stillaritijs, aut vtrisque, dantur. Et si dulcia non respuant, syrūp. Violaceus.

Anguriarum maturarum succus exsuctus, ad sitim sedandam, valde in vsu est, illic vbi bene maturescunt. Quod & è granatis recentibus prius sæpè pressis & perforatis, vtiliter fit.

Præter hæc, in solidiore formâ, multa masticata & sensim deglutita, licet minùs quàm quæ bibuntur madesfaciant; vel deuorata, sitim compescunt.

Qualia sunt ex acidis, Acetosæ, Trifolium acetosum, mansa, Lactuca, Portulaca, Endiuia, Cichorea, Buglossi vtriusque flores, in acetariis.

Brassica capitata, Rapæ, Poma, cocta, aciditatemque adepta, addita racemis Berberis, sicuti condiri solent.

Medica mala, Poma, Cerasa, Pruna, Mala Punica, Ribes, Berberis, Vua crispa, Passulæ, Vuæ, acida præsertim vel saltem vinosa, recentia, vel etiam siccata rursumq; macerata, vt Pruna, Cerasa, Passulæ, comesta sitim extinguunt: minùs si Saccharo condita dentur.

Ex dulcibus, licet ea sitim plerisq; augeat, tamen quibus grata sunt, vt senibus, radix Liquiritiæ masticata recens, sitim sedat.

Saccharum item candum, & præcipuè è syrupo Violaceo sumptum, refrigeratum ore retentum, Manna item: & Saccharum ros. tabul. vel Manus Christi comestæ: & confer. Rosarum præsertim, si cum spiritu Vitreoli, ruborem & aciditatem contraxerit, & conferua Violarum: conditū caulium Lactucarum, & carnis Cucurbitarum, Citri.

Vel hoc modo electuarium paratum: R. confer. Ros. 3. ij. confer. Acetosæ 3. j. conferu. Viol. Bugloss. Nenuph. ana 3. b. rob. de Ribes q. s. & prout acidulum esse cupimus; Vtatur.

Linctus ad idem paratur: R. mucilag. feminis Psyllij, Cytonior, vel gummi Traga-

chant. extractæ cum aqua Ros. addito Saccharo, vel Syrupo conuenienti.

R. mucilag. prædictarum ʒ. j. syrups de Agrestia ʒ. ʒ. Sacchari parum: fiat linctus.

Vel semina Psyllij, Cytoniorum, sacculo indita, addito Saccharo, refrigerataque in aqua, sæpe linguæ imponantur.

Trochisci in ore eandem ob causam donec sensim diffuant, retinentur: R. medullæ 4. sem. frig. mai. ana ʒ. j. sem. Portulacæ, Amyli, succi Liquirit. ana ʒ. ʒ. incorporentur cum inf. gummi Tragach. fiant formulæ.

Oris refrigeratio actualis, plurimum iuuat. Si sæpe colluatur Aquâ frigidâ, addito præsertim Acero; brodio item Brassicæ conditæ, vt dictum; vel aquâ stillariâ Rosarû, Vitium, Acerosæ, &c. Et si in ore Chrysalum refrigeratum, vel Lapillos, vel etiâ Glaciem teneant, sæpeque permurent.

Sunt qui Mucilaginis seminum, & oleo Rosaceo, linguam illinunt.

Aër frigidus inspiratus frequenter, non quod refrigerando pulmones, sitim illorum causâ tantum factam, emendet, sed quia calorem in genere corrigit totius corporis, quia succingentem oris tunicam stomacho & ventriculo connatam, refrigerat, vt minus sitiant, efficit.

Sicuti & aliæ externæ refrigerationes, per Balnea, Pedum & extremitatum lotiones, Linteaminum, Indusiorum mutationes, idem efficiunt.

Quod & Epithemata hepatis cordisq; regioni adhibita, præstant.

Colli & gutturis inunctio ex ol. Violaceo, Nenupharino, de Salicibus, Papauerino, aliud quoque adiumenti adferre creditur.

Sunt qui & caput iisdem oleis, ad sitim in febribus corrigendam, inungunt: consensu, quod caput cum ventriculo neruorum causâ habet, iuuare existimantes: quod ego quia somnum prouocat, illud facere potius existimaui.

Somnus sitim sedat, vt inquit Hipp. non quod humectet, vt voluerunt: sed quia per somnum calor ad exteriora potius feratur, sicuti hoc sudores, qui tunc facilius fiunt, satis declarant.

Quies, cum per eam corpus minus inca-

lescat, minusq; humor dissipetur, conuenit.

Quod & pauca locutio, cum multa sitim augeat, refertur.

DE HÆMORRHAGIÆ DEFECTV.

C A P. XIV.

Genera.



HÆMORRHAGIARVM, quas natura certo tempore, per certas vias molitur vtiliter, defectus, p ratione loci primum differunt: prout nimirum illæ vel nō fiunt, vel non sufficienter, quæ per vterum, vel podicē, vel nares, aut alia loca fluere debebant.

Quæ per vterum fit in fœmineo sexu sanguinis euacuatio mēstrua dicta, singulis mētribus toto ætatis tempore, annis quadraginta quodammodo comprehenso, quo fœmina ad conceptum habilis est, & nec vterum gestat, nec lactat, consueta & necessaria, si deficiat, Mensium suppressio dicitur. Hæc q; varians quod vel nunquam quibusdam, quod tamen rarum est, etiam citra incommodum menses fluxerint: quæ idē quasi virilem naturam induissent, Viragines dicuntur. Aliis verō etsi manarint, postea cessarunt, nec amplius redierunt. Aliis toto anni spacio, vel mētribus aliquot substituerunt. In quibus, primum lassitudo spontanea sese offerens morbos prælagit: Dein cardialgia, appetitu prostrato, & nausea, in vomitionem aliquando tendens; infestat: Cordis & artiarum palpitatio molesta est: Capitisq; dolores adsunt: Insomnia grauiam mentem perturbant: Pallor faciei & huiditas, vitium hoc prodit: Vrinarum cruditas inter reliqua signa quoque demonstrat. Quæ vt præter naturaliter mēstruis suppressis, in plethoricis magisque in cacochymicis succedunt: ita etiam naturaliter cessantibus mētribus in puerperis quibusdam, ex illis accidentibus, quædam illis eueniunt: & vomitus in primis mētribus admodum vrget easq; afficit. Ad hunc defectum, si parcius quam constitutio cuiusque requirebat, fluant, refertur.

fertur. Vt cum minori quantitate quam par erat, redduntur. Aut vix vnum aut alterum diem perseuerant. Quod si frequentius accidat, damnum quoque tandem inferre solet.

Purgatio
post partum defectum.
Est & alius, qui partum mox subsequitur, per vterum sanguinis effluxus, necessarius, per dies aliquot perseuerans, abundantiusque quam menstruus fluxus fluens: quem Purgationem post partum appellant. Quæ si non fiat, aut diminutè, morbis grauissimis, dolori colico, conuulsionibus, aliisque occasionem præbet.

Hæmorrhoidum suppressio.
Per podicem in utroque sexu sanguinis effluxus, hæmorrhoidis generali vocabulo appellatus, quibusdam saltem naturis consuetus, vel semel in anno, vel certo anni tempore, deficere dicitur, si tunc solita hæc euacuatio, illis præsertim quibus peculiaris sit, non superueniat: vocaturque Hæmorrhoidum suppressio. Quem defectum tunc potissimum explicant Medici, si qui eo laborant, accidentia quædam patiantur, quæ ex retentis hæmorrhoidibus prouenire cognoscant: in illis præsertim quibus prius aliquando hæmorrhoides fluxerunt, & tunc suppressæ sunt, cum cacochymicos morbos, ut cæcexiam, febrem quartanam, melancholiam, aliosque similes patiuntur. Verum & ægri ipsi, cum hunc fluxum fastidiant, nec expetant, proin nec de illius effectu conquerruntur; tunc maxime ex illius suppressione se malè habere & affici præsentunt, quando venæ hæmorrhoidales inflatæ, magnum cruciarum illis adferunt, neque aperiri, quod necesse erat, possunt, quas Cæcas hæmorrhoides vocant.

Narium hæmorrhagie defectus.
Per nares, hæmorrhagia generatim sic dicta, quæ suo tempore facta, quibusdam naturalis est euacuatio, plethoricis imprimis iuuenibus & viris consueta, cum alias illius euacuationes non habeant: mulieribus item quibus menses decenter non fluunt: & grauidis quandoque: virginibusque antequam menses erumpant: & in morbis interdum critica; aut alias necessaria euacuatio, si subsistat, huc quoque referri potest: cum in ea prouocanda Medici tunc quoque laborent.

Partium æstuarum hæmorrhagie.
Per alias vias si sanguis effluat, etsi quandoque iuuat, tamè cum non adeò fiat secun-

dum naturam, aut Medicus id moliri soleat, si non fiat, ad defectus hæmorrhagiarum naturalium pertinet.

Cause.

Hæmorrhagiarum dictarum defectus, vel ob sanguinis qui fluere debebat, penuriã aut vitium accidit. Vel ob venarum obstructionem, aut coarctationem euenit.

Cum in fœminis eã ætate, quã ad conceptum maturæ habilesque sunt, non tantum sanguinis ea quãtitas, quæ pro corporis nutritione necessaria erat, sufficiat, sed & pro fœtus enutritione, maior adhuc illius, singulis mensibus requiratur, & circa venas vteri colligatur, isque si illo mense conceptus fiat, ad illius augmentum & nutritionem retineatur, si verò non cõcipiat, absoluto mense è corpore repurgetur: si copia hæc sanguinis desit, aut non sufficiens adsit, menstruorum quoque fluxus vel nullus, vel diminutus erit. Quæ penuria sanguinis, etsi à diuersis causis procedere possit, non tamè omnes causam huic suppressioni præbent.

Constitutionis cuiusdam peculiaris occasione, sed rarò euenit, ut fœminæ inueniantur, in quibus, uti natura, cum ad cõceptum nondum idoneæ sunt, non plus sanguinis quam corpori nutriendo opus erat, generat, sic & deinceps in illis iam ad concipiendum aptis, hanc moderationem seruat: quæ proin etiam sine noxã menstruis destituuntur, atque steriles ob hunc defectum, manent. Quam illarum hanc constitutionem, quia cum virili nonnihil conuenire videtur, virilem vocant, ipsasque Viragines appellant.

Ob succi è quo sanguis gigni debuit defectum, ut menses parcius potius fluant, quam omnino desinant, accidit: cum natura consuetum hunc ordinem, etiam in sanguine non adeò redundante, nihilominus seruet. Fieri tamen potest per longam inediam, aut ciborum paucioris succi diuturniorem vsum: & in morbis potissimum, in quibus ob longam abstinentiam corpus marcescit, ut in mensibus defectus aliquis se offerat.

Absumpto quoque in morbis acutis sanguine ob caloris vehementiam, si diu perfliteret, idem euenire posset: sed quia breues

rhagie defectus.

Cõstitutio virilis, causa mensium suppressionum.

Parsumonia in cibis, causa mensium suppressionum.

Sanguinis per alios vias effusio.

causa sup-
pressorū
menstrui
& hæ-
morrhoidū.

sunt, in illis calor potius intempestiuum vel immoderatum fluxum concitat, quàm suppressio, sæpe etiam vt in crisi superueniens, morbum soluat, facit. Quod & à nimis euacuationibus, vt magis promoueantur, commotà per eas excretrice facultate, quàm sistantur menstrua, euenit. Nisi hoc per magnas fiat hæmorrhagias: inter quas & hæmorrhoidum nimius fluxus, menstruum sistere vel imminuere potest: & vice versâ menstruorum fluor, hæmorrhoides, & vtrumque narium hæmorrhagia, aliæq; & e contra, hæ illas. In quibus tamen hæmorrhagijs, non tam quòd sanguis nimium profundatur, quàm quòd ad alia loca deriuetur, fluores dicti subsistunt, vel segnius fluunt. Quæ & præcipua hæmorrhoidum suppressorū causa est, quòd natura illuuiem illam nō ad venas hæmorrhoidales deriuat, sed alibi retinet, aut aliò propellit.

Crassities sanguinis, causa menstrui suppressorū.

Sanguinis vitium menstruorum suppressioni, vt & hæmorrhoidum, sæpius occasionem præbet. Si tale sit, quod illum minus fluxilem reddat. Vti fit si crassior quàm illius natura requirebat, fiat: vel ciborum ingestorum crassiore succum gignentium causâ: vel quia sero minimè dilutus, vehiculo hoc suo destitutus, crassescit. Quæ & causa, quòd in cacecticis & hydropicis, sero è venis exudante, menstrua suppressa sint, sectaque venâ, crassus sanguis potius quàm serosus detrahatur. Sed & coralli alicuius rubri vel etiam albi instar, si illum congelari contingat, qualem alij quoq; se vidisse prodiderunt, & nos è venis aliquando extraximus, illud longè magis efficit.

Cruditas & impuritas sanguinis, causa menstrui suppressi.

Crudus quoque sanguis, aut aliàs impurus & cacochymicus, non solum ob crassitiem, si modò crassus simul sit, (sicuti aliquando è vena secta, sanguine extracto & concreto, in superficie illius eiusmodi tenacem & crassam, in cutem veluti cōdensatam materiam extensam videmus) sed & quia laudatus minimè est, sed vitiosus, vt à natura minimè menstruatim euacuatur, in causa est: quæ vt foetui prospiceret, laudatū & purum potius sanguinè ad vterum, quàm impurum, quo minimè foetus frui potuisset, sicuti & in modò natis purissimum mamillis,

ad lactis generationem demandare solet, & proin cū talis non est, natura in eo propulsando minimè sollicita, vt menstrua non fluant, accedentibus præsertim alijs quoq; impedimentis, vt obstructione, de qua mox dicetur, occasionem præbet. Quæ & causa, quòd cacecticis, leucophlegmaticis virginibus, menstrua, quamdiu vitioso sanguine scatent; retenta sint, donec rursus sanguine repurgato, coloreque viuido redeunte, ad menstruas pristinas expurgationes redeant. Ex quo satis quoq; patet, menstruum hunc fluxum naturalem, non, vti communis est opinio, ad vitiosi sanguinis euacuationē, cū si is superabundet, fluxus hic potius cesset, à natura institutum esse, & proin non quod qualitate peccet sanguis, sed quantitate redundet, euacuari: aut si eiusmodi redundantia, per hæmorrhagias vteri, vel menstruo tempore, aut extra hoc expurgetur, etsi eo quòd corpus purgat, iuuet, præternaturalem tamen, sicuti & tunc immoderatiùs plerumque, nulloque ordine fluere solet, existere. Qualem & mulieribus, quibus iam ob ætatem menses desierunt, nihilominus frequenter accidere, in hæmorrhagijs immoderatiùs fluentibus, ostendemus. Nec nos mouere debet, quòd hæc sanguinis impuritas hæmorrhoidibus, vt fluant, occasionem præbet, cū huius fluxus longè alius quàm menstrui sit vsus & ratio. Qui &, licet per eum crassus foeculentusque sanguis expurgetur, nisi quid aliud obstat, & à natura ad venas hæmorrhoidales deriuetur, facile tamen in consuetis, per illas expurgabitur.

Obstructio venarum, hæmorrhagiarum naturalium defectuum, causa interdum existit; Imprimis in visceribus & vasis maioribus, vel illis quæ ad partem per quam sanguis fluere debebat, pertinent, facta. Idque, quòd illius naturalis distributio & deriuatio ad partes, per quas illum excerni oportebat, impedita sit: sicuti videmus per cucurbitam visceribus admotam retracto sanguine, aut aliàs per venam sectam reuulso, quia cursus hic illius sistitur, hæmorrhagias cessare, contrariòq; motu in pede sanguine detracto eo ad inferiora commoto, menses moueri. Hincq; cacecticis, non tã quòd impuro sanguine

Obstructio in visceribus & extra hæc causa suppressorū menstrui & hæmorrhoidum.

sanguine redundant, de quo prius dictum, quam obstructionum harum causâ, mēstrua supprimuntur. Et obstructionibus factis in venis meseraicis, hæmorrhoides consuetæ nō ampliùs fluunt, ob eamq; causam postea in graues morbos, qui ob putredinem & impuritatem, à sanguine venarum meseraicarum nascuntur, vt febres, melancholias, epilepsias incidunt: à quibus vix, nisi hæmorrhoides redeant, liberātur. Verum & in ipsis partibus quæ sanguinem effundunt, si hæc obstructio fiat, fluxus illius intercipitur mēstruus, si venæ ceruicis vteri, vel quæ post partum sit expurgatio, si etiam venæ vteri obturatæ sint: hæmorrhoidalis aut narium hæmorrhagia, si illis in locis hoc fiat. Idque vel ipso sanguine crasso, tenaci, illic subsistente, sibiq; viam præcludente, aut alioquin concreto & grumoso, qui post partum, purgationes solitas, frequentius præcludit: aut ab alijs humoribus.

Obstru-
ctio in
vasis
partium
per quas
sanguis
fluit, cau-
sa Men-
strui, Hæ-
morrhoi-
dum, &
Purga-
tionis
post par-
tum de-
fectus.

Coarctatio etiam venarum in illis locis, o-
sculorumq; illorum occlusio, sanguinis flu-
xum supprimit. Quod aliquando à pingue-
dine nimia, venas, illorumq; orificia oblite-
rante, si copiosior vteri venis adnascatur, p-
dire docent: Aut è callo seu cicatrice, post v-
teri exulcerationes relicta: Vel alio aliquo
duro scyrrhosoque tumore. A quibus poste-
rioribus, etiam podicis venæ hæmorrhoida-
les occludi possunt. Imprimis verò, si in tu-
morem hæ venæ eleuatæ, qui interdum du-
rus & verrucosus est, sanguinem, quo imple-
tæ sunt, natura que euacuare nititur, profun-
dere nequeant: sicuti in dolentibus hæmor-
rhoidibus cæcis dictis, explicabitur. Confor-
mationis vitio, ab ortu, vterus sic potest esse
formatus, vt vel venter hæc desint, aut penitus
occaluerint, in illis quibus nunquam men-
ses fluxerunt, viraginitibus.

Pingue-
do, causa
Menstrui
defectus.

Callus, ci-
catrix, &
Scyrrh?
causa
Menstrui
& Hæ-
morrhoi-
dum sup-
pressorū.

Tumor
verruco-
sus, causa
Hæmor-
rhoidum
suppres-
sorum cum
dolo-
re.

Cōforma-
tionis vi-
tium cir-
ca vteri
causa sup-
pressorū
Menstrui.

Ab intemperie vteri frigidiorē, (vti volūt
& mulieres sibi potissimū persuadent, &
proin adeò à frigore sibi cauent, & à frigidis
cibis abstinent, & si illis mēstrua cessent,
quòd certis cibis, frigidioribus imprimis vsq;
sint, inde accidisse credunt) si fiat mēstruo-
rum defectus, cum adeò hæ partes, vt vena-
rum attingantur orificia diuque constricta
maneant, refrigerare difficulter possint, vix

hoc euenire potest. Nisi hoc ea ratione, quòd
frigiditas, vt sanguis minùs aptè fluat, effi-
cit, cōtingat. Aut si frigiditas ea dicatur, quæ
calore partis natiuo debilitato, superuenit, &
tūc facultate expultrice lāguidiore existere,
mēstrua rariùs vel parciùs fluant, accidit.

Imbecilli-
tas vteri,
causa
Menstrui
deficiens-
tium.

Curatio.

IN mēstrum defectu (de reliquis enim
postea agemus) hæc methodus obseruan-
da. Si eo ætatis tempore, quo mulier non
fœcunda est, mēstrua non fluant, quia hoc
naturale est, mutari minimè debet: Proin ni-
si præteritis iam pubertatis annis, qui deci-
moquarto ætatis in alijs citiùs, in alijs tar-
dius incipiunt, nondū fluxerint; vti plerun-
que in virginibus accidit malè tunc colora-
tis & affectis, prius cura nulla instituenda. Et
si annis quatuor, quinque vel sex ante quin-
quagesimum mēstrua cessarint, non am-
plius reuocanda sunt. Nec eo tempore, quo
mulier fœtum conceptū, proprio sanguine,
aut in lucem editum eo in lac conuerso e-
nutrire debuit, etsi plus sanguinis quàm fœ-
tus absumat, in ea cumuletur, & in quibus-
dam mēstrua adhuc aliquoties se manife-
stent; neq; in grauidis, etsi accidentia quoq;
quædam, quibus menses deficere solent ac-
cidunt, primis mensibus appareant: neq; in
lactantibus, temerè menses ciere oportet. Vt
nec illis septimanis, etsi menses prouocandi
sint, quibus prius non fluxerunt, nisi hoc ad
præparationem corporis fiat, sed ea demum
septimanâ, quâ menses antè fluere consue-
uerant, aut indicia quædam ac si fluxurè qui-
dem essent, si modò possent, quod ex suppu-
tatione, dolore dorsi, aliisque coniecturis se-
se offerentibus assequimur, aut eo tempore,
quo se quidē manifestant, sed leuiter tan-
tū, & gutta vna aut pauca tantum appa-
rent; menses prouocantia, validiora præ-
sertim exhiberi adhiberi que debent.

Menstrui
rum sup-
pressorū
cura.

In illis quæ ab ortu, ob naturam virilem,
aut constitutionem vteri occlusam, à mensi-
bus immunes & steriles sunt, mēstruum
fluxum ordinariū reddere, impossibile.

Ob sanguinis defectum, si mēstrua pur-
gatio cesset, aut imminuatur, frustra eam p-
uocare in macilentis & attenuatis tētabimur, us,
sed

sed potius vt is reparetur, bonâ viuendi ratione studebimus; tuncque sponte redit, vel facile in ordinem suum reducitur. Si verò aliò raptus, non amplius per vterum effluat, eò reducendus erit.

Si vitium sanguinis, aut obstructions in visceribus factæ in causa sint: hisce soluendis & repurgationi sanguinis intendendū, admixtis ijs, quæ muliebria ducunt. Quæ &, si hæmorrhoides, remanēte impuro sanguine in venis meseraicis, non fluant, locū habent.

Durities callosa, scirrhusa, vteri ceruicis, si menses impediat, hæc prius auferenda, dein menses, nisi per se redeant, sollicitandi. A pinguedine si vteri venæ occultatæ sanguinem minimè profundant, ieiunio illum absumere oportet.

In reliquis causis, ab humorum crassitie, & ab vteri venarum obstructione profectis, aut refrigeratione, sicuti & in aliis, quando menses mouere consultum est, sequēti modo procedendum.

Purgantia per aluum conueniunt, si à sanguinis vitio & impuritate menses subsistat: quæ, etsi facultatem expultricem stimulando, deiectiones promoueant, quia tamen simul vteri venarum vim sollicitant, eā quoque ratione menses prouocant: ob quam causam etiam illis quibus fluunt menses, ne nimis fluant, cathartica exhibere veremur, & in illis quibus subsisterunt, plus sæpè cathartici, præsertim si ea quæ menses simul mouent, illis commisceantur, quàm aliis, quæ tantum menses propriâ vi mouent, efficiamus. Quæ nos prout pituitosos, vel biliosos, aut melancholicos humores redundare cognoscimus, seligimus.

Præmittitur autem alui lenitio ex Catholico, Tryphera, Hieræ & similibus.

Præparatur dein humor: R. syrup. de Artemisia, de quinque Radicibus ana 3. j. β. Oxymel. simpl. 3. j. aquarum Artemisiæ, Matricariæ ana 3. ij. aq. Pulegij, Nepetæ ana 3. j. fiat iulep. pro trib. vel quatuor dosibus, aromat. Cinamomo.

Vel hoc decocto: R. quinq; rad. Aperit. in vino macerat. ana 3. β. rad. Rubiæ mai. Eryngij ana 3. vj. rad. Valerianæ 3. β. herb. Artemis. Pulegij, Matricariæ, Melissæ, Nepetæ, Cha-

mædreos, Chamæpith. Thymi ana M. j. summit. Lupul. Cicerum rub. ana P. j. baccarum Lauri 3. β. sem. Anisi, Fœnic. ana 3. ij. sem. Petrosel. Cuscutæ ana 3. j. fl. Rosmar. Sambuci, Buglosi vtriusque ana P. j. rad. Polypodij 3. j. fiat decoctio, cuius colatura dulcoretur Saccharo & arom. Cinam. Pro diebus aliquot bibenda.

Dein purgabitur hac potione: R. Catholici 3. vj. Agarici troch. 3. j. sp. Benedictæ lax. 3. β. Croci gr. v. cum saccharo fiat bolus: Vel bibat cum vino Antos. vel Absynthite.

Vel sic in biliosioribus: R. Tryphere Perficæ 3. vj. Rhabarbari el. 3. j. Spicæ 3. j. el. de succo Ros. 3. j. syrupi Rosar. sol. 3. j. cum aqua Buglosi & Fumariæ, fiat potio.

Vel hoc decocto: R. rad. Liquiritiæ 3. j. Cicerum rub. P. j. Artemisiæ M. j. sem. Anisi, Fœnic. añ. 3. ij. flor. Cord. P. j. rad. Polyp. sem. Carthami, fol. Senæ ana 3. β. Epithymi 3. ij. fiat decoctio: infunde Agarici trochisc. 3. ij. fiat expressio; adde syr. Rosar. sol. 3. j. fiat potio.

Vel per puluerem: R. Turpethi 3. iiii. Agarici 3. ij. Cinam. Zingib. ana 3. β. Salis fossilis 3. j. Croci gr. v. Sacchari 3. ij. fiat puluis: sumat cum Vino albo infus. Artemisiæ: vel aliâ ratione.

Vel per pilulas: R. spec. Hieræ & Bened. lax. ana 3. β. pilul. Fœtidarū 3. j. vel plus si fortiores esse velis, cum Vino albo, fiant pilulæ.

Per vices purgantia mensesq; simul mouentia, eâ septimana quâ menses instare coniectamus, commodè exhibentur: quæ etiam inter ea quæ sumuntur medicamenta, citius illud, vti dictum, præstant.

Inbecilliorib. & virginibus leuiora dantur: & quia amara menses mouent, in forma pilularum præcipuè: quales hæc sunt: R. Aloës 3. j. β. Agarici, Rhabarbari ana 3. j. Myrrhæ, gūmi Ammon. dissoluti in Aceto, rad. Gentianæ & Azari ana 3. β. Spicæ, Cinamomi, Masticis añ. 3. j. Croci gr. v. cum syr. de Artemisia, fiat massa: capiat 3. β. vel 3. ij. acuantur interdum addito Diacrydio.

Vel fit infusio: R. rad. Cichoreæ, Petrosel. Fœniculi añ. 3. β. rad. Azari 3. ij. Absynthij, Artemisiæ ana 3. j. β. fol. Senæ 3. j. Rhabarbari 3. ij. Spicæ 3. j. Agarici 3. ij. Zingib. 3. j. conuascentur p. Vino: Pro duabus vel trib. vicibus.

Fortio-

Fortioribus & ex pluribus concinnatis, in forma syr. ad vsum sic paratur: R. rad. A-peritiuarum ʒ. j. β. rad. Liquiritiæ, Pæoniæ rec. ana ʒ. j. rad. Ireos, Azari, Rubiæ mai. E-ryngij, Dictamni albi ana ʒ. j. radic. Aristol-loc. Valerianæ ana ʒ. β. Cyclaminis ʒ. ij. herb. Artemisiæ, Matricariæ, Pulegij, Maioranæ, Melissæ, ana m. j. herb. Sabinæ, Serpilli, Mar-rubij, Cardui ben. Thymi ana m. β. flor. Ro-smar. Sambuci, Cordial. ana p. j. flor. Cheiri p. j. β. Cicerum rub. p. j. baccar. Iuniperi & Lauri ana ʒ. β. sem. Anisi, Fœnic. ana ʒ. ij. semin. Cuscutæ, Apij, Petrosel. Leuistici ana ʒ. j. Passul. ʒ. j. β. Ficum num. x. fiat deco-ctio in Aqua & Vino, & in colatura infunde rad. Polypodij, sem. Carthami ana ʒ. ij. β. fol. Senæ 4. j. β. radic. Bryoniæ siccata ʒ. j. ite-rum coquantur & colentur, infunde Agari-ci, Turpethi ana ʒ. β. & si validam operatio-nem requiris Hellebori ʒ. j. Zingib. ʒ. j. β. de-nud bulliant, sed leuiter, colentur: adde Sac-chari 4. j. β. coquatur ad consistentiam syru-pi, de quo sumat ʒ. j. augendo vel minuendo dosim prout operabitur: cum iure Cice-rum, bis aut ter: instante tempore mēstruo: vel in plenilunio, quod idoneum ad hæc ef-fic putant.

Infusio in vino ex amaribus & efficacibus, prius siccatis, id quoq; præstat: R. radic. A-zari ʒ. β. radic. Cyclaminis ʒ. ij. rad. Gentia-næ ʒ. j. β. herb. Absynthij, summ. Centaurij, Sabinæ, Marrubij, Carduibened. ʒ. ij. Maio-ranæ, Pulegij ana ʒ. j. flor. Anthos, Cheiri ana ʒ. ij. sem. Fœnic. Apij ana ʒ. j. fol. Senæ ʒ. j. Agarici, radic. Bryoniæ ana ʒ. β. Turbith ʒ. ij. Zingib. ʒ. j. puluerisetur, infundantur in Vino vt superemineat duobus digitis: & v-tatur diebus aliquot loco syrapi.

Quæ mensium prouocandorum causâ per os exhibentur remedia; Vel quia sanguinē augment in exanguibus fœminis, vt hic fluxus redeat, occasionem præbent: quod, quæ corpus bene saginant, efficiunt. Vel quod calefaciendo & attenuando sanguinem fluxui aptum reddunt: atq; venarum oscula a-periunt, eâdem ratione vt diuretica, à quibus hæc non admodum differunt, id faciunt. Accedente fortè proprietate quoque aliqua nobis incognitâ: de quibus hic agemus.

Præparantur autem varijs modis, & ex-hibentur tempore quo menses aliâs fluere solebant, ieiunis. Aliquando etiam cum balneum intrant, vel ex eo egrediuntur, sic enim potentiùs operantur, & vnum aliud adiuuat: Vti & ante venæ sectionem in pe-de. Quorum exempla præcipua sequuntur.

Inter ea quæ in cibis sumuntur, iusculum hoc sæpè sumptum conuenit: R. Cicerum rubr. p. j. radic. Petrosel. ʒ. ij. flor. Borrag. p. j. Porrorum vel Cæparum mund. num. j. de-coquantur, sumat ius, Butyro & Sale decen-ter conditum, & Croco & Cinam. aromati-zatum, quod singulis matutinis bibat.

Acetarium ex Nasturtio, Sio, addito Ra-phano & Cæpis, comestum sæpè in robu-stioribus conducet.

Ex medicamentosis in substantia, dantur in formâ pulueris per se, cum vino, aquis, de-coctis, alijsve liquoribus, vel cum melle, me-licrato, hydromellite, alijsve syrupis: vel cum saccharo, & tunc tabulæ formantur: vel sunt electuaria aut pilulæ, superbibendo quoq; liquores.

Pulueres autē sic fiunt. Primus: R. Cro-ci ʒ. β. Maceris, Cinamom. ana ʒ. j. fiat pul-uus; Bibat aliquot matutinis.

Secundus: R. semin. Nigellæ ʒ. β. Myrrhæ ʒ. j. Cinam. ʒ. j. Croci ʒ. β. fiat puluis.

Tertius: R. trochisc. de Myrrha, sine as-sâ foetidâ ob foetorem, ʒ. β. sem. Nigellæ, Bo-racis ana ʒ. j. fiat puluis pro vnâ vice.

Quartus: R. rad. Azari, fol. Sabinæ ana ʒ. β. sem. Paludapij, Petrosel. ana ʒ. j. Cinam. ʒ. β. Croci ʒ. j. Myrrhæ, Succini ana ʒ. β. fiat puluis: capiat ʒ. j.

Quintus: R. rad. Azari, Dictamni albi, Rubiæ, Ireos ana ʒ. β. radic. Cyclami. fol. Sa-binæ, Pulegij, Rutæ, flor. Cheiri, sem. Nigellæ, cort. Calsiæ fist. & Calsiæ lignæ, ofsium Dactylorum ana ʒ. j. Cinam. ʒ. j. Schœnan-thi ʒ. β. Croci ʒ. β. fiat puluis: Pro pluribus vicibus.

Sextus: R. ofsium Dactylor. Borracis, sem. Lauandulæ ana ʒ. j. Maceris ʒ. β. Croci gr. v. fiat puluis, pro vnâ vice sumendus.

Septimus ex splene paratur, quod reme-dium singulare perhibetur, potest sic parari: R. Splenem bouis iunioris castrati, torrea-

tur in cistano, cuius 3. j. addito Cinam. 3. β. Croci gr. iij. puluerisata, cum decocto Cicerum vel Pisorum, sæpe propinetur. Paracelsus ipsius essentiam elicit atq; exhibet.

Salia chymistarum probantur, Artemisiæ, Melissæ, & radicis Chelidonij.

Inter electuaria, Theriaca diateffaron ad 3. j. exhibita, ad menstrua prouocanda approbatum est remedium.

Tryphera magna sine opio, ad 3. j. β. propinata idem præstat.

Electuarium Hæmagogon, præter quod alias sanguinis excretiones iuuat, imprimis in sanguine menstruo euacuando valet, si illius 3. j. vel ij. exhibeantur.

Electuarium de Scoria, vel limatura Ferri Rhazis, ad quantitatem castaneæ propinatum, quoque confert: in cacecticis præsertim foeminis.

Aliud sic parari potest: R. radic. Aristol. Ireos, Rubiæ ana 3. j. fol. Sabinæ, Marrubij ana 3. β. Schœnanthi, Spicæ, Xyloaloes ana 3. j. gummi Laccæ 3. β. cum Melle fiat electuarium: Vel datur alio modo.

Efficacissimum hoc est: R. succi Mercurialis & Mellis ana æquales par. coquantur in formam syrui: quo excipe puluerem seminis Nigellæ, addito pauco Cinam. & 3. β. Croci, donec spissum fiat electuarium: De quo sumat cochlj. Vel si inspissare velis, vt pilulæ formentur, eâ formâ degluriat.

Conseruam Borriginis cum Vino, pro secreto habent in hoc casu mulieres.

Inter pilulas, vsuales de Castorio pilulæ exhibitæ, menses educunt.

Ex trochiscis, de Myrrha, qui ad menses mouendos potissimum in vsu sunt, rectius, ob foetorem assæ, quam si alia formâ eas sumerent nemo ferre posset, pilulas ex illis parabimus, & aliquot exhibebimus.

Vel hoc modo: R. trochif. de Myrrha 3. j. Castorij 3. β. cum succo Artemisiæ, fiant pilulæ paruæ; & sumat.

Vel hoc pacto: R. Myrrhæ 3. j. Aloës 3. β. sem. Lupinorum & Nigellæ, radic. Rubiæ tinct. Gentianæ ana 3. β. Croci 3. j. Boracis 3. β. cum syr. de Artemisiâ fiat massa: capiat 3. β. pro vice.

Vel ex lachrymis: R. Myrrhæ 3. j. Calba-

ni, Assæ foetidæ ana 3. β. Castorij 3. j. Croci 3. β. sem. Nigellæ, rad. Azari ana 3. ij. cum succo Sabinæ & Melle, fiat massa: capiat 3. β.

Vel sic: R. Agarici, Hermodactyl. ana 3. β. fimi Caprarum sylv. exiccati 3. j. gum. Laccæ, Myrrhæ ana 3. ij. cum syr. de Artemisiâ, fiat massa: capiat 3. j.

In cacecticis virginibus ad obstrukciones soluendas & menses mouendos: R. troch. de Capparibus, de Rhabarb. ana 3. β. gum. Ammon. dissol. in Aceto forti 3. j. rad. Gentianæ, semin. Apij, Petros. rad. Azari ana 3. ij. trochif. de Myrrha 3. β. cum syrupo de Artemisiâ, vel de Radicibus, fiat massa: capiat alternis diebus, vel triduo 3. β. vel 3. ij.

Liquidâ formâ bibenda dantur, aque, succi, decocta & infusa, vel simplicia, vel inuicem permixta: additis interdum pulueribus, electuarijs alijsve in illis dissolutis.

Aquæ elicite laudantur præcipuè, Artemisiæ, Sabinæ, Pulegij, Matricariæ, Melissæ, Calamenti, Mentastrî, Nepetæ, Petroselinî, Fœniculi, Raphani, Acori, & Cinamomi: per se data, vel inuicem permixtæ.

Succi conueniunt ab iisdem plantis expressi: sed magis grati sunt, succus Raphani, Eryngij, Porri: item succus ex virgultis Salicum rubrarum expressus: Vinum item album tenue: quæ ceteris pmixta sumuntur.

Vel hoc modo: R. succi Raphani & Eryngij ana 3. ij. succi rad. Ireos 3. j. additâ Sacchari æquâ portione: Detur 3. j. β. cum Vino.

Vel sic: R. iam enarratos succos, addendo succi Artemisiæ, Pulegij, Petroselin. 3. j. Sacchari æquas ad omnia portiones: coque in formam syrui: Da 3. j. β. vel plus, cum Vino, vel per se.

Decocta vel infusa in aqua vel vino, vel alio liquore, sunt ex prædictis plantis, ad hunc vsu, ex quibus aquas elici diximus. Et præter hæc Cicerum decoctum valde hic commendatur: feminis item Iuniperi & Lupulorum: Item Phæxolorum, Pimpinellæ, florum Chamomil. & Hordei quoque decoctum.

Ex his fiunt composita hoc modo: R. Artemisiæ, Pule. Melissæ foliorum siccator. ana 3. ij. baccarum Lauri, Iuniperi, ana 3. β. decoquantur in Vino: Bibat.

Vel sic: R̄. radic. Paludapij, Apij veri Fœniculi ana ʒ. j. β. Cicerum rubr. Hordei ana p. j. decoquantur, addendo in t̄b. j. Mellis crudi ʒ. iij. Vini ʒ. ij. iterum bulliant, despu-
mentur: Bibat aliquot vicibus.

Vinum amarum valde efficax: R̄. radic. Gentianæ, Valerianæ sicc. Azari ana ʒ. ij. rad. Rubiæ mai. ʒ. β. Scyllæ præpar. ʒ. j. herbar. Absynthij, Cardui bened. Artemisiæ, Sabinæ, Rutæ sicc. ana ʒ. iij. infundantur in Vini mens. j. bulliant in duplici vase: Bibat de eo ʒ. iij.

Vinum ex infusione aromatum & mellitum quoq; mensium fluxum iuuat: Hippocraticum vel Claretum dictum.

Syrupus ad vsum sic paratur: R̄. rad. Aperi-
tium ana ʒ. ij. rad. Eryngij, Rubiæ mai. ana ʒ. j. rad. Azari ʒ. β. herb. Artemisiæ, Pulegij vtriusque, Serpilli, Sabinæ, Melissæ, Calamenti, Nepetæ, Rutæ ana m. j. florum Anthos, Camomil. odor. Cheiri, Genistæ, Hyperici ana p. j. femin. Apij veri, Leuistici, Fœniculi ana ʒ. ij. Cicerum rub. p. j. granorum Iuniperi p. β. fiat decoctio in Aqua & Vino, & in colaturæ t̄b. iij. dissolue Mellis crudi ʒ. vj. decoquantur & despu-
mentur: & vtatur. Vel redigatur in formam syrupi, vt ad vsum seruari queat.

Syrupus de Artemisia, de Calamenta, de duabus & quinq; Radicibus, Oxymel. simpl. compos. diureticum & scylliticum, vfitat ad hæc asseruantur.

Potiones aliæ ex horum omnium mixtura variè fieri possunt. Exempli gratiâ: R̄. syr. de Artemisia, ʒ. j. β. aquarum Pulegij, Melissæ ana ʒ. ij. aquæ Cinamom. ʒ. ij. fiat iulep. Pro vno haustu.

Vel sic: R̄. rad. Petros. ʒ. j. Cicerum rub. p. j. Pulegij m. j. femin. Fœniculi, Petros. ana ʒ. j. fiat decoctio in Vino, in colatura dissolue Tryphæ magnæ sine opio, vel Theriacæ diatesaron ʒ. j. syrup. de Artemisia ʒ. j. Croci ʒ. β. fiat potio: Pro vnâ vice.

Ex topicis, balnea humida, vel pro infusione facienda, vel ad forum regionis vteri, ad menstrua prouocanda vsurpantur; Eo maximè tempore, cum menses instant: diebus aliquot repetitis manè & vespri: per horam vnâ. Quem tamen non aded, vt

sudores prouocent, quibus menses impedi-
rentur, actu calefacere debent. Ob quam & causam non siccare aut astringere, sed potius relaxare debent: vnde & accidit, quod quando thermas siccantes eo nomine ad-
eunt mulieres, harum vsu nullum emolu-
mentum sentiant. Parantur autem ex deco-
ctis plantarum odoratarum, aliarumq; cali-
darum, varijs modis: maiore quantitate pro
infessione: minore pro fotu fumendo, & in
aquâ addito Vino coquendo.

Paratur facilè etiam hyemis tempore: R̄. fol. Sabinæ, Rutæ recent. flor. Lauandulæ, m. ij. vel plures, baccarum Iuniperi p. ij. co-
quantur pro infessione vel fotu. Aestatis
tempore adde Mercurialis rec. m. ij.

Aliud pro pauperibus: R̄. Cæpas, Por-
ros, & nisi odor impediât, Allia, cum toto,
decoquat per se, vel cum supradictis quan-
titate aliquam.

Tertium tale erit: R̄. rad. Liliorum, Va-
lerianæ, herb. Artemisiæ, Sabinæ, Rutæ, Me-
lissæ, Leuistici, Pulegij, Calamenti ana m. j.
vel ij. flor. Chamom. Sambuci ana p. j. vel ij.
sem. Lini, Fœnogr. ana ʒ. j. femin. Carui ʒ. β.
baccarum Lauri, Iuniperi, Cicerum rubr.
ana p. j. coquantur.

Compositum ex multis sic fit: quod & et-
si non omnia recipiat, efficax tamen erit,
si reliqua maiori quantitate addantur: R̄. ra-
dic. Liliorum, Altheæ, Ireos ana quar. j. rad.
Rubiæ mai. Aristoloch. vulgaris, Valerianæ
ana ʒ. iij. rad. Azari ʒ. j. β. radic. Acori veri,
Enulæ camp. ana ʒ. j. herbarum Artemisiæ,
Sabinæ, Rutæ, Abrotani, Matricariæ, Melis-
sæ, Calamenti, Nepetæ, Pulegij, Origani,
Spicæ celt. Leuistici, Satureiæ, virgulta-
rum Salicum rubrarum confectarum ana
m. ij. femin. Centaurij min. Cardui bened.
Maiozanæ, fol. Lauri ana m. j. florum Cha-
momil. Anethi, Sambuci, Lauandulæ, Chei-
ri, & Leucoj ana p. j. feminum Lini. Fœno-
gr. ana ʒ. j. feminum Nigellæ, Nasturtij ana
ʒ. β. bacc. Iuniperi, Lauri ana p. j. feminis
Apij. Leuistici ana ʒ. ij. decoquantur pro
balneo.

Fotus ex efficacioribus sic fit: R̄. rad. Ru-
biæ, Azari, Aristolochiæ, Cyclaminis ana
ʒ. j. fol. Cucumeris asini Mercurialis añ. m. j.

Myrrhæ ꝓ. coquantur in Vino & aqua, dissoluantur succi Artemisæ & Sabinæ ana ꝓ. j. fellis Vaccæ ꝓ. Pro fotu.

Iisdem decoctis, si crura calidè manè & serò, à summo ad imum pedem descendendo abluantur: vel aliàs pedes aliquamdiu profundè in illis immergantur, idem quoq; sæpè repetita, facere poterunt.

Et si per clysmata injiciantur, quia vteri ceruix recto intestino incumbit, non minus quàm extrinsecus operabuntur. Quod tunc maximè cum alius suppressa, clysmatum vsum requirit faciendum: cum & clysmata stimulantia aluum, ex Mercuriali, Benedicta, Hieris parata, vterum quoq; vicinum ad menses sollicitent. Quod & rectius præstabit, si prædictorum quoq; simplicium decocta vel succi permisceantur.

Vel hoc modo, valde efficax, si aliquoties fumatur, enema: R. rad. Liliorum ꝓ. iij. radic. Ireos rec. ꝓ. j. β. rad. Valerianæ ꝓ. j. herb. Artemisæ, Sabinæ, Rutæ ana M. j. sum. Centaurij, flor. Chamom. Melilori, Lauandulæ ana P. j. feminum Lini, Fœnogr. ana ꝓ. β. femin. Carui, Nigellæ ana ꝓ. ij. baccar. Lauri P. j. Cicerum rubr. P. j. fiat decoctio: dissolue Bened. lax. Hieræ Logod. ana ꝓ. iij. succi Mercurialis & rad. Ireos ana ꝓ. j. Mellis scyll. ꝓ. j. β. olei Cheirini ꝓ. ij. fellis Tauri ꝓ. j. fiat clyster; Datur sine sale, si diutius retinere posset.

Illitiones in pubis seu pectinis regione & lumbis, post balnea præsertim factæ, illius operationem iuuant, & sine illis quoq; profunt. Qualia omnia ex relaxantibus & calefacientibus oleis & axungijs factæ profunt.

Appropriatum magis huic affectui hoc erit: R. oleorum Cheirini, Iriniana ꝓ. j. misce.

Oleum Muscatum, muscellinum dictum, idem præstabit.

Vel hoc vnguentum: R. olei Amygdal. am. Liliorum ana ꝓ. j. ol. Cheirini, Irini, e floribus Geristæ ana ꝓ. β. axungie Anferis, medull. cruris Viruli ana ꝓ. β. mucilag. sem. Fœnogr. ꝓ. vj. rad. Azari, Aristoloc. Cyclaminis, Ireos ana ꝓ. j. Ceræ quant. s. fiat Vnguentum.

Emplastra quoque admoventur pectini,

& supra pudendum, ex præcedentibus; Veluti: R. rad. Liliorum, Ireos ana ꝓ. ij. bulborum Porrorum ꝓ. j. herb. Artemisæ, Sabinæ, Pulegij ana M. j. Ficum numero x. coquantur in Vino; pistentur; adde fimi Caprarum syl. ꝓ. ij. ol. Lilior. & Cheirini ana ꝓ. j. fiat Cataplas.

Vel: R. olei Cheirini, Irini, Muscellini ana ꝓ. j. Stryacis, Galbani dissol. in aqua Vitæ ana ꝓ. β. Salis nitri ꝓ. j. resinæ Laricæ q. l. fiat emplastrum.

Suffitus, ceruice vteri excepti per infundibulum, aut in sella perforata, muliebria ducunt, si ex aromatibus, vt vult Hipp. alijsq; calidis fiant: quibus & post balnea, alioque tempore, vtantur.

Ex vapore decoctorum, infussionum prædictorum, admissorum, facti conueniunt.

Aut hoc modo: R. radic. Dictamni albi, Rubiæ ana ꝓ. j. herb. Artemisæ, Pulegij, Botryos, Sabinæ, Lauri ana M. j. bacc. Lauri, Iuniperi ana P. j. rad. Galangæ, Zingib. ana ꝓ. ij. Myrrhæ, Bdellij ana ꝓ. β. decoquantur in Vino: & dum calet, suffitum excipiat.

Si quoq; oleum Spicæ, vel Zibetum pudendis apponas, vel illis ea illinas, subtili & vehementi expiratione, vehementer menses cient.

Fumus, idem præstabit, sequens, suavis adhuc: R. Storacis ꝓ. ij. Benzoini, Thur. Gallicæ vel Aliptræ mos. an. ꝓ. β. Garioph. ligni Aloës, Scænanthi, Cals. lignæ ana ꝓ. j. Sacch. ꝓ. ij. excipiantur infusione gummi Trag. factâ in aqua Cinam. fiant trochisci pro fumo.

Vel sic: R. ligni, Sabinæ bacciferæ, & Iuniperi: & supra carbonem projiciantur: Vel baccæ Iuniperi.

Validior hic erit sed foetidus: R. Mumie ꝓ. ij, Galbani, Bdellij, Oppopanacis ana ꝓ. j. Thuris, Storacis ana ꝓ. j. β. rad. Azari, Scænanthiana ꝓ. j. Vngulæ asini velequi ꝓ. j. puluerizentur, & cum resina Laricea fiant trochisci: Vrantur in sella occlusa, dum mulier sedet, vt fumus inclusus maneat.

Pessaria in ceruicem vteri intrusa: vel nascalia admota in virginibus, extrema sunt remedia, quæ vteri oscula suo calore & acrimoniâ aperiant, non tamen nimium irritent aut exulcerent.

Raphanus in formam pessi sectus, subditus id facit.

Mercurialis contusa, in sacculo indita, valde iuvat: cui Centaurij flores si addatur, amplius operabitur. Idem facit Scordium verum vel Alliaria contusa.

Vel sic: R. succi Mercurialis, Cæparum, Fellis vaccæ ana ʒ. j. Mellis ʒ. ij. coquantur ad consistentiam suppositorij: & vnum indatur.

Quibus permisceri possunt hi pulueres: R. radic. Azari, Cyclam. ana ʒ. ʒ. Agarici ʒ. j. Myrrhæ ʒ. ij. excipiantur Melle cocto vt prius, vel solo: fiant pessaria.

Vel sic: R. Aloës ʒ. ʒ. Myrrhæ ʒ. ij. rad. Gentianæ ʒ. j. ʒ. sem. Nigellæ ʒ. j. excipiantur Felles bouis: fiat pasta pro pessarijs.

Aliud ex speciebus: R. spec. Hieræ Picræ, & Bened. Lax. & troch. de Myrrha ana ʒ. j. ʒ. cum Mellis cocti ad tenacitatem q. l. fiat pessarium.

Vel ex antidotis: R. Tryphæræ Persicæ sine opio, Theriacæ diatessaron ana ʒ. ij. inspiscentur puluere semin. Nigellæ: Pro pessarijs.

Efficacissimum: R. Myrrhæ ʒ. ʒ. sem. Nigellæ ʒ. ij. Agarici ʒ. j. salis Nitri ʒ. ʒ. cum succo Brasicæ vel Melle in pastam redigatur: Pro pessario. Si addas troch. Alhandal ʒ. ʒ. fiet potentissimum.

Vel ex odoratis: R. troch. Galliæ & Aliptæ mosch. ana ʒ. ij. j. Ziberæ, Mosci, Ambræ portionem, prout diues est: excipiantur Styrace: Pro pessario.

Vel sic additis oleis: R. ol. Muscellini ʒ. ij. Styracis liquirit. ʒ. j. ol. baccarum Iuniperi gut. vj. misceantur: & lana in eo intincto apponatur vel intrudatur.

Infusiones in sinum vteri ex decoctis pro balneo supra expositis, si fiant, longè validius, quàm si extrinsecus tantùm adhibeantur, id præstabunt.

Vel hoc: R. radic. Rubiæ & Azari ana ʒ. ʒ. Artemisiæ, Pulegij an. m. j. sem. Nigellæ ʒ. ij. Lupinorum ʒ. j. fiat decoctio, & in t. ʒ. dissolue succi Sabinæ ʒ. ij. Inijciatur portio.

Ex actu agentibus præsidij, Venæ sectio in pede facta, eo tempore, quo instât, ad menstruum fluxum comouendum præcipuum & vtilissimum est remedium: cum enim ad inanitum ex inferioribus venis sangui-

nem, alius ex superioribus in locum vacuum mox sequatur, concitato sic sanguine, qui prius otiosus & segnis circa vteri venas hærebat, viam illic naturalem potius quàm aliam secutus, per oscula ceruicis vteri erumpens, fluxum consuetum efficit. Ob quam causam non solum in plethoricis, in quibus plethoræ causâ è venis primùm brachij, antequam in pede aperiatur, sanguis mittitur, sed & in macilentis, nisi quid aliud obstat, hoc remedij genus vsurpari potest. Aperiturq; ea communiter, quæ sub malleolo seu talo interiore dispersa est, Saphena dicta, in eo pede vbi hæ venæ magis turgidæ videntur: quem & prius in aquâ feruidâ, & postea quoque cum secta est, vt vena magis pateat, sanguisq; citius fluat, immergere, & tamdiu retinere debent. Sed & in poplitis regione si secetur æquè prodest, citiusq; sanguis effluet. In vtroq; pede eodem tempore, vel in vno manè, in altero vesperi facta, potentiùs adhuc operabitur. In quibus agendis, si fasciâ coxa tota interim strictè cinctâ sit, cum sanguis descendere nequeat, maiori impetu ad vterum præcipitabitur.

Sanguisugæ talo appositæ, si sanguinem sugant copiosum, venæ sectionem ex parte supplere possunt.

Cucurbitulæ in poplite, coxarum interiore sede, & in pube quoque eodem nomine adhibitæ, sanguinem eò rapiunt: præsertim si accedat scarificatio.

Ligaturæ factæ in coxis & pedibus idem præstant. Frictionesq; fortes, per vniuersum pedem deorsum factæ.

Congressus, si legitime fieri possit, virginibus tempore virginittatis, menstruorum defectu laborantibus, pallidis & morbosis, hunc fluxum, si nubant, interdum primâ nocte, sicuti hoc etiam sanis, vt citius quam par erat fluant, quod pro virginittatis indicio certo habent, commouet, & in certum ordinem cum colore viuido & incolumitate restituit.

Purgatio post partum appellata, species illa hæmorrhagiæ, si non rectè procedat, quia, vt dictum, grauissimis morbis occasionem præbet, promouenda erit. Quod idem medicamentis exhibitis, quæ menses aperire docuimus, præstat. E quibus tamen cum

Purgatio
post partum
de
sectus
cura.

habenda sit ratio puerperæ doloribus exagitata & imbecillis, non nimis violenta eligemus, nec quæ corpus admodum accendant, præsertim si febris, ut sæpè fit, adsit, propinabimus.

Et in tali casu febris, hunc puluerem exhibere possumus: R. rad. Pæoniæ (quæ menses prouocat, & si metuatur convulsio duplici nomine proderit) ʒ. j. femin. Maluæ ʒ. ʒ. Myrrhæ, Cinamom. ana ʒ. j. Sacchari ʒ. j. capiat duabus vicibus cum Vino albo, vel aquâ Pæoniæ, vel aliâ supradictâ.

Vel hoc decoctum: R. radic. Pæoniæ ʒ. ʒ. Capill. Ven. Chelidoniam, ana M. j. Artemisiæ M. ʒ. fl. Viol. P. j. Cicerum rub. P. j. Hordei P. ʒ. fiat decoctio: adde Sacchari q. s. aromat. Cinamom. ʒ. j. & Schœnanthi ʒ. ʒ. Pro duabus vicibus.

Damus & efficaciora si nihil obstat; qualia multa dicta sunt, & imprimis hoc decoctum: R. Artemisiæ, Verbenæ, Chelidoniam, gran. Iuniperi q. s. decoquantur in Vino: & bibat.

Vel hæ pilulæ: R. radic. Aristolochiæ ʒ. j. Myrrhæ ʒ. ʒ. Piperis ʒ. j. cum succo Pomæ, fiant parvæ pilulæ: capiat ʒ. ʒ.

Reliqua quoque quod attinet remedia, eadem quæ menses mouere diximus, vsurpantur: ut Insestiones ex Altheâ, Chamomillâ, & Artemisiâ, similibusque. Et vnguenta, suffitus, pessaria, frictions, ligaturæ cucurbitulæ; nonnunquam & venæ in pedibus sectio, consideratis viribus & accidentibus, ex illis quæ menses mouent, conuenientia eligendo administrabuntur.

In hæmorrhoidibus, si consuetæ prius fuerint & subsisterint, manifestumque inde nocumentum imminere vel iam adesse videamus, eas mouere studebimus. Vti & si prius non fluxerint, nihilominus aliquando prouocare nitemur, si illuvies illa quæ morbos parit, per hæmorrhoidum fluxum euacuari potest: sicuti cum in venis mefæraicis causa febrium, melancholiæ, aliorumque morborum latet, facere oportet & conuenit. Dein & quando in venis hæmorrhoidalibus dilatatis & tumidis sanguis turget, exitumque quærit, nec tamen via illi patet, hæc aperienda natura quæ iuvanda est. Quod

in iam dictis causis, quæ illud suadent, hæc methodo perficitur.

Purgantia per sedes, ob impuritatem sanguinis, qui in hæmorrhoidibus suppressis retinetur, quandoque exhibentur, nec tantum eo nomine, sed & quia vim irritando deiectionariam, intestina podicemque stimulo, sic quoque hæmorrhoidum fluxum nonnihil promouent. Imprimis si hæc illis permisceantur, quæ, præterquam quod vtrumque præstant, oscula venarum suâ amaritudine, ut aloë, colocynthis, aliæve, aperiunt: eodem modo sicuti in mensium fluxu purgationes, institui docuimus. Quorum exempla huc quoque referri possunt.

Sicuti & ea, quæ per os ad hæmorrhoides promouendas exhibentur, non alia, quam quæ & menses prouocare, varijs formis proposuimus, cum sint, non hic de nouo repetere necesse est. Sicuti & electuarium Hæmagogon aliâque vsitata, quæ mensibus mouendis ascribunt, idem in hæmorrhoidibus efficere traduntur.

Topica tamen hic potius in hæmorrhoidibus mouendis, quam quæ assumuntur, locum habent, cum venæ hæmorrhoidales non adeo, sicuti menstruæ venæ in corpore lateant & absconditæ sint, rectiusque & propinquius ob id illis admoueri efficaciusque sic operari possint: cum interdum foris quoque prominere & tumere conspiciantur, alias cæcæ, hoc est, conspiciæ minimè sint; & non procul ab extremo annulo podicis absint, ut remedia faciliè eò pertingant, ac inuerso etiam podice illis quoque rectâ applicari queat.

Vnguentis autè hoc præstari potest, quæ podici inunguntur, aut alioquin applicantur. E leuioribus hoc est: R. radic. Ireos, Cyclaminis ana ʒ. ʒ. summ. Centaurij, Matricariæ ana ʒ. ij. puluerizentur, affunde olei Nucum ut superemineat digito, succi Cæparum rubrar. ʒ. j. coquantur parum, colentur; hoc oleo inungat.

Vel sic: R. Lardi saliti, à membranis mundi & cortice ʒ. j. fellis Porci ʒ. ʒ. Fimi Columbini ʒ. ij. Nitri ʒ. ʒ. misce fiat vnguentum.

Aliud: R. spec. Hieræ picræ, Bened. lax. ana ʒ. ij. radic. Cyclam. Aristol. summ. Centaurij

Hæmorrhoidum suppressa et cuncta.

taurij min. ana 3j. excipiantur Melle & Fel-
le: fiat vnguentum.

Efficaciora adhuc hæc sunt: R. succi Por-
ri, Cæparum rub. ana 3j. fellis Porci vel Bu-
buli 3.vj. radic. Cyclaminis 3j. pulpæ Colo-
cynth. Euphorbij ana 3.ß. cum Melle fiat li-
nimentum. Si succum Efulæ vel Lathyri-
dis addas, erit efficacissimum: sed si vrat, re-
mouendum.

Suppositoriorum forma, præsertim si in-
trinsecus hæmorrhoides lateant, est conue-
nientior, si modò non cum dolore intumue-
rint, & diutius ea retinere queant: hoc mo-
do: R. Mellis, succi Cæparum acrium, Fellis
ana 3j.ß. coquantur, permisce in fine spec.
Hieræ picræ 3j. Myrrhæ 3.ß. radic. Cyclami.
3.ß. Salis nitri parum: fiat suppos. Si parum
Hellebori addas, erunt efficacissima.

Radix Ireos recens in formam supposito-
rij secta, atque intincta in Felle: vel si acri-
monia metuatur, in oleo Irino, & subdita
idem facit.

Cepæ vel Allij bulbus, detracto externo
cortice, intrusus idem efficiet: magisque ad-
huc radic. Cyclaminis recens eodem modo
vsurpata.

Insecciones vel externi fortius, & iniecta
clysmata, eadem quæ & menses prouocant,
hic quoque competere possunt.

Suctione facta per sanguifugas, ad sangui-
nem hæmorrhoidalem eliciendum, vtimur:
& vt deinceps libentius spontè quoq; fluant,
hac ratione efficiamus: podicem primùm san-
guine illinendo, vt eo sanguifugæ allec-
tæ, auidius eum apprehendat, & postea per arun-
dinem eas adhibendo. Quod, cum hæmor-
rhoidum fluxum requirimus, tutius & cer-
tius est remedium.

Frictio podicis panno aspero facta: vel fo-
lijs asperis ficus, aut borraginis alijsve, hæ-
morrhoides interdum aperit, vel vt medica-
menta postea melius operentur, promouet.

Sectione cum plebotomo, si vena tumens
appareat, sanguinem quoque emittere pos-
sumus, cauentes tamen ne ab eâ errantes,
podicem qui summe sensibilis est, vulnere-
mus. Sunt qui setis eas pun gere, donec san-
guinem profundunt, doceant. Cæterum ve-
næ sectio alijs in locis facta, vt neq; si in pede

fiat, hæmorrhoides, sicuti verò in mulieri-
bus menses, promouere potest: cum hæmor-
rhoidales venæ, à venæ portæ, non à venæ
cauæ ramis, sicuti menstruæ prodeant: quæ
cum nullibi ad cutem ferantur, et si venæ cu-
tanæ fecentur, nulla ab illis fieri potest san-
guinis euacuatio aut agitatio.

E naribus sanguinem elicere in illis, qui-
bus consueta cum esset hæc hæmorrhagia,
non amplius fit, non inconsultum, præfer-
tim si capitis & oculorum aut aurium ex ple-
thoraimmineant morbi, ad hosce præcauen-
dos, sicuti & ad eosdem curandos, cum infes-
tant, nisi sponte natura has venas aperiat,
fluxum hunc promouere, non minima pars
est curationis.

Actu autem eas aperire phlebotomo, cum
paruæ sint, & nares inuerti nequeant, valde
arduum. Setis tamen aliqui pungendo san-
guinem eliciunt.

Si nares, asperis & aculeatis plantis com-
plicatis in pessum, impleantur, rectius hoc
succedit: præsertim si nares hisce oppletæ
premanur, aut percutiantur: veluti folijs
Millefolij, Borraginis, Rubiæ tinctorum, A-
parines, floribusque graminis, fortè Harun-
dinacei, & similibus.

Vnguentis si nares illinantur, id effici do-
cent, paratis ex Mentha cum Melle: vel Ru-
biæ tinctorum in oleo dissolutæ.

Docoetum Crocodilij radicis bibitum, san-
guinem è naribus elicere docet Dioscor.

In alijs locis internis, vt sub lingua, vel ex-
ternis, vt in fronte, vel brachijs aut pedibus,
(vbi, qui venas malleoli aliquando secue-
runt, pruritum nonnunquam in ambitu ci-
catrix sectionis sentiunt, sanguine exi-
tum quærente, quem & aliquando sponte
apertâ illic cute, effluxisse, vti hoc in equis
consuetum, vidimus) si sanguinis fluxus re-
quiratur, tum ad morborum præcautionem
tum curationem, hoc venæ sectione potissi-
mum perficitur. Antequam, vt venæ tumi-
dæ fiant, meliusque appareant, decocto Sal-
uiæ, alijsque prius foueri possunt. Corpus
quoque exhibitis admotisque calefacere,
cum sanguinem faciat fluidum,
vt rectius educatur,
iuvat.

Narium
hemor-
rhagia
defectus
cura.

Parti-
aliarum
hemor-
rhagia
defectus
cura.

DE SVDORIS DEFECTV.

DE SVDORIS

DEFECTV.

CAPVT XV.

Genera.



Sic hunc affectum appellamus, quando excretio illa, quæ per poros cutis cum madore, quem sudorem vocant, perficitur, tunc cum fieri debebat, & necessaria erat, non succedit: Vel illius loco halitus potius, quam mador, erumpit: aut cum generalem sudorem esse oportebat, pauciores duntaxat partes, vt caput vel pedes, sudant.

*Sudoris eon/ueti-
Suppres-
sio.*

*Sudoris ad sani-
tate nec-
cessarij,
Defectus.*

In sanis alioquin hic defectus accidit, quando in quibusdam naturis plethoricis, vel cacochymicis, aut humidioribus natura sponte per sudores, excretiones certo tempore molitur, sicq; corpus alleniat & postea intermittit: tuncque Sudoris suppressio dici potest. Vel cum alioquin ad sanitatem conseruandam sudoribus opus erat, eosq; exercitijs aut balneis elicere student, nullus tamen sequitur effectus: sicuti aliquibus in ipso æstu balnei sedentibus, sudores tamen minimè emanare, aut tenaci tantum madore cutem obliniri, nec digna quantitate profuere, sæpè vidimus.

*Sudoris in mor-
bis neces-
sarij, De-
fectus.*

In morbis in quibus sudores necessarij erant, vt per illos morbifica causa expurgaretur, hic defectus quoque sese offert, vt sudores naturæ vel artis commoueri nequeant: aut alioquin non rectè procedant. Sicuti in morborum acutorum imperfectis crisis, & in morbis etià diuturnis quibusdam euenit.

Causa.

Serum quando deficit, vel aliò rapitur, aut impeditum est, vel crassum, causa Sudoris defectus.

Ob easdem à sero dependentes causas, sicuti mictio pauca, sic & sudores pauci fiunt, cum materiam & sudori & vrinæ serum præbeat. Vti fit, si exigua illius in corpore sit copia: Aut si non ad habitum corporis, sed aliò serum feratur, atque per multam mictionem, diarrhœas, aliòve modo euacuatur. Quâ ratione in morbis, cum natura per sudores euacuationem tentat, per alias

purgationes factas sæpè impeditur, & non eò quòd vergit, sed aliò ducitur, sudoresq; non procedunt. Dein & ab obstructionibus fieri potest, vt transitu feri impedito, sudores æquè atq; vrina difficulter erumpât: ob quam causam hydropici vt parum mingunt, sic & ægrè sudant, quod tamen illis necessarium erat. Sed & crassities & tenacitas feri, vt mictionem, sic & sudores impedire potest: quæ & in hydropicis leucophlegmaticis, vt minus aptè sudant, facit; & in morbis acutis sudores non prius, donec concocto humore, attenuati sint, erumpunt: atq; ideò quæ sudores mouent, attenuantia sint remedia. Quorum omnium quæ à sero dependent causarum, causas prægressas, in mictionis defectu docuimus.

Verum præter has à sero dependètes causas, frequentior sudoris defectus causa est, quòd serum ad externum corporis habitum non alliciatur, cum ad sudorem euocandum, calor exterior requiratur, quo deficiente, nisi natura spontè in morbis vi quadam eos protrudat, sudare minimè possunt.

Serum quia ad habitum corporis non allicitur, causa Sudoris defectus.

Longeque minus, si accedente contrariâ qualitate, frigore, sudor repellatur, & pori simul astringantur: cum alioquin vix sola pororum obstructio, sudores impedire possit.

Curatio.

Si sudores non erumpant ob feri defectum, frustra in illis euocandis laboraremus, neque illud conueniret. Vti nec, etsi redundet, sed aliò rapiatur, aut per alias vias euacuatur, nisi hoc sinistrè & contrà quàm natura tentat fiat: tunc enim naturâ ad sudores vergente, nec aliæ euacuationes instituentæ sunt, & quæ sinistrè fiunt, impediendæ. In obstructionibus quoque & cruditatibus, si per sudores excrementa expurgare consultum est, hæ prius soluendæ, materiaque præparanda. Verum si præsentè, serosi humoris excrementitij, collecti in venis & corporis habitu, redundantia, cum ad præcautionem morborum, tum ad curationem, hac euacuatione opus sit, eaq; ob crassitiem aut cruditatem non procedat, attenuandus & concoquendus, vt vocant, primùm erit, & si externa aliqua causa sudores impediat, illa ante

Sudoris defectus curatio

529

ante omnia auferenda, & postea ad ea, quæ sudores provocât, deveniendum. Quæ cum in eiusmodi casibus in quibus sudores necessarij sunt, hinc inde explicentur, hic saltem diuerfos modos, quibus illud præstatur, generatim attingemus.

*Sedatio
sive
Sudore
elicitio
remedia.*

Inter ea quæ assumuntur, ad sudorem eliciendum, remedia: alia quæ largâ liquoris alicuius ingestione, sudori materiam præbent, illum prouocant, maximè accedente calore corporis externo, ad interiora illum euocante, nullaque re aliâ impediante. Ita si, dum calent siue in lecto, aut aliâs, & præsertim dum ieiuni sunt, affatim bibant, mox sudor sequitur.

Nec solum si tepida sint sed & frigida, quodd tunc interioribus subito refrigeratis, calor in ambitu corporis citius ad se serum trahat, vel quodd, ob frigidam potionem in calente corpore, exhalatione factam, hæc extrorsum dispersa, sudoribus materiam præbeat.

Præsertim verò si talia fumantur, quæ facile penetrant, hoc citius efficient, suntque hæc, quæ Sudorifera dicuntur, remedia.

Inter quæ, aquæ stillatitiæ ob tenuitatem præualent, eæque præcipue, quæ subtiliores magisque à crassamento repurgatæ existunt, Vt exempli gratia, ex calidis: Cerefolij, Cardui bened. ex alijs Fumariæ, Limonium, &c.

Decocta multa fiunt ad hanc rem. Qualia sunt vsitata decocta, Gaiaci, Zarsæ parillæ, radic. Chinæ, aliorumque lignorum, radic. & herbarum, in multa aqua decocta. Vel Poligoni minoris, Caudæ equinæ, & similia in Vino decocta.

Vel sequens tantopere commendatum & in vsu: quod R. Milij excorticati, cuius loco & Panicum sumi potest, P.j. decoq; in aqua ad crepaturam vsq; colaturæ sume ʒ.iiij. permisce Vini ʒ.ij. Pro vno haustu, Syrupum S. Ambrosij vocant.

Vel sic: R. Hyfopi, Maioranæ, decoquantur in brodio pulli, adde emulsionis de ʒ.ij. femin. Cannabis factæ; Bibat.

In substantia varijs modis dissoluta, aliòve modo, exhibentur, Theriaca, aliaque Antidota narcotica: cum in somno fortî sudores facile erumpant.

Item rob de Sambuco, Ebulo, cum aquas vel decocto datum.

Vel: R. Croci ʒ.j. Zingib. ʒ.ʒ. puluerizentur; Detur cum lacte amygdalino.

Aut: R. Sulphuris ʒ.j. Sumat cum vitello Ori.

Salia, Olea certa aut Spiritus exhibent Chymici, Spiritus Vitreoli guttas, cum liquore conuenienti, dant.

Extrinfecus quæcunque corpus calefaciunt adeò, vt sanguis eò rapiatur, & cum eo serum corpusque rarum fiat, sudores prouocant. Quod mitiori maioreve calore, pro humoris copiâ & corporis constitutione perficitur. Quem sequentia accendunt.

Indumenta integumentaque, multa, & quæ bene se applicant, pellicea, plumea.

Aër, igne, sole calefactus, extrinfecus corpus inflammans.

Aqua calida, naturâ vel arte, in qua corpus immergitur.

Vnguenta quibus spina dorsi, atque vbi maiores sunt venæ, corpus illinitur, nõ adeò violenter sed sensim excalefacientia & rarefacientia, ex oleis conuenientibus parata, vt ol. Liliorum, Pyrethri & simil.

Corporis motus vehemens eâ ratione sudores elicit.

Animi quoque affectus, qui spiritus & humores inflammant, vt Ira, Gaudium; vel exagitant, (nam & spirituum agitatio sudores prolicit) vt Terror, vel Metus, id præstant.

~~~~~

## DE LACTATIONIS

### DEFECTV.

#### CAPVT XVI.

##### Genera.



TSI hæc excretio naturalis, lactis, Lactatio dicta, quæ per papillas suctione infantis, eo tempore, cum mulier illum enixa est, eousque donec aliquantum adauctus sit, procedere debet, non adeò matrinecessaria sit, vt nisi lactet omnino lædatur, cum multas videamus, studio vt habitiores fiant mamillasque elegantiores retineant,

fui ipsius corporis venustati potius, quam liberorum commodo studentes, à lactatione abstinere, nec proin lædi; quod tamen etiam aliquando accidit, quando plethorâ sibi, vel in mamillis inflammationem ob neglectam lactatione accersunt: tamen quia infanti hoc vtile, quem mater vel nutrix lacte alere debet, si tunc fieri nequeat, quia incommodat, defectus quoq; huius functionis appellatur. Hicq; variat, quòd aliquando non succedit, quia vel succio fieri nequit in Suctione impedita: vel quia Lac deest, vel omnino, vel ex parte, Lactisq; defectus tunc dicitur.

*Causæ.*

**D**efectus autem lactationis ob sanguinis penuriam in venis mamillarum accidit: cum enim is lacti materiam præbeat, eo deficiente, lac quoque deficit, lactatioq; procedere nequit. Sicuti hoc varijs de causis, vt in mensium defectu ab hac quoque causa oriente, dictû fuit, potest accidere. Imprimis verò in puerperis, si ob fastidium cibi dum grauidæ erant, parcè vixerint, vel cibo non benè nutriente, ob picam dictam, dum vterum gerebant, passæ fuerint. Vel si post partû immoderatiùs purgatæ sint, aut illis menses, qui quamdiu lactant, non redire debent, eo tempore fluant, & præsertim immoderatiùs, quam ipsorum natura ferre possit. Aut alioquin magnas hæmorrhagias passæ sint. Aut dum lactant, morbo diuturno acutòve extenuentur. Impuritas quoque sanguinis si tanta sit, vt ad mamillas feratur, cum non nisi ex puro sanguine, qui foetus in utero existentis est pabulum, etiam lac vtile generetur, lac ex eo concoqui non potest, vt deficiat, in causa est. Sed & crassities sanguinis, sicuti mensium suppressorû causa est, ita &, si eo nomine mamillarû venas peruadere nequeat, lactationem tollit vel imminuit.

**Mamillarum causâ,** si venæ in ipsis ob tumorem durum, aut alio modo obturatæ sint, lactatio deficit. Vel si papillæ non perforatæ existant, quia tunc egredi lac non potest. Aut si desint papillæ, cum tunc apprehendi, quod ad suctionem requiritur, minimè possint, lactatio nulla quoque fieri potest, sicuti frequenter evenit ex fricatione, ob pruri-

tum, quem puellæ in papillis sentiunt, præsertim cum nobiles fieri incipiunt, papillas ita lædi, vt vlceribus illic natis absumantur, vel relicto callo, obturentur. Sed & ob papillarum fissuras & dolores, quando matres, laborum infantis firmam cōstrictionem dum fugere volunt, in illis ferre nequeunt, lactatio, donec hæ cessent, omittitur.

*Curatio.*

**S**i ob sanguinis defectum lactatio impedita sit, optimè nutrienda est mulier. Si ob illius cacochymiam, purganda decenter. Si ob sanguinis crassitiem, attenuandus. Si mamillarum aut papillarum vitio, hæc priùs emendanda: sicuti alijs in locis hæc explicantur.

Hic autem ea quæ proprietate quadâ lac gignere, atque sanguinem calore suo attenuando fluidumq; reddendo, & ad mamillas deriuando, lactiq; sic materiam subministrando, lac augere dicuntur, describenda.

Exhibentur autem commodè eo nomine inter alimenta, Lac, Oua, Vbera animalium lactantium, Cerebra: non tantum quia bene nutriunt, sed quòd & proprietate quadam lactis prouentum faciunt.

Fructus item lacteum succum reddentes, Amygdalæ, Pinæ, similesque comestæ: aut emulsiõ eorum propinata.

Puls ex Ovis, Vino, Butyro & Saccharo, Germanis vsitata, valde conuenit.

Oryza item cum Lacte cocta.

In iusculis coquantur herbæ recentes, Caulium, Maluarum, (Lactucam lac augere etsi scribant, cum tamen genituram extinguat; credere minimè possumus.) Erucæ, Anethi, Fœniculi, Petroselinii, & Anisi, herbæ pauciores, vel omnes, iusculumque bibant, herbasque comedant.

Cæpe quoque in brodio cocta, aliòve modo tosta, & comestæ, profunt.

Radix Tragopogi flore purpureo, decocta in iusculo & comesta cum Zingibere.

Cicerum & Hordei decocta itide profunt.

Vinum optimum cum nutriat & calefaciat, nutricibus magnum in lactatione adfert adiumentum.

Decocta medicata hæc sunt: R. Hordei p. j. herbæ.

*Suctio impedita. Lactis defectus.*

*Sanguinis penuria, impuritas, crassities, causa Lactationis deficit.*

*Lactatio impedita. Suctio deficit. Curatio.*

*Lac gignens vel augens.*



herb. Fœniculi, Petroselin. ana M. j. coquantur, dulcorentur Saccharo: & bibat.

Vel sic: R. rad. Echij ʒ. β. herb. rec. Maluæ, Brassicæ, Polygalæ, Fœniculi, Petroselin. Anethi, Erucæ, Ocimi, Menthæ, ana M. j. Hordei, Cicerum, añ. P. j. sem. Lini ʒ. ij. sem. Anisi ʒ. iij. sem. Nigellæ ʒ. j. fiat decoctio addendo Sacchari q. s. Bibat singulis maturinis.

Ex succis sic: R. succorum Sonchi, & Tragopogi añ. ʒ. β. Detur cum Vino albo, vel addito Saccharo exhibeatur.

Lumbricorum decoctū, valde laudatur in brodio factum carniū simplici, vel in quo Fœniculum, Hordeum, aliaq; incocta sint, & nesciat nutrix, quid sit illi exhibitum.

Quæ sicciora sunt, minùs lac generare possunt, tamen probantur multa semina, quorum herbæ vtiliores sunt, aliaque.

Vt: R. semin. Anisi ʒ. iij. semin. Fœnic. ʒ. j. sem. Erucæ, Nigellæ ana ʒ. β. fiat pulvis: Detur ʒ. ij. cum decocto aliquo simplici vel composito supradicto.

Vel: R. Lumbricorum exiccat. puluerifactorum ʒ. iij. Sacchari ʒ. β. semin. Anisi ʒ. j. Zingiberis, Cinamom. ana ʒ. β. fiat pulvis: Detur cochlear cum decoctis.

Vel: R. CrySTALLI subtilissimè triti ʒ. j. detur vt suprà, Corallum eodem modo exhibitum laudant.

Lac Lunæ appellatū, ex alpiū cauernis abrafum, ad lactis generationem, si ʒ. j. pondere sæpè exhibeatur, vtilissimum censent

Mammis ad sanguinis attractionem varia adhibentur.

Forus calidi, venas dilatantes id faciunt.

Mentha contusa mamillis imposita, lac allicit.

Vel fiat hoc emplastrum: R. fol. Petroselin. Fœniculi, Menthæ, recentium ana M. j. coquantur & contendantur, adde farinæ Hordei P. j. Storacis cal. ʒ. ij. semin. Nigellæ ʒ. j. ol. Liliorum ʒ. ij. fiat cataplasma.

Sinapismis & Dropacibus mammis appositis, aliqui sanguinem, si omnino eò ferri nolit, attrahunt: sed leuioribus vtendum, cum faciliè inflammentur.

Frictio mamillarum tutius illud facit.

Et si cucurbitulæ iuxta axillas, illic vbi maiores venæ, quæ lactis materiam ferre so-

lent, & liuidæ apparere, ad mamillas descendunt, apponantur.

Sugere sæpè mamillas, vel ex illis lac mulgere, vt libentiùs lactatio procedat, efficit.

Si quoq; ob absentiam papillarum succhio fieri nequeat, certo instrumeto cauo vitreo, papillarum regioni adhibito, si canalem inde prominentem fugat infans, lac eliciet.

DE VENEREI ACTVS

## DEFECTV.

### CAPVT XVII.

#### Genera.



VANDO commixtio, seu coitio aut congressus maris & fœminæ, qui membris ad id destinatis mutuo iunctis, feminumque inuicem permixtione, ad generationem potissimum vel mutuū amorem, suo tempore perfici debet, vel nullo modo, aut non absolute fieri potest, Actus Veneri defectus, esse dicitur.

In masculis hi frequentius, quàm in fœminis, cum in hoc actu peragendo plus vir quàm mulier præstet, obseruantur. Præcipue in eo, quod membrum virile, quod non semper tensum, sed ne impedimentum adferret, pendulum & molle esse debuit, tunc cum commixtio hæc fit, vt dirigi possit, non attolatur indureturque, quod voluntate nostrâ minimè perfici potest. Hincq; fit, vt qui hac impotentia laborant, venerè exercere omnino nequeant, ob eamq; causam Impotentes esse dicantur. Sed & huc referuntur illi, quibus licet membrum aliquatenus vt eo non nihil ad venerè vti possint, intumescat, quia tamen languidius, quàm oportebat, existit, segniter & imperfectè suū opus peragit: quos Languidos vocare possumus. Si quoque in ipso actu, siue eum strenuè aut lentè obeant, semen non profundant, cum illud quoque ad absolutum hunc actum perficiendum, requiratur, impedimentumque quod & vir & mulier sentit, adferat, Imperfecta Venus dici potest. Neque autem si rariùs, rectè tamen hoc munus obeant, defectus dici

Impotē-  
tia in  
masculis.

Langui-  
ditas in  
masculis.

Veneris im-  
perfecta  
in masculis.

debet, cum hæc functio generationis causâ instituta, finem citius assequatur, si rarius fiat. Et cum vterius adhuc ad pruritum compescendum, & debitum vxori persoluum, Venus concessa sit, in hoc quod maior moderatio adhibetur, eod rectius hæc actio & secundum naturæ ductum, peragitur.

In foeminis, etsi rarius hunc defectum, membri ipsarum causâ, accidere obseruetur, quod in illis semper ad suscipiendum, dum sanę sunt, aptum est, nec vt in viris subinde no- uo robore instrui, aut, vt in canibus, cum certo duntaxat tempore caleant, mulier verò nullum definitum tempus habeat, dilatari debuerit: sit tamen ob illius sinus vteri vitium aliquod: Apparens vel Abditum nonnunquam, vt maritum non admittere vel ægrè, aut etiam admissum diutius ferre minime possint: Venusq; sic impedita sit aut molesta. Sicuti & Imperfecta est, quando in congressu aliquæ nullam aut exiguam voluptatem sentiunt: præsertim si hoc non illis, quæ nimio illius vfu fatiata eam aliquandiu amplius nō curant, sed his quæ temperatè eā alioquin vtuntur, accidat: aut etiā perpetuum quibusdam sit; sicuti multis annis durante matrimonio, tres non plus delectationis aut sensus in coitu, quàm ex contactu externo alioquin fieri solet, percepisse ex maritis ipsarum, consilium à me petentibus, cognoui: in quibus Venus extincta esse dicitur.

### Causæ.

**I**N vtroque & mare & foeminâ horum defectuum, quod membris idoneis ad Venerem exercendâ destituantur; vel quod semen non eiaculari possint; in membris genitalibus, per quos actus exercetur, quæ sunt in viro, virga; in muliere, sinus vteri: Vel vasis seminalibus, quæ materiam feminis & semen continent, aut deferunt, causa perquirenda.

Memברי virilis causâ actus hic deficit, si eo vir destituatur. Quemadmodum aliquos eunuchos in lucem prodixisse, scribunt. Quod & si casu membrum amputetur, aut aliis eunuchizetur, accidit: vel si ita mutiletur, vt glande abscissâ, reliqua pars illius ad congressum inutilis: Vel si ab ortu adeo sit exile, quale

in Hermaphroditis, mulierem potius referentibus, leuiter tantum prominere interdum videmus, vt nullius ad hanc rem sit vsus: aut si ad eam crassitiem excreuerit, aut alijs de causis adeo intumuerit, vt sinus vteri id aut planè non excipere, aut non nisi magnam cruciatu intromittere possit: aut alias incurvum naturâ vel inflatione, & vt in hydropicis conuolutum inflati farciminis instar, dirigi nequeat: aut tumor aliquis adnatus, obstaculum illi adferat: Vel aliter læsum, viceratum, in glande præsertim & præputio, impetum hunc ferre nequeat; sicuti in congressu violento interdum, vel ex impuro concubitu, illi nonnunquam contingit: quod & refertur, si præputio angusto adhuc glans obiecta, denudari nequeat: quibus de causis, Venus vel non perfici, vel ægrè, vel non perfecte potest. Et si ab intemperie frigida adeo sit refrigeratum vt sanguinis influxus, qui ad illius distentionem, vti mox dicitur, requiritur, præpeditus sit, idem euenit: aut si alioquin ita stupeat & insensile sit, quod neruorum vitio ab iisdem causis, vt in stupore dictum & paralyti, accidere potest; vel incantamētis effici, vt exquisitum illum sensum amittēs, nec titillatione aut stimulo, quæ à semine prodire mox dicemus, incitatum, assurgat. Unde quoq; sepè Venus nulla vel languida obitur.

Vteri sinus seu ceruicis vitio, Venus deficit; si via seu introitus ad ipsum per cutem non satis apertus sit; nam si rimâ nullâ apparente infantes nascantur, sicuti interdum accidit, diutius, cum vrinâ reddere nequeant, nisi patefiat, viuere nequeunt. Quod ab ortu, vel post exulcerationes, coalescente ex parte hac sede, fieri potest, sed rarus est. Vti & illud; vt orificium sinus vteri penitus coalescat: quod tamen mulieri cuidam ex partus difficultate, hac parte læsâ, accidisse vidimus, vt cum curam illius, pudore impedita, naturæ committeret, luxuriante carne, os illud ceruicis vteri adeo occaluisse, vt nemēstruis quidem pateret effluxus, & cicatrice spissâ, sicuti postea sectione post mortem illius, quâ viuā ferre nolebat, deprehendi, profundè admodum & penitus oblitteratum fuisse. Frequentius autē orificium hoc, hymene in virginibus occlusum, primam coitionem

Venus impedita in mulieribus.

Venus imperfecta in mulieribus.

Venus extincta in mulieribus.

Memברי virilis Defectus, Causa formatio mala, Defectus, Stupor, causa impotentia

In Vteri sinus rimâ vel orificio Causa Angustia, Læsis, Causa Veneris impedita.

coitionem acerbam facit, & si spissum sit, tādū donec liberetur, impedit. Dein & angustius ab ortu, vel adnata carne, aut tumore, aut callo factum; Vel alia huius oris vel sinus ipsius læsio dolorem adferens, vt virum excipere vel pati nequeat, facit.

*In vasis seminalium, quia semen nullum, vel non decens generatur, causa Veneris improprie, vel imperfecte in vitro, quæ seculum: vel etiam ex tincta, in seminali.*

Vasorum seminalium, quæ seminis materiam, sanguinem scilicet adferunt, vel semen generant, continent & effundunt, affectuum causâ, in vtroque sexu, venus aut impedita aut languida est, si tales sint, vt eorum causâ nullum semen, vel non tale, quale ad stimulum venereum excitandum requiritur, generetur. Cum enim hunc pruritum seu stimulum, quo natura excitata, in maturis, sanguine arteriarum spirituoso, corpora penis fungosa & glandem perfundens & replens, (quod hactenus à flatibus fieri malè creditum est) vt ille inde dilatatus, tumens, rigidus, rubens & calidus, qualis ad actum hunc exercendum requirebatur fiat, seminis causet acrimonia; tunc præsertim, cum illud in proprijs vasculis redundans, seu vt vocant turgens, aut calidius, aut aliàs commotum, exitum querens naturam sollicitat, eoq; modo quo dictum membrum intendit: fit sanè, vt si inualidum, aqueum, crudum; vel quantitate minimè decenti, aut omnino non generetur, cum nec stimulus tunc adfit, sine quo membrum rectè minimè potest erigi, sicuti in Eunuchis videmus, vt autem venereum mares vel nullo modo, vel languidè obeant. Et si hoc in muliere contingat, stimulusque ille desit, cum non incallescant, vt venerem non expetant, aut sine voluptate eam peragant, euenit. Sed & illi affectus vasorum seminalium, qui seminis, etsi non deficiat, excretionem impediunt (cum & nisi hoc fiat in vtroq; sexu satietas in actu perficiendo hoc, non sit) vt Imperfectus sit, efficiunt.

*Imbecillitas, Refrigeratio, Conformatio mala vasorum seminalium, causa Veneris defectiva in*

Eiusmodi autem affectus, per quos semen deficit, aut languidius nascitur, vel excerni minimè potest, sunt, vel imbecillitas vasorum seminalium, ratione senij vel morbi aliquis, præsertim circa has partes; aut ob nimis frequentem, ab immoderato veneris usu seminis profusionem, laxatis admodum & debilitatis hisce vasis contracta. Vel re-

*utroque sexu, & in viris, speciatim illius vnde Frigidit dicitur.*

frigeratio nimia harum partium, præsertim si in viro, illius membrum similem contrahat, vt dictum, intemperiem, cum & tunc sanguine minus impleri distendique possit: qui & soli inter impotentes rectius Frigidi vel Refrigerati dicuntur, licet in genere sic eos appellare soleant. Quorum omnium dictorum morborum causâ, semine vel nullo, vel paucio, vel inertigenito, non stimulantur, & ad venerem minimè excitantur, nec etiam si desit, ejicitur; vel spontè & sine sensu effluit. Quod & à mala conformatione vasorum horum, ab ortu quibusdam innatum est: quæ qualis sit, difficile est in viuis discernere, nisi ex eo, quod perfectis aliquin membris genitalibus & nulla prægressâ causâ, ad venerem tamen apti minimè sunt; & in mortuis sectio quandoq; vasorum semen deferentium aut generantium, absentiam, aut ductum peruersum, si in vtroque præsertim hoc latere inueniatur, sicuti ipse deprehendi, vel aliud quid eiusmodi in causa fuisse, patefacit.

*Tucantatio, Impotentia illius in viris, unde Ligati appellantur.*

Ab incantatione magicis artibus hac imbecillitate, in vasis genitalibus genitâ, vel pene, vt supra dictum, vel vtriusque; vt coire nequeat vir, frequenter procedit: quos Ligatos & Maleficiatos appellare solent. Quod quâ ratione fiat, cum præternaturale sit, non est nostrum indagare.

*Castratio, Impotentia in Eunuchis.*

Dissectis vasis adferentibus seminis materiam, execto in castratione, non vno (non enim hoc impedit) sed vtroque teste, in masculis, cum semine amplius generari nequeat, illud profundere minimè quoque possunt, & cum stimulum amittant, neq; hunc amplius exercere. Nisi fortè membro, alijs de causis affluente sanguine inflato, vt se mulieribus miscere queant, aliquantum irritentur, vnde tamen nullus sequitur effectus. Quo nomine cum Eunuchos perfectos reddere volunt, quibus mulierum curam committant, membrum radicitus, vt dictum, amputant: licet & enarrata castratio illos impotentes & effœminatos reddat. Quæ, vt viris eo nomine, tum ad hernias sanandas, sæpè fit; sic in fœminis vel morbi alicuius causâ, vel ad lasciuia illis demendam, tentatam fuisse (quæ tamen in scrophis fre-

quentissima est) nec audiuisse, nec legisse me memini.

*Obstructio vasorum seminalium causa venereæ defectus. Obstructio vel angustia, aut perforatio canalium in penes, causa venereæ impeditæ, vel imperfectæ, in viris.*

Obstructio quoque horum vasorum ab humore crasso, tumoreve, defectum aliquem causare potest. Et præcipuè in viris, si ductus ille seu canalis sub penis corporibus, feminis & urinæ excretionibus communis, à caruncula, callo, calculo & similibus obturatus sit, vt nec vrina, nec semen excerni possint, impedit. Aut si aliàs ob languorem membri dum venus exercetur, hic canalis non directus, nec sufficienter dilatatus sit, vt in congressu semen, præsertim si paucum sit, non rectè ejiciatur, sed impingens subsistat, donec postea sponte effluat, sæpè occasionem præbet. Vel si alicubi perforatus, sub penis ductu, per fistulam illic genitam, vti vidi aliquoties, semen non per præputij foramen, sed per alterum effundant; quòd impedimentum tamen non veneris actum, sed conceptionem, vt illic dicitur, potius impedit.

A sanguinis pènurìa, quæ semini gignendo non sufficiat, actus venereus vix penitus sistitur, cum illius non tanta requiratur copia: ob quam causam, & qui in edias patiuntur, parè tenuiterque viuunt, à morbo conualescunt, & phitici ipsi adhuc, ad hunc actum peragendum habiles sunt. Magis tamen hi, quibus sanguinis suppetit copia. Quod autem in morbis quibusdam, vel animi affectibus doloribusq; hæc penitus cesset actio, non mirum, cum voluptas quæ hunc actum primùm excitat, sublata sit.

A sanguinis crassitie vix quoque, quò minus, cum mouetur ad virgæ extensionem, in eam dispergatur, accidere potest: cum sanguis spirituosus ex arteriis potius eò, quàm crassus feratur. Salaciores tamen eos, quibus sanguis calidior tenuiorq; existit, esse existimamus.

#### Curatio.

**C**onsiderandum prius, an apparens vel occultum sit vitium: sicq; prædicendum & agendum.

*Impotentia, Lægudicatio, Penes.*

Si in viris membrum ab ortu desit, vel alioquin ita sit formatum, vt ad vsum accommodari nequeat: Aut si amputatum sit peni-

tus, vel saltem glans præcisa: aut si testes vtrinque castrati sint, cura impossibilis. Vti & in mulieribus, si ab origine sinus vteri ita occlusus angustatusq; sit, vt nullà arte & citra discrimen vitæ, aperiri queat. Reliqui defectus, tam in membro virili, quàm mulieris apparentes; tumores præter naturam, vlcera, læsiones, obstructio penis ductus, semen deferentis, cum cæteris quoque locis communes sint affectus, alibi explicantur. Quomodo verò proprii hisce locis, vt præputij & ductus seminis angustia, & hymenis amplitudo, affectus curari debeant, hic explicabitur. Si verò nullo horum apparente, virga erigi nequeat, nec semen profundum; vel mulier sine omni delectationis sensu, aut cum exiguo, hunc actum peragat: tunc si hi defectus in sanis alioquin perseuerent; vel erit originale aliquod vitium internum; quod ex eo, quòd à teneris tales fuerint, cognoscimus, atque idcirco incurabile: Vel ab incantatione procedit, quam soluere non nostrum est: Vel alioquin ab imbecillitate, refrigeratione, aut morbo aliquo alio descendit, vnde seminis prouentus impeditur, vel semen inutile gignitur. Quæ si diu perseuerauerint, etsi difficulter emendantur, tamen in hisce causis potissimùm cura adhibebitur.

Exhibentur autem eo nomine ea, quæ semen generant, quod genitum suà copià & acrimonià stimulum venereum excitare, & ad hunc actum membra rectè disponere, diximus. Sunt autem hæc, quæ dum sanguinem copiosum procreant, semini gignendo materiam vberiore subministrant. Quibus calefacientia permiscemus, vt sanguis calidior inde redditus, semen feruentius, quod ad venerem eò magis incitet, generet: quod &, vt sanguis sic calefactus & attenuatus, citius & copiosius ad virgæ dilatationem influat, iuuat. Et cum serum hac quoque ratione accendatur, fit, vt cum illud ad vesicam deferretur, non solum illam, sed & propter vicinam, partes genitales calefaciens, actionem hanc quoque illarum promoueat. Sicuti vsu cantharidum vesicam vehementer accendi, & ad exulcerationem sæpè vsque irritari, vt mistio inde frequens & cruenta se-



ta sequatur, & per consequens, calore in viciniam vsque deriuato, venerem simul iisdem excitari, videmus. Quam seminis acrimoniam, falsa hisce permixta, sicuti dicitur, adiuuare quoque possunt. Quæ remedia nos, quatenus manifestâ qualitate operantur, eo modo potius, quàm flatus gignendo, quibus penis corpora minimè distendi, ostendimus, venereum actum iuuare credimus: accedente præsertim proprietate quadam nobis incognitâ, quam ex albedine carniū, fructuum, radicū, &c. tanquam femini similia, fortè primū, qui hæc docuerunt, obseruauerunt: Vel ex eo, quòd à salacibus animalibus desumpta sint; Vel quòd formâ testes referant, vti orchides, & satyria: vel scrotum rugosum, vt tubera terræ.

Exhibentur eo nomine varia remedia, præsertim in cœna, vel post eam cubitum ituris, si statim effectum eâ nocte quærimus; aut si successiue operari debent, etiam manè.

Ex alimentosis quæ benè nutriunt, multumque sanguinem generant, conueniunt, eligunturque præsertim, quæ alba & medullosa sunt. Qualia sunt Cerebra, Testes, salaciorum præsertim animalium, vt gallorum, coturnicum, passerum, vulpis. Caro quoq; castoris, fortè quòd testibus præualere, cum tamen vesicæ sunt, non testes, credant, & cum eas ob fœtorem non possint comedere, carnem illius substituerunt. Et quia lutra, castoris naturæ non adèd absimilis, illius quoque carnem, in hac re vtilem, probauerunt. Caro cancrorum, ostreorum, testudinum nemoralium; aliorumq; piscium cartilaginorum, vt Sepiarum, Polyporum. Ex humoribus animalium, Lac & Oua. Ex fructibus amygdalæ, auellanæ, pineæ, pistacia, castanæ, phasæoli, fabæ, cicer album, oryza, hordeum, cinaræ item echinus. Ex radicibus, pastinaca, rapum, napus, sifer, fortè & tragopogi radix, cum quæ lac gignant, semen quoque procreent. Item cæpa, porrum, tubera terræ. Inter herbas, eruca, caules, asparagorum teneritates. Quæ omnia sola, inuicemve permixta, variis modis præparata, assumpta in cibis id præstabunt, si modo, vt in pterisq; in illis quia insipida

sunt, fieri solet, aromatibus, inter quæ piper cæteris præualeat, optimè condiantur & saliantur. Cuius condituræ causâ, magis ferè venerem stimulare, quàm proprietate suspiciamur; hincque factum, vt cum ab hisce piperatis sumptis, veneris stimulum sentirent, non ratione condituræ, sed ipsius quod conditum erat causâ, hoc profectum fuisse crederent. Proin & nos, sic potius illis inter cibaria vtimur, quàm quodea præsertim, quæ carnea sunt, medicamentis, vti aliàs facere solent, & vt citius sic corrumpantur efficiunt, permisceamus.

Vsitata Venerem iuuantia edulia sunt; Puls alba. Weinwarm dicta, ex Vino, Ovis, Saccharo & Butyro parata, quâ nouiter nuptos manè recreant. Vel crocea Lebersult appellata, ex hepate porcellorum, quod conceptum, proprietate iuuare assumptum, scribunt: addito Vino dulci, multisq; aromatibus & Croco, quòd quoque Venerem acue-re docet Dioscor. præparata: quam ipsa nuptiarum die, Germani solent apponere. Quòd & puls atra, Pfeffer nominata tantopere Piperata: & congelatum illud croceum Galley / ex succo carniū vel piscibus factum, egregiè quoque aromatizatum & Croci tinctum, referri possunt.

Inter bellaria reliqua saccharata, mellita, aromatizata, varia parantur, quæ hic competunt, atque eo nomine vel in fine cœnæ, vel ante somnum in postcœnio Epidorpsimo Græcorum, quem Schlaßtrund vocant, fortè ad hunc vsum primum instituto dantur.

Vt sunt confectiones siccæ ex fructibus nucleatis, & seminibus Saccharo obductis, paratæ. Inter quas Pineæ, Fistici, semen Erucae, sic condita, præferuntur.

Vel Martius panis datur, imprimisq; hic erit utilis: R. Amygdalarum, Auellan. ex cort. ana 4. j. Pinearum. Pistacior. ex cort. ana 3. j. contundantur diligenter, adde Cinamom. 3. β. Piperis 3. j. Zingib. Gariophyl. Nucis mosch. Cardamom. mai. ana 3. β. semin. Erucae 3. ij. & si luteum habere vis, Croci, vel si rubrum, Santali q. f. & Sacchari q. f. misceantur, coquantur in clibano forma placentæ vel panis; Vratur.

Panis vitæ quem *Ebbuthen* vocant admodum aromatizatus & mellitus, valde conuenit: Quæ omnia veneris promouendæ causâ, primum excogitata fuisse credimus.

Eruca, Nasturtium hortense & aquaticum, aliæq; acres herbæ, crudæ, cum garo piscium aut melle, vt Hispani solent, comestâ in cœna, stimulum addunt.

Vinum generosum dulce, & imprimis aromatizatum Cinam. & Pipere, moderate sumptum, cum vniuersum corpus calefaciat, illudq; vegetum reddat, hanc quoque actionem intendit. Immoderate verò sumptum, narcoticâ vi, ad eam ineptos potius reddit.

Ex medicamentosis Pulueres varij fiunt, qui cum Vino, Lactē, alijsve exhibentur: aut per se saccharo addito puluerisata vel tabulata dantur: hac ratione parati.

Primus puluis: R. Piperis gr. x. confracta saltem, ne fauces vrât; Bibat in Vino generoso cubitum iturus: vel Lactē tepido.

Secundus: R. Piperis 3. β. Croci 3. β. fiat puluis, imponat Hordeato: & comedat.

Tertius: R. Piperis 3. j. Nucis mosch. 3. β. Salis 3. j. (si fumatur, quo stinci saliti fuerint, erit vtilius) Vtatur cum Ouo forbili.

Quartus: R. Piperis 3. j. Zingib. femin. Erucae, Porri ana 3. β. Sacchari 3. ij. Capiat 3. j.

Quintus: R. seminum Erucae 3. ij. sem. Fraxini, Bulbi, Lini, Anisi ana 3. j. feminis Pastinacæ, Napi, Raphani, Cæparum, Porri, Sinapis, Vrticæ, Nasturtij, Asparagi ana 3. β. Piperis 3. j. β. Zingib. Galangæ, Gariophyl. Maceris ana 3. β. Croci 3. j. ras. Eboris 3. j. Priapi cerui vel tauri, vel ericij, carnis Stincorum ana 3. β. Sacchari ad pondus omniū. Cinamom. 3. ij. fiat puluis subtilissimus: Exhibeatur ad 3. ij.

Sextus efficax admodum: R. seminum Erucae 3. β. feminis Pastinacæ, Rapæ, Porri ana 3. j. feminis Nasturtij, rad. Pyrethri ana 3. β. Piperis 3. j. Zingib. Cinamom. ana 3. β. Croci 3. j. Cantharidum ablatis alis num. 9. Boracis 3. j. Moschi gr. aliquot, Sacchari 3. j. fiat puluis subtilissimus: capiat coch. j. ab initio: augendo dosim si non succedat; Bibat cum Lactē tepido,

Septimus omnium validissimus: R. Cantharidum abruptis alis num. ij. Cinamom. 3. j. Sacchari candi 3. j. Bibat in Lactē: si non iuuerit, capiat secundâ vice Cantharides tres.

Inter electuaria; Diasatyrium Nicolai 3. j. quantitate exhibitum, huius rei gratiâ, excogitata est compositio. Anacardina quoque compositio, quia vehementer accendit, iuuat.

Aliud sic fieri potest: R. rad. Satyrionis & Eryngij cond. ana 3. j. Zingib. cond. conf. Acori veri ana 3. β. Pinearum, Fisticorum mundat. ana 3. ij. medullæ nucis Indicæ 3. j. feminum Lini, Fraxini ana 3. ij. semin. Erucae 3. j. β. sp. Diatrionpip. 3. j. spec. Diambrae, Diamoschi ana 3. β. Cinamom. 3. j. Priapi cerui vel tauri, vel ericij, Stincorum carnis sicci ana 3. β. in mulieribus, matrix Leporis sicca quoq; additur, Sacchari 3. j. adde Mellis q. s. fiat electuarium: capiat 3. ij. vel plus.

Pilulæ ex ingratis sic fiunt: R. stercoris Muris 3. β. sem. Erucae 3. j. Piperis 3. β. Cantharidum abruptis alis numero v. excipiantur Terebinthinâ: capiat 3. j.

Syrupus ad vsum asseruandus hoc pacto fieri posset: R. radicum recent. Satyrionis, Eryngij, Pastinacæ, ana 3. ij. radic. Bulbi, Porri, Cæparum ana 3. j. radic. Pyrethri, Dracunculi ana 3. β. herb. rec. Erucae M. ij. Nasturtij, Erisymiani ana M. j. feminum Erucae 3. β. semin. Lini, Fraxini, Asparagi ana 3. ij. sem. Anisi (cum & lac gignere credatur) 3. β. Datylorum num. v. fiat decoctio in Vino albo, & in colatura adde Sacchari quant. sem. aromat. Piperis 3. j. Cinamom. 3. ij. coquatur ad consistentiam. Capiat 3. j. per se, vel cum Vino dulci.

Cathartica exhibita, si calidis & aromaticis correctâ, vti parantur, & leuiora sint, quàm vt alium vehementer moueant: vel si mouent, quoq; venerem vehementer stimulare, obseruauimus: ita vt illis antequam purgare incipiant, virga admodum erigatur: sicuti mihi aliquando falsi sunt, in pharmaco errorem commissum fuisse, existimantes.

Odores suaues, non tam recreando, quàm vi calefaciendi & penetrandi, ad venerem aptiores

priores reddunt: & ex ijs vehementes præcipue, vt Ambraë, Moschi, Ciuetæ.

Admouentur extrinsecus illinitiones, in masculis potius; quibus penis non solum prominens pars, sed & ea quæ subtus in perinæi regione latet, inungitur; vt eo calefacto, sanguis ad illius erectionem, libentius adfluat. Et vt ad seminis quoque generationem, sanguis in vasa seminaria feratur, testes, lumborum & pubis regionem, & plantas interdum pedum inungimus. Ex calidis attrahentibus proinde hæc parantur.

Ex vſitatis oleis: R. oleorum de Piperibus, de Euphorbio, de Castorio ana æq. partes. Inungat.

Vel sic: R. succorum Erucae, Nasturtij, Aquæ vitæ ana ʒ. j. rad. Pyrethri ʒ. ij. semin. Sinapi ʒ. j. Euphorbij ʒ. ʒ. ol. Lini ʒ. j. ʒ. coquantur, colentur: Vtatur eo oleo.

Aliter: R. ol. nucis Mosc. per expref. ʒ. ij. ol. Spicæ gr. vj. ol. Garyophyl. ʒ. ʒ. misce pro inunctione.

Sine oleis sic paratur: R. Fellis apri vel verris ʒ. j. Ciuetæ ʒ. ʒ. Mellis parum, inungat penis & perinæi regionem: si addas Cantharides tres vel quat. erit efficacissimum.

Oleum formicarum, ex decoctis formicis alas habentibus, in oleo, paratum, efficacissimum est.

Pinguedo item ericij.

Vnguentum conueniens: R. rad. Pyrethri, Piperis, Zingib. sem. Sinapi ana ʒ. j. Euphorbij ʒ. ʒ. Castorij ʒ. j. Formicarum sicc. ʒ. ʒ. puluerifentur, adde ol. Laurini q. ſad. excipiendum, addendo parum ol. Spicæ, & Cera: fiat vnguentum.

Pollex pedis dextri, si oleo in quo Cantharides dissolutæ sint, vngatur, admodum Venerem incitare scribunt: quod ob eximiam cantharidum vim, quæ extrinsecus applicatas cruentam mictionem promouisse, alibi ostendimus, experientiâ hac persuasi, fieri posse non negamus.

In muliere, hæc illinitiones in lumborum & pubis regione factæ, illam quoque stupidam & inertem, excitare possunt. Priuatim verò in illis, vt maiorem voluptatem in congressu sentiant, iuuabit, si ante congressum vir glandem Ziuetæ inungat, vel Felle gal-

linæ, aut Lucij piscis: quod illi loco pessarij est.

Thermarum calidarum vsus, calorem fouendo & reuocando in Refrigeratis dictis & imbecillioribus, veluti postremum adhibetur remedium.

Quod & balnea & infusions, foras, pedum lotiones, ex calidis actu potentiaque, possunt efficere. Qualia ex decocto rad. Ireos, herb. Nepetæ, Calamenthæ, Vrticæ, Maioranæ, Erucae, Erysimi, flor. Lauandulæ, Chamomillæ, similiumque, parari possunt.

Pellibus quoque diligenter munire has partes, vt calor conseruetur: & pedes à frigore præcauere, cum frigus valde noceat, calor iuuat, admodum proderit.

Manualis operatio impotentiam nonnunquam tollit. In viro, si præputium ita angustatum, vt glans deteginequeat, artibus varijs dilatemus, & si aliter fieri nequeat, sectione diuidamus. In muliere, si sinus vteri foramen, hymene obductum, aut aliàs angustius, vel etiam omnino callo occlusum, sectione, quod nummo acuto aliqui facere docent, aperiamus vel dilatemus. Quod ego cauterio meo sine dolore, in illâ fœminâ, cuius casum exposui, sectionem quam conaturus eram renuente, iam aliquousque via factâ, nisi mors superuenisset, tandè p̄fecissem.

Quæ & incarnatos & ligatos, vt vocant, soluendos, aliæ operationes pertinent; Vt excutere puluinaria: Vt per annulum sponsalem mingant, iubere: Vel per axim aratri, & similia multa, non nostri est instituti, aut etiam officij, explicare.

Sicuti nec amuleta, quibus si ab hac causa procedat, magnam efficaciam tribuunt. Cineres tamen stellionis nigri, in petiâ ligatos, & manu sinistrâ gestatos, membrum virile erigere, etiam in alijs causis docent: si verò in dextrâ teneatur, impedire.

Imaginatio & apprehensio prægressæ voluptatis, venerem potenter excitat: quæ recordatione & intuitu, vel auditu eorum, quæ hæc in memoriam nobis reuocant, perficitur: longèque magis contactu.

Animi affectus suaues, vt gaudium, aptiores ad hunc actum, sicuti contrarij mororem & dolorem adferentes, ineptiores reddunt.

Quam lætitiā sensuum recreatio, per vi-  
sum, auditum, imprimis musices, aliosque  
sensus facta, adfert.

DE SALACITATE.

C A P. XVIII.

*Genera.*

Pruritus  
venae.



**M**MODERATAM ad venerē pro-  
pensionem, Salacitatis nomine  
comprehendimus : quæ variat  
primum eo, quod est vel conti-  
nuus, vel frequenter incitans pruritus, &  
vehemens admodum veneris desiderium,  
quod quando expleri nequeat, admodum  
inquietos reddit, & nisi sibi temperare que-  
ant, vt turpia facinora committant, adigit.  
Masculis & foeminis nonnunquam contin-  
gens; diuersimodè tamen in eo, quòd ma-  
res citius incalescant, foeminæ difficilius fa-  
tiantur.

Mayor Ye  
NCHEN.

Altera species longè grauior & præternaturalis magis est, infatiabilis Venerus furor, cum, etsi eam exerceant, ab eâ minimè leuantur, sed potius ampliùs accenduntur, vel non nisi diutius durante sæpeque repetitâ venere satiantur.

Fœminis autem, hæc Veneris nimia potentia citius contingere potest, quàm viris: sicuti verò impotentiam ad Venerem, frequentius viris quàm fœminis accidere diximus. Veluti impuris & contagiosis mulieribus; vel ex morbo alio aliquo quibusdam accidit, & Priapismus vteri à quibusdam ineptè vocatur. Sed alias hoc vitio laborasse, illisque innumeris congressibus multorum virorū vix satisfieri potuisse, historia reginæ Semiramidis impudicissimæ fœminæ aliarumq; exempla testantur, quod & multis, vt ad sedandam libidinem multa illicita tentent, & in turpissima vitia peccataq; ruant, occasione præbet. Atq; interdum accedente Furore, qui vterinus dicitur, bestiarum congressus (veluti illa, quæ mente capta, canes Anglicos admittere cupiebat, sicuti in mentis alienatione explicatum fuit) expetant.

Priestly

Viris rariùs hoc euenit, etfi enim aliqui  
admodum luxuriosi sint, qui Venerem vnâ

nocte sæpius exercere possint, hoc tamen non naturæ stimulo quodam quasi coacti, sed vt robustiores esse videantur, studio, irritamentis ad illud præstandum se ipsos pellientes, peragunt. Inuenti tamen etiâ sunt, hac prurigine laborantes; cui plerumq; virosa gonorrhœa, vti dicetur, coniuncta est. Hunc autem affectum, quia membrû quamdiu ille perseverat, illis extêsum & rigidum est, Priapismum, Tentiginem, & à satyris, qui lasciui erectâ virgâ pinguntur, Satyriasmum vocant. Licet & alium affectum, in quo penis continuò riget, & supra modum intumescit, sed sine desiderio coeundi priapismum, & si cum palpiratione fiat, Satyriasmum appellant: qui tamen à morbo aliquo illius loci dependentes, cum ad magnitudinem aduictam & dolores pertineant, illic potius tractabitur.

Cause.

**O**Mnis falacitatis immoderate causa; Vel à feminis copia, vel acrimonia, vel commotione, quæ stimulum venereum commouent: Vel à sanguine, cuius affluxu in viris membrum extendi in aërus Venerei defectu ostendimus, proficiscitur.

Semen si copiosum generetur, vel si ob *Seminum copia, caliditas, causa Præritum veneri.*  
plethoram: vel calorem vasorum semina-  
riorum, sanguinem continuo allicientium,  
quia tunc redundans turgensq; , vt vocant,  
ad sui expulsionem naturam sollicitat, vt ad  
Venerem sanguinei magis incitentur, facit.

Imprimis verò, si semen ultra naturalem, quam in se habet, maiorem adhuc & præter naturalem acrimoniam & caliditatem acquirat, etsi non ita redundet, magis tamen si simul exuperet, continuò ad Venerem excitulans, Libidinosos facit. Hoc autem à ciborum nimia conditura & aromatificatione, calefacientium frequenti vsu, vel à medicamentis eiusmodi proficisci posse, in remedijs impotentiae sanandæ, exposuimus.

Quod & ab humoribus calidis, acris, non  
in vtero foeminis collectis, sicuti ex pituita  
salsa & bile illic coaceruatis, accidere scri-  
bunt, sed non in vtroque sexu, femini per-  
mixtis, illudque virosum summeq; acre red-  
dentibus, fieri potest. A cuius ardore pruri-  
tus ille Veneris insatiabilis oritur, qui mu-  
lieribus

Semiviv  
copia, ca  
lidas,  
causa

*Pruritus  
venerei.*

Seminis  
acrimo-  
nia, cau-  
sa Fure-  
ris vene-  
rei, in fa-  
mine Ve-  
terani di-  
cti.



heribus impuris & vitiosum semen habentibus (quo & eos, qui cum ipsis congregiuntur, sæpe inficiunt) potius quam viris, consuetus est: cum viri, quando à perverso eiusmodi semine hunc pruritus patiuntur, gonorrhœa, virosâ ob id dictâ, infestati, illud continuò profundant, qui feminis fluxus, mulieribus non adeò faciliè ut viris, evenit. Vnde nec leprosos eo nomine salaces esse, ut aliqui causam illius hanc esse scripserunt, concedimus, cum hoc illis potius quod separati ab vxoribus, vel à matrimonio & concubitu prohibiti vivant, sicque ob abstinentiam coactam libidinosi fiant, accidat.

*Semini  
comotio,  
causa  
Pruritui  
venerei.*

Excitatum quoque in propriis vesiculis, & veluti iam loco motum, exitum querens, pruritus vehementem, ut parum quin effundatur, absit, facit. Cum hæc illius sit natura dum sanum est, ut in suo loco retentum, nisi copiâ nimiam redundet, non adeò stimulum excitet; sic quando iam ab eo non nihil recedit, & vix amplius, longèque minus si è vesiculis in ductum iam effundatur, potest subsistere, fit, ut sic commotum non rejiciatur, admodum pruriens, ad excretionem valde sollicitet. Sicuti per imagines, insomnia, contactus, semen commoueri in utroque sexu potest.

*Sanguinis  
spirituosi  
in colem  
adfluxus  
causa  
Priapismi.*

Sanguis spirituosus arteriarum, affatim penis corpora & glandem adimplens, idque diu, Priapismi causa est, in quo ille continuò riget. Quod, quando cum veneris appetitu fit, (quam illius speciem tantum huc pertinere diximus) tunc illius sanguinis influxus, feminis causâ, sicuti iam dictum, stimulantis accidit. Sed & aliis de causis illud fieri potest, ut ante huius stimuli sensum sanguine affluente, penis erigatur, erectusque diutius maneat, eamque ob causam semine comoto, veneris inde sequatur appetentia. A calore autem lumborum & renum, ut vocant, partiumque vicinarum procedere solet, sanguine copiosius tunc ad hæc sedes affluente. Cuius caloris ut multæ causæ esse possunt, sic decubitus supinus, ob quem lumbi in culcitra plumea immersi, vel à duro subiecto cui incumbunt, ut scamno, stramine pressi, incalescunt, adiuuante situ corporis, cuius

causâ sanguis facilius eò fluit, penis erectio- nis, & per consequens ad venerem inclinatio- nis maioris, causam esse, docet experientia. Atque ob lecti calorem, ut prouerbum affirmat, circa mediam noctem ad venerem excitati magis apti sunt. Si aliis de causis, ob dolorem, inflammationem, flatuum aut aquæ influxum, membrum intumescat, aliò, sicuti dictum, pertinet.

### *Cyratio.*

**V**enereo stimulo si admodum & frequen- ter incitetur mares vel feminae, ne committant adus venereos illicitos, si à legitimo congressu qui per matrimonium fit, vel legibus, vel alio modo prohibeantur, aut in coniugio vnius culpâ, mariti præsertim, alteri non satisfaciat; ardor ille præsertim immodicus compescitur, si feminis potissimum prouentus, illiusque nimia caliditas & ardor, ut & sanguinis, impediuntur, & ne sperma sic irriteretur aut moueatur, caueatur: sequentibus modis.

*Pruritus  
& Furor  
venereus,  
& Priapismi  
cura.*

Quæ euacuationis causâ exhibentur purgantia, tunc potissimum in hoc casu locum habent; si à vitiosis humoribus, vel acribus succis, semen corrumpentibus & acutibus, salacitas hæc vehemens oriatur. Quæ nos illis quæ maximè redundare cognoscimus, & in causa esse putamus, accommodabimus.

Ad refrigerandam lasciuia, quæ refrigerando seminis feruorem extinguunt, vel siccando, etsi calida sint, illud absumunt, dantur: quibus fortè & proprietates quædam insita opitulatur. Neque hic in flatibus pellendis, absumendis, quos in causa esse minimè posse diximus, laboramus. Dantur autem sub noctem vel manè: sæpe repetita, cum citò effectus minimè sentitur.

Acetarium in cœna comestum, paratum ex Lactuæ, Portulacæ, Mentæ, (quæ venerem proprietate extinguit) foliis recetibus, addito Aceto, plus proderit, si sæpe hoc fiat, quam multa alia, si modò interim ab aromatatum & acrium usu sibi temperent.

Electuarium hoc vtile erit: R. conf. flor. Nenupharis, & Menthe anæ ʒ. j. caulium Lactuæ cond. ʒ. vj. feminis Viticis, Agnicasti (ob hæc vires sic dicti) ʒ. j. ʒ. feminis Ru-

tæ 3.ß. Coralli 3.j. Cryſtalli 3.ß. Camphoræ 3.j. cum ſyrup. de Portulaca q.ſ. fiat electuarium.

Pulvis conueniens: R. rad. Biſtortæ 3.j. fol. Mentæ, Rutæ, flor. Nymphææ ſicc. ana 3.ß. ſem. Viticis 3.j.ß. ſemin. Cannabis, Vuarû, Lactucæ ana 3.ß. Cryſtalli 3.j. Camphoræ 3.j. fiat pulvis; capiat 3.j. cum iuſculo vel ſyrup. Portulacæ: vel addito Saccharo exhibetur: vel in tabulas redigatur, Saccharo diſſoluto in aqua Roſ. & Lactucæ.

Syrupus conueniens: R. ſuccorum Lactucæ, Portulacæ ana 3.ij. ſucci Menthæ 3.ß. aquarum Roſarum, Viol. ana 3.j. Aceri roſ. 3.ß. Sacchari 3.ij. coquantur in formam ſyrupi. Detur 3.j. frequenter.

Decoctum Lactucæ, Portulacæ, Intibi, Menthæ in iuſculis proderit.

Aquæ frigida potus ordinarius, venerem reſtinguit.

Vt omne veneris deſiderium & uſus tollatur, aliqui pro certo hiſce effici poſſe affirmant; ſi vinum in quo Mullus piſcis extinctus fuerit, propinetur. Alij, ſi Formicæ quadraginta in potu dentur.

Extrinfecus ſi actu refrigerentur pedes, genitalia, lumbi, admodum venerem compeſcit. Immerſio membri virilis in aquam frigidam, mox illum facit languidum.

Quæ potentiâ refrigerant, additis ſiccantibus, in ſotu adhibita genitalibus, venerem quoque extinguunt. Vt decoctum Lactucæ, Plâtaginis, Portulacæ, fol. Salicis, flor. Nymphææ & ſimilium.

Quod & ſi pedes eo ſæpè lauentur, præſtant, addito præſertim Aceto.

Vel ſi ex ſuccis harum plantarum, fomentum teſtibus in viris, addito Aceto & Camphoræ momento, adhibeamus, efficacius erit. Quæ etiam in vterum iniecta, inhibere nimiam mulierum ſalacitatem credunt.

Oxyrrhodinum idem præſtat, ſi teſtes in eo immergantur.

Inunctio regionis renum frequēs tali vnguento, iuuabit: R. ol. Nenupharini 3.ij. ſucci Lactucæ 3.j.ß. coquatur ad ſuccorum conſumptum; adde ſeminis Viticis 3.j. Camphoræ 3.ß. Ceraæ albæ parum; fiat inunctio.

Vnguentum album camphoratum: vel

refrigerans renes, Gal. additâ Camphorâ, idem præſtabit.

Lamina plumbea renibus impoſita id quoque facit.

Odor Camphoræ venerē conſopit; quare caſtitatis nomine camphoram geſtare docent; tantamque illi vim, vt & contactu quoque admota brachiisve alligata, id efficere poſſit, attribuant. Vti & Vitici & Verbenæ, ſi ea in cubiculo ſpargantur.

Ieiunium ſeuerum laſciuiam aliquomodo ſedat. Sed præſertim abſtinētia ciborum calidorum, aromatum & vini imprimis; quam regulam hi potius ſeruare debēt, qui abſtinentiâ certorum ciborum, caſtitatem ſeruare ſe poſſe, profitentur.

Affectus animi triſtes & moleſti, ob offenſam, mœrorem perſeuerantem adferentes, laſciuiam tollunt.

Morbi, ob dolorem vel intemperiem calidam aut frigidam, idem faciunt.

Sanguinis per venam ſectam detractio parum efficitur, niſi tanta ſit, vt corpus inde penitus emacietur, aut debilitetur, quod tamen citra grauiorem offenſam vix poteſt fieri. Quâ ratione, exhaustis per venæ ſectionem omnibus penè venis, quendam vxoris petulantiam repreſſiſſe ſcribunt. Priuatim tamen venarum poſt aures apertionem, impotentes reddere, exemplo Scytharum probat & docet Hippocrates.

Caſtratio, ſalacitatis extremæ, extremum eſt remedium: quæ in viris tantum exectis teſtibus, vel amputato membro, quod certius & tutius eſt, fieri poteſt. Quâ ratione ſeipſum, caſtitatis cauſâ, Origenem caſtraſſe ſcribunt: egoq; ſacerdotem, quia ſæpè propter laſciuiam mulctatus fuerat, offenſum, idē feciſſe ſcio. Quod alias ſeruus, quos vxoribus miniſtros adiungūt, ne ab illis corruptantur, heri facere ſolent: rectiusque hanc penâ illi, qui adulterio, vel ſcortatione delinquant, & in iis peccatis perſeuerāt, luerēt.

Congreſſus legitimus coniugum, ſœdere matrimonij ſociatorum, certis, mum ad luxuriam ſedandam & caſtè emendandam, eſt remedium, omnibus à Deo, qui dono continentia carent, conſeſſum & liberum mortalibus.

DE CONCEPTVS DEFECTV.

CAPVT XIX.

Genera.

Sterilitas.



**Q**VANDO mulier eâ ætate quâ ad concipiendum habilis esse debebat, mensesque illi naturaliter fluunt, viri consuetudine vrens, non concipit nec generat, Sterilitas, Agonia, Atechinia dicitur. Et si quoque semel aut iterum conceperit & pepererit, & postea annis præfertim consuetis, (qui in aliis biennium, in aliis triennium, in aliis amplius temporis spatium est, quo rursus concipere solent) vel etiam nunquam postea amplius concipiat, defectus huius functionis, & per consequens generationis, quæ ad propagationem generis humani, ut aliquoties vel multoties fiat, necessaria est, existit.

Ex illis autem quæ hoc modo steriles & infœcundæ sunt: Aliæ sanæ nihilominus & benè habitæ sunt, magisque quàm quæ aliquoties procreantur plerumque pinguescunt, tardiusque senescunt. Plerumque verò accidentia vteri quædam huic defectui copulata sunt. Quod vel menstrua nunquam illis apparuerunt: quæ & viragines tum ob hanc causam, cum quod non generant, appellantur. Vel quod quæ prius fluxerant, nunc suppressa sint, aut parcius vel nullo ordine fluunt; aut cum difficultate coloreque alieno. Quibus frequens hoc accedit malum, quod vterinus albus fluor dictus mulieribus infœcundis consuetus est. Sed & alia etiam interdum patiuntur incommoda: quæ omnia sterilitati occasionem vel præbent, vel inde nascuntur.

*Meres vel feminas procreandas deficiunt.* Huc & hoc incommodum referre posset, quod aliquæ fœminæ tantum fœminas pariunt, & nullos masculos; præfertim si hoc successionem stirpis euertat. Verum & quæ masculos tantum procreant, fœminas interdum habere optant.

Causa.

**Q**UOD autem non concipiat mulier, licet in actu venereo nullus obseruetur defectus, cuius causâ, si & congressus & per consequens procreatio impedita sint, eâ iam in Impotentia explicata fuit) fit hoc, vel quia semen vtero minimè excipit: aut exceptum non retinet. Quod viri vel mulieris feminis, aut instrumentorum genitalium causâ, accidit.

Seminis virilis occasione potissimè hoc accidit, si non sufficiens, aut prolificum ad generationem à viro conferatur: etsi enim tunc mulier illud concipit, procreatio vel nulla, vel irrita, sicuti in mola dicitur, sequitur. Nisi enim tanta illius sit quantitas, ut vteri cauitatem, quæ proin exigua facta fuit, in conceptu adimpleat, ex eo fœtus minimè procreabitur. Quæ & causa est, si semen iustâ quantitate, quæ ad generationem requiritur, colliginequeat, sed frequentius quàm conueniat, per veneris nimium usum, aut inuoluntarium illius in gonorrhœâ effluxu, excernatur, ut illi non generent; uti verò alij qui rarius eam exercent, & vel procreationis, vel sanitatis causâ, sibi temperare possunt. Vnde & euenit, quod senes aliqui matrimonium cum iuueniculis contrahentes, cum minus quàm iuuenes feruidi parcius venere vrantur, liberos adhuc etiam extrema senectâ, sicuti parens meus octuagenario maior, procreent. Quod si quoque semen non coctum & elaboratum, sed crudum sit, tenue, aquosum; & ut vocant, frigidius, vel spiritu non perfusum, vel alioquin vitia ea in se contineat, quæ illius generatricem vim tollunt, cum non sit prolificum; ex eo nihil generari poterit. Tale autem ob imbecillitatem vasorum seminalium: vel permixtionem prauorum humorum, à causis in impotentia & salacitate explicatis, nascitur. Fit tamen sæpè, ut tacitum vitium aliquod in semine procreationem minimè impediens lateat, quod in sobolem ex eo genitam transiens, suo tempore sese exerit, similemque affectum à parente hereditarium in eo, eâ ferè ætate, quâ pater eo primum laborare incepit, profert: vnde podagra, elephantiasis, &c.

*Seminis virilis paucitas, Cruditudo, Vitiata causa Conceptionis, defectus, Sterilitas à viro dependens.*

*Semē vi-  
ri & mu-  
lieris in  
causa,  
quod  
Mares  
vel Fe-  
mina ge-  
neretur.*

milesque affectus, ab insitis causis in liberos propagantur. In semine viri defectum hunc quoque existere, quod semine tantum & nulli mares ex eo nascantur, credibile est, cum inualidius tunc à femineo semine in sexu conferendo, vincatur: quorum abditas causas relinquere satius est, quam temperaturę alicui, aut quod ex hoc illōve teste semen prodiens sexum immutet, affingere, cum exēto vno teste, vel hoc illōve temperamento præditus, nihilominus vtriusque sexus sobolem generent.

*Seminis  
mulieris  
defectus,  
cruditas,  
impuri-  
tas, cau-  
sa Conce-  
ptus de-  
fectus seu  
Sterili-  
tatis a fe-  
mina p-  
fecta.*

Mulieris feminis causā, (quod ad foetus generationem cum virili cōmiscere necesse esse, sexus in foetu femineo, & similitudo matris in mascula & feminea prole apparens, satis declaret) si illud deficiat penitus, vel minori quā opus erat quantitate conferatur, idem sine dubio contingit, & frequentius fortē quā in viris, cum mulier & si semine destituatur penitus, congressum tamen ferre possit, vir autem eo priuatus, ad illum exercendum ineptus sit. Quæ & causa, quod meretrices quę quæstus gratia illud adeo profundunt, vt exsuctæ penitus fiant, tam multis & variis se commiscentes, illorum semen licet excipiant, tamen non concipiant. Quod & si illud labē aliquā affectū, impurum, aut crudum existat, non solum scortis sed & alijs solet accidere, quę plerūq; malē habitæ aliisque morbis affectæ sunt. Sed & si feminis mulieris temperatura, eadem cū virilis feminis existat, ex cōmixtionis horum æquabilitate nihil generari posse contendunt, & vt ex diuersis illorum naturis, medium & temperatum ex vtriusq; mixtum exfurgat, requirunt. Verū nos omne semen calidum statuentes, non prolificam vim in eo, sed cuiusque decenti temperaturā constituimus.

Virilis membri causā, modō tale sit, vt actum venereum perficere possit, rariū hoc fit. Neque enim si eam longitudinem, quā aliqui alius prævalent, non habeat, modō rectē formatum actum obire possit, hoc quod minū semen ab ipso eiectum, vtero (qui cū calet feminis appetens, facillē eouſque progreditur, illudq; arripit) concipi queat, nisi aliud obſtet, impedimentum adferet. Si ta-

men, foramen semen & vrinam in glande *Penis nō  
in recto  
loco aper-  
tura, cau-  
sa Con-  
ceptus  
defectus.* emittens, non in medio illius, vt rectā interius orificium vteri aspicere possit, sit, sed in latere vel subtrās, sicuti in quibusdam ab ortu hoc accidisse vidi, vel alioquin ductus alibi sub pene fistulā perseverante perforatus, ita vt dum semen emittit, illud non ad osculum matricis dictū ei aculetur, aut peruenire possit, illud concipi nequit.

Si ab vtero sterilitas procedit, rariū illius cervicis causā, vt conceptio non fiat, nisi per accidens, quatenus congressum impedit, vti iam dictum, accidit. Sicuti verō vteri fundi orificij vel illius substantiæ occasione, hoc frequentius fieri solet.

Orificium interius dictum vteri, seu trās- *Vteri o-  
rificij in-  
teriori,  
Amplis-  
simo, La-  
tatio, oc-  
clusio,  
causa  
Sterili-  
tatis.* uersa rimula angusta & occlusa, quæ tempore conceptionis se aperit, semenque haurit, si ampla nimium fiat, etsi tunc facillē admittat, quia tamen illud diutius minimē retinetur, vt nihil ex eo generetur, in causa est. Hoc autem, diducto eo vltra modum partu violento, ob foetus magnitudinem aut peruersionem, adeo vt ad pristinam angustiam, sicuti aliās post partum fieri solet, redire nequeat, solet contingere. Quæ & causa aliquando est, quod mulieres post partum difficilē non amplius concipiant. Laxato quoque hoc orificio, ab humidioribus multis excrementis, vel in vtero genitis, aut in cervicem illiusq; in fluxu aliorum mensium continuo, effusis, retentisq; aliquamdiu, sedemq; hanc alluendo madefacientibus, idē accidit, vt ad conceptum aliquæ mulieres, profluuiū hoc muliebri obnoxia, non sint idoneæ. Occlusa quoq; & obſtructa penitus hac viā, adeo vt aperiri nequeat, cum femini tunc minimē pateat in vterū introitus, conceptio nulla fit: sicuti ab ortu, à cicatrice, aut exerescentiā carnis, vlceraſis aut laceratis in partu arduo, hūc sedibus relictis, obſtrui potest: quā ratione etiam exterius orificiū, etsi longē patentius sit, occaluisse, superius declaratum fuit. Ab alijs verō causis vix obſtruitur. Nam quod de adipe fertur, sterilitatem in pinguibus mulieribus efficere, non quod in vteri ceruice aut fundo abundet, in quibus nullus esse deprehenditur, sed aliam ob causam hoc agere, si modō hoc verum, prius



prius demonstrauiamus. Quòd verò non aperiatur ad conceptum hoc orificium, alio enim tempore naturaliter semper occlusum manet, & post conceptum in gravidis rursum mox se claudit, nec nisi de nouo in superfœtatione, sicuti & postea in partu se aperit vterus, sicuti iam ostendetur, in causa est.

*Vteri sub  
stantia  
Solidi-  
tas, Du-  
rities &  
Siccitas,  
causa  
Sterili-  
tatis.*

Corpus ipsum seu substantia vteri, si nimis compacta & dura sit, vel sanguine non perfundatur, conceptionis defectus potissima est causa. Cum enim tunc primum mulier ad concipiendum apta fiat, quando vterus ipsius, qui densus & nervosus est, & quamdiu talis manet ad concipiendum ineptus, calore infuso, affluenteque sanguine adausus, carnosus & mollis fit, & sicuti canibus dum calent, pudendum turgescere videmus, in ambitu orificij intumescit, rimaque illius ampliatur, (sic enim auidius semine excipere potest) fit sane, ut si in naturali desitute persistat, aut etiam præter naturam durior adhuc euadat, cum ipsius orificium ad semen fugendum, sicuti dictum, aperiri nequeat, nulla sequatur conceptio. Hoc autem vel à constitutione & temperamento illius tali, ab ortu procedit, ut statim siccior & solidior, quam par erat illius substantia euadat: Qualis alias primum senio appropinquante, fieri solet, & naturalis quoque, quòd tunc mulieres parere desinant, causa est. Sic & si ante senium mulieri hoc accidat, fit, ut sanæ alioquin mulieres, steriles fiant talesque permaneat. Quod & illis quæ venere nimia, aut aliis rebus vterum vehementius exiccarunt, euenit: aut quibus alioquin vterus à tumore aliquo præter naturam, aut post inflammationem induratus est. Sed & si sanguis vteri substantiam

*Vteri sub  
stantia,  
quod san-  
guine, non  
irriga-  
tur, cau-  
sa Steri-  
litas.*

imbuere nequeat, cum non solum ad dilationem & molliem vteri dictam, influxus illius requiratur, sed & ut quando semen vtero concipitur, illique adnasci incipit, mox sanguis, ex quo & incrementum sumat, foetusque alatur, præstò esse debuerit. unde & principium generationis statuitur: duplici huius necessitatis causa, si vel omnino nullibi ad vterum feratur; vel alias suppressis menstruis impeditus sit, à causis illic recentis; vel licet per cervicem illius menstrua-

tim euacuetur, tamen ad fundum vteri peruenire nequeat, ob vteri dictam soliditatem, vel venarum vterum implicantium angustia, aut obstructions, accidit, ut viragines, vel quæ menstruorum suppressione laborarunt, aut etiam quibus menstrua fluunt, præsertim immoderatiùs (unde minus quoque vteri venis, tunc, cum vterus calere debuit, distribui potuit) non concipiant, sterilesque sint. Quod & illis euenire potest, quæ à matrimonio & consortio viri diu abstinentes, vel alijs de causis, quia diu non conceperunt, atque vterum hoc otio & defuetudine, ut nunquam sanguine admodum perfusus fuerit, aut intumuerit, habilisque ad conceptionem factus sit, exanguem veluti reliquerunt, sanguine ad cernicis illius venas potius defluente, & per menstruas euacuationes expurgari solito; ex consuetudine hac longa, sanguine eò potius quam ad vterum defluente, fit ut postea, etsi cum viro misceantur, iam ætate prouectiores, non tam facile, uti quæ mox in iuuentute venerem exercent, imprægnentur.

Imbecillitas vteri, causa est, ut neque ad conceptionem aptus, sicuti dictum, tempore idoneo, fieri possit, & quòd functionibus illis lesis, quarum præcipua seminis est conceptio, illud non attrahat, vel apprehensum retineat. Quæ illius debilitas, vel ab ortu illi connata est, vel quia alias refrigeratus est, aut morbis quibusdam debilitatus, illi contingit. Suntque hæc ad venerem tardiores, alijsque vteri morbis sæpe obnoxie.

*Imbecil-  
litas vte-  
ri, causa  
Sterili-  
tatis.*

Intemperies, præter siccam iam dictam vteri constitutionem, & debilem, quam frigidam appellare solent, humida præsertim cum frigiditate copulata, conceptioni quoque incommodat, huicque tanquam frequentiori ferè soli, curationem accommodant. Quod ab excrementis humidis, in vtero ex crudo vel prauo illius nutrimento, natis collectisque, illumque humectantibus atque refrigerantibus, ac illius orificium, ut supra dictum, laxantibus, ferè contingit. Cum ex defluxu illius in vterum, nullâ patente viâ, hoc vixdum fieri possit: uti verò corpus eiusmodi excrementa per consuetas, etiam sanguinis expurgationum, venas, transactis plerumque mensibus, vel etiam una cum illis, quæ tunc

*Intempe-  
ries hu-  
mida vte-  
ri, causa  
Sterili-  
tatis.*

tunc malè coloratæ & impuræ sunt, expurgare solet. Fit tamen in vtrisque, vt cum à sanguinis vitio hæc proueniant, eiusmodi fœminæ quæ non concipiunt, malè habitæ & decoloratæ existant.

### Curatio.

Conceptus  
defectum  
curandi  
ratio.

**S**I mulier non concipiat, nullo alio defectu actus venerei obeundi, nec in viro, aut in illa apparente (cuius curationem illic exposuimus) causas diligenter expendentes, hac methodo procedemus. Si ob seminis penuriam, quod in viris citius contingit, hoc fiat, tunc rarius coeant, illisque quæ semen augere possunt, de quibus in impotentia dictum, vtantur. Si quia crudum est semen, aut vitiosum non procreent, vt sanguis laudatus generetur, & si quod inest vitij ab eo expurgetur, vasaque semen generantia corroborentur, curandum. Si membri virilis vitio, eò quòd foramen semen emittens alicubi apertum sit, illud accadat, sectione facta vel erosione labiorum huius fistulæ, vt conascatur denuò & claudatur, procurandum: quòd, eo occluso, semen rectam viam rursus sequi, & per glandis foramen recta rursus effundi possit: quod quando ab ortu deest, desperata tunc est curatio. Si verò vteri causâ, sterilitas contingat, idque quia vterum adeò induratum vel orificium illius, ex partu læsum laxatumque nimis, aut tumore aliquo obturatum habent, in illis mulieribus, quæ sanæ alioquin, vel nunquam conceperunt, vel post partum aut læsionem vteri insignem, non amplius concipiunt, desperata ferè est curatio. Sicuti & in illis viraginitibus, quibus à teneris menses nunquam fluxerunt. In reliquis verò, quibus propter imbecillitatem, vel humiditatē, aut refrigerationem, aut excrementorū vteri copiam cōceptio impedita est, quibus & menses plerumq; non decenter fluunt, aut fluor vterinus dictus, molestus est, aut alij morbi comites existunt, curandis potius intenti ad conceptionem illarum permouendā curam, cum meliori spe, sequenti modo accommodare poterimus. Quæ, & in desperatis, in omnem euentum, tentatur.

Ante omnia generatim hoc modo mulier

euacuabitur. Purgamus primū illas: in quo corporis constitutionem, humorum redundantiam & præcipuè an menses non rectè fluant, vt ferè fit, & albo fluore vterino laborent, obseruamus.

In genere autem sic procedimus: R̄. Catholici ʒ. j. syr. Ros. sol. ʒ. ij. aquæ Borrag. & Artemisiæ q. s. fiat potio: Detur.

Veniam dein aperimus: si plethorica sit.

Dein præparationis nomine: R̄. syr. de Artemisia, Capill. Vener. ana ʒ. j. β. aquarum Borrag. Artemisiæ, Nepetæ ana ʒ. j. misce, fiat iulep. aromat. Cinam. Capiat tribus matutinis.

Huius loco hoc decoctum sumi potest: R̄. rad. Aperitiu. temperat. in Vino ana ʒ. β. rad. Eryngij ʒ. j. rad. Enulæ, Valerianæ, Imperatoriæ ana ʒ. β. herb. Artemisiæ, Matriariæ, Nepetæ, Pulegij, Chamædreos, Alchimillæ, Maioranæ ana M. j. Buglossi vtriusq; cum toto, Cichorij, Endiuia, Fumariæ ana M. β. florum Leucoij, Genistæ, Rosmarini, Borrag. Cicerum rub. ana p. j. sem. Anisi, Fœniculi, ana ʒ. ij. semin. Petrosel. Sileris mont. Pastinacæ sylu. ana ʒ. j. conquassentur, decoquantur, clarificentur & aromat. Cinam. atque addito Saccharo q. s. fiat apozema pro tribus dosibus, vel quatuor aut quinque, Vel ex infusis in Vino & decoctis in duplici vase, vinum exhibeatur.

Si simul purgare velimus, requirente illud corporis impuritate, præcedentibus addimus, radic. Liquirit. ʒ. ij. rad. Azari ʒ. ij. Mercurialis recentis M. j. Passul. par. xx. fol. Senæ, radic. Polypodij ana ʒ. j. β. femin. Carthami conquass. ʒ. vj. & prædicto modo cum Aqua vel Vino decocta exhibemus.

Purgamus dein hac potione: R̄. Rhabarbari ʒ. iij. Cinam. ʒ. j. infundantur in Vino, diluto parum aquâ Endiuia, exprimantur, dissolue elect. de Citro sol. vel Diaphæn. ʒ. ij. syrapi Rosar. sol. ʒ. ij. fiat potio.

Si pilulas malit: R̄. pilul. Cocciar. Aggregatiu. Sine quibus, ana ʒ. j. cum Vino albo, fiant pilulæ.

Absolutè purgatione Tryphæræ magnæ sine opio ad ʒ. j. sequenti mane propinamus.

Vt per vices euacuetur, pilulis vsualibus vel electuario aliquo laxatè illud efficitur:

Quæ

Quæ tunc dantur singulis mensibus antequam balneis alijsve topicis, sicuti dicitur, vtantur: Vt R̄. Catholici 3.ij. Diaphænic. 3.j. Calsiæ rec. extr. 3.ij. pulpæ Sebesten 3.j. syr. Rosar. sol. 3.j. ̄. misce: capiat bolum per se, cum iure Cicerum aut Vino.

Pilulæ vsuales, repetantur priores: Vel R̄. pilul. de Aromat. de Agarico añ. 3.j. ̄. Cocciarum 3.j. troch. Alhandal 3. ̄. cum syr. Rosar. sol. cum infus. purgantium, fiat massa: capiat 3.j.

Sudores in humidioribus mulieribus, si frequenter prouocentur, cum ab vniuerso corpore euacuent, valde illis vtile erit. Quo nomine decoctum Guaiaci, adhibita cibi parsimonia, more vsitato interdum bibant, qua dum quædam ex meo præscripto, vtēbatur, grauida antequā absolueret facta est. Item balneo sicco humidoque, vti mox dicitur, eos eliciant.

Menses prouocentur, exhibitis ad motisque, in illis quibus deficiunt: & præsertim venæ sectione iuxta malleolum factâ: vt hæc in menstruâ suppressis explicata sunt.

Conceptionis autem potissimum iuuandæ gratiâ, exhibentur mulieribus ea remedia, quæ venerem excitare, semen augere, in venereo actu iuuando superius descripta sunt: quæ vt in eo defectu viris potissimum, quibus impotentia citius accedit, quàm fœminis, exhibentur: sic hîc, mulieribus ad conceptum promouendum, qui citius fit, si in venere magis caleant, & semine abundant, dantur: atque interdum, ne in viris mora sit, illis quoque simul propinantur. Addendo illis quæ fœminæ assumere debent, ea quæ vterum propriatere iuuant, & calefaciendū & siccandū intemperiem corrigunt, menscūq; si suppressi sint, promoueant, humiditatesq; si redundant, absorbent. Sequenti modo.

Pulueres sequentes id præstent. Primus: R̄. Nucis mosch. 3.j. Moschi gr. ij. Salis q. s. pro ouo saliendo; cum ouo Sorbili capiat singulis matutinis.

Secundus: R̄. sem. Sileris mont. 3.j. sem. Erucæ 3. ̄. rasuræ Eboris 3.ij. Cinamom. Nucis moschatæ añ. 3.j. Moschi gr. vj. Sacchari 3.ij. fiat puluis: capiat 3.j. cum Vino generoso.

Tertius: R̄. spec. Diamoschi, Diambre a-

na 3. ̄. ras. Eboris 3.j. semin. Sileris mont. 3.ij. Cinamom. 3.j. Sacchari 3.ij. fiat puluis: vel dissoluto Saccharo in aqua Cinamom. & Artemisiæ, fiant tabulæ: Dentur ad 3.ij.

Quartus: R̄. Testiculorū verris 3.ij. Priapi tauri 3.j. Matricis leporis, Coaguli leporis ana 3. ̄. exiccata omnia & puluerisata sumantur, addendo Cinamom. 3.j. ̄. Nucis mosch. Gariophyll. ana 3. ̄. Piperis, Zingib. ana 3.j. semin. Erucæ, Pastinacæ syl. Sileris mont. Fraxini ana 3. ̄. sem. Nasturtij, Pœoniæ ana 3.j. ras. Eboris, Cornu capræ, ana 3. ̄. Moschi, Ambre ana gr. vj. Sacchari 3. x. In forma pulueris vel tabularum exhibeatur potius 3.ij.

Ex fructibus nucleatis, rectius confectioes sequentes paramus, quàm illos pulueribus aut electuarijs permiscendo compositionibus quæ diu asseruari debent, & rancorem acquirunt.

Confectio sicca: R̄. nucleos fructuum sequentium saccharo obductos, Amygdalarū, Auellandarum, Pinearum, Fisticorum ana 3.j. cort. Citri, Cinamom. Gariophyl. Zingib. incisorum & Saccharo quoque vti solent condit. ana 3. ̄. sem. Erucæ condit. 3.ij. misce: capiat cochl. j. pro vice cubitum itura.

Martius panis sic fieri potest: R̄. nucleor. Amygd. dulc. 4.j. Auellandarum 4. ̄. Pinearum 3.ij. Fisticorum 3.j. macerentur in Lacte, & postea contendantur, addendo spec. Diambre, Diamoschi ana 3. ̄. Cinamom. 3.ij. ras. Eboris 3.j. vel de pulueribus prædictis 3.j. coquantur in panes rotundos, vel aliter formatos.

Electuaria sequentia proderunt: R̄. conf. Eryngij, Orchidis, ana 3.j. ̄. conf. flor. Rosmarini, Scabiosæ, cond. cort. Citri, Nucis mosch. Zingib. ana 3.j. commisceantur, addendo puluerum prædictorum sine saccharo, primi, secundi, vel tertij 3.ij. vel iij.

Reliqua in remedijs venerem mouētibz inuenienda erunt.

Tryphera maior sine opio 3.j. quantitate, cum Vino generoso, laudatur.

Edulia efficacia hoc modo sunt: R̄. Nucis mosch. 3.j. Zingib. Piperis ana 3. ̄. Maioranæ siccæ 3.j. sem. Erucæ, Sileris mont. Carui ana 3. ̄. fiat puluis: ad sequentes vsus,

**R.** Cerebellum porci, coquatur in Vino maluatico, in fine addendo pulueris prædicti, & Salis q. s. Comedat frequenter in cœna.

**Vel: R.** Testiculos & cristas gallorū dum castrantur, & coquantur eo modo, & pulvere condiantur: & comedantur.

**Vel: R.** Testiculos arietis, incidantur, vt solent antequam torrentur, voluantur frustra in dicto puluere, atq; folijs Saluiae & Omento pingui desuper inuoluta, bacilloque affixa, torreantur: Pro cœna.

Sed & alia alimenta bene nutrientia, si illis egregiè reficiantur fœminæ, vt ad conceptum aptiores fiant, efficiunt.

Ferculum sequens pro imprægnatione mulieris mirè commendatum, sic suauius & efficacius parabitur: Sumendo fol. Menthae, flores Scabiosae & Pimpinelle, omnia recentia, incidantur, minutim, affunde duo vel tria Oua confracta, addè Cæpas incisas, Nucleum mosch. & Salis q. s. coquantur in sartagine in placentam, Psantuch: vel inuoluatur pasta folijs Cauliū & coquatur sub cineribus: comedant de eo vir & mulier ieiuni, & post horas quat. commisceantur, ostiduo postquam è mensibus purgata fuerit.

Decoctum sequens infallibile prædicant esse remedium. Fit, radicem Eryngij, fol. Artemisiae & Sanamundae decoquendo in Vino rubro: & cyathum vnum tepidum mulieri manè & vespere exhibendo: cū 3. j. Trypherae magnae sine opio, per dies nouem.

Hoc quoque arcanum, ob singulares vires esse volunt. Exhibere olei Maioranæ arte chymica elicti, & Moschi ana gr. j. vel ij. cum Coagulo leporis.

Topicis adhibitis balneis, suffitibus, inunctionibus, pessarijs, vterum calefacere, exicare, roborare, interdum relaxare si durus, astringere si nimis latus & humidus, studemus.

Balneis, infusions, præcipuè cōueniunt. Vt illis per dies quinque, sex vel octo, absolutis menstruis purgationibus, antequam maritum admittat, vtatur: horam vnā aut alteram ante introitum lecti, vel ante cœnā aut etiam manè in eo ventris inferiora immergendo, vel omnino in eo sedendo. Reperiendo illorum vsum sequenti mensē, &

tertio & quarto quoque, si interea non concipiat: quod ex eo, si menses sistantur, cognoscimus.

Si itaque ex calefacientibus, siccantibus, vterumque roborantibus balneumque concinnare volumus, ex pluribus paucioribusve, hoc modo fieri poterit: **R.** rad. Liliorum alb. Valerianae, Ireos, herb. Matricariae, Artemisiae, Pulegij, Nepetae, Origani, Calameti, Maioranæ, fol. Lauri, summit. Sabinæ & Iuniperi, fl. Sambuci, Rosmarini, Lauandulae ana q. s. addendo baccarum Lauri & Iuniperi ana p. j. sem. Sileris mont. 3. β. Aluminis 3. iij, vel plus, aut salis, decoquatur in Aqua pluuiali, addendo Lixiuum, aquam feratam & Vinum.

Vel si magis astringere & exicare velis, supradictis adde, Gallarum, Balauft. ana p. j. fol. Rubi, Quercus ana M. j, Aluminis 3. β. decoquantur vt supra, augendo mensuram aquae extinctionis Ferri.

Cum relaxare potius volumus: **R.** rad. Liliorum, Althaeae & Maluæ cum toto, Parietariae, ana q. s. addendo paulò minùs Matricariae, Pulegij, & de alijs supradictis vterum roborantibus. Item seminis Lini, Foenogr. ana p. j, fol. Chamom. Meliloti ana p. ij. p balneo.

Si expurgare vterum ab humiditatibus præcipuè studemus, addè balneo calefacienti, rad. Bryoniam, herbā Mercuriale & Persicariam, vt reliqua quantitate exuperent.

Isdem, præsertim quæ efficacia sunt, vterum fouere, si in eo multoties sedere tadio sum illi sit, loco balnei cōueniet.

Vel si tota mulieris constitutio humidior, balnei vsum diuturnum requirat, eo corporis inferiora penitus immergendo, per mensis spatium vti poterit.

Thermarum item naturalium siccantiū vsum, per mensis spatium & vterius, mulierum insecundarum vltimum est refugium, ad quas eo nomine proficiscuntur; in illisq; multas horas indies sedent, & sudant. Quæ efficaciores erunt, si naturā actu calidæ quoque sint: quales aluminosae & nitrosae, & gypsum redolentes, Plumbariae dictae, passim inueniuntur. Sulphureae item: quæ cum vim emolliendi habeant maximam, in duritie vteri naturali sanas mulieres steriles reddere,



videndum, extremum remedium, & quia siccant, in aliis quoq; conuenient. Salsæ etiam maris & puteorum aquæ, arte calefactæ & vsurpæ, per se vel cum decocto conuenienti, proderunt.

Suffitus vtero excepti idem quoque præstant: qui ex decocto feruenti excitati, atque à muliere dum in stapha sudat, vel quando cunque balneum humidum egreditur, aliquamdiu admittuntur.

Calefaciens potissimum & roborans, ex odoratis plantis sic fiet, efficacioribus. Vt decocto Matricariæ, Pulegij, Calamenti, Origani, Saluæ, Hyssopi, Ocimi, Maioranæ, Rosmarini, Chamomillæ, addendo Fumariam, & Pimpinellam, quæ priuatim hic cōmendantur. Item rad. Imperatoriæ, Valerianæ & Acori veri, ana q. s. ea in aqua & Vino decoquendo.

Vel si magis astringendum & siccandum, addimus rad. Bistortæ, Agrimoniam, Gladium capulas, nuces Cupressi, decoctione q., addito Vino rubro stiptico, facimus.

Fumū iniectis pulueribus vel trochiscis, supra accensos carbones excitatum, mulier quotiescunq; ab infensione surgit, excipiat.

Qui sic parabitur, bonique odoris erit: R. Benzoini, Storacis, ana 3. ij. Ladani 3. j. ligni Aloës 3. j. Moschi 3. ss. Sacchari 3. iij. misce; fiant trochisci cum infus. gummi Tragach. Vratur vnus.

Vel hoc modo: R. trochisc. Galliæ & Aliptæ mosch. Imponatur vnus carbonibus.

Vel sequens non ita suauis: R. Masticis, Thuris, Storacis, Ladani ana 3. j. Garyophyl. Cinamom. rad. Cyperi, Nucis mosch. Santalici ana 3. ss. Castorij 3. j. fiat puluis: Projiciatur portio illius supra carbones ignitos, & fumum excipiat.

Quæ sinui vteri admouentur proximè, nascalia, vel quæ profundè intruduntur, pessaria, ad vterum ab humiditatib. expurgandum, si illis redundet, instituuntur, purgato prius generatim corpore, & transactis mensibus, quæ tempore alba vteri excrementa fluere solent, ante balnei vsum, vel dū eo vtitur, vna vel duabus aut trib. noctibus ea continendo, vel si menses nō rectè fluant, etiam paulò ante ipsorum aduentum illis vtendo.

Hoc modo: R. folia Mercurialis recentia, contundantur, atque in sacculo sericeo butyro illito supponantur. Quod si nimis mordicant, Melle & Vitellis ouorum potius subacta, vsurpantur.

Vel sic: R. pulu. Benedictæ 3. ss. Agarici 3. iij. seminum Nigellæ 3. j. fellis Hirci 3. j. ss. farinæ Cicerum 3. j. cum succo Mercurialis vel Betæ: fiant pessaria.

Ad calefaciendum vterum, eumque ad conceptum disponendum, alia subiiciuntur, cum balneo vsa est & suffitu, seque in lectum composuit mulier, tribus postremis balnei diebus, totam noctem relinquendo, vt sic absoluto balneo, viro se commiscens, ad conceptum fiat idonea.

Hoc pasto: R. Tryphera magnæ sine opio 3. j. Masticis 3. ss. Styracis liquidæ 3. ss. Coaguli hædi vel leporis 3. ss. Zibetæ vel moschi 3. ss. Impleantur sacculo pro pessariis.

Vel sic: R. Masticis 3. ss. Thuris 3. iij. rasuræ Eboris 3. j. ss. Nucis cupressi 3. j. fol. Melissæ, Nepetæ, Gariophyl. Spicæ nardi ana 3. ss. Zibetæ vel Moschi 3. ss. vel ad pretium minuendū, Castorij 3. j. excipiantur coagulo Hædi vel leporis recenti, addendo Styracis liquidæ 3. iij. fiant pessaria.

In viraginitibus & quibus vterus durus & siccus est, eum potius dilatare oportet, hoc modo: R. axungie Anseris & Gallinæ, mucilag. sem. Foenogr. extractæ cum Vino, Vitelli oui ana 3. ss. resinæ Laricæ, Coaguli hædi ana 3. ij. rad. Ireos 3. iij. Storacis cal. 3. ij. Cere albæ q. s. addendo parum Moschi vel Castorij: fiant pessaria.

Vnctiones, post balneum & suffitum peracta, in pectinis regione & vmbilici fieri debent. Probatur autem imprimis ol. Muscatum seu Muscellinum dictum.

Vel fiat tale: R. olei Cheirini, Nardini, axung. Gallinæ & Anseris ana 3. ss. Styracis liquidæ 3. ij. Gariophyl. Nucis mosch. Macearis ana 3. j. Ligni aloës, Schoenanthi ana 3. ss. Galliæ mosch 3. j. Cere q. s. fiat linimentum.

Efficacissimum hoc est: R. olei Maiprang & Gariophyl. per destillat. ana 3. j. olei Nucis mosch. per expres. 3. j. Zibetæ & Moschi gr. aliquot. Cere albæ q. s. fiat linimentum: quo vmbilicus & introitus sinus vteri illinatur,

diebus postremis balnei, antequā cum marito concumbat.

Emplastra vterum, vt semen auidius rapiat, & conceptum retineat confirmantia, in perinei & lumborum regione vel eodē tempore vel mutatis vicibus, gestare debēt, tunc primum, quando peractis diebus balnei, suffitus, inunctionum & pessarium, ab illis cessant, & viri consuetudine iterum vti incipiunt mulieres; continuō vel saltem singulis noctibus, ad vltimam septimanam, quā menses erumpere debent, vsque illa ferendo.

Quale hoc est: R. emplastri pro Matrice 3. j. Galliae mosc. 3. ij. Styrcis liquidæ 3. j. 6. Gariophyll. 3. j. Masticeis 3. ij. malaxentur oleo Muscellino vel Cheirino: fiat emplastrum.

Quod si menses, exactā curā vnius aut alterius mensis, sistantur, suspicioq; sit grauidam illam esse, per septimanam vnam aut alteram expectandum: quo tempore quiesca mulier esse debet, & nisi interea redeant, sequens emplastrum ad conceptum retinendum abortumque vitandum locis dictis applicare, & singulis noctibus retinere debet: R. emplastri de Mastice 3. j. rad. Bistortæ 3. ij. nucum Cupressi, Hypocistidis ana 3. ij. Santalirubr. Ros. rubr. Gariopyl. ana 3. j. malaxentur oleo masticino: fiat emplastrum.

Congressus decens, vt conceptio fiat, omnino requiritur. Qui sic instrui debet, vt non fiat, nisi tam mare quā femina, eum magno desiderio appetente, si desiderium illud ex aliquandiu intermisso concubitu potius, quā irritamētis nascatur: quæ & non minima causa est; quare, post peregrinationem longā, maritis diu absentibus, & quod mulieres, dum thermis vtuntur, aliquandiu à maritis separate, aut dum remedijs vtuntur, diutius à concubitu abstinētes, postea citius concipiant. Dein quoq; sic actus perfici debet, vt eodem tempore vtrinq; semen emittatur, nec mox ab inuicem separentur. Et cum mulier se grauidam esse, suspicatur, à Venere, donec embryo vtero adnatus, beneq; confirmatus fuerit, abstineat. Absolutis mensibus, die vno aut altero, si congregiantur, tunc tantum conceptum fieri posse, alio minimè, existimatur. Alij citius hoc fieri, si illud dum menses adhuc fluunt, fiat,

autumant. Quod nos omni tempore, cum vterus calet, vt supra demonstratum, fieri posse credimus. Sunt qui varios congregiendi modos ad conceptionem facientes, turpiter docent, & quod scelus est, depingunt.

Si vir ante concubitum glandem Zibetæ inungat, cum odore illius vterus delectetur, citius eum semen excipere, plerique docent.

Odorem Zibetæ, Ambrae, Moschi in pomis, chirothecis, puluinis, noctu praesertim, mulieres ad conceptum aptiores reddere, scribunt.

Vt masculus potius quā femina generetur: Alij si vir & mulier victus ratione calidior & sicciore vtantur, fieri posse autumant, hisce rationibus, quod quia mares calidiores foeminis esse censentur, à calidioribus naturis procreentur, adducti. Alij verò si vir ante congressum matricē leporis, mulier verò testiculos illius exiccata & puluerizata cum vino bibant, id fieri posse, docent. Vel si vir adipe anseris cum terebinthina virgam inungat, tertioque die coeat. Alij qui ex semine testiculi dextri mares, ex sinistri foeminas generari putant, ligaturā huius illiusve testis in coitu, vt mas vel foemina procreetur, effici posse, Aristotelem secuti, qui in pecoribus hoc facere iubet, scribunt: quod falsum esse non solum in castratis, vno teste vtrisque generis sobolem tamen generantibus, vt superius demonstratum est, cernere est; sed & ratio docet, quod nisi vinculum adeo arctè stringatur, vt vasa seminaria intercepta, penitus, feminis transiitum impedire minimè possit, illud verò si tentetur, cum sine summo dolore fieri non possit, vir tunc ad actum Venereum excedendum, ineptus redditur.

Alij qui mares, si dextrā, foeminas, si sinistrā vteri sede semen excipiat, formari censent, marem generari, si foemina à concubitu semper in dextrum latus recubuerit, volunt. Superstitiosè quidam, vt hoc fiat,

fasciā pueri albā pede dextrum, nigrā sinistrum, ligare iubent.

# I N D E X.

**A**ffectuum omnium, qui in hoc opere tractantur, & in margine plerumque adnotati reperiuntur, tam Symptomatum in generibus propositorum, quam Morborum in causis descriptorum. Quibus, ubi cuiusque cura (quo nomine omnem actionem Medici, quæ prædicendo operandoque perficitur, intelligimus) inueniatur, numero indice, singulis addito, significatur.



- A** Bstemij 481. vide, cura  
Fastidium certorum ciborum. 226  
Agonia, Atechnia: vide Sterilitas.  
Albugo oculi, causa Visus defectus 192. cura 226  
Alii constipatio 422. causa 423. cura 425. cura 426  
Amanrosis: vide, Visus defectus.  
Amblyopia: vide, Visus defectus.  
Amor; Hereos: vide, Animi commotio.  
Aneurisma in cordis palpitatio-  
ne: vide, Cordis palpitatio.  
Anhelatio 388. 415  
Anhelosi, Suspiriosi: vide, Asthma.  
Animi commotio 82. causa 93. cura 110  
Animi deliquium: vide, Virium lapsus.  
Animi affectus, causa Suspiriorum 390. cura 397  
Anorexia: vide, Appetentia de-  
iecta.  
Aphonia: vide, Vocis defectus 351  
Apolipsis: vide Aphonia.  
Apoplexia 113. causa 20. 22. 27. cura 30. 51. 53. 57  
Apositia 482. causa 483. cura 485  
Appetitus defectus 480. causa 483. cura 485  
Appetitus deprauatus 491. cau-  
sa 494. cura 497  
Appetentia deiecta seu imminuta 482. causa 483. 484. cura 485  
Appetentia nimia ciborum 491. causa 493. 494. 496. 497. cura  
Appetentia canina: vide, Bouli-  
mos.  
Appetentia vitiosa 492. causa 497. cura  
Apprehensio, causa Fastidij cer-  
torum ciborum 482. cura 485  
Aquei humoris tenacitas, causa  
Suffusionis 190. cura 236  
Arteriarum repletio à sanguine  
arterioso, copioso & feruido,  
causa Cordis palpitatio 472. cura 474  
Aspera arteria amputata, causa  
Strangulationis 376. cura ibid.  
Aspera arteria constrictio, causa  
Suffocationis 360. cura 377  
Aspera arteria irritatio ab illa-  
psis, causa Tussis 392. cura 393  
Aspera arteria irritatio à deslu-  
xione, causa Tussis 393. cura 402  
Asthma 349. causa 360. cu-  
ra 377  
Asthmatis species diuersa à com-  
muni 352. causa ibid. cura 362  
Auditus lesio 239. causa 240. cura 250  
Auditus defectus in Surditate 239.  
in Auditu graui ibid. causa 239. 241. 242. 244. 247. 249. 250. cura 252. 258. 259  
Auditio grauis, Barycoia; vide  
Auditus defectus.  
Auditio praua, Obauditio 239. causa 240. 241. 242. 244. 250. 252. 253  
Auditory nervi refrigeratio, causa  
Auditus defectus 249. cura 259  
Auditory nervi stupor, causa Au-  
ditus defectus 249. cura 259  
Auditus organi repletio, ab humo-  
re, causa Auditus defectus 247. cura 258  
Auditus organi cōformationis vi-  
tium, lesio, causa Auditus defe-  
ctus 247. cura 258  
Auditus organi affectus à Spiritu,  
vapore, statu, causa Auditionis  
prauæ 245. cura 252  
Auditus organi offensio, à sono,  
causa Auditus defectus & de-  
prauationis 242. cura 250  
Auris obstructio ab excrementis,  
tumore, causa Auditus defectus  
& deprauationis 242. cura 252  
**B** Alburies 351. causa 358. 359. cura 375. 376  
Balburies cum stridore 389. causa 396  
Boulimos: vide, Appetentia ni-  
mia.  
**C** Aecitas: vide, Visus defectus.  
Caligo 170. causa 192. cura 226  
Callus, Cicatrix, causa Mensum  
& Hamorrhoidum suppressorū  
509. cura 510. 524  
Caloris natiui extinctio, causa  
Virium imbecillitatis 461. cura 463  
Cardiaca: vide, Ventrículi orificij  
dolor.  
Caros 12. causa 20. 22. cura 39. 51  
Carrilaginū osium articulos in-  
crustantium exiccatio & exa-  
speratio, causa Immobilitatis  
302. cura: vide Ligamentorum  
exiccatio.

# I N D E X.

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Castratio, causa impotentia in eunuchis</i> 538                                                                                           | <i>nis &amp; Dyspnoea in Apoplexia &amp; Epilepsia</i> 351. cura 362                                  | <i>bribus affectus, causa Lethargi &amp; Cari</i> 25. cura in Lethargo 54                                                             |
| <i>Catalepsis</i> 18. causa 28. cura 57                                                                                                      | <i>Cerebri affectus, causa Olfactus defectus</i> 260. cura 262                                        | <i>Cerebri spiritus animalis defectus causa Tremoris</i> 341. cura 344                                                                |
| <i>Catalepticos species, Aphonia</i> 351                                                                                                     | <i>Cerebri imbecillitas, causa Mentis imbecillitatis</i> 2. cura 4                                    | <i>Cerebri spiritum absumptio, causa Apoplexia</i> 27. cura 57                                                                        |
| <i>Catoche: vide, Cataplexis.</i>                                                                                                            | <i>Cerebri imbecillitas, causa Visus defectus</i> 175. cura 201                                       | <i>Cerebri spirituum agitatio, causa Animi commotionis</i> 93                                                                         |
| <i>Cerebri calida intemperies, causa Insomniorum</i> 148. cura 151                                                                           | <i>Cerebri vitium organicum, causa Mentis imbecillitatis</i> 3. cura 4                                | <i>Cerebri spirituum agitatio, causa Vertiginis</i> 176. cura 202                                                                     |
| <i>Cerebri calida intemperies, causa Vigiliarum</i> 148. cura 150                                                                            | <i>Cerebri prava conformatio, causa Stultitiae</i> 103. cura 142                                      | <i>Cerebri spiritum agitatio &amp; perturbatio, causa Inquietudinis</i> 338. cura 343                                                 |
| <i>Cerebri calida intemperies, causa Visus hallucinationis</i> 174. cura 201                                                                 | <i>Cerebri tumor, causa Soporis cum Stupore</i> 24. cura 53                                           | <i>Cerebri spirituum commotio, causa Vigiliarum</i> 146. cura 149                                                                     |
| <i>Cerebri frigida intemperies, causa Soporis</i> 19. cura 38                                                                                | <i>Cerebri inflamatio, causa Phrenitidis</i> 103. cura 135                                            | <i>Cerebri spirituum perturbatio, causa Melancholiae hypochondriacae</i> 97. cura 113                                                 |
| <i>Cerebri frigida intemperies, causa Visus defectus</i> 173. cura 202                                                                       | <i>Cerebri lesio, causa Soporis &amp; Apoplexia</i> 24. cura 53                                       | <i>Cerebri spiritum perturbatio, causa Insomniorum</i> 148. cura 150                                                                  |
| <i>Cerebri frigiditas, calor, imbecillitas, repletio, ab humore, vapore, lesio, causa Auditus defectus &amp; depravationis</i> 240. cura 250 | <i>Cerebri putredo, causa Mania</i> 103. cura 143                                                     | <i>Cerebri spirituum perturbatio, causa Insomniorum</i> 148. cura 150                                                                 |
| <i>Cerebri humida intemperies, causa Memoria imminuta</i> 3. cura 4                                                                          | <i>Cerebri vermes, causa Mania</i> 104. cura 143                                                      | <i>Cerebri spirituum perturbatio, causa Visus hallucinationis</i> 176. cura 202                                                       |
| <i>Cerebri humida intemperies, causa Somni immodici</i> 19. cura 38                                                                          | <i>Cerebri macula, causa Mania</i> 103. cura 143                                                      | <i>Cerebri spirituum in nervos profusio, causa Epilepsia, Convulsionis, Catalepsis, &amp; Stuporum diuersorum generum</i> 28. cura 57 |
| <i>Cerebri sicca intemperies, causa Memoria imminuta</i> 3. cura 10                                                                          | <i>Cerebri à sanguine affectus, causa Cari &amp; Apoplexia</i> 22. cura 51                            | <i>Cerebri arteriarum, &amp; vasis venosi induratio, causa Vertiginis</i> 179. cura 202                                               |
| <i>Cerebri à pituita affectus, causa Cari &amp; Apoplexia</i> 20. cura 39                                                                    | <i>Cerebri à pituita, seu aqueo humore fluctuante affectus, causa Vertiginis</i> 183. cura 208        | <i>ChrySTALLINI humoris deflexus à sua sede, causa Visionis, quæ res non nisi propinquas vel distitas cernunt</i> 188. cura 218       |
| <i>Cerebri à qualitate maligna affectus, causa Mania</i> 92. cura 106                                                                        | <i>Cerebri ab humore melancholico affectus, causa Melancholiae &amp; Mania</i> 99. cura 119           | <i>ChrySTALLINI humoris peruersio, causa Visus hallucinationis &amp; Strabismi</i> 187. cura 218                                      |
| <i>Cerebri à qualitate venenata affectus, causa Soporis &amp; Stuporis</i> 27. cura 56                                                       | <i>Cerebri à vapore copioso aggrauatio, causa Somni profundi</i> 25. cura 54                          | <i>ChrySTALLINI humoris discoloratio, causa Visus hallucinationis &amp; Glaucomatis</i> 190. cura 219                                 |
| <i>Cerebri à vi narcotica affectus, causa Soporis &amp; Stuporis</i> 26. cura 55                                                             | <i>Cerebri à vapore halituofo irrigatio, causa Somni immodici</i> 25. cura 53                         | <i>ChrySTALLINI humoris obscuritas, causa Nyctalopia</i> 190. cura 219                                                                |
| <i>Cerebri à vi temulenta dementia, causa Temulentiae</i> 90. cura 104                                                                       | <i>Cerebri à vaporibus affectus, causa Vertiginis, Hallucinationis &amp; Scotomatis</i> 178. cura 202 | <i>ChrySTALLINI humoris, seu vitrei induratio, causa Visus defectus</i> 190. cura 219                                                 |
| <i>Cerebri intemperatura, causa Mentis imbecillitatis</i> 4. cura ibid.                                                                      | <i>Cerebri à vaporibus incalescentia, causa Paraphrenitidis</i> 103. cura 135                         | <i>Ciborum parcius usus, causa Menstruorum suppressorum</i> 506. cura 510                                                             |
| <i>Cerebri intemperatura, causa Stultitiae</i> 103. cura 142                                                                                 | <i>Cerebri à vaporibus petiti in febribus</i>                                                         |                                                                                                                                       |



- Cicatrix oculi, causa Visus defectus* 192. cura 226
- Colli angustia, causa Vomitionis difficilis* 418. cura 421
- Columella defectus, causa Loquela defectus* 359. cura 376
- Conceptus defectus* 553. causa 554. cura 559
- Congelatio: vide Catalepsis.*
- Conscientia vitiosa, causa Apperentia nimia* 493. cura 497
- Contractio* 276. 278. causa 293. cura 329
- Contractio, Contracti / Germ.* 279. *Paralysis vel Contractio- nis species, ubi & causa, & cura.*
- Convulsio, Fallend Siechtag: vide, Epilepsia.*
- Convulsio, Geyicht 15. causa* 28. cura 57
- Cordis & arteriarum pulsatio: siue magna siue parua sit* 468. causa 471
- Cordis palpitatio vel tremor* 468. causa 471. 472. 474. cura ibidem
- Cordis affectus, causa Respiratio- nis abolita in Syncope.* 351. cura 362
- Cor impetens maligna qualitas, causa Virium defectum* 462. cura 463
- Cor offendens maligna qualitas, causa Cordis palpitatio* 474. cura ibid.
- Cordis vulnus, causa Virium la- psus & mortis* 462. cura 463
- Cornea discoloratio, causa Visio- nis falsum: colorem represen- tantis* 193. cura 236
- Cornea obscuritas, causa Caligi- nis* 192. cura 226
- Corporis calor, causa Inquietudi- nis* 338. cura 343
- Corporis calor, causa Respiratio- nis cita* 390. cura 396
- Corporis dolor, causa Inquietudi- nis* 338. cura 343
- Corporis motus, vehementis, causa*
- Respirationis cita* 390. cu- ra 396
- Corporis habitum peruadentes v. pores, causa Palpitationis* 340. cura 348
- Corporis plethora & cacothymia, causa Lassitudinis spontanea* 272. cura 273
- Coryza* 393. causa ibid. cura 401
- Cynicus spasmus, spasmis species* 280. causa 289. cura in Spasmo 324
- D**
- Dæmonis fasciatio, causa So- paris demoniaci* 27. cura 57
- Dæmonis fasciatio, causa Obses- sorum* 89. cura 104
- Defatigatio post labores* 270. causa 272. cura 273
- Deiectionis defectus* 422. causa ibid. cura 426
- Delirium: vide, Phrenitis, Para- phrenitis.*
- Dentium defectus, causa Balbu- ties* 359. cura 336
- Dentium stupor, causa Mandendi defectus* 279. cura in Hæmo- dia.
- Desuetudo, causa Fastidij certoru ciborum* 482. cura 485
- Distributionis Chyli tarditas, cau- sa Appetentia imminuta* 483. cura 485
- Distributio chyli nimis cito facta, causa Appetentia nimia* 494. cura 497
- Dyspnœa, Difficilis respiratio* 349. causa 353. 360. 362. cura 364. 375. 376. 377
- Dyspnœa in partium naturalium vitij, præsertim Hydropicis* 358. causa 357. cura 375
- Dysuria: vide, Mictus interruptus vicibus.*
- E**
- Ebrietas: vide Temulentia.*
- Ectasis: vide, Sopor grauius cum insomnia, & Stupor remanente auditu.*
- Eclipsis: vide, Stupor.*
- Emunctio* 389
- Ephialtes: vide Incubus.*
- Epilepsia seu Convulsio* 14. causa 28. cura 57. iterum 336. causa 338. cura 343
- Epistotonos, Contractionis species* 278. vide Contractio.
- Erigendi & flexendi corporis Im- potentia* 278. causas & cu- ram: vide, in Spasmo, Tetano, Gibbo, Musculorum, Ossium, Li- gamentorum, affectibus, motus impotentiam facientibus.
- Eructandi impedimentum, Sode- Germ.* 415. causa 418. cura 422
- Eunuchi* 514. vide, Impoten- tia.
- Expiratio, Sreatus* 389. causa 392. 393. cura 414
- Expiratio copiosa ab Hydrargyri usu* 393. causa ibid.
- Exsufflatio* 388
- F**
- Fames insatiabilis vel immodi- ca: v. de Apperentia nimia.*
- Fastidium ciborum* 480. cau- sa 483. cura 485
- Fastidium ciborum certorum* 481. causa 482. 485
- Faucium angustia occlusa, cau- sa Suffocationis & Dyspnœa* 358. cura 377
- Faucium, asperitasq; arteria ab aëre frigido, vel aqua, refrige- ratio, causa Tussis & Raucedini-* 391
- Faucium irritatio à defluxione, causa Sreatus, Expirationis & Raucedinis* 393. cura 413. 414
- Faucium morbi, causa Raucedini-* 395. cura 413
- Faucium à sanguine oppletio, cau- sa Excretionis illius* 393
- Fortis magnitudo, causa Parui- difficultatis* 442. 443
- Fortis*

- F**œtus situs peruersus, causa Partus difficilis, vel nullius 442. cura 445
- F**œtus imbecillitas, causa Partus defectus 442. cura 445
- F**luctuatio in auribus: vide, Auditio praua.
- F**ormicatio: vide, Stupor.
- F**ractura osium: vide, Osium fractura.
- F**rigidi 538. vide, Impotentia.
- F**uror venereus in masculis: vide, Pruritus venereus.
- F**uror venereus Vterinus in fœminis 545. causa 546. cura 550
- G**
- G**esse: vide, Oculos claudendi impotentia.
- G**ibbus, Contractionis species 278. causam & curam vide in Contractione.
- G**ibbus Luxationis osium species 301. causa ibid. cura 330
- G**laucoma 290. vide, ChrySTALLINI discoloratio & suffusio.
- G**ustus lesio 159. causa ibid. cura 163
- G**ustus defectus 159. causa 160. ibid. cura 163. 165. 166
- G**ustus falsus 159. causa 161. cura 168
- H**
- H**æmodia, Stupor dentium 153. causa 157. cura 158
- H**æmorrhagia defectus 504. causa 505. cura 510
- H**æmorrhagia narium defectus 504. causa 507. cura 526
- H**æmorrhagia partium defectus 505. causa 506. cura 526
- H**æmorrhoidum suppressio 505. causa 506. 508. 509. cura 524
- H**emiplegia, Paralysis vnius lateris 276. vide, Paralysis.
- H**ermaphroditus 535. vide, Impotentia.
- H**orror: vide, Rigor.
- H**ydrophobia 86. causa 89. cura 107
- H**ypochyma: vide, Suffusio.
- H**ypopios: vide, Oculi pus.
- H**yposphasma: vide, Sugillatio.
- H**ysterica mulieres: vide, Vteri suffocatio.
- I**
- I**maginatio, causa Oscitationis 339. cura 348. iterum 391. cura 397
- I**maginatio: vide, Visus hallucinatio, cuius species existit.
- I**mmobilitas generalis seu plurium partium simul 276. vide, Paralysis seu Spasmus, vbi hoc tatum euenit.
- I**mmobilitas particularis seu peculiarium partium 277. veluti dorsi, in brachijs & cruribus 278. maxilla inferioris & oris 280. palpebrarum ib. oculi ibid. quorum causas & curam vide in Paralysis, Spasmo, Contractione musculorum, tendinum, ligamentorum, osium, cartilaginum affectibus, Immobilitatem procurantibus.
- I**mpotentia in masculis, qui Impotentes dicuntur 534. causa ibid. 536. 537. cura 540
- I**ncedendi & apprehendendi Impotentia 278. causas & curam vide in Paralysis, Spasmo vero & flatulento, Contractione musculorum, Osium, Ligamentorum, Cartilaginum, motus impotentiam gignentibus affectibus.
- I**ncantatio, causa Impotentia illius in viris, vnde Ligati appellantur 538. cura 539. 540
- I**ncubus, Pignalion 350. causa 355. cura 364
- I**ngenij tarditas: vide, Mentis imbecillitas.
- I**nsomnia praternaturalia 144. causa 146. ibid. 148. cura 149. 150. 151
- I**nquietudo 335. causa 338. cura 343
- I**schuria: vide, Mictio abolita, v-
- sicâ plenâ.
- I**schuria in Delirio 430. causa ibid. cura 432
- I**ntestinorum exiccatio, causa Alui constipationis 423. cura 426
- I**ntestinorum obstructio à fecib. causa Alui constipationis 432. cura 426
- I**ntestinorum obturatio alia, causa Alui constipationis 425. cura 426
- I**ntestinorum conuolutio, causa Alui constipationis 423. cura 426
- I**ntestinorum sensus ablati, vel obtusus 425
- I**udicij defectus: vide, Mentis imbecillitas.
- L**
- L**abiorum amputatio, dissectio, vlcera, aliæque vitia, causa immobilitatis illius 303. vide, Os claudendi & aperiendi impotentia.
- L**axationis defectus 330. causa 531. cura 532
- L**actis defectus 531. causa ibid. cura 532
- L**anguiditas in masculis, qui Languidi dicuntur 534. causa 535. cura 540
- L**aryngis musculorum affectus, causa Vocis defectus 353. cura 364
- L**aryngis rimula astrictio vel obstructio, causa Vocis defectus 359. cura 379
- L**asitudo spontanea 271. causa 272. cura 273
- L**ethargus sine febre: vide, Caros cum febre; vide, Sopor cum febre.
- L**igamentorum morbi, causa Motus impotentia 301. cura 327. 330. 332
- L**igamentorum exiccatio, durities, tumor, causa Motus impotentia 302. cura 327. 329
- L**igamentorum laxitas, causa Motus impotentia 302. cura 332
- L**igamentorum soluta continuitas, causa Immobilitatis 301. cura

**cura** 329  
**Ligati, Maleficiati: vide, Impotentia.**  
**Ligula sub lingua astricta, causa**  
**Loquela defectus** 359. **cura** 376  
**Lingua diminuta, causa Loquela**  
**defectus** 359. **cura** 376  
**Lingua nimium adaucta, causa**  
**Loquela impedita** 358. **cura** 376  
**Lingua exiccatio, causa Balbuties** 358. **cura** 375  
**Lingua vitium, causa Balbuties cum stridore** 396  
**Lingua imbutio, causa Gustus falsi** 161. **cura** 168  
**Lingua nervorum affectus, causa quod Muti & Surdi sunt** 351. **cura** 362  
**Lingua musculorum affectus, causa Loquela defectus** 353. **cura** 364  
**Lipothymia, Lipopsychia: vide Virium Lapsus.**  
**Loquela defectus** 351. **causa** 353. 359. **cura** 364. 376  
**Loquela defectus, deficiente voce** 351. **vide, Vocis defectus.**  
**Luxatio osium: vide, Osium dislocatio.**

M

**Malacia: vide Pica.**  
**Mamillarum venarum ob-  
 turatio, causa Lactationis defe-  
 ctus** 531. **cura** 532  
**Mania** 85. **causa** 91. **cura** 99. 103. 104  
**Mares vel foeminas procreandi de-  
 fectus** 553. **causa** 555. **cura** 562  
**Matris parturientis imbecillitas,  
 causa Partus defectus** 442. **cura** 445  
**Melancholia** 83. **causa** 99. **cura** 119  
**Melancholia hypochondriaca** 85. **causa** 97. **cura** 113  
**Membrarum & cutis affectus,  
 causa Stuporis** 156. **cura** 157

**Membrum virilis defectus, confor-  
 matio mala, stupor, causa Im-  
 potentia & Languiditatis** 535. **cura** 539  
**Membrum virilis canalus obturatio,  
 angustia aut perforatio, causa**  
**Veneris impedita, vel imperfecta**  
**in Viris** 539. **cura** ibid.  
**Membrum virilis non in recto loco**  
**apertura, causa Conceptus defe-  
 ctus** 558. **cura** 559  
**Membrorum ex labore nimius mo-  
 tus, causa Defatigationis** 272. **cura** 273  
**Membrorum ex otio torpor, causa**  
**Pigrities** 271. **cura** 273  
**Membrorum imbecillitas, causa**  
**Motus debilitatis** 371. **cura** 273  
**Membrorum lassitudo, causa Pan-  
 dulationis & Oscitationis** 339. **cura** 348  
**Memoria imminuta: vide Mentis**  
**imbecillitas.**  
**Menstruorum suppressio** 504. **causa** 506. 507. 508. 509. **cura** 510  
**Mentis imbecillitas 1. causa** 3. **cura** 4. 10  
**Mentis hebetudo: vide, Mentis im-  
 becillitas.**  
**Mentis consternatio 11. causa** 18. **cura** 38  
**Mentis defatigatio 143. causa** 146. **cura** 149  
**Mentis alienatio 80. causa** 89. **cura** 104  
**Mictionis defectus** 428. **causa** 429. **cura** 432  
**Mictio abolita, vesica plena, Ischu-  
 ria** 428. **causa** 430. 431. **cura** 432  
**Mictio abolita, vesica inani** 428. **causa** 430. **cura** 432  
**Mictio interrupti vicibus, Dysu-  
 ria** 428. **causa** 430. **cura** 432  
**Mictio pauca & rara** 428. **cau-  
 sa** 429. **cura** 432  
**Mictio stillatim facta, Strangu-**

**ria** 428. **causa** 430. 431. **cura** 432  
**Morbus caducus, Comitialis, Sac-  
 cer, Lunaticus, Herculeus: vide,**  
**Epilepsia.**  
**Mordendi & mandendi impoten-  
 tia** 279. **causas & curam: vi-**  
**de in Paralyti, Trismo, Osium,**  
**Musculorum, Ligamentorum**  
**affectionibus, motus impotentiam**  
**causantibus.**  
**Morsus canis rabidi, causa Hydro-**  
**phobia** 92. **cura** 107.  
**Motus debilitas** 270. **causa** 271. **cura** 272  
**Motus impotentia** 275. **causa** 282. **cura** 303  
**Motus depravatus** 335. **causa** 337. 338. **cura** 343  
**Musculorum, illorumve tendinum**  
**exiccatio, causa Contractionis**  
**293. cura** 329  
**Musculorum, illorumve tendinum**  
**tumor, causa Paralysis** 295. **cura** 329  
**Musculorum, illorumve tendinum**  
**morbi, causa Paralyseos, Spasmi**  
**flatulenti: aliarumq; Immo-**  
**bitatis specierum** 290. **cura: vide in illis speciebus.**  
**Musculorum, illorumve tendinum**  
**immia attractio: & causa Spasmi**  
**flatulenti** 296. **cura** 325. 335  
**Musculorum organicum vitium;  
 causa Motus impotentia** 296. **cura** 335  
**Musculorum refrigeratio, causa**  
**Motus impotentia** 295. **cura** 324  
**Musculorum spacia flatibus op-  
 pleta, causa Spasmi flatulenti**  
**292. cura** 325  
**Musculorum distentio ab hali-  
 tuosis vaporibus, causa Pandi-**  
**culationis** 339. **cura** 348  
**Muti** 351. **vide, Loquela defectus.**  
**Muti & surdi simul** 351. **cau-  
 sa** 351. **cura** 352  
**Myopia: vide, Visus res non nisi pro-**

pinquas discernens.  
Myrriasis : vide, Pupilla dilata-  
tio.

N

**N**arium obturatio, causa Olfac-  
tus defectus 259. cura 262  
Narium circa ossa cribrosa ob-  
structio, causa Olfactus defectus  
260. cura 262  
Narium irritatio ab acribus, cau-  
sa Sternutationis 392. cura 400  
Narium pruritus à sanguine, cau-  
sa Sternutationis 393. cura 400  
Narium vellicatio ab odore, causa  
Sternutationis 391. cura 400  
Narium vellicatio à defluxione,  
causa Sternutationis 393.  
cura 400  
Natura ex consuetudine mutata,  
causa Vigilium 146.  
cura 149. 150.  
Natura ex consuetudine mutata,  
causa Insomniorum 146.  
cura 149. 150.  
Nausea: vide, Fastidium ciborum.  
Nervorum morbi, causa Paraly-  
sis 285. cura 324. 329.  
335  
Nervorum à pituita affectus, cau-  
sa Paralyxis 285. cura 304.  
Nervorum frigida intemperies,  
causa Paralyxis 288.  
cura 324.  
Nervorum siccitas, causa Paraly-  
sis 288. cura 326.  
Nervorum cōformationis vitium,  
causa Paralyxis 288.  
cura 325.  
Nervorum tumor, causa Paraly-  
sis 287. cura 329.  
Nervorum latio, causa Paralyxis  
289. cura 329.  
Nervorum compressio, causa Pa-  
ralysis 288. cura 329.  
Nervorum ab alijs humoribus  
quàm pituita affectus, causa Pa-  
ralysis speciei, colicos dolores se-  
qui solita 287. cura 324.  
Nervorum affectus, causa Trans-

glutiendi difficultatis qua Pa-  
ralysis vel Spasmi est species 416  
417. cura 418.  
Nervorum irritatio, causa Spas-  
mi seu convulsionis particularis,  
illiusq. diuersarum. specierum  
289. 290. cura 304. 324.  
Iterum 338. cura 343  
Nervorum latio, causa Tremoris  
341. cura 344  
Nervorum principij irrigatio, re-  
frigeratio, compressio, causa Vi-  
sus defectus 173. cura 202  
Nervi optici contorsio, causa Visus  
defectus 175. cura 201  
Nervi optici soluta continuitas,  
causa Visus defectus 175.  
cura 201  
Nervi optici siccitas, causa Visus  
defectus 174. cura 202  
Nervi optici refrigeratio, causa  
Visus defectus 173. cura 202  
Nervi retiformis affectus, ob spiri-  
tus animalis priuationem, causa  
Visus defectus 185. cura 216  
Nervi retiformis affectus, ob obie-  
cti priuationem, causa Visus de-  
fectus 185. cura 217  
Nervorum sexta & septima con-  
iugationis affectus, causa Dys-  
pnœa in Paralyxi 352. cura 362  
Nervorum recurritum affectus,  
causa Loquela & vocis defectus  
352. cura 362  
Nervorum tam motoriorum, quàm  
sensoriorum affectus, causa For-  
micationis 155. cura 158  
Nervorum tam motoriorum, quàm  
sensoriorum affectus, causa sen-  
sus falsi caloris & frigoris 155.  
cura 158  
Nervorum motoriorum affectus,  
causa Stuporis 153. cura 157  
Nervorum sensoriorum affectus,  
causa Stuporis 154. cura 157  
Nictatio 337  
Nubecula 171. causa, cura: vi-  
de Visus hallucinatio.  
Nutrienti penuria, causa Famis

immodica 171. cura 407  
Nyctalopia 171. causa 190. cura 219.

O

**O**blivio: vide Memoria im-  
minuta.  
Obsessio à demone 86. causa 89.  
cura 104.  
Obstructio in visceribus & extra  
hæc, causa Mensum & Hamor-  
rhoidum suppressorum 508.  
cura 510. 523.  
Obstructio in vasis partium per  
quas sanguis fluit, causa Men-  
sium, Hamorrhoidum & Pur-  
gationis post partum defectus  
509. cura 510. 523. 522.  
Oculi oclusio, causa Visus defe-  
ctus 191.  
Oculi humorum absumptio, cau-  
sa Visus defectus 186. cura 217.  
Oculi humorum effluxus, causa  
Visus defectus 185. cura 217  
Oculi humorum prolapsus, causa  
Visus defectus 190. cura 217  
Oculi pus, causa Visus hallucina-  
tionis & defectus 195. cura 237  
Oculi peruersio, causa Strabismi  
191. cura 218  
Oculi musculorum contractio, cau-  
sa Strabismi 303. cura in  
Contractione.  
Oculos aperiendi & claudendi im-  
potentia 280. causas & curam:  
vide in Paralyxi, Spasmo & Pat-  
pebrarum affectibus, motus im-  
potentiam gignentibus.  
Oculi post somnum aperiendi dif-  
ficultas, Spasmi lenioris species  
281.  
Oculos volutandi impotentia ib.  
causas & curam vide in Apople-  
xia, Epilepsia, ubi hoc euenit.  
Oculorum tumor, vulnus, causa il-  
lius Immobilitatis 303. vide O-  
culos claudendi & aperiendi Im-  
potentia.  
Oculorum offensa à splendore, causa  
Sternutationis 391. cura 400  
Oesophagi cōpressio, causa Trans-  
glutiendi



# I N D E X.

- glutendi difficultatis 417.  
cura 421
- Desophagi exiccatio, causa Transglutendi difficultatis 417.  
cura 419. 420
- Desophagi obstructio à deglutitis illicherentibus, causa Transglutendi difficultatis 417. cura 419
- Desophagi obstructio à tumore, causa Transglutendi difficultatis 417. cura 421
- Desophagi obstructio, causa Vomitionis impedita 417. cura 421
- Desophagi vel stomachi angustia, causa Vomitionis impedita 417. cura 421
- Olfactus laesio 259. causa 260. cura 262
- Olfactus defectus 259. causa 260. 261. 262. 263.
- Olfactus deprauatus 259
- Olfactus foraminulorum oclusio, causa Olfactus defectus 261. cura 263
- Olfactus organum, humore tenui affectum, causa Olfactus defectus 262. cura 263
- Opistotonos, Contractionis species 263. vide; Contractio.
- Orthopneumatici, qui recta ceruice respirare coguntur 349. causas, curam: vide in Suffocatione & Dyspnoea.
- Os aperiendi & claudendi impotentia 280. causas & curam vide in Paralyfi, Spasmo & Labiorum affectibus motus impotentiam gignentibus.
- Oris tortura ibid. Paralyfis & Spasmi species: ubi & causa & cura.
- Oris distorsio seu leuis Spasmus: in plorantibus & ridentibus 280. causa 290
- Oris & narium obturatio, causa Suffocationis 338. cura 377
- Oris irritatio, causa Expuitionis 392. cura 414
- Os succingentis tunica limus, causa Gustus defectus 160. cura 166
- Os succingentis tunica siccitas, causa Gustus defectus 159. cura 163
- Os succingentis tunica siccitas & nigredo, causa Gustus defectus 160. cura 165
- Oscitatio 387. causa 291. cura 397. iterum 337. causa 339. cura 348
- Osium articularum dislocatio, causa Immobilitatis 298. cura 332
- Osium fractura vel alia laesio, causa Motus impotentia 297. cura 330
- Osium morbi, causa Impotentia 297. P
- P**Alpebrarum tumor, vulnus, causa Immobilitatis 303. vide
- Oculos claudendi & aperiendi impotentia.
- Palpitatio tonnuissima, Suppless Germ. 290. causa ibid. cura in Spasmo 336. causa 340. cura 343
- Pandiculatio 337. causa 338. 339. cura 348
- Panniculus oculi, causa Visus defectus & hallucinationis 185. cura 234
- Papillarum defectus vel coalitus, aut laesio, causa Suctionis impedita 531. 532. cura ibid.
- Paralyfis, Resolutio 276. causa ib. 285. 287. 288. 289. 290. 295. cura 303. 324. 326. 329. 335
- Paralyfis cum sensu fornicationis 276. causa 288. cura: vide Paralyfis.
- Paralyfis species colicos dolores sequi solita 276. causa 287. cura 324
- Paraphrenitis 88. causa 103. cura 135
- Paraplegia, Paralyfis vtriusq; lateris 276. vide Paralyfis.
- Partium imbecillitas particularis 457. causa 562. cura 563
- Partium corruptio, causa Partium imbecillitatis 462
- Partium sensibiliu irritatio, causa Rigoris & Pandiculationis 338. cura 346
- Partus defectus 439. causa 441. cura 445
- Partus difficilis naturalis 439
- Partus difficilis praeternaturalis ibid. causa 442. 443. cura 445
- Partus omnino impeditus vel nullus 440. causa 442. cura 445
- Peccatum, causa Partus difficilis naturalis 441
- Phrenitis 88. causa 103. cura 135
- Pica: vide, Appetentia vitiosa.
- Pigritia, Segnities, Tarditas, Ignavia ad aliquid agendum 269. causa 271. cura 273
- Pinguedo an Partus difficultatis 445
- Praeternaturalis causa Insomniorum 146. cura 149
- Priapismus 547. causa 549. cura 550
- Priapismus vteri: vide, Furor vetricinus.
- Pruritus venereus 547. causa 548. 549. cura 550
- Pudendi mulieris rima angustia, causa Partus difficultatis 444. cura 445
- Puerilis morbus, Kindlin wehe: vide, Epilepsia.
- Pulmonum connexus cum thorace, causa Dyspnoea 360. cura 377
- Pulmonum obstructio, causa Asthmatis 360. cura 378
- Pulmonum pituita ex congestione, causa Tussis 393. cura 402
- Pulmonum pus, causa Tussis 394. cura 402
- Pulmonum sanies, causa Tussis 349. cura 402
- Pulmonum sanguis, tam ex destluxus, quam inde suscitatus, causa Tussis 394. cura 402
- Pulmonum topi, causa Tussis 393. cura 402
- Pulsatio in auribus: vide, Auditio praua.

**Pulsus inordinatus & inequalis**

469

**Pupilla obstructio ab oculi humoribus, causa** Visus defectus 195

**Pupilla angustia, causa** Nyctalopia 199. cura 220

**Pupilla dilatatio, causa** Vespertina aciei 199. cura 220

**Pupilla peruersio, causa** Strabismi 191. cura 218

**Pupilla peruersio, causa** Visionis per nasum 192. cura 218

**Purgationis post partum defectus** 505. causa 509. cura 522

R

**R** Aucedo 389. causa 391. 393. 396. cura 413

**Rigor, Motus deprauati genus** 337 causa 338. cura 346.

**Rigor, Spasmi species** 277. vide Tetanum.

**Risus Sardonius** 290. causa ib. cura in spasmo.

**Renum vel vtrorum cōsumptio, obstructio, exiccatio, causa** Mictionis suppressa vesica inani 430. cura 432

**Respirationis defectus** 348. causa 351. cura 363

**Respiratio abolita in Syncope** 348 causa 351. cura 362

**Respiratio cita** 387. causa 390. cura 396

**Respiratio deprauata** 386. causa 389. cura 396

**Respirationis organi lassitudo, & a vaporibus aggrauatio, causa**

Oscitationis 391. cura 397

**Rudus** 388. causa 396. cura 414

S

**S** Alacritas 547. causa 548. cura 550

**Sanguinis crassities, causa** Mensium suppressorum 507. cura 510

**Sanguinis cruditas & impuritas, causa** Mensium suppressorum 507. cura 510

**Sanguinis per alias vias effusio,**

**causa** Mensium & Hamorrhoidum suppressorum 506. cura 510. 523

**Sanguinis penuria, impuritas, crassities, causa** Lactationis defectus 531. cura 532

**Sanguinis spirituosus in colem adfluxus, causa** Priapismi 549. cura 550

**Satyrasis: vide** Priapismus.

**Scotoma. Obtenebratio** 170. causa 178. 179. cura 203

**Scorodinos** 169. causa, cura: vide Vertigo.

**Scirrhus, causa** Mensium & Hamorrhoidum suppressorum 509. cura 510. 523

**Seminis acrimonia causa** Furoris venerei vterini in foeminis 548. cura 550

**Seminis commotio, causa** Pruritui venerei 549. cura 550

**Seminis copia, caliditas, causa** Pruritus venerei 550. cura 548

**Seminis mulieris defectus, cruditas, impuritas, causa** Sterilitatis a foemina profecta 555. cura 559

**Seminis virilis, paucitas, cruditas, vitium, causa** Sterilitatis a viro dependentis 554. cura 559

**Semen viri & mulieris in causa, quod** Mares vel Foemina generentur 555. cura 568

**Sensus falsus caloris & frigoris, foris intusq.** 152. 153. causa 155. cura 158

**Septi quatenus musculus, affectus, causa** Dyspnœe 353. cura 364

**Septi per consensum affectus, causa** Dyspnœe 353. cura 364

**Septum flatibus in abdomine collectis distentum, causa** Dyspnœe 357. cura 375

**Septum humore, abdomen replete, distentum, causa** Dyspnœe 355. cura 357

**Septum visceribus ventris impeditum, causa** Dyspnœe 357.

**cura** 375

**Septi nerui defluxione molestati, causa** Asthmatis occulti 352. cura 362

**Septum vaporibus a venis mescraicis ascendentibus affectum, causa** Incubi 355. cura 364

**Septum vaporibus ab vteri venis venientibus affectum, causa** Suffocationis vteri 355. cura 369

**Septi irritatio, causa** Singultus 394. cura 397

**Septi & subiectarum partium morbi aliqui, causa** singultus 396. cura ibid.

**Septi paucitas, causa** Mictionis pauca & rara 429. cura 432

**Serum aliud raptum, causa** Mictionis pauca & rara 429. cura 432

**Seri crassities, causa** Mictionis pauca & rare 430. cura 432

**Seri transitus impeditus, causa** Mictionis pauca & rara 429. cura 432

**Serum quia ad habitum corporis non allucitur, causa** Sudoris defectus 527. cura 528

**Serum deficiens, aliud raptum, impeditum, crassum, causa** Sudoris defectus 527. cura 528

**Sibilus aurium: vide** Auditio praua.

**Singultus** 387. causa 394. 395. 396. cura 397

**Sitis defectus: vide** Adpositia.

**Sitis immodica, praternaturalis vel vehemens** 492. causa 495. 497. cura ibid.

**Somnus immodicus ii. causa** 19. 20. cura 38. 53

**Somnus profundus** 12. causa 25. 26. cura 54. 55. 56

**Sopor grauis, Veterinus Subeth: vide** Caros.

**Sopor cum stupore** 13. causa 24. cura 53

**Sopor grauis cum insomnijs horrendis: vide** Sopor cum delirio.

**Sopor cum delirio, Cataphora seu**

**Coma**

Coma agripnion 13. causam  
& curam vide in Lethargo.  
Sopor demoniacus 13. causa 27.  
cura 57  
Spasmus seu Convulsio particula-  
ris 276. 277. causa 289.  
cura 304. 324  
Spasmus ad stomachum chirur-  
gorum 290. ibid. cura in  
spasmo.  
Spasmus mirus hinc inde per mem-  
bra discurrens 277. causam &  
curam: vide in Spasmo.  
Spasmus flatulentus, Krampf  
Germ. 276. 277. causa 292.  
296. cura 325. 335  
Sterilitas 553. causa 554. 555.  
556. 557. 558. cura 559.  
Sternutatio 387. causa 391.  
392. 393. 395. cura 400  
Strabismus 187. causa 187. 191.  
cura 218  
Strabismus, Contractionis species  
281. causa 304. cura in  
Contractione.  
Streptus in auribus: vide Auditio  
prava.  
Stultitia, Moria, Fatuitas, Infan-  
tia 80. causa 103. cura 142  
Stupor, Narce 151. causa 154. 156.  
cura 157. 158  
Stupor, Obstupefcentia 13. causa  
19. 20. cura 38. 56  
Stupor cum resolutione: vide, A-  
poplexia.  
Stupor cum convulsione: vide, E-  
pilepsia.  
Stupor cum rigiditate: vide, Ca-  
talapsis.  
Stupor remanere auditu, vel mo-  
tu 18. causa 29. cura 57  
Suctio impedita 531. causa 532.  
cura ibid.  
Sudoris defectus 527. causa ib.  
cura 528  
Sudoris consueti suppressio 527.  
causa 527. cura 528  
Sudoris ad sanitatem necessarij  
defectus 527. causa ibid.

cura 528  
Sudoris in morbis necessarij defe-  
ctus 527. causa ibid. cura 528  
Sugillatio in oculo, causa visus  
hallucinationis & defectus 195.  
cura 236  
Suffocatio & Strangulatio ab ex-  
ternis 349. causa 358. 360.  
cura 376. 377  
Suffocatio à fungorum esu 757.  
cura 375  
Suffocatio seu Strangulatio aut  
Praefocatio vteri 350. causa 355.  
cura 369  
Suffocatio & Dyspnœa in Angina  
349. causa 358. 559. cura  
377  
Suffocatio & Dyspnœa in Apople-  
xia, Paralyti, Spasmo 349.  
causa 351. 352. cura 362  
Suffocans catarrhus 349. causa  
& cura in Asthmate.  
Suffusio causa Visus hallucinatio-  
nis & defectus 196. cura 226  
Surditas, Cophosis: vide, Auditus  
defectus.  
Sardi & Muti simul: vide, Audi-  
tus defectus.  
Sussurium 387. causa 390.  
cura 397  
Syncope: vide, Virium lapsus.

T

Tactus leso 151. causa 153.  
cura 157  
Temulentia 81. causa 90.  
cura 104  
Tendinum exiccatio, tumor, solu-  
ta continuitas, attractio, causa  
Motus impotentia: vide Muscu-  
lorum illorumve tendinum eius-  
modi morbos.  
Tendinum nimia elongatio, causa  
Motus impotentia 295. cura 335.  
Tendines pituita imbuti, causa Pa-  
ralyseos 290. cura 304. 335.  
Tentigo: vide, Priapismus.  
Tetanos, Spasmi species 277.  
vide, Spasmus.  
Tetanos, Contractionis species 278

vide Contractio.  
Thoracis cavitatis repletio, causa  
Dyspnœa 362. cura 376  
Thoracis compressio, causa Dys-  
pnœa 361. cura 377  
Thoracis costa introrsum delata,  
causa Dyspnœa 362. cura 376  
Thoracis cartilaginum induratio,  
causa Dyspnœa 361. cura 375  
Thoracis musculorū affectus, cau-  
sa Dyspnœa 353. cura 364  
Tinnitus aurium: vide, Auditio  
prava.  
Transitus per gulam defectus 415.  
causa 416. cura 418  
Transglutendi difficultas 415.  
causa 416. 417. cura 419.  
421  
Transglutendi difficultas, Para-  
lysis vel Spasmi species 415.  
causa 416. cura 418  
Tremor 336. causa 341.  
cura 344  
Trismus 280. Spasmi vel Con-  
tractionis species, vbi & causa  
& cura.  
Tumor verrucosus, causa Hemor-  
rhoidum suppressorum, cum do-  
lore 509. cura 523  
Tussis 388. causa 391. 392. 393.  
394. 402  
Tussis sicca 395. causa ibid.  
cura 402  
Typhomania: vide, Sopor cum de-  
lirio.

V

Vasorum seminalium affectus,  
vnde semen vel nullum, vel  
non decens generatur, causa Ve-  
neris impedita, vel imperfecta  
in vtroque sexu: vel extincta in  
mulieribus 537. cura 539  
Vasorum seminalium obstructio,  
causa: cneris defectus 539.  
cura ibid.  
Vasorum seminalium refrigera-  
tio, coformatio mala, causa Ve-  
neris defectus in vtroque sexu;  
& in viru speciatim illius, vnde

- Frigidi dicuntur* 538. cura 539  
*Veneri actus defectus* 534. causa 535. cura 539  
*Venena quadam, causa Boulimi, & Sitis intollerabilis* 497. cura ibid.  
*Ventriculi lentor, pinguedo, humor, causa Appetentia deiectione* 483. cura 485  
*Ventriculi calor, causa Appetentia prostrata* 484. cura 485  
*Ventriculi imbecillitas, causa Appetitionis defectus* 484. cura 485  
*Ventriculi stupor, causa Appetitus defectus* 484. cura 485  
*Ventriculi offensio, causa Fastidij ciborum* 483. cura 485  
*Ventriculi certa constitutio, causa fastidij certorum ciborum* 483. cura 485  
*Ventriculi sensus exquisitus, causa Appetentia nimia* 493. cura 497  
*Ventriculi qualitas occulta, causa Boulimi & Appetentia canina* 496. & *Pica* 497. cura ibid.  
*Ventriculi siccitas, causa sitis præternaturalis* 495. cura 497  
*Ventriculi humectatio, causa Apopsitie* 476. cura 485  
*Ventriculi madoris defectus, causa Sitis vehementis* 495. cura 497  
*Ventriculi morbi aliqui, causa singultus* 396. cura 397  
*Ventriculi irritatio, causa Singultus* 395. cura 397  
*Ventriculi cardialgia, causa Sternutationis* 395. cura 400  
*Ventriculi & intestinorum irritatio, causa Tussis sicca & sternutationis* 395. cura 400. 402  
*Ventriculi ebullienti humor, causa Eructationis difficilis quæ Sedt vocant* 418. cura 422  
*Ventriculi flatus, causa Ructus* 396. cura 414  
*Ventriculi tenax humor, causa Vomitionis difficilis* 418. cura 421  
*Ventriculi constitutio ad vomitum inepta* 417. cura 421  
*Ventriculi molestia, causa Vomitionis* 396. cura 414  
*Ventriculi orificij dolor, causa Animi deliquij in Cardiacâ* 460. cura 463  
*Venus imperfecta in masculis* 535. causa 537. 538. cura 539  
*Venus imperfecta in mulieribus* 535. causa 535. 537. cura 539  
*Venus extincta in mulieribus* 535. causa 537. cura 539  
*Vertigo, Dinos* 172. causa 176. 179. 183. cura 202. 203. 208  
*Vertigo cum imaginationibus* 172. causa 179. cura: vide, *Vertigo*.  
*Vermis in profundo narium natus, causa Olfactus defectus* 261  
*Vesica distentio ob urinam diurentem, causa Ischuria* 430. cura 432  
*Vesica vulnus vesicâ inani, causa Mictionis suppressa* 430. cura 432  
*Vesica stupor, causa Mictionis pauca vel rare* 431. cura 432  
*Vesica cervicis contorsio, causa Ischuria* 430. cura 432  
*Vesica cervicis refrigeratio, causa Strangurie* 430. cura 432  
*Vesica cervicis calculus, eam obstruens, causa Ischuria vel Stranguria* 431. cura 432  
*Vesica cervicis excrecentia, causa Ischuria vel Stranguria* 431. cura 432  
*Vesica cervicis compressio, liquando à tumore vicino, causa Ischuria vel Dysuria* 430. cura 432  
*Vesica cervicis obstructio ab humore, causa Ischuria vel Dysuria* 431. cura 432  
*Vespertina acies* 171. causa 199. cura 220  
*Vigilia nimia* 143. causa 146. 147. cura 150. 151  
*Viragines, quibus circa incommodum menses nunquam fluxerunt* 504. causa 506. cura 510  
*Virium imbecillitas generalis, Schwaehheit Germ.* 455. causa 459. 460. cura 463  
*Virium extrema imbecillitas in Agone mortis* 455. causa 461. 462. cura 463  
*Virium lapsus, Syncope* 456. causa 461. cura 463  
*Virus laesio* 169. causa 173. cura 201  
*Virus defectus in Cœcitate* 169. Imbecillitate 170. causa 173. 174. 175. 184. 185. 190. 191. 192. 194. 196. cura 201. 202. 208. 216. 218. 226. 234. 236  
*Virus imbecillitas: vide, Virus defectus.*  
*Virus res distantes rectius quam propinquas discernens* 170. causa 188. cura 218  
*Virus res paulo distantiores non recte discernens* 170. causa 188. cura 218  
*Virus res non nisi oculo propinquas recte dijudicans* 171. causa 189. cura 218  
*Virus hallucinatio* 171. causa 174. 176. 187. 190. 193. 195. cura 201. 203. 226. 236  
*Virus cui falsus color & splendor offertur* 172. causa 182. 190. 193. cura 236  
*Virus non nisi per nasum facta, casus admittendus* 190  
*Vitæ motus defectus* 454. causa 457. cura 463  
*Vitalem spiritum influentem & fixum dissipantes morbi, causa Virium imbecillitatis* 490. cura 463  
*Vitalem spiritum influentem & fixum dissipantes evacuationes, causa Virium defectum* 460. cura 463  
*Vitales spiritus exagitans dolor, causa*



# I N D E X.

|                                             |                                              |                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>causa Virium prostrationū</i> 460.       | <i>consumptio, causa Virium im-</i>          | <i>&amp; siccitas causa Sterilitatis</i> 557  |
| <i>cura</i> 463                             | <i>becillitatis</i> 459. <i>cura</i> 463     | <i>cura</i> 559                               |
| <i>Vitales spiritus exagitantes Ani-</i>    | <i>Vnguis, Vngula, Pterygium, Zebel;</i>     | <i>Vteri substantia quodd sanguinemō</i>      |
| <i>mi affectus, causa Virium imbe-</i>      | <i>vide, Panniculus, oculi.</i>              | <i>irrigerur, causa Sterilitatis</i> 557.     |
| <i>cillitatis &amp; syncope</i> 460.        | <i>Vociferatio</i> 388                       | <i>cura</i> 559                               |
| <i>cura</i> 463                             | <i>Vocis defectus</i> 350. <i>causa</i> 351. | <i>Vteri imbecillitas, causa Sterili-</i>     |
| <i>Vitalium spirituum dissipatio: i-</i>    | <i>cura</i> 362. 377                         | <i>tatis</i> 558. <i>cura</i> 559             |
| <i>psorumq; pabuli a calore, causa</i>      | <i>Vocis defectus in Dyspnœa</i> 350.        | <i>Vteri humida intemperies, causa</i>        |
| <i>Virium imbecillitatis</i> 461.           | <i>vide Dyspnœam.</i>                        | <i>Sterilitatis</i> 558. <i>cura</i> 559      |
| <i>cura</i> 463                             | <i>Vocis defectus in Paralyfi</i> 350.       | <i>Vteri vasorum connexus non dis-</i>        |
| <i>Vitilis spiritus insitipenuria, cau-</i> | <i>causa</i> 352. <i>cura</i> 362            | <i>solutus, causa Partus difficulta-</i>      |
| <i>sa Virium defectuum</i> 457.             | <i>Vocis defectus cum dolore fauciu</i>      | <i>tis</i> 442. <i>cura</i> 445               |
| <i>cura</i> 463                             | <i>351. causa</i> 353. 358. <i>cura</i>      | <i>Vteri orificij interioris angustia,</i>    |
| <i>Vitalium spirituum supercalefa-</i>      | <i>364. 377</i>                              | <i>causa Partus difficultatis</i> 443.        |
| <i>ctio, causa Pulsationis cito &amp;</i>   | <i>Vomendi difficultas</i> 416. <i>cau-</i>  | <i>cura</i> 445                               |
| <i>magna</i> 471. <i>cura</i> 474           | <i>se</i> 117. 118. <i>cura</i> 421          | <i>Vteri ceruicis orificij angustia, cau-</i> |
| <i>Vitalium spirituum nimia agita-</i>      | <i>Vomitio</i> 388. <i>causa</i> 396.        | <i>sa Partus difficultatis</i> 443.           |
| <i>tio causa Pulsationis cito &amp; ma-</i> | <i>cura</i> 414                              | <i>cura</i> 445                               |
| <i>gne cordis &amp; arteriarum</i> 471.     | <i>Vreteris absentia vel conforsio,</i>      | <i>Vteri ceruicis angustia, causa Par-</i>    |
| <i>cura</i> 474                             | <i>causa Mictionis suppressæ, vesti-</i>     | <i>tus difficultatis</i> 444.                 |
| <i>Vitalium spirituum agitatio, cau-</i>    | <i>câ inani</i> 430. <i>cura</i> 432         | <i>cura</i> 445                               |
| <i>sa Cordis palpitatio</i> 471.            | <i>Vteri sinus rimæ vel orificij Coar-</i>   | <i>Vteri conformationis vitium, cau-</i>      |
| <i>cura</i> 474                             | <i>tus, angustia, lesio, causa Veneris</i>   | <i>sa Mensum suppressorum</i> 509.            |
| <i>Viti saltus, Veitstdang</i> 87.          | <i>impedita</i> 536. <i>cura</i> 439         | <i>cura</i> 510                               |
| <i>cura in Mania.</i>                       | <i>Vteri orificij interioris amplitudo,</i>  | <i>Vteri imbecillitas, causa Mensum</i>       |
| <i>Vitrei humoris situs peruersio, cau-</i> | <i>laxatio, oclusio, causa Sterili-</i>      | <i>deficientium</i> 510. <i>cura</i> ibid.    |
| <i>sa Visus hallucinationis</i> 187. 188    | <i>tatis</i> 556. <i>cura</i> 559            | <i>Vteri suffocatio: vide Suffocatio</i>      |
| <i>Viuisici humidi, seu Primogenij</i>      | <i>Vteri substantia soliditas, durities</i>  | <i>vteri.</i>                                 |

## I N D E X Remediorum quorundam.

**R**emedia, quorum innumera, non solum prius vsitata (ex quibus pleraque correctiora proponuntur) sed etiam noua & rara, (inter quæ & chymica) multa hinc inde variis formis præscripta reperiuntur, indici inferere nolimus, cum ea ex affectibus quibus in curatione accommodantur, facile peti, atque illic inueniri possint. Diligentem enim Lectorem, non talem qui obiter saltem hæc mea scripta inspiciat, & neglectis aliis, remedia tantum enucleet, requirimus. Vt tamen vbi remedia quædam expresse, & copiose proponuntur, pateat, hæc pauca huic indici subiungere volumus.

|                                                 |     |                                                         |     |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| <i>Aconitica, auditum iuuantia remedia</i>      | 225 | <i>Sudatoria seu sudorem elicientia remedia</i>         | 529 |
| <i>Aluum soluentia remedia</i>                  | 426 | <i>Visum restaurantia Oxydorcica remedia</i>            | 220 |
| <i>Conceptionem procurantia remedia</i>         | 560 | <i>Vrinam prouocantia &amp; mictionem adiuantia re-</i> |     |
| <i>Lac gignentia vel augentia remedia</i>       | 532 | <i>media</i>                                            | 433 |
| <i>Resoluentia vires, cordialia medicamenta</i> | 464 |                                                         |     |

FELICIS PLATERI  
ARCHIATRI ET  
PROFESS. BASIL.

Praxeos

Seu

DE COGNOSCENDIS, PRÆDICEN-  
dis, præcauendis, curandisq; affectibus  
homini incommodantibus,

TOMVS SECVNDVS

DE  
DOLORIBVS,

Libro vno, qui tertius totius est operis,  
agens:

*Singula ipsorum Symptomata, in generibus: Morbos eorumq; Cau-  
sas, in causis: & Curam in curatione  
proponens.*



BASILEÆ, IMPENSIS LVDOV. REGIS,  
TYPIS IOANNIS SCHROETERI.

MDCXXV.



*Ad Illustrissimum Potentissimumq; S. Rom. Imp.  
Principem,*

**FRIDERICHVM DVCEM  
WIRTEMBERGENSEM ET TECCEN-  
sem, Comitem Montisbeligard. Dominum in Heiden-  
heim, Equitem ordinis Regij Francorum  
& Anglorum,**

*Principem Dominumq; meum clementiss.*

**FELIX PLATERVS ARCHIATROS BASIL.**



*INGVLARI Dei Opt. Max. providentiâ, quâ & hacten-  
us clementissimè conseruatum me, grato animo agnosco,  
factum omnino arbitror, Illustrissime & Potentissime Prin-  
ceps, quod, cum studij, obseruantia fideiq; erga Illustriss. T.  
Cels. testanda causâ, primam medicæ Praxeos partem,  
Illustr. T. Cels. coram offerrem, non solum benignissimè acce-  
ptus, sed & exoptatissimo responso, mirum in modum fue-  
rim exhilaratus. Siquidem Illustr. T. Cels. hoc consilium &  
institutum meum, non tantummodo comprobauit collau-  
dauitq;, sed & patrocinio illius tractatus, animo planè*

*beneuolo suscepto, eorum quæ superessent, defensorem se quoque futuram, idq; ser-  
mone & scripto testata, obtulit, atque ad reliquorum editionem maturandam, pu-  
blicæ utilitatis iuuanda gratiâ, me est cohortata. Cuius Cels. T. clementiæ & summi  
fauoris recordatio, assiduarum mearum meditationum & lucubrationum laborem, mihi  
aliquomodo faciliorem reddidit, animumq; sub cogitationum & negotiorum mole pres-  
sum ac fatiscentem, subleuauit, atque ad ceptam commentationum medicarum telam,  
alacrius pertexendam, accendit.*

*Quod autem Illustr. Cels. T. mihi homini medico, licet immerenti, benignitatis & gra-  
tia indicia adeò luculenta exhibere voluerit, fecit id, præterquam quod naturali qua-  
dam erga omnes literatos animi inclinatione est propensa, etiam celeberrimorum, e-  
mnium atatum Principum virorum exemplo mota, quos medicis plurimum semper tri-*

buisse, eosq; maximo in pretio habuisse, ex historiarum abunde constat monumentis. Hippocrates quippe apud Alexandrum & Perdiccam, reges Macedonia, eum dignitatis obtinuit locum, ut licet amplissimis propositis premiis, à potentissimo Persarum monarcha Artaxerxe, fuisset inuitatus, illis tamen reiectis, maluerit apud popularem suum regem in Gracia subsistere, quàm ad illum commigrare. Vnde factum, ut eius etiam posteri, sequentibus Macedonia regibus essent chari, cum Aristotelis pater ab Amynta rege, eo præcipue nomine, in medicum domesticum fuerit cooptatus, quod ex Hippocratis familia esset oriundus. Quæ res etiam ipsi Aristoteli, apud Alexandrum magnum, Amyntæ ex filio nepotem, præter doctrinam insignem, eam conciliauit gratiam, ut cum eius mandato, à Philosopho præclari illi libri, de animalium historia essent conscribendi, suis sumptibus animantia, venatores, aucupes & piscatores, in eius rei usum aluerit. Quin idem Alexander, tantum tribuit Philippo, uni ex medicis suis, ut licet Parmenionis epistolis suspectus ei fuisset redditus, qui gnarus infirmitatis Alexandri, scripserat à Philippo medico ut caueret, nam corruptum illum à Dario ingenti pecuniâ esse: accepto tamen ab illo poculo, epistolas interim medico tradiderit, atque ita inter bibendum, oculis in vultum legentis intentis, eum ut securum conspexit, latior factus, sanitatem quarto die receperit. Floruerunt & alij medici complures, fauore & gratiâ apud reges diuersos. Apud Antigonom Diocles: apud Antiochum Erasistratus. Iure ciuitatis Romana, C. Iulius Caesar medicos donauit. Sed & in altissimo dignitatis & honoris gradu, Octauius Augustus, Antonium Musam collocauit, quod de illo belli & pacis temporibus, præclare esset meritis. Galenus etiam apud Impp. Verum & Marcum Antoninum, in tanta fuit estimatione, ut huius filij, M. Aurelij Commodi valetudo, illi curanda concrederetur. Verum omisis hisce, quæ olim & apud externos euenerunt, quadam recentioris memoria, propiusq; nos attingentia exempla commemorasse, non abs re fuerit. Wilhelmus Copus Basileensis, ante centum plus minùsve annos, apud Ludouicum XII. & eius successorem ac generum, Franciscum I. Gallie Reges, magno cum utriusque fauore, laudeq; suâ, medici regij officio est functus. Et nostra ætate, Monspessulana Academia florentissima, Professores aliquando eximij, quibus ibidem præceptoribus etiam sum usus, Guilelmus Rondeletius, à Principibus compluribus, Antonius Saporta à Navarra, Honoratus Castellanus à Francia regibus, amplissimis honoribus & premiis fuerunt condecorati. Ioannes quinetiam Fernelius, maximi nominis medicus, cum quo Parisiis memini familiariter me conuersatum, regi Henrico II. & Regina, quæ eius consilio se fecundam, cum prius sterilis esset, factam predicabat, erat summè charus. Quid Andreæ Vesalium Basileæ apud parentem meum, pia memoriæ, mihi puero adhuc, visum, & Carolum Clusum, ante quinquaginta & plures annos Monspessuli mihi familiarem, adhuc superstitem commemorem? quorum ille rei anatomica peritiâ immortalem sibi gloriam acquisiuit, & à Carolo V. Imp. in medicum fuit allectus: hic stirpium cognitione exactissimâ, indefesso studio longiq; peregrinationibus auctâ, rei herbariæ scientiam supra modum illustrauit, & Philippum II. Hispaniarum regem demeruit: quemadmodum amborum scripta satis superq; testantur. Vestigijs horum insisterunt illustr. Cels. T. Principes antecessores, Duces Wirtembergenses, à posteris meritò omnigenarum laudum encomijs concelebrandi, qui duo illa præclara inclytæ Tübingensis Academia lumina, Leonhardum Fuchsiū & Iacobum Schekium fouerunt maximique fecerunt. Ut alios complures, partim vitâ

functos,



functos, partim adhuc luce hac fruentes, quos Principes singulari amore prosequuti sunt, & adhuc prosequuntur, ne illos in os laudando, palpum iis obirudere velle videar, silentio pratercam. Et ne aliorum etiam Principum & Magnatum erga me quoque favorem ac beneficia, quæ meo iure recensere possem, altius repetam, vel maiorum saltem Illustr. T. Cels. Illustrissimorum Ducum Wirtembergensium clementiam & munificentiam in me, depradicasse suffecerit. Cui nuper Illustr. T. Cels. maximum adiecit cumulum, cum pro insitâ suâ lenitate, me quoque in Rhenani tractus veteranorum medicorum numerum referre, sic compellare, atque unâ cum fratre Thoma Platero, tanquam fidei spectata medicos, licet longius remotos, gratiosissimè complecti, liberalissimè magnificentiissimèq; habere, nec non de variis morbis, eorum causis, curatione & remediis, fusè mecum colloqui, fuerit dignata. Ut igitur præclara T. Cels. de me concepta opinioni, uti æquum est, responderem, & in enulgendis reliquis, communi bono, pro captus mei modo, consulere studerem, ac ut votis plurimorum præstantissimorum medicorum, qui primam partem cum vidissent, exactiq; iudicii sui calculo comprobauissent, & ad illis, quæ supersunt, supremam manum imponendam, me vehementer sollicitarant, satisfacere, secundam hanc operis practici mei partem, sub Illustrissimi nominis tui faustis auspiciis, uti & primam, in lucem edere visum est. Nullum autem mihi est dubium, hoc meum qualecunque opus, ex clarissimorum quorumcunque veterum ac neotericorum medicorum & chirurgorum, meis insuper propriis observationibus, longo usu à me compertis, maximis laboribus congestum, eo fore bonis quibusq; gratius, quod de doloribus inscriptionem præferens, in eo cum ferocissimis hostibus, qui sanctissimis cruciatibus, tenerrima hominum corpora excarnificant, mihi fuerit depugnandum. Ex quorum numerosissimâ acie, qui doloribus molestitiq; variis irruentes, exitum nobis intentant, sunt imprimis calculus, podagra, colici dolores, febrium intolerabiles aestus, pestis, eiusmodiq; sexcenti alij venenati morbi, lethalesq; affectus, atque externas corporis partes, horrendum in modum infestans, tumorum, vulnerum, ulceramq; myrias: quibus præcauendis, propulsandis vel saltem mitigandis, infinita hic proponuntur salutaria alexipharmaca, antidota, medicamenta & remedia, causaq; eorum, de quibus tamdiu maximi quiq; medici, inter se sunt digladiati, adhucq; disceptant, rationum firmamentis, pro humani iudicii mediocritate, suffulta, ita diducuntur, ut non videantur à veri scopo aberrare. De quibus omnibus, iudicandi potestatem liberam, candido lectori, haud inuitus permitto, quem pro suâ, æquanimitate, in bonam partem ea accepturum, & æquâ iudicii lance ponderaturum, confido. Illos vero, apud quos tanta est, ut ille ait, autoritas vetustatis, ut inquirere in eam scelus esse ducant, meminisse velim eius, quod idem didicit, dedisse omnibus Deum pro virili portione sapientiam, ut & inaudita inuestigare possint, & audita perpendere: nec quia nos antiqui temporibus antecesserunt, sapientiâ quoque antecessisse, quæ si omnibus æqualiter datur, occupari ab antecedentibus non possit: cumq; sapere, id est veritatem querere, omnibus sit innatum, sapientiam sibi adimere, qui sine ullo iudicio, inuenta maiorum probant, & ab aliis pecudum more ducuntur. Quibus per me quidem licet suo abundare sensu, modo per ipsos mihi quoque integrum sit, mea placita publici iuris facere, atque liberè cum bonis quibusvis communicare.

## EPISTOLA DEDICATORIA.

Tuam autem Illustrissime Princeps Celsit. quantâ possum animi subiectione, oro obte-  
storq., ut alteram hanc scriptionis meae partem, variorum ingeniorum censura multi-  
plici exponendam, pro innatâ clementiâ, in protectionem suam comiter suscipere, heroico  
prasidio, contra criticorum morsus defendere, me meosq. in posterum quoque commenda-  
tos habere, ac favore & clementia, ut hætenus, prosequi non dedignetur.

Deum Patrem Domini nostri IESV CHRISTI, supplicibus votis precor, ut  
Illustr. T. Cels. in omni bono confirmet, consiliis salutaribus instruat, virtute armet, omni-  
busq. benedictionibus cumulatisimè exornet, & ab omni malo incolamem inte-  
gramq., cum Illustrissimis filiis Regulis conferuet, ad gloriam suam &  
Reipubl. commodum. Basileæ 1. Aprilis, Anno  
Christi 1603.



DE DO.

# DE DOLORIBVS,

## LIBER III.



**D**OLORIS nomine hic generatim omnem sensum molestum, tristem ob id vocatum, quem quinque sensus percipiunt, intelligimus: de quo cum ægri magis, quàm de functionis læsione aliqua conquerantur, etsi ea dolori iungatur, nos hic potius peculiari libro, de dolore, qui tot partibus accidere solet, quàm in deprauatis sensibus, quò dolorem, quem sensus tactus præsertim patitur, referre alias solent, agemus. Idquè eò rectius, cum dolor non sensus tactus symptoma, utpote qui obiectum, quod dolore infert, non aliter, quàm reuera est, sentit & diiudicat, existat, sed offensa, quæ sensum hunc sequitur, ex secundo symptomatum genere sit, simplicium scilicet affectuum, qui sensibus percipiuntur, & hic ad tactiles referuntur.

Variant autem primùm dolores, pro diuersitate sensuum, qui illos percipiunt, cum omnes quinque sensus, obiectæ rei violentiæ, offensam patiantur & doleant, licet non eodem modo hoc fiat. Aliter enim proprii in facie positi sensus quatuor: aliter communis vniuerso corpori, quintus, molestiam percipiunt, vnde prima dolorum oritur differentia.

Proprii in facie tantum constituti quatuor sensus, visus, auditus, olfactus, gustus, cum non adeò ab obiectorum suorum vehementia dolores acerbos, sicuti sensus tactus, patiantur, citiusque remittant, nos simul explicabimus, **VISVS, AUDITVS, OLFACTVS, GUSTVS DOLORES,**  
CAP. I.

Page 1

Communis vniuersis corporis partibus sensibilibus, sensus tactus, qualitatium experientia eundem afficientium, varios dolores, eosque sæpè atrocissimos & diuturnos perferunt: Vt sunt calores, frigora, pruritus, titillationes, punctiones, ardores, lancina-

tiones. Quorum differentias, non ex diuersis hisce illorū generibus, seu sensuum proprietatibus desumemus, sed quatenus hi dolores vel in vniuersum corpus, aut certas illius partes aliquas cadunt, in illisque observantur, describemus.

Vniuersi corporis partes sensu tactus præditæ simul dolere omnes vix possunt: interdum tamen plures vnà, vel aliquæ per corporis superficiem expansæ, ut cutis, dolore infestatæ, eum generaliorē reddunt. Et cum corpus imbecille aut lassum est, licet vniuersum dolere videatur, tamē cum tunc potius de motus illius, & virium imbecillitate, quàm de dolore conquerantur, etsi in lassitudine dicta comes quoque sit, in motus imbecillitate & virium defectu (quò hæc pertinent) explicata fuerunt. Intemperie tamen cum omnes totius corporis partes simul possint affici, si id fiat, molestiam inde & dolorem partes omnes sensiles, si modò magna sit, etiam sentire necesse est. Quod à frigida intemperie vix, ut cunctæ simul afficiantur, potest contingere, nisi mors, sicuti frigore extremo affectus accidit, mox sequatur. Quemadmodum verò à calida intemperie, quæ veluti vniuersum corpus ab externo calore, non foris tantum, ut per frigus ferè fit, sed & intrinsecus increscere, & offensam aliquam inde sentire videmus: Ita maximè in febribus calore perseverante, omnes totius corporis partes accenduntur, eumque partes quæ sentire possunt, sentiunt cum molestia: ut ita sola tantum intemperies calida, generalem vniuerso corpori dolorem hunc, in caloris sensu aduersum, procreet; de quo agemus in **FEBRIBVS,**  
CAP. II.

Page 3

Partium certarum dolores omnis generis inveniuntur: qui vel abstrusi, vel patentes in diuersis partibus occurrunt.

Abstrusi seu latentes dolores, intrinsecus

in corporis quatuor distinctis sedibus, capite, collo, pectore, ventre, illarumque cavitatibus interioribus consistunt, & secundum illas distinguuntur.

In capitis sede interna, intra caluariam dolores existentes; explicabuntur in CAPITIS DOLORE, CAP. III. pag. 263

In faciei cavitatibus internis, dolores qui se offerunt, describentur sequenti modo:

Qui in oculorum sedibus consistunt; in OCULORVM DOLORE, CAP. IV. pag. 227

Qui in aurium cavitatibus; in AVRIVM DOLORE, CAP. V. pag. 266

Qui in naribus; in NARIVM DOLORE, CAP. VI. pag. 276

Qui in oris interioribus; in ORIS DOLORE, CAP. VII. pag. 282

Qui in oris ossis sedibus; in DENTIVM DOLORE, CAP. IIX. pag. 297

In colli interioribus dolores accidentes; explicabuntur in FAUCIVM DOLORE, CAP. IX. pag. 313

In pectoris seu thoracis cavitare, qui se exhibent dolores; proponentur in PECTORIS DOLORE, CAP. X. pag. 335

In ventris seu abdominis cavitare, dolores interni qui occurrunt, hoc ordine tractabuntur.

Qui in elatiori sede media, circa foueam cordis, vt vocant, occurrunt; in CORDIS

DOLORE, CAP. XI. pag. 377

Qui in lateribus vtrinque sub costis; in HYPOCHONDRIACO DOLORE, CAP. XII. pag. 438

Qui in reliqua sede abdominis; in VENTRIS DOLORE, CAP. XIII. pag. 483

In ventri adnatis locis reliquis, dolores interni alij cum excretionibus illic factis potissimum se manifestant, vt cum deiectione per aluum, vel cum vrinae redditione, quæ cum præcipuè in illis obseruentur, in reiectis de his potius agemus: alij verò dolores in certis illius loci sedibus seu foraminibus residentes, demonstrabuntur hac serie.

Qui in pudendorum interioribus sunt dolores; explicabuntur in GENITALIVM DOLORE, CAP. XIV. pag. 492

Qui in podice latent dolores; in PODICIS DOLORE, CAP. XV. pag. 543

Patentes dolores extrinsecus in corpore se magis manifestant, qui hoc pacto potissimum distinguuntur.

Profundiores sunt alij nonnihil; qui describentur in HABITVS CORPORIS DOLORE, CAP. XVI. pag. 567

Elatiores qui sunt & apparentes; in SUPERFICIEI CORPORIS DOLORE, CAP. XVII. pag. 630





# DE VISVS, AVDITVS, OLFACTVS, GVSTVS, DOLORIBVS.

## CAPVT I.

### Genera.



**D**OLOREM, etsi propriè tristem illum sensum quem tactus sentit vocent, sic tamen etiam appellare possumus molestias illas quas interdum quatuor reliqui sensus non in functionum

læsione, sed in hac illarum offensa per sentiunt patiunturque. Quæ diuersimodè admodum tum visui, tum auditui, tum olfactui, tum gustui eueniunt: vnde & diuersa prodeunt genera: quorum varietas etsi sensibus facile dijudicetur, difficile tamen est eam quo pacto fiat describere, propriis nominibus exprimere: nisi quòd offensam hæc quæ visui & auditui accidit, horum sensuum Offensionem; & quæ olfactui & gustui accidit Insuauitatem, appellare possimus.

### Causa.

**P**rocedunt autem hæc enarratæ quatuor sensuum noxæ, ab obiectorum ipsorum violenta vel inimica qualitate, sensus hosce nimium pulsante vel malè afficiente. Idq; vel per obiectum visus in splendore, vel auditus in strepitu, vel olfactus in fœtore, aut saporis in insuauitate.

**Splendor** seu lux nimia, si vehemens sit, vt solis aut flammæ: vel subitò oculo offeratur, vt fulguris, eiusmodi molestiam illi adfert. Vnde oculos ad illius splendoris occursum, vt eum declinèt, mox claudunt. Quam molestiam etià sensus tactus in oculo & naribus vicinis præsentiens interdum, sternutationem, vt hanc offensam excutiat, sicuti in sternutatione dictum, mouet. Sed & lux colore alio aliquo intensius aut diutius lucens, visumque diu multumq; feriens, ei aduersa nonnunquam fit.

Strepitus magnus per clamorem, clango-  
rem campanæ, tubæ, fistulæ, subitò ve alio-  
quin factus, præsertim iuxta aures, vt crepi-  
tus sclopeti aut tormenti maioris, auditus of-  
fensionem talem parit.

Fœtor magnus, seu odor quilibet aduersus, qualis est fuliginosus ab ambugis, vel putris ab excrementis exurgens, aut aliud quid spirans, olfactum afficit atque molestat. Simulq; aliquando nares vellicado tactumq; ipsarum mouendo sternutationem quoque mouet: interdum & vicinum gustum afficiens, nauseam illi etiam conciliat.

Insuauitas seu ingratus & alienus sapor, qualis imprimis est amarus, vel nimium salus, acidusve aut alioquin nauseosus, ab externis assumptis, vel internis humoribus aut exhalationibus, gustui oblatus, molestiam & tristem sensum illi adfert: tactumque simul ferit.

### Curatio.

**S**ublata causâ cessat & effectus. Quæ si externa fuerit, quæ omnibus quatuor sensibus hanc offensam parere solet, vel subito cessat, vel amoueri potest. Si interna, quæ gustui tantum incommodat, expurgatione humorum prauorum atque exhalationum foetidarum repressione, corrigitur. Si impressione facta in sensibus hisce aliquandiu hæc offensa permaneat, tunc euacuationibus adhibitis, tum alterando hæc impressiones, contrariis, vt splendorem nimium tenebris, vel colores aliquos visui aduersos contrariis coloribus, fœtores, odoratis, insuauitatem sapore conuenienti emendabimus. Sicuti hæc in deprauatione horum sensuum, quos tunc simul deprauant, explicata fuerunt.

## DE FEBRIBVS.

## CAPVT II.

## Genera.



EBRIS, πυρετός Græcis dicta, affectus est, in quo vniuersum corpus calore præternaturali perseverante incallescit: plerumque à frigore cum aliquo horrore vel

rigore incipiens: variasque molestias, diuersaq; alia symptomata proferens. Genera autem duo prima & summa ipsarum statuuntur, variantia præsertim in eo, quòd vel continuò perseverant: vel cessant, rursusq; redeunt: quarum illæ continuæ, hæc intermitteutes dicuntur.

*Continuæ febres.*

Continuæ febres sunt, quarum calor à prima inuasionè ad extremam vsq; solutionem nunquam integrè cessat. Harum varia occurrunt genera; quæ primùm ratione caloris distinguimus in acutas & lentas. Acutasq; vocamus, in quibus calorem manifestè ægri sentiunt, ab eoq; molestiam percipiunt. Quæ rursus sunt duplices: aliæ Puræ, quarum calor purus tangentis manum tantum calefacit, nec dum adeò sicuti impurarum ferit: Impuræ aliæ, quarum calor impurus tangentis manum non tantum calefacit, sed & pungit & veluti mordicat. Lentas verò appellamus, in quibus ægri calorem vix dum aut leuiter saltem, nec tamen semper, etsi continuæ sint, persentiunt: quæ quoque duplices sunt: Hæcicæ, quasi corpus eas tanquam habitum contraxerit, dictæ: quod cum nondum factum, simpliciter Lentæ vocantur. Hisce omnibus, siue acutæ, siue lentæ sint, si malignitas accedat, Malignæ dicuntur: quæ ob causam diuersam triplices sunt: Putridæ malignæ, si causa putris maligna: Pestilentes, si pestilens venenū: Venenatæ, si venenū aliud eas excitet. Vt sic prima & summa febrium genera, partim à calore, partim à permanentia, partim à causa denominata, septem sint: Puræ, Impuræ, Hæcicæ, Lentæ, Putridæ malignæ, Pestilentes, & Venenatæ. Verum vt ea secundum apparentia accidentia (vt cognosci possint) primùm diuidamus, variant hæc febres primùm inter se:

quòd aliæ febris solius, aliæ etiam aliorum morborum comitum accidentia proferunt, illisq; se manifestat & cognoscuntur: illasq; solitarias, has comitatas appellamus.

Solitariae continuæ seu incomitatas febres sunt, quæ febrium tantum, nec aliorum morborum accidètia, à calore ipsorum acuto, vel lento, vel maligno prodeuntia, producant. Qualia ex plerisq; supradictis generibus inueniuntur: vel simpliciter occurrentia, vel inuicem coniuncta; è quibus febres illas simplices, has compositas vocamus.

Simplices continuæ solitariae febres sunt, si vnius generis febris corpus occupet. Quæ denuò ex eo potissimum, quòd nunc breuiiores, nunc longiores, nunc diuturnæ sunt, si modò cursum perficiant, nec degenerent, discernuntur.

*Simplices continuæ febres.*

Breuiiores continuæ solitariae febres sunt, quæ septimum diem vix attingunt, vel integram septimanam non complent: Quales ex acutis, & malignis aliquæ existunt.

Acuta breuis febris cōtinua solitaria vna est ex illis, quas Puras vocauimus, & quæ cōtinua nō putrida, vt in causis dicitur, aliàs appellatur: & quòd paucis diebus finiatur, Diaria dicitur. Quæ à causis externis incipiens, nunc vnū saltem diem durat, & viginti quatuor horarū spatium vix cōplet, Ephemeræq; tunc nominatur. Aliàs in duos, tres, vel quatuor dies prolongatur, & tunc Diaria pluriū dierū, vel Synochus simplex pura, nō putrida, ad differentiā impuræ seu putridæ, vocatur. Desinunt aut non subita mutatione, quæcrisim vocant, sed sensim per occultā transpirationem, vel madorem, sudorēve manifestum: vel si exacto triduo quadriduove non cessat synochus pura, in impurā synochum, quæ longiore est, quod frequentius fit, vel hæcicam, quæ diuturnior existit, quod tamen rarum, commutatur: atque in quam abierit, signis illic explicandis cognoscitur.

*Pura febris, continuaria febrium genus. Ephemeræ, pura continuæ species.*

*Synochus febris pura continuæ species.*

Accidentia siue symptomata febrium diariarum hæc sunt: Cum horrore leui interdū incipiunt, præsertim si non adeò puræ non nihil degeneret: vel sine eo, si exquisitæ existant; idq; præsertim si iam prius antequam febris inceperit, corpus à calore aliquo externo, febres hæc accendentes incaluerit, & fe-

*brez*

bre superueniente, calor tunc non primum incipere, sed augeri tantum videatur.

Calor febrilis horrore subsequens, vel per se incipiens, à principio ad finem vsq; nullis paroxysmis interuenientibus exacerbatur: sed vel in æquali gradu manet in Ephemera, & in Syncho Acmaistica, Homotono, Vniformi ob id dicta: vel augeri videtur in Epacmaistica, Anabatica, Inualefcente: vel decrescere in Paracmaistica, synochis, sic tunc appellatis: idq; donec, vti dictum, sensim desinat. Variat aut calor in illis, quod vel mitior est & remissior, quod breuior est febris, vt in ephemera; quem blandum & halituosum, quod tactu cutis mollis & vda magis sentiatur, vocant: vel vehementior, si diutius perseveret, in syncho sanguinea à causa appellata, accedente nonnunquam acrimonia quadam, in syncho quam biliosam vocabimus, eaque quæ iam impura fieri, & in putridam conuerti incipit.

Reliqua accidentia, quæ magis minusve pro ratione caloris & corporis constitutionis virgent, sunt; Dolor capitis cum pulsatione: Sitis magna vel exigua: Orisq; amaritudo in biliosa: Inquietudo: Lassitudo: Vigiliæ vel Somnus profundus. Ad hæc accedunt; Respiratio concitata: Pulsus celer, frequens & validus, magnusq; , non tamen inæqualis aut inordinatus, vel saltem non admodum: Facies rubra, tumida: Venæ turgidæ: Cutis mollis: arida vè in biliosa. Urinæ si hæc febres sint breues, à naturali non multum mutatae: si longiores, rubræ & tinctæ: Sudores, qui sæpe citius quam docent, erumpunt, nec graueolentes, nec molesti.

*Pestilens  
febris  
continua  
febrilium  
genus.*

Maligna brevis continua febris, vna quoque ex Pestilentibus dictis inuenitur, quæ priori acutæ synochæ dictæ non admodum est ab similibus, ita vt, nisi ex eo quod populariter grassetur, & vires tam subito deiciat, aliquo pacto cognosceretur, ab illa vix discerneretur: vti &, si bubone comite, sicuti ferè fit, prodeat: cum & hoc in syncho fieri possit, neq; tunc ab illa hoc signo certò distingui potest: vt non sit mirum, eos qui peste primum correpti sunt, se febre syncho prehenso esse existimare: eoque se ab initio consolari. Procedit enim pestilens febris quoque ab externis causis, sed occultis: subitoq; &

clandestinò corpus, ac veluti in momento ferit, & paucis diebus, nisi mors præueniat, nullà quoque crisi, vti synochus desinit.

Quod accidentia illius attinet. Cum horrore quoque leui plerumq; inuadit. Calore mox subsequente: qui interdum admodum mitis est, vt de eo minimè conquerantur: urinæq; à sanorum urinis nihil, vel non multum differentes conspiciantur. Quorum tamen imbecillitatem pulsus arguit. Sed & interdum calor vehemens, vt in syncho, aliquando etiam acris, si non nihil degeneret, existit: & tunc accidentia sicuti in synochis: qualia sunt, Dolor capitis; Delirium; Vigiliæ; Sitis quoque, eam comitantur: quibus accedunt virium subitaneus lapsus. Sudoresque qui in febribus pestilentibus mox ab initio prodeunt, redeuntque, morbum tamen minimè finiunt.

Longiores continuæ solitariae sunt, quæ in septimanam vnā vel alteram, aut plures producuntur. Quales ex acutis & malignis aliquæ deprehenduntur.

Acuta longior continua solitaria febris *Putrida* na est, ex illis quas Impuras nominauimus, *febris, continua febrilium genus.* & quæ Continua putrida, vel conclusa, aut continens aliàs quoque appellatur, & septimanaria ad differentiam diariæ vocari possit. Quæ per se, vel ex commutatione (vti dictum) synochi febris puræ in hanc impuram, incipiens (quod ex eo, si quarto die ad summum synochus pura non cesset, & calor acrior appareat, præsertim si tunc novus horrore, vti sæpe fit, suboriat, cognoscitur) postquam absoluto principio in augmento aliquandiu hæserit, eoq; finito ad statum vsque peruenerit, per subitanam mutationem, quam crism seu iudicium vocant, nisi moriantur, mox declinante febre ab ea liberantur: vel si crisis imperfecta fuerit, de nouo rediens, ad salutem, mortemve eum deducit. Aliquando quoque sed rarò admodum hæc febris, & in primis illius species quæ ardens est, si non extingatur, sed aliis imprimatur, in nouam veluti febrem degenerare videtur, quæ breui tempore corpus consumit: proin & febris Colliquans ardens dicitur, quam hæcticæ febris speciem aliqui quoque fecerunt. Nonnunquam & in

Hecticam verā, sicuti diariæ, vti illic dictum, commutatur.

Accidentia autem harum febrium & plura & vehementiora quam diariarum occurrunt, ita vt ob quorundam violentiam ab illis febris novum nomen, ac si diuersæ illius essent species, sortiatur. Tum quæ molestiâ ægro; horrore; calore; siti, linguæ ariditate; dolore capitis; pariūt: tum functiones ipsius lædentiâ; mentem delirio perturbant, vires prosternunt: & quæ in corporis consumptione, excrementisq; obseruantur: quæ omnia se hoc modo proferunt.

Horror in prima tantum harum inuasionē corpus non nihil concutit, maximè si per se incipiant, & non ex diariarum commutatione exordium sumant, vbi vel nullus, vel levis tantum sentitur; quo mox cessante in reliquo febris decursu, nisi interdum & præsertim instante crisi leuiter perhorrescant, nullus amplius alias horror se offert, neque etiam si hæc febris paroxysmis exacerbetur, rursus redit: aut si novus suboritur, non ille à continua hæc febre, sed intermittente, quæ tunc illi copulata erit, sicuti mox in compositionis febribus dicemus; proficiscitur. Verum & per hunc horrorem, & exteriora & interiora interdum frigent, alias interiora solum horrent: Sed & frigus, nonnunquam calore etiam inualecente, exteriora adhuc aliquousque obsidet.

Calor qui horrorem mox sequitur, secundum quatuor harum febrium tempora; varias habet mutationes. Nam mox in principio vehemens est & acris: statimque in augmento ad statum vsq; augetur. Quo tempore interdum suas habet exacerbationes seu paroxysmos; quos accessiones seu reduplicaciones quoq; vocant, febresq; tunc Synechas continuas; O in E conuerso, ad differentiam synochorum putridarū, de quibus mox agetur, vocant: In quibus, si paroxysmi die eodem semel atq; iterum redeant, ita vt bis terve vno die exandescat febris, quod & frequentius fit. Inordinata continuatunc dicitur, præsertim si altero post die semel tantum vel minimè acuarur. Quod si verò altero die primum paroxysmus redeat, eumq; ordinem deinceps seruet, quod raro fit, Quoti-

diana vocatur continua. Tertio verò die frequentius paroxysmi repetunt in illis febribus, quæ ordinem seruant, Tertianæque est continua; Quod quarto demum die vix accidit; vt tam diu paroxysmi protrahantur: vnde rara admodum est Quartana dicta continua. Verum & nullis interdum distinctis paroxysmis hæc febres exacerbantur, tuncq; Synochus putrida ad differentiam prioris synochi non putridæ breuioris existentis appellatur: quæ quoque vti & alia quatenus ad statum vsque, vel augetur, vel minuitur, vel eundem tenorem seruat, Epacmastica, Paracmastica vel Homotonos dicitur. Quod si verò maximum in febre continua putrida sit incendium; atque ardor in eadem vehementia continuo persistat, & veluti vnus tantum ad statum vsque perseverans paroxysmus sit, tunc ardens febris, Causos nominatur: in qua specie si interiora vri videantur, extremis frigescentibus, Leipyrias vocatur febris. Postquam autem ad vigorem vsque hæc febres peruenerunt, cum calor ad summum vsque progressus diutius consistere nequeat, tunc si per crism in melius vergat, calore sensim remittente & dissipato, declinatio sequitur, fitque aliqua per sudores, mictiones, aliasve vias euacuatio: si verò crisis in deterius abeat, prægresso mortis agone, viribus deficientibus extinguuntur: vel si non sit absoluta crisis, calore nondum remittente per nouam crism, quæ rursus superuenit, vel ad salutem, vel ad mortem fit adiudicatio.

Sitis admodum in hisce febribus molesta est; ad quam sedandam, ea quæ frigida sunt & madent, vehementer appetunt, acidis que recreantur. Appetentia autem ciborum penitus prostrata est, estque magna; præsertim eorum quæ dulcia, alimentosa & nidiorosa existunt nausea: ita vt & acida, grata aliquin ipsis, interdum fastidiant.

Linguæ ariditas, nigredo & inflammatio interdum ardentes comitatur febres: cuius quoque occasione, (& præsertim si accedente malignitate, vti mox dicitur, eiusmodi febres epidemiæ passim grassentur, si hoc symptoma ipsis consuetum habeant) totum affectum à puniceo linguæ colore, quem nostra

Synech<sup>is</sup>  
febris In-  
ordina-  
ta, Quo-  
tidiana,  
Quarta-  
na: putri-  
de conti-  
nua spe-  
cies.

Syno-  
chus fe-  
bris pu-  
trida co-  
tinua spe-  
cies.

Causos fe-  
bris pu-  
trida co-  
tinua spe-  
cies.

Leipy-  
rias fe-  
bris cau-  
sonis spe-  
cies.

Decume  
Ger. pu-  
trida co-  
tinua spe-  
cies.



nostrates braunrot vocant; Breune vulgus appellat, quasi dicas inflammationem ad nigredinem tendentem. Labiorum item inflammatio, scissuræ, exulceratio cum crustis, interdum citius, aliàs tardius, in declinatione superueniunt.

*Hauptwe Ger. putrida continua Species.* Dolor capitis, nisi mente capti eum minimè sentiant, circa initium præsertim magnâ parit molestiam: propter quod evidens & frequens in febribus hisce putridis symptoma, vulgus eas *Hauptwe* / cephalalgias vocat: quæ cum temporum pulsu, & rubore faciei ægros affligunt. Sed & cordis dolor, ut vocant, cardialgia dicta, ut in plerisque morbis, sic & hic, molestus est. Atque contundens quidam ossium dolor in lumbis, dorso, & artubus sentitur.

*Daubhauptwe Ger. putrida continua Species.* Delirium plerumque diebus aliquot elapsis superuenire solet: interdum leuius, aliàs grauius: ita ut & furiant: ob cuius symptomatis enormitatem, & quod frequens sit in eiusmodi febribus, vulgus Germanorum insanas cephalalgias, *Daubhauptwe* / præsertim si maligna quoque sit febris, & populariter grassetur (vbi postea dicitur) appellat. Conuulsio nonnunquam has quoque febres sequitur. Sed & vigiliæ admodum illos detinent.

*Syncope palis febriu, putrida continua Species.* Vires admodum ob febris perseverantiam prosternuntur, nonnunquam & penitus concidunt. Syncope quandoque in ipsa exacerbationis die superuenit, illisque redeuntibus repetit: tunc ob graue hoc & periculosum symptoma, febres hæc syncopales appellantur. Pulsus autem, pro virum ratione, parvus vel magnus existit.

*Colliguanæ ardens febriu causis Species.* Emaciatur corpus tandem ob febrium diuturnitatem, & colliquantem calorem, idque maximè in ipsarum declinationibus; si copiosis sudoribus aut mictionibus corpus tunc quoque inaniatur. Sed & subita corporis consumptio aliquando has febres, causam præsertim, sequitur, uti superius in colliquantem febre dicta, ostensum fuit.

Excretiones quod attinet: Vomitus quibudam molesta est: Singultus aliquos affligit: Diarrhœa nonnunquam superuenit: Mictio copiosa post crism in morbi declinatione sæpè adest: Sudores erumpunt, cri-

simque sequuntur: Sanguinis è naribus fluxus, uti & menstruus, criticè, aliàs extra crism, prorumpunt. Excrementa quoque quæ redduntur, variè se offerunt, uti vrinæ diuersæ substantiæ & coloris: Sudoresque diuerso odore, vel nullo præditi. Quorum omnium mutationes, & quid præfagiant, curationi harum febrium præmitteremus.

Maligna longior continua febris, vna *Putrida* quoque solitaria ex putridis malignis dictis, *maligna* admodum frequenter occurrit: a priore *a-fbris,* *cōtinua-* *rum fe-* *brum* *genus.* *Putrida* longiore putrida dicta non multum differens: nisi quod populariter quoque pestis alicuius instar in plurimos, adultos potius; & præsertim in viros sæuiat: licet & priuatim nonnunquam aliquos inuadat, viresque subito prosternat. Quæ per se incipiens in septimanas quoque, uti putrida prolongatur, & per crism, sed non ita certam, ut in illis, euacuationesque aliquas soluitur.

Accidentia quoque eadem quæ in putrida, in illa adsunt: sed grauiora magisque periculosa. Calor tamen in suis mutationibus & exacerbationibus non eum ordinem quem in putrida seruat, sed inæqualis, atque inordinatus existit.

Capitis inprimis dolor & Delirium subsequens, hic tanquam magis conspicua & frequentiora symptomata, ut tota febris ab illis denominetur, uti in putrida dictum, occasionem vulgo præbuit.

Uti & faucium illa linguæque inflammatio, si ut sæpè fit, cæteris præualeat symptomatis, nomen febris quoque immutat.

Sed & inuenta est malignarum febrium *Sudor* species ex Anglia primum per Europam diuagata; sudore perpetuo suam perniciem manifestans; multosque passim iugulans: quam Sudorem Anglicum ob id vocarunt. *Angli-* *cui, pu-* *trida* *maligna* *cōtinua* *Species.*

Diuturna continua solitaria febris, non solum ad septimanas aliquot, sed & menses multos usque se extendens; vna quoque est ex illis quas Hecticas vocant. Quæ ex commutatione, febrium prædictarum in hanc desinentium, nascitur. Vt diaria, si post elapsos tres vel quatuor dies non in putridam conuersa sit, quod frequentius tamen euenit, in hanc, quod rarissimum, permuat. Vel putrida diu perseverans; vel si ardens *Hectica* *febris,* *cōtinua* *putridum* *februm* *genus.*

fit, tandemq; cessans, hanc hecticam post se relinquit. Quæ & ab intermittentibus, si diuturnæ & vehemens sint, prodire potest. Quæ postea quàm diutissime permanens, sensim hominem conficit.

Quod accidentia illius attinet. Calorem non magnum in ea experiuntur ægri, vnde quoq; se febricitare vix putant: qui tamen post cibum sumptum, vnâ duabusve horis acuitur, sed eo confecto, mox ad pristinam æqualitatem redit. Quin & arteriæ calidiores circumpositis partibus esse tactu sentiuntur, & dum pulsant, veluti tensæ & puræ, celeri quoq; & frequenti, vt in reliquis febribus, motu esse videntur.

Marcor mox hanc febrem sequitur: vel si iam prius ob febrem putridam præcedentem corpus emaciatur fuerit, magis augeatur, atque tandem adeo, vt totum corpus contabescat, increfcit. Cuius causâ (prout hæc corporis consumptio, vel incipit, vel augetur, & ad summum peruenit) tres hecticæ gradus, non à calore sed hoc marcore statuuntur, incipiensq; vel adaucta, aut confirmata dicitur hectica, in cuius postremo gradu ad pellem & ossa vsque corpus absumitur, hecticaque Marasmodes dicitur. Verum & per vrinas colliquescentis corporis pinguedines vel portiones aliquæ vti voluerunt, excretæ eas pingues, mox furfuraceas, tandem orobeas dictas reddere feribunt, quod tamen vix nisi renum & vesicæ affectuum causâ accidere posse, alibi docuimus.

Imbecillitatem magnam cum languore, viriumq; tandem collapsam ob morbi diuturnitatem sequi necesse est: vnde & Pulsus, etsi celer, paruus tamen est, & debilis.

Compositæ febres sunt, cum diuersi generis febres simul in corpore coincidunt, illudq; eodem tempore afficiunt. Quod varijs modis fieri potest: tum in continuarum permixtione inuicem: tum si cum intermittentibus copulentur.

Continuarum enarratarum genera diuersa inuicem permixta corpus afficiunt: si Putrida cum Hectica, quam excitauit, adhuc coniuncta sit.

In qua calor vehemens putridæ febris,

huic copulatæ, lentum illius calorem obscurat, ita vt ille tantum præualere sentiat. Ex marcore tantum extremo hecticam subesse tandem deprehenditur: præsertim si tunc putrida languidior fieri incipiat. Quæ etiam hectica citius ægrum conficit. Distinguiturque à colliquante illa post febres ardentes nata, de qua superius dictum: quod in ea febris sit ardentissima, quæ corpus subitò, non sensim, conficit.

Sed & reliquæ omnes continuarum dictæ species, hecticæ, cum diuturna sit, si prius hac æger laboret, atque illæ de nouo superueniant, complicari possunt: quarum causâ vt & aliorum morborum si accedant, æger citius conficitur. Quæ etiam commixtio facile ex nouo febrili calore inuadente, & quæ nam sit febribus, ex prædictis illius indicijs cognosci potest.

Cum intermittentibus, mox explicandis febribus, continuæ frequenter permixtæ, febrem constituunt, continuò quoque perseverantem (quò nomine hic inter continuas explicatur) sed quæ interueniente nouo horrore aut rigore, quando paroxysmi intermittantium redeunt, facile ab illis, mox discernitur & cognoscitur. Hæc autem permixtio ipsarum etsi varijs modis fieri, & in omnibus continuarum speciebus, intermittens singulis iungi possit: præcipuè tamen ea continuarum febrium cum intermittentibus permixtarum species frequentior est, adeoque intricata, vt vna, etsi ex duabus, intermittente nimirum & continua acuta putrida dicta constet, esse videatur; quæ quia tertiana intermittens continuæ quotidianæ vt volunt, copulatur frequentius, Hemitritæus siue Semitertiana, quasi media totius febris pars tertiana sit, dicitur: eaque Minor, si cum hac febre continua, vel Maior, si cum quartana continua copuletur.

Non dubium tamen est, & quartanam intermittentem cum continua iungi quoque posse.

Incipit autem hæc primum cum horrore, si continua prima sit: si intermittens, cum rigore: moxq; alia illic copulata, deinceps hunc processum seruat, vt vna die binæ fiant:

Marasmodes  
hectica  
species.

Composita  
continua  
febres.

Putrida  
cum Hectica  
copulata.

Putrida  
cum in-  
termittente,  
copulata  
febris,  
Hemitritæus.

fiant: quarum vna cum rigore febris intermittens sit, altera exacerbatio tantum est febris continuæ, sine horrore; quæ secundo post die rediens, vnam tantum accessiorem parit: quem ordinem deinceps quoque, donec vel simul, vel successiue remittant, feruat; nisi fortè intermittens quartana continuæ copulata, die quarto primum geminas accessiones proferat.

Symptomata quælibet febris suo generi consentanea profert, maximè verò, quia frigus cum rigore in corpus iam accensum continuæ febris calore coincidit, sit vt eo tempore quo accessio tertiæ febris incipit, & calorem & frigus simul æger persentiat. Quæ fortassis ea est febris Epiala, quam superius quoque hac ratione fieri posse diximus, & ad quotidianas continuas à quibusdam ferri, cum in ea quotidie accessiones fiant, licet altero tantum die frigus cum calore concurrat. Sed & calor eò in compositis hisce, quàm simplicibus febribus maior erit, quòd calor tertiæ febris cum continuæ calore alternis diebus concurrens, duplicem veluti æstum tunc adferat: Vnde & tunc symptomata quæ calor proferre solet, admodum erunt vehementia, corpusque & ipsius excrementa valde alterabunt, viresque prosterneant, inter quæ syncope, cum ambæ febres concurrunt, adeò ipsis familiaris; vt syncopalem febrem eandem cum Hemitæo fecerit Rondeletius.

Verum & intermittens hecticæ quam excitauit, adhuc copulata esse, corpusque simul afficere potest. Quod non solum ex summo corporis marcere, qui febrem intermittentem sequitur, sed & quòd die quietis lenta hæc febris nihilominus adsit; pulsusque, alijsque illius indicij deprehenditur. Vti & si iam prius hecticæ laborans æger intermittente corripiatur, facile eam superuenisse, ex illius signis cognoscitur.

Comitatæ febres continuæ sunt, quæ aliquem morbum qui ipsas vel excitauit, vel qui ab illis prodijt, comitem habent, aliaque præter ea quæ febris solitaria adfert symptomata, à morbo comite prodeuntia & cum febrium accidentibus complicata, febriumque naturam aliquando permutan-

tia. Cuius generis, & puræ, & impuræ, & malignæ, & pestilentes, & venenatæ, & hecticæ, & lentæ inueniuntur febres. Quæ si morbum præcedant, Primariæ: si sequantur, Secundariæ, & Symptomaticæ communiter nominantur febres. Variantque, quòd morbi comites vel extrinsecus apparent: suntque vel inflammationes, vel erysipelata, vel bubones, vel anthraces, vel ethymata, vel exanthemata. Vel in interioribus latent, & doloribus, tussi cachexia, excretisque alijs se præcipue produnt & manifestant.

Inflammationes externas febris interdam sequitur, nunc Ephemeræ, nunc Synochæ puræ instar cursum perficiens, suaque accidentia promens,

Quod si ab ictu bestiae venenatæ producatæ inflammationes febrem comitem habeant, Venenata à nobis appellata erit, ephemeræ instar brevis, cum, etsi hominem non interimat, supra diem vnum durare vix possit. Accidentia grauiora alia quoque, vt tremorem, conuulsionem, similiaque subito superuenientia (quibus, vt & ex prægresso ictu, cognoscitur) simul adiuncta habens.

Erysipelata externa febris synochus pura frequenter protrudit: quam & tunc erysipelas communiter vocant. Germani vero nostri Carfunkel; id est, Carbunculum, quòd gemmæ sic appellatæ, quæ aliàs hyacinthus dicitur, ruborem flauescentem, erysipelas inde natum referat, appellant. Hæc febris processum eundem vt solitaria synochus seruat, atque diebus aliquot elapsis finitur, vel commutatur. Accidentiaque similia quoque profert, & præter hæc die, vel eodem, vel altero aut tertio, rarius, tardius, erysipelas cum rubore & ardore si simplex sit: aliàs accedente simul tumore; si phlegmonodes, eoque maximo; si oedematodes sit, in cruribus præsertim, interdum & in facie, rarius in alijs locis, protrudit: glandulis vicinis simul interdum intumescens. Quæ & febre soluta nunquam remanent, sed; sicuti in tumoribus hisce suis in locis explicatur, habent.

Bubones febris Ephemeræ vel Synochus.

Epiala  
febris, he-  
mitæa  
species.

Syncopa  
in febre,  
hemitæa  
species.

Intermit-  
tens cum  
hectica,  
composita  
febris.

Comita-  
ta conti-  
nuæ fe-  
bres.

Inflam-  
mationi  
externæ  
comites fe-  
bris E-  
phemeræ  
rat.

Synocha  
venenata.

Erysipe-  
lata ex-  
terna co-  
mes fe-  
bris: Syn-  
ochus  
pura;  
Carbun-  
culus  
Germ.

Buboni-  
comites fe-  
bris.

*bris, Ephemera, Synochus pura, Pestilens, Venenata.*

chus pura, sæpenumerò profert, à solitarijs, aut synocho modò dicta quæ erysipelata producit, non differens: nisi quòd primo statim die, vel mox eum sequentibus, vti in priore erysipelas; hìc bubones in adenibus, paucioribus pluribusve in locis, in collo, *Rhittel* vocant, in inguinibus, sub alis, cum dolore, ruboreq; interdum in ambitu apparente, prorumpant. Quam febrem & ob similitudinem febrium inter se, vti & eam quæ erysipelas parit; Carbunculum nostri quoq; appellant: nomenq; hoc etiam solitariae ephemeræ & synocho eandem ob causam accommodant.

Verùm & Pestilens febris, bubonem nunc vnum, nunc plures, mox in prima illius inualione, vel non diu post eam, frequentius in inguinibus, & sub axillis, nonnunquam & iuxta aures, cum dolore se in illis locis manifestante protrudit: qui nisi denud euanescent, adaucti inflammatique in panum seu phygethlon abeuntes, tandem in abscessum versi, admodum ægrotantes molestant, nouamque febrem synochum interdum accersunt. Sed & absconditi aliquando bubones, in pinguibus præsertim, dolore, soloque rubore illis in locis se produnt.

In Venenata dicta febre, aliquando in utroque inguine dolores graues suboriri, in causis ostendimus.

*anthraci comes febris, Putrida, Maligna, Pestilens.*

Anthrax in febribus quibusdam & in primis in Pestilenti in corporis aliqua sede, frequenter in extremitatibus profilit. Qui ab initio pustulam paruam referens, pruritu & ardore molestat, mox verò in vlcus crustosum conuertitur. A quo anthrace ab initio lineam rubram ad bubonem, qui plerumque illum comitari solet, longo etiam interdum spatio, porrigi, sæpè obseruauimus.

Sed & anthracem non pestilentem, febribus quandoque Putrida continua, vel simplex, vel maligna simul, rariùs Pura, præire multoque minus, nisi maximus in eo sit ardor, subsequi solet.

*Ecthymatibus comes febris, Synochus*

Ecthymata; febres aliquæ continuæ frequenter protrudunt: quæ rariùs sunt Synochi simplices; frequentius Putridæ; frequentissimè Putridæ malignæ dictæ. Quæ in-

fantibus aded consuetæ sunt, vt pauci inueniantur, qui non febres pustulas illas proferentes in infantia passi sint: quibus & plures eodem tempore iisdem in ædibus vel locis sæpè corripuntur, & proin illis contagiosæ & populares existunt. Sed & in adultis, rarissimè tamen, & tantum malignæ putridæ febres, eiusmodi pustulas proferunt, quæ proin & deteriores nihil boni portendunt. Sunt autem hæc febres, nunc breuiiores, in quibus & citius erumpunt pustulæ: nunc longiores & tunc tardius ferè prodeunt; febrisque in septimanam, & ultra quoque in adultis præsertim extendi potest: nullâ tamen crisi certâ, sed sensim superueniente, nonnunquam scdâ alui proluie, desinunt.

Accidentia eadem quæ synochus putrida, sed mitiora in infantibus, in adultis grauiora adfert: interdum & deteriora in maligna putrida, si non rectè prodeant ecchymata, in ætate præsertim prouectioribus. Erumpuntq; die tertio vel quarto, vel etiam tardius, nulla tamen crisi aut febris solutione pustulæ, corporis vniuersam vel maiorem illius partem descedantes, tamque diu, donec vel denud euanescent, vel pustulæ suppurentur, sicuti suis locis explicabitur, perseverantes.

Sed & febris inuenta est Pestilens aliqua, quæ non alijs, quàm pustularum eiusmodi eruptionum indicijs, multa millia infantium e medio sustulit, & quandoq; in adultos, sed rariùs iisdem characteribus sæuebat.

Exanthemata in eadem febre, quæ ecchymata producit, & vel Synochus simplex est, vel putrida aut maligna, efflorescunt: & sicuti illic pustulis, ita hìc maculis rubris latis corporis superficiem, præsertim in facie & pectore, conspergit. Infantibus quoque, vti prior peculiaris, ita vt plerique quoque febres ambas, tum eam quæ maculas, tum eam, quæ pustulas profert, sed diuersis temporibus patiantur. Per cætera cursu atque accidentibus, eodem modo vti & prior febris se habens.

Sed & in febribus putridis malignis, maculæ rubræ, quales post pulicum morsus alias apparere solent, vel subfusæ aut nigræ, vel

*pura & Putrida, Putrida, Maligna, Pestilens.*

*Exanthematis comes febris, Synochus pura & Putrida, Maligna, Pestilens, Venenata.*



vel violaceæ, quas Itali *Petechias*, German. *Rechflecken* vocant, circa statum harum febrium erumpere interdum, & per cutem hinc inde dispersæ, illius malignitatis indices & mortis propinquæ prænunciæ esse solent. Nonnunquam & latam eiusmodi maculam solitariam sub papilla apparentem, in febre maligna cuiusdam puellæ mortem ipsius anteire & præfagire vidi.

Verùm & similes maculæ subfusæ in febribus Pestilentibus, vti in putridis malignis, non solum febrem pestilentem detegunt, sed & mortem instare denunciant.

In Venenatis febribus, maculæ diuersi generis, venenum latens quoque produnt.

*Doloribus comes febris Ephemera, Synochus pura.* Dolores aliquos summos, vt podagricos, nephriticos, colicos, dysentericos, & dentium quoque in dentitione infantium, aliosque vt in partus difficultatibus, febricula interdum comitatur Ephemera vel Synochus pura; quæ brevis est, nec per se grauiam adfert symptomata.

*Inflammationibus intermixtis comes febris, Synochus pura & putrida.* Alios quoque dolores, aliaque accidentia ab inflammationibus internis producta, febribus Synochus pura, degenerans tamen aliquando circa finem, comitatur. Quæ si eas sequatur & symptomatica sit, non adeo longa, aut vehemens esse potest, nec ita, nisi inflammationis causâ hoc fiat, periculosa. Si verò febris primaria sit, inflammatioque eam sequatur, (quod plerumque tam subito fit, vt non solum vnâ hæc simul prodijisse, sed & inflammationem febrem præcessisse, febremque tunc quoque symptomaticam esse creditum sit) tunc si cum tussi in qua cruenta purulentaque excreantur in peripneumonia, accedente simul dolore punctorio in pleuritide; vel cum ardoris dolore & tensione in hepatitide; splenitide febris hæc iungatur, decursus illius longior, quàm in synocho solitaria esse solet, & pro morbi comitis ratione, citius tardiùsve finiri, vel in putridam interdum permutari, nonnunquam etiam recrudescente, sicuti in causis explicabitur. Accidentia tamen, quæ à febribus hisce proficiuntur, leuiora plerumque quàm in synochis solitariis existunt: vnde & capitis dolorem rariùs experiuntur, etsi ea symptomata, quæ à morbo

prodeunt, grauiam & periculosa sint: quorum causâ affectus hi acuti, non febris nomine, dicuntur. Quod si quoque delirium graue in phrenitide vera, vel suffocationis periculum in angina, quæ has febres vti & linguæ inflammatio in affectu Breuine dicto, interdum sequitur, hisce febribus accedat: febris comes tunc quoque non alio modo quàm prior se habet: etsi accidentia alia à morbo prodeuntia summè periculosa, quorum causâ affectus hi peracuti nominantur, existant.

Tussim cum exscreatione purulenta & *Phthisi comes febris Hæctica.* tabe in phthisi, Lenta primùm symptomatica comitatur febris quæ diuturnitate in Hæcticam symptomaticam tunc quoque dictam conuertitur, à solitaria non admodum differentem; cum & hæc sensim longoque tempore ægrum conficiat. Calorque in ea mitis, nulla grauiam adferat symptomata; quem tamen noctu aliquo modo incrementum, magisque tunc ægrotantes sentire scribunt. Pulsus etiam frequens, celer atque inæqualis, non tamen validus in perseuerante febre, ob imbecillitatem quæ sequitur, existit. Dein & vrinæ febris causâ vix alteratæ apparent.

Cachexiam, nunc colore alieno, nunc *Cachexia comes febris Lenta.* vitioso corporis habitu tumente in leucophlegmatia, vel gracilesciente in atrophia, se manifestantem, febris interdum comitatur, Lenta symptomatica appellata, ob calorem illius minimè acutum, sed adeo mitem & lentum, vt vix eum ægri depræhendant; hæcticæ febris calori non absimilem, vnde & vulgus eas hæcticas quoque, vti & nostri Germani *Entfium* communiter appellant, hasque febres, infantibus & virginibus, in primis antequam menses erumpant familiares, ex cita respiratione & cordis palpitatione, accedente marcore corporis, quem ex ossis xiphoeidis prominentia, & costarum scapularumque eminentijs colligunt, esse iudicant & propter macilentiam alij eas *Nippsucht* / & à cordis palpitatione, quæ ferè quoque adest, *Hertzgesperz*, circumforanei noua excogitantes nomina appellant. Quæ febres diuturnæ quoque admodum sunt, & nonnunquam in veras hæcticas de-

finunt; aliās verò morbo vnde prodeunt sanato, iterum abolentur.

*Retentæ* secundinæ, foetus mortui, aut vermium, aut sanguinis concreti accidentia, calore præternaturali, illiusque indicij, pulsuque concitato, non tamen vehementibus, nec diutius durantibus, cùm causa diutius quoque (vt illic dicitur) minimè subsistat, sese offerentia, comitatur febris interdum, quæ nisi aliud accedat, Lenta quoque symptomatrica existit. Sicuti de hac & alijs morbos alios comitantibus febribus, vterius in tractatione singulorum morborum, vti & tunc de morbis ipsis quo pacto se habeant, febribusque se accommodent, agemus.

*Intermittentes* febres sunt, quæ certis temporibus intermittunt, certisq; redeunt. Harum vnum tantum est genus, omnisque intermittens febris, cùm calorem apparentem, molestumque, eumque impurum & pungentem diffundat. Acuta impura seu putrida, vt in causis demonstrabitur, existit. Cuius tamen diuersæ species, pro dierum, quibus redire consueuerunt, numero statuuntur.

Hæ autem solitariae tantum, non vti continuæ comitatae esse deprehenduntur. Nam etsi morbum alium aliquem producant, hic tamen cum à febre diuersus sit, illiusque naturam minimè immutat, nec cum febris accidentibus implicatus, vti in continuis fit, sed seiunctus existat, comitata eo modo, sicuti eas appellamus, dici non potest. Dein & cùm nullæ morbos sequantur, & morbi si febrem accendunt, ea semper continua sit, vt in causis declarabitur, nec symptomatrica aliqua ex illis rectè dici possunt, sed primariae, cùm per se incipiant, appellabuntur.

Verum simplices & vnius generis aliquando, vti & continuæ sunt intermittentes febres; in quibus tamen non vna solum semper, sed frequenter duæ vel tres etiam species ipsarum, non vno paroxysmo concurrentes, sed diuersis paroxysmis, ægrum infestant: eoque nomine vel simplex, vel duplex, vel triplex intermittens febris dicta occurrit. Quæ quocunque modo se ha-

beant, si cum continua febre aliqua iungantur, Compositæ erunt febres, vel Hemitritæus dicta, vel aliæ febres; quæ in compositis continuis, cùm si hoc fiat, continuo nihilominus æger febricitet, descriptæ fuerunt.

Cæterum acutæ huius impuræ seu putridæ febris intermittens, cuiuscunque speciei decursus, totius illius morbi temporis, nunc vna septimana, nunc pluribus perficitur, interdum vix mensibus aliquot absoluitur. Quo tempore febris aliquoties inuadit, tempusque illud inuasionis Accessio dicitur: quâ tamen reliquum quoque febris tempus, quod horis nunc paucioribus, nunc pluribus completur, comprehendunt; quod Paroxysmum seu exacerbationem quoque vocant: licet magis propriè deterius febris tempus, vti in continuis quæ statis temporibus exacerbantur, dictum, sic appelletur. Tempus verò quietis, quo febris cessat, Remissio, anesis dicitur. Vtriusque verò temporis & febris accessio, & remissionem comprehendentes, per circulum veluti decursum, Periodum, circuitumve nominant: qui non eadem latitudine in singulis febrium generibus perficitur, sed ab eo die, quo accessio facta est supputando, die vel eodem, vel sequenti, vel tertio, vel quarto, vel quinto recurrit.

Tertio die quæ redeunt febres intermittentes, sunt frequentissimæ, Tertianæ dictæ; & nonnunquam in eandem horam, quâ prior accessio inceperat, insidunt: frequentius horis aliquot anticipant: aliàs maxime cùm declinare incipiunt, cunctantur: eumq; ordinem vel aliquam diu seruant, vel nullo certo ordine recurrunt. Harum accessio horarum interdum est quatuor, frequentius septem, nonnunquam ad horas duodecim & quatuordecim vsq; exporrigitur; totidemq; circuitibus quatuor scilicet, septem, duodecim, quatuordecim nonnunquam etiam pluribus factis cessat. Hæc omni tempore, æstati tamen magis consuetæ sunt, vti & iunioribus: quæ autumnio accidunt, & in senibus, diurnæ sunt, periculosæ non vacant.

*Quarta-  
na febris  
intermit-  
tens.*

Quarto die, quæ rursus inuadunt, frequentes quoque sunt febres, Quartanæ dictæ. Idque vel eodem anticipationis, aut cunctationis ordine, vel inordinate. Quarum accessiones totidem horis, vti tertianæ perficiuntur, plerumque tamen longiores sunt. Vti & totius febris decursus, longus admodum existit: cum rarius trium, frequentius sex mensium spatio primum conficiatur: ultra annum quoque nonnunquam, sed errore prorogatus, & ad duos vsque aliquando productus. Hæ autumnii tempore plerumque incipientes, vix ante veris initium desinunt, & mediæ ætatis hominibus magis familiares existunt.

*Quotidiana febris intermit-  
tens.*

Altero die quæ mox redeunt febres, Quotidianæ, quia quotidie inuadunt, dicuntur. Harum priuatum genus veteres statuerunt, ipsarumque accessiōem horis octodecim, intermissionem sex perfici scripserunt, Amphemerinam quoque vocantes. Alij verò rarissimam eam & ex sexcentis febribus, vix vnā talem inueniri testantur: alij penitus eam à febrium intermittētiū classe excludunt: quibus & nos consentimus. Ergo quæ quotidie inuadunt febres, non nouæ, sed ex priorum quoque generum sunt numero, tertianæ scilicet vel quartanæ, quarum alterutrum genus si corpus præhendat, & vel mox, vel in morbi progressu, vti ferè fit, illi altera accedat febris, vel sui generis vel alterius tunc cum plures sint vnâ cessante vno die, altera mox alio die sequitur, sicque quotidie accessiones, sed ob diuersitatem febrium non pares, nec iisdem horis sunt: idque tamdiu, donec priore terminatâ, alteraque adhuc permanente, ad pristinum ordinem diei, vel tertij, vel quarti, prout febris quæ remanserit, fuerit, redeat. Quod in Duplici tertiana, & Triplici quartana, quas Hemitritæos quoque sed non veros Font. vocauit, ordine tali ferè euenit. Sed & ordo hic interruptus est, duobusque diebus febris exerceat, vno intermittit, si Duplex quartana extiterit, vel tribus diebus accessio redit, vno desinit, si Tertianæ cum quartana febre coincidat.

Eodem die quo desit febris, si repetat,

nec tunc nouum intermittētiū febrium genus esse dicendum est: sed quando iam enarratæ febres quotidie redeunt multum accipiant, hoc euenire potest, vt vnâ cessante, mox eodem die altera quoque inuadat. Quod si anticipatio succedentis febris adeo præcurrat, vt in accessiōem prioris febris nondum finitam incidat, tunc paroxysmum, præterquam aliàs consuetum est, admodum prolongari necesse est; præsertim si quæ secuta est febris, circa finem alterius inceperit: quod si fiat, quod tamen rarum est, accessio ad horas decem & octo prorogari potest. Quod cum obseruassent veteres, forè hunc terminum longum quotidianis ab illis constitutis accommodarunt: cum tamen duæ potius sint accessiones, horrore nouo interueniente, qui tunc cum altera incipit, accedit.

Quinto & sexto quoque die, febres aliquas rediisse obseruatum est: quod tamen cum fit, nisi febris quæ penitus cessarat, per recidiuam quinto vel sexto die factam, suspicionem quintanæ vel sextanæ mouerit, cuius quoddam semel tantum vel iterum fieret, indicium foret; non alia quam Quartana erit febris: utpote quæ tantam moram trahat, vt quinto vel sexto die primum redeat: quod tamen insolens est.

*Quintana, Sextana febris.*

Accidentia febrium intermittētiū varia sunt; quæ & ægro molestiam pariunt, vt frigus, calor, sitis, capitisq; dolor; & functiones illius lædunt; excrementaq; immutant, de quibus ordine agemus.

Cum frigore non tantum febres intermittentes incipiunt, vti & continuæ, sed & singuli ipsorum paroxysmi postquam redeunt, cum oscitatione, pandiculatione, & frigore extremitatum, manuum, pedum, nasi, aurium se primum manifestant: succedente postea plerumque Rigore; cui symptomati præcipue Germani intenti, tanquam illi quod primò se offert, febres has Kältwee vel Frierer / frigidum morbum vocant. Hoc autem plus minusve urget, corpusque diuersimodè afficit, in varijs illius speciebus. Vehementer friget interdum corpus, rigorque vel de repente in tertiana, tardius paulo in quarta-

*Kältwee Germ. intermit-  
tens fe-  
bris.*

na succedit, quo corpus omne concutitur, dentesque strident, & corpus veluti feriri, membraque contundi, & grauari sentit æger. Sed & frigore mitiore vtraque nonnunquam, accedente horrore aliquo, vel etiam nullo incipit, diutius tamen tunc perseuerat. Vniuersum quoque corpus plerunque frigus occupat, & tam in exterioribus, quam interioribus sentitur: nonnunquam exteriora, alias interiora magis infestat. Sed & eodem tempore interdum quælibet corporis pars frigus & rigorem cum calore simul percipit, & tunc febrem Epialam vocant, & febris quotidianæ speciem, alij intermittētis, alij continuæ faciunt. Nos tamen hoc, tum cum intermittentes febres eodem die, vti dictum est, coincidunt, & frigus vnius, antequam calor alterius febris cessarit, incipit, accidere posse putamus. Vel etiam quando intermittentes cum continuis, sicuti in hemitritæo ostensum fuit, concurrunt: cum in continuis calor semper perseueret, & intermittente febre accedente horror quidam & frigus in principio simul infestent.

Calor qui frigus & rigorem mox sequitur, vel, vti dictum est, cum frigore mox se, vel in iisdem partibus diuersisve intus forisve profert, vehementissimus est in tertianis quibusdam, mox accensus, & in vniuersum corpus effusus, acer, & tangentis sensum quoque feriens, mox ad vigorem tendens, sed statim mitescens. In alijs remissior, nec adeo totum corpus occupat, atque igni è viridibus lignis succenso comparatus: sicuti in tertianis diuturnioribus euenit. Vehemens quoque in quartanis non tamen toto corpore æquabilis, sed cum quadam frigoris permixtione, & artuum, ossiumque, veluti dolore sensum mouet.

Sitis præ cæteris symptomatibus vehementer tum in tertianis, tum in quartanis ægros affligit, quæ veluti enecti, continuè frigidam efflagitant, eaque haustâ mox aliam expetunt. Sed & nonnunquam durante adhuc frigore, tum præsertim cum foris est, interiora verò calent, potum quoque expetunt.

Dolor capitis interdum superuenit: alias

ab initio mox molestat, in processu verò illius cessat.

Functionum mutationes spectantur potissimum in hisce. Quod delirant interdum durante paroxysmo: Inquieti quoque sunt, corpusque iactant & denudant, dum calor in summo est; Vigiliæ interdum adfunt: Alias somnolentia quoque premit, præsertim in infantibus. Respiratione magnamultum hauriunt spiritum: Pulsus initio paroxysmi paruus, postea celer & creber, magnusque fit inæqualis plus minusve. Debilitas, nisi vires quietis tempore recoligantur, sequitur. Syncope quoque in quadam specie, quam etiam Syncopalem vocant, interuenire solet. Vomitiones sub finem rigoris amaræ frequenter accidunt: Sudores copiosi, vaporosi, & calidi plerumque post singulos paroxysmos sequuntur, per quos febres hæ inclinant, & tandem ijs perseuerantibus iudicantur: Accedente quoque nonnunquam frequenti mictione. Hæmorrhoides quandoque, vel menses superueniunt.

Excrementorum alterationes in Urinis spectantur, quæ flauæ aut flammeæ, substantiæ mediocris, vel mox in tertianis, vel postmodum in quartanis, in quibus primis ferè diebus albæ seu aquosæ existunt, apparent: sed & nigra in quartanis non semper mala, si materiæ per illam fiat expurgatio, censebitur. Deiectiones quoque biliosæ flauæ admodum, interdum & atræ, tum sumpto pharmaco, tum naturâ sponte agente, videntur.

#### Causæ.

**F**ebrium omnium enarratarum generum causa prima est morbus. Qui est interperies calida, seu calor præter naturam, omnes totius corporis partes, calidiores quàm par est reddens. Sic autem & febris ipsa tanquam morbus definitur, licet calor ille febrilis, qui certis in locis tactu deprehenditur, & ab ægro per sentitur, quatenus molestiam illi præbet, inter symptomata quoque fuerit recensitus. Huius autem caloris, seu morbi, seu febris, primum sedes; dein essentia consideranda veniunt.

Sedes

Epiala  
febris, in  
intermit-  
tentium  
februm  
species.

Synco-  
palem  
febris in-  
termittentium  
februm  
species.

Interperies calida, vt morbus, causa omnium februm.



*Intem-  
perie cali-  
da subie-  
ctæ sedes,  
sunt om-  
nes toti-  
us corpo-  
ris par-  
tes, in o-  
mnibus  
febris.*

Sedes huic morbo subiecta, & quæ afficitur, non tantum aliqua est pars, sed omnes totius corporis partes: non solum carnosæ, quæ tamen facilius accenduntur, sed & membranae, ossæq; calorem hunc præternaturalem concipiunt. Inter quas tamen cor ipsum prius, antequam reliquæ omnes partes incallescant, accendi necesse est: cui mox consentientes promptè celeriterq; simul omnes, plus minusve, prout naturâ suâ magis aut minus calidiores sunt, accenduntur: quæ etsi corpus vndique ferè incaluerit & æstuet, spiritus sanguisque efferuescant, aut aliæ quoque partes principes, vt cerebrum, hepar, intemperie calidâ laborent; non tamen febrem, nisi cordi calorem prius communicent, aut illud antea calore affectum sit, efficiunt. Sed nec cordis calor levis, aut, etsi vehementer, momentaneus tamen sit, qualem per motum & iram, non tantum vniuerso corpori, sed & cordi ipsi accidere, ex pulsu & respiratione tunc concitatis deprehendimus, verum impressus & permanens, febrem potest inducere.

Essentia huius caloris febrilis præternaturalis non eadem in omnibus febribus inuenitur: pro cuius diuersitate, diuersa febrium superius explicatarum exurgunt genera. Est enim calor is vel aduentitius & mutabilis, quem igneam vocant. Isq; vel purus & simplex, corpus tantum accendens, puras seu non putridas dictas febres efficiens. Vel impurus. & putredine permixtus, corpus simul inquinans, impuras seu putridas febres creans. Vel malignus & putris simul: vel malignus tantum, corpus insuper inficiens: malignas, putridas, pestilentes, venenatas nominatas sub se comprehendens. Aut est insitus & constans calor hic febrilis, seu temperamentum in calidius conuersio, vnde corpus calidius redditur, à quo hæc febres appellatæ prodeunt. Quæ omnia quæ ratione fiant, tum à calore puro, tum putredine, vel qualitate maligna permixto, in his tribus causis iam ostendimus.

*Calor pu-  
rus, cau-  
sa febris  
Puræ  
seu non.*

Purus calor & simplex, qui solius caloris est exuperantia, prius ferè in spiritibus & sanguine, in venis & arterijs accensus, atque per has vias cordi continuatur, in hac materia

quæ cordi continuo infunditur, illudque aluit, cordi altius impressus, atq; inde per consequens singulis partibus communicatus; febres efficit Puras quoque seu simplices vocatas, continuas omnes: calore semel accenso non remittente, donec extinguatur: easq; vel solitarias sine alio affectu cursum suum absoluentes: vel alio morbo, qui illas sequitur, vel præcedit, comitatas. Quæ varietas inde primum procedit: quod causa morbifica harum febrium, vel in vasis permanet, vel extra hæc quoque profunditur.

*In vasis  
cordi con-  
tinuatur,  
sanguis  
ritum in-  
flammati-  
onis, causa  
febris  
Puræ  
continua*

In vasis, venis scilicet & arterijs, si sanguis accensus seu inflammatus, cor accendens, & febrem sic inducens, ad solutionem vsq; persistat, nec ex illis in alias partes effundatur; tunc prout vel non à morbo vel à morbo prodeunt, solitariae vel comitæ, quæ tunc symptomatice sunt, hæc sunt febres.

*In vasis  
maneat  
solitaria  
rum.*

Si nullus morbus has febres excitat, sed à causa procatarctica initium sumpserint, sanguisq; vti dictum, accensus, in vasis permaneat; tunc solitariae nullo alio morbo illiusve accidentibus comitatæ aut impeditæ & priuatiæ dictæ, cum per se incipiant, erunt hæc febres; & pro ratione caloris plus minusve acutæ; breuiore ferè, cum illarum calor die vno vel altero, nisi in putrem conuersus putridas febres excitet; vel altius impressus, hæc tunc pariat, mox iterum remittat, penitusq; cesset. Quod illis non ea ratione, sicuti voluerunt, accidit; vt nimirum si spiritus tantum incalescant, eodem die calor rursus euanescat, ephemeraq; tunc fiant febres: si sanguis verò accendatur, paulò longius calore perseverante, synochi: si cordis substantiam occupet, diuturnæ hæc febres existant: cum in omnibus hisce speciebus, & spiritus & sanguis, quæ in vasis confusa, separatim accendi nequeunt, simul, & vnâ cum illis cordis quoq; substantia, inflammatur: omnisq; febris, vt & morbi omnes pro subiecto in quo resideant, non spiritus & humores, sed partem solidam habere debuerint. Sed hæc febrium diuersitas cum ratione causæ, à qua excitantur; tum subiecti corporis quod occupant, accidit.

*Causa  
procatar-  
ctica san-  
guinis ex-  
citans  
causa fe-  
bris Pu-  
tridæ  
seu  
primari-  
arum.*

Causæ externæ, quæ has febres excitat, ratione, prout hæc in corpus agit, diutiusve

perseuerat, hæ febres in tempore & magnitudine variant. Quæ causæ, vel ex ambientibus, aut assumptis, vel motu corporis procedunt.

Ex ambientibus, corpus accendunt per se, Aër calidissimus, Aqua feruens, si diutius in ijs præsertim in sole vel balneo moram trahant. Ex accidenti quoque vehemens refrigeratio, & subitanea, extrinsecus ab aëre vel aqua, potissimum dum corpus admodum calet, facta: quia calor ad interiora subito à frigore externo percussus, spiritus, humores, visceraque interna, & vnâ cum illis cor inflamat, febres eiusmodi nonnunquam excitat: quod hac ratione accidere probabilius est dicere, quàm quod à frigore cute astrictâ, porisque obturatis, quia tunc aëris via interclusa, ab eo sanguis perfuari (quod illi euentilationem vocant) non possit, is accendatur vel putrescat (sicuti existimarunt) hoc eueniat; cum nos sicuti respirationis necessitatem non cordis refrigerij causâ, quod cor, cum secundum naturam se habet, non indigebat, institutam fuisse alibi docuimus: ita quoque transpirationis vsum, non vt sanguis refrigeretur, cum temperatus existens id non requirat; sed excrementorum potius euacuandorum causâ, vt in putridis febribus, quæ ab hac intercepta proueniunt, explicabimus, ordinatum fuisse, asseramus.

Assumpta quæ actu vel potentiâ vehementer inflamment, præsertim si subito penetrent, idem præstare possunt. Qualia imprimis vinum meracissimum, & ab illo elicitâ aqua, ardens dicta, affatim bibita, possunt efficere. Sic & anacardinam confectio nem sumptam, febrem suo calore excitare posse scribunt. Verùm nec cruditatem, nec ciborum corruptionem, hæ febres, sicuti docuerunt, sed vel alios morbos, aut febres putridas potius quàm puras excitare, suo loco ostendemus.

Motus corporis vehemens, celer præsertim, corpus nimium calefaciendo, febrium harum causa esse potest: sicuti in equis, si nimium impellantur, videmus accidere: quos tunc febricitare ex cita respiratione & calore extremitatum, & sudore, facile deprehen-

dimus. Quod & validus motus corporis continuatus, vel repetitus potest efficere: cuius causâ mulieres, si in partus difficultate diu laborent, febre quoque accenduntur: quam & dolor, si ille simul adsit, adauget. Sed & animi motus immodici per vigilias, inprimis subitanei, & præsertim per iram, nonnunquam & per terrorem & gaudium facti, si nō tantum spiritus & sanguinem agitant, sed & cor simul admodum accendant, febres excitant. Merorem verò & metum non nisi interueniente putredine, hæ febres efficere posse existimamus.

Subiecti corporis, quod febribus hisce corripitur occasione hæ febres præcipue variant. Corporis autem quævis constitutio hæc febres suscipere potest, si causa eam euincat externa, à qua calor excitatus, prout vel in corpus quod temperatū, vel calidiū, vel impurum etiam, incidit, febres hæ pro diuersitate constitutionum variant.

Temperatum enim corpus, si à causis aduentitijs accendatur, cum diutius in eo calor persistere nequeat, sed corpus mox iterum ad suam temperiem redeat, breues Ephemeræ, quæ primo die plerumque cessare solent, febres gignuntur. Quarum & calor ob eandem causam mitior existens, nullas insignes in corpore mutationes parit, & cum impurus minimè sit, sine horrore incipit, & sine crisi, sensim per sudores, quia in illis quoque aliqua fit propter calorem exhalatio, expirat.

Calidior corporis constitutio ea est, quæ ad calorem suscipiendum magis apta existit. Quæ si à causis externis accendatur, tunc utrinque accedente calore, Synochi simplices febres, quæ diutius perseuerant, caloreque vehementiore vrgent, prodeunt. Talem autem constitutionem, vel sanguineam, vel biliosam existere necesse est.

Sanguinea dispositio, eo citius à causis aduentitijs calorem cōcipit, quod maior est sanguinis copia, vel is calidior existit. Proin & iunioribus, & plethoricis, & naturâ calidioribus, & quibus consuetæ sanguinis hæmorrhagiæ per menses, hæmorrhoides, narium fluores, suppressæ sunt, febres hæ facilius accidunt, quæ & ob causæ efficientis cum adiuvante concursu, supra vnum diem, ad duos

*Sanguinis et spirituum, in tempore, in vasis, à causa externa, inflammatio, causa febris Ephemeræ.*

*Sanguinis et spirituum, in plethorico corpore, in vasis, à causa externa, inflammatio, causa Synochi sanguinea.*

duos vel tres vsq; extenduntur, Synochiq; simplices sanguineæ dici possunt: Maiore æstu, alijsq; symptomatis ob enarratas causas quoque affligentes: alioquin, eodem modo, vt ephemeræ, incipientes & desinentes.

*Sanguis in et spiritus, in bilioso corpore in vasis, à causa externa inflammationis, causa Synochi biliosa.*  
 Biliosam constitutionem promptè quoque, cum calidior sit, eadem causæ accendunt, febremque synochis similem efficiunt, quam synochum simplicem biliosam vocare possumus. Cum præter ea accidentia, quæ bilis proferre solet, quibus insuper molestat, in reliquis, nisi in putridam commutetur, eundem processum, quem sanguinea febris, seruat.

*Sanguis in et spiritus, in impuro corpore, in vasis à causa externa inflammationis, causa Synochi desinens.*  
 Impurum corpus si à causis exterioribus febrem cōcipiat, tunc si sanguis impurus ad putredinem aptus sit, simplex & pura febris diutius minimè manet, sed cum putredinem mox sanguis concipiat, febres hæ in putridas (sicuti in illis explicabimus) synochos quoque, sed putridas dictas, longioresque permutantur. Quod si verò sanguis impurus nonnihil, nondum tamen putredini obnoxius sit, tunc Synochus simplex & pura adhuc, nondum tamen putrida permanet, accidentiaque quoque & plura, & vehementia, quàm priores synochi, hæc adfert; Frequentius tamen de vitioso hoc sanguine naturæ portionem illius aliquam è venis propellente, synochus inde comitata, vti illic dicitur, nascitur.

*Morbis calidis sanguine & spiritum accendens, causa febrium Purarum symptomaticarum comitata.*  
 Si à morbo aliquo eiusmodi febres oriuntur, sanguisque accensus in vasis adhuc persistat, tum symptomaticæ, cum morbum sequantur, Simples hæ febres appellantur. Quæ quoque, nisi ratione morbi permutati in putridas symptomaticas abeant, aliquo modo ad prædictarum à causa externa genitarum febrium, ephemerarum nimirum vel synocharum naturam, etsi causa morbi comitis decursus, symptomataq; ipsarum nonnihil commutentur, accedunt.

Cæterum morbos, qui hæc febres inflammatas symptomaticas excitare possint, eos partis alicuius esse necesse est, qui calorem tantum effundant, vt vicinum primum sanguinem in parte contentum, & copiosius nonnunquam doloris causâ, quem eiusmodi calidi morbi plerumq; adferre solent,

ad eam attractum, atque inde continuatione sanguineam massam reliquam, corque ipsum intermedio huius accendant. Quales morbi calidi, qui febres excitare possunt ab humoribus calidis, sanguine scilicet & bile tantum, cum ex humoribus soli hi citra putredinem aut corruptionem febres accendere queant, ferè nascuntur.

*Sanguis novus morbus, causa febris Ephemeræ, vel Synochi, Symptomaticæ.*  
 Sanguis, non è venis causâ febris præcedentis excidens (de quo postea agemus) sed aliam ob causam, veluti calore, doloreve commotus in partem influens, illicque vel intemperiem solam, quæ in tenerioribus corporibus quoque febrem excitare potest; vel inflammationes, erysipelata, diuersorum, pro sanguinis influxi varietate, generum, accendens, febris eiusmodi inflammationes sequentes procreat. In quibus febribus, sanguis accensus è venis quandoque excidens (sicuti postea ostendetur) inflammationes has, vt iterum recrudescant efficere, vel alias de nouo excitare potest. Quæ simplices & puræ non putidæ (vti voluerunt) ab initio harum inflammationum, cum adhuc nihil in illis sit putridi, quoque existunt, & pro ratione morbi caloris vel adaucti augmentur, vel remittentis remittunt: atque antequam ille penitus soluatur, ferè cessant; nisi supuratione facta, nouo superueniente dolore, vel putredine tunc oborta, recrudescant. Tales autem febres symptomaticæ in varijs morbis calidis (sicuti in illis morbis explicabitur) occurrunt; tum viscerum carnosorum, membranarum; tum aliarum partium: Eò vehemētiore longioresve, si morbus cordi, maioribusve venis magis vicinus sit, calorque in eo maior, corporaque calidioris naturæ existunt, quæ & facilius febre incalescunt: sicuti & infantes, ex sola dentitione, gingiuis accensis, febriculâ affici videmus. Alias verò mitiores, breuiusque, si procul à fonte caloris absint, & præsertim extrinsecus occurrant: in quibus vix calor, sed horror duntaxat aliquis, vnde horripilationes vocant, deprehenditur. Interdum verò neque ille adest, suntque in quibusdam inflammationibus omnino apyreti.

*Biliosus morbus causa febris.*  
 Biliosus humor calidissimus & feruentissimus, interdum, sed rarius eiusmodi febribus oc-

bris E-  
pheme-  
ra, vel  
Synochi,  
sympto-  
matica-  
rum.

bus occasionem præbet. Quando nimirum is non in proprio receptaculo contentus, quod minimè solet afficere, neque sanguini adhuc confusus, seroq; dilutus, quibus ardor illius cōtemperatur, & non nihil restinguitur (quæ de causa nec ictericis febres inde prodire obseruamus) sed secretus ab ijs in partes sensiles, ventriculū & intestina infusus, substantiæ ipsorum se insinuans, erysipelataq; procreans, qualia circa ventrem fieri, & febres Lipyrias, in quibus interiora vruntur, excitare solere docet Aëtius, ardorem & dolorem intolerabilem, circa ea loca efficiens, sitimq; inextinguibilem procreans, nisi à natura, vti ferè fit, per excretiones cōtinuò reijciatur, retentus, vicina quæque, vna cum sanguine & spiritibus accendens, eiusmodi febriculas quoque, interdum tales morbos sequentes, profert. Quales in cholera morbo, bile supra infraque, & dysenteria, per sedem, meracissimā reiectā; & colicis cruciatibus ijs, quos à bile & erysipelate intestinorū accidere, suo loco explicabimus, comites aliquando adesse, sæpenumerò deprehendimus. Quæ tamen magnæ, cum causa illarum procul à corde, circa venas meseraicas lateat, esse minimè possunt.

E Vasis  
sanguis  
nis infla-  
mati, Sy-  
nochi  
febrē ex-  
citantis  
portio in  
partes ef-  
fusa, cau-  
sa febrili  
Synochi  
rum, pri-  
maria-  
rum, co-  
mitata-  
rum.

Extra vasa iam enarrata maiora si sanguis accensus, à causis explicatis, cor inflāmans, febremq; excitans, portionē illius aliquam in partem internam externamve effuderit, (sicuti sæpissimè fit, quando ob copiam illius, vel feruorem & tenuitatem, vel etiam impuritatem aliquam naturæ grauem, in venis subsistere nequit, & vel statim in prima febris inuasionē, vel mox postea vi naturæ propulsus, è venis expellitur, veluti in crisi harum febrium aliquando per hæmorrhagias se natura exonerat) tunc in partibus ad quas fertur, novum morbum excitando, febres comitatas dictas, quia tunc morbos comites nanciscuntur, non tamen symptomaticas, vti hætenus creditum est, cum morbum non sequantur, sed illum præcedant, illiusq; sint causæ, sicuti declarabitur, procreabunt. Quæ proin iam non omnino reliquarum solitiarum simplicium febrium cursum aut naturam seruabunt, sed morbi superuenientis accidentibus vel auctæ, vel im-

peditæ, pro diuersitate illorum, breuiores vel longiores, & plus minúsve acutæ euadent: & quando natura bonam quantitatem sanguinis accensi à venis effudit, non ita æ-

Sanguis  
nis infla-  
mati, in  
febre Sy-  
nochi, in  
viscera  
interna  
effusio,  
causa fe-  
brili Sy-  
nochi  
quas eius  
modi vi-  
scerū in-  
flamma-  
tiones co-  
mitatur.

In viscera interiora aliqua ad suscipiendum idonea, eiusmodi influxus in hisce febribus sæpè fiunt: eaque præsertim quæ carnosæ & sanguinea, venisque copiosis referta, illarum intermedio maioribus venis continuata, ac illis vti & cordi vicina sunt: Potissimumq; eo nomine in pulmones; quos dum inflammant, pleuritidem vel peripneumoniam (sicuti in illis affectibus ostenditur) procreant. Neq; enim vti hætenus persuasum, eiusmodi inflammationes febres istas præcedere nec procreare, vti multis ostendere possemus, sic hoc satis declarat; quod hæ febres antequam punctorius dolor aut inflammationis indicia se demonstrent, cum horrore & subsequente calore inuadant, & quandoq; horis aliquot illa præueniant, nec proin ab illis inflammationibus, aliter quàm quod à febribus prius excitatæ, nouo calore in viscere cordi vicino argeantur, accendantur. Quod tamen febrem non tunc primū incepisse satis demonstrat: multoque minus putridam eam esse (sicuti quoque existimantur) cum & ab inflammatione calor ille suscitatus, copiā suā potius quàm putredine febrem augeat: nec dum aliquam, ab inflammatione præsertim primū facta, putredinem sibi asciscat: nisi fortè quando sanguis in hisce inflammationibus suppuratur, hoc fiat, vnde & tunc pure genito eas augeridocui Hippoc. Quod tamen fortè quia propter dolorem, qui tunc quoque augetur, febris exacerbatur, potius, quàm quod ex putrida exhalatione noua putrida febris superueniat, cum mox quoque cesset, fieri credimus. Nisi vlcere aut corruptione aliqua viscerum, hæce inflammationes sequente, vt cum pleuritis vel peripneumonia in phthisim conuertuntur, febre hac tunc in putridam hecticam symptomaticam dictam conuersa, hoc accidat: & sicuti mox in putridis dicemus febribus,



bus, sanguine in illis putrido excusso è venis, illud eueniat. Quæ omnia vti in pulmonibus frequentissime, ob situm illorum & constitutionem ad influxum hunc recipiendum apta, vti dictum, eueniunt: Sic & sanguine in hisce febribus synochis, in hepar lienemve effuso, cum viscera quoque sint sanguinea, vasaque magna admittant, eadem ratione inflammationes in illis, quæ febres hæc sequuntur, easque augment, nasci possunt. Quæ febres in omnibus enarratis viscerum inflammationibus, cæteris synochis solitarijs longiores, pro ratione morbi comitis, fiunt: atque variant prout vel inflammationes veræ sunt, quarum febres Phlegmonodeis vocant: vel erysipelas potius, cuius febres tunc acutiores existunt, & Typhodeis appellantur, etsi hoc nomen febrili, quæ hepatis erysipelati copulatur, propriè accommodatum sit: vti & febres ab erysipelate pulmonum, priuatim Crymnodeis vocarunt. Sed & sanguine nonnunquam in eiusmodi febribus in cerebrum, quod sinibus amplis suis sanguine facile impletur, excusso, idem fieri potest: tuncque huic febrili cerebri inflammatio, quæ subito cum delirio in phrenitide, aliàs tardius, dolore capitis præcedente, & vt ad cerebrum potius sanguis feratur, occasionem quoque præbente, copulatur, eamque acutam & periculosam facit. Quod & in ventriculum, intestina, vterum, vesicam, sanguine in febribus dictis expulso, vt hæc inflammationes eas comitentur, fieri potest. Verum cum alia via, quæ in viscera carnosa ducit, ad suscipiendum conuenientior sit, illaque viscera membranæ venas meferaicas tantum admittant, vel alioquin procul à vasis maioribus & corde absint; cum hæc partes inflammantur, ob dolorem qui partibus illis sensibilibus facile accedit, euenit, vt febres potius inflammationes sequantur quam antecedant, & (vti superius dictum est) symptomatice existant. Sicuti quæ partibus carnis accedit inflammatio, cum sine sensu existentes, dolore non ita afficiantur, à febribus potius, vt dictum, procedit, illarumque est symptoma.

*Sanguis inflammatus in*

In alias partes internas febres dictæ, sanguinem è venis interdum quoque profundunt.

Vti in colli musculos & glandulas, illicque inflammationes in ore, lingua, faucibus, & anginas, quæ eas sæpe sequuntur excitant. Sed & fit, vt licet non à febribus, sed alijs de causis incipiant, tum hæc, tum priores inflammationes, febre superueniente, nouaque materia affusa, vt in inflammationibus prius dictum, denuò repetant vel augeantur. Verum & arthriticos tumores & dolores, eiusmodi febriculæ interdum præcedunt, naturam per eas sanguinem in articulorum sedes propellente, qui proinde nisi abstruso sint loco, rubore & tumore tunc fiunt conspicui: ita vt qui ad articulorum morbos dispositi sint, ex leui causa febre hac præhensi, naturam ad extremitates corporis se exonerare consuetam, vel in articulorum regionem, vel cutis superficiem, in podagra vel carbunculo dicto, vt mox ostendemus, quæ duo mutatis vicibus, aliquos affligere solent, in hos affectus incidant. Cæterum licet & hæc febres, catarrhos nonnunquam præcedant, eosque promoueant, quia tamen hoc non materiam illis præbendo faciunt, sed calore suo fluxiones mouent, à solitarijs non differunt: quæ & alijs morbis quoque copulari possunt.

In corporis superficiem, cutem præsertim, glandulas, interdum & membranas interiores simul, sanguinem in hisce febribus synochis natura sæpe exonerare solet, illicque rubores, ardores, tumores vel pustulas excitare: quæ aliàs citius, aliàs tardius prorumpunt: & prout sanguis vel purus, isque vel tenuis aut crassus, vel flavus, vel ater, vel ferus, aut aliàs impurus, nondum tamen puris (de quo postea) tumore, colore, dolore, diuersimodè se, cum hæc conspicua fiunt, manifestant: sicuti hæc prolixius alibi in illis morbis explicabuntur; cum hic tantum obiter, quatenus febres, quæ hæc producunt, inter se differant, sit ostendendum. Quæ differentia potissimum ex eo, quatenus vel tumores, vel pustulas procreant, oritur.

Tumores vel rubores frequenter profertur hæc febres Synochi, quæ Carbunculum (vti dictum) nominant. Quæ adeo consuetæ sunt multis naturis ad hæc inflammationes (ob sanguinis caliditatem, tenuitatem

*Sanguis inflammatus in corporis superficie, in febre Synocha effusus, causa febrili Synocha, quæ bubones, erysipelas, et alia materiam, exanthemata, anthracas, comitatur.*

rem, ferofitatem, vel impuritatem) difpofitis, vt vel leui aliqua ex caufa, vel faltem fanguine in venis efferuefcence accenfæ, certo tempore illos inuadant, nec fenibus, & illis qui etiam alijs morbis conflantur, vt po-  
tagrâ, parcant. Hæ diariarum inftar fe profe-  
runt, vti iam explicatû: quas rariùs eodem,  
frequentius altero primùm vel tertio etiam  
die, tumor in glandulis venarum maiorum  
diuifionibus atratis in inguinibus, in alis, in  
circuitu menti, fi in illas fanguis feratur, fe-  
quitur, cû moleftia faltem aliqua interdum  
in illis locis fe offerente, nonnunquam & in-  
flammatione. Frequentiffimè verò fanguine,  
in crurû infimas fedes descendente, pruritus  
illic primùm & ardor, fedem illam in  
ambitu malleolorum diuexant, poft eaq; ru-  
bore pars illa, fi eryfipelas fit, flauefcente,  
nonnihil interdû, vel fufco, prout fanguiste-  
nuis qui affluit, exiftit, fuffunditur: aliquan-  
do & in tumorem attollitur & inflammatur,  
fi eryfipelas fit phlegmonodes, fanguine pu-  
riore eò defluxo; & fi ferofus fit, crure vni-  
uerfo in eryfipelate œdematofò intumefcente.  
Quos tumores, bubones, in inguinibus  
ex fanguine illos in defluxu alluente, nati,  
præcedere, & præfagire plerumque folent.  
Quibus omnibus citius, tardiùsve erumpen-  
tibus (vti dictum) febris remittere plerumq;  
folet; tantùm abeft, vt (ficuti hætenus cre-  
diderunt) hæ febres tunc primùm incipiant,  
illorumq; affectuum fint fymptemata, cû  
hi potiùs illorum exiftant; & febres hæ, an-  
tequam vllum indicium harum inflamma-  
tionum appareat, iam pridem eas præceffe-  
rint; & fi glandulæ tantùm intumefcât, cû  
tunc ardor magnus minimè fit, hæ febres il-  
las accendere minimè potuerint.

Ethymata in eiuſmodi febribus puris, et  
firin putridis & præfertim malignis hoc fre-  
quentius fiat, vti & ex fupradictis eruptio-  
nibus, aliquas quoq; prodire poſſe illic oſten-  
demus, interdum erumpunt. Vti & exan-  
themata illa rubra frequentius; quæ infanti-  
bus in febribus hiſce fynochis etiâ nondum  
putridis, fanguine ob copiam illius, vel di-  
fpoſitionem eam, quæ facîle inflammatur,  
in infantibus accenſo, erumpere interdum 3.  
vel 4. quoque demum die ſolent, & hac via

ſe expurgare. Quæ tamen tunc contagioſa  
minimè ſunt, ſæpeq; ſponte euaneſcunt.

Quod & eadem ratione per anthracem  
nondum peſtilentem, vel ſolùm alicubi e-  
rumpentem, vel cum bubone, natura inter-  
dum in febribus iſtis fynochis nondum pu-  
tridis, ſi ſanguis ater ſit, nondum tamen pu-  
tris aut malignus, aduſti portionem aliquam  
ſic expellens, moliri ſolet. Eodem ferè mo-  
do, vti in peſte correptis, vnde quibus priùs  
hæc non contigerunt, ſi vel ſupradictæ eru-  
ptiones, vel anthrax prodeant; ſe peſte cor-  
reptos ſibi ex metu perſuadent.

Putredine permixtus calor in putreſcen-  
tibus humoribus, vel corporis partibus pri-  
mùm excitatus, atq; inde cum exhalatione  
putri, vel aliqua putredinis portione ad cor  
vſque delatus, illudque putri calore accen-  
dens, & à corde in ſingulas corporis partes  
effuſus, febris facit Putridas dictas, tamdiu  
perſeuerantes, vel toties redeunt, quam-  
diu & quoties putris hic vapor, vel humor  
cor ferit. Quod tunc faciunt, quando illis in  
locis excitantur, à quibus ad cor vſque per  
certos veluti canales deferri queant, venas  
nimirum & arterias. Cum enim hæ tan-  
tùm ſint viæ, quæ cordi continuatæ, in i-  
pſius ſinus ſe ampliſſimis oriſicijs aperiunt,  
in eosque & humores & ſpiritus continuè  
infundunt, non per aliam viam putrida hæc  
exhalatio, aut materia, cor accedere, illudq;  
intrinſecus quoque, vti ſi febris fieri debuit,  
neceſſe erat, accendere potuit. Nam ſi ci-  
tra horum ductuum adminiculum, vapor  
putridus thoracis cavitatem penetrare, &  
capſulam cordis poſſet peruadere, eaque ra-  
tione cor accendere, perpetuè, ob putres  
exhalationes excrementorum in ventre in-  
feriore continuè congeſtas, febricitaremus:  
quarum tamen foetidam euaporationem, li-  
cet adeò ſubtilis & calida ſit, vt per crepi-  
tum excuſſa, ac adhibita flammâ accenda-  
tur, ad ſuperiora vſque pertingere minimè  
poſſe, aut partes aliquas illie inſicere, niſi  
fortè ob vitium, quod ſuo loco oſtende-  
mus, anhelitum foetidum faciat, ex eo, quod  
nullæ partes inde afficiantur, manifeſte pa-  
tet: Et licet venenata qualitas vbicunque  
ea fuerit & per quaſcunque vias feratur, cor  
ipſum;

ipsum petere possit, hoc tamen in putrida hac materia crassiore, quæ certis locis comprehensa coercetur, nec nisi per patentias vias corpus potest peruadere, minimè fieri potest: nisi ea manifestos hosce ductus, vti dictum, sequatur. Per quos sicut calor simplex ad cor vsque in spiritibus & sanguine delatus, febres simplices & puras dictas parit: sic quoque per eadem vasa putris exhalatio seu materia ad cor perueniens, febres putridas excitat, diuersorum generum, prout diuersis in locis materia hæc putrescit. Atque illa quoque non eiusdem est naturæ. Loci autem diuersitas, vnde præcipua oritur ipsarum varietas, potissima hæc est: quod materia quæ putrescit, vel in venis & arterijs, hoc est, in vasis, vel extra hæc vasa in partis alicuius humore: vel substantia, vti explicabitur, continetur.

In vasis, hoc est, venis & arterijs, humores qui febres putridas excitare debent, putrescunt: vel cordi continuatis: vel ijs quæ cordi nulla continuatione iuncta sunt: nihilominus tamen per vasa cordi continuata putrem exhalationem ad cor, possunt transmittere. Hæcque est causa, quod ex putridis febribus, aliæ continuæ sint, aliæ intermittentes.

*In vasis cordis continuatis sanguis in putredo causa febrium putridarum continuatis.* Continuada cordis substantiæ vasa sunt, vti dictum, arteriæ & venæ quoque, si meseraicas demas. In hisce itaque & amplissimis, & copiosis quoque per vniuersum corpus dispersis, si humor putrescat, cum illi per hæc vasa, in quibus lateret, ad cor aperta semper pateat via, assiduè putres vapores, vel ipsius quoque putridi humoris portiones ad cor demandans, illudque continuè accendens; continuas febres, quæ à principio ad integram vsque solutionem non cessant, & conclusæ, quod harum causa vasis inclusa sit, dicuntur, procreant. Quæ nisi ægrum prius ob causæ morbi que vehementiam iugulent, aut corpus vti dicitur, summo ardore colliquet, tardius cessant, & tandem perseuerant, donec materia hæc putris, continuis exhalationibus, quas diffundit, calorq; febrilis assiduè dissipat, tandem consumatur, & quod reliquum est naturæ efficaciam, vbi concoctum elaboratumq; fuerit, im-

petu quodam violento, per crissim perfectam, in qua natura morbo non oppressa succumbat, expellatur. Cæterum humor in vasis putrescens, qui febris causa est coniuncta, causaq; illius antecedens, putredinem in eo accersens, rursum consideranda veniunt.

Humor in venis & arterijs putrescens, Sanguis est: cum enim calidus & humidus sit, facile putrescit: eadem ratione, quæ illum extra vasa effusum corrumpi videmus & putrescere. Verum vniuersus, nisi ad extremum vitium peruenerit, vix putrescit, sed quantitas quædam illius duntaxat, remanente semper sanguinis aliqua portione meliore (etiã si & propter morbum & inedia, quam patiuntur ægri, nullus novus dum ægrotant gignatur sanguis) qui vel à putri sanguine separatus alijs in locis consistit: vel etsi illi permixtus est, ab eoque incaluit, nondum tamen, quia minùs aptus erat, computruit, & dissipatà putri materiâ, mox ad pristinam puritatem redit: sicuti hæc ex sanguine detracto consideratoque, qui nunc purus, mox impurus, interdum, vti dictum, confusus effluit, obseruamus. Sed nec, etsi ex diuersis partibus constet sanguis, separatim vna aliqua ex istis, reliquâ intactâ, potest putrescere: sed quocunque loco putredo illum inuaserit, & tenuiorem, & crassiorē, & mediæ consistentiæ, & pinguiorem potius quàm crudiorē (cùm talis sanguinem elaboratum perfectumq; minimè, sicuti alibi ostendetur, constituat) illius partem affici simul necesse est, cùm ex ijs non distinctis separatisque (quales tamen in sanguine detracto frigoreque concreto, aliquo modo dissitas ostendere nobis conantur) sed penitus inuicem confusis, sanguinea massa, quamdiu in venis existit, constet: nullaque vel minima sanguinis portio, quæ non ex illis partibus constet, existat: & serum quoque putredinis hac labe infectum, manifesta illius, tum per vrinas, tum per sudores excretum, proferat indicia. Ob quam causam febrium putridarum diuersa genera, non ex eo, quod diuersæ illius partes, quas humores, sanguinè, bilem flauam, & atriam, pituitamq; vocant, putrescant, vti vo.uerunt, proficiuntur, sed pro loci in quo

putrescit, & sanguinis qui putrescit, diuersitate exurgunt.

Loci causâ in quo sanguis putrescit, febres hæc admodum variant: primum quatenus in Venis vel Arterijs putrescit.

In venæ cauæ ramis, sanguinis hæc putredo, febres putridas gignens, perpetuò ferè latet: ijsque plerumque maioribus: in quibus & maiori copiâ coaceruari, & promptius inde cor potest afficere: quod tamen si in minoribus duntaxat consisteret, fieri minimè posset: vel si plures impleteret, in vicinas magnas venas mox quoque penetraret. Itaque in trunco venæ cauæ sursum deorsumque à cordis regione iuxta spinam delato: vel ramis maioribus ab illo, circa iugulum & inguina propagatis, putredo hæc in sanguine contenta, cor continuò afficiens, putridas diuersas, prout cordi plus minúsve putredo vicina est, efficit.

*In venæ  
cauâ se-  
de cordi  
vicina,  
sanguis  
putre-  
do causâ  
februm,  
Synochi  
putridæ,  
Causa  
vix, Lys-  
piria.*

Vicina cordi putredo, cum cor pariter vehementia exerceat, ipsiq; tum portionem, tum exhalationes continuò demandet, febres quæ nullo ordine exacerbantur, quales Synochos esse diximus, præcreat: quæ tamè incrementum decrescuntve, vel in eodem persistunt, prout putris vel augetur, vel minuitur, vel aliquandiu æqualis persistit materia. Sed & in Causone, quia focus illius cordi propinquus, illud quoque æquali igne continuò flagrat, nullæ mutationes manifestè apparent: præsertim cum ad summum progressus calor, intendi vix vltèrius citra ægrotantis interitum possit: nisi quòd interdum circa thoracem, vel præcordia, circa spinæ ductum in dorso, vbi putris latet materia, non tantum cordi, sed & vicinis quoque partibus illic molesta, ardor intensus ab ægro percipitur: quæ & causa est, cur in ea Lipyrria febre, quam aliqui causonis speciem faciunt, interiora viri videantur.

*In venæ  
cauâ se-  
de à cor-  
de magis  
distante,  
sanguis  
putre-  
do, causâ  
februm  
Synochi  
vix, quæ*

Distans nonnihil à corde putredo in venæ cauæ ramis, quia cor pari impetu, vix ea quæ cordi propinqua est, non pulsatur; idcirco & febres, quarum calor non semper ideò existit, sed quæ suas exacerbationes seu paroxysmos habent, gignit. Cum enim exhalatio tunc putris, cuius focus procul abest, ob viarum ambages nonnihil impedita, nõ pos-

sit, eadem mensurâ semper & ordine ad cor <sup>exacer-</sup>perferri, sit, vt tunc præsertim cum maiori co- <sup>bantur.</sup>piâ coaceruata est, ad cor potentiùs feratur; illudque tunc validius pulsans, calore aucto, exacerbationes nouas causet; non tamen cum horrore, vti in prima febris inuasio fit, incipientes redeuntisque, cum in corpus iam febre accensum, accessiones hæc non à febre liberum, vti prima, incidant. Quæ rursum, cum euaporatio hæc nonnihil discussa est, remittunt, non tamen febris cessat, sudorêve aut alia excretionem ad extremam morbi solutionem, sicuti febrium intermittentiũ paroxysmi, finiuntur, cum calor semel accensus, etsi causa eam excitans nonnihil remittat, nondum tamen cesset, extingui ob eam causam minimè possit: sicuti nec simplicem calorem à causa externa excitatum, etsi causa remota sit, non tamen, donec sensim cor ad suam intemperiem redierit, citius febres cessare, ostensum est. Estque hæc potissima veriorque causa, quare febres paroxysmis quibusdam interdum acuantur: qui frequentius Vno die bis, cum exhalatio putris multa nec ad eò procul diffusa est: Altero verò semel tantum dissipata priore die insigni illius portione, redeunt, eumque ordinem pro causæ agentis ratione vel aliquoties seruant, vel immutant. Sed & fit, vt cum causa procul abest, parciòrve existit, Tertio primum die, ordine hoc aliquandiu deinceps seruato, exacerbationes hæc redeant: rariùs Quarto; Alteròve tantum die: quorum omnium causâ febres continuæ putridæ, vel ordinatæ, vel inordinatæ, quotidianæ, tertianæ, quartanæ distæ sunt. In eiusmodi autem febribus continuis, quarum causa à corde procul remota in venis latet, ijs in locis vbi ea consistit, grauedo, dolor & ardor in vicinis locis, iuxta ceruicem, lumbos, & ipsis quoque artubus ægrotantem affligunt: capitisque ferè dolor omnes, nonnunquam & delirium, ob euaporationem potiùs calidam eò vsq; quoque pertinentem, quam quod in cerebro putris hæc materialateat, infestant. Fieri etiam potest in hisce omnibus febribus putridis, siue materia cordi vicina, aut distans in venis lateat, vt portione illius aliquâ e venis vi naturæ excusâ,

*Ex venæ  
cauâ, san-  
guinis pu-  
tridæ fe-  
brem pos-  
sibile est*



*atantis portio in partes effusa, causa febris Putrida tum continuatur morbo alio comitatur.*  
excusâ, sicuti hoc in puris febribus frequenter accidere diximus, vt eâdem ratione se exonerans natura in interiores exterioresve corporis partes, in illis vt in alijs, vitia, non iam puram inflammationem, sed putredinis indicia proferentia, tumores nimirum, pustulas, & maculas excitet. Sicuti hoc frequenter in iunioribus euenit, illaque e&thymata & exanthemata tam copiosa, in febre ipsarum, synochum putridam tunc vt & Fernel. testatur referente, erumpunt; quæ tamen contagiosa minimè erunt: qualia nihilominus vitia, non solum putredinis, sed & malignitatis notas præ se ferentia, tuncq; contagiosa, in malignis febribus se manifestare, illic ostendemus.

*In arteria magna sanguinis putredo causa.*  
In arterijs sanguinis hæc putredo an fieri possit, eâdemq; ratione febres excitare dubium est. Hic enim cum spirituosus sit & calidus, faciliè quidem accendi potest, caloremq; simplicem cordi communicando febres puras seu simplices, vt in illis dictum est, excitare: vix tamen solus aut separatim à venæ causæ sanguine, cum purissimus sit, poterit putrescere: nisi vel simul cum ab illo ab eadem causa mox putrescat, vel ob viciniam, ab eo semina quoq; putredinis concipiat: præsertim cum exhalationes à putrido sanguine profectæ, per has quoq; vias, tum in hisce febribus putridis, tum intermittentibus, vt dicetur ad cor deferri queant. Quod si igitur in arterijs quoq; enaratis de causis, putredo nascatur, febres sine dubio prodibunt ardentissimæ: quales Causones esse diximus: idque præsertim, si in arteriæ magnæ trunco cordi vicino hoc accadat.

Sanguinis diuersitatis causâ, hæ febres inter se quoque non nihil differunt: prout is Temperatus, Intemperatusve antequam ipsius occasione febris excitetur, sese offert.

*Sanguinis temperati in vasis putredo, causa synochi putridæ.*  
Temperatus sanguis, nullo vitio, nisi fortè copiâ suâ peccans, & proin ex sua natura minimè putrescens, si putrescat, febres efficit Synochos dictas putridas: quæ vel ex simplici synocho, sanguine prius accenso, & postea demum putrescente, putridæ sunt: vel etiam tales mox à principio causarum externarum occasione euadunt. Vnde &

harum principiū ephemeræ aliqui putres, cum à causis externis prodeant, vocant: nos tamen cum putris hic calor, vt simplex, non die vno, imò pluribus vix dum cessare possit, ephemeræ appellare minimè possumus, sed synochos putridas, cum in illis tum ratione sanguinis moderati, calor mitior quâ in cæteris continuis putridis, & æqualis magis, deprehendatur, nullas exacerbationes habens ( nisi quatenus is calor augeri minuiue potest) tum eiusdem sanguinis æqualitatis causâ, tum quia cordi vicinus in maioribus vasis primùm à causis externis afficitur, vnde pari impetu cor feriri diximus.

Intemperatus verò, si antequam putrescat sit sanguis, calidiorem eum, quàm naturaliter aliàs existit, esse necesse est: cum frigidior & crudior cachexiam potius, quàm febres procreet. Talis autem si ante febris inuasionem existat, siue tenuior aut crassior sit, maius quoq; cum computruit, parit incendium: eoq; maius adhuc, si, vt dictum est, in arterias quoq; eiusmodi putredo prorepat; vel aliàs cordi admodum vicino loco oriatur: quibus causis concurrentibus febres sunt Causones, immenso æstu, in eodem statu aliquandiu, vt dictum, perseuerantes, ægrumq; fatigantes, adeoq; sæpè, si plures accedant causæ, inflammantes, vt (nisi æger cum febre prius extingatur) cordis substantia per febrem colliquata, seu potius arefacta, totius corporis consumptio, quâ breui spatio æger consumitur, sequatur, sicuti hoc in febre ardente Colliquante appellata, accidere diximus.

Causa antecedens hanc putredinem sanguinis in venis, eamq; accersens, est vel Calor præternaturalis, vel Vitium sanguinis.

Calore nimio si accendatur sanguis, febres inde prodire diarias ostensum est: quæ si in sanguineum & plethoricum corpus incidunt, vt in synocho simplici fieri diximus, nisi magnum hoc sanguinis incendium, vel sponte mox remittat, aut vehementer refrigerantibus remedijs, quibus, vt in curatione dicemus, præcipuè hæ febres sanantur, restinguatur, tunc sicuti in alijs partibus supercalefactis & inflammatis, non discussa inflammatione, suppurationem aliquâ, vel

in sanguine, vel in partium quoque substantia fieri videmus; ita & hinc massa sanguinis labem aliquam & corruptionem ex diutius perseverante calore concipiens, febrem, non iam à solo calore simplici, ut ab initio, sed cum putredine copulato productam, parit. Hæcque est causa, quare synochus febris altero tertiove die non cessans, in synochum putridam commutetur. Quam inde prodixisse ex prægressis ephemeræ & synochi simplicis indicij cognoscimus, inter quæ illud, quod ab externo calore accensæ sint, etiam ab initio mox tales fuisse, declarat. Et hac ratione potius quam aliâ, Plethora sanguinis, quam plerique putridarum febrium causam statuunt, febres, ex commutatione simplicium in putridas, enatas procreat.

Vitiosus sanguis vel cacochymicus, qui vel innata iam habet feminam putredinis, vel saltem ad putredinem aptus & habilis est, si vel copiam suam, vel impuritatem eo usque progressus est, ut iam non amplius à natura regi, emendarive vel repurgari queat, tunc putrescens, febres putridas diuersas, pro loci materiæque putrescentis varietate, ut dictum, creat. Quas diu sæpe, antequam incipiant, ob sanguinis vitium intrinsecus latens, neutra quædam corporis constitutio nondum perfecte ægra, nec integre sana, præcedit, easque prænunciat. In qua spontanea lassitudo, capitis grauedo & dolor, insomnia turbulenta, distentio hypochondriorum, cardialgia, cibi fastidium, excrementorum consuetorum mutationes & foetores, & non consuetorum per sudores, eruptiones, vomitiones, eruptiones frequenter se manifestant. Tale autem vitium sanguini vel ab Assumptis: aut Retentis excrementis: vel Ambientibus extrinsecus aduenit.

Assumpta cibus & potus cum materiam sanguini præbeant, si vel cacochymica sint, aut corrumpantur, vitium eiusmodi sanguini possunt imprimere.

Cacochymici cibi, succo maligno ex sua natura referti, etsi postquam assumpti sunt, concoctione aliquas mutationes subeant, & in sanguinem conuertantur in eo tamen

pristinæ conditionis vitia cum remanserint, si continua congestione accumulentur, tandem putridas hæc febres producunt, easque sæpenumero populares, si vitium in alimentis, quibus omnes passim ex necessitate vtuntur, consistit. Qualia multa in herbarum leguminumque generibus inueniuntur, vitiaque frugum præsertim existunt, quæ dum frumentis, vel necessitate ob annonæ caritatem à pauperioribus, vel casu cum nimium luxuriant, copiose permixta è plerisque esantur, sanguinem inficiendo, febribus hæc epidemijs, in societatibus ciuium, vel expeditionibus militum grassantibus, occasionem præbent.

Corrupta quoque alimenta & putredinis labe infecta, eandem in sanguine noxam deponunt: ut quæ laudata alioquin nec per se vitiosa, Vel antequam assumantur, talia euadunt, Vel ingesta primum corrumpuntur.

Antequam ingerantur multa alimenta, vetustate, vel humiditate putrescentia, ut falsamenta carnis pisciumque semiputrida, caseus putris; foetore & putredine sanguinis massam usu assiduo tandem inficientia, febres accersunt. Et quæ cum multis sint communia, veluti aqua, panis, caro, in longinquis navigationibus, aut alijs corrupta, vel frumentum madidum in horrea congestum, ex necessitate comesta, febres multis communes generant.

Ingesti cibi facile corrumpuntur, qui humido excrementitio abundant; Ut sunt fructus præsertim horarij, quorum usus continuus, æstatis tempore, febribus, quæ vel mox in autumnno vel sequenti vere inuadunt, ansam præbet. Quæ verò vel alimentosa, ut lac, & oua: vel dulcia alioquin, in calidis ventriculis cito corrumpuntur, in bilem meracissimam conuersa, biliosos alios potius morbos, quam febres procreant. Sicuti & si ob ciborum duritiem, tenacitatem: vel potius ob ventriculi, iecoris & lienis affectus, assumpta alimenta, ægre cocta, crudiores sanguinem gignant, alij affectus citius tunc, ut obstructions, quam febres, nisi aliud quid accedat, sequuntur.

Retentio excrementorum sanguinis fuliginosorum, ut vocant, seu potius serofo-  
rum & ichorum, quæ continuò per insen-  
silem transpirationem, interdum quoque  
per manifestos madores sudoresque expur-  
gantur, quia sanguinem impurum, & co-  
adceruatis hisce excrementis, vitiosum tan-  
dem reddit, putridas quoque hasce febres  
gignit. Hæc autem uti varijs de causis sup-  
primi possunt, præsertim si ob otium & na-  
turæ inertiam hæc excrementa non discuti-  
antur: sicid astrictâ cure porisque obstruc-  
tis, corporeque extrinsecus à liberiore aë-  
re impedito, si hæc diutius perseverent,  
maximè si aliæ insuper accedant causæ, ac-  
cidere quoque potest. Non quod sangui-  
nis per poros refrigeratione, aëre inter-  
cluso, impedita, sanguis accendatur pri-  
mum, moxque putrescat; sicuti in causis  
februm diararum, hoc à subitaneo frigi-  
ditatis, dum corpus calet, occurso proue-  
nire posse diximus: sed quia cute conden-  
satâ, excrementa tenuiora per habitum  
corporis exspirare consueta, subsistant:  
dein & cum tunc ab aëre liberiore corpus  
perflari nequeat seu euentilari, humidita-  
tes excrementitiæ sub cute non consu-  
mantur & dissidentur: sicuti videmus in lo-  
cis occlusis, quæ aër subire nequit, res mu-  
co sitæque tandem obductas corrumpi: ita  
& ex humiditatibus hisce retentisque ex-  
crementis sanguine infecto, febres putridas,  
non tamen, nisi diu hæc causa perseveret,  
quoque prodire.

Ambiens non aër à putridis foetidisque  
exhalationibus, vel expirationibus corpo-  
rum putrescentium corruptus, inspiratio-  
ne continuò attractus, & transpiratione  
corpora subiens, labem suam tandem spiri-  
tibus, sanguini, cordi imprimens, febres pu-  
tridas quoque excitare potest: easque si multi  
in tali aëre versentur, accedatque dispositio ad  
susceptendum apta, populares: nonnun-  
quam etiam, si ab ægrotante talis per expi-  
rationem & sudores in aërem quem hauri-  
mus, vel corpora mox nostra deriuetur pu-  
tredo, contagiosas. Quæ tamen frequen-  
tius à maligna qualitate vel venenata, quâ  
potius corpus per contagionem afficitur,

quàm simplici putredine, sicuti illic demon-  
strabitur, accidunt.

Non continuata cordi vasa, ex venarum *In vasis*  
& artierarum genere, quæ sic appellamus, *meseraicis*  
sunt venæ tantum Meseraicæ: dictæ, venæ *cu, san-*  
portæ ab hepate prodeuntis propagines, *guinis*  
ad viscera naturalia in ventre inferiore di- *putredo*  
spersæ, nullibi ad alias partes, nec è profun- *causa fe-*  
do ad cutem ullibi, nisi iuxta podicem, ubi *brum*  
hæmorrhoidales venas dictas constituunt, *Putrida,*  
emergentes. Arteriæ enim, quæ has co- *rum in-*  
mitantur, eadem ratione, uti illæ quæ ca- *termi-*  
uæ venæ ramos sequuntur, omnes ab ar- *tensum.*  
teria magna progressæ, intermedio illius  
cum corde quoque continuantur. In ve-  
nis itaque meseraicis si humor putrescat,  
etsi ductus ab ijs ad cor pertinens, interue-  
niente hepatis substantia, in quam venarum  
meseraicarum rami omnes prius colle-  
cti; rursusque per eam dispersi cessant,  
sit interruptus; quia tamen in eandem sub-  
stantiam hepatis, venæ cauæ rami inferun-  
tur, & cum osculis venæ portæ commu-  
nionem quandam habent, fiatque ab illis  
in illa continuò sanguinis transitus; dein  
& arteriæ à corde progressæ, in lienis præ-  
sertim substantia, nec non & alibi, in ven-  
triculo & intestinis, venis meseraicis con-  
iungantur: huius communionis & vicini-  
tatis causâ accidit, ut quonies vapores pu-  
tridi à venis meseraicis excitati, venæ ca-  
uæ & arteriæ ramos proximos implent,  
per eandem viam, uti continuæ cor ip-  
sum putri exhalatione petentes, putri-  
das febres excitent: non tamen continuò  
ad finem usque perfectum, sicuti continuæ  
dictæ febres perseverantes, sed statim tem-  
poribus intermittentes rursusque redeun-  
tes: Idque quod materia partis non sal-  
tem procul à corde sit dissita, quo nomi-  
ne & continuas febres nonnihil remitte-  
re aliquo modo, non tamen cessare peni-  
tens, cum cor semel accensum, antequam  
calor penitus remittat, novâ in venis cor-  
di continuatis euaporatione collectâ, de-  
nouo impulsus, caloris exacerbationes,  
sicuti diximus, certo tempore reduntes  
proferat; Sed & alijs de causis hoc evenit,  
ut in venis meseraicis collecta putrida ex-  
halatio

halatio, & ob loci distantiam, non assiduò cor pari impetu feriens, febres procreet, quæ non solum in eodem statu similes minimè permanent, sed penitus quoque, ob viarum, per quas ad cor perferri debet, interclusionem aliquam, cessent: & tamdiu intermittant, quamdiu materia putris in suo quasi foco coërcita, non prius suas exhalationes ad cor usque transmittere potest, donec veluti turgens, & excandescens, & multum de se, & tetrum vaporem diffundat: qui cum ob copiam & aduersam qualitatem subsistere nequeat, naturamque irritet, ab ea quoque impulsus, per dictarum viarum transitum in venæ cauæ & arteriarum vicinos ramos irrumpens, & ad cor usque penetrans, febres accendit, tam diu perseverantes, donec quicquid è foco excussum est, calore crematum dissipetur, nonnunquam & in sudores abiens discutitur: quo pacto intermittit penitus febris, donec alio materiei motu succedente & efferuescentiâ, nouus paroxysmus, citius aut ferius, necdum eadem forma, sicuti hæc mox explicabimus, recurat. Cæterum quis nam Humor in venis meseraicis putrescat, qui causa coniuncta febrium est intermittentium; dein Antecedens putredinem accensens causa, consideranda veniunt.

Humor in venis meseraicis contentus, Sanguis est quoque, non tamen adeò purus & elaboratus, sicuti cum in hepate denuò concoctus, & ab excrementis ferosis, biliosisque repurgatus, corpori nutriendo magis idoneus factus est: etsi quamdiu adhuc in venis est meseraicis, portio ipsius purior, partibus illic membraneis alendis possit sufficere: quæ ex diuersis quoque partibus, tenuiore nimirum & crassiore constat, seroque diluta est. Præter quas tamen portiones, excrementitijs insuper humoribus ex cibi potusque portione continuò genitis, & cum chylo transeuntibus, plus minusve, prout excrementa hæc redundant, permiscetur: à quibus in secunda primùm concoctione repurgatus denuòque elaboratus, in venam cauam transfertur. Eiusmodi autem excrementitij humores, quatenus sensus quoque iudicat, ferosi & bilio-

si existunt. Serum enim ex potu largo, & cibi humidioris vsu assiduo genitum, venasque meseraicas pertransiens, secumque alios humores, nunc crudos, nunc pituitosos, aqueos potius quàm mucosos deferens, ad venas emulgentes maiori sua quantitate, indeque ad renes & vesicam deriuatur. Biliosa quoque materia ex assumptorum portione aliqua continuò nata, sanguini huic confusa, in hepate primùm ab ea in propriam illi vesiculam destinatam repurgatur. Præter quos humores excrementitios, nullos alios in hisce venis sanguini commiseri; quibus natura, sicuti prædictis duobus certas vesicas aut receptacula condiderit, sensibus inuenire possumus: vti neque lienem hoc nomine conditum, nec sensu, nec ratione licet colligere. Putredo itaque in meseraicis venis suscitata, vix dum, vti neque in vena caua quoque fieri posse diximus, separatim in aliqua parte huius sanguinis, vel excrementis illi permixtis, cum hæc non distincta, sed inuicem confusa sint, poterit consistere, sed vbicumque fuerit, totam illius quoque massam eo in loco inquinat: quæ si ad eam putredinem perueniat, à qua calidissimæ exhalationes & feruentissimæ expirent (cum nisi tales sint, ad cor usque penetrare, illudque accendere vix possint) tunc febres hæc procreabit. Proin neque à crudo, pituitosoque aut ferosiore sanguine, eiusmodi febres, cum nec ea ratione putrescere, & vehementem calorem concipere, aut exhalationes feruentes diffundere queant, gignuntur, sed ab eo redundante, alij potius affectus proueniunt. Sicuti verò cum biliosa, quæ huic sanguini semper permixta est materia, immoderatus collecta, nec in vesiculam, vti solita erat, aut non sufficienter expurgata, sanguinem biliosorem reddens, putrescit; accidit, quòd tunc efferuescens, eiusmodi euaporationes feruentes, subilesque ad cor usque faciliè transeunt, illudque inflammantes, & quæ mox iterum dissipantur, expirans, febres intermittentes causet. Eamque ob causam hunc sanguinem bile, vel flauâ, vel atrâ nimium perfusum, qualem per hæmorrhoides nonnunquam



quam excretum febres has soluisse comperimus, & ab infantibus modò natis copiosè per aluum excerni videmus, putrescentem febribus intermittentibus causam præbere, hoc modo, quo nunc explicabimus, asseueramus. Biliosus sanguis diu sæpè antequam febrem producat, in venis coacervatus, tandem putrescens & circa præcordia turgens atque effervescent, exhalationesque ardentes diffundens, sensiles primùm partes, nervosas præsertim vellicans, facultatemque expultricem stimulans, frigus in principio paroxysmi (calore cum sanguine ad interiora reuocato) excitat, moxque naturâ id quod molestat excutere nitente, oscitationes, pandiculationes, horrores, rigoresque, seu corporis totius concussionem sequuntur: vti & alijs locis, si acris materia partes sensiles irriteret, corpus quoque horrere obseruamus: sed & vomitio ob hanc facultatis expultricis commotionem in principio sæpè molesta est. Quibus circa initia se offerentibus, mox ubi exhalatio hæc à præcordijs, per dictas vias ad cor usque ascendens, illud accendit, calor succedit, remittentibus tum eiusmodi frigoribus & rigoribus, nisi, sicuti aliquando accidit, tam subito vapores cor petant, ut calor, antequam frigus desinit, iam sua proferat indicia, & eodem tempore, & frigus, & calor simul, sicuti in febribus epialis euenire diximus, sese offerant. Calore itaque eiusmodi accenso, qui nonnunquam à præcordijs veluti exurgere videtur, vniuersum corpus æstuat, sitisque intolerabilis, aliæque à calore prodèuntia accidentia tamdiu perseuerant, donec vaporibus hisce per insensilem transpirationem sudoresve manifestos discussis, febris sensim desinat seu intermittat: tamdiu, donec noua portio, quietis tempore putrescens denuò exhalationum eam quantitatem, quæ nouum paroxysmum inducere possit, diffundat. Duratque hæc paroxysmorum per vices continuatio, donec omnis ea quæ putredini apta erat materia, è corpore educta fuerit, quod per varia euacuationum genera natura, Medici operâ interdum adiuta, præstat: nam & successiuè in singulis paroxysmis

pars biliosæ illius materiæ putrescentis, partim in vaporem conuersa, caloreque discussa consumitur: vel per corporis habitum occultè, madorève manifesto exhalat: partim verò sero permixta per sudores graueolentes & vrinas, quæ ob bilis permixtionem & calorem admodum flauæ & tanquam rubræ, acres & foetidæ post paroxysmos redduntur, excernitur: morbusque frequenter totus sudoribus soluitur: in quibus si crassior biliosæ huius materiæ portio in cute subsistat, scabies morbos curato, sæpè succedit, nonnunquam & alia externa vitia: sed & per vomitionem in quibusdam, non tantum vel pituita, vel bilis è vesicula effusa in ventriculum, sed & de materia hæc è venis excussa aliquid interdum rejicitur. Quibus euacuationibus, paroxysmorum aliquot vicibus factis, tandem causa febrilis penitus tollitur, febresque desinunt: quod & interdum maiori vi per vomitiones vel diarrhœas ars, naturæve præstat, materiam hanc febrium è venis meseraicis à sanguine secretam hac ratione euacuando: quo modo frequenter hæc febres sanantur, vti rariùs confusam hanc cum sanguine materiam, per easdem cruentas vomitiones deiectionesve ejiciendo: quæ etsi fiant, periculo tamen, cum non sit vitata via, minimè carent: nisi venis meseraicis, quæ ad podicem feruntur apertis, per hæmorrhoides hæc febrilis causa vnà cum sanguine permixta, excernatur: quo pacto diuturnas quoque febres plerunque quartanas, hac hæmorrhagia cessare obseruamus, cum vix per alias sanguinis detractiones, quæ venæ sectione fiunt, aut spontaneo narium sanguinis fluore, cum hæc sanguinem è venæ cauæ ramis duntaxat exhauriant, venæque meseraicæ nullibi ad exteriora cutis, nisi circa anum, ut dictum est, desinant, proin nec causa sic tollatur, nisi fortè, inanitis venæ cauæ per hæc euacuationes ramis, è venis meseraicis febrilis in has rapiatur materia, febres intermittentes desinant: sed frequentius si talis fiat transitus, putrisque sanguis, sanguini in venæ cauæ ramis commisceatur, in continuas, vti ex intempestiua phlebotomia

facta sæpè accidere videmus, commutantur. Sed & fit, vt biliosa hæc materia à sanguine repurgata, seroq; tandem confusa, ab eoque contemperata, illiusq; beneficio in venæ cauæ ramos translata, in corporis habitum & vrinas, quæ admodum tingit & colorat, infundatur: quod dum fit, febris comite iſtero vel mox cessat, si tota illius causa eò excussa fuerit, vel si portio illius remanserit, nihilominus adhuc persistit. Interdum verò & hæc materia in fibras intestinorum infusa, eryſipelata, colicos cruciatus enormes proferentia, cessante vel remanente febre, prout tota, parsue illius duntaxat eò profusa fuerit, excitat: è quibus dein resolutiones & conuulsiones, vt in illis locis explicatum fuit, perniciosæ sequuntur. Sed & biliosam hanc materiam pondo libræ, circa iecoris membranam coëctam, & portione aliqua spinæ neruis in hærentem, post mortem febricitantis cuiusdam sectione factâ, Fernelſe deprehendiſſe testatur. Biliosus itaque sanguis nimium in venis meseraicis coaceruatus, si putrescat, causa proxima & vera est febrium omnium intermittentium, quæ tum ob interruptam viam, tum tenues vapores intermittere potest aliquandiu & redire. Verum quod diuersimodè hoc fiat, ratione diuersitatis Materiæ, tum etiã loci accidit.

Materia hæc sanguinis biliosi putrescentis, non eadem semper est, sed quemadmodum videmus bilem segregatam à sanguine, nunc flauam, nunc viridem, nunc atram inueniri: eamque vel tenuiorem, vel crassio rem: sic & dum sanguini venarum meseraicarum adhuc confusa est, vel saltem in venis adhuc residet, variat: præcipueque in eo quod nunc Tenuior: nunc Crassior existit.

Tenuioris & fluidæ bilis, qualis ferè esse solet, quæ huic sanguini permiscetur, putredo, antequam eò deueniat, vt febrem excitare possit, ad triduum vsque ex sua natura, ab eo tempore, quo iam prior illius putredo discussa est, supputando, ferè extenditur: vnde tertio die tunc rursus invadens Tertianam dictam febrem efficit: Quæ, si æqualis portio cum priore computruerit,

eàdem quoque horâ rediens, iustum aliquem seruat ordinem: vel quod frequentius accidit, si maiorem illius copiam putredo inuaserit, horam vnã aut aliquot anticipat: vel cum minor iam restat humoris illius ad putredinem apti portio, fereque tota consumpta est, tunc & paroxysmi cunctantur, sensimq; febres desinunt. Sed & prout hæc materiabiliosa, pura, impurave fuerit, totius febris, tum singulorum paroxysmorum decursus variant.

Pura & nisi quod sanguini permixta sit, sincera aliàs bilis, cum calidior sit, Exquisitam tertianam, ardentem admodum efficit: cuius vapores cum citius discutiantur, paroxysmi quoq; breuiores sunt: febrisque ipsa ob materiei citum motum non diuturna, vix septem circuitus excedens, existit.

Impura verò si fuerit hæc materia, crudo potius quàm pituitoso, serosoq; humore, & sanguine permixta, vt ferè euenit, tertianam Notham (in qua paroxysmi longius perseuerant, magisque inordinati existunt, febrisque totius tempus longius produci-tur, quia materia & copiosa & inæqualis est) excitat.

Crassior ac veluti adusta si sit bilis, quia tardius tunc putrescit, antequam eò deueniat: vt febrem excitare possit, longius tempus quoque requirit, proin & ad quartum diem vsque paroxysmus protrahitur, Quartanamque ob id dictam febrem efficit: Quæ eàdem ratione, iisdemque de causis, vt in tertiana dictum, vel anticipat: vel eodem modo inuadit: vel cunctatur, & vel exquisita, vel notha existens, circuitus breuiores longioresve obtinet. Et calore quoq; alijsque accidentibus non adeò à tertiana discrepat: nisi quod, vt dictum, ob humoris crassitiem, diuturna & pertinax existit, donec multis vicibus materiã tandem absumptã, paroxysmi mitius inuadant, canſcentur, sensimq; febris penitus tandem desinat. Sed & si materia hæc ad eam tenacitatem perueniat, vt non nisi quinto vel sexto die putrescens, euaporationes eas, quæ febrem excitare queant, diffundat: tunc, quod tamen rarissimum est, si modò sit, Quintanæ vel Sextanæ dictæ fiunt febres.

si purum,  
Notha,  
si impu-  
rum sit.

Sanguis  
cras-  
sior in  
vasis me-  
seraicis  
putredo  
causa  
Quartanæ  
intermittentis,  
Exquisita,  
si purum,  
Nothæ  
si impu-  
rum, vel  
Quintanæ  
aut  
Sextanæ.

Sanguis  
tenuior  
in  
vasis me-  
seraicis  
putredo  
causa  
Tertianæ  
intermittentis,  
Exquisita.

Loci diuersitatis occasione, in quo materia putrescit, variant hæc febres, prout vel Eodem in loco, vel in Diuersis latet.

Eodem in loco si putrescat, Simples fiunt febres, eæq; vel tertianæ, vel quartanæ: legitimæ vel spuria: pro materiei, vti dictum, varietate.

Diuersis in locis si putredo sit, in venis erit, vel meseraicis tantum, vel simul quoque in venæ cauæ ramis.

*In vasis  
rum me-  
seraicis  
rum di-  
uersis lo-  
cis simul  
fanguis  
vni facta  
putredo,  
causa  
Tertia-  
na du-  
plicis vel  
Quarta-  
na tripli-  
cis, vel  
duplicis,  
vel inui-  
cem con-  
fusarum  
si illic te-  
nuis, ali-  
bi cras-  
sor pu-  
trescat.*

In folis meseraicis venis, si non vno aliquo in loco, sed duobus vel tribus, circa hep-  
par, lienem, mesenterium, omentum, vel  
alibi bilis putrescat, febres fiunt duplices,  
vel etiam triplices: atque vnâ cessante, alte-  
ra sequente mox die inuadit; vel nonnun-  
quâ etiam eodem die quo febris desijt. Hinc  
iam quotidianæ dictæ fiunt febres, non eæ  
quas practici à pituita fieri scribunt, & qui  
veritati magis adstipulantur, tales se nun-  
quam obseruasse, vel apertè fatentur, vel  
tacitè innuunt, sed quæ Tertianæ duplices,  
vel Quartanæ triplices dicuntur, quæ quo-  
tidie suas accessiones, raro pares, habent.  
Sed & huc Quartanæ duplices, quæ duo-  
bus diebus inuadunt, vnoque intermittunt,  
referendæ sunt. Et quemadmodum si eiuf-  
dem naturæ bilis diuersis in locis putre-  
scat, hæc fiunt: sic & diuersæ naturæ, te-  
nuis & crassa simul diuersis in locis si pu-  
trescat, Confusas tertianas cum quarta-  
nis, diuersis diebus inuadentes febres fa-  
ciunt: Quæ signis inter ipforum sympto-  
mata commemoratis distinguuntur & co-  
gnoscuntur.

*In vasis  
meseraicis  
et va-  
sis conti-  
nuatis,  
eodem  
tempore  
facta  
fanguis  
vni pu-  
redo,  
causa  
Elemen-  
tariæ.*

Non in folis meseraicis venis, sed & in  
venæ cauæ ramis si putrescat sanguis, siue  
ea per se inceperit, aut per transitum, vti  
declaratum fuit, facta sit, tunc continua fe-  
bris intermittenti copulatur, fitque Hemi-  
tritæus, seu semitertiana dicta febris. Vbi  
rursus pro diuersitate materiæ, vel tertianæ,  
vel quartanæ, simplices vel duplices:  
nothæ vel legitimæ, cum continua, vel nul-  
las exacerbationes, vel certis diebus habente,  
implicentur. Vnde fit, vt nunquam  
sint sine febre, sed vel exacerbatione certo  
tempore ex continuis succedente, vel pa-  
roxysmo febris intermittens indies, vel

altero, vel tertio die simul inuadente, varias  
mutationes in symptomatis, sicuti enarra-  
tum fuit, perficiant.

Causa antecedens putredinis illius, in hu-  
moribus venarum meseraicarum, quæ fe-  
bres hæc intermittentes facit. Alia est Ef-  
ficiens, alia Adiuuans.

Efficiens, cibus & potus, è quibus cali-  
dus, acris, biliosus & adustus succus, tum in  
ventriculo, tum primis vijs mox gignitur.  
Is enim diutius illic collectus, nec rectè à  
sanguine separatus, in venis meseraicis, vel  
certo loco, vel diuersis, vti dictum, coacer-  
uatus, cum putredo illum inuadit, febres gi-  
gnit, suo humori consentaneas: breuiiores,  
longioresve, vel alio modo variantes. Talis  
autem succus à cibo & potu, qui vel succum  
talem in se habet, vel corruptione primum  
acquirat, gignitur.

Succum acrem biliosum in se habent, cæ-  
pæ, allia, porri, caseus putris, aliaque similia,  
quæ ex sua natura eo abundant.

Corruptione in succum hunc abeunt, in  
calidis præsertim ventriculis, dulcia, quæ in  
bilem facile commutantur vti & pinguis:  
Horarij item fructus, ob quorum esum, au-  
tumni tempore, sicuti dysenteria à bile, ita  
& quartanæ eandem ob causam, facile ge-  
nerantur. Sed & humida alia, etsi euchy-  
ma per se sint, vti lac & oua, corruptione, in  
meracissimam bilem frequenter degene-  
rant. E quibus omnibus illuuiæ hæc na-  
ta, nisi per excrementa alui rejiciatur, tan-  
dem in venas rapta accumulataque febres  
gignit: quas tamen ab alia aliqua externa  
causa, quæ tunc primum, cum febris inci-  
pit, occurrebat, initium sumpsisse, vel quia  
frigidam biberunt, hoc illudite comede-  
runt, vulgus sibi persuadet.

Adiuuans causa, dispositio corporis est a-  
pta ad febres hæc suscipiendas: idq; vel ra-  
tione Constitutionis: vel Anni temporis.

Constitutione qui calidiores sunt & bi-  
liosi, facilius hisce febribus præhenduntur.  
Proin, qui mediæ ætatis sunt, citò hisce  
corripiuntur, & viri & adolescentes. Sed  
& infantes ob intemperantiam ijs sunt ob-  
noxij, & cum in vtero matris existentis ad  
huc talem materiam coacervare soleant, a-

tro sanguini similem & biliosam, nisi ab ea in partu rectè expurgentur, has febres secum nonnunquam in lucem adferunt. Verùm & senes eas nonnunquam, rariùs tamen patiuntur.

Anni tempus febribus gignendis idoneū illud est, quod calidius existit, & in quo vitus ratione deteriore vti consueverunt. Sic autumnii tempore, ob præcedentem alimentorum illuuiem, & tertianæ & quartanæ accidunt. Veris & æstatis tempore, tertianæ plerumq; vigere solent.

*Extra-  
vasa pu-  
tredo fa-  
cta, cau-  
sa febriu  
Lenta-  
rum, Sym-  
ptomati-  
carum.*

Extra vasa, hoc est, venas & arterias putredo facta, febres excitare quoque potest, si ea vapores terros vel putredinis portionem per vasa eadem ad cor vsque transmittendo, illud calore aliquo putri afficiat: unde febres Symptomaticæ cum affectum aliquem, qui hanc putredinem efficit, sequantur, prodeunt. Eæque Lentæ plerumque atque inæquales, cum materia extra vasa posita, tantam copiam, sicuti cum in vasis consistit: eoq; ordine ad cor nequeat transmitti: cessantes citius tardiusve, vel ad extremum vsque perseverantes, prout putredo ipsa persistit. Quæ vel in Humore aliquo naturali, vel præternaturali: aut Corpore præternaturali, vel naturali: aut Parte corporis aliqua consistit.

*Humores  
rum quo-  
rundam  
extra va-  
sa putres-  
cent, causa  
febriu  
Lenta-  
rum, Sym-  
ptomati-  
carum.*

Humores contenti extra vasa putrescentes pauci, citra partium eos continentium corruptionem, febres putridas excitant: cum tamen singulos humores putrescentes extra vasa febres putres excitare posse plurimi opinati sint: quod nos an & quomodo id fieri possit, in singulis tam calidis quam humidis humoribus, quotquot extra venas inveniuntur, cum hi tantum ad putredinem apti sint, examinabimus. Calidi autem sunt: sanguis naturalis & venis nonnunquam excedens: & bilis excrementitia diuerforum generum. Humidi verò, serosus & pituitosus humor.

Sanguinem, si è venis in partem influat, inflammationemque illic excitet, febrem symptomaticam simplicem seu puram tantum, necdum, etiamsi illic suppuratur, putridam, nisi vera illius putredo, & partis corruptio, vti postea dicetur, sequatur, excita-

re, supra ostensum est. Quodd si verò è venis vel ruptis aut apertis effusus sanguis con crescat, diutiusque retentus putrescat, magnâ præsertim copiâ, locisve cordi proximis: vti in thorace, pulmonibusve; tunc febres quoq; putridæ, sed lentæ nonnunquâ, eiusmodi affectus comitantur. Quod rariùs tunc, quando in ventriculum, aut intestina, vterumve illapsus, cum diutius illic vix possit subsistere: aut cum in renib. vesicæ collectus, cum illic ab vrina continuò eluatur, accidit.

Bilem, tam eam quæ à sanguine venarum meseraicarum continuò in vesiculam illi propriam, vel lienem, vti quoq; voluerunt, repurgatur: quàm illam quæ in ventriculo interdum ex assumptis nascitur, si harum aliqua vel in proprijs receptaculis, aut in alia loca effusa putrescat, febres putridas intermittentes procreare plerique existimarunt, & à bile flaua tertianas, ab atra quartanas, easque exquisitas, si synceras, nothas, si permixta existat: sicuti nos biliosæ illius materiei, quæ sanguini venarum meseraicarum permixta est, varietate accidere docuimus, fieri affirmant. Nos verò cum atram eiusmodi bilem, qualem describunt, in lienis substantia nullibi obferuimus, nec illic vesiculam atræ bili excipiendæ exstructam, vti in hepate pro flaua bile, deprehendamus, & lienis vsus longè excellentiorem, quàm vt bilis atræ esset receptaculum, sicuti alibi docuimus, esse sciamus: nec alijs quoque in locis bilem atram aliam quàm quæ ex flaua bile præternaturaliter in hanc degenerat, omniaque excedens, ab ea, quàm frigidum humorem statuunt, plurimum differt inueniamus: nulla ratione conuinci possumus, vt talem aliquem humorem in liene positum febres quartanas, aut alias excitare credamus. Quodd si verò succum melancholicum putrescentem sic appellent, & quartanæ febris causam, si putrescat, statuunt: neque hunc in lienis substantia, aut alibi separatim, à sanguine, cuius sæx esse dicitur, consistere, concedimus. Si verò crassiorem sanguinis partem intelligant, in eo sententiam nostram, quâ in venis meseraicis sanguinis portio-



portionem aliquā putrescentē febres intermittentes efficere diximus, cōfirmant: cūm fæculentus sanguis in maioribus venarum meseraicarum ramis potiùs, quàm in exiguis lienis vasis ob arteriarum copiam, tenuiore potiùs sanguine quàm crassiore impletis, contineatur. In quibus meseraicis venis, si putredo in fæce sanguinis facta quartanas, vti admittunt, procreat: concedent & necessariò, tertianarum febrium, quæ ex intermittentiū quoq; vti quartanæ sunt genere, causam in eodem sanguine, sed diuersâ solum illius parte, vti testatum fecimus, latere. Sed nec bilem excrementitiā aliam extra venas alicubi collectā, siue flaua, siue viridis & æruginosa, siue atra existat, febriū intermittentiū causam, si putrescat, vti aliqui voluerūt, statuimus: cūm ea in parte aliqua ventris collecta, aut in eam effusa, quandoquidem calidissimus & acris ex sua natura est humor, præsertim si accedente putredine, vel aliā causā calidā, aliū in super calore suscipiens efferuescat, partes sensiles vellendo, adurendoque, colicos cruciatus, cardialgias & vomitiones diarrhœasq; biliosas potiùs quàm febres, procreat, nisi quatenus dolore & calore corpus interdū inflammando, febriculas aliquas, quæ tamen rariùs, vti dictū, hosce affectus comitantur, excitat: nec dūm si sic efferuescat, tamdiu in loco aliquo queat consistere, vt vaporibus inde tetrīs emissis, ad cor vsq; penetrādo putridas febres possit inuhere: in quibus tamen ob calorem febrilem, hæc quoq; nonnunquam loco mota exandescensque, præsertim si in corpore redundet, accidentia bilis prouentum significantia; vti in febribus intermittentiū dictū est, proferit: quorum potiùs ipsa febris causa, quàm bilis ipsius febris, statuenda erit: cūm & ipsa excrementis alui naturaliter permixta, atque vnā cum ipsis putrescens, sicuti prius monuimus, vapores tetros & foetidissimos expirans, superiora tamen minimè petat aut inficiat.

Pituitam superuacaneam, cūm eam, quæ in ventriculo, intestinis, mesenterio, tum quæ circum viscera coaceruatur, putrescentem, febres intermittentes quotidianas generare scribunt: & si vitrea, acidaque fuerit,

epialas inde prodire. Sed & serosæ pituitæ in corpus effusæ putredinem, lentam aliquam febrem, leucophlegmaticis & cachecticis interdum peperisse, a quibusdam proditum est. Cæterum qua ratione pituita, cūm sit humor frigidus, ex putredine tantum calorem possit concipere, vt putres exhalationes tam acres calidasque proferat, quales, vt ex illis febres gignantur, requiruntur, nō video: cūm quoque si diutius retineatur, accedatq; partis alicuius caliditas, mucositatem potiùs quàm putredinem adipiscatur, pituitaq; putrescentis nullibi in generibus illius explicandis, vt aliarum specierum, authores meminerint. Accedit & hoc, quod eiusmodi febres quotidianæ, quales forrè, vt singulis tribus humoribus excrementitijs, pituitæ, bili flauæ & atræ, suas febres accommodarent, excogitatæ fuerunt; nunquā sicuti hoc prius explicatum fuit, obseruatæ fuerint: aliæq; sit febrium epialarum, quod & calor & frigus simul tunc vrgeant, vti quoq; dictū fuit, causa. Quod serosam verò pituitā febres inducentem attinet, id feri potiùs quàm pituitæ causā accidere, iam in sero demonstrabimus.

Serum sicuti in venis sanguinem diluit, illiusque calorem humiditate sua contemperando, febres mitiores reddit, & quando bilis illi excrementitia permiscetur, in ictericis, illius feruorem compescendo, facit, vt febrem non accendat: ita & in venis meseraicis, biliosæ sanguinis materiæ putrescenti, maiori copiā permixtū, efficit, vt febres lentæ magis, sed diuturniores, quales nothas esse descripsimus, prodeant. Cæterum à sanguine separatum, & in abdominis, thoracisque capacitatem maximā copiā effusum, vel sub cute collectum, illisque locis quàm diutissimè retentum, corruptumque, fetorem & acrimoniam acquirens, quale in hydropicis subuiride & foetidum sectione sæpiùs, illis in locis contineri obseruauimus, febriculas aliquas, sed lentas, præsertim si in cordi vicinis locis abundet, tum ab ipsius calore & tenuitate, tum accedente ferè partium, vti dicitur, corruptione, nasci comperimus: quales & in leucophlegmaticis virginibus eo nomine prouenire posse, vti Fernel, quoque docet, concedimus.

Corpora carnosā & humida, quia facile putrescunt, & putrescendo calorem præternaturalem acquirunt, febres putridas frequentius, quam humores extra vasa positi, inducunt. Siue sint naturalia; partes nimirum corporis corpus constituentes: vel in eo contentæ certo tempore: vti fœtus ipsiusq; secundina. Siue præternaturalia, vermes.

*Partium  
quarun-  
dam pu-  
tre-  
do,  
causa fe-  
bris Len-  
taris sym-  
ptomati-  
carum.*

Partium corporis quarundam corruptio: propriæque substantiæ putredo, febres lentas putridas, si per venas & arterias partibus insertas, & vnâ sæpè cum parte putrescentes, portio putredinis vel vapor saltem, ad cor vsque penetret, excitat: easque si nobile præsertim aliquod viscus occupet putredo, cordique vicinū, pertinaces magis diuturnasque: in quibus tum ob febrium istarum perseverantiam, tum viscerum corruptionem, corpus sensim contabescit & absumitur. Quæ putredo vel ab impactu humore putrescente, partemque simul inficiente, aut erodente, incipit: vel ab abscessu & vlcere, post inflammationes, aut externas iniurias, aut venam ruptam in parte aliqua exoritur. Quod qua ratione in quibusdam partibus accidens, febres has excitet, in alijs verò minimè, explicandum erit.

Pulmo omnium frequentissimè in phthisicis ulceratus, tandemq; corruptus & in pus conuersus, maioriq; ex parte absumptus, vicinitatis causâ cor indefinèter putredine lacessens, febrem eiusmodi Lentam symptomaticam vocatâ comitem semper habet: quæ tandem temperamentū illius destruens, in hecticam quoq; symptomatica dictam conuertitur: cuius occasione, & quia viscus nobile deperditur, corpus ad extremum marcorem redactum, tandem extinguitur.

Hepatis, Lienisque putredines, quæ cum non ita diuersa ipsorum sit substantia, vtrisque ab iisdem causis, certis ipsorum in locis frequenter accidunt, & post mortem perscrutatis visceribus magno cum fœtore sæpè occurrunt, febres quoq; Lentas symptomaticas diuturnas proferunt, quas cum atrophia & cachexia (læsâ sanguificatione, siue hepar aut lien corrumpatur) sequatur, priuatim id vulgus obseruans, has tantum febres infantibus & virginibus magis consuetas hec-

cas, *Etistum Germanicè*, cum tamen plures earum, vti dictū fuit, sint species, appellant.

Renum verò putredo, etsi horripilationes, vt vocant, aliquas pariat, perseverantem tamen febrem minimè inducit; cum portio illius putrescens minimè subsistat, sed per vrinam continuò diffuat: vnde nec corpus addè contabescit: præsertim cum rene vno affecto, penitusq; sæpius absumpto, alter nihilominus sua munia obire, homoque diutius sic adhuc conseruari queat.

Cerebrum, vti & Cor ipsum, cum nobilissima sint viscera, ad eam putredinem, quæ febrem eiusmodi quoq; gignat, viuente homine peruenire minimè possunt: etsi quandoque vlcera in cordis substantia depræhensa sint, illa tamen mortem citius quam febrem pepererunt.

Sed & in Membranosis partibus, circa ventriculum, intestina, vesicam, & vterum, quin & in alijs membranis mesenterij, vel omenti, insignis facta putredo, febres Lentas comites protulit. Sicuti & in habitu corporis alicubi extrinsecus intrinsecusve genita partis alicuius magna corruptio, febriculas tales symptomaticas solet inducere: quarum causa tamen quò magis à corde abest, eò magis inæquales febres, aliàs veluti remittentes, nunc rursus recrudescentes, efficit.

Fœtus quoque vnâ cum secundina ipsum inuolvente membrana, de nouo in corpore genita, vteroque vasorum beneficio connexa, si putrescant: præsertim si diutius retenta vterum eadem labe inficiant, vicinisq; partibus, vti vidi, corruptionem quoque adferant: febres similiter enarratas, non eodem modo, sed diuersimodè corpus exagitant, & nisi æger prius extinguatur, diuturnas excitant.

Præternaturalia quoque in corpore genita, Vermes, aliæve corpora carnosā, membranaeque partibus adnexa, si corrumpantur, præsertim verò si putredinis labem partibus simul aspergant, easdem febres Lentas, inordinatè corpora horrore concutientes consumentesq; proferunt. Quas tamen antequam hæc putrescant, vix inducunt. Etsi infantes interdum, cum viuus adhuc scatent lumbicis, febricitent: cum hæc illorum febris, tunc

*Corporis  
præterna-  
turalis  
quarun-  
dam pu-  
tre-  
do,  
causa fe-  
bris Len-  
taris sym-  
ptomati-  
carum.*

reliquarum synochorum instar, à causâ aliqua externa progressa, acuta proin nec lenta, vti sæpè cum hisce febribus alij affectus occurrere solent, sic in infantibus vermes illis consueti se offerunt.

Qualitate malignâ permixtus calor, cor feriens, febres malignas creat; easque continuas ferè, & si hæc vis maligna in vicina corpora à corpore ægri rursus diffundatur, contagiosas. Differentes primùm, quatenus exitiosus hic calor, vel à sola maligna vi procedit, vel à putridine cum maligna qualitate copulata, nascitur.

Calor Putridus & Malignus, causâ febrium Putridarum malignarum.

Putredo non simplex, sed cui perniciofa accessit qualitas, iam non putredine solâ, vti in reliquis putridis febribus explicatû fuit, cor accendens, sed malignâ vi cuius participes simul est, cor fatigans, febres malignas & contagiosas nondum tamen pestilentes, parit: infantibus cum æthymata & exanthemata erumpere solent consuetas & populares; rariùs adultis accidentes. Dein & in adultis potius communes epidemias eas gignit, quæ pestè minimè grassante, nullis apparentibus veræ pestilentia in bubone præsertim vel anthrace indicijs, nihilominus in plurimos sæuiunt, multosq; interdum sine grauioribus symptomatis, aliàs verò capitis dolore & delirio præcipuè apparentibus, unde hæc febres denominari quoque solent, iugulant. In quibus, in quo loco, & quomodo putredo facta malignitatem eam possit concipere; Et quæ illius sit causa exponendum.

Locum autem in quo putredo hæc maligna gignitur, eundem, in quo & simplicem putredinem fieri diximus, esse oportet: Et in vasis vel venæ causâ, vel meseraicis, vel extra hæc quoque consistere: atque in iisdem, sicuti ostensum fuit, quoq; humoribus vel corporibus.

In vasis cordi continuatis, sanguinis putredinis malignæ causâ febrium Putridarum malignarum continuarum.

In vasis enim maioribus venæ causâ sanguis putrescens, si præter simplicem putredinem, venenatam quoque vim adipiscatur, & per vasa quoque cordi copulata, vti in putridis febribus dictum est, cor afficiat, illudq; non solum calore putri, sed & maligno exagitet, febres continuas, easque duplicem obnoxam perniciosas, excitat. In quibus si portionem illius sanguinis maligni, natura in

cutis poros, membranasq; aliquas excutiat, rum, ob maculas vel pustulas emarratas profert: si vero minimè, nihil eiusmodi tunc erumpit: nisi forte iam prostratâ naturâ, maculæ aliquæ veneni latentis indices se manifestent, mortemque præfagiant. Cæterum tunc pro ratione Putredinis & Malignitatis, quæ simul hic concurrunt, hæc febres variant.

Putredinis sanguinis causâ, hæc febres ad synochorum putridarum, vel reliquarum continuarum naturam quoque aliquo pacto accedunt: & prout in sanguinem temperatum, vel intemperatû putredo hæc inciderit, vel in loco cordi magis vicino, aut longius ab eo dissito facta fuerit, mitiora grauiorave in calore, & quæ illum sequuntur symptomata profert, totiusq; morbi decursus variat. Unde fit, quòd harum febrium aliquæ in eodem statu synochorû instar ferè permanent, nullasq; insignes exacerbationes adferunt: quales febres, cum in infantibus æthymata efflorescant, plerunq; existunt: quæ & si natura putrem materiam ad exteriora vndiq; corporis mox propellat, tutiores simul mitioresq; existunt: Sed & in adultorum febribus malignis si putredo vehemens minimè sit, neq; in vrinis aut sanguine illius indicia magna deprehendantur, immitis calor, aut quæ eum sequuntur, accidentia grauiora occurrunt. Sicuti verò putredine in illis inualefcente, maximè si corpus intemperatum occupet, circaq; cor proximè versetur, aut alias partes principes possideat, accidit, tunc enim reliquarum continuarum instar cum horrore incipiunt, caloreq; immiti, vti & illæ, interdum & causonum modo proferunt, vt dictum est, symptomata.

Qualitatis verò malignæ putredini iunctæ occasione, præsertim si ea præualeat, corque labefactando vires mox deiciat, cum natura tunc impedita, morbum ordine quodam seruato fortiter aggredi nequeat, accidit, vt hæc febres, siue mitiores, siue vehementiores, caloris causâ existant, non certam rationem in motu, quo dijudicari queant, obseruent, nec statò tempore exacerbentur: licet percrisim aliquam quoq; interdum soluantur: aliæ verò quæ synochos putridas referunt minimè, sed per fœdas excretiones sensim,

ſenſim, vt in ea quæ ecchymata profert ſit, deſinant.

In meſeraicis venis bilioſa quam diximus materia, ſi præter putredinem eam, quâ febres intermittentes gignit, malignam inſuper naturam acquirat, fortè & intermittentes, pernicio non carentes, procreabit: verùm cum eiufmodi materiam quandoque in primis hiſce vijs natam, ſiue viridis, cærulea, atræve fuerit, ſi venenata inſuper viſ acceſſerit, natura ipſius pernicio offenſa, mox tentet eiſcere, & per lienterias, diarrhœas, vomitiones peruerſas excutere, rariùs ſit, vt febres intermittentes malignæ inueniantur, & ſi quandoq; ob retentam eam materiam diutiùs ſuperueniant, excretiones eiufmodi lethales comites habeant.

Extra vaſa verò humores putreſcentes, cum febres, vti docuimus, ſimplices excitare vix queant, ita & ſi malignitas quædam accedat, febres putridas malignas minimè, ſed ſyncopes, conuulſiones, aliaque potiùs accidentia procreabunt. Vel ſi venenata ea viſ, quæ & ſuapte naturâ etiam ſine putredinis opera febres gignere poteſt, acceſſerit, tunc febres, quas à ſola maligna vi accendi poſſe mox explicabimus, non putridas malignas excitabit. Corpora verò putreſcentia, lentasq; febres continuas producentia heſticas, ſi perniciem ſimul conſequantur, infeſtas quoque febres eas progignent.

Cauſa verò malignam hanc qualitatem in ſanguine producens, & putredini iungens, vnde poſtea hæ febres putridæ malignæ oriuntur, ab Ambientibus, vel Aſſumptis Retentiſve proficiſcitur.

Ambientia nos, aër, aliæve corpora, ſi non ſolùm putredinis, ſed & malignitatis ſemina in ſe contineant: eaq; vel per inſpirationem attracta, aut per contactum corporibus inſuſa, ſanguinem infeſciant, febribus enarratis cauſam, præſertim ſi iam priùs putredo in ſanguine extiterit, frequenter præbêt. Quod vitium ab ambientibus procedens; Vel à mutationibus magnis; Aut exhalationibus proficiſcitur.

Mutationes temporum ſeu tempeſtates inordinatæ, magnæ ſubitæque, quas meteo- ra quædam præcedentia vel comitantia præ-

ſagiunt, vel indicant potiùs quàm cauſant eiufmodi in aëre vitia, febres hæſce epidemias procreantia malignas, quibus multi paſſim corripiuntur, & quæ in vulgus peſtis inſtar ſæuiunt, efficiunt. Inter quas ver plu- violum, aſtro diu flante, cauſa non infrequens ſtatuitur.

Exhalationes, exſpirationeſque, non ſolùm putridæ, ſed & pernicioſæ, quas terra, aquæ, lacus, proferunt: animaliumque præſertim iam priùs hac lue infectorum excrementa, ſudores, exſpirationes, cadauera, reddunt, aërem inquinantia, corporaq; infeſciant, febres eiufmodi, illis tamen qui in talibus locis verſantur, vnde ſemina contagij prodeunt communiores, procreant.

Aſſumpti cibi vitioſi, non qui putredinem ſaltem in ſanguine, vti ſuprà oſtenſum eſt, accerſunt, ſed & qui vitium aliquod malignitatis illius, quâ deſcripſimus, in ſe continent, ſi ſanguini, quem gignunt, vtramque noxam inurant, febres iam non ſimpliciter putridas continuas, ſed malignas inſuper, illis que qui hoc viuendi genere uſi ſunt, infeſtas proferunt. Quales quoque poſt famem diurnam hominũ ſocietatibus, & militum expeditionibus ſequi ſolere, dictũ hoc vetus, *μετὰ λιμὸν λοιμὸς*, poſt famem peſtis (ſic febres malignas quoque vocantes) oſtendit.

Retentus quoque diutiùs in corpore ſanguis putris, quemadmodum ſi alicubi è venis effuſus in corporis aliqua ſede hæreat, venenatamque naturam induat, ſymptomata, qualia in ijs, qui à beſtijs virulentis icci proueniunt, excitat: ſic & in venis ſanguis alicubi putreſcens, certoque loco, vbi febrem excitare nondum poteſt, diutiùs ſubſiſtens, ſi veruſtate adeò degeneret & corrumpatur, vt iam non ſolùm putris, ſed & pernicioſus exiſtat: non tantùm putridis exhalationibus febres putridas, ſed & maligna vi exitioſas, & characteribus quibuſdam interdum notatas inducet. Quales in adultis præſertim, ſed certis duntaxat naturis impuris, etiam nulla graſſante febre epidemia, ijs ſolent accidere, qui diu priùs, antequam febre illa corripiuntur, in neutra veluti conſtitutione poſiti, affectionibus tamen quibuſdam præſagis grauati, tandem in febrem in-

cidunt:



cidunt: Quam malignam esse, subita virium prostratio & maculæ, aliæq; latentis veneni indicia nonnunquã erumpentis coarguunt. Sed & in infantibus præcipuè febres eandem ob causam, etsi ob robur naturæ mox virus propellentis, non ita perniciosè ecchymatibus tamen & exanthematibus copiosè erumpentibus, totumque corpus contaminantibus, horrendæ & contagiosæ, pleraq; ipsorum certò ætatis tempore inuadunt corpora. Per quas illuuiem illam impuri putridiq; ipsorum sanguinis, quam à primo ortu ad illud infantie tempus vsq; quo hæc putredo iam inualescens febrem parit, coaceruarunt, excutiunt, & sic corpus primà hac ætate, à putredine hac in sanguine natà, vti postea sequentibus ætatibus per scabiem, aliasq; naturæ expurgationes, purificant & veluti renouant. Quæ excrementa per ecchymata primùm erumpentia, non solum à materno sanguine, quem menstruū vocant, vti voluerunt, dependent: cum non impuro, sed laudato matris sanguine foetus alatur, & quæ excrementa inde colliguntur, ad pariendi tempus vsque coaceruata, mox vbi foetus in lucem prodit, per secessum, non solum biliosa & subuiridia, sed & atrii sanguinis instar copiosè deiciantur: verum etiam postquam foetus natus est, ex victus illa mutatione noua illuuiis, vti postea, eà rursus immutata, aliæ superfuitates congeruntur.

Calor  
Mali-  
gnus  
tū, cau-  
sa febrili  
tantum  
Mali-  
gnarum.

Maligna sola qualitas, non iam putredini copulata; sed per se febres accendit, eas quas Pestilentes & Venenatas nominauimus. Quæ qualitas in corpore rariùs, nisi putredo eam præueniat, & proin cum putredine iuncta sit, suscitatur: sed à veneno extrinsecus corpori illato prodit: illo scilicet, quod eam vim habeat, vt statim postquam corpus subiit, primo insultu cordi venenatam suam vim imprimens, malignamque hanc in illo qualitatem, excitans, vires illius totiusque corporis simul mox prosterнат: illudque & vnà cum illo spiritus & humores, corporisque partes accendat: febresque sic pariat, ad ephemerarum vel synochorum naturam quoque nonnihil accedentes, sed cum summa virium imbecillitate coniunctas, easq; sicuti & illas, vel soli-

tarias, vel affectu alio aliquo externo comitatas: Quæ tamen differunt pro ratione veneni præcipuè, à quo hæc febres oriuntur, Cum enim venenorum multa occurrant genera, quæ non solum certis corporis partibus insidiantur (sicuti illorum sunt variae noxæ) sed cor, vti dictum, afficiunt, atque inter ea quædam etiam illud inflammantia febres accendant, & hanc in ipsis proprietatem, qualis sit, explicare minimè possimus: illud tamen præstare ex effectu cognoscamus; Ex effectuum quos proferunt diuersitatibus præcipuis, omnia hæc venena febres inducentia in duo genera referemus. Vnum venena à manifestis causis prodeuntia in genere comprehendens: quod venenum inflammans vocabimus. Alterum à causa occulta profectum: venenum pestilens appellatum.

Inflammans venenum aliquod inueniri, *Venenū inflammas causa febrili* quod ab ictu bestię venenatæ, fortè & aliunde, corpus subiens febres Venenatas ob id dictas accendere possit; ex accidentibus, inflammatione nimirum vehementi, calore summo totius corporis; siti immensâ, horrore & rigore, superuenientibus, colligere possumus, vti Nicander & Diosc. hæc describunt: Nicandro expressè testante dipsadis serpentis morsu cor prorsum accendi. Quæ febres propriæ tantum illis, qui hoc veneno tacti sunt, sæuissimis, iam dictis, alijsque nonnunquam accidentibus coniunctæ sunt. In quibus si portio aliqua veneni, vi naturæ ad exteriora propellatur, characteres aliqui, per maculas aut liuores erumpentes, se in cute alicubi manifestant. Sed & nonnunquam bubones, vt in peste correptis, erumpere, Nicander in cerastæ serpentis morsu, vnde in vtroque inguine incessantem dolorem oriri scribit, comprobabat. Interdum & illic vbi morsus factus est, virusque hoc corpus subiit, pustula vel inflammatio aliquando apparent, illamque per quam venenum corpori infusum sit, viam manifestat.

Pestilens venenum omne cuiuscunq; sit *Venenū pestilens causa febrilis* generis corpus subiens, febrem accendit, Pestilentem dictam: cum rarò inueniatur *hæc venena* pestis, licet in quibusdam calor vix aliunde

quàm ex solo pulsu deprehendatur, sine febre existens: quæ & sicuti aliæ venenatæ, exitiosa est, & præterquam illæ, contagiosa quoq;: & contagij causâ, generalis multis & popularis. Hoc autem virus pestilens, reliquorum venenorum instar, ab exterioribus corpora primùm inuadere, ex eo, quod veluti in momento hominem feriat, satis patet. Verùm vbi extra corpus quod afficit adhuc positum lateat, cum occultè, non cognito loco, à quo emergit, inuadat, secus ac reliqua venena, quorum plerumque sedem, vnde prodierint, cognoscere possumus, hic verò, nisi à vicino corpore affecto illud prouenisse suspicemur, vnde nam venerit incognitum nobis existat, valde dubium est. Plerique in aëre venenum hoc latere, atque vnâ cum illo corpora nostra subire contendunt: vel cælitus seminibus pestiferis in aërem immisis: vel, aëre magnis temporum mutationibus atque exhalationibus, adeo vitiatò, vt non tantum malignitatem eam, qualem in putridis malignis febribus inde excitari posse diximus, concipiat, sed & pestiferam illam vim adipiscatur. Quæ tamen quò minus probare possimus, omisis multis alijs argumentis, hæc ostendere satis videntur, quòd post magnas eiusmodi sæpè tempestates diuque durantes, etsi alij morbi, nulla tamen pestis, illis præsertim in locis, vbi contagium corporum ægrorum vitatur, sequatur: & quòd pestis sæpè numero, nullis eiusmodi temporum, syderum, astrorum mutationibus prægressis, aut præsentibus, aut illis saltem quæ nullius momenti sunt, nihilominus grassetur, interdumque populariter: sicuti Anno 64. præsertim in peste illa magna, quæ apud nos fuit, nemoque aëris incontinentiam accusare potuit, diligenter obseruauimus. Inprimis verò, si ab aëre venenato, vt vocant, pestis suam originem sumeret, omnes quicunque in eo versantur, eumque hauriunt, hanc luem mox contraherent: cum venenorum in ea sit natura, vt cum totâ substantiâ nobis aduersa sint, qualiacunque vel quomodocunq; disposita corpora petant, virus illi imprimant: quòd cum hic minimè accidat, & pestis è vicinis, eo-

demque aëre fruuentibus, vnum vel alterum, vel aliquos saltem apprehendat, in aëre causam pestis subsistere, atque inde in humanum genus propagari, affirmare minimè possumus.

Verisimile magis esse videtur, quemadmodum & reliqua venena, in corporibus certis, ab origine mundi innata, hærent; sic & pestilens hocce venenum, non tantum hominum quibus corporibus, qui iam peste ægrotant, sed & aliorum, nondum, vt iam dicetur, febricitantium, & in vestibis quoque, alijsve quibuscunque delitescere posse, & de corpore in corpus, non solum mutuo contactu, sed & intermedio aëre, corpora hæc interueniente, & venenata illa semina ab vno suscipiente, & in aliud deriuante, transferri. Quod & virus pestilens, vel inspiratione attractum, cor mox afficit, febreque in momento accendit: vel aliquin corporis aliquam sedem occupans, inde vel ad cor vsque inspiratione, vel per cæcas vias, progressum, idem facit: vel illic aliquamdiu subsistens nec vltius propagatum: corpus infectum, nondum tamen pestilenti febre laborans reddit: à quo tamen vel proprium corpus, vel aliorum, nunc citius, nunc tardius, potest affici. Quæ & causa est, quòd aliqui ab infectis locis in alia loca: vbi nulla est pestis, fugientes, illicque aliquamdiu hærentes, post multos sæpè dies peste primùm corripiantur, vel non correpti alios inficiant: sicuti & scortum, quod cum eo qui lue Venerea inquinatus fuit, coierit, ab eo nondum ita infectum, vt eo morbo ægrotet, alios tamen dein qui cum illo congregiuntur, eadem lue inficere posse experientia docet, Ferneliusq; etiam testatur. Et proin affirmare hoc non veremur, seminaria hæc pestis, vt & alia venena, in aliqua mundi plaga semper in quibusdam corporibus residere, ab eaq; in alia loca, eo modo, vt dictum est, propagari. Sicuti & luis Venereæ venenum, homini saltem, vt ferè & pestilens hoc venenum contagiosum & noxium, simili modo, primùm ab Indis, de corpore in corpus serpendo, ad nos vsque peruenisse, atque nunc quoque nullibi quàm in corporibus subsistere, & nunc in nos illos-

ve per contagium vagari scimus. Quæ lues, sicuti quandoque in quibusdam regionibus nullibi se manifestans, alijs tamen in locis in certis corporibus residet, & per vnum aliquem rursus in regionem eandem transfertur: sic & pestis, etsi diu sæpè quibusdam in locis cessarit, nihilominus alicubi terrarum corporibus quibusdam inhærens, inde suo tempore in alia corpora, vti dictum, deriuatur: vt non necesse sit, eo nomine, quia interdum nihil de ea vbi vigeat audimus, quasi penitus extincta è mundo sublata sit, eam cum redit, in aëre, de nouo genitam, indeq; delapsam statuere: licet aërem quoque maligna qualitate imbui, & cum ea corpora subire posse, sicuti in putridis malignis modo dictum fuit, minimè negemus: vti & pestis contagio à corporibus affici infectis, ab eoque in vicina corpora, modo prius dicto, deduci, quoque concedimus: exordium verò illius ab aëre proficisci, admittere ob causas enarratas minimè possumus. Quæ omnia in veneni huius pestilentis se de & origine inuenienda, vti probabilia sunt: ita valde arduum, explicare quâ ratione venenum hoc pestilens per contagium de corpore in corpus migret, aut quare hæc illavè corpora potius inuadat, alijs in eadem vicinia existentibus parcat: cum hoc non adedè apertè, vt in cæteris venenis, sed occultè, vti dictum, fiat, vti verò facilius est ostendere, quare febres non eiusdem naturæ existentes, aut iisdem accidentibus & characteribus comitatæ, inde nascantur. Quæ omnia vel ratione veneni: vel subiecti corporis, quod hoc veneno infectum est, dispositionis: vel virium causâ accidunt.

Venenum pestilens eiusdem naturæ minimè esse, sed diuersæ, effectus illius tantopere differentes, qui corporis affecti constitutionis solius causâ, non sic variare possent, ostendunt; cum aliqua regnet pestis, quæ sine discrimine in omnes vel plerosque sæuiat: alia verò quæ paucos tantum inuadat: alia quæ quosquos tetigerit interficiat, magnamque stragem edat: alia, quæ correptorum multi sanantur: Verum quidnam in veneno latens illius varietatis causa sit, atque

vnde proficiscatur, vti & in cæteris venenis, describi minimè potest.

Dispositionem corporis, vel cordis, vt vult Fernel. aptam quæ hoc venenum facile suscipiat, inuenire, æquè impossibile, atque veneni huius naturam ostendere, videtur. Cum cuiuscunq; constitutionis & temperamenti sint homines: atque inter eos, non solum qui impuro corpore existunt, sed & qui puro & sano præditi sunt, facilius hac lue affici videamus: ita vt vel nullam aptitudinem hîc requiri: vel si quæ est, qualis ea sit, non solum cognitu difficillimam, vt ait Fernel. sed incognitam penitus & abstrusam esse, fateri cogamur: & proin in causa tam priore, quæ in veneno occulta, quam in hac, quæ in corporis aptitudine ignota latet, ad diuinam solum prouidentiam confugere, quæ pestiferam hanc luem, vel pœnæ nomine, in certis regionibus, nunc hîc, nunc illic latentem excitat, atque in ea loca quæ vult, per se, vel per medium aliquod, in eos quos Deus signauit, transfert, quibusdamque è medio sublati, alijs saltem castigatis rursus prout disposuit, vt aliò transmigret, procurat. Verum etsi dispositionem illam, quæ vnumquemque ad pestem suscipiendam aptum ineptumve facit, non aliter explicare possumus: tamen quod febris pestilens non vna eademque à veneno hoc pestifero exoriat, subiecti corporis quod afficitur diuersitatis causâ accidere, demonstrare possumus; cum quemadmodum & ignis pro materiæ accensæ varietate vehementius leniusve vrit, sic cum in quæuis corpora grassari queat pestis, pro eorum varietate febris inde nata alio alioq; modo se habet.

Temperata corpora si inuadat (nec illis enim parcit, sed & hæc præcipueque infantes, virgines, adolescentes, beneque habitos corripit) febrem nunc mitiorem, Diarriæ similem, facit; accensis cum corde tantum ferè spiritibus: proin & tunc calor, & quæ hunc sequuntur accidentia mitiora apparent, nec vrinæ admodum mutantur.

Sanguineos & plethoricos si pestis corripiat, tunc si nullo cum corde, spiritibus & sanguine quoq; inflammatis, febris hæc pe-

stilens Synochis affinis erit: in qua maior æstus, & quæ ab eo prodeunt, capitis dolor, cum rubore faciei, aliæq; ægrotantem vehementius vrgent symptomata.

Biliofos verò si pestis præhendat, tunc ob calorem cordis, spirituum & humorum, bile quoque efferuescente motaq; præter caloris enarrata symptomata, vomitus, deiectiones, aliæque accidentia, à bile prodire solita, ægrum molestant.

Impura corpora, præsertim autem ea quorum sanguis putredine prius nonnihil infectus est, & quæ ad febres putridas iam erant disposita, si pestis occupet; tunc ad Putridas continuas, malignas præsertim, febris hæc pestilens accedens, & calore acri, alijsq; grauioribus peste correptum affligit symptomatibus: & impuritatis causa excretiones fædas profert.

Virium quoque nec tantum veneni, ut prius dictum, causâ accidit, ut in maiori minorive periculo peste laborantes versentur: cum validæ vires validius huic noxæ resistent, debiliores citius succumbant. Sed & earum causâ potissimum euenit, ut characteres aliqui, latentis veneni indices, in exterioribus erumpentes, se manifestent, vel minimè appareant. Nam si ob naturæ debilitatem, venenum pestiferum circa cor, corporisve interiora penitus subsistat, nullum illius indicium foris profert. Quod si verò naturæ robore portio illius in partes extimas excutiat, tunc quamcunque attigerit, vi suâ quam in se habet ardente inflammans, vel causticâ etiam adurens, ruborem, dolorem, stigmata, sub axillis: vel bubones in adenibus, vel iuxta aures: vel anthracem alicubi quorum causâ, si magna sit inflammatio, febris incrementum quoque sumere potest, parit. Nonnunquam verò in poros cutis, si se exoneret, maculas, pustulas, illic, sicuti in generibus ostensum, protrudit. Quos omnes characteres, venenum, eò à natura, ut dictum, protusum potius profert, quàm quod cum corpus subit, in ingressu suo, notam hanc, sicuti aliqui existimarunt, mox imprimat; cum naturâ, etsi ex his aliquâ subito in prima febris inuasionem appareant, ubi primum

offensam sentit, statim eam repellere & venenata hæc vis uti in momento cor petit, ita illico quoque retrocedere possit. Nisi fortè ex contactu corporum infectorum, tale quid nascatur; sicuti mihi in manibus, cum peste laborantem sudorem mortalem exudantem tangerem, foceroque chirurgo in pedibus, pustula, hanc ob causam pestilentialis, citra febrem & aliam noxam nata, mox tamen iterum euauit. Sed & fit ut bubones in peste correptis, non semper à venenatâ illâ vi in corporis emundatoria excusâ, verum ob carbonis vicini ardorem, doloremque, influxum hunc in adenes commouentis, uti in alijs quoque inflammationibus accidit, proueniant. Licet & quandoque ab vtriusq; causis proficiantur, tunc plures numero fere, vel iisdem, vel diuersis in locis proueniunt, qui dein inflammati suppuratique nouam interdum febrem priori veluti coniungunt. Quæ omnia diligenti & longa obseruatione perscrutatus, qui iam sexies pestilentia apud nos regnanti interfui, & ad singulorum finem usque perseueraui, pesteque correptis fideliter adfui, manumque adhibui, in medium, sicuti hæc vidi & cognoui, proferre, veritati potius quàm vlli addictus magistro, non dubitavi.

Institus & constans calor in corde, singulisque partibus impressus, non uti illi quem aduentitium & mutabilem esse diximus, Græci que ignem vocant, qui citra temperaturâ ipsorum speciei permutationem, has partes accendere atque rursus euanescere potest, partibus quæ incaluerant ad pristinam constitutionem iterum redeuntibus: (quod ita fieri posse Fernel lib. de temperamentis cap. 9. quoque eleganter ostendit) sed hic in quo temperamentum ipsaque elementorum proportio, ut verbis utar Fernelij, in calidius atq; siccus ita conuersa sunt, ut ægrè calor ille amplius ex illis auferri, seu temperamentum hoc calidius & siccus permutari possit, febres excitabit, quæ perseuerantes & diuturnæ sunt, & vix aut nunquam amplius è corpore extirpari possunt: vnde Hæctica, quod corporis habitu, quem *ἡσυχία* appellant, firmius consistat, cum

Calor institus & impressus causa febrium hæctica.



cum *febris* à suo subiecto ægre separetur, appellatæ sunt. Et cum calor in ipsis non igneus, vt reliquarum febrium sit, sed vt dictu, temperamenti duntaxat quædam in calidius & ficius cōmutatio: idcirco calorem vix dum persentiunt, licet & totius corporis partes similes alteratæ, calidiores & ficiores esse tactu, vt & cor ex pulsū cito & duro deprehendantur. Quorum tamen calor non similis semper permanet, sed tunc cum corpus alioquin calidius redditur, quod non tantum cibo sumpto, cuius saltem meminerunt, sed & ex motu vehementiore alijsque de causis accidit, augetur atque exacerbat, pulsusq; & cordis motus admodum intenduntur. Sed & corporis hæc, quæ febres hæc sequitur, consumptio & marasmus, non illius est à calore vehemētiore facta colliquatio, quā portiones aliquas corporis dissolutas per vrinas excerni, temerè excogitarunt, falsi fortē ijs, quæ à renibus impuris & vesica prodeuntia, vrinis nonnunquam innatant, cum aliàs nullo modo id fieri possit, vt nec in ardentissimo causone adeo partes assentur vel liquecant: cum hic marcor ob partium simularium temperamenti quoq; in calidius & ficius, cordis causā, permutationem, quo nomine non rectè nutriuntur, sed sensim emarcescunt, eueniat.

Causa verò efficiens istarum hēcticarum, est febris alia, hæc præueniens, illisq; occasione præbens, cum vix ab alijs causis cordis temperamētū adeo perueriti posset, nisi interueniente prius febris alterius igneo calore; qui vel suā efficaciam aut diuturnitate, cor tandem sic immutaret. Vnde & rariū à simplici & puro calore, in febribus diarijs excitantur, quæ exacto tempore quo aliàs cessare solent, si non desinant, nec in putridas commutentur, in has abeunt. Sicuti verò frequentius à putridis tam solis quā malignis, cum diuturniores sint, generantur, præsertimque si calidissimo causone cor diu flagrarit, qui tandem restingus hanc post se intemperiem relinquit, hēctica tunc illa diuturna, in qua corpus sensim cōsumitur, causone cessante, succedit: non autem illa, in qua causone adhuc remanente, ob illius magnum incendium cor adeo torretur, vt to-

tum corpus subito consumatur, quam hēcticam colliquantem quoque vocant, cum tamen nulla alia à causone sit noua febris. Verum & ab intermittētib; diuturnis, caloremq; vehemēti flagrantibus, hēcticæ quoq; eo modo produci possunt: Vti & si continuis copulatæ, in hæmitritæo diu perseverante, idem accidere posse, Fontan. quoque docet. Sed & ab alijs putridis etsi lento calore præditæ sint febres, si diuturnæ admodum existant, corque continuo suo calore longo tempore pulsant, tandem illud ita permutari potest, vt febris hēctica, lento calore quoq; prædita, hæc lentas putridas febres sequatur: sicuti in cachecticis, & præsertim phthisicis, cum causa cor afficiens illi adeo vicina sit, lentas hæc febres in hēticas conuerti videmus. Sed & putridis continuis & intermittētib; quæ hæc febres hēticas pariunt, febribus adhuc vigētib; , hēcticæ sæpè incipiunt, & cum ipsis complicantur: quod sicuti superius ostensum fuit, ex febrium prædictarū accidentibus adhuc perseverantibus, & corporis maiore consumptione, quā alioquin in febribus putridis eueniat, depræhēdimus, vt cum hēctica cum putrida acuta lentaq; vel intermittente coniuncta est; quod plurimum facit cordis dispositio, si illud naturā temperamētum calidius adeptum sit: quod facilius à febribus dictis, atque amplius incalcescit & exiccatur. Vti & cor tenerius adhuc, in quo calor ille extraneus facillè imprimitur: illiusque nativum temperamentum destruit, occasionem præbet: ob quam causam in infantibus iunioribus, febres hēcticæ tam sunt consuetæ, vt non solum prægressā diuturna febre, sed & diariā, in hēticas labantur.

#### Curatio.

**C**uratio omnium febrium, à morbo indicatione desumptā, generalis est refrigerare & humectare: cum omnis sit calida & sicca. Verum cum non vnus idemq; sit calor in omnibus illius speciebus, & causæ illius admodum diuersæ existant, vnde tot febrium oriuntur genera, prout hæc causis, vel conueniunt, vel discrepant, cura diuersis febrium generibus erit accom-

modanda. Quorum præcipua esse diximus: quod aliæ febres Solitariae seu solæ, nullo alio morbo comite se offerunt: quæ rursus vel simplices, vel compositæ sunt: aliæ verò alio morbo Comitatae existunt: quorū trium summorum ipsorum generum causâ, primum cura febrium variat.

Simplices solitarias febres eas appellauimus, quæ vnius generis sunt. Quæ tamen ob causam diuersam varia rursus sub secōprehendunt genera: quorum causâ & cura ipsorū variat: cum vel à calore simplici prodeant, Puræ & simplices dictæ febres Ephemeræ & Synochi: vel putrido, Putridæ continuæ & intermittentes: vel maligno, Malignæ putridæ, & Pestilenciales & Venenatæ: vel à calore fixo, Hæcticæ. Quibus octo generibus, priuatim singulis curationem accommodabimus.

*Ephemeræ  
væ febris  
curatione.*

Ephmera febris pura seu simplex, solitaria, sponte, primo die plerumque ante viginti quatuor horarum spatium elapsum cessat, nec periculum adfert. Quod si ulterius ob errorem commissum, aut causæ magnitudinem perseueret, in synochum, rarius in hæcticam, vti dictum, commutatur. Quod ne fiat, sic eas, per ea quæ euacuant atque alterant, gubernare oportet.

Ad euacuationem materiei illius subtilis seu fuliginosæ, vt vocant, quæ ab accenso non nihil sanguine in vaporem resoluitur & expirat, per insensilem transpirationem, vel madores manifestos, naturâ, quæ & sponte illud, nisi impediatur, per eiusmodi excretionem facit, iuvabimus.

Corpus ægri tectum, ne percussio fiat, seruando.

Cibum nullum antequam declinet febris, ne naturæ motum impediamus: vel si vires in corpore debili langueant, tenuem saltem exhibendo.

Propinandoque ea interdum, quæ transpirationem illam, vel etiam sudores mouere possunt, vti in synocho comitata mox explicabitur.

Alvus si laxa fuerit, minus de commutatione huius febris in synochum erit periculi. Quod suppositorio vel clysmate, non per assumpta, hoc breui tempore rectius perficitur.

Vomitum si ab assumptis, & vino præsertim corpus adeo incaluerit, non erit inutilis.

Alteratio non magna, cum calor mitis sit, instituitur. Nisi quod aërem, in quo decumbit æger, si calidior sit, contemperamus potius quam admodum refrigeramus: ne calore subito ad cor represso, febrem augeamus, aut transpirationem sudoresve impediamus. Potu quoque moderato, si sitiant, leuiter eos refrigeramus, seu potius refocillamus: quo & sudoribus, vt melius prodeant, occasionem præbemus.

Synochus simplex seu pura, si solitaria manet, etsi vehemens in ea sit calor, citra tamen noxam, si recte tractetur, tertio vel ad summum quarto die, vel expirat, vel sudore soluitur. Quod nisi fiat, in putridam vel hæcticam abit. Frequentius verò, effusâ è venis portione sanguinis, erysipelata, bubones aliosque externos affectus, citius tardiusve: vel internas inflammationes subito plerumque producit, sicuti mox in comitata synocho explicabitur.

*Synochi  
febris non  
putridæ  
curatio.*

Quibus vt occurratur maturè, dum solitaria adhuc est febris, & præsertim ne internæ inflammationes, quæ summè periculosæ sunt, sequantur: morbi causâ incendium hoc sanguinis subito restinguere studebimus: sanguinemque ne è venis excidat, retinere: & quicquid ab eo in vapores abiit, discutere: accidentiaque insuper grauiora corrigere. Quæ nos obseruatâ interim corporis constitutione, an sanguinea, biliosaue sit, hisce remedijs perficimus.

Sanguinis detractio primum locū tenet, & ad sanguinem inflammatum euertendum, vt vocant, eumque, ne è venis in partes nobiliores irrumpens, illic periculosas inflammationes procreet, reuellendum, (quo nomine & Fontanonus eam maturandam censet, sicque meæ sententiæ has inflammationes synochos sequi, non anteire, subscribit) præcipuum est remedium. Quam ob causam in plethoricis subito illa fieri debet: & si die primo, quia ephmera esse existimabatur, intermissa fuerit; altero, cum iam synochum esse, ex eo quod febris non remiserit, constat, mox erit instituenda, & per venæ generalis aperturam molienda. Atque insignis

inignis illius quantitas detrahenda: & in robustioribus & summe plethoricis, ad animi deliquium vsque, teste Galeno, facienda: vel saltem iteratis vicibus, quod & tutius est, repetenda. In biliosis tamen & iunioribus (quibus etiam decimum annum egressis, si periculum inflammationis immineret, venam aperire non vereretur) parcius erit administranda.

Per alvum euacuatio, cum de causa nihil demat, & corpus tantum accendat, minime competit. Ante venae sectionem tamen, alvus si laxetur, vtile erit: idque ut citius fiat, per Clysterem, qui simul etiam refrigeret, rectius perficitur, hoc modo: R. herb. Emollientiarum quatuor ana M. j. Lactuce M. β. Hordei p. j. fiat decoctio, in qua dissolue Caisiae rec. extracte ʒ. j. vel succi Betae & Lactuce an. ʒ. β. Mellis, Butyri rec. ana ʒ. j. Salis parum, fiat Clyster. Sed & post venae sectionem, reiterari potest, si alvus astricta sit.

Vel illius loco syrupus Viol. vel Rosat. sol. ad ʒ. ij. cum aqua fontis dissoluti dantur: vel Diaprunis simplex, aliave ex leuioribus: quibus & cacoehymia, si illa adsit, minuitur.

Vomitibus in consuetis, maxime naturam ad eum impellente, conceditur. Praesertim vero conuenit, si a vino, aut alijs assumptis, febris haec nata sit. Et si bilis in synocho, in ventriculo efferuescat, molestetque, plurimum iuvabit.

Exhibentur quae feruorem sanguinis restringendo extinguunt, vel mitigat: eumque ne facile a venis excidat, incrassant. Quod actu potentiaque frigida praestabunt. Et quae putredinem, in quam sanguis inflammatus facile conuertitur, arcent, & sic, ne in putridam synochus abeat, praecauent: qualia acida sunt, quae vtrumque refrigerando & putredinem inhibendo praestare possunt. Quae & cum bilis feruorem compefcant, in illius redundantia & efferuescentia eam egregie retundunt: oris amaritudinem & sitim potenter emendant, sic triplici nomine iuvant. Quae omnia varijs formis sic vsurpantur.

Aquae frigidae potus, praecipuum quod sanguinis feruorem compescere potest, est remedium: qui & ad satietatem vsque, faustus, una cum sanguinis ad animi defectum vsque edu-

ctione, ad curationem huius febris sufficere, duoque haec esse potissima illius remedia hactenus creditum est. In quo tamen constitutio corporis, & consuetudo, huius remedij quantitatem, vel augere, vel minuere possunt.

Aqua cruda, vel cocta, addito interdum Hordeo, Aceti pauxillo, vel succo Granatorum, Limonum, aliorumve, acidula facta, loco potus exhibita, plurimum quoque proderit.

Aquae stillatitiae etiam commendantur: ut Portulacae, Acetosae, assatum bibitae: quibus decoctum Hordei permiscere possumus. Plerique Lentium decoctum commendant, quod tamen si erysipelas appareat, ut materia foras euocetur, potius locum habet, sicuti illic explicabitur.

Iulepi quoque ex syrupis de Ribes, Granatorum, Limonum, Acetosae, Citri, vel Iuiubini, ad sanguinem incrassandum, permiscendo illis aquas conuenientes facti: atque vsitati iulepi Rosar. Viol. Capill. Ven. conueniunt.

Vel si alvus astricta sit, hoc modo: R. syrupi, vel iulepi Viol. (differunt enim tantum quod ille ex succo, hic ex aqua Violarum parantur) ana ʒ. j. β. syrupi Ribes ʒ. j. decocti Hordei ʒ. vj. aquae stillat. Buglos. Acetosae. an. ʒ. ij. fiat iulepus: aromat. tantillo Cinnamon. in delicatis, vel Galanga, ad gratiam.

Quod si alvus nimium fluat: R. iulep. Alexandrini, vel illius loco iulep. Rosacei (qui propter aquam rosae astringit, cum syrupus laxet) ʒ. ij. decocti Hordei duplum: Utatur per vices.

Syrupi etiam supradicti per se, cochlearis vnus vel duorum mensuram dantur.

Olei Vitreoli guttas aliqui permiscunt Aquae acidamque sic redditam propinant.

Conseruae & conditurae sic exhiberi possunt: R. conf. Ros. ʒ. j. conf. Acetosae, rob. de Ribes ana ʒ. β. cort. Citri cond. ʒ. β. cum syrupo de Ribes.

Vel tale conditum: R. conf. Ros. Acetosae, rob. de Ribes sicci parum, & rob. de Berberis, si alvus nimium fluat, an. ʒ. ij. Coralli ʒ. j. Santali rubri ʒ. β. Sacchari ros. tab. quantum sufficit, fiat conditum.

Externis remedijs alteramus, cordi, hepatri & renibus frigida adhibendo: quorum consensu vniuersum corpus refrigerium sentit.

Cordi

Cordi hoc epithema: R̄. aquæ Rosar. ʒ. iij. aq. Buglos. Borr. ana ʒ. ij. aceti Rosacei ʒ. ʒ. succi Pomorum acidorum, vel Limonum ana ʒ. ij. Santali rub. ʒ. j. fiat Epithema.

Hepati verò tale: R̄. aquarum Endiuſæ, Acetofæ ana ʒ. iij. aceti Rosacei ʒ. ʒ. Spicæ ʒ. j. misce.

Renes inungimus Cerato albo Gal. vel Santalino vnguento.

Balneum aquæ dulcis in declinatione, ad refectiorem, & vt quod residuum est discutiat, prodest. Post quod Oleo humectante, corpus, vel spina vnguntur.

Frictio in declinatione quoque, ad vapores à sanguine calido excitatos, resoluendos, lenis, pannis calidis, competit. Postquam Oleo chamæmelino corpus inungendum.

Somnus, tum quia reficit, sitim sedat, sudorem prouocat, commendatur.

Accidentium correctionem quod attinet, Vt vires sustententur, Viçtus conceditur nutriens, sed tenuis: vt Prisana seu cremor hordei: Lac Amygdalinum, Fructus cocti. Remedijs alijs, præter ea, quæ prius inter refrigerantia enarrata sunt, cordialibus, si restaurare illos velimus, possumus.

Dolor capitis, Vigiliæ, Delirium, Sitis, Oris siccitas, Linguae asperitas, si grauius afficiant, vt suis locis dictum est, emendantur: quæ tamen plerunque, prioribus rectè administratis, sponte cessant.

*Continuum putridarum febrium curatio.* Continua putrida solitaria febris, etsi varias species sub se comprehendat, veluti continuam Tertianam, Quotidianam, Quartanam, & quæ illis frequentior est Inordinatam dictam: Synochum item putridam & Cautionem: cum tamen harum omnium causa sit eadem, sanguis in venis putrescens; licet ob illius diuersitatem loci; varietatem, hæc illius species pro exacerbationum ratione tantum differentes oriuntur: nos tamen omnium curam simul, cum pleraque, si non omnino, saltem ex parte singulis accommodari possint remedia, explicabimus.

Prædictionem verò quod attinet: cum vt inquit Hippoc. acutorum morborum (febres intelligens) incerta sint iudicia, non temere salutem aut mortem polliceri debemus: periculum tamen aut bonam spem, nec hæc ta-

men friuolè nimium, sed ambiguè patefacere possumus, obseruatis signis atq; accidentibus, diebusque in primis decretorijs, sic quod aliquid decernant, appellatis; atque inter eos indices vocatos, obseruare conuenit, vt prout in illis signa bona malæ se offerunt, an crisis bona, malæ aut dubia, in certos quoque dies cadere solita, futura sit, prædicere queamus: ex quibus vti veteres iudicare soliti sunt, sic & nos singulis diligenter consideratis, aliquid, circumspicere tamen, pronuntiare possumus. Nam si in melius crisis vergere debet, quæ ad salutem ducit, in diem decretorium bonum cadere debet, qui Septimus est primæ septimanæ, & Decimus quartus secundæ. Vigessimus verò non vigessimus primus, tertiæ: eodemq; ordine deinceps Vigessimus septimus, Trigessimus quartus & Quadragessimus: quos Quartus, Vndecimus, Decimus septimus, reliquique eos triduo semper præeuntes indicare solent. Indices ob id dies dicti. In deterius verò si crisis abire debet, quæ mortem adfert, tunc in diem malum decretorium incidere solet: qui est vel Sextus, vel Octavus, vel Decimus, vel Duodecimus. Incerta crisis ea est, in qua non omnino remittit febris, proin & imperfecta dicitur & dubia, in bonam aut malam partem postquam redierit, tendens. Hæc autem die frequentius, Tertio, Quinto, vel Nono fieri solet. Cæterum signa prognostica, accidentiaq; quibus de euentu febrium iudicamus, præcipua sunt sequentia.

Vrinæ, cum materia in venoso sit genere, atque ob id maximè mutantur, inter hæc signa toto febris decursus tempore maximè obseruantur. Quæ si colore fuerint intense croceo, aut ex aureo colore rubescentes, calorem ostendunt: vel bilis per vrinas expurgationes. Nigrescentes verò maius incendium cum denotent, perniciosæ sunt: nisi atrabiliarius humor per criticas euacuationes effusus eas obscurat. Substantia, si tenues sint, quocunq; calore præditæ, crudæ, proin & deteriores quàm crassæ iudicantur. Perspicuæ si sint, siue tenues siue crassæ, cum ad naturales accedant, bonæ. Turbulentæ: si ab aëre externo corruptæ sint, quia hoc crassæ & coctis solet accidere, nihil mali portentuat:



dunt: si confusæ statim turbidæ mingantur, nisi hoc in critica aliqua expurgatione fiat, malum significat. Hypostasis in vrinis bona est, si in fundo subsideat: collecta sit, non dispersa aut discerpta, vbique æqualis, alba, crassiuscula: præsertim si diebus indicibus & decretorijs mox talis appareat: quæ ab enarratis notis recedit, minus bona est.

Pulsus maximè hîc calorem & vires quo pacto se habeant, patefacit. Qui quò frequentior & celerior est, maximè in diastole, eò maiorem adesse calorem declarat. Et prout parvus, vel magnus esse deprehenditur, vires dijudicat. Inæqualis admodum, Intercidens, Myuros & Vermicularis, nihil boni significat.

Respiratio difficilis, parua, summè concitata, non bona.

Sudores quos æger facillè fert, & qui totum corpus madefaciunt, calidiq; sunt, boni existunt. Graueolentes si idòneo tempore prodeant, non sunt noxij. Frigidi verò mali, & in agone mortem præcedunt.

Mictio copiosa vtilis, & critico die bono superueniens, febrem tollit.

Sanguinis è naribus fluor, vti & mēstruus, intempestiuè superuenientia, nō leuant; critice verò, febrem solvunt.

Diarrhœa subsequens nisi de causa morbi aliquid auferendo iuuet, cum debilitando plus obicit, periculosa. Vti & deiectiones nigræ perniciem morbi portendunt.

Exacerbatio febris si perpetua sit: & si corpus continuò aduri videatur, vt in ardente febre: vti & si quotidie illa fiat, & bis tēve repetat in febribus quæ inordinatæ & quotidianæ dicuntur, periculosa existit.

Corporis vehemens iactatio & summa inquietudo, denudatioque, & ad pedes, vt inquit Hipp. deuolutio, febris magnitudinem & virium prostrationē denuntiant. Somnus si laborem facit, pro malo signo quoque ab Hippoc. habetur. Collapsa tempora, nares acutæ, linguæ nigredo & siccitas, extremorum frigiditas, pro malignis signis habentur. Vti & subita totius corporis in causone colliquante diēsa consumptio.

Syncope grauis & frequens, Singultus perseverans, & Convulsio, Caros, accidentia

peruersa & nonnunquam lethalia existunt.

Curatio febrium continuarum putridarum, etsi à natura perficiatur, quæ sola hunc morbum potest euincere, sicuti & sæpè hoc peragit, adiuta tamen Medici operâ; rectius & citius illud præstabit. Si de causa morbi, quæ illum facit, vel auget aliquid euacuetur; Morbique huius calida intemperies alteretur; Viresque, vt ad statum vsque in quo crisis fieri debet, consent, conseruemus; Symptomata, si quæ grauius vrgeant, & iam diētis causam morbumque emendantibus, viresque retinentibus non tollantur, sed ob violentiam ad se curationem trahant, corrigamus. Quod varijs artibus & remedijs perficitur.

*Continua-  
rum pu-  
tridarū  
febrium  
curatio.*

Euacuancia autē causam quæ febres procreauit, fouet vel auget, sub se, sanguinis per sectiones; humorum & excrementorum, per aluum, vrinas, sudores, euacuationes, comprehendunt.

Sanguinis detractio (nisi quid impediatur, inter quæ virium subita prostratio, syncope, eaque præsertim, quæ in febre quam syncopalem vocant, ex diarrhœa vel bile commota prodit, sunt præcipua) quæ venâ secā & scarificatâ cute perficitur, locum hîc potissimum habet: tum vt causam morbi minuat: tum vt accidentia mitigentur.

Causam minuet, si vena aliqua patens generalis in brachio aperiatur, sanguisq; inde extrahatur. Quod certè primarium in hisce febribus (cum causâ in sanguine & in venæ cauæ ramis, à quibus sanguis extrahitur, lateat) est remedium, cum & vnâ cum sanguine putredinis portio euacuetur: sicuti manifeste talem ferè in principio dum effluit, prodire videmus: naturâ ad extremitates portione aliquâ huius causæ febrilis in venas maiores cutaneas, quæ & eo nomine tumidæ sunt, ijs in locis, vbi maior illius est copia, protrudente: quod & cum talem materiam mox primo ictu effluere solere viderem, occasionem mihi præbuit, talem potius venam, quæ hac materiâurgeret eligere, quam discrimen aliquid inter brachij venas, cum vno in loco omnes à caua vena iuxta iugulum prodeant, facere, & vulgi, & chirurgorum, non ita magni, in hisce, vti & in

signis cælestibus, obseruationes facere. Sed & per venæ sectionem si calor euentiletur, & refrigerij nomine conuenit, febrisque calorem minuit.

Tempus autem ad plebotomiam faciendam idoneum, mox ipsius febris est principium, in quo & statim fieri debet, vt sic incrementum morbi impediamus, & à causa morbi illicò aliquid, dum vires constant, detrahamus. Sed & in augmento, si neglecta fuerit ab initio, fieri potest. In vigore tamen, qui aliàs citius, aliàs tardius superuenit, ab ea, ne naturæ motum impediamus, abstinendum: in principio enim, teste Hippoc. si quid mouendum videtur, mouendū, cū verò consistit morbus, quiescere oportet.

Quantitas verò sanguinis detrahendi, pro ratione causæ & morbi æstimanda est. Causæ occasione, sanguinem, si impurus & putris effluat, aliquandiu vt fluat permittendo, sin minus, citius sistendo: & si, quia dum adhuc fluebat sanguis & calebat, non ita vti postea cū refrigeratus congelatur, impuritas illius cognoscebatur, copiosius minime detractus sit, eam rursū quoque, quia morbus exigit, nonnunquam reiterando, & tertio quoque aliquando, si nulla adsint impedimenta, viresque ferant, administrando. Morbi quoque ratione, quantitas sanguinis detrahendi est metienda. Sic enim in syncho putri, vt in simplici, cū & hæc in plethoricos soleat incidere, magna illius requiritur euacuatio. Quæ & in causone, ob summum incendium, larga fieri debet, etsi hoc, qui eum à bile pura nasci autumant, quod nos improbauimus, damnent. In reliquis, prout maius minusve est incendium, largius parciusve, obseruatis ad hæc corporis constitutione & viribus, vsurpanda.

Accidensia quæ sanguinis detractioe mitigantur, sūnt cephalgiæ & deliriā, quæ hæc febres frequentius comitantur, & quæ vulgus mox obseruare solet. In quibus cū materia ad cerebrum feratur, generali venæ apertione præmissā, venā in pedibus sectā, & scarificatione in extremitatibus factā, sanguinem inde reuellimus. Deriuationis quoque causā, frontis venam, in delirio præsertim aperimus: vel sub lingua tutius venam

tundimus: præsertim cū colli vel faucium, aut linguæ metuitur inflammatio. Sed & scarificationes in collo & scapulis plurimum commendantur.

Humorum & excrementorum reliquorum purgationes, in continuis putridis febribus nonnunquam instituuntur: tum vt causam, quæ febrem fouet vel auget, amoueamus: tum vt eam, quæ febrem facit, illiq; proximè iuncta est, imminuamus, præparemus & auferamus.

Causa quæ febrem fouere & augere potest, retentio excrementorum intestinorum, & ventriculi, existit.

Retentio excrementorū crassiorum seu sæcum in intestinis, duplici nomine in hisce febribus acutis obesse potest. Tum quia, si copiosa adsint, venæ per sanguinis detractioem inanitæ, in se illuuiem ex venis meseraicis primū, illæq; ab intestinis ea, vti voluerunt, rapiant: quo nomine plerūq; venæ sectioni excrementorum alui quædam ablutio præmittitur. Tum quod si humores purgare volumus, & prius alui sæces nō fuerint elutæ, nec corpus, vt inquit Hippoc. fluidum sit factum, medicamentum hisce sæcibus expurgandis impeditum, minus de reliquis euacuat, quo nomine cathartici hæc fere præmitti solent. Inprimis verò quod cū in sæcibus alui, varia excrementa putrida, biliosa contineantur, si ea retineantur diutius, vapores fætido & putri quem exhalant, calorem, si non cordis (quod vt in causis diximus, penetrare minimè possunt) saltem partium vicinarum, illarumque quod hic vapor potest pertingere, adaugent, & sic febrem illiusque symptomata, sitim præsertim, capitis dolorem, reliquaq; grauiora & vehementia reddunt. Quo nomine ne alvus, vel ab initio, nec etiam toto morbi progressu, constipata sit, & à principio, & toto morbi decursu laxantibus exhibitis & iniectis cauebimus: Quæ naturam leuiter vi abstergente ad excretionem sollicitet, at nullo tamen pacto calefaciant, sed vel temperata & humida sint, vel, quod & alterationis causā iuvat, simul refrigerent. Quæ varijs formis sequentibus per indita & assumpta administrantur.

Clysmata, cū citius operentur, maxime

conueniunt : proinde & ante venæ sectionem, quam longius differre nolumus, plerunq; iniiciuntur. Quæ & humiditate actuali, melius intestina euunt, & non aded, vti exhibita, irritant, nec calefaciunt: dein & alvum humectam diutius retinent, & ne tam facile rursus sistatur, vti ferè post reliquas purgationes solet accidere, cauent. Vnde & per totum morbi decursus, cum præsertim constipatio, ob calorem summum, adest, atq; alijs naturam irritare non licet, vt in statu quoque morbi, iniici possunt.

Paratu facilis, laxans, humectans, abstergens, refrigerans sic fiet: R. Hordei, Furfuris ana p. j. herb. Maluæ, Violarie ana m. ij. Semperuiui mai. squamas iij. vel iiij. fiat decoctio, & in lib. i. dissolue. Mellis communis coch. ij. Butyri saliti coch. iij. succi Betæ 3. j. fiat Clyster.

Eadem præstabit sequens, sed magis abstergendo stimulat: R. quatuor herb. Emollitiuarum (loco brancæ vrsinæ, si non habetur, Atriplicem sumedo) Bliti, Spinachie, Betæ, Caulium, Lactucæ ana m. j. rad. Altheæ 3. j. herb. Parietarie, Mercurialis an. m. β. Prunorum n. x. sem. lini 3. β. sem. Cucurb. conuasat. 3. β. (loco iiij. f. frig. mai. quæ ferè rancida sunt) fiat decoctio, & in lib. i. dissolue, Sacchari rub. Mellis Viol. ana 3. j. (quæ duo præter vim abstergendi etiam putredini resistunt) olei Violarum 3. iij. vitellos ouorum n. ij. Calsiæ, vel Diaprunis simp. 3. j. Laricæ, dissolutæ prius cum vitello oui sec. artem 3. ij. (quæ præ cæteris stimulat) Salis parum, fiat Clyster.

Cum amplius refrigerandum est, vt in causone, sic parabitur: R. herb. Emollit. iij. fol. Lactucæ, Portulacæ, Semperuiui, Endiuie, ana m. j. flor. Violar. Nymphææ, Hordei ana p. j. f. Cucurb. 3. β. f. Melonum 3. ij. Prunorum dulc. n. x. fiat decoctio, & in lib. i. dissolue Sacchari rub. 3. j. Mellis violar. 3. j. β. Calsiæ 3. β. succi Lactucæ 3. j. Salis parum, fiat Clyster.

Quod si vero æger pituitosus sit aut senex, febrisque minùs sit ardens, qualem quotidianam continuam esse putarunt, tunc temperata magis eligenda, & leuiter calida reliquis permisceri possunt, atque abstergentia,

propter pituitam, augeri debent, hoc modo: R. Maluæ, Parietarie, Mercurialis, Betæ, ana m. j. Hordei, Furfuris, ana p. j. Passul. Ficuum, ana paria xij. sem. Fœniculi, Carui, ana 3. j. β. flor. Cord. Chamæmeli ana p. j. fiat decoctio, & in lib. i. colaturæ dissolue Mellis ros. Sacchari rub. ana 3. ij. succi Betæ, vel Mercurialis 3. j. olei Chamæmel. & Viol. an. 3. j. β. Salis parum, fiat Clyster.

Suppositoria, clysmatura loco, si incommoditas aliqua clysmatum vsus, aut ægrinimia modestia, impediunt, vsurpari possunt: quæ tamen stimulo tantum, vt naturæ fæces protrudat, illas prouocant. Commune sumi potest ex Melle & Sale coctum: vel aliud aliquod paratu facile ex Ficubus: vel Vitello oui & Sale, in infantibus.

Exhibita fæces educuntia, minoratiua dicta, loco clysmatis venæ sectioni, vel purgationi præmittuntur, varijs formis.

In forma boli sic: R. Calsiæ rec. extr. pulpæ Tamarind. an. 3. β. cum Saccharo, vel sine eo fiat bolus.

Vel sic: R. Catholici, Diaprunis simpl. ana 3. iij. cum Saccharo fiat bolus.

In forma potionis, pro delicatioribus: R. Mannæ el. 3. j. β. dissoluatur cum brodio Cicerum: Et bibat.

Vel: R. Prunorum Damas. n. x. Passul. e. nucl. 3. β. Dactyl. n. iij. florum trium Cordial. p. j. sem. Cucurbitæ 3. β. f. Melonum conuasat. 3. ij. fiat decoctio, dissolue Calsiæ, syr. Ros. lax. simpl. ana 3. β. fiat haustus.

In biliosis & calidioribus, sic potest fieri: R. syr. Ros. sol. & Viol. ana 3. j. Cal. rec. extr. 3. j. fiat haustus.

Eadem repeti possunt per morbi progressum, si non Clysteribus vtimur, & alvus est constipata.

Vel hoc, quo ego alvum sine noxa apertam sequare soleo: R. syrup. Ros. sol. simpl. & Viol. rec. ana 3. iij. vtatur cum aqua costæ, instar iulepi loco potus: sic enim alvus semper lubrica manet. A cuius tamen vsu, si rugitu & alijs signis fluorem alui metuamus, desistendum est.

In Ventriculo si excrementitij aut crudi humores sint, eadem ratione, leuioribus illis

expurgantur. Præsertim verò quia tunc vomitus vrget, & si bilis in illum feratur, sitis immensa affligit, orisque amaritudo molesta est, natura, vt per vomitum illud quod molestat, eijciat, iuuanda erit. Idque vel actu fauces irritando: vel exhibitis simul vomitorijs leuioribus, quæ relaxando & abstergendo potius iuvent, & calorem simul contemperent.

Quale hoc est: R. Aquæ tepidæ, poculum vnum, Aceti albi, parum: Bibat.

Vel: R. Aquæ tepidæ, vel Brodij pinguis, cyathum, addendo syrup. Acetos. simp. vel Oxymelitis 3. j. β. Olei communis loti à falsedine 3. j. misce.

Coniunctam causam febris, in sanguine scilicet putredinē, etsi venæ sectio, vt dictum, potius educat: tamen purgantibus per alvum, & vrinas, & sudores, de illa quoque aliquid euacuare possumus, cum ex venis quoque, per has vias euacuatio fieri queat.

Purgantibus per secessum primum ferè vtimur, vt non tantum excrementa intestinorum & ventriculi, vt dictum fuit, eleuantur, sed & illuvies in primis venis, quæ putredini in maioribus venis, occasionem præbuit, educatur, & per consequens ex venis ipsis, cum natura medicamenti sollicitata, etiam ab intimis locis excrementa præternaturalia, quibus grauat, soleat ad sentinam illam excrementorum protrudere, de causa morbifica aliquid tollatur. Quo nomine statim, vbi intestina abluta, vel expurgata prius fuerint, post venæ sectionem altero die, vel si ea locum non habeat, eodem, maximè cum morbus non dat inducias, vel materia iam turget, vbi præparatione longiore opus non est, illa exhibentur. Interdum verò cum febris diutius perseverat, præmissa prius præparatione, dantur. Sed & in progressu morbi purgationes, vti & præparationes ante illas, interdum, sicuti explicabitur, repetimus. A vehementioribus autem & calidioribus catharticijs, vel abstinemus, vel illa sic præparata, ne corpus nimium exagitent, vel inflammant, exhibebimus. Et licet Practici in intermittentibus, & continuis febribus, non admodum diuersis remedijs purgantibus vtantur: cum tamen in intermittenti-

bus, quietis diei causâ, cum æger tunc a febre liber sit, etiam fortioribus liceat vti remedijs purgantibus, hîc verò cum febris nunquam desinat, non ita commodè facere queamus: purgantia in continuis febribus moderanda, & pro febris naturâ sequenti modo varianda sunt.

In causone enim seu summè ardente febre, minùs calidis laxantibus, illisque quæ simul ardorem contemperent, vtémur: Vt R. Prunorū Damasc. n. x. Passul. repurg. 3. j. Sebesten n. xij. Tamarind. 3. j. Dactylorum n. iij. trium florum Cord. ana p. j. semin. iij. frig. mai. rec. ana 3. j. sem. iij. frig. min. ana 3. β. fiat decoctio, addendo, si voles, parum aquæ Endiuia & Lactucæ, vt omnis vitetur caliditas, dissolue Mannæ (quæ hisce commixta non facillè in bilem, vti aiunt, vertitur.) Cassiæ ana 3. β. (quæ valde, cum aliquid etiam aciditatis Tamarindorū instar habeant, conuenit) syrup. Viol. 3. j. vel syr. Viol. & Ros. ex infus. sem. ana 3. β. fiat haustus.

Vel sic, paulò efficacior: R. Cassiæ recent. extr. pulpæ Tamarind. ana 3. β. el. de succo Ros. 3. ij. fiat bolus: vel dissoluatur cum decocto aliquo, vt Hordei, aut iure.

Vel: R. el. Diaprunis sol. & de succo Ros. ana 3. j. β. syr. Viol. 3. j. cum decocto Hordei, vel aqua Endiuia, fiat potio.

Quâ sumptâ, vti & post alia diagridiata, syr. Viol. 3. j. β. cum aqua Endiuia, ad scammoneæ ardorem reprimendum, superbibere possunt: vel post euacuationem factam, illud, ad restinguendum incendium, sumere, aut alia alterantia, vti mox dicitur.

Rhabarbarum propter astringentem aliqui improbant: quæ tamen minimè in eo est metuenda, præsertim cum infusum hac ratione datur.

R. syrupi Viol. 3. j. β. ros. sol. sem. 3. j. Rhabarb. infusi in aqua Endiuia, & expres. 3. β. fiat potio.

Vel sic: R. Rhabarb. el. 3. iij. Spicæ 3. j. infundantur in aqua Endiuia & sero Lactis, & expres. dissolue Mannæ gran. 3. j. Cassiæ 3. vj. syr. Viol. 3. j. fiat potio.

In synochio putri, & in constitutione sanguinea, eadem vsurpari possunt, vti & hoc quod sequitur: R. Rhabarb. el. infusi in aqua



Acetosæ & Endiuiaë ʒ. iiij. Mirolal. citrin. inf. in sero Lactis ʒ. iiij. fiat exp. dissol. syr. Ros. fol. f. ʒ. ij. fiat haustus.

In tertiana & biliosis corporibus, à calidioribus & fortioribus, quia facile diarrhœa sequitur, cauendum quoque erit: vix itaque ad scammoneata, nisi facile ferant, remedia, descendendum: Proin & supradicta in causone descripta, & quæ bilem maximè respiciunt, hic conueniunt: Vt R̄. decoctionis florum & fructuum Laxantium, quant. suff. quæ sic eleganter parari potest, ex Prunis num. x. Tamarind. ʒ. i. Sebesten. Iuiubar. an. n. x. Passul. ʒ. j. Dactylis n. v. floribus Violar. Buglos. Borrage. an. p. j. f. Cucurb. ʒ. ʒ. In hoc decocto, infunde R̄. Rhabarb. ʒ. iiij. Myrobal. citrin. ʒ. ij. Spicæ ʒ. j. fiat expressio, adde Cassiæ ʒ. ʒ. Mannæ ʒ. vj. fiat potio.

Vel sic R̄. syr. Rosar. fol. cum inf. Rhabarb. ʒ. j. ʒ. dissolue cum aqua Buglosæ vel Endiuiaë.

Vel R̄. syrupi Diasereos (qui multa refrigerantia & deopillantia recipit) ʒ. j. ʒ. dissolue vt supra.

Vel sic, cum vrinae quoque promouendæ sunt: R̄. rad. Cichoreæ, Graminis, Asparagi an. ʒ. ij. infundantur in Vino acidulo, herbarum Endiuiaë, Borrage. Acetosæ ana m. j. Tamarind. ʒ. j. florum trium Cord. an. p. j. fol. Senæ ʒ. iiij. fiat decoctio & in colatura dissolue syr. Violarum Rosarum fol. ana ʒ. j. fiat haustus.

Aut sic: R̄. Diaprunis lenit. Cassiæ ana ʒ. ʒ. el. de succo Ros. ʒ. ij. dissolue cum aqua Acetosæ, Buglos. & Viol. fiat potus.

In quotidianis adijciuntur pituitæ educendæ cathartica accommodata: sed cum hæc febres ob frequentes exacerbationes, vires admodum deiciant, cautè ijs vtendum, vel supradictis leuioribus potiùs insistendum. In pituitosis tamen naturis: R̄. Agar. troch. ʒ. j. medullæ f. Carthami ʒ. ij. macerentur in Oxymel. & aqua Endiuiaë, Violar. Capill. Ven. exprimantur, adde Catholici ʒ. j. fiat potio.

Vel sic: R̄. pilul. Aggregat. ʒ. ij. cum aqua Endiuiaë, fiant pil.

In quarranis continuis, quæ melancholicis comperunt, adijciuntur, vt R̄. Rhabarb.

ʒ. iiij. Myrobal. ind. ʒ. ij. infundantur in sero Lactis, & expressiorem dissolue cum decocto facto ex mercurialis m. j. Epithymi ʒ. ij. & fol. senæ ʒ. iiij. addendo, syr. de Pomis redolentibus ad ʒ. j.

In progressu morbi, febre perseverante, antequam status appropinquet; vel si imperfecta crisi facta, febris nondum soluta fuerit, rursus aliquid euacuandum: diligenter tamen prius obseruando, an per alias euacuationes, vt per sanguinis fluorem, vel vrinas, aut sudores, natura excretionem tentet: quod nisi ante septimum fiat, aut harum euacuationum signa adsint, denuò euacuare, viasq; obstructas aperire, tentabimus.

Idq; hoc modo: R̄. Rhab. el. ʒ. iiij. Myrobal. chebul. ind. an. ʒ. j. ʒ. infundantur in aquis Endiuiaë, Absynthij & paucò Vino albo, fiat exp. diss. syr. Bizantini. Ros. fol. simpl. an. ʒ. j. vel cum inf. Senæ ʒ. ʒ. fiat potio.

Vel sic: R̄. Diaprunis lenit. ʒ. vj. electuarij de succo Rosato ʒ. ij. syrupi Rosati fol. ʒ. j. cum aquis supradictis, vel decocto communi.

Aut hoc modo in robustioribus: R̄. pilul. Aggregat. de Rhabarb. an. ʒ. j. Aurearum ʒ. ʒ. cum aqua Viol. fiant pilulæ.

In declinatione morbi, si quid residui, sæpè ijsdem purgantibus repetitis educitur.

Præparatio humorum ante purgationem interdum statim in morbi principio, excrementis seu sæcib. prius expulsis, & in morbi progressu quoq; si febris perseveret, vti dictum fuit, instituitur. Quæ ex ijs quæ humores calidos ferocientes frigiditate compescunt, tenues in crassant, illorumq; putredinem reprimunt, atq; adhaerentes & impactos abstergunt, parantur: ea addendo, quæ simul vias obstructas expediunt, vt sic humores rectius per illas, per vrinas, sudores & alium quoque, educi queant: quæ si simul alterando calorem febris reprimant, & partibus principibus cordi & hepati, quæ duo viscera maximè incaluerunt, appropriata sint, tanto magis iuuabunt. Hæc itaq; secundum causam, & pro constitutionis aggratione, instituitur.

In causone, cum sit acutissimus morbus, vixque longas concedat inducias, humo-

remeducimus, & summè frigidis, vti dicitur, alteramus.

In syncho quæ in sanguineos incidit, sic humor præparabitur: R. syr. de Limonibus, vel de acetositate Citri, Acetof. simpl. Violarum ana ʒ. j. β. aquæ Acetofæ, Endiuia, Portulacæ, Buglos. ana ʒ. ij. misce: Vtatur per triduum.

Vel sic: R. syrupi de granatis, de Limonibus, de Acetof. ana ʒ. j. de Nenuph. ʒ. β. aquarum Violar. Nenuph. Lactucæ an. ʒ. ij. fiat vt prius.

Vel ex succis hoc modo: R. syrupi de succo Endiuia, de succo Plantag. de succo Portulacæ ana ʒ. β. aquarum Endiuia, Plantag. Portulacæ ana ʒ. ij. syr. de Ribes ʒ. β. Vtatur vt prius.

In tertiana & biliosis corporibus, eadem conueniunt, quia acida bilem retundunt. Vel sic: R. syrupi Acetof. simpl. Oxyf. Violarum ana ʒ. j. aquarum Acetofæ, Endiuia, Buglos. ana ʒ. ij. Bibat per biduum vel triduum.

In quotidianis febribus & pituitosis naturis, vti & senibus: R. Mellis ros. Oxymel. simp. syr. de Bizantijs ana ʒ. j. aquarum Polytrichi, Cichorij, & Graminis an. ʒ. ij. misce.

In quartanis febribus & melancholicis: R. syr. Viol. Buglosi, Borr. de Fumaria ana ʒ. j. aquarum Portulacæ, Fumariæ, Buglos. Borr. ana ʒ. j. β. fiat Iulep pro tribus dosibus. Qui, vti & cæteri, puluere Santali, aut alijs aromatizari possunt: vel illius loco post haustum, semper tab. vna Triasantali vel Diarrhod. exhiberi.

Vrinæ & sudores (cùm per hæc natura plerunque causam morificam iam concoctam & præparatam expellere soleat) promoueri, naturæque in ijs prouocandis suppetiæ ferri debent, remedijs vias aperientibus, & vti vocant, de obstruentibus: quæ & vtrumq; præstare possunt, & quatenus attenuant etiam sudores promouent. Hic autem potissimum motum naturæ, an ad vrinas vel sudores vergat, obseruare, & quò vergit eò ducere conuenit. Quod ex vrinis, si illæ crassescant, multam hypostasim habeant, eamq; copiose & plus ferè quam bibant, mingant, eò naturam tendere, & con-

trarium eueniat, & sudores eruptionem aliquam tentent, ad sudores potius inclinare, cognoscemus.

Diuretica autem aperientia & attenuantia, hic non calefacere, vel saltè minùs quàm alia debent: aut saltem si illis vtamur, refrigerantibus additis, ne noceant, contèperari.

Quod varijs formis in potu exh. bitis, quibus purgantia interdum permiscemus, si aliud constipata, hoc modo, per hoc decoctum perficitur: R. radic. Cichoreæ, Graminis ana ʒ. j. Glycyrrhizæ, radic. Fœniculi, Petros. ana ʒ. β. herb. Capill. Vend. Endiuia ana M. j. rad. Polypodij ʒ. vj. fol. Senæ ʒ. β. f. Anisi ʒ. j. iij. sem. frig. mai. & min. ana ʒ. β. fl. Cord. p. j. f. Petrosel. ʒ. β. fiat decoctio: dissolue in colatura syr. de duabus Rad. ʒ. ij. Syr. ros. fol. ʒ. j. fiat potio pro duabus vicibus: Bibat vnum haustum, & repetat si necesse erit.

Quæ verò non purgant, sed solum ad vrinas promouendas vsurpantur, per morbi progressum, vnâ, duabus vel tribus vicibus exhibentur. Quibus absolutis, rursum quoque interdum iisdem purgantibus in progressu morbi iam explicatis, euacuamus: vel, si natura per vrinam & sudores euacuare incipit, omisis purgantibus, ne ab officio eam reuocemus, potius, vti mox dicitur, eam refocillabimus.

Decoctum Asparagorum in iure exhibitum, admodum vrinas prouocat: Sicuti & Granatorum succus exhibitus.

Quod & iulepus hic præstat: R. syrup. de Bizantijs de Endiuia an. ʒ. j. aquarum Endiuia, Absynthij, Polytrichi an. ʒ. j. Bibat.

Vel si maiore apertione opus sit: R. Mellis ros. Oxymelitis symp. syr. Capill. Vend. ana ʒ. vij. aquarum vel decocti Graminis, Asparagi, Cichoreæ ana ʒ. j. misce.

Emulsio ad vrinas promouendas à multis commendata, rectius sic parabitur: R. feminum Cucurb. ʒ. β. f. Melonum ʒ. ij. f. Cucum. Citruli Endiuia, Portulacæ an. ʒ. j. contundantur, & cum aqua Endiuia extrahatur emulsio, adde syrup. Acetof. simpl. ʒ. j. β. fiat potus. Sed & simplici emulsione, iij. sem. frig. mai. ad aquosos & serosos humores expurgandos, aliqui vti solent.

Pilulæ ad hæc præstanda accommodæ hoc modo ex vrinas mouentibus & aperientibus, attenuantibus parantur: R. trochi. de Rosis, de Eupatorio an. ʒ. β. de Capparibus (in melancholicis) ʒ. j. fiat puluis, & cum aqua Apij, fiant pilulæ: Capiat alternis diebus, superbibendo parum decocti Hordei & Foeniculi.

Aquam Adianti cum decocto Hordei, & rad. Foeniculi, per se exhibet Fontanonus.

Sudores, si natura eò potius vergat, vti ferè circa declinationem fit, mouendi: & si natura in illis propellendis deficere videatur, vel etiam antequam erumpant, si eò inclinet, adiuuanda. Ad eos autem mouendos diuretica prædicta remedia, aperiendo & attenuando quoq; conducunt. Vti & potus alij, iulepi, aliaq; quia sudori materiam præbent; vti in alterantibus dicitur, & in præparantibus iam dictum est, id præstant.

Aquæ solæ cum valde tenues sint, stillatitiæ, affatim exhibitæ in vsu frequenti sunt: quales etiam in Synocho simplici explicatæ fuerunt. Quibus spiritus Vitreoli, vt vocant Chymici, guttam vnā vel duas permiscet.

Inunctio etiam spinæ dorsī & extremitatum, sudores euocat. Qualis hæc est: R. oleor. Chamæmel. Anethini an. ʒ. β. ol. Viol. Amygdal. dulc. an. ʒ. j. misce: Inungantur manibus prius Aquâ vitæ madefactis.

Fristio huc referri potest, quæ materiam ad exteriora alliciendo, vt per sudores exhauriatur, vel discutiat, adiuuat.

Alterantia vsurpanda: quæ calorem febrilem refrigerando & humectando emendantia, morbo contraria sunt: quæ vnâ & causæ putridæ calorem & euaporationem retundunt, & simul putredinem emendant; Causæ quoque opponuntur, & per consequens symptomata, quæ à febris calore emergunt, vt sunt dolores capitis, vigilie, sitis, inquietudo, &c. emendant. Refrigerantibus itaque & humectantibus vtendum, quæ communis cum in omnibus febribus sit regula, vt Hippoc. in viâ docet, maximè in hisce acutis, tum quia magnus in illis est calor, & causa in sanguine accenso & putrelaret, locum habet. Inter quæ acida, cum putredini simul resistent, id maximè præstant.

Additis quæ obstructions quoque, si illæ adsint, tollant. Hic tamen non vt in synocho simplici subito, & affatim est refrigerandum, sed sensim: ne humorum impediatur concoctio, quæ solis refrigerantibus perfici nequit, eum ipsorum portionem corruptam maturefcere oporteat. Hæc itaq; & exhibitis, & iniectis, & ad motis sequentibus perficiuntur.

In potu ordinario, Aqua, quia humectat, assuq; refrigerat, & madefacit, eo nomine & sitim compescit, eamq; huius sedandæ causæ ægri maximè appetunt, præcipuè competit. Quæ vel cruda, vel cocta, vel præparata datur.

Cruda, nisi ventriculi imbecillitas, aliudue suadeat, concedi potest: quam tamen aliqui, antequam humores aliquo pacto saltem concocti sint, exhibere verentur: quod tamen alij non curant. Interdum verò etiam affatim, quantum quis vno haustu capere potest, ebibita, in causone & Synocho & tertiana, ad magnum illud incendium restinguendum confert: adeo vt aliqui hac ratione, quia sudores superuenire solent, mox à febre liberentur: Dein & ne à calore ventriculi mox emendetur, vel vti voluerunt, in bilem conuertatur, affatim bibenda permittitur: & ante concoctionem Auerrores quatuor librarum mensurâ se exhibuisse, & à morte se hoc modo multos liberasse, gloriatur. Cuius nocumentum, si sentiât, vomitus emendat, & si eo facto, veter calidis integatur panis. Sicq; vomitorij vsum quoq; si illud requiratur, præstat.

Cocta aqua simplex, cum nihilominus humiditatem suam seruet & grata sit, in stomacho debiliore, quia flatulentiam & cruditatem deposuit, melior est.

Composita interdum datur, additis ijs, quæ vel simul nutriunt, vel putredini resistent, illiusq; penetrationem iuuant, vel potentiâ refrigerant, vel alioquin eâ corrigunt.

Ex nutrientibus potius quam refrigerantibus, vt vulgus putat, est hordeum. Quo nomine Hordei decoctum vsitatum est, quod cum paruam nutriendi materiam conferat, affatim quoq; bibere conceditur. Quod & in exacerbatione, cum calor ad exteriora iam peruenit, datur.

Panis in aqua agitatus, succumq; depone-  
nes, eamque dealbans, nutritiuam aliquo  
pacto illam facit.

Amygdalarum in aqua cruda vel cocta  
contrularum emulsio, Lac dictum, valde ap-  
ud Germanos vsitata est: quæ tamen, cum  
nimium alat, & victus tenuis hîc requira-  
tur, non ita vt ad satietatem illam bibant,  
sicuti ferè faciunt, concedenda, & potius ali-  
menti loco quàm sitis extinguendæ gratiâ,  
vt in victus ratione dicitur, propinanda.  
Quod si diluta admodum detur, paucas a-  
mygdalas ad mensuram vnâ aque adden-  
do, incommodum hoc minimè adferet.

Putredini resistentia acida plerumque &  
dulcia sunt.

Acida cum simul refrigerent egregiè, ijs-  
que ægri summopere delectentur, præcæ-  
teris competunt. Quo nomine Aceti gut-  
tas aliquot, vt sic se mutuo corrigant, aquæ  
permiscet Galenus. Sed & succi alij vt Gra-  
natorum, hoc modo addi possunt. Vinum-  
que granatorum, vinosorum, musorum di-  
storum, plurimum commendatur.

Syrupi aciduli id præstant, aquis permix-  
ti. Quales sunt Acetosus sim. Oxyfacc. s.  
de Limonibus, de Acerof. citri, de Ribes, de  
succo Oxalidis, de Agresta, de Omphacio,  
Granatorum, Pomorum & Prunorum aci-  
dorum. Omittendo eos qui austeri simul  
sunt, qualis ille de Berberis existit: qui ta-  
men, si fluxus adsit alui, non inutiles erunt.

Aquæ his permiscetur, fiuntq; Iulepi: vt  
aqua Endiuia, Lactucæ, ( quæ & per se sola  
assatim quoque bibitur ) Cichorii, Acetosæ,  
quibus & aqua Rosarum, si astrictio requi-  
ratur, addi potest.

Dulcia aliqua putredini quoq; resistent.  
Atque ex illis Saccharum potius quàm mel,  
cum facile in bilem conuertatur, in adultio-  
ribus si illis delectentur, interdum portio-  
nibus miscetur: sed quia dulcia plerumque  
fastidiunt, potius acidodulcibus syrups, vti  
dictum, permiscuntur. Sed & Passularum  
quoque decoctum in vsu, & aliquibus gra-  
tum est.

Corrigentia cruditeriam in ventriculis  
debilioribus, quædam addi possunt: inter-  
dum: quorum caliditas, si quam habeant,

copiâ aquæ euicta facilè deperditur. Inter  
quæ Cinamomi tantillum, vt odor tantum  
suauis aquæ concilietur, in ea decoquere,  
vel potius eâ aquam aromatizare vulgatis-  
simum est. Alij semen Coriandri incoquunt:  
quorum loco radix Galangæ, aliæq; vsurpa-  
ri possunt; Santalum rubrum si sumatur,  
quod aquæ, vini rubri colorem addit, ad fal-  
lendos ægrotantes delirantes, & vinum ex-  
petentes, iuuat: præsertim si vino Grana-  
torum, vinosus aquæ odor quoque con-  
cilietur.

Inter medicamentosa alterantia, potio-  
nes variæ & iulepi, quales in præparantibus  
dicti fuerunt, cum vtrumq; præstent, humo-  
res nimirum & corporis inde natam intem-  
periem emendent, per totum morbi decur-  
sum eo nomine vsurpari possunt.

Quorum tamen formas si mutare veli-  
mus, hoc decoctum parari potest: R. radic.  
Cichorii, Asparagi, ana ʒ. j. herbar. Endiuia,  
Lactucæ, Portulacæ, Hepaticæ, Lenticulæ  
aquæ an. m. j. fl. Viol. Bugloss. Borrag. an. p. j.  
Hordei p. j. f. Cucurb. ʒ. β. f. Psyllij ( quod  
admodum refrigerare creditur ) ʒ. j. fiat de-  
coctio, adde Sacchari q. s. Aceti parum, de-  
coquatur ad mediam consistentiam. Capiat  
ʒ. ij. vel iij. per se vel cum alio potu.

Vel sic: R. herb. Endiuia, Acetosæ, Ci-  
chorij, Hepat. ana m. j. Hordei mundi p. j.  
fiat decoctio, coletur: adde parum Aceti  
in pauperibus, in ditioribus syropos.

Vel sic: R. syr. Acetos. simpl. ʒ. ij. mucil-  
lag, f. Psyllij ʒ. β. Capiat frequenter tria co-  
chlearia.

Solidiora medicamentosa admodum re-  
spuunt ægri febricitantes, eaque, quæ bibe-  
re possunt, illis ob sitim gratiora sunt. Ad  
variandas tamen remedium formas, con-  
fectionibus siccis in forma tabularum, non  
tantum post iulepos præparantes, vti su-  
pra dictum, sed & per reliquum morbi pro-  
cessum, vti possunt. Vt tabulis vsitatis  
Triasantali.

Vel sequentibus: R. pul. Triasantali ʒ. j.  
Diarrh. ʒ. j. troch. de Camphora ʒ. β. Coral-  
li rubr. ʒ. β. conf. Rosar. Violar. Bugloss. ana  
ʒ. β. Sacchari dissoluti in aqua Ros. & Endi-  
uia q. s. fiant tabulæ: Vtatur frequenter ma-  
ne &



ne & vesperi: superbibendo aquam Endiuie.

Electuaria mollia ex conferuis facta, non solum altero die post purgationes ad roborandum & corrigendum calorem à pharmaco conceptum, sed & alio quoque morbi tempore, hoc modo exhibentur: R. conferuæ Ros. Buglos. Viol. ana 3. β. cum Saccharo vel rob de Ribes, quo magis delectantur, fiat bolus, quem capiat.

Gratius ægrotanti hoc erit: R. conf. Ros. Acetosæ ana 3. j. carniū Citri, Lactuearum caulium, Cucurbitarum condit. ana 3. β. cum syr. de Ribes fiat, elect. Capiat frequenter, superbibendo aquam Endiuie, Buglos. & Acetosæ.

Clysteres non solum cum constipatio adest, ut ea tollatur, & ut humores ad aluum deriuentur, sed quoque alterationis causâ, injiciuntur. Qui tamen minus id quam assumpta præstare possunt, cum non actu, ut illa quæ sumuntur, hos frigidos injicere tutum sit, nec adeo ut illa ventriculum afficiant: cuius consensu maximè corpus refrigeratur, & sitis extinguitur, idcirco laxationis potius nomine quam refrigerationis usurpantur. Quorum exempla iam in principio inter laxantia posuimus.

Præcipue tamen refrigerationis causâ talis injici potest: R. Lactucæ, Portulacæ, Violariæ, Maluæ, Semperuiui, ana M. j. Hordei p. j. fl. Cord. p. ij. Cucurbit. 3. β. fiat decoctio, adde olei Viol. 3. iij. Mellis Violar. 3. ij. Diaprunis simp. vel Caisiæ 3. j. fiat Clyster.

Cibis alterantia permixta, aut condimenti loco illis addita, ut illi non solum nutrant & reficiant, sed & refrigeret, efficiunt: quod & vulgus hac ratione heri, cum illis semper cibos velit obtrudere, magis probat, ægri autem in potu fieri potius expetunt. Quod hisce modis rectius perficitur.

Iusculis eo nomine, Lactuca, Acetosa, Portulaca, Borrugo, Endiuia, quæ gratiora præ cæteris sunt, incoquantur: quæ & aluum laxam, præsertim si Spinachia, Melta, aliaque emollientia seu laxantia addantur, seruant.

Formulas in iusculis decoquere solent, quæ tamen gratiam iusculo minimè addunt. Veluti: R. seminum Acetosæ, Lactucæ ana

3. j. fl. Melonum 3. ij. sp. Triafantali 3. β. Coralli 3. j. sp. Diamarg. frig. 3. j. β. fiant formulæ lupinares: coquantur in iusculis.

Condimenta varijs modis in hunc usum ex Arantiorum, Limonum, Ceraforum, Granatorum, Ribes, Vuæ crispæ, Berberis succis & carne: Vel ex aridis fructibus Ceraforum, Prunorum, parum decoctione emollitis, quæ valde grata sunt, parantur. Et poma Acida, ut Limonia in taleolas secta, additoque Saccharo, interdum & aqua Ros. condita, laudantur. Reliqua cucurbitacea & cucumeracea, quia facile corrumpuntur, satius est omittere.

Bellaria alia ex succo Acetosæ, Aceto & Saccharo, uti & Portulaca aceto condita, ut illa quoque existunt, aliaque multa similia.

Extrinsicus occurrentia, alterationis causâ usurpanda, sunt aer quem attrahimus: remediaque quæ adhibemus.

Aer frigidissimus à natura, vel sic arte paratus, inspiratus, plurimum alterat, cum illius actualis & potentialis frigiditas pulmonibus communicata, vicinitatis causâ, magnum cordi accenso adferat, leuamen. Interea tamen etsi sic inspiratione attractus conferat aer, non tamen ad occursum illius corpus subito denudare & refrigerare ægri (quod tamen maximè, dum ob calorem inquieti sunt, præcipue dum exacerbationes fiunt, expetunt) debent: idque ne ex subita illa percussione lædantur, & sudores, præsertim si illi insistent, impediuntur. Interim tamen ne integumentis nimis, & præsertim plumeis & pelliceis, corpus magis incalcescat, cauendum, quo nomine & lecti linteamina & indusia frequenter mutare: uti & lectum ipsum: plumasque ex eo auferre, vel puluinari corium insternere, valde iuvat. Uti & si radios solares à conclavi, hominumque frequentiam, ne illis incalcescat, auerimus: aëremque salubriorem intromittamus, meridianum impediamus. Cubiculum Aquâ cum Aceto conspergamus. Floribusque & herbis frigidis, folijs Salicis, Vitis, Nenupharis, conisternamus.

Applicantur extrinsecus alterationis causâ, quæ partes principales potissimum, quarum causâ præcipue adeo incaluit, ut cor,

hepar, renes, refrigerant. Sed & cerebrum refrigerantia, idque doloris capitis & delirij causâ, quæ ob illius calorem quoque accidunt, sicuti in symptomatibus dicemus, adhibentur. Vti & illis partibus: quarum magnus cum capite consensus, vt sunt, testes, extremitatesq; corporis, existit.

Cor potissimum, admotis, vel statim in principio, si ardens sit febris, in alijs verò in augmento & statu primum, materiâ prius euacuatâ aliquo modo, refrigerandum erit: cum ab illius febrili calore concepto, cæteræ omnes partes similes calorem præternaturalem conceperint: additis semper, quæ nobilissimum hoc viscus proprietate reficere & roborare possint: & medicamenti vim penetrando ad cor deducere. Quæ in pectore cordis regioni, in forma epithematum, vel vnctionum: & pulsuum quoque in carpo, alijsque vbi sub cute arteriæ se offerunt, regionibus applicantur. Sicque parari possunt.

Epithema cordiale in causone & alijs speciebus, cum magnum est incendium, subito adhibendum: R. aquarum Ros. 3. ij. aq. Violar. Bugloss. vtriusque Lactucæ an. 3. j. Scabiosæ 3. β. Aceti rosac. vel de floribus Garyophyl. hortensium 3. β. succi Limonium, vel Pomorum acidorum 3. ij. pul. Diamarg. frig. 3. j. misce: fiat Epithema: Applicetur panno sericeo, qui succo chermes tinctus, & charmesinum dicitur, eo madefacto: actu, si magnus sit ardor, frig. in alijs tepide.

Aliud epithema admodum cordiale: R. aquarum Ros. 3. ij. aquæ Acetosæ, Bugloss. vtriusq; , Viol. Nenupharis an. 3. j. Scabiosæ, Melissæ, Aceti & Vini albi an. 3. β. succi Limonium, vel Citri, vel Arant. vel Pomorum odor. acid. 3. ij. Santal. omnium 3. j. raturæ Eboris, cornu Cerui an. 3. β. Coralli rub. Lap. prætiol. an. 3. ij. Margar. 3. β. Cryfalli 3. β. Croci 3. β. misceantur, fiat epithema pro corde & pulsibus.

Vel sacculus talis pulsibus in carpo & pedibus quoque alligetur: R. flor. Ros. Rub. Violar. Bugloss. vtriusque an. 3. β. fiat pulvis: adde, pul. Gariophyl. 3. β. Santal. omnium, ligni Aloës ana 3. j. Croci gran. v. pul. Diamarg. frig. 3. β. misceantur omnia, ligen-

tur in duobus parvis sacculis: irrorentur Vino albo & Aceto, & succis dictis: Ligentur supra pulsus.

Vnguentum pro cordis regione & pulsuum: R. olei Viol. Ros. an. 3. j. mucil. spsylvij 3. β. Galliæ mos. 3. j. Camphoræ gran. vj. Croci 3. β. succi Limonium 3. ij. misceatur.

Hepati quoq; refrigerationis causâ epithemata adhibentur, atq; vnctiones: additis quæ viscus hoc nobile simul corroborent, & quæ simul obstructions, si adsit, aperiant. Hoc enim fiscus in febrib. admodum quoq; incalcescit, & ipsius consensu cæterorum calor etiam augetur vel minuitur.

Epithema admodum refrigerans, ardentibus febribus accommodum sic parabitur: R. aquarum Lactucæ, Nenuphar. Solani an. 3. j. β. aquæ Ros. 3. j. aq. Endiuia, Cichorij an. 3. β. Aceti ros. 3. j. Camphoræ gran. vj. misce, fiat epithema, applicetur vt moris.

Aliud hepatis magis appropriatum, & cum obstructions adsint, vtile: R. aquarum Endiuia, Hepaticæ, Cichorij, ana 3. ij. aquæ Rosar. 3. j. β. aquæ Lactucæ, Semperuiui ana 3. j. aquæ Absynthij 3. vj. pul. Triasant. Spicæ, Ros. rub. ana 3. β. Aceti 3. j. troch. Camphoræ 3. β. fiat Epith.

Sacculus talis parari potest, idem præstans: R. fl. Ros. rub. Viol. & fl. Cichorij ana p. j. omnium Santal. an. 3. β. seminum Acetosæ, Endiuia, Portulacæ an. 3. j. f. Petrofel. 3. β. Spicæ nardi 3. j. contundantur: infuantur in sindone rubra, fiat sacculus: maceretur in aqua Endiuia & Rosar. & pauco Aceto: Adhibeatur regioni hepatis tepide.

Vnctio hepatis regionis, post epithematum vsum, ex vnguento Santalino commodè instituitur. Quod & vnguento ex oleo Rosar. & Violar. additâ Spicâ nardi & Cera, præstari potest.

Renibus cum & horum calor in febribus acutis magnus sit, & reliquorum calorē augeat, vnguenta talia etiam adhibentur, illisque dorsum & lumbi inunguntur. Quale Vnguentum refrigerans renes est Gal.

Vel quod sic parabitur: R. vnguenti Refriger. Gal. 3. ij. ol. Violar. Rosarum an. 3. j. Aceti 3. β. Camphoræ gran. v. agitentur simul, fiat vnctio.

Testes cum renibus atq; vniuerso corpore, propter vasa multa ad ipsos descendencia, consensum habent maximum: ob quam causam illis refrigeratis, corporum magnū incendium ex parte quoq; restinguitur.

Quod vt diuersimodè, sic & hoc fotu potest fieri: R̄. aquarum Plantag. Nymphaeae an. ʒ. iij. Aceti rosar. ʒ. j. Vini rubri ʒ. j. & misceantur, & intincti panni actu frigidi testibus applicentur.

Extremitatum lotiones frigidae, ob eundem consensum magnum, quem cum reliquo corpore habent, idque propter vasorum illic sub cute conuenientium congeriem, vti & neruorum, idem praestant: & somnum simul conciliant.

Quarum exemplar hoc sit: R̄. Lactucæ, Violariæ, Semperuiui, Portulacæ, fol. Vitis, Salicum an. M. j. cap. Papau. n. xij. vel herb. si vigiliæ adsint, M. j. Aëti ʒ. j. Vini albi mens. ʒ. aquæ Fontis q. f. coquantur adde Lixiuij parum ad corroboracionem articulorum: Hocq; decocto manus, & brachia, & pedes, & tibiæ, bis in die, vel semel sub noctem, tepidè lauentur.

Iuuat & si manibus frigida vt Lapides, Poma, similiaq; retineant.

Virium conseruatio in febribus continuis acutis summè necessaria, quas altero oculo, vt docent, semper intueri oportet: nam illis deficientibus frustra Medicus laborat, cum naturæ opus sit, febrem euincere, quâ succumbente, morboque superante, crisis perfecta, fieri nequit: sed vel imperfecta fit, vel in ea lucta succumbit, ægerq; extinguitur. Conseruantur autem & viuendi ratione, seu vsu decenti aëris, cibi & potus, aliorumq;: dein & medicamentis.

Aër plurimum eos reficit, si præter frigiditatem competentem, vti dictum, liber sit, & purus: eaq; ratione vires refocillat, & simul alterat.

Cibus, vti sanis & ægris quamdiu viuunt ad restaurationem perditū necessarius est; sic & hic, cum præsertim corpora vehementer calore exoluantur, requiritur. Sed quia is, vt nutriat, à natura nostra euinci & concoqui prius aliquoties debet, eoque nomine naturam cibi exhibitione à morbi mate-

ria concoquenda reuocamus, maximè si illi copiosum, aut qui ægrè euinceretur, exhiberemus: hanc ob causam ille cibus qui ægrum aliquo pacto sustentare queat, atque interim naturæ minimum negotij præbere possit, illi debet sufficere. Talis autem Tenuis esse debet: qualem Hippocra. in acutis morbis esse voluit. Qualis dicitur, qui parum nutrit, rariusque certoque duntaxat tempore exhibetur. Qui tamen secundum magis & minus differens, vel tenuis: vel tenuissimus: vel medio modo se habens, existit. Interim consuetudinem, quæ altera est natura, diligenter obseruantes, illiq; aliquid condonantes.

Tenuissimus victus, nunc extremè tenuissimus est, quo in vigore morbi vtendum esse docet Hippoc. Quem & ægri ob breue hoc tempus, quo natura in morbo expugnando impedita est, facilius perferunt: qui alias si summè exquisitus diutius perseueraret, vt idem scribit Hipp. periculosus esset: ob quam causam tenuissimus quidem, non tamen extremè tunc esse debet. In quo tamen minus, sicuti in eo frequentius, quod pleniorē, quàm par erat, exhibent, sic morbum facilius ægrum superaturum vulgo ineptè existimante, peccatur.

Rarius autem qui exhibetur, tenuissimus esse dicitur, vt semel in die: vel si bis detur, pauci tamen sit nutrimenti.

Parum nutriens cibus inprimis huc refertur. Vt si decoctum Hordei non potus, sed cibationis causâ, bis in die, in statu tantum morbi, illis propinetur.

Pisana veteribus dicta, cum paulò sit efficacior, vbi hoc decocto perseuerare nequeunt, illis conceditur. Quæ cremor, vt nunc vocant, seu succus est hordei, ex eo excorticato vel mundo, vt vocant, vnde pisanæ nomen, decocto paratus. Qui nunc spissior, nunc dilutus magis, si minus eum nutrire volumus, exhibetur. Qui & simul bilis, si illa efferuescat, vti in hisce febribus fieri solet, acrimoniam admodum retundit.

Cuius loco & succus tritici, Amylum dictum, vel Oryza bene cocta, quæ facilius digeritur, minusq; inflat, vsurpari potest.

Iusculo gallinæ, vel pulli, additis inter-

dum alterantibus, vti prius dictum, nostri vti solent: quòd certè, cum in eo conficiendo natura non aded occupetur, improbari non omnino potest.

Lac vocatum seu emulsio Amygdalarum, non loco potus, quia nunc nimia copia ingeritur, sed cibi datum, huc quoque referri potest, cui emulsionem aliorum seminum Frigid. vt melonum, interdum permiscet.

Tenuis verò victus, qui hoc paulò plenior est, dicitur, quo à principio æger ( vti quoque docet Hipp. ) vti eoq; tamdiu donec status immineat, ( tunc enim sensim iterum detrahendum ) perdurare debet, & diebus pluribus aut paucioribus, prout status morbi citius, vt in causone & tertiana, tardiusve in reliquis, aduenit, perseverare. Sed & cum acerbatio febris adest, eo tempore & paulo antè, non cibandus erit æger, non tam ob naturæ motum non impediendum, quàm ne calor, quod cibo sumpto solet fieri, vt & in hecticis dicetur, augeatur.

Plenior autè victus, attamen tenuis is erit, tum qui frequentius vt bis, tæue in die exhibetur, tum is qui solidiorem cibum præbet.

Vti est contusum carnis Pulli alicuius, prius bene decoctæ, & cum suo iure dilutæ. Vel brodium, in quo hæc diu multumque coxerint.

Oua cum in biliosis facile corrumpantur, non temerè exhibenda erunt. Vti & eandem ob causam Lac, quod Hipp. febricitantibus malum esse docet, minimè conuenit.

Panis lotus prius, cum iure, huc quoque refertur.

Pruna, Poma, Pyraque, non austera tamen, recentia, vel potius aliquamdiu asseruata, aut etiam siccata penitus ( tunc enim in illis succus est laudatissimus, vti nostri omnis generis fructus eiusmodi asseruare solent ) costæ, cum suo iure, qui ab aridis instar syrapi spissus coquitur, vtiliter exhibentur.

Quæ reliqua à plantis, exceptis fructibus, sumuntur, alterationis causâ potiùs quàm nutritionis, vt & fructus acidi, vt dictum, vsurpantur.

Vinû præ cæteris omnibus illud est, quod magis reficit: sed non tam ob calorem, cum

si dulce non sit, sed vinosum aut acidulum, tunc minimè corpus inflamet, quàm ob capitis dolorem, quem in hoc affectu consuetum auget, non, donec hæc remittant, & in declinatione sit febris, cõceditur: Tunc enim & ad vrinarum prouocationem, & reficiendum ægrum, permittitur, vti & conualescentibus. Victus ratio quoque plenior, quæ fit sæpè & paucis nutriendo, cõceditur.

Somnus quoque admodum vires reficit. Qui tamen à multis toto febris tempore, quo calor ad exteriora vergit, ne per eum ad interiora repat, improbatur. Verum cum calorem per somnum ad externa potius quàm interna rapi, quod somni tempore plus calere & sudare soleant, satis ostendat, eoque nomine, vti & quod sitim sedet, quoque proficit, non necesse erat hoc quod potiùs iuuat metuere, & ob id à somno eos arcere, sicque magis debilitare: cum nec per somnum natura ab officio, quòd tunc magis concoctioni ciborum intenta sit, cum minùs tempore somni, vt alibi ostensum est, concoctio fiat, reuocetur, sed naturæ vis in morbi causa elaboranda minimè cum dormit, quiescat. Interim tamen in ipsa febris exacerbatione, satius est à somno abstinere: & reliquo tempore, habitâ ratione ætatis, consuetudinis, & prout se post somnum bene malèue habent, eum ita regere, ne immoderatus aut intempestius oblit, Et si quoque omnino in somnis sit æger, eum interdum exhibitis ad motus prouocare.

Frictiones loco exercitij, quod maius obire nequeunt, viribus aliquo modo excitandis quoque, sed maximè ad causam morbi ficam tollendam, vt dictum, adhibentur.

Animus fortis, nec nimium tristis: in primis fiducia in Deum, ipsiusque ministrum Medicum, spesque salutis, vel in præsentem, vel futura vitam, magnum viribus adiumentum adfert.

Medicamenta quod attinet, restaurantia in alterantibus ijs quæ & simul vires conseruant, iam sunt ex parte explicata. Præter quæ multa alia in syncope, in praxi nostra descripta, præferri in febris hisce Syncopalibus dictis, locum habent.

Possumus tamen cum vires omnino deiectione



iectæ sunt, sequentem Iulepum exhibere: R̄. aqua Ros. Buglos. Scabiosæ an. ʒ. j. β. aquæ Cinamom. cum aqua elicita, vel etiā vino (nec enim in summa virium prostratione calor illius metuendus) ʒ. β. spec. Diamargarit. frigid. ʒ. β. colentur, adde Manus Christi perlati ʒ. j. succi Limonum ʒ. j. misce: Capiat frequenter cochl. j.

Vel sic: R̄. confect. Alkermes ʒ. j. (modo non alui fluor, quem lapis lazuli promouet, addit) syrup. de Papau. ʒ. β. (qui & ipse reficit) aquæ Cinamom. ʒ. ij. aquæ Buglos. q. s. sumat: addendo interdum parum Vini.

Externa quæ pulsibus applicantur & cordi, in alterantibus iam recitata sunt.

Symptomata quod attinet, quorum præcipuè etiam ratio habetur, multa ex illis, iam enarratâ curâ, causæ morboq; accommodatâ, quoq; emendantur, alia etiam curam aliquando peculiarem requirunt, qualis in singulis symptomatis in præxi dicta explicabitur, & hîc tantum summam, quomodo procedendum, docebitur.

Capitis dolor & quod mox sequitur delirium, quæ potissimum vrgent, illis quæ causæ & morbo debentur remedijs iam dictis, cum & vapores quoq; reprimant, & incendium illud in capite contemperent, etiam emendantur. Illorum tamen nomine cum inualescunt, Venam sub lingua aperimus, & Scarificatione, Cucurbitulis, Frictionibus, revulsionis causâ utimur, Topicaq; capiti ab initio repellentia, inde dolorem sedantia, mox discutientia, vt in cephalalgijis ostensum, ad mouemus.

Vigilias nimias soporiferis, & in summa necessitate narcoticis, vnâ cum cordialibus, vt supra dictum, & refrigerantibus, cum illa calefaciant, potius, capitisque dolorem faciant, exhibitis, corrigimus. Vel si somnus profundus adsit, reuellentibus eum arcere studebimus.

Sitis, quæ maximè vexat, potu actu frigido, acidisque, vt explicarum, emendatur. Quam & multis conditis, quæ tamen propter dulcedinem eam potius promouent, sedare conantur. Verum & somnus, vt dictum, sitim sedat.

Inquietudo frigidis, & potu inprimis mi-

tigatur. Et si aëre externo liberiore & frigidiusculo refocillentur: frequenterq; locum, quem continuo calefaciunt, mutant.

Linguae, oris, fauciumve inflammationes variæ: inter quas & angina occurrit, in febribus hisce, quas tunc *Urtine* vocant, Ariditas item oris & glutinositas, linguaeq; nigredo, quomodo curentur, alibi docetur.

Cardialgia inunctione ventriculi tollitur. Syncopæ, vt in viribus restaurandis iam dictum, prospicitur. Ardore in hypochondrijs, extrinsecus hepatis, renibus applicatis, supra expositis, mitigantur.

Dyspnœæ nomine pectus inungimus.

Diarrhœa, ventri applicitis sistitur: & propinatis illis, quæ astringendo citra calorem, qualis est syrupus Cydon, proficiunt. Constipationem alui, laxantia dicta solvunt.

Marcor corporis si hecticam minetur, illiusve metus & suspicio sit, non solum cordialia in cordis regione, sed & vniuerso pectori epithemata, & vnguenta humectantia applicamus, potionesque cordiales supradictas frequentius repetimus, sicuti hæc in hecticæ cura explicabuntur.

Intermittentes putridæ febres, sub se comprehendunt Tertianas, Quartanas: Tum simplices, quarum illæ vnum, aliæ duos dies dant inducias: Tum duplices quæ mox altero die redeunt: Easq; vel Exquisitas ab humore simplici, vel Nothas à mixtis humoribus, vel Diuersæ naturæ genitas. Plures enim species harum, vt in causis dictum est, minimè statuimus: cum reliquæ omnes quas alij adiiciunt, diuersimodâ humorû mixtione ab enarratis variantes, & quotidianæ quoque ipsorum, vel sub his comprehendantur, vel minimè in rerû natura inueniantur. De compositis ex intermittentibus & continuis priuatim agemus.

Harum autem omnium iudicium certius est quam continuarum. Cum, vt dictum, tertianæ breuiores sint, si sint exquisitæ, sintq; æstiuales & vernaes: Longiores verò nothæ & autumnales. Quartanæ verò omnium longissimæ, autumno incipientes, & per menses sex plerunque perseverantes: interdum tribus mensibus cessantes, errore nonnunquam ad annum vsque producuntur.

Ex duplicatis febribus, singulæ suam naturam seruant.

Sunt autem febres hæ per se minimè lethales: etsi quæ exquisitæ sunt, admodum acutæ existant, cum ipsarum causa procul à corde in ventre inferiore circa excrementorum sentinam, ut dictum est, lateat, à quo loco melius quoq; expurgari potest. Nisi ea in maiores venas translata continuam excitet, quæ dein periculosa est. Fit tamen quoque, si diutius febres intermittentes perseverent, aut frequentius infestent, ut visceribus vicinis læsis, hepate, liene, ventriculo, & intestinis, noui inde morbi & grauiora periculosioraque sequantur symptomata, ut colicus dolor, icterus, hydrops, similiaque quæ ob errorem ægri nonnunquam & medici, possunt accidere.

Febrium autem istarum omnium tam tertianarum quam quartanarum cuiuscunque generis curationem, simul explicabimus, cum causa non aded, quod ipsius naturam attinet, quam in vtrisque nos biliosam statuiamus: nec loco, quem in vtrisque venas meseraicas posuimus, discrepent. Et si plerique pro diuersitate humorum tam naturalium quam præternaturalium, quotquot ferè in corpore inueniri possunt & excogitari, singulorum putredini suas accommodantes febres, singulis, vel saltem pluribus, certa curationis capita assignarint: non tantum tertianis & quartanis, quatenus exquisitæ vel spurix, simplices vel duplices sunt (quo nomine & nos ipsarum curationem variare dicemus) separatim singulis curationes præfigentes: sed & tertianis nothis à bile citrina (sic eam, quæ pituita tenui & aqua diluta sit, vocantes) genitis: vel à bile vitellina (sic eam cui crassa pituita permixta sit, appellant & vtramque tertianam Maioris famæ vocantes) vti & huic tertianæ quam Minoris famæ notham vocant, eamque à bilis cum melancholici succi, vel atræ bilis præternaturali permixtione oriri existimant: item huic quam à bile prassina vel æruginosa fieri dicunt, peculiarem curationē accommodantes: Quod & diuersis quartanis faciunt nothis, non tantum, vti volunt, à sæce sanguinis, sed & bile & pituita adustis ortis. Sed &

quotidianæ, quam non saltem à pituita simplici pronatam, sed & à dulci, acida, salsa, vitrea, epialas, lypurias dictas, & ex illius mixtione cum melancholia vel bile, fieri credunt, singularum quoq; harum specierum, priuatam curationem docent. Eas item quæ ab hisce non alia ratione, quam quod graui syncope, ut & continuæ quædã, in paroxysmis ægrum exagitant, & syncopales ob id dicuntur, ac si diuersum constituerent febrium genus, peculiariter quoq; quomodo curari debeant, explicant. Vnde factum, ut tam confusa & multiplex febrium curandarum descripta sit vndiq; tractatio, tamq; varij purgationum pro humorum diuersitatibus, à quibus febres nasci crediderunt, modi sint propositi, quibus scitent integra febrium curandarum volumina: quæ si quis imitari vellet, ægro curam incertiore redderet, quam si totum negotium naturæ committeret: quæ per se sola sæpè ad febres sanandas sufficit.

Itaq; curationem omnibus intermittentibus simul accommodantes. Primum quid causæ summouendæ ratione, euacuantibus moliendum; Et ob morbum alteratibus efficiendum; Viriumq; restaurandarum causâ, in viuendi ratione obseruandum sit; Deniq; symptomatum grauiorum occasione faciendum: curandi methodum ad singulas interrim tertianarum, quartanarumq; diuersitates respecturi, explicabimus.

Euacuantia ratione causæ administrantur, ut ea tollatur vel minuatur: quam in venis meseraicis sanguinem putrem biliosum esse diximus: quæ causa nisi prius sublata sit, qui volunt alijs paroxysmorum cursum & motum hunc naturæ, per quem portionem illius causæ excutit, impediendo febres sanare, vti maior empiricorum vel indoctorum turba facit, quia causa tunc remanet, grauiores morbos, qui vel cessante febre, vel vna cum illa superueniunt, ut colicam, icterum, cachexiam, cæterosque inducent. Ergo primum per euacuantia causa morbi tollenda erit, vnde & morbi calor emendatur, & symptomata mitigantur. Fit autem hoc formis sequentibus.

Sanguinis detractio si fieri posset ex venarum meseraicarum ramis, vbi causam putrem

trem harum febrium latere diximus, sine dubio, quia eam euacuaret, præstantissimum esset remedium: vti in febribus continuis, si rami venæ cauæ aperiuntur. Verum cum venæ meseraicæ nullibi ad cutem pertingant, nulla ipsarum sectio, vti venæ cauæ ramorum cutaneas venas constituentium, illic fieri potest. Nec etiam intrinsecus medicamentis exhibitis tutum esset hisce venis referatis, sanguinem ex illis in ventriculum & intestina emissis pervomitum & alvum, vti tamen natura aliquando sponte facit, educere: cum talia medicamenta vehementiora & adurentia esse oporteret: quæ erodendo non tantum venas aperirent, sed & exulcerando dysenterias facerent: vti ex colocynthidis usu sinistro sæpe factum esse vidimus. Hæc etsi seita habeant: nihilominus in febribus hisce sanguinem educimus interdum hac ratione.

Hæmorrhoidum fluxus in hisce febribus, non solum quartanis, vti existimarunt, sed & tertianis reliquisq; omnibus speciebus, plurimum competit, hasq; febres, etsi longissimæ sint, nec alio artis præsidio sanentur, per fluxum hunc sanari subito interdum videmus. Nec mirum, cum venæ hæ venarum meseraicarum rami, causam morbi proximam, si sanguinem effundant, euacuent. Ergo harum fluxus, si sponte à natura, vti in conluetis ferè fieri solet, concitetur, non est sistendus, & si parcius fiat, promouendus. Sed & in diuturnioribus febribus, quartanis præsertim, quibus ob sanguinis crassitiam, qui hac ratione melius euacuatur, priuatim competere existimant: si naturam eò inclinare præsertim videmus, vel quod notæ aliquæ sanguinis interdum apparent, vel pruritus in podice sentitur, proritandæ sunt. Quod fit incipiendo à fortibus leuioribus; Sanguisugari applicatione, quod omnium est commodissimum: Vel frictionibus cum folijs ficus, caprifolij, sicuti hæc in hæmorrhoidibus explicata fuerunt. Sunt qui eas secando aperiunt, quod tamen, nisi vena manifestò appareat, ne podex vulneretur, cauere oportet, vnde eos summos postea cruciatus passos esse, obseruauimus.

Menstrua quoque in fæmineo sexu, si suppressa sint, etsi hæc non vt hæmorrhoides

à venis meseraicis, sed venæ cauæ ramis effluant, atque aded à causa proxima febris nil videantur educere, quia tamen naturalis hæc excretio certo tempore fieri debet, & si impedita sit, collectionis illuviei in vniuerso corpore, causam quoque præbet, vti & hisce febribus, ea est promouenda: vt sic corpus purum reddatur, & eosdem usus, quos venæ sectionem præstare quoque dicemus, præstet. Præsertim cum per hanc viam in impuris corporibus natura suam illuviem soleat deponere: & fortè etiam ex venis meseraicis propter vicinitatem venarum hæmorrhoidalium, aliquis fiat ad hanc sedem transitus, quæ venulæ, etsi non ita ob exilitatem pateant, impletæ tamen distendi, vt in reliquis quoque videmus, possint. Ergo menses si non fluant, aut non decenter, promouere eos oportet: quod varijs fit modis. In primis verò venâ sectâ, saphenâ dictâ: quæ vel statim menses prouocat, vel illorum materiam exhaurit. Sed & licet prius ob generalem euacuationem vena secta sit, altero tamen mox die vel sequentibus, malleoli hæc vena nihilominus aperiri debet, vnde sæpe febris mox cessat, vel vt citius desinat, vna cum alijs remedijs adhibita, facit. Sed & purgantia, de quibus postea, vti naturam sollicitando excretiones mouent, sic & menses prouocant, sicuti hæmorrhoides.

Phlebotomia in vena cutanea aliqua patente, aliquando conceditur, aliquando improbat. Omittenda est enim in tertianis exquisitis, alijsque, quæ vehementi calore ob bilem magis adurentem, vnde hæc febres fiunt, excruciant. Quin & in pituitosis, & senibus, & in reliquis quoq; non temerè, vti tamen vulgus facit, potioremq; curationis partem hanc esse iudicat, administranda: cum enim nihil de causa coniuncta febrium, vti dictum, detrahat, hac ratione iuvare minime potest. Sed & sæpe sinistrè vel temerè instituta, raptâ materiâ intra venam cauam, ex intermittente continuam facit: vel puriore sanguine ob exhaustos venæ cauæ ramos, ex venis meseraicis retracto, is qui remansit biliosus putrisque, cuius frenum sanguis erat, quo cõtemperabatur, magis ferocit. Vnde plus in febribus venam aperiendo, quam

eam negligendo (nisi hæc, quod grauius aliquod symptoma, vt ex sanguine accenso partium internarum inflammatio metuitur, fiat) peccari obseruau. Conceditur tamen interdum in plethoricis & cacochymicis, hac ratione. Si summa plethora adsit: quæ ex constitutione corporis cognoscimus, & vrinis admodum rubicundis ac crassis, quas potissimum eo nomine obseruant: & si quoque permanens post febrē in corpore calor, non tamen febris adsit, tunc ad summouendam eam plenitudinem, cum sit naturæ grauis, vti & ad caloris euentilationem, vti in synochis ab accenso sanguine factis diximus, probatur, & in die quietis fieri debet. Licet enim nonnunquam in paroxysmi principio facta, calorem reprimendo, & vapores ascendentes reuellendo, paroxysmum vel impediatur aut tardetur: quia tamen sic naturæ motus impeditur, quo causæ morbificæ portio excutitur, conuenire minimè potest. Ergo tempore quietis (diligenter illud præsertim in duplicibus febribus obseruando & eligendo) non in morbi principio, sed augmento, vel statu quoque in tertianis, vix antè tertium paroxysmum vel quartum, qui grauissimus esse solet, mitti debet: prædicendo tamen paroxysmi qui sequetur malitiam, ne venæ sectionis causâ id accidisse putent. Eligendo venam communem, latam brachij, vt tutius secari possit: cui magis, quam vtricoloraria, medianæve eligatur, intendendum. Quantitas autem illius ad 3. 4. 6. 7. vel 8. educenda. In quartanis tamen priuatim in sinistro brachio facta, sed tardius, cum iam aliquamdiu perseuerarint (sunt enim quartanæ ab initio leuiter tractandæ, ne duplex vel triplex fiat, aut vires concidant, quas ob morbi diuturnitatem conferuare oportet) prodesse creditur. Aut si sinistræ manus venam inimo digito proxima, saluatella dicta, secetur, quam singulari quodam modo quartanas sanare credunt. In cachecticis, quia non tantum sanguis venarum meseraicarum impurus est, sed & ille qui in venæ cauæ ramis continetur, vel antequam febris incepit (facile enim impura corpora hisce febribus corripiuntur) vel febre iam vigente, vt tunc quoque aliqua illius portio educatur, venæ sectio, ne febris

augeatur, aut noua accedat, conceditur. Et si emissus sanguis putris quoque appareat, longius fluere finitur, & si crassus & niger in quartanis appareat, maior ipsius quoque portio educitur: sin minus, sistitur. Et si necessitas exigat, sæpè reiteratur. Verum ne bilis, sanguine detracto, amplius ferociat, syrupum aliquem refrigerantem, vt de Limonibus, vel Viol. mox post venam sectam exhibere consultum est; vel, vti consuetum, iussculo mox exhibitio illud cauemus.

Humorum reliquorum & excrementorum expurgationes in febribus intermittentibus, Crassiorum, per deiectiones, vomitiones; Tenuiorum per vrinas & sudores, instituuntur.

Fæces crassiores expurgantia, & intestina eluentia primum locum habent: tum statim in morbi principio: tum in progressu illius.

In principio ante reliquorum usum & venæ sectionem, si illa facienda sit, intestina ab excrementis quibus perpetuò scatent, elui debent, tum vt quæ sequuntur remedia reliqua melius operentur, tum ne per venæ sectionem, venæ inanitæ excrementa, vti voluerunt, rapiant. Quod iniectis exhibitisque perficitur.

Iniecta clysmata citius id præstant, & cum intestina tantum eluere cupimus, præsertim vsurpantur. Inter quæ ea quoque quæ in febribus continuis descripta sunt, conuenire possunt, si leuioribus vti velimus: cum perunque hic & fortioribus vti liceat. Quæ secundum morbum & constitutionem sic distinguere possunt.

In tertianis & vehementer calidis febribus, sic fiunt: R. rad. Altheæ 3. j. herb. iij. Emollitiuar. ana M. j. Hordei ʒ. j. sem. Cucur. 3. ʒ. fiat decoctio, dissolu. in lib. 1. ʒ. Calsiæ 3. ʒ. Mellis Violar. 3. j. ol. Violar. 3. ij. fiat Clyster cum Sale.

In quartanis verò: R. herb. iij. Emollitiuar. Mercurialis, Betæ ana M. j. rad. Buglos. 3. ij. Prunorum n. x. iij. sem. frig. mai. ana 3. ij. Epithymi 3. ij. sem. Anisi 3. ij. fiat decoctio diss. Catholici, Sacchari rub. ana 3. j. ol. Viol. 3. ij. ol. Chamomil. 3. j. fiat Clyster cum Sale.

In pituitosis constitutionibus, & si copia phle-



phlegmatis in intestinis sit, ad potentiùs abstergendum hoc vtendum: R̄. rad. Liquiritiæ ʒ.ij. herb. Maluæ, & Betæ cum radicibus, Parietariæ, Betonicæ ana M.j. Hordei integ. Furfuris ana P.j. fl. Cham. Meliloti, Buglosi ana P.j. Agarici ʒ.ij. Ficuum n.x. sem. iij. frig. mai. ana ʒ.ij. f. Fœniculi ʒ.ij. fiat decoctio, dissolue, Diaphœn. Hieræ picræ an. ʒ.ij. Sacchari rub. Melif. ros. ana ʒ.ij. ol. Violar. Chamæm. ana ʒ.ij. Salis parum, fiat Clyster.

Suppositoria loco clysmatū vsurpari possunt, quibus iteratis eodem die bis aut ter, naturam potentiùs nonnunquam quàm per clysmata operari vidimus.

Quòd si verò mox in prima inuasiōe ventriculū cruditatibus & excrementis pituitosis aut lentore, aut bile infestari videmus: sicuti ex cardialgia, quæ ferè semper comes est, nausea & desiderio vomendi, cognoscimus: tunc potiùs ante venæ sectionem, vel si illa minimè fieri debeat, mox à principio, minorans dictum damus: vel vomitum, maximè in consuetis, mouemus.

Minorantia dicta, & ventriculū, & intestina à cruditatibus, & excrementis crassis, & humoribus obuijs expurgant: quibus nos, vt inquit Hippoc. corpora ante purgationem fluida facimus. Quæ cum in die quietis dentur, non tam curiosè, vt in continuis, in quibus cum ea sumunt adhuc febricitant, sunt eligenda. Quæ tamen quoque in tres classes, vti clysmata, distinguimus.

In tertianis exquisitis, vel quando admodum calore sæuit febris: R̄. Calsiæ rec. extr. ʒ.x. pulu. sem. Anisi vel Liquirit. ʒ.ij. cum Saccharo fiat bolus: Capiat per se, vel dissoluendo cum aqua Endiuia vel Cichorij.

Vel: R̄. Calsiæ rec. extr. pulpæ Tamarind. ana ʒ.ʒ. sem. Anisi ana vt supra.

Vel: R̄. Calsiæ rec. extr. ʒ.ʒ. syrup. Ros. sol. (vel succi Ros.) & Violar. ana ʒ.ij. cum aqua Cichorij & Buglosi. fiat potio.

Vel: R̄. Prunorum Damascen. n.x. Tamarind. n.xij. decoquantur in iusculo vel aqua, donec omnia dissoluantur, exprimatur ius & bibatur.

Paulò efficacius hoc est: R̄. Rhabarb. ʒ.iiij. Spicæ ʒ.ij. infund. in aqua Endiuia & exp. diss. Calsiæ ʒ.ʒ. syr. Ros. sol. ʒ.ij. fiat potio.

In quartanis, melancholicis & diuturnis febribus: R̄. Calsiæ ʒ.ij. pul. Epithymi ʒ.ij. Sacchari q. s. fiat bolus, vel diss. cum aq. Buglosi.

Vel: R̄. Epithymi ʒ.ij. decoquatur in iure, adde Mannæ gr. ʒ.ij. Bibat.

Vel: R̄. Prunorum n.x. Dactyl. n.ij. Epithymi ʒ.ij. fl. Cord. ana P.j. fiat decoctio, diss. Catholici ʒ.ij. syr. de floribus Persicorum ʒ.ij. fiat potus.

Fortius hoc erit: R̄. confect. Hamech. ʒ.ij. ʒ.ʒ. Cathol. ʒ.ʒ. diss. in aquis Buglosi & Fumariæ.

In pituitosis constitutionibus eadem dari possunt, & paulò quoq; fortiora: Vt R̄. Catholici ʒ.ʒ. Diaph. ʒ.ij. cum saccharo fiat bolus.

Vel: R̄. Dactylorum n.v. Prunorum n.x. Passul. paria x. Ficuum n.iiij. rad. Liquirit. ʒ.ʒ. fiat decoctio, dissolue Diaphœnic. tab. Diacarth. ana ʒ.ij. Bibat.

Si pilulas malint: R̄. pilul. de Agar. vel de Rhabbarbo, vel si leuiore, Mastichinarum ʒ.ij. fiant pilulæ.

Validiores hæ sunt: R̄. pilul. Aggregat. ʒ.ʒ. cum syr. Ros. sol. fiant pilulæ.

Vomitum cum per superiora, & crudam materiam, vel lentā pituitosam, quæ in ventriculis febricitantium interdum, non tanquam causa coniuncta, sed tanquam redundantia excrementorum, hæret, & biliosam quoque, si illa motu febris ad ventriculū conciterur, excutiat, plurimum alleuat, & nonnunquam febrem mitigat, & proin minoratui vices obit. Qui tamen, si conspiciatur adsit, nisi prius alvus soluat, promoueri minimè debet: vti hoc mox, quando eodē remedio febrilem causam coniunctā quoq; euacuari posse explicabimus, ostēdemus. Vbi & remedia vomitum conciliantia adijciuntur: in quibus à leuioribus incipiendum est.

Purgatio humorum per cathartica, quæ naturam iam validiùs vrgent & stimulant, vt sic à venis meseraicis materia putris februm educatur, instituitur. Per quam, sensim semper aliquid demendo, vt sic febres mitigentur, & tandem penitus cessent, efficiamus. Cæterum in hac ritè faciendā, prius crassioribus excrementis, vti dictum, educatis, humores ad purgationē præparari, posteaq; euacuari debent. Quæ duo & statim in principio peragenda erunt: nisi materia morbi

tam sit copiosa, vel aded turgeat, vt sponte iam exitum quærens, præparatione minimè opus habeat. Tunc enim naturæ motus statim exhibito purgante medicamento iuvandus. Sed & nisi febris remittat, sed longius perseveret, per morbi quoq; progressum ad præparationes & purgationes rursus redeundum. Quod si nec sic cesset, tertio & in summè pertinacibus & longis febribus, quarto quoque repetendum erit.

In principio itaque hoc modo præparare & purgare convenit. Præparatio humorum in febribus intermittentibus, æquè ac continuis necessaria: eoque magis, cum materia hic in venis mæseraica latens, putris, maiori præparatione concoctioneque opus habeat, & ne ulterius putrescat, putredo sit inhibenda, viæque aperiendæ; vt sic ex venis illis in intestina per cathartica rectius propellatur. Quæ vt melius operentur, hypochondria, dum his vtuntur, ol. Chamæmel. Vino albo permixto aliqui inungere iubent. Hæc pro ratione febris & corporis constitutionis distinguenda quoque erunt.

In tertianis & acutioribus febribus, ad calorem contemperandū, putredinem arcendam, bilis feruorem extinguendum: R. syr. Acetof. f. Oxyfacc. f. ana 3. vj. syr. Endiuia, Viol. an. 3. β. aquar. Endiuia, Acetofæ an. 3. iij. misce fiat iulep: Capiat per triduum.

Vel sic: R. syr. de acetof. Citri, vel Limonibus 3. j. syr. de Endiuia, Viol. an. 3. β. aquarum Endiuia, Lactuca ana q. f. Capiat ter.

In pauperibus: R. Sacchari 3. ij. Aceti albi 3. β. decoctionis Hordei & Endiuia 15. j. β. succi Ribes vel Pomorum admodum acidorum 3. j. decoquantur, despumantur: Bibat tribus vel quatuor vicibus.

Vel fiat decoctum sequens: R. rad. Cichoreæ, Dentis leonis cū toto an. M. β. herb. Endiuia, Lactuca, Hepaticæ, Acetofæ an. M. j. flor. Viol. Buglos. an. P. j. 4. f. frig. mai. an. 3. j. fiat decoctio & in 15. j. β. dissolue syr. Acetof. f. Oxyfacc. f. ana 3. ij. vel vini Granat. acid. & vinosorum 3. iij. misce: Capiat quatuor vel quinque vicibus.

In tertianis longis, nothis, & cum adsunt obstructions: R. Oxy mel. f. 3. j. syr. de Endiuia, de Cich. lan. 3. β. aquarum Capill. Ven.

Endiuia, Cichorij ana 3. j. fiat syrupus: Reiterando per vices tres vel quatuor.

Vel: R. Oxy mel. compos. syr. de Cichor. compos. ana 3. j. syr. Capill. Ven. 3. β. aquarum Endiuia, Capill. Ven. ana 3. ij. misce: Reiterandum vt dictum.

Vel: R. rad. Cichoreæ, Graminis, Asparagi, Plantag. ana 3. j. rad. Fœnic. Petrof. lan. 3. β. herb. Endiuia, Cichorij, Dentis leonis, Capill. Ven. Hepaticæ an. M. j. Betonica M. β. iij. f. frig. mai. ana 3. ij. f. Endiuia, Portul. ana 3. j. f. Fœniculi, Anisi, Petrof. ana 3. β. Hordei P. j. Prunorum acid. n. vj. fl. Cord. ana P. j. fiat decoctio, diss. in 15. j. β. Oxy mel. sem. 3. iij. fiat Iulepus aromatizatus 3. j. Santal. Pro tribus vel quatuor vicibus.

Pro pauperibus: R. aquæ Mulsæ mens. β. Aceti albi q. f. vt acidulum fiat: Bibant, vt dictum.

In quartanis sic præparandum, in principio morbi, dum adhuc calor febris magnus est: nam si diu perseverauerint, calor diuturnitate debilitatur: R. Oxy mel. f. syr. de Bizantijs ana 3. j. β. de Fumaria 3. j. aq. Buglos. Borriginis, Lupul. ana 3. iij. misce pro tribus vicibus.

Vel sic: R. syr. Acetof. compos. de Bizantijs, de Buglos. an. 3. j. aquarum Fumariæ, Buglos. Borriginis, Endiuia ana 3. iij. misce.

Vel hoc decocto: R. rad. Buglos. Rusci, Asparagi, Cichoreæ, macerat. in Vino albo an. 3. j. rad. Fœnic. Petrof. an. 3. β. Liquir. 3. vj. cort. Tamaricis 3. β. herb. Buglosi vtriusq;, Capillarium, Chamædt. Chamæpyth. Beton. ana M. j. fl. Cord. Genistæ ana P. j. Passul. purg. ab acinis 3. ij. Prunorum n. x. f. quatuor Frig. mai. ana 3. ij. f. Cuscutæ, Petrof. Endiuia ana 3. j. Cicerum rubr. P. j. fiat decoctio, dissolue syr. de Bizant. 3. ij. Oxy mel. sem. 3. iij. fiat apozema pro tribus vel quatuor dosibus aromat. 3. j. Cinamomi.

Purgatio deinde, vel statim non concocto humore si turgeat: vel concocto prius, vt dictum, exhibenda: eaq; sumptâ, horis aliquot si necesse sit, Lauativum ex aqua seu decocto Hordei vel Infculo cum saccharo Ros. dandū. Et sequenti post eam die confortativum, vt dicetur, exhibendum.

In Tertianis exquisitis, & brevioribus, & arden-

ardentioribus, & duplicatis febribus, minus calida, vel mitiora vsurpanda sunt, hoc modo: R̄. Rhabarbari el. ʒ. iij. Spicæ gr. vj. Myrobal. citrin. confric. oleo Amygd. amar. ʒ. ij. infundantur in aqua Endiuia, prius parum irrotata Vino, & post horas duodecim exprimantur, addendo syrup. Ros. sol. simpl. ʒ. ij. f. Viol. ʒ. j. Bibat.

Alia: R̄. Calsiæ rec. extr. ʒ. ʒ. el. de Succo Ros. ʒ. ij. syr. Ros. sol. simpl. & de floribus Persicorum an. ʒ. j. cū aq. Endiuia vel Viol. misce.

Tertia: R̄. Hordei p. j. Prunorum n. vj. Iulub. Sebesten an. n. x. Tamarind. ʒ. ʒ. fl. Cord. p. j. Senæ ʒ. ij. fiat decoctio, dissolue in colatura Mannæ gr. ʒ. j. syr. Diasereos vel Ros. sol. cum infus. Rhabarbari ʒ. j. fiat potio.

In tertianis & quartanis nothis, longis, & in pituitosiore constitutione, Potio: R̄. rad. Cichor. ʒ. ʒ. Liquiritiæ ʒ. j. flor. Cord. p. j. Prunorum n. x. radic. Polypod. ʒ. vj. femin. Carthami ʒ. ʒ. femin. Anisi ʒ. j. Senæ ʒ. iij. fiat decoctio, dissolue Rhabarb. infusi in vino albo & aqua Endiuia, æquis partibus ʒ. j. syr. Diasereos ʒ. j. fiat potio.

Alia: R̄. Rhabarb. ʒ. j. Spicæ ʒ. ʒ. infusa in Vino albo & aqua End. Agarici ʒ. j. cum zingib. gran. vj. infusi in Oxymel. exprimantur: adde Mannæ el. ʒ. ij. fiat potio.

Tertia: R̄. Cathol. ʒ. ʒ. Diaph. el. de fuceo Ros. ana ʒ. ij. aqua End. & Beton. fiat potio.

Pilulæ: R̄. pilul. Aggregat. ʒ. j. cum Vino albo odorato fiant pilulæ.

Puluis: R̄. Rhabarb. el. ʒ. j. Cinamom. ʒ. ʒ. Turpet. el. ʒ. ij. zingib. ʒ. j. fol. Senæ ʒ. j. ʒ. fiat puluis: Detur cum iure Cicerum.

In quartanis ab initio non sunt fortiora vsurpanda, cum adhuc vehementer æstuent, Potio: R̄. Rhabarb. ʒ. j. Myrobal. Ind. confricat. ʒ. ij. Spicæ, Cinamom. an. gr. v. j. Epithymi ʒ. ij. infundantur in sero Lactis, fiat expressio: dissolue syrupi de floribus Persicorum ʒ. j. vel de Pomis redolēt. compos. Rond. qui helleborum recipit ʒ. j. fiat potio.

Alia: R̄. flor. Borrage. Buglos. Viol. ana p. j. Ceterach veri m. j. sum. Thymi & Epithymi ana ʒ. ij. rad. Liquirit. ʒ. j. Passul. Sebesten an. n. x. f. Anisi ʒ. ij. f. Cuscute ʒ. j. radic. Polypod. ʒ. vj. Senæ ʒ. ʒ. Tamar. ʒ. ʒ. cort. Myrob. Ind. ʒ. ij. fiat decoctio: diss. in ʒ. iij. col. syr. de

floribus Persicorum vel Ros. sol. cum inf. Senæ ʒ. j. vel de Pomis redol. fiat potio.

Tertia: R̄. Catholici ʒ. ʒ. vel ʒ. vj. vel illius loco Diasenæ tantundem, quæ in quartanis admodum laudatur, Confect. hamech ʒ. ij. ʒ. syr. de Bugloss. de Fumaria ana ʒ. j. aquæ Buglos. q. s. fiat potio.

Vomitibus etsi obuia tantum prima fronte educere videatur, & sic ventriculum euacuare, is tamen sæpè naturâ motâ, siue à principio fiat, & postea in morbi progressu, causam coniunctam illam biliosam è venis meseraicis egregiè excutiens, febrem mitiorem reddit, vel penitus tollit: atque ea ratione febres interdum mox curantur, vel si diuturnæ sunt, vt quartanæ, & post multas purgationes non cessent, interdum repetitis vomitionibus per duos trêse dies, sanantur. Quod & sæpè, si magnâ copiâ bilis per violentas vomitiones, quod tamen non adeo tutum, reiiciatur, accidit: cum materia biliosa febrilis in venis meseraicis contenta, sicuti cum circa intestinorum venas hæret, per purgationes tandem euocatur, sic si in superioribus, circa ventriculum, venis meseraicis lateat, vomitionibus, vel pluribus, vel magnis educitur.

Probatum idcirco in omnibus febrium intermittentium speciebus vomitus, maxime si nausea, cardialgia, vti ferè fit, adsint & vomere consuevi sint, nec alia, inter quæ & ventris censeretur cōstipatio, impediunt: cum, nisi ea prius laxetur, vomitus noceat, aluumque magis, nisi vomitoria ob violentiam illam moueant, supprimat. Hunc tamen dum cruditas adhuc est, in ventriculo, quod in quotidianis accidere putant, aliqui improbat, nec volunt vt vomitus ante septem vel octo dies prouocetur: tutiusq; concitari, si signa concoctionis adsint, docent, & pituitæ causâ incidentia vt oxymel. scyll. vomitorijs permiscant: in quo, cum pituitam febris causam proximam minimè esse posse ostenderitimus, nimis sollicitè laborare videntur. In quartanis plures vomitu, quàm ferè alio medicamento, liberatos scimus: vnde vomitum radicem curæ febriliū Auicena vocauit. Tempus autem vomitioni aptum interdum dies quietis est. Debetque ieiuno ventriculo si faciliè

vomant, fieri: sin minus, ventriculo cibus pleno: idq; præsertim, si cibum adhuc vt in progressu quartanæ & tertianæ sæpè fit, sumere possint. Tunc & antequam vomant, vel iusculum Piforum, aut Cicerum, aut Pulli affatim bibant. Raphanos & alias radices esuales, Caules, Pisces salfos, ad abstersionem comedant, vinumque dulce bibant, & paruo post tempore vomitum aëu vel potèntiā irrent. Sed & in principio accessione vomitus factus, & aliquoties, cum paroxysmi incipiūt, repetitus, plurimū iuvat febrisq; inde minor vel breuior fit, citiusq; cessat.

Proritur autem leuioribus minusq; irritantibus, cum debiliores sunt, & calor non magnus existit: fortioribus verò in diuturnis febribus, vt quartanis, & pituitosis, ventriculis, qui validissima ferre possunt. Quod sequentibus perficitur.

Aëu si irriterentur fauces digito vel penā, vomitio rectius succedit: quod & sine vomitorio exhibito in consuetis ad vomitum mouendum sufficit: quando prius cibo impleto, vt dictum, stomacho: aliàs post vomitoria exhibita hæc irritatio vomitum promouet; præsertim si post sumptum vomitorium, quartā horæ parte, iuris Pulli scutellam superbibatur, posteaque fauces irriter & vomat.

Vomitoria autem læuiora hæc sunt: R. aquæ Endiuia: poculum, Bibat affatim, & digito in fauces intruso vomat.

Vel: R. Oxymel. simpl. (quod omnes in omnibus speciebus probant) ʒ. j. vel ʒ. j. β. aut ij. vel iij. aquæ, vel Communis, vel Pluuia: vel decocti Hordei, insignè portionem: Bibat tepidè.

Vel: R. Oxymel. f. ʒ. ij. aquæ decoctionis Mellis, & feminis Raphani ʒ. vj. Bibat.

Item: R. aquæ Nucum viridium cum Aceto destillatæ, Bibat ʒ. iij. & vomat.

Vel: R. flor. Chamomil. ʒ. j. Anthos, & Anethi ana ʒ. β. fiat decoctio in aqua stillatitia, vel decocto Raphani: Bibatque initio. Quo multos liberatos fuisse testatur Rond.

Decoctum Lapatii, Atriplicis, & Portulacæ aliq; probant.

Vel: R. feminum Atriplicis, Anethi, Raphani ana ʒ. j. fiat decoctio in aqua, dis. Oxy-

mel. succi vel scyl. (si crassus in ventriculo sit humor) Bibat.

Fortiora hæc sunt: R. femin. Eruca, Porri, Raphani ana. ʒ. β. f. Atriplicis ʒ. ij. rad. Azari ʒ. j. fiat decoctio, diss. Oxymel. simpl. ʒ. ij. Bibat.

Azari feminis, & radicis, & Genistæ feminis decoctum magni facit Rond. addito Cinamom. & Macere, decoctioneque in Vino facta, vt vult Diosc.

R. rad. Palmæ Christi ʒ. j. β. Detur cum Vino Maluat. illius puluis.

R. Azari cum radic. ʒ. β. coquatur, decoctumq; propinetur.

Vel: R. Phaseolorum p. β. seminum Atriplicis, Anethi, & Raphani ana. ʒ. iij. Calamenti sicci ʒ. j. β. fiat decoctio, & in ʒ. iij. diss. Oxymel. succi vel scyl. (si crassa pituita in Ventriculo) ʒ. j. β. fiat potio.

Stibio alijsq; fortissimis exhibitis, vt Hellebore albo, plurimi fuerunt restituti: tunc enim immensam copiam serosi humoris cum bile citrina vel porracea vomunt, fitque magna è venis meseraicis à natura, quæ tunc admodum irritata est, euacuatio. Sed quia non caret summo hæc vis periculo, non temerè in quibusuis, sicuti alibi diximus, propinari hæc, vt Empirici faciunt, debent.

Repetuntur, si febres perseverent, altera vice per alvum expurgationes, pro diuersitate febrium variantes, hoc modo.

In tertianis exquisitis & duplicibus & acutioribus, corpore purgato, si nō cessent: satis erit Clysmate deinceps ventrem laxum seruare, & naturam aliquo pacto, vt è venis meseraicis portionem huc excutiat, sollicitare. Quo nomine clyster supradictus repetendus, vel alter magis stimulas iniiciendus.

Vel sequens altero, vel tertio die dari poterit: R. Hordei, Cicerum ana p. j. Maluæ, Violar. Bliti, Betæ, Atriplicis ana m. j. fl. Chamæmel. p. j. sem. Anisi ʒ. j. fiat decoctio, dissol. Mell. Viol. Sacchari rub. ana. ʒ. j. β. ol. Viol. ʒ. iij. vitellum Oui n. j. Salis parum, fiat Clyster.

Purgans quoque si febris non cessat, sed leuius, exhibendum. Veluti ius in quo Melita, Violaria, Spinachia, Malua, ebullierint. Vel potiones ex Rhabbarbo, Cassia, vti supra dictum, repetendæ.

In nothis, & longis febribus præsertim, de nouo



de nouo præparare & purgare oportet. Idq; vel repetitis supra dictorum præparantium purgantiumq; formulis: easque cum variæ illic explicatæ sint mutando, ita vt nouas hic adicere non sint necesse.

Inprimis verò hic ea quæ simul & præparant, & vias & materiam, & simul euacuant, laudantur, si aliquoties illis vtantur, & postea nihilominus adhuc validiore medicamento purgentur. Quæ varijs formis vsurpantur.

Apozema hoc illud præstabit: R. radic. Cichorij, Asparagi, Graminis, ana ʒ. j. β. rad. Lapatij, Acetosæ, ana ʒ. j. radic. Petros. Fœniculi ana ʒ. β. Liquiritiæ ʒ. vj. herb. Endiuie, Cichorij, Acetosæ fol. rot. Capillarium, Buglossi, ana m. j. Betonicæ, Pinpin. an. m. β. iij. f. frig. mai. ana ʒ. ij. Anisi ʒ. j. β. f. Fœniculi ʒ. j. Cord. anap. j. flor. Chamæm. p. β. Prunorum, Sebesten an. n. x. Tamarind. ʒ. vj. f. Carthami conuas. ʒ. j. β. macerentur radic. in Vino acidulo, postea omnia decoquantur in aqua, & in colatura feruida adhuc q. f. infunde Agaric. troch. ʒ. β. fiat iterum leuis decoctio, in fine addendo Myrob. citrin. Rhabbarbari el. ana ʒ. β. & in fine aromat. Cinam. ʒ. j. Spicæ ʒ. j. dissolue syr. Rosar. fol. ʒ. iij. miscendo. Vtatur alternis diebus, diu continuando: poculum vnum, augendo vel minuendo dosim, prout prima potio operabitur, bibendo.

Potest media illius pars addito plus Sacchari vel syrupi, ad formam syrupi, vt diutius conseruari citra corruptionem possit, decoqui. Et cum aliquoties Apozemate vsus est, syrupo dein vti. Et si totum apozema ad formam syrupi coquatur, tunc per se, vel cum aquis conuenientibus, vel decocto Hordei, aut Cicerum, aut cum Iusculo vncie illius aliquot exhiberi.

Ante cuius vsum, donec ille paretur, vel illius etiam loco, syrupus vsualis Diase-reos, vel de Rosi sol. cum infus. Rhabarb. dari potest.

Infusio in vino facta, nostro sæculo, quo absynthite vino pleriq; delectantur, ægrotis magis grata esse solet: cum & absynthiū plus quam quoduis aliud, senæ tetrum odorem reprimat, & vnâ cum vino, purgantiū,

quam ventriculo adferre solent noxam; corrigit: & vinum cum aperiendum simul est, suâ vi penetrandi, illud egregiè promoueat, cuius & calor, si vinofum præsertim sit vinum, aut dilutum, cum illud tantopere non calefaciat, exigua hæc illius quantitas, eius vsu impedire minimè poterit.

Quod ad aperiendum & laxandum sic parabitur: R. rad. Cichor. ʒ. j. β. rad. Graminis ʒ. j. rad. Petros. Fœniculi an. ʒ. β. rad. Ireos ʒ. ij. herb. Absynthij ʒ. iij. Chamæd. Chamæpit. Capill. Ven. an. ʒ. ij. fol. Acetosæ, Hepaticæ, Eupatorij Mef. an. ʒ. ij. fl. Cord. an. ʒ. j. seminum Anisi ʒ. j. f. Petros. ʒ. β. fol. Senæ ʒ. j. β. conuascentur omnia, adde Rhabarb. ʒ. iij. cum Spicæ ʒ. β. in nodulo ligati: Agar. ʒ. 4. cum Zingib. ʒ. j. similiter ligati, affunde Vini albi vinosi parum diluti atque Endiuie lib. v. (quia bonam portionem absorbet materia) stent & per noctem infusa, & manè bulliant parum in duplici vase, sensim rfrigescant: Vtatur vti de apozemate dictum fuit. Et ne corrumpatur, quod post dies aliquot interdum fit, rursus calefaciendo post triduum vel quatrimum, cauetur.

Electuaria vsualia ad hosce vsus, si qui illis delectentur, sic parari potuerunt: R. Cassiæ fist. rec. ext. ʒ. ij. pulpæ Tamarind. extr. cum aqua Endiuie ʒ. j. β. Mannæ gran. ʒ. j. Catholiconis, Diaprunis simpl. elect. Lentiui ana ʒ. β. Rhabbarbari el. infusi in Vino albo donec mollescat ʒ. ij. Spicæ ʒ. j. Senæ ʒ. j. β. irroratæ prius Vino, Cinam. f. Anisi ana ʒ. β. syrupi de quinque Radicibus & de Cich. cum Rhabarb. an. q. f. fiat electuarium: Capiat prima vice ʒ. β. experiundi causâ, postea augeat sensim dosim: idque alternis diebus, vel per se, vel, si mauelit, liquore aliquo dissolutum.

Pilulæ vsuales, horum loco, hæc sumi possunt: R. Agar. troch. ʒ. ij. Turbith. ʒ. j. zingib. ʒ. j. Rhabarb. elect. ʒ. iij. Spicæ ʒ. β. Diagrydij, præpar: cum succo Ros. ʒ. j. extracti Absynthij ʒ. j. cum syrupo de Rosi sol. cum infusionibus, fiat massa: Capiat tertio die vel alternis: à ʒ. β. incipiendo: manè ieiunus, parum syr. Viol. diluti aquâ Endiuie superbibendo.

Hiscæ aliquamdiu si vsi sint, nec febris re-

mittat; & non nimium hæc remedia per vices vsurpata ægrum purgando fatigarint, rursus paulò fortioribus, hac portione purgabitur:  $\mathcal{R}$ . rad. Liquirit.  $\mathcal{Z}$ . j. Passul.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . Prunorum num. vj. Tamarind.  $\mathcal{Z}$ . vj. sum. Thymi  $\mathcal{Z}$ . j. Polypod. Senæ ana  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . f. Carthami  $\mathcal{Z}$ . vj. f. Anisi, Fœniculi ana  $\mathcal{Z}$ . j. fiat decoctio, infunde Rhabarb. el.  $\mathcal{D}$ . iij. Spicæ  $\mathcal{D}$ .  $\beta$ . Agar. troch.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . fiat expressio, dissol. Diaph.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . fiat potus.

Vel:  $\mathcal{R}$ . el. de succo Ros. Diaphœn. conf. Hamech an.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . fyr. Ros. sol. cum inf. fol. Senæ  $\mathcal{Z}$ . j. dissolue in vino Abs. & aqua Endiuia, fiat potio.

Vel hisce pilulis:  $\mathcal{R}$ . pilul. Aggregat. de quinque gener. Myrob. Sine quibus an.  $\mathcal{D}$ . j. cum Vino albo od. fiant pilulæ n. viiiij.

In quartanis, perseverante morbo, cum sit admodum diuturnus & pertinax, interdum quiescere etiam per mensis vsque aliquando spatium, oportet: postea rursus concoquendo & purgando hac ratione procedendum.

Præparatur humor tenax & crassus biliosus & sæculentus sanguis hoc modo:  $\mathcal{R}$ . fyr. de Fumaria, de Epithymo an.  $\mathcal{Z}$ . j. fyr. Viol. Endiuia an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . aquarum Buglos. Fumaria, Endiuia an.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . arom. Santal. citr. Bibat per 5. vel. 6. dies.

Ineunte Vere cum herbe haberi possunt, ut adhuc circa autumnum, sic præparari potest:  $\mathcal{R}$ . Buglossi vtriusque sum. Lupul. Fumariæ, Cirsij an. M. j. recent. contundantur addendo Aceti  $\mathcal{Z}$ . ij. exprimatursuccus, addendo, succi Pomor. redol. tb. j. Sacchari q. s. misce: Vtatur per vices.

Purgetur postea vel eodem vt supra, vel validiore adhuc, quàm in principio factum est, medicamento:  $\mathcal{R}$ . Prunorum Damasc. n. x. Pass. Iuiub. Sebest. an. n. xij. fl. trium Cord. p. j. f. Anisi  $\mathcal{Z}$ . j. fiat decoctio in aqua & vino albo, infunde Myrobal. citr. Ind. conf. ol. Amygd. dulc. an.  $\mathcal{Z}$ . iij. Rhabarb. el.  $\mathcal{Z}$ . j. Spicæ gran. vj. Senæ  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . Epithymi & summitatum Thymi an.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . fiat expressio, dissolue fyr. Ros. sol. f.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . Catholic.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . cont. Hamech  $\mathcal{Z}$ . j. fiat potio.

Vel hisce pilulis:  $\mathcal{R}$ . pilul. Aggregat. de quinque generibus Myrob. Turbith pulue-

rizati an.  $\mathcal{D}$ . j. Zingib. gran. v. cum Vino albo fiant pilulæ.

Vt verò simul præparetur & purgetur materia, tale fiat apozema:  $\mathcal{R}$ . rad. Alparagi, Graminis, an.  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . rad. Apij, Petros. an.  $\mathcal{Z}$ . j. Liquirit  $\mathcal{Z}$ . ij. cort. rad. Cappar. Fraxini, Tamaricis, Sambuci, an.  $\mathcal{Z}$ . j. macerentur omnia in Vino albo, herbar. Borrage. Bugloss. cum toto, Adianti, Polytrichi, Ceterach veriana M. j. Chamæd. Chamæpythios, Betonica an. M.  $\beta$ . Mercurialis recent. M. j. vel aridi M. ij. fl. Cord. Anthos, Genistæ an. p. j. seminum Anisi, Petros. an.  $\mathcal{Z}$ . ij. f. Cuscutæ, Fœnic. an.  $\mathcal{Z}$ . j. iij. f. frig. mai. an.  $\mathcal{Z}$ . ij. Passul.  $\mathcal{Z}$ . ij. Prunorum n. x. fiat decoctio, in colatura infunde rursus f. Carthami contusi  $\mathcal{Z}$ . j.  $\beta$ . rad. Polypod.  $\mathcal{Z}$ . iij. fol. Senæ  $\mathcal{Z}$ . ij. Agarici troch.  $\mathcal{Z}$ . iij. Myrobal. Ind. Citrin. conf. ol. Amygd. dulc. an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . Epithymi, summit. Thymi an.  $\mathcal{Z}$ . iij. stent in infus. feruenti: atque in fine parum bulliant, dein colentur, adde succi Pomorum redol. vinosorum quartarium j. Sacchari quartarium j.  $\beta$ . fiat apozema: vel decoquendo ad spissitudinem iustam, syrupus, arom.  $\mathcal{Z}$ . ij. Cinamom. Vtatur per vices, ab  $\mathcal{Z}$ . j. ad plures, vt dictum prius de alijs, vel per se, vel dissoluen do cum sero Caprino, vel aqua Bugloss. Borrage. &c. procedendo.

Vini infusio ex iisdem fieri potest: quæ & æquæ, vti dictum conueniens: contemperando interim parum vinum, si nimis potens sit: & addendo absinthium: cum vina amara magis, secus ac decoctia, placeant.

Minus itaque operosa talis fiat ex aridis sequentibus infusio:  $\mathcal{R}$ . rad. Graminis, Cichorii, Petrosel. Fœniculi an.  $\mathcal{Z}$ . j. cort. Tamaric. Sambuci an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . herbar. Absynth. Chamæd. Chamæpit. Betonica, an.  $\mathcal{Z}$ . j. Fumariæ, Linguae ceruinæ an.  $\mathcal{Z}$ . ij. flor. Cord. an. p. j. Epithymi, sum. Thymi an.  $\mathcal{Z}$ . ij. f. Anisi, Fœniculi an.  $\mathcal{Z}$ . j. f. Petrosel. Coriand. ana  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . radic. Polypod. sicci, Senæ an.  $\mathcal{Z}$ . ij. Agarici  $\mathcal{Z}$ . iij. zingib.  $\mathcal{D}$ .  $\beta$ . affunde Vini albi, vel meri, vel diluti q. s. vt superemineat, mace retur: coquatur, vti de priore dictum, & vtratur. Non aromatizatur autem, cum minus crudum propter vinum sit, & absinthij odor præualere debeat.

In forma electuarij sic fieri potest: R. Catholiconis 3. j. Diasenæ fol. conf. Hamech. an. 3. β. medul. f. Carthami bene pistatæ 3. vj. Turbith puluerizati 3. ij. Zingib. infusi in Oxymel. 3. j. fol. senæ mund. subtiliss. pul. 3. ij. β. f. Anisi 3. β. syrupi de Epithymo q. f. fiat electuarium: Capiat per vices, per se: à 3. vj. incipiendo: vel cum sero Caprino dissolutum.

Vel pilulis his vtatur: R. Myrobal. Ind. Citr. conficcat. ol. Amygdali. an. 3. j. Rhabarb. el. 3. ij. Turbith 3. j. β. Thymi, Epithymi an. 3. j. Senæ 3. j. β. Tartari 3. j. zingib. Spicæ an. gran. vj. irrorentur omnia sero Caprino, donec mollescant, dein cum syr. de Epithymo fiat massa: Capiat 3. ij. augendo dosim, prout necesse erit.

Pilulæ ex Agarico, cum succo Eupatorii veri, & pauxillo Spicæ, in quartanis commendantur.

Hiscæ si aliquandiu vsi fuerint, mox postea, vel paucò post tempore iterum purgandi erunt: & tertio quoque, si perseveret febris, cura hoc modo, vti dictum, erit repetenda: quietem interim & inducias interpolatis vicibus ægro concedendo.

Sed & clysmata per morbi progressum vsurpata plurimum competunt, ad materiam è venis meseraicis continuè prouocandam, & ne alius constipetur, vti ex decubitu, & propter calorem, & inediam fieri solet, cauendum. Quorum exempla in principio, ex stimulantibus & aperientibus parata, propòsita fuerunt.

In melancholicis febribus tale sæpè injici poterit: R. herb. Emollitiu. an. M. j. Melissæ, Fumariæ, Ruglosi vtriusq; an. M. β. Mercurialis, Thymi an. M. j. β. fl. Chamæm. Meliloti, Genistæ, Sambuci an. P. j. f. Carui 3. j. f. Lini, Foenogræc. an. 3. ij. Furfuris P. j. β. Cicerum P. j. fol. Senæ 3. j. fiat decoctio, dissol. Mel. Viol. & Anthos. an. 3. β. conf. Hamech. Bened. lax. an. 3. ij. ol. Violar. & Chamæm. an. 3. j. β. Salis parum: fiat Clyster.

In nothis febribus, & pituitosis corporibus, tale enema vsurpari potest: R. rad. Liliorum, Altheæ an. 3. j. Liquiritiæ 3. j. β. herbarum Emollit. Atriplicis Mercurialis, Melissæ, Betonicæ an. M. j. Ficuum ping. P. vj. f.

Anethi, Foeniculi an. 3. j. f. Carthami contusi 3. vj. fol. Senæ 3. x. fl. Chamæm. Sambuci, Anthos an. P. j. fiat decoctio dissol. in tñ. j. col. Catholici, Diaphoen. an. 3. ij. Hieræ Gal. 3. iij. Mellis, Sacchari rubr. an. 3. j. olei Violar. Liliorum, Chamæmel. an. 3. j. Salis parum, fiat Clyster.

Inedia ad euacuationes quoque pertinet: per quam, cum non tantum, ne noua causa accedat, impediatur, sed & ea quæ in venis meseraicis congesta est, ab intestinis & ventriculo rapiatur, febres quoque aliquando cessare possunt. Vti non solum Thessalus suâ triduanâ inediâ febres curabat, sed & Empirici quoque nostro sæculo idem facere conantur. Verum cum per omnimodam cibi abstinentiam bilis admodum ferociat, & partibus enarratis, à quibus rapitur, ventriculo præsertim & intestinis, etiam si se substantiæ ipsorum insinuet, vnde colicam prodire alibi docuimus, incommodet, grauiioresque sæpè morbos excitet, non temerè inediâ, in qua omnino nihil sumunt, cum sic etiam sudores & vrinæ impedirentur, febres sanare conabimur.

Tenuium humorum expurgationes, cum sero & ichoribus, per ea quæ per vias vrinæ, vnâ cum vrina, aut per sudores cum sero, aut insensilem transpirationem euacuant, fiunt. Quæ quidem si prius materia, quæ febres facit, purgatione aliquousque detracta, aut crassior illius portio ablata fuerit, remanente adhuc tenuiore illius parte, & ichoribus, si per dictas vias euacuent, febres hasce sanant, materiam eam quæ residua est, per vrinas aut sudores, (cum vnâ cum sero quaquauersum excrementa corporis ferri possint) euacuando. Quod natura sponte ferè facit, & per has vias, tum plerunque cum iam concocta & ad excretionem habilis facta est, expurgat. Quam & Medicus naturæ minister imitari, eoq; tempore, quando signa concoctionis apparent, vti & circa declinationem, vt si quid remansit, tollatur sequenti modo, præmissis, vti dictum, purgantibus, per vrinas, sudores, & insensibilem transpirationem, excretiones instituere debet.

Per vrinas itaq; euacuantiæ remedia habita

bita ratione febris, partim præparantibus, uti supra dictum, permiscemus: partim illis, purgatione iam factâ, circa declinationem utimur.

In tertianis breuioribus & acutioribus, leuiores & quæ minus corpus accendant, exhibemus. Ut cum in iusculo semen Melonum cum Ciceribus rubris, additâ radic. Petroselinî decoquimus, illisq; ut manè per aliquot dies bibant, propinamus.

Quod & decoctum teneritatum Asparagorum, Ceruissia bibita, vel emulsio quatuor f. Frig. mai. cum lacte Amygdalino, inter potum data, præstant.

Vinum Granatorum vinosorum dictorû, medijs saporis, valde vrinâs bibitum mouet.

In tertianis nothis & longis febribus eadem competunt, & his quoque validiora. Ut decoctum Pulli cum rad. Petrosel. & Fœniculi, Borragine & Ciceribus: Alijsq; in vitus ratione explicatis.

Vel hoc: R. Cicerum rub. p. j. Hordei p. ß. Liquiritiæ 3. j. Passul. 3. j. ß. rad. Fœniculi, Petrosel. an. 3. ij. f. Melonum & Cucurb. ana 3. ij. fiat decoctio in iure Pulli macro: Utatur aliquot matutinis.

Vel sic: R. decocti Hordei cum rad. Fœniculi 1b. j. adde syr. Capill. Ven. 3. ij. misce.

Fortius hoc modo, si calor non metuatur, parabitur: R. rad. Rusci, Asparagi, ana 3. j. rad. Fœniculi, Apij, Petrosel. ana 3. ß. rad. Azari 3. j. herbar. Endiuicæ, Hepaticæ, Capill. Vend. ana M. ß. Hyssopi tertiam partem M. j. seminum Fœniculi 3. ij. iij. f. frig. mai. ana 3. iij. Cicerum p. j. fiat decoctio, adde Sacchari q. f. vel Mel in senibus, Aceti tantillum: Utatur.

Decoctum ab aliquibus valde probatum: R. summit. Absynth. 3. ij. Cicerum rubr. 3. vj. coquantur: Bibat patiens 3. iij. post inunctionem dorsî, ut infra dicitur.

Anethi decoctum cum Ruta & Melicrato: vel decoctum Hyssopi, idem præstat.

Aquæ Gentianæ, Absynthij, Centaurij: vel Graminis, Asparagi, Apij, Petrosel. Ligustici, Valerianæ horum loco vsurpari possint.

Pilulæ in obstructionibus magnis ad vrinâs mouendas accommodæ hæ sunt: R.

troch. de Absynthio de Rosis, de Eupat. ana 3. j. cum aqua Gentianæ fiant pilulæ: Capiat 3. j. diebus aliquot continuis, superbibendo decoctum Cicerum rubr. sem. Melonum & rad. Petroselinî.

Vinum dilutum album tenue, vrinâs mouet, & circa declinationem eo nomine conceditur.

Sed & medicamenti loco infusio in ipso facta, sic vsurpari potest: R. radic. Fœniculi, Asparagi ana 3. j. herb. Absynthij, Hyssopi ana 3. j. ß. fl. Chamæm. Anethi ana 3. f. Fœniculi 3. j. infundantur in mens. j. Vini, & dilutum aquâ coctâ vel præparatâ, vel elicâ, ut dictum, bibat.

In quartanis longis, cum diu durarunt, leuiores iam descripta, atque illis adhuc fortiora quoque, cum non magnus amplius sit calor, conueniunt: Ut R. Liquirit. Passul. ana 3. j. rad. Petrosel. 3. j. ß. rad. Azari 3. j. herb. Adianti, Polytrichi, Ceterali, Hyssopi, ana M. ß. Lupul. p. j. f. Asparagi 3. iij. f. Fœniculi 3. j. Melonum 3. ij. Cicerum rub. p. j. fl. Chamæmel. 3. j. ß. fiat decoctio in 1b. vj. aquæ: adde vini Granat. 3. iij. Sacchari q. f. Bibat aliquot matutinis.

Vinum maximè quartanarijs confert, quare dilutum datur.

Vti & hæc infusio: R. herb. trium Capillarium an. M. j. Hyssopi M. ß. fl. Cham. p. ß. rad. Fœniculi, Apij, an. 3. j. rad. Azari 3. ij. f. Fœniculi 3. j. f. Cuscutæ 3. j. ß. fiat infusio in Vini mens. j. Utatur, ut supra.

Pilulæ supradictæ quoque, vel tales competunt: R. troch. de Absynth. de Eupat. de Rhabarb. an. 3. j. cum syr. de Byzant. fiant pilulæ: Capiat ut supra dictum, cum iure Cicerum, in quo radices decoctæ sint.

Sudorum prouocatio, si eò maximè tendat critica excretio, ut naturæ motus iuuetur, & in declinatione ad residuum expellendum conuenit. Quod sequentibus præstabitur: inter quæ, ea quæ leuiores sunt, si non sudores mouent, saltem per insensilem transpirationem euacuant.

Frictiones eo nomine, tum ante paroxysmum duabus horis, tum in principio paroxysmi, cum incipit calere, ut vapores discutiantur, & calor per totum corpus dispergatur,



tur, competunt. Quæ si validè fiant, sudores quoque promouent.

Abstergere sudorem frequenter, sudores validius prouocat.

Aqua costæ cum pauco vino exhibita, sudores elicit. Sed & sola affatim bibita, sudores potenter promouet. Vnde qui ægris potum aded interdunt, eosque siti ferè enecant, cum sic minùs sudent, & corpus ipsorum valde inflammetur, vnde hæctica facilius sequitur, temerè illos affligunt.

Aqua Buglossæ bonâ quantitate bibita, sudorem potenter elicit, & præsertim in quartanarijs vtilis est. Vti & aliæ aquæ, vt Fumariæ, Scabiosæ, Cardui benedicti illis appropriatæ sunt.

Decoctum sequens ad sudores eliciendos laudatur: quod & vrinas mouet: R. Hordei P.j. rad. Apij, Petrof. Rusci, Asparagi, Vrticæ ana ʒ.j. rad. Ireos, Enulæ an. ʒ.ß. baccarum Lauri n.xij. fl. Anethi, Chamæmel. ana P.j. Pulegij, Calamenti an. M.ß. sem. Cymini, Anisi, Fœniculi, Citri an. ʒ.j. bulliant in multa aqua: Utatur frequenter.

Theriaca quoque eo nomine exhibetur: Vti & alia: Quæ in ijs, quæ paroxysmos impediunt, explicabimus.

Inunctio spinæ ex oleis relaxantibus, aliæque illic quoque describenda, idem præstant.

Balneum in quartanis longis, tum quia sudores prouocat, tum quia simul humectat & reficit, vtilissimum est. Proin & actu humidum ex Aqua dulci paratum esse debet: in qua nonnunquam Hordeum & herbæ emollientes, humectantes, coquuntur. Quo in die quietis, vel saltè quinq; horis ante aduentum paroxysmi, actu non nimis calido, vti debet. Et post illius usum, corpore prius absterfo, propinataque Mithridati vel Diaborraginati an. ʒ.j. in lecto sudare, superdormireq;. Quo pacto multi à febre quartana diuturna liberati fuerunt.

Alterantia, morbi caliditati & siccitati resistere, atq; idcirco refrigerare & humectare in genere debet: ea quoq; illis quæ causæ putridæ resistunt: & vias aperiunt obstructas: viresq; roborant, permiscendo. Quæ cum non aded inter se differant, non secundum febriū genera, sed formas potiùs distinguemus.

In potu quicquid eo nomine ægrotantibus exhibetur, cum illis sit gratiùs, hac forma potiùs illis alterando subueniendum: quâ non solum delectantur, sed & refocillantur.

In Paroxysmo autem quia magis sitiunt, id præstat Aqua costæ, si cruditas timetur: vel cruda, vt in continuis dictum est: vel in qua Hordeum coquitur, quæ tamen, si multum hordei addatur, quia multum nutrit, in paroxysmo improbatur. Nec dum in paroxysmo postquam rigor desijt, à potu aded, vti ferè fit, arcendi sunt, cum sicuti & Fernel. testatur, & Iouertus in paradoxo, æger calore accensus & sitibundus, si diutius sitim perferat, & sic incendio non subueniatur, ed facilius corporis colliquatio, calore solidas corporis partes inuadente & depopulante, sequatur: & sudores quoque, sicuti priùs dictum, qui à potu materiam desumunt, hac ratione impediuntur, qui frigido potu copiosoque promouentur. In quo tamen ne nimium & affatim refrigerando, subitanea hac mutatione, viscera lædantur, vnde hydrops, sicuti in quartanis nonnunquam ob hoc peccatum accidit, facile sequitur, moderatio quædam adhibenda erit: idque præsertim si ventriculus à frigido potu offendantur: tunc enim non tam largam, nec nisi correctam aquam concedimus. Consuetudine non neglectâ interim, & prout illa fuerit, potum augentes minuentsue.

Extra paroxysmum verò si corpus minùs biliosum sit, aut calor febrilis non aded vehementer corpus accenderit, sed illud integrè ad se solutâ accessione redeat: Vinum dilutum aquâ communi vel Buglossi in quartanarijs præsertim, & in nothis febribus, tenue, acidulum, quod nullo pacto accendere, cum potiùs refrigeret, potest, conceditur: cum & sicuti dictum vrinas quoq; moueat, & vti dicetur, vires interim conseruet. Quo nomine & tunc in ipso calidiora quædam, vt Hyssopum & Gal. iubente Piper: alij Gariophyllos, decoquunt. Alij Ceruissiam, cum vrinam moueat, propinant.

Sed & extra paroxysmum & in paroxysmo, potentiâ refrigerantia, & humectan-

cia, præsertim in calidioribus febribus, visceribusque appropriata, sequenti formâ liquidâ, in potu quoque, exhibentur: R̄. Aquæ Endiuia, Acetosæ, Buglos. an. quart. j. vini Granat. ʒ. ij. Sacchari q. s. fiat Iulepus: vel potest addi syrupus acidus, si bilis ferociat, ut de Pomis acidis, vel Ribes, vel Acetos. s. aut Oxyfacch.

Vel: R̄. Aquæ coctæ mens. j. syrupi de Limonib. vel de acet. Citri ʒ. ij. Viol. ʒ. j. misce.

Vel utatur hoc syrupo Acetoso appellato: R̄. Aquæ t̄b. x. Aceti ʒ. iij. Sacchari ʒ. iij. decoquantur, & bibat.

Iulep Alexandrinum, ex aqua Rosar. & Saccharo, prædest. Aliaque multa in siti suo loco explicata: inter quæ succus Portulacæ valde laudatur à Dioscorid.

Electuaria mollia & solida variis modis dantur.

Post cathartici assumptionem, sequenti die ad roborationem hoc detur: R̄. conf. Ros. Viol. an. ʒ. j. pul. Triasant. ʒ. ʒ. cum Saccharo fiat bolus.

In nothis & quartanis: R̄. conf. fl. Borr. rag. & radic. Buglos. an. ʒ. j. cort. Citri condit. ʒ. ʒ. pul. Diamarg. frig. ʒ. ʒ. misce.

Vel: R̄. Theriacæ ʒ. j. conf. Buglos. ʒ. ʒ.

In paroxysmo etiam electuaria pro siti dantur, quæ tamen, si dulcia nimis sint, sitim potius excitant. Alterationis tamen causâ talia fiunt.

Electuarium siccum: R̄. conf. Rosar. Buglos. an. ʒ. j. carniū Citri condit. cort. Citri condit. an. ʒ. ij. rub. de Ribes ʒ. ʒ. spec. Diamarg. ʒ. ʒ. Sacchari Ros. tab. q. s. fiat mixtura.

Vel hæc mixtura: R̄. confer. Ros. rob. de Ribes, Ceraforum acid. condit. Prunorum acid. cond. an. ʒ. j. conf. Buglos. ʒ. ʒ. misce: Capiat tempore sitis.

Per morbi progressum sic alterandi & corroborandi erunt, tabulis: R̄. spec. elect. Triasant. duplicato Rhabarbar. ʒ. j. Diarrh. alb. ʒ. j. Diamarg. frigid. ʒ. ʒ. conf. Rosar. & radic. Buglos. an. ʒ. j. Sacchari dissol. in aqua Ros. & Endiuia: cum pauco Aceto, si calor adsit, fiant tabulæ: Capiat intermediis diebus, in die quietis.

Saccharum Rosar. tab. per se & cum aliis permixtum valde commendatur, uti & ma-

nus Christi vocatum & tabul. Triasantali & Diacorallium.

Aliæ tabulæ in quartana & melancholicis: R̄. spec. Diarrhod. Triasantali ana ʒ. ʒ. Diamoschi ʒ. ʒ. sp. Lætitiæ Gal. ʒ. ʒ. sacchari diss. in aqua Ros. & Buglos. q. s. fiant tab.

Mollia electuaria sic vsurpantur: R̄. conf. iij. fl. Cord. an. ʒ. j. conf. Scolopend. Capill. Vend. Cirsij an. ʒ. ʒ. cort. Citri condit. ʒ. ij. spec. Diarrhod. Diatrag. frig. Diamarg. frig. an. ʒ. j. cum syr. conf. cort. citri.

Vel: R̄. Diabuglossati, Diaborragin ana ʒ. j. Lætitiæ Almanf. ʒ. ij. spec. el. de Gemmis, Arom. ros. an. ʒ. ʒ. cum syr. de pomis.

Vel in melancholicis: R̄. iij. conf. Cordial. an. ʒ. j. spec. Cord. pro cibo, frag. Lap. pretiosorum, Margarit. an. ʒ. ʒ. adde si vis ad formam folia Auri, cum syr. de Ribes & Ceraforum acidorum, vel de Pomis acidis, qui mîrè gratus, fiat electuarium.

Pilulæ valde à quibusdam ad refrigerandum commendatæ: R̄. troch. de Campl. ʒ. ʒ. cum Aceto fiant pilulæ: Capiat ʒ. ʒ.

Clysteres supradicti laxantes per morbi progressum vsurpati, alterationis quoque vsum præstant.

Cibi alterationis causâ humidiores, ut & in continuis dictum, quoq; vsurpantur.

Carnes humidiores: Ut sunt iuniorum quadrupedum, vituli lactantis, porcelli, hædi, pullorum, elixæ potius, exhibentur. Item piscium saxatiliū, quos Pipere in quartanis, aliis tamen de causis, condiunt.

Oua forbilia, nisi facîle, ut in biliosis ventriculis sit, corrumpantur, conueniunt:

Vuæ suspensæ aliquamdiu valde ægros recreant. Rapæ laudantur à quibusdam. Vti & Persica, & Pepones.

Panis lotus cum iusculo datur. Et cremor Hordei.

Iuscula, Lactucæ, Borr. rag. Bugl. (in primis in quartanis) Endiuia, condiantur: & aqua Buglosi brodiis permiscetur.

Condimenta ex Agresta & Aceto, Cappariolis, bene à sale ablutis, vtilia sunt: uti & nostrum compositū quod Gumpist vocant.

Confectiones item fructuum acidorum: Et fructus hi recentes, nisi quid obstat, vel siccati potius, rursūq; emolliant.

Acetaria

**Aceraria ex Lactuca cum Aceto**, & paulo Oleo. Item radic. Cichor. parum cocta, cum Aceto & oleo comesta, prodest, vel teneritates ipsius.

Aër frigidiusculus ut & in cōtinuis dictū, naturā talis, vel arte paratus eligendus.

Epithemata hepatis refrigerationis causā, ubi magnus calor, hoc modo applicantur: R. aquarum Cichor. Endiuiae, an. ʒ. iiij. aq. Absynth. ʒ. ij. Santali citrin. Ros. an. ʒ. j. Spicæ ʒ. ʒ. aceti Ros. ʒ. ʒ. fiat epithema.

Postea vngatur cerato Santalino, oleo Viol. lotis aq. frig. an. ʒ. j. Spicæ ʒ. ʒ. misce.

Pro corde epithema hoc conuenit: R. aqua Rosarum ʒ. ij. aq. Borrag. Bugl. an. ʒ. j. aq. Melissæ ʒ. ʒ. aceti Ros. ʒ. vj. spec. Cordial. vel Diamarg. ʒ. j. Croci ʒ. j. misce.

Postea vngatur regio cordis vel pulsuum sequenti: R. Ther. ʒ. ij. vnguenti Nenuph. citrini ʒ. j. succi Limonum ʒ. ʒ. Croci, Camphoræ an. gran. v. fiat linimentum.

Renes, si incaluerint, refrigerationis causā inunguntur: R. mucilag. f. Psyllij, extractæ cum aqua Ros. ʒ. j. Santal. ʒ. ij. Camphoræ ʒ. ʒ. olei Ros. Viol. ana ʒ. j. Ceræ albæ q. f. fiat vnguentum.

Balneum alterationis causā & non tantum ad sudores mouendos, uti superius dictum est, in quartanis, humectando, ex humectantibus paratum commendatur: quod tamen extra paroxysmum, iam diu perseverante morbo, tutius adhibetur. Licet vulgò in febribus intermittētib. omnibus madefacere adeò metuant, ut si vel iuxta flumina aut fontes ambulent, reciduiam se pati sibi persuadeant: eoq; nomine, ne qui a febre liberati sunt, pontes transeant, aut nauigia cōscendant, aut supra terram nouiter cultam ambulent, vehemēter anili superstitione cauent: cum tamē madefactio illa in febrib. illis diuturnis calore nō nihil remittente, p̄sertim si corporis adsit consumptio non im̄p̄betur.

Virium conseruationis causā, ut æger, si acuta p̄sertim sit febris, non succumbat, vel si diuturna, sufficere possit, viuendi ratio recta, per decentem victum, aërem, somnū, exercitia, instituitur.

Aër purus & liber esse debet, & nonnunquam odoratis efficax, fieri.

**Cibus & potus, quatenus nutritionis causā instituitur**, Tenuior in genere, in febrium omnium intermittētiū principiis esse debet. In quibus famem & sitim primā septimā tolerare multum ad curam facere Auicēn. docet. Et si diuturniores sunt & chronicæ, uti nothæ, & quartanæ, & in tribus primis septimanis parcius viuant, citius sanantur. Inde verò, uti & si bilis efferuescat in tertianis & quartanis, cum in ediam ægrè ferant, plenior conceditur.

In accessione ipsa, ne natura in morbi-  
cæ materiæ concoctione impediatur, neue calore præternaturali cibus corrumpatur, febrisque augeatur, cum & cibo sumpto corpus magis incalescat, ut in hēcticis, priuatim fieri solet: cibum ferè subtrahimus. Quo tempore & potum nutrientem ex decocto multi Hordei paratum, uti prius dictum, improbant, nosq; eo nomine lat amygdalinum, spissius p̄sertim, quod tamen tantopere v̄sitatum est, longè minùs concedere possumus. Interim tamen si biliosus & valde attenuatus vel raræ texturæ sit æger, ne bilis ferociat, aut hēctica sequatur: etiam in paroxysmo nonnunquam aliquid cibi, uti & pueris ob consuetudinem, permittitur.

Extra verò paroxysmum, in biliosis, in declinatione febris, ægri cibandi erunt: & rursus ante inuasionem paroxysmi, horis duabus vel tribus. In longioribus verò febribus, ut quartanis, die accessionis totā, si ieiunent, consultum erit: cibusq; horis sex vel septem ante paroxysmum, vel tanto tempore, ut prius concoctio, antequam paroxysmus inuadit, absoluat, exhibeatur. Quod & in duplicibus febribus indies inuadentibus obseruandum est, semper quietis tempus, quod febrem longius antecedit, eligendo, & proin mox post declinationem febris, cum morbus non det inducias longiores, cibandum. Cibus autem facilis concoctionis, ut iam dictum, in alterantibus & cōtinuis, eligitur.

Vinum in primis cum reficiat, in quartanis & alijs fere nothis conuenit: sed extra paroxysmum, cum æger cibatur, nec dum adeò immoderate sit exhibitum: cum si sitis

magna sit, aqua tunc potius cocta propinari debeat. Hoc autem dilutum, tenue & album datur: nouumq; antiquo melius præfertim in biliosis erit, cum antiquum empyreumate suo vehementer accendat. Sed nec rubrum, si clarum & dilutū sit, improbat.

Somnus plurimum reficit, in declinatione & tempore quietis factus: cum per vigilas nuntias lædantur. In principijs tamen paroxysmorum nocet.

Exercitium moderatum, in quartanarijs præfertim, valde est utile.

Animi affectus immoderati & tristes nocent, Moderati & iucundi profunt.

Medicamentis quo pacto vires conseruare & restaurare debeamus, partim in alterantibus, partim alibi indicatum est.

Symptomata seu accidentia febrium intermittentium, curatione methodicā iam explicatā, vnā cum morbo quoq; mitigantur, tandemque penitus eo sublato cum illo tolluntur. Si quæ tamen ex illis, grauiora cum sint, potissimum vrgeant, adhæc quoque cura dirigitur. Idque vel omnibus in genere accidentibus eam accommodando, quod sit paroxysmum febrilem impediendo: vel priuatim certis subueniendo, de quibus in fine dicetur.

Paroxysmus seu accessio febrilis in febribus intermittentibus, totius morbi decursus est, in quo omnia febris accidentia, quæ à frigore & calore proficiscuntur, se proferunt, eoque cessante, cessant. Qui paroxysmus, & per consequens febrium hæc accidentia, si impediuntur, ne eueniant: cura quoq; sed illegitima est, qualis symptomatibus attribuitur, cum causa non auferatur, sed duntaxat illius euaporatio, vel motus cor accendens impediatur. Hæc autem quæ illud præstant, potissimum rigorem prohibent, qui principium est febrium intermittentiū, quo impedito, cum hunc maximè vulgus respiciat, etsi calor aliquis leuis superueniat, nihilominus febrem cessasse vel minorem factam esse, existimat. Sed & fit, vt cum rigor, per quem materiæ febrilis corpus. peruadentis rigoremque excitantis sit per corpus transicus, impeditur, cum tunc illa non per rigorem mota subsistat, tam rigor quam

calor minimè superueniant, & febrilis paroxysmus sic illorum usu, quibus rigorem impedimus, penitus cesset. Quod tamen, nisi purgata prius & concocta sit materia, si fiat, tutò minimè aut rectè fieri potest, cum causâ relicta, etsi febris desinat, grauiora tamen inde sequantur accidentia. Sicuti Empirici his tantum intenti, vt mox ita febrem sanent, in colicos cruciatus, icteros, hydropicos, vralibi dictum ægrotantem inducunt. Fit tamen quoque hoc interdum etiam secundum rationem, si paroxysmorum multitudo vires vehementer prosterнат, vt aliquando, licet causa penitus sublata minimè sit, paroxysmum hæc extraordinarijs remedijs cogamur mitigare, aut sistere, sed ita, vt nihilominus in cura methodica in causæ sublatione procedamus. Sed & fit, vt licet causa ablata sit, aded habitum contraxerit febris, & naturam in consuetudinem pertraxerit, vt hac consuetudine mota, hunc ordinem deinceps aliquandiu nihilominus, vt sæpè accidit, seruet: tunc vt illum naturæ motum, sistamus, maximè eo tempore quo febris inuadere solet, vel cum iam præludia rigoris, oscitatio, pandiculatio, aut frigus, incipiunt, vel etiam paulò ante horum aduentum, ad rigorem impediendum, & per consequens sic paroxysmi partem aliquam, aut etiam vnā cum rigore calorem subsequenter, totumque paroxysmum retardandum, aut tollendum, ea quæ rigorem mitigare, vel penitus summouere possunt, remedia usurpabimus: quorum mentio in praxi nostra, vbi de motu deprauato egimus, in rigoris descriptione quoque facta est. Quæ id faciunt, vel materiam, quæ corpus sensim peruadendo concutiendoque rigorem efficit, per euacuationes diuersas diuertendo: vel sensum nonnihil, vt minùs irritationem partes sentiant, stupefaciendo: vel corpus subito in principio, antequam frigus & rigor superueniant, calefaciendo. Quæ tamen omnia cautè, & non prius (si modò non aliquid aliud, vti dictum, hoc vrgeat) nisi materia præparata & aliquo modo purgata sit, erunt administranda: & tunc primum ex vno aliquo horum, vel



euacuante, vel stupefaciente, vel alterante, vel ex inuicem commixtis, vti iam dicitur, præparanda.

Vicitus ratione seu nutrimentorum exhibitione, cum natura à causa morbi ad cibum coquendum reuocetur, sæpe fit, vt si largius ante paroxysmum comedant, ille impediatur: hinc vulgò, *Sie haben das Fieber abgeessen*/ Germ. dicere solent.

Euacuantibus idem, naturam aliò reuocando, in excretionibus sursum deorsumve factis, perficitur.

Per vomitum, quem in principio paroxysmi instituiamus, cum veluti revulsio quædam à venis meseraicis, è quibus materia ad cor euaporat, ad ventriculum fiat; paroxysmi impediri possunt: sicuti & hoc sæpe fit, vt cum per vomitum causa in ventriculum & intestina excutiat, non tantum paroxysmus impediatur, sed & febris, vti superius dictum, penitus sanetur.

Purgantia paulò ante paroxysmum horà ferè vnà exhibita, non tamen fortiora (quia cum ipsorum operatio in febris statum tunc incideret, & plurimum ægrum debilitaret, & dum deicere cogeretur, commoueret) sed leuiora, quæ potius sollicitando naturà quàm purgando reuellunt, eo modo, vt dictum, sæpe paroxysmos præcauent: quo nomine, agaricum, senam, aliàq; dant: quibus quædam alterantia ob causam dicendam addunt. Ex pluribus autem compositionibus, quæ hoc modo illud præstant, hæc vtiliora sunt.

Decoctum sequens: R. Epithymi, Thymi, Polypodij, Senæ, ana ʒ. j. flor. Borræg. p. j. fiat decoctio, coletur: Capiat per horam ante aduentum paroxysmi haustum, addendo interdum parum Vini. Hoc in quartana præsertim commendatur.

Vel puluis: R. Senæ ʒ. iij. Turbith ʒ. j. Piperis ʒ. j. Zingib. ʒ. ʒ. Cinam. Myrrhæ ana ʒ. ʒ. Sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, diuidatur in tres partes: Detur vna pars ante accessionem cum Vino albo.

Agaricus cum succo Fumariæ & Foeniculi datur ad ʒ. j. ab Helidæo.

Sunt qui Diagrydij ʒ. j. cum syr. Viol. ʒ. iij. permiscant, & ægrotanti, horà vnà ante paroxysmum instar castaneæ exhibent.

Mercurij puluerem cū Aceto fortissi. Theriaca & Saccharo in robustis exhibet aliqui.

Stupefacientia nonnihil, vti diximus, quia sensum partium minuunt, & interea sudores mouent, vti alibi dictum, ante inuasionem quoque eo nomine exhibentur.

Vt Theriaca ʒ. j. ʒ. vel paulò plus aut minus, cum Vino optimo data, ab omnibus, in perseverantibus febribus, laudatur. Aliqui eam cum vino Absynthite, vel aqua Cardui bened. vel Menthæ, vel aqua Ros. miscent. Cui alij Diatrion pipereon, alij Myrrham, vt Diosc. quoque addunt.

Sed & aliæ opiatæ, & Antidota, si comendantur: vt Panchrestum Nicolai, cum vino quoque exhibitum. Item Mithridatū, & cum liquore Cyrenaico, apud Glauconem.

Hyoscyamum in hepialis laudat Dioscor. dando folia tria vel quatuor. Seminis illius ʒ. j. cum Vino aromatico in principio paroxysmi exhibita, iterando bis vel ter, pro certo habetur præsidio.

Alterantia varijs modis exhibita paroxysmos quoque sistunt, intus forisq; admota: quibus & motus corporis iungitur.

Intrinfecus & calefacientia & refrigerantia vsurpantur.

Calida, quia statim corpus accendunt, frigus & rigorem, & sic primam febris inuasionem, arcere videntur, vnde nec calor postea, quem rigoris motus propellit, aut leuior saltem, sequitur. Sed & quia bonam portionem febrilis materiei, tenuioris præsertim, dissipant, calida illud præstare aliqui putant. Vti & si sudores mox moueant, hoc pacto quoque febrem præcipitant. Quæ tamen si vehementer calida sint, non statim in principio febrium, donec materia concocta sit, sunt exhibenda, ne absumptis tenuioribus materiis, crassiore manente, ex simplici duplex vel triplex fiat febris, vel in continuam transeat. Quod & in supradictis stupefacientibus, ex theriaca cum calidis illis permixtis paratis, obseruandum erit. Cæterum ex illis quæ calore operantur, hæc longâ obseruatione potissimum probantur.

Decoctum hoc: R. Zingib. ʒ. ʒ. Piperis ʒ. j. membranarū Nucum interiorum, seu nauicij ʒ. ij, bulliant in t. b. ij, Vini tiptici: de col.

fume 3.v. adde fyr. Viol. 3.j. Bibat horis duabus vel tribus ante accessionem : cooperiatur, & in lecto maneat & sudet.

Aliud: R. rad. Gentianæ 3.j. summit. Centaurij min. Serpilli ana ʒij. bulliant in Vino: Bibat haustum, vt supra.

Vel potio hæc: R. succi Calamentæ 3.ij. vel illius loco fyr. de Calamenta 3.j. ʒ. Detur cum Vino & aqua Borruginis.

Vel hæc ex aquis parata: R. aquarū Gentianæ, Centaurij, Plantag. ana 3.j. ʒ. Bibat: Multi ol. Vitreoli guttam vnam addunt.

Alia: R. Plantag. quam febrifugā vocant, recentis m.j. Acetosæ rec. M.ʒ. Aceti quart.j. Theriacæ quart.j. destillentur: Bibat huius aquæ 3.ij. dimidia horā ante paroxysmum.

Vel puluis mirè in omnibus febribus vti & pestilentialibus commendatus: R. Sacchari candi 3.ij. Zingib. 3.ij. Camphoræ 3.j. fiat puluis: Datur 3.j. cum aqua calida: hunc & Crato laudat.

Alter: R. pul. Cancerorū fluviatilium, cranij Humani, rasuræ Eboris an. ʒj. Cinam. 3.ʒ. Croci ʒj. fiat puluis: Detur ʒj. cum Vino.

Tertius: R. Myrrhæ ʒj. Piperis gr. vj. Zingib. ʒ. ʒ. Sacchari 3.ij. fiat puluis: Detur 3.j. vel ex eo fiant pilulæ cum succo Gentianæ.

Electuarium: R. Rubiæ trochif. Nicol. 3.j. detur cum Vino albo. Eodem modo datur electuarium ex Asa Mesuæi, Triomphyllon Nicolai, Elect. Petri Arnol. Villanouani.

Vel: R. Cinamomi 3.ij. Piperis 3.j. Croci 3.ʒ. Myrrhæ, Styracis, Serapini ana 3.ʒ. Benzoini 3.ij. rad. Gentianæ 3.ij. cum Melle fiat elect. Datur à 3.ʒ. ad ʒij. duabus horis ante paroxysmum.

Refrigerantia nonnunquam id præstant, & febrilem paroxysmum sistunt: sed cum magna refrigeratione vt id faciant sit opus, adeo subito cor refrigerare per assumpta, non ita tutum est, atq; si hoc externis perficiatur, vti mox dicitur.

Potu frigidæ affatim facto in ipso paroxysmo, vel extra hūc, multi paroxysmos sistūt, & dicunt cōmuniter, Das Fieber abtünchen.

Vinum Grætorum ad 3.ij. in principio paroxysmi si bibatur, & postea pullisbus vnguenta, vti dicitur, admoueantur, febres sanare potest.

Externa remedia febres curantia per exercitia, applicationes, iniectiones, amuleta, superstitiosaq; interdum, ad ministrantur.

Exercitiū si ita instituat, vt corpus ante inuasionē paroxysmi incalcescat & sudet, paroxysmos diuturnarū febrium nonnunquā sistit. Hoc autē, motu corporis, eundo, equitando, currendo ante aduentum paroxysmi, donec corpus incalcescat, perficitur.

Horum loco, si debiliores qui ambulare nequeunt, fricentur, & postea tegantur & calefiant, pannis aliisve artibus, nonnunquam etiam vti dicitur, vngantur, eaq; omnia, antequam frigus incipiat, fiant, vt rigor minime superueniat, efficere possunt.

Applicationes, illic vbi pulsus arteriarum sentitur, factæ, multum in hac re, vel solæ, vel vnā cum cæteris administratæ, præstare possunt, vt in vtriusq; carpi regione: interdum & in temporibus vtriusque, & pedibus iuxta malleolos. Hæc autem ex illis quæ vel materiam diuertere & reuellere à corde possunt, quod maxime acria præstant, parantur: vel alioquin ex illis quæ cordis intemperiem nonnihil mutant, & ne faciliè à vapore mox eleuando in paroxysmo inflammetur, veluti muniunt, & proin, & ex acribus, & temperatis, & nonnunquam refrigerantibus, quibus multa penetrationem iuvantia adduntur, vt virtus ad cor vsque peruenire queat, componuntur.

Adurens & vesicas eleuans, applicatum sic fiet: R. fol. Ranunculi, Pedis Columbini, recent. contundantur & applicetur cum Sale & Aceto.

Alia calefaciens: R. fol. Thlaspi contusa & similiter cum Sale & Aceto applicata.

Idem præstant Bursa pastoris, Dentillaria Rond. Ruta, Salvia, Calendula, Angelica, Vrtica, similiaque.

Vt hoc modo: R. fol. Sambuci, Rutæ, Calendulæ, Vrticæ ana m.j. contundantur cum Sale & Aceto: Applicentur.

Item: R. Allij, Cæparum ana q. f. contundantur & applicentur.

Minus calefacientia & potius nonnihil refrigerantia, sic sunt: R. Plantag. Sonchi ana m.j. contundantur, adde fuliginis Furni parum, Salis & Aceti q. f. Applicentur.

Vel hoc, quod maculam nigram parit, & erodit non nihil: R. corticum interiora Nucis ramorum, q. s. macerentur in Aceto, & applicentur: quo remedio feliciter sæpè vsus sum.

Panis item maceratus aliquoties in Aceto, pulsibus applicatus, prodest.

Remedium sæpè à multis cōmendatum, experiētiāq; crebrò comprobatum: R. vnguenti Populeonis portionem, subige cum telis Aranearum mundis: fiant pilulæ magnæ: De quibus duas brachijs, duas pedibus, duas temporibus cum folio Vitis ante inuasionem paroxyfmi applicabis: repetendo alijs quoque vicibus.

Inunctiones similem ob vsura sunt pulsum, spinæ & extremitatum.

Ad pulsus: R. succi Rutæ, Vrinæ pueri an. æq. partes, misce: Vnge vel laua omnes pulsus, paulò ante inuasionem paroxyfmi.

Vel: R. ol. Chamæmel. q. s. & in eo decoq; Araneas: inunge pulsus & spinam.

Spinæ inunctiones multum quoque præfertim ad rigorem compescendum, vti alibi dictum fuit, possunt: vt, R. olei Chamæmel. ℥. iij. Laurini ℥. j. de Castoreo ℥. ss. Araneas, Lumbricos an. n. x. teste Dioscor. aquæ Vitæ ℥. ij. coquantur ad aquæ vitæ consumpt. Inungatur tota spina.

Oleo in quo pastilli ex Anthemidis floribus parati, dissoluti sint, si febrientes à vertice capitis ad pedes inungantur, sanari docet Matthiolus.

Suffumigiū de merda Cati laudat quidā.

Anthemidem per Clysterem iniectam, alij probant.

Amuleta quàm plurima passim describuntur: Inter quæ & hæc à multis certa esse prædicantur. Araneā in nuce Auellana collo appensam; Vel Limacis lapidem: aut Iaspidem gestare: item Talpam manibus, donec moriatur, in ipso paroxyfmo retinere.

Superstitiosa, vt characteres certos, vel notas, aut scripta secum ferre, febrem carminibus pellere, lustrare; vendere, aliaq; incantamenta seu nugas, omittimus.

Reliqua priuata symptomata, quæ in febribus intermittētibz occurrunt, etsi suis singula locis in praxi nostra explicentur: tamen hic obiter quomodo dijudicanda, tra-

ctandaque sint, dum adhuc æger febricitat, explicandum.

Vigiliæ, & Capitis dolor propter euaporationes, si nimium infestent, vapores impedi-mus, & soporem conciliamus. Si sopor profundus accedat, & huius ratio habenda.

Sitis, Linguae ariditas, ob calorem & euaporationem maximè molesta sunt: quibus vti in alterantibus dictum, succurrimus.

Appetitum prostratum, euacuantia emendant, & morbi diuturnitas sponte corrigit, ita vt tandem omnino fiant in declinatione & cum conualescūt famelici, vt, ne nimium comedant, tunc potius cauendum sit.

Syncope in febribus syncopalibus, in primis prospiciendum. Et si syncope, bilis vitio, oris ventriculi causâ fiat, illius acrimonia infringenda: vt in ventriculi dolore dicitur: dein & roborantibus, vt in syncope dictum, muniendi.

Dolor ventriculi, si ab ille vitellina, vel porracea excitetur: vel à flatibus cum rugitu, aut ob potum nimium fiat: ille ijs quæ bilis acrimoniam retundunt: alter & roborantibus, & flatu discutientibus curatur.

Alii profluvium eiusdem bilis causâ sæpè accedit, quo nomine, si nimis vrgeat; ea quoque, quæ in dolore ventriculi diximus, adhibentur: & clysmata absterforia, quales illud, quod ex decocto Hordei cum Sacchari rubri ℥. ij. fit, existit, iniicienda.

Colicus dolor vnâ cum febre interdum inuadit, bile intestinis se insinuante, quo & sæpè, vt dictum, febre cessante relicta causâ, euenit, & vt in colico dolore in praxi dictum, curatur. A pituita vitrea in Lipyria febre, quam quoque ab eo humore prodire putant, colicum dolorem nasci scribunt: verum ab hoc humore frigidissimo febrem fieri minime posse, iam ostendimus.

Cachexia, Hydrops: Durities hypochondriorum, Oedemata crurum, in febribus diuturnis sæpè accidunt, ob viscerum internorum naturalium læsiones: quorum cura suis locis explicabitur.

Marcor corporis in declinatione, interdum ex atrophia: interdum propter incipientem hecticam, post acutas & duplices hæc febres, superuenit.

Parotis aliàs quoq; in quartana erumpit. Vermesq; quandoq; reijciuntur. Quibus singulis sua adhibentur remedia.

*Cōtinua putrida maligna febri cu- ratio.* Cōtinua putrida maligna solitaria febris, quæ epidemia plerunque, rariùs priuata est, quam German. propter insigne symptoma *Haupttve*/ alij simpliciter Malignam, Arabes Malè morigeratâ, Itali propter maculas Petechiam vocant, & Rond. quia omnes symptomatieas febres malignas censuit, Symptomaticam appellat: eandem curandi rationem, cū putrida nondum maligna ferè requirit. Quam & aliqui semitertianis sanandis, quia illas quoque malignas esse existimarunt, accommodarunt.

Prædictionem autem quod attinet, iisdem signis, quæ in putridis continuis prioribus descripsimus obseruatis, hæc facienda: Quæ tamen signa cū in putridis non malignis dubia sint, illarumq; iudicium sit incertum, hic cū simul adsit malignitas, longè magis ambigua erunt: cū hæc malignitas adeò cordi insidietur: vt sæpè etiam apparentibus signis concoctionis, æger nihilominus inopinatò extingatur. Dein & cū criticos illos motus natura, quæ hic magis adhuc oppressa est, non eo ordine, vt in non malignis, perficiat: si in illis dubiè, hic sanè longè magis cautè & ambigùè, de salute vel morte, ex prædictorum obseruatione, prædicendum erit. Inter quæ, maculæ interdum erumpentes pulicum morsibus similes, vel fuscae, Petechiæ dictæ, mortem plerunque propinquam denuntiant.

Curatio malignarum febrium, vti & in alijs simpliciter putridis, hoc modo perficitur. Vt de causa morbi, quæ & putrida & maligna simul est, quæ illum facit vel auget, aliquid euacuare studeamus: Caloremq; putridum malignum, ijs quæ non tantum refrigerant, sed & putredini, inprimis malignis eorum seminibus, resistunt, alteremus, Virium, quæ præsertim hic plurimum labefactantur, habitâ ratione: Vti & quorundam aliorum accidentium.

Euacuationes autem tam sanguinis quàm humorum aliorum, sequentibus modis vrsurpantur.

Sanguinis detractio per phlebotomiam,

scarificationes, vt in continuis putridis, consideratis iisdem quæ illic obseruari debere diximus, institui potest: inter quæ, vires, quæ hic statim labuntur, præcipuè sunt æstimandæ.

Humorum reliquorū expurgationes, eodem modo, vt in putridis alijs instituendæ: additis semper quæ malignitati resistūt: qualia etiam in malignis febribus, eethymata & exanthemata protrudentibus, describentur.

Per vrinas, sudores euacuantia medicamenta, vt in alijs quoque, locum habent.

Alterantia similia quoq; competunt. Exhibendo ea præsertim, quæ, præter quàm quòd refrigerant, putredini resistunt: vt sunt acida, additis semper cordialibus, illic quoque explicatis. Vti & externa, quæ hic quoque adhiberi possunt.

Vires etiam, obseruatâ victus ratione, consimili modo sunt conseruandæ, alijs medicamentis cordialibus: quæ cū in malignis citiùs & grauiùs quàm in alijs putridis offendantur, eò magis restaurantia exigunt. Ita vt Vinum acidulum refectionis causâ interdum illis permittatur.

Accidentia alia eadem ratione, vt & illic, corriguntur.

Pestilens febris seu pestis, cū sit morbus contagiosus, ab externa pestifera qualitate, de corpore in corpus, contagio, per contactum, vel etiam intermedio aëris, transeunte, procedens: Partim quâ ratione libet adhuc ab illa præseruari; Velea iam infecti curari debeant, explicandum.

Præseruatio autem, etsi seminaria pestis abscondita occultè alicubi lateant, nobisq; ignorantibus in corpus penetrent: tamen in causa externa declinanda, vel corrigenda, & corporis præparatione, ne faciliè ab ea afficiatur, perficitur.

Declinamus verò causam, Fugiendo potissimū loca illa, vbi pestis grassatur. Quod fiet, si, quatenus vocatio, pietas & honestas non prohibent, ægros non accedamus: nec ipsum vestes, tegumenta, aliavè, attingamus: domos, plateas in quibus decumbunt, vitemus. Et cū vbi nam causa hereat, ignoretur, multiq; semina pestis, vt dictum, secum gestare, etsi ab illis nondum afficiantur,

diu

*Pestilens febris præcautio et curatio*



diu possint: loca vbi magna hominum esse solet congregatio, in concionibus, consultationibus, & inprimis balnea publica, choreæ, vbi citius, vt mox ostendetur, hæc contrahuntur, fugienda. Et cum ab aliis quoque tam animatis quam inanimatis corporibus contagium hoc prodire possit: nihil tutius, quam vt vulgò fertur, citò & longè seu procul abire, tardeque reueri.

Emendamus causam illam pestilentem alicubi latentem, ne aliquè possit inficere, aut vt penitus quoque tollatur: Si ea quæ infecti attigerunt, integumenta, vestes, aliæque, aëri libero, antequam iis utamur, prius aliquādiu perflantia exponamus, & lauemus: quo nomine & pecuniam, pestis tempore, antequam in manus accipiat, aliqui prius abluere solent.

Plerique autem, aëris infectionem pestis causam statuentes, eum emendare student. Quod & nos, licet in corporibus semina pestifera potius, quam in aëre hæere, probauerimus, nō improbamus: cum iisdem quibus aër corrigitur, etiam corpora nostra, quæ aër continuo alluit, & per inspirationem subit, aëris correcti intermedio, alterentur, & præsertim cum & per aëris medium seminaria pestis de corpore in corpus, vt dictum, transferantur, hæc illius alteratio vim illius pestilentem retundere poterit. Quæ aëris alteratio & repurgatio variis modis sequentibus perficitur.

Inquinamenta primum omnia, & quibus aër impurus fieri, aut infici potest, auferendo, a sordidis, putridis, corruptis humoribus, corporibusve expirantia, & factorem exhalantia.

Et si aër purus, ficcus, qualis ab ortu vel occasu prodirin conclauiā, quæ homines inhabitant, intromittatur: aliis verò arceatur. Aues si in hypocauftis aut cameris alantur, aërem purgare scribunt, & præsertim passer: quos & circa loca, vbi pestis regnat, minime permanere, vulgus credit. Ignis luculentus accensus, aërem purgat: quo Hippoc. pestem grassantem cessare fecit.

Suffitus in locis publicis, priuatisque ex quibusvis odoratis facti, aërē corrigunt: Quo nomine ligna Iuniperi, quod præ cæteris consuetum, plerunque accenduntur. Et po-

morum cortices ficci in hypocaufto vrantur, reliquaque eiusmodi sicca, vt Sabinæ lignum, baccifera præsertim, quod admodum odoratum est, vel Lauri, Rosmarini, Viticis, vsurpari possunt. Ignisque qui in foco accenditur, ex ligno Quercino, Vitium, Salicum, iniecta ruta, funipero, aliisque parari potest.

Carbonibus ardentibus baccas Iuniperi suffitus causā vulgò imponunt, vt & Mastichem, Thus, Succinum, Caryophyllos, aliaque innumera: quæ si vrantur, gratum odorem spirant.

Trochisci sequentes in eum vsum parati idonei sunt: R. Benzoini, Styracis cal. an. 3. β. ligni Iuniperini, vel Sabinæ baccifera 3. j. rad. Angelicæ 3. j. cum infus. gummi Tragac. in aqua Ros. addendo Moschi gran. aliquot, fiant trochisci pro fumo.

Vel fiant candelæ, quæ ignem concipientes, fumum, donec consumantur, reddunt: R. Myrrhæ, Thuris an. 3. ij. Benzoini, Styracis an. 3. iij. Ladan 3. j. β. Succin 3. β. baccar. Iuniperi 3. ij. cort. Pomorū sicci 3. j. cort. Citri sicci, Santal. citrin 3. β. ligni Iuniper. 3. j. lig. Aloës, Caryoph. an. 3. j. carbonum Salicis vel Tiliæ ad duplum ponderis, cum inf. gummi Tragac. addendo Camphoræ gran. vj. vt fiant candelæ nigrae, seu aues cypriæ, vt vocant.

Odoramenta non accensa, sed per se bonum odorem spirantia, hoc modo fiunt. Si odoratos flores & herbas, inprimis Rutam, mala Citria, Limonia, Arantia & similia, vel seum quis gesserit, vel cubiculum illis odoratum reddat.

Item si spōgiam, vel lintheum pannum ex Aceto & Aqua rosacea, vel Aceto rutaceo madefacta gesserit, naribusque sæpè adhibeat.

Vel hoc modo: R. Rutæ contusæ p. j. affunde Aceti optimi portionem aliquam, & succum exprime, cui adde rad. Angelicæ 3. β. Camphoræ, Croci an. 3. β. hæcque spongia ad vsum dictum excipiantur.

Vel hoc balsamo, vt vocant, alas narium, aut labrum sub naribus inungat. Quod fit ex oleo seminis vel rad. Angelicæ, per destillationem eliciti cum Cera alba: subigatur, vsurpetur.

Poma odorata manibus gestare quoque

conducit: R. rad. Angelicæ, Myrrhidis ana 3.ij. Zedoariæ 3.ß. Ros. rub. 3. j. Lauand. 3.ß. feminum Angelicæ, Nigellæ, Coriandri an. 3. j. f. Ocimi 3.ß. corr. Citri sic. 3. ij. nucis Mosc. Caryoph. an. 3.ß. Cinam. ligni Aloës, Iuniperi, Santal. citri, an. 3.ij. Ladani, Styraeis cal. an. 3.ß. Benzoini 3.ij. Myrrh. 3. j. Camphoræ gran. vj. cum infus. gummi Trag. facta in aqua Angel. vel Ros. fiat pomum. Odoratus fiet, si parum olei Caryoph. vel sem. Angelicæ permisceas, & in superficie bombace Moschatâ inuoluas.

Faciem, manus, axillas, pudenda, odoratis lauare utile quoque est, veluti Aceto simplici vel rosaceo: aquis item Rosarum, Angelicæ, Lauandulæ, addendo aliquid Camphoræ: vel florum Citrangulorum, quam aquam *Nasse* vocant.

In aures immittit olea destillata aromaticum odoratorum Droëtus.

Vestes vapore vel suffitu odorato perfumare, velaquis irrorare iam dictis, aut alijs additis odorem conciliare, prodest. Vel si cheirothecas perfumatas, vt vocant, odoratas induant, & gestent, aut sacculos in sinu ferant. Qui ex pulueribus Cypri, Viol. appellatis, alijsq; permultis similibus paratur.

Vel hoc modo: R. rad. Angelicæ 3.ß. rad. Ireos od. 3.ij. feminis Coriandri, ligni Iuniperini an. 3. j. Benzoini, Styracis an. 3.ij. fiat puluis, addendo Mosc. vel Ambrâ, si velint.

Corpora autem ne faciliè hac lue inficiantur præseruabimus præcipuè, si ne accendantur admodum, aut humores in ijs vehementer commouéantur, caueamus. Et repletio, & impuritas in illis vitetur & emendetur. Si prophylactis, quæ pesti aduersantur, ipsa muniamus.

Ne corpora itaq; incallescant nimium, eo tempore, dum pestis viget, sibi homines cauere debent: cum supercalefacta facilius vti febrem, sic & qualitatem hanc malignam hauriant.

Aërem igitur calidiorem, arte calefactum, vt in hypocaustis, qui nimium incaluit, vitent. Et in primis illum, qui in balneis siccis illos inflammat: vnde plerosque tempore pestifero, si tunc ijs vtantur, peste correptos obseruauit.

Motus quoque nimius corporis, qui cursu, saltu & in choræis præcipuè obitur: vel animi, per iram, gaudium, vehemens commotio, eo quoque nomine obest.

Vti & assumptorum calidiorum, vt aromaticum & potus, in primis vini meracioris, immodicus & frequens vsus. Quæ proin tunc temporis, acidis frigidisq; corrigi, corpusq; eiusmodi potius alterari debet.

Agitatio humorum, quia facilius illis commotis corpus ab externis causis afficitur, nocet. Vnde & metus, vt citius qui pestem metuunt, minus qui animo quieto sunt, eâ corripiantur, facit. Imaginatione tamen hic quoque (quæ vt vulgò fertur, facit casum) plurimum opitulante. Sed & Veneris vsus eo nomine improbatur. Atq; intempestiuè, vel nimium sanguinem detrahare, vel purgare, nocuum.

Repletio tamen omnis & vitanda, & si adsit, corrigenda erit; nam licet quælibet corpora pestem suscipere possint, facilius tamen plethorici & cacochymici inficiuntur. Ob quam causam corpora pura seruare, & si immunda sint, euacuantibus munda reddere oportet: hoc modo.

Venæ sectio, etsi non temere, ne humores turbentur, præsertim in iunioribus, qui magis pesti sunt obnoxij, facienda sit: si tamen corpus plethoricum sit, in adultis, & præsertim, si huic assueti sint, iuuabit.

Clyster, si prauis abundant humoribus, alternis diebus iniectus, probatur.

Purgatio in cacochymicis, si modo non nimium corpus exagitet, conuenit. Tum ea, quæ in consuetis, veris & autumnî tempore, præparatis prius humoribus redundantibus, biliosis, vel pituitosis, vel melancholicis, posteaque expurgatis, instituitur. Tum ea, quæ successiuè vt corpus purum seruerur, sæpè purgamus, ex leuioribus tamen parata. Quibus si ea, quæ pestiferae qualitati resistunt, putredinem arcent, addamus: præstantiora erunt.

Inter pilularum forma, cum amara, vt aloën, quæ optima est, recipere possit, primas tenet, eoq; nomine pilulæ Pestilenciales, vel Communes, alias de Tribus, vel Rusi ab auctore appellatæ, tantopere commendantur.

Quorum vetus hæc est descriptio: R̄. Aloës, Ammoniacy, Myrrhæ, æquale singul. pondus: cum Vino fragranti formentur.

Neoterici sic eas parant; R̄. Aloës 3. j. Myrrhæ; Croci ana 3. β. cum Vino odorato: vel, in calidioribus naturis, cum succo Limonium vel Citri fiant pilulæ. Quibus prophylactica varia permisceri possunt.

Efficaciores ad purgandum, addito Rhabarb. vel Agaric. hoc modo fiunt: R̄. Aloës 3. ij. Rhabarb. Myrrhæ ana 3. j. Zedoariæ, Croci an. 3. j. cum succo acetos. Citri vel Limonium fiat massula.

Vel: R̄. Aloës 3. iij. Rhab. puluerizati, aspersi aquâ Cin. 3. j. β. Agar. troch. 3. j. Myrrh. el. gummi Ammoniacy dissoluti in Aceto an. 3. ij. Croci 3. β. Camphoræ 3. j. olei rad. Imperat. gutt. ij. cum Aceto subigantur.

Quibus hisce leuioribus, frequenter, vt hebdomadatim semel vel bis vti possunt, & 3. β. vel 3. j. vel pil. j. manè, vesperi alteram sumere: quæ & infantibus, si illas deglutire possent, essent viles.

Hisce paulò fortiores in magis cacochymicis, sed rariùs tunc vsurpari possunt: Vt, R̄. priorem Massam cum rhabarb. & agarico, addendo pilul. Aggregat. 3. j. Diagridij 3. j. cum syr. Ros. sol. fiant pilulæ.

Ex Terebinthina, loco pilul. Rufi, veteres pilulas exhibuerunt: cuius loco si illa desit, nos resinam Lariceam æquè vtilem, cum egregiè purget, hoc modo substituere possumus: R̄. Terebinthinæ resinæ, vel Laricæ coctæ, vt puluerizari possit. Rhabarb. optimi irrorati aqua Cinam. an. 3. ij. Turbith. 3. j. Zingib. 3. β. cum puluere Liquirit. fiat massa. De qua 3. j. vel plus, si eas purgare volumus, dabimus.

Dilutum ex Terebinthinæ vel Laric. 3. j. cum vitello oui, & aqua Cardui bened. factum, loco pilular. datum, egregiè purgat.

Potiones variæ in hunc vsum parari possunt hoc modo: R̄. Triph. Persicæ (quam plurimùm Mesues laudat) ab 3. β. ad 3. vj. aquæ Acetos. Scabios. Cardui ben. q. s. misce: Capiat singulis quinque diebus talē potione.

Infantibus, Manna in iusculo dissoluta dari potest, vel rhabarbarum hoc modo: R̄. extractum Rhabarbari, misceatur cum suc-

co Ros. & cum Saccharo, dissoluatur in aqua Acetosæ, reducatur in tabulas. Conditum Rhabarbari pro pueris Droetus parat.

Antidota multa prophylactica, atque inter illa opiata quoq; quibus Rhabarbarum præsertim, nonnunquam & Tryphera admixta, descripta sunt. Quæ tamen, cum non tanquam purgantia, sed quatenus antidota, composita sint, eò potiùs referenda erunt.

Fortissimè purgantia in summè cacochymicis probantur, & pro expertis habentur: qualia ex diagrydio, colocynthide, rad. cucum. as. terra Armenia, stibio, quod & magnis compositionibus aliqui miscuerunt, & similibus, parantur.

Vt puluis hic: R̄. trochisc. Alhand. Diagrydij, Turbith an. 3. j. Euphorbij 3. j. Mastichæ 3. β. Croci 3. j. radic. Serpent. Pimpinellæ, an. 3. β. fiat puluis: Capiat 3. β. cum aqua aliqua conuenienti.

Vel electuarium hoc: R̄. rad. Cucum. agr. Apij, Coriandri, Semperuiui foliorum, terantur simul: adde Mellis q. s. & Piperis parum, fiat electuarium, instar auellanæ vsurpandum. Quod miris laudibus, & ad præcationem, & curationem pestis, ab Honorat. Castellano extollebatur.

Prophylactica, quibus corpus, ne faciliè inficiatur, præparatur, multa sunt, experientia potiùs, quàm ratione inuenta: cum antidota vera, quæ huic veneno resistent, minimè, vti neq; huius qualitatis pestiferæ vera natura, cognoscatur. Idcirco cum certa, quæ huic pestifero veneno aduersentur, ignorentur: quæ in genere venenis resistunt, hic quoque vsurpantur. Quorum præcipua tantùm & à multis diu probata proponemus: Atq; quatenus ea vel sumuntur, vel saltem in ore tenentur, vel extrinsecus pulsui, cordis regioni, adhibentur, vel alioquin pro amuletis habentur, primùm distinguemus.

Quæ assumuntur antidota, cum præter proprietatem illam, quâ venenis resistent, alia in super sint vehementer calida, alia minus, alia frigida potiùs quàm temperata, habitâ ratione ætatis & constitutionis, hæc illæ potiùs eligenda, nec temerè quæuis, calidissima illa præsertim vt euphorbiû & aqua vitæ, quas finitè vsurpatas aquas mortis nō.

nunquam faciunt, iunioribus potissimum exhibenda. E quibus quædam in forma liquida dantur, quæ cum diu asseruari nequeant, cum magna urget necessitas, & aliæ quæ ad usum parantur, non sunt ad manum, illis præsertim, qui in ædibus infectorum habitant, vel illos accedunt, propinantur. Qualia sequentia sunt.

Decoctum hoc: R. rad. Torméillæ, Pimpinellæ an. 3. j. rad. Valerianæ 3. β. rad. Enulæ, Angelicæ an. 3. ij. fol. Galegæ; Sanguisorbæ ana M. j. decoquantur in Vino & aqua, addito pauco Aceto & Croco.

Vel vini infusum, quod magis ingrata & amara ferre potest: R. rad. Tormentil. Diastamni, Succisæ, Pimpinellæ an. 3. j. β. rad. Valerianæ, Imperatoricæ, Angelicæ an. 3. j. rad. Serpent. Gentianæ ana 3. β. fol. Cardui bened. sem. Coriandri an. 3. j. Cinam. ij. inciduntur & infundantur in Vino albo & pauco Aceto, vel Vino: Bibat sæpè manè.

Lac ouillum ieiunè bibitum, mirè à quibusdam ad præseruationem commendatur.

Succi nonnunquam in condimentis, & præsertim acetariis, acidi exhibentur: veluti Acetum ipsum: vel succus ex pomis Citranguli, succus Ribes, Crespini, Vuæ crispæ, Puniceorum, Cerasorum, Prunorum, Pomorū.

Item Caryophyllorum hortensium florū succus, seu potius acetum, vt parant Germani, Galegæ succus cū Theriaca datus à Matthiolo, Verbenæ succus cū Vino vel brodio, Ceparum itè succus, variis modis exhibitus.

Quæ asseruari diutius queunt prophylactica, cum pestis, vbi semel regionem inuadit, diu soleat subsistere, & proin semper ad usum præsto esse debeant, variis formis hoc modo idonea sunt.

Succi inspissati, quos Rob' Arabes, nostri Extracta vocant, ad hanc rem ex efficacioribus, vt Carduo benedicto, Verbena, aliisve, vtiliter vsurpantur. Iuniperi extractum valde consuetum est & vile, quod & infantes, cum ingratum minimè sit, admittunt.

Syrupi quoq; addito Saccharo, vt gratiores sint, præsertim infantibus, sic parari possunt: R. Verbenæ, Scabiosæ, Galegæ an. M. j. gran. Iuniperi p. j. decoquantur in Aqua & pauco Aceto, addito Saccharo, fiat syrupus.

Vel succi Granat. succi Limonum, ana 3. β. Aceti Ros. 3. ij. aquæ Ros. 3. iij. Sacchari q. s. fiat syrupus.

Conseruata, per se nonnunquam siccata, alias saccharo, melle, aceto, sale, aliisve permixta, aut aliter cōdita, præcautionis causâ manduntur.

Vt Zedoaria incisa, manè comesta: vel cū Vino bibita.

Vel Caryophylli, in Aceto prius macerati. Citriorum, Arantiorum genera, per se, vel prius condita, mansa.

Verbena, manè comesta.

Torméillæ radix, cum rasura Cornu cerui, & Aceto sumpta, vel Saccharo cōdita. Vri & Pimpinella.

Acetosa, Buglossum, Borrago, & radix Tappi barbati, eodem modo præparata.

Radix item Petasidis, in Aceto macerata, & rad. Myrrhidis.

Baccæ Iuniperi, in Aceto maceratae.

Vel permixta hoc modo: R. fol. Rutæ, Saluæ, Plantag. baccas Lauri, contunde cum Aceto, misce: Comedant manè cochlearnum: cui Bolus interdum additur.

Remedium ex nucibus vsitatum, de quo manè toti familiæ datur, hoc modo paratur: R. Nucum nucleos, folia Rutæ & grana Iuniperi, confusa & cum Aceto permixta.

Aliud ex iisdem Apollonij, vel Mithridatis, vt volunt à multis laudatum præsidium: R. nucleorum Nucum 3. iij. Caricarū ping. 3. iij. fol. Rutæ sicc. 3. ij. subige cum Aceto & Sale, vel Melle, si magis dulcibus delectatur.

Compositum magis sic fieri potest. Si supradictæ compos. addatur rad. Tormentillæ, Pimpinellæ an. 3. β. Boli præp. 3. vj. Croci 3. j. & cum Aceto, & Sale, & Melle subigatur. Exsequentibus pulueribus aliqui huic compositioni quoque addi possunt. Et Myrrha à quibusdam additur.

Confectiones variæ prophylacticæ ex pulueribus, & aliis omnibus simul mixtis, in forma tragematum, vel tabularum, vel electuariorum, fiunt. Quæ primùm, quatenus temperata, & gratiora, odoratoraq; vel ingrata, aut narcotica simul sunt, distinguuntur.

Temperatiores confectiones, minusque





quod tamen ob foetorem non nisi magnis compositionibus & parua quantitate, vt in theriaca fieri videmus, addendum erit.

Opiata antidota in vsu præcipua sunt, quæ tamen si nimium fumantur, propter opium tandem lædere possunt.

E quibus vsitata sunt, Theriaca, Mithrid. & inprimis antidotus illa magna Matthioli.

Electuarium de ouo valde probatur. Quod rectius, ne aduratur, sic parabitur: R. vitellum vnius Ovi, coctum ad duritiem, cui adde Croci contriti æquale pondus, agitenturque probe simul: addendo dein pulueris rad. Tormentil. Dictamni an. 3. β. rad. Angelicæ 3. j. rad. Vincetoxici, Succisæ, Zedoariæ an. 3. ij. sem. Erucæ 3. j. Myrrhæ 3. j. Theriacæ, Mithrid. optimi an. q. s. ad formandam massam fatis duram. Cuius 3. j. cum Aquis, Vino, vel Aceto propinatur.

Electuario sequenti An. 82. feliciter vsi sumus: R. rad. Angel. Imper. an. 3. ij. rad. Tormentillæ, Carlinæ, Vincetoxici, Pimpinellæ, Morsus diaboli, Phu veri an. 3. j. Zedoariæ 3. β. gran. Iuniperi 3. ij. bacc. Lauri 3. j. feminum Angelicæ, Acetose, Cardui bened. an. 3. j. f. Citri mund. 3. β. fol. Rutæ, Cardui ben. an. 3. j. Croci Piperis, Maceris an. 3. β. rasuræ cornu Cerui & Eboris an. 3. j. Boli præp. cum succo Citri 3. β. Opii 3. j. fiat puluis, adde Camphoræ 3. β. nucleorum Nucum rec. Ficuum an. 3. β. Sacchari finissimi 3. ij. Mellis 3. xij. fiat electuarium. Ad tabulas formandas cape 3. j. pulueris, ad 3. j. β. Sacchari, cum aqua conuenienti dissoluti.

Quæ prædictæ omnes compositiones, vel per se vsurpantur, de quibus illis manet aliqua portio sumitur: vel alijs permixtæ in nouas formas rediguntur.

Veluti ex mithridato communes hæ tabulæ sic fiunt: R. Mithridati 3. β. Sacchari candi & communis puri ana 3. iij. cum Vinum maluatico fiant tabulæ.

Vel electuarium excellens hoc modo paratur: R. Theriacæ optimæ 3. iij. rad. Tormentil. feminum Iuniperi, Cardui ben. Acetose an. 3. ij. Boli præpar. 3. β. ras. Eboris 3. j. Coralli 3. j. β. sp. Diamarg. frig. 3. j. cum syr. de acetos. Citri fiat electuarium: Capiat per se, vel cum Aquis, aut Vino.

Sed & supradictis confectionibus varijs, vel speciebus prophylacticis si Theriaca addatur, opiata sunt. Quibus & ingrata, & alia supradicta misceri possunt, & omnia veluti in vnum congeri.

Aquæ stillatitiæ prophylacticæ, quia omnes sudorem mouent, & ob id expulsiuæ dictæ sunt, in curatione pestis recensentur: vbi omnis generis tam prophylacticæ, quàm curatiuæ, & vtrique præstantes explicabuntur.

In ore tenenda quædam quoque præcautionis causæ sunt, sic enim, cum per aërem attractum pestem corpus subire existimant, eum quasi in ipso ingressu corrigi autumat. Quod tum maxime cum in publicum prodeunt, vel loca suspecta, & inprimis cum ægros adeunt, erit faciendum.

Ex simplicioribus, Angelicæ radix, ore retenta, valde iuuat, & bonum odorem simul ori conciliat. Vti & Zedoaria eodem modo efficax, Enulæ item campanæ radix, & Galanga, Citri cortex vel Arantiorum, & femina illorum, Fœniculi semen aliqui similiter cōmendant. Reliqua inodorata vt Verbena, quæ valde probatur, Tormentilla, Pentaphyllum, vel ingrata, cum difficulter diu in ore retineri possint, omittimus.

Trochisci vel formulæ, vt in ore hanc ob causam contineantur, frequenter parantur. Quæ nos, omisis multis inodoris, ex odoratis potius & validis, permiscendo grata quoque quædā, si illa simul deglutire debent, hoc modo componimus: R. rad. Angel. 3. ij. Ireos 3. j. Zedoariæ 3. β. cort. Citri sicci, f. Coriandri an. 3. β. Caryoph. Nucis mosch. Santali citri, an. 3. j. Cinam. 3. ij. Boli Arm. præp. cum succo Limonum, vel Aceto 3. j. β. Sacchari 3. vj. cum inf. gummi Tragac. in aqua Ros. addendo gran. j. vel ij. Moschi, vel Ambre, fiant trochisci, vel morselli.

Alij faciliores & grati: R. rad. Angelicæ 3. j. ligni Iunip. 3. β. lig. Aloës 3. j. Sacchari 3. β. cum infus. Moschata fiant trochisci.

Myrrham aliqui solam in ore tenent, vel alijs permiscunt: sed quia valde ingrata est, si eam alijs permisceamus, moschum, cuius odorem tunc euincit, possumus omittere.

Moschati trochisci simplices ex solo Saccharo & Bolo fiunt.

Externa remedia, varijs applicantur partibus.

Cordi autem præcipue, quæ pulsantibus arterijs in carpo & alibi, & cordis regioni admoventur, & cum nisi cor pestiferâ illâ qualitate afficiatur, pestem minimè contrahat, nec febricitet, plurimum profunt. Proin cordialibus applicationibus, & venenatis quoq; cum venenum venenum pellere credant, vt dicetur, muniunt.

Cordialia autem in forma sacculi vel vnguenti, vt hæreant diutius, cum epithemata mox siccentur, potissimum administrantur.

Sacculus itaq; ex odoratis efficacibus (omittentes ea quæ forinsecus inutilia sunt, vt lapides) sic poterit fieri: R. flor. Cord. an. P. j. Anthos P. ß. fol. Scordij, Maioranæ, Melissæ an. M. j. radic. Angelicæ 3. ß. cort. Citri ficci 3. ij. rad. Ireos 3. j. feminum Acetose, Coriandri an. 3. ij. f. Ocimi 3. j. f. Citri, Santali citr. ligni Aloës, nucis Mosc. Materis an. 3. ß. Croci 3. j. fiat puluis, E quo sindone excepto, & cum bombace interpastato, sacculi formantur: Quibus Moschum vel Ambra addi possunt.

Illinuntur pulsuum & cordis sedes varijs modis. Veluti ex aceto ad id parato, hoc modo: R. rad. Angelicæ 3. ß. fl. Cord. Caryoph. hortensian. P. j. cort. Citri 3. vj. Croci, Camphoræ an. 3. j. fol. Melissæ, Cardiacæ an. M. j. Theriacæ 3. ij. misceantur, affunde aquæ Rosar. q. s. permiscendo quartâ partē Aceti ros. Hoc aceto pulsus, nares & cor inungantur.

Vel sequenti linimento: R. Theriac. opt. 3. ij. vnguenti Nenuph. citrini 3. iij. sp. Cord. 3. ß. succi Limonum q. s. fiat instar linimenti.

Aut balsamò hoc odorato: R. ol. Caryophyll. ol. feminis vel rad. Angelicæ per destil. ana gut. v. Cerae albæ parum, addendo paululum Moschi. Arteriæ pulsantes inungantur.

Vel sequenti: R. succi Cardiacæ, Melissæ ana 3. ij. Camphoræ dissol. in aqua Vitæ 3. ß. Croci 3. j. Mellis parum: Fiat pro pulsibus linimentum.

Venenatâ, quæ cor à pestifero veneno munire existimant, non solum ab empiricis, sed & à doctis quibusdam mirè commendantur, quæ tamen alij improbant.

Ex scorpionibus oleum, Matthiolus vehementer extollit. Quod minori labore sic parabitur: R. olei Scorpionum rectè parati 3. ij. Theriacæ 3. j. misce: Et pulsuum regio inungatur, vel cum ægrè misceantur, cum panno applicentur.

Huic Rhabarbarum aliqui permiscentes, præstantius reddi credunt: quale oleum Scorpionum Clementis existit.

Ex arsenico aliqui tabellam hanc paratam magnis laudibus efferunt: R. Arsenici crystallini & rubri an. par. æq. fiat puluis, excipiat albumine Ovi, vel mucilag. Tragac. fiat tabella spissa: Quæ serico duplici inuoluta, in cordis regione gestetur.

Nonnunquam & pulueribus cordialibus arsenicum permixtum, hoc modo gestatur: R. lap. fragm. Præciosorum, Coralli, Marg. cornu Cerui vsti an. 3. j. Ireos 3. ß. Croci 3. j. Arsenici albi 3. j. Auripig. 3. ß. fiat puluis pro sacculo, cui parum Ambra quoq; additur.

Bufonis exiccati puluerè ad 3. ij. magno, vt inquirunt, successu aliqui permiscunt.

Hepar, si vnguentis illud roborantibus & refrigerantibus vngatur, corpus à peste magis tutum reddere, aliqui existimant.

Emissaria, vt alas, inguina, alij Aceto cum Benzoino, Syrace, Ladano, & Lithargyrio fricare docent, & pro secreto habent.

Vlcera externa casu vel caustico inducta, si adsint, & aperta eo tempore, dum pestis viget, diu feruentur, præcauere corpora quoque censetur.

Cauterium in brachijs & tibijs, si illis qui cum ægris versantur, actu vratur, vel potentia inducatur, eos præmunire creditur.

Scrotum monachus quidâ Lugd. An. 64. peste regnante, perforabat, vulneriq; radic. Hellebori, sicuti equis in morbo Hunschæ fieri solet, infigebat, sicq; viros à peste tutos fore pollicebatur.

Amuleta, Periammata dicta, magni quoque sunt. Vt Auellana perforata eousq; vt nucleus eximi possit, repleta Argento viuo, obtrurataq; & in collo suspensa: quod mirè iuuare, à Marfil. Ficino, exemplis adhibitis, probatur. Quam aliqui appensam, ita vt cordis regionem attingat, esse volunt.

Idem Saphyrus, Hyacinth. Smaragdus, Vnicor-

Vnicornu, Ebur, collo gestata, vt nudum pedus attingant, præstare putantur.

Sicuti & Pentaphylli, Dictamnique radices, Betonica item cum radice si manibus gestetur.

Curatio febris pestilentialis, variis modis à Practicis, prout eam ab hoc illòve humore natam existimant, instituitur, illiq; euacuando scopos accommodant. Nos verò qui eam à pestifera qualitate corpus inficiente natam ostendimus, huic magis propellendæ & alterandæ medendi scopum accommodamus. Etatis interim, & an mulier grauida sit, cū illis quoq; insidietur, vt & infantibus & iuuenibus, ratione habita.

Prognostico tamen prius præmissio, cū periculosa sit omnis pestis, eaq; plures semper extinguantur, quàm euadant. In quā nisi viginti quatuor horarum spacio natura venenum totum, vel præcipuam illius portionem à corde extrorsum, vel aliò, vbi minùs nocet, propellat, nulla amplius spes, irritaq; Medici opera erit. Maculæ si appareant, cū per illas nulla fiat critica, vt putarunt, expulsio, plerunque lethales sunt, mortemque iam imminere prænuntiant. Bubones quo plures erumpunt, & anthraces, sanari eos citius posse spem aliquam faciunt. Virium subitanea & magna prostratio, Syncope præsertim superueniens, Extremorum frigus, promalis signis habentur. Si mulier grauida, peste correpta abortiat, vt ferè fit, plerunque moritur.

Curatio autè, vel à natura sola, cū multi sanentur, vel Medici operà adiutà, perficitur. Quam, Morbo pellendo, Viribus seruandis, & Symptomatibus corrigendis, accommodamus.

Morbum, qualitatem venenatam, cordi & per consequens vniuersi corporis partibus similariibus, vnà cum calore febrili præternaturali, impressam esse diximus. Cuius causâ qualitatem hanc pestiferam à corde, & humores quoque, qui febrem augent, euacuare primum studemus. Simulque venenatam illam vim alterare, eamque alexipharmacis, vt minùs noceat, retundere. Et caloré quoque mitigare. Quod & simul & separatim variis modis tentatur.

Euacuancia autem hoc venenum, illudq; à corde reuellentia, humoresque febrem augentes expellentia, hoc ordine, hisce modis, vsurpare debent.

Sanguinis detractio per phlebotomiam facta, primum consuetumq; remedium esse solet, cū per eam magnam veneni pestiferi copiam educi posse, plerique sibi persuadeant. Verum in iuuenibus ante ætatis tempus maturum eam minimè faciendam esse generalis est regula. In grauidis quoque, præsertim in pede, vbi alias, vt dicitur, fieri solet, propter metum abortus, tutò minimè fit. In reliquis verò, quomodo ad pestiferam illam qualitatem à corde reuellendam, vel è corpore vnà cum sanguine educendam, cū in eo minimè contineatur, prodesse queat, non video; cū per eam, venis inanitis, vt lues hæc extrinsecus corpus subiens, spiritusque mox afficiens, magis introrsum rapiatur, potius promoueatur. Dein & naturæ motus, quo statim in prima inuasiōe per sudores & externas pustulas, bubones, extrorsum venenum nititur excutere, sanguinis hac pfusione impediatur. Viresq; tunc, quas hic ad propellendum illud venenum necessarias, omnino cōseruare debemus, labefactentur. Neque sanguinis detractiōe ad causam morbi educendam, vel euentilandum calorem, qui hic adeò magnus non est, tantum emolumenti, quantum ferè nocumenti, ob causas dictas, accidit. Vnde magno mortalium malo, non obseruatis hisce, vt neque aliis circumstantiis, nisi quòd ætatis sola habita ratione in iunioribus eam negligunt, in aliis omnibus, mox, siue morbus sudorem, bubonem, anthracem proferat, vt ferè in prima statim inuasiōe fit, mox in principio venam aperiant, sanguinemq; copiose sinunt effluere, & in omnibus, etiam si videant plerosque nihilominus mori, hoc remedij genere inconsideratè vtuntur. Quod tamen non, nisi consideratione omnium diligenti factâ, tentare, & tunc tantum vsurpare deberemus, quando febris pestilens corpora summe plethorica, vel cachectica inuadens, febrem in illis, ob copiam sanguinis, vel putredinem, quæ simul accendit, non simplicem, sed synochum



chum, vel putridam facit, cuius causâ postea vena secta, si sanguinis copia vel putredo nonnihil tollatur, mitior febris euadit, tolerabilioraq; profert symptomata. Quæ tamen, vel tunc quoque parçè, virium causâ, fieri debet: & si illæ statim in principio prostratæ sint, nec tunc, etsi iam dicta repletio cam requirat, facienda. Sicuti & experientia plures ex adultis venâ non sectâ, quàm eâ apertâ, euasisse toties comperimus. Licet aliqui extremum ex ea facientes remediû, tam copiosâ sanguinis emissionem factâ, vt animi inde sequeretur deliquium, se multos liberasse fateantur, & nullam aliam, nisi vehementem sanguinis detractionem probent.

Nos verò minùs peccari, si ea omittatur, quàm temerè vsurpetur, putamus: & si fiat, ratione febris aliquid potiùs, quàm pestiferæ qualitatibus, opitulari: cum ea non in sanguine consistat, sed extrinsecus adueniens cor subito occupet, neque ab eo per hanc possit reduci, aut expelli, existimamus. Tempus autem, si hæc fieri debet, conueniens, mox illius erit principium: in quo nisi ante diem naturalem absolutum, hoc est, intra viginti quatuor horas fiat, postea non amplius conueniet, sed naturam tantum impedit. Quo tempore si sudor adsit, vti ferè accidit; donec ille perficiatur, differenda: nec enim ille villo modo, vel sanguinis effluxu, vel motu corporis, seu denudatione, quod dum vena secari debet requiritur, impediri debet; sed tunc primùm postquam sudauit, & nonnihil refocillatus est, vel cibo, vel medicamento paululum æger, vena, si necessitas exigat, mox est aperienda. Quod & ante sudorem, si ille non mox adsit, fieri potest. Nec hîc in alui laxatione, quæ aliàs venæ sectioni præmitti solet, cum tempus non tam diu det inducias, tardandum. Vena autem communis aliqua, si nil appareat: si verò dolor alicubi sentiatur, vena lateris dolentis eligitur. Si eruptio circa inferiora, vt in inguine circa pudenda fiat in pede vena malleoli, saphena dicta, vel pedis aliqua insignis eiusdem lateris, aperitur. Si in superioribus, vena brachij, vel manus eiusdem lateris: vbi etiam priuatim, si sub a-

xillis sit, basilicam, si circa aures, vel axillam, cephalicam secant: sed & in facie si aliquid appareat, sub lingua venam tundunt. Dein & anthraci, vel bubonibus apparentibus, cucurbitulas aliqui, priùs antequam venam secent, imponere iubent, vt venenum eo loco, per naturam expulsum, maneat, neq; per venæ sectionem ad interiora reuocetur: quo nomine & sicuti supra dictum est, venæ sectionem plerumque plus nocere quàm iuuare comprobauimus. Verum sunt & qui venenum per venæ sectionis factum vulnus elici posse credentes, postquam sanguis fluere desijt, vulneri Scordium vel Alliarum, scordio viribus fortè non absimilem, contusa applicant. Alij Ostrea viua apponunt: illisque venenum allicere student.

Cucurbitularum applicationes aliquando venæ sectionis locum supplent, præsertim in iunioribus: sed & in adultis, cum per eas nulla fiat ab interioribus venis sanguinis extractio, vt per venam sectam, vnde vires debilitari, & ad interiora pestiferam qualitatem reuocari, eoque nomine minùs conuenire diximus, tutius fortè erit, & cucurbitulis ad exteriora mox ab initio quod corpus subiit venenum euocare, & naturæ motum statim etiam, sudore & characteribus pestiferis iam erumpentibus, sic adiuuare. Proin & illis in locis, quo natura venenum propellere nititur, vt si character pestilens circa superiora prodeat, scapulis & collo, si circa inguina, natibus, suris & in poplite, cucurbitulæ affigi debent.

Scarificatio ante cucurbitularum vsum, iisdem in locis priùs facta, potentiùs ad exteriora elicit, nec adeò cum exterior tantum superficiarius educatur sanguis, vt si per venam sectam euacuetur, debilitat, aut naturæ motum impedit.

Sanguisugæ illis quoq; in sedibus admotæ, scarificationis locum supplere possunt.

Vesicatorium pollicis pedis, aut annulari digito manus, ex Ranunculo, vel Flammula applicatum admodum deriuat, eoq; magis, si vesica excitata, filo trajiciatur, illudque vt saniem melius profundat, sæpè trahatur, & ne pertusa citò denuò coalescat, applica-

to desuper folio Betæ, vel Brassicæ, butyro inunctio, caueatur.

Plantis pedum Columbus viuus per medium scissus superligatus, valde diuertit. Quod & piscis Tinca per medium sectus: & Raphanus tritus: item Vrtica cum radicibus: & Hædera terrestres, contusa, faciunt.

Capiti quoq; pullus Columbinus viuus discerptus, si calidus adhuc applicetur, à quibusdam laudatur.

Per habitum corporis, manifesta euacuatione, per sudores, vel insensili transpiratione, huius pestiferæ qualitatibus facta euacuatione, vel saltem à corde, seu interioribus ad exteriora, seu centro ad superficiem euacuatione, præcipua curationis pars est. Quam & natura sponte ferè semper mox à prima inuasionem molitur: cuius motum Medicus iuuare debet, vel si nil tentet, eam ad expulsionem excitare.

Fitque hoc exhibitis plerunque per os: nonnunquam, sed raro, suffitu, vel frictione. Exhibitis verò illud efficimus diaphoreticis, epispasticis, quæ & expulsiua, quod venenum expellant, à neotericis appellantur. Eligendo ea præsertim, quæ venenis resistere longa experientia deprehensa sunt. Ex quibus, vel solis, vel saltem reliquis permistis, hæc Expulsiua dicta remedia varijs formis parantur.

Quorum remedium vsus statim in prima huius febris inuasionem esse debet, vt si fieri possit, antequam qualitas illa venenata cor pessundet, quod statim nisi propellatur facit, sponte à natura, vel adiuta, exhibitis hisce expulsiuis, vnà cum spiritu & calore ad exteriora propellatur, illiusque malignitas antidotis hisce insingatur. Itaque quò citius hæc exhibentur, eò rectius hoc fiet: cum in ipso præcipuus curationis cardo versetur: & nisi intra viginti quatuor horarum spatium, vel citius, (cum sæpè etiam hoc breui tempore pestis iugulet) exhibeantur, quæ postea sunt, ad veram curationem parui sunt momenti, neglectaque hac occasione, nisi natura sponte id faciat, frustra postea laboramus. Neque hinc venæ sectio, vti dictum, aut purgatio, si quando, vt mox dicetur, facienda est, illud impedire debet: et

si sudorem multi post venam sectam hisce prouocare primum malè doceant, qui tamen, si fortè non consulto Medico vena secta sit, nihilominus non omitti debet. Sed & altero die eadem repetuntur remedia. Quin & in progressu morbi, viribus constantibus, si natura rursus eò vergat, repeti possunt. Non tamen ægri adeò ad sudores per vim, nisi sponte erumpant, impelli (cum & sine illis, ex vsu horum, per insensilem transpirationem, fiat euacuatio, & pestifera illa vis retundatur) debent.

Forma autem variâ, humida præsertim, quæ & ad sudores mouendos magis est accommodata: vt decocti, vel aquæ, vel infusionis, vel potionis, vel electuarij, &c. hæc exhibentur.

Decoctum simplex nonnunquam citra aliorum permissionem, paratur. Vel commune decoctum, quod in morbillis ad propellendas pustulas & maculas in vsu est, vti illic explicabitur, hic quoque nonnunquam exhibetur.

Quod tamen rectius parabitur, si antipharmaca illi addas: sicuti pro infantibus & iunioribus commodius hoc modo fit: R. Lentium, Hordei an. p. j. Ficuum n. x. Dactylor. n. v. rad. Tormentil. Dictam. an. 3j. fiat decoctio, addendo parum Vini: Detur.

Ex alijs verò antipharmacis, decoctum rad. Angelicæ, Bardanæ, Petasitidis, Chelidonie, Tormentillæ, Dictamni albi, conuenit.

Item si Acetosa, Plantago, Tanacetum, Verbena, Scordium, Ruta, aliaque plura vel pauciora in aqua & Aceto, vel Vino, vel Aqua conuenienti stillatitia decoquantur, haustusq; de hoc decocto detur.

Allium in Hydromelite decoctum, & ad 3. ij. vel paulò plus exhibitum, potenter sudores & vrinas elicit.

Guaiaci decoctum tale idem præstabit: R. Guaiaci 3. ij. Zarsæ parillæ 3. j. fiat decoctio, in qua decoque granorum Iunip. bacc. Lauri rad. Angelicæ, Enulæ an. 3. ij. Cinam. parum, fiat decoctio.

Succi per se vix dantur, sed potionibus, vnà cum alijs permiscuntur. Calendulæ succum ad 3. iij. potum, multum conferre docet Rondel.

Aquæ exstillatæ, idem præstabunt: è quibus selectiores hæ sunt, Ex simplicioribus. Arantij florum aqua, Nasse dicta: & quæ ex succo Limonum, vel folijs quoque, cum odorata sint, elicitur. Angelicæ item fol. aqua, cum pauca aqua Vitæ data, mirè sudores, vti sæpè expertus sum, conciliat.

Quernorum foliorum, Lentis palustris, Sanguisorbæ, Acetosæ, Tormentillæ, Dracuntij, Pimpinellæ aquæ, idem præstant.

Chelidonie item sublimatio, cum Vino & Aceto facta.

Vel hæc magni vsus aqua: R. radic. Perlonatæ mai. seu Bardanæ tb. j. cort. medij Fraxini tenerioris M. ij. eliciatur aqua: Cuius 3. iij. propinentur.

Nucum viridium aqua summopere etiam laudatur.

Composita magis sic fit: R. Nucum nondum omnino, sed penè, maturorum, minutim incisorum q. vol. adde recentes has herbas, Acetosæ, Scabiosæ, Verbenæ, Rutæ, an. M. j. Solani, Semperuiui an. M. 3. destillentur. Hisce si prius antequam aqua elicitur, Acetum addatur, facile vomitum mouebis, sed nihilominus sudores mouet.

Citria mala vel limonia, sic destillantur: R. Limonia mala, vel Citria minora n. x. si maiora sint, duo vel tria sufficiant, inciduntur, adde herbar. Borrag. Acetosæ ana M. ij. vel iij. Vini albi odorati tb. iij. destillentur. Dosis 3. ij.

Ex varijs concinnatæ aquæ selectiores; probatæque sunt sequentes. Quarum prima hæc est: R. radic. Angelicæ, Imperatoriæ, Tormentillæ, Valerianæ, Dictamni, Succisæ, Pimpinellæ, Bistortæ an. 3. j. herbarum Verbenæ, Scabiosæ an. M. j. Aquæ vitæ, vel Vini optimi mens. j. destillentur, Detur 3. j.

Secunda: R. fol. Rutæ, Calendulæ, Saluæ, Verbenæ, Scabiosæ an. M. j. rad. Bardanæ, Succisæ an. 3. ij. in Vino albo macer. destillentur, Dosis 3. j.

Tertia hæc existit: R. ligni Guaiaci tb. 3. radic. Angelicæ, Imperat. Gentianæ an. 3. j. Ireos, Zedoariæ an. 3. 3. fol. Cardui ben. Rutæ, Scordij ana M. ij. Ocimi M. j. poma Limonia incisa n. vj. destillétur ter, Quantitas 3. 3.

Quarta, quæ sæpè feliciter vsus sum: R. radic. Valerianæ, Pentaphylli, Dictamni albi, Apij, Pimpinell. Serpentariæ, Tormentillæ an. 3. j. Gentianæ 3. 3. radic. Ebuli, Aristoloch. Angelicæ an. 3. ij. Galangæ 3. vj. fol. Valerianæ, Apij, Chelidonie ana M. j. Rutæ M. 3. baccar. Lauri & Iuniperi an. 3. 3. ligni Aloës 3. ij. Cinamom. 3. vj. incidantur & contundantur, adde Aquæ vitæ mensur. j. aquarum Borrag. Bugloss. Acetosæ, Scabiosæ an. M. 3. destillentur, Dosis 3. ij.

Quinta ex pluribus & efficacioribus, sic parabitur: in quâ studio ea quæ terrea, dura, lapidosa sunt, cum ab illis vis hac ratione elici nequeat, omittimus: R. radic. Tormentil. Pimpinellæ, Dictamni, Vincetoxicæ, Pentaphylli, Barbanæ, Petasitidis, Succisæ, an. 3. j. radic. Angelicæ, Imperat. Enulæ, Myrrhidis, Valerianæ, an. 3. 3. radic. Gentianæ, Aristolochiæ veræ, licet & vulgaris bona sit, an. 3. iij. Zedoariæ, Galangæ, Zingib. an. 3. ij. radic. serpentariæ, Aronis, Allij, Cæpæ an. 3. ij. cort. Laureolæ 3. j. herbar. Scabiosæ, Verbenæ, Calendulæ, Chelidonie, Lyfimachiæ, Scordij, Rutæ, Tanacetij, Saluæ, Melissæ, Plantaginis, Veronicæ maris, Cardui ben. Absynthij an. 3. ij. flor. Rosarum, Bugloss. Borrag. Nymphææ, Violar. an. 3. j. Croci 3. 3. seminum Coriandri, Ocimi, Citri, Angelicæ an. 3. j. f. Acetosæ, Cardui ben. an. 3. ij. gran. Iuniperi, Laurian. 3. j. Nucis mosc. Maceris, Caryophyll. an. 3. j. Limonia mala incisa n. v. nucleorum Nucum n. xv. Boli Arm. præp. 3. j. incidantur omnia minutim, & affunde Vini præstantiss. q. f. vsuperemineat, Aceti ros. 3. ij. Aquæ vitæ quart. j. macerentur, destillentur. Posset & infusio horum sola, si in spiritu Vini fieret, cum tunc non corrumpatur, vsurpari.

Camphoram si prædictis compositionibus, quas destillare volumus, addamus, aquas illas odorem illius spirantes, admodumque efficaces reddemus. Quod & fieri poterit, si Camphoræ portionem addendo, vel in ea maceremus: vel dissolutam prius cum Aqua vitæ illi permisceamus.

Theriaca quoque vel Mithridatum, vel alia antidota, vel electuarium de Ovo, si enarratis compositionibus, antequam destil-

lentur, addantur: aquæ fiunt ad hosce vsus accommodæ, Theriacales dictæ.

Quæ & hoc modo fieri possunt: Inter quas Prima hæc admodum excellit: R̃. Theriacæ optimæ ʒ. v. Myrrhæ sol. ʒ. j. β. Croci ʒ. β. Aquæ vitæ ʒ. x. destillentur, Dosis ʒ. β. cui nonnunquam de spiritu Vitreoli guttulam addunt.

Secunda hæc sæpius quoque experta est: R̃. Cæparum albarum mund. incisarum n. vj. Allij mundari n. iij. herb. Rutæ, Chelid. Plantag. an. M. j. Theriacæ optimæ ʒ. j. β. Aquæ vitæ ʒ. ij. Aceti ʒ. j. Vini ʒ. ij. destillentur: valde est efficax, & proin ʒ. β. pro vna vice forte sufficiet.

Tertia, quam peste An. 94. sæuiente, cum in vsu pauperum potissimum composuissim, tam utilis & tantum profecisse deprehensa est, vt tunc alio remedio vix dum vterentur, multiq; eâ restituerentur: R̃. radic. Tormentillæ, Bardanæ, Pimpinellæ, Succisæ, Phu veri hort. recentium an. ʒ. iij. rad. Imperat. Angelicæ, Dictamni albi, Gentianæ, Serpentariæ an. siccarum ʒ. j. Cæparum recent. excort. Nucum recentium nondum plenè maturar. an. ʒ. vj. fol. Rutæ, Acetosæ, Cardui ben. rec. an. M. ij. incidantur omnia, addendo Camphoræ ʒ. j. β. dissolutæ in Aqua vitæ ʒ. j. adde Mithridati ʒ. j. β. Vini albi præstantif. mens. j. β. Acetirof. ʒ. ij. eliciatur aqua: cuius dosis summa ʒ. ij. est. Cui syr. Acetof. simp. vel de Limonibus in delectationibus utiliter permiscuntur.

Quarta à veteribus ex helleboro parata, hoc modo correctæ est: R̃. radic. Angel. ʒ. ij. Zedoariæ ʒ. β. rad. Hellebori nigri ʒ. ij. Succisæ, Tormentil. Dictamni, Chamæleontis albi, Gentianæ an. ʒ. j. Theriacæ iij. Nucum immat. n. xx. aquæ Veronicæ ʒ. iij. Aceti ʒ. j. β. destillentur: Dosis ʒ. ij. β.

Infusiones aquarū loco vsurpari possunt: quibus & viribus minimè cedunt, sed potius eas exuperant. Quales tum ex supradictis, vti dictum, parari possunt: tū sequentes.

Prima ex camphora infusio: R̃. Camphoræ ʒ. β. Zingib. albi ʒ. j. Caryophyl. ʒ. j. β. Sacchari candi ʒ. j. Aquæ vitæ mens. j. stent diu infusa, Dosis ʒ. ij. homini adulto.

Alteræ ex antidotis opiat: R̃. Antidoti

Matth. rectè præpar. vel illius loco Mithridati, vel Theriacæ optimæ ʒ. ij. vel amborum ʒ. j. Aqua vitæ optimæ ʒ. x. syr. de succo acetoso Limonium, vel Citri ʒ. v. stent in infusione per mensem, vel in bal. Mar. Dos. ʒ. j.

Tertia: R̃. aquæ Vitæ ex vino generoso quater destillatæ ʒ. j. β. Vini maluatici ʒ. ij. syr. de succo Limonium, vel Citri ʒ. ij. Antid. Matth. vel Theriacæ, vel Mithridati ʒ. x. rad. Angelicæ ʒ. β. Zedoariæ ʒ. ij. Camphoræ ʒ. j. Croci ʒ. β. pulueris alicuius Liberantis, (sicuti mox describentur) ʒ. j. β. spec. Diamargar. frigid. ʒ. j. de Gemmis ʒ. β. Cinnamon. ʒ. ij. Mosci ʒ. β. infundantur, vt dictum, Dosis ʒ. j.

Quarta: R̃. rad. Angelicæ domest. Imperatoricæ, Zedoariæ, an. ʒ. ij. radic. Angel. sylu. Pimpinellæ, Phu veri, Vincetoxici, Tormentillæ, Personatæ, Carlinæ, Enulæ (nam sudores mouet) an. ʒ. iij. bacc. Iuniperi, Lauri an. ʒ. j. sem. Angelicæ ʒ. j. fol. Rutæ ʒ. ij. fol. Calendulæ, Verbenæ, Scabiosæ ana ʒ. j. Cinam. ʒ. j. β. Piperis longi ʒ. β. Croci ʒ. j. Myrrhæ ʒ. β. fiat puluis: affunde spiritum Vini rectè præpar. q. s. vt trium vel quatuor digitorum spacio superemineat: adde syr. de succo acetoso Limonium, vel Citri, ad calorem temperandum, vel de Acetosa ʒ. ij. stent bene obturata in vase vitreo, in sole, vel, si statim vtendum eâ, in bal. Mar. vel vtrinque. Et quando opus erit, da ʒ. j. cum electuario aliquo, vt Theriacâ, vel Mithridato, vel Antidoto Matth. ʒ. j. Si iunior & calidior sit, da minus, & dissolue cum aqua Calendulæ.

Possunt & alij pulueres, qui in prophylacticis expositi sunt, simili ratione infundis & liquor exhiberi. Vel pulueres, à quibus aquas destillari iussimus, non destillari, sed tantum macerari, infusumq; dâri.

Syrupi formâ interdum hac exhibentur. Qui ex multis supradictorum decoctis, vel succis fieri possunt, si hæc Saccharo addito, vt diutius asseruari queant, inspissantur.

Vel sic: R̃. rad. Angelicæ, Tormentil. Dictamni, Pimpinell. Cruciatæ an. ʒ. j. rad. Imperat. Zedoar. an. ʒ. β. fol. Cardui ben. Verbenæ, Rutæ, Chelidonij, Calendulæ cum floribus, Saluiæ an. aridor. ʒ. iij. gran. Iunip. ʒ. ij. bacc.



bacc. Lauri 3.j. ̄. fiat decoctio in Vīno, col. ad de Sacchari quart. j. decoquantur in formam fyrupi: Capiat 3.j. per se vel dissol. in Aquis convenientibus.

Extracta dicta, inprimis Angelicæ, Verbenæ, Enulæ, competunt: quæ & ferè cum aquis dantur. Vti & rob de Sambuco, quod quoque probatur.

Oleum Vitreoli ̄. j. pondere cum Aquis dat Matthiolum.

In substantia pulueres dantur vix per se, sed in portionibus dissoluti, vel electuarijs, opiativæ permixti: nisi fortè ex illis infantium causâ, qui alia respuunt, tabulas formemus: quales superius enarratæ fuerunt.

Vel sequentes tabulæ, quibus & in grauidis vti possumus: R̄. rad. Angelicæ 3. ̄. rad. Tormentil. Dictamni ana 3. j. Theriacæ 3. ̄. spec. Diamarg. frig. ̄. 3. Sacchari dissoluti in aqua Acetosæ 3. iij. Dos. 3. ij.

Ex pulueribus verò, in potionibus dissoluti exhibentur, sequentes. Primus hic erit pro imbecillioribus: R̄. rad. Tormentil. Petasitidis, an. 3. ̄. fiat pulvis tenuissimus, adde spec. Diamarg. vel alt. Cordialis ̄. j. cum aqua Acetosæ & syr. de Limonibus, Sumat.

Secundus: R̄. Boli arm. præp. 3. ij. rasuræ cornu Cerui ̄. j. Margarit. ̄. 3. fucci Limon. 3. ij. aquæ Acetosæ, vel Cardui ben. q. s. misce.

Tertius amarus est: R̄. rad. Tormentil. Dictamni, Gentianæ, fol. Cardui bened. pul. ana 3. ̄. Boli præp. Coralli ana 3. j. Detur cum aqua Acetosæ.

Quartus: R̄. Succini albi, Coralli ana 3. j. Margar. ̄. j. vngulæ Alcis, Eboris an. ̄. 3. fiat pulvis: Detur cum aqua Portul. vel Scabiosæ, Qui & infantibus utilis, præsertim si in tabulas redigatur, cum ægrè pulueres bibant.

Quintus nonnihil ingratus: R̄. spec. Cordial. vel Diamargar. ̄. ij. ras. cornu Cerui ̄. j. f. Ocimi ̄. 3. f. Acetosæ ̄. j. medullæ f. Citri gran. vj. Myrrhæ ̄. 3. Aceti q. s. fiat potio.

Ex camphora facti pulueres, valde in peste cōmendantur, quos & refrigerare credunt. Præsertim hoc pacto exhibitus: R̄. troch. de Camphora syr. de acetos. Citri ana 3. j. aquarum Scabiosæ, Acetosæ, q. s. fiat potio.

Alius pulvis, qui omnes febres curare, & in peste valde utilis quoque esse censetur, ex

camphora paratur: cui calida, cum camphoram frigidâ esse existiment, addunt: R̄. Camphoræ 3. j. Zingib. 3. ij. Sacchari candi 3. iij. fiat pulvis, Dos 3. j. cum aquis Cardui ben. vel Scabiosæ, vel Calendulæ.

Hunc paulisper immutatum, infundunt, illiusq; dilutū, vt superius dictum exhibent. Alij cū Theriaca, vt infra dicetur, permiscēt.

Ex euphorbio, cui in hoc casu multum tribuunt Itali, pulvis sic paratus admodū est efficax: R̄. Euphorbij, Mastichæ an. ̄. 3. Croci gr. v. Sacchari candi 3. j. fiat pulvis, dissol. cum aquis Acetosæ, & Aceti rosa. 3. ̄.

Vel sic: R̄. Euphorbij, Mastichæ, gummi Elemi ana ̄. 3. rad. Tormentil. Angelicæ ana 3. ̄. Camphoræ ̄. 3. fiat pulvis: aquarum Acetosæ q. s. Aceti ros. 3. ̄.

Alij quoque compositi pulueres ex varijs concinnantur, quos Liberantes vocāt, quorum variæ sunt descriptiones, hinc inde in Practicis inueniendæ.

Salia sua Chymici quoq; extollunt, quæ & Crato valde laudat, vt sal Angelicæ, Scabiosæ, Scordij, Cardui ben. Zedoariæ, Fraxini, Guaiaci, Absynthij: quorum gr. 10. vel 12. cum conf. Ros. vel aqua Citrij mali, aut alijs, dantur. Salis Polypodij 3. j. cum Vīno data, mirè à quodam probabatur.

Diasulphur, si rectè præparatum detur, validum expulsiuum esse dicit Crato.

Antimonium diaphoreticū ex multis fusionibus cum Sale nitro paratum, tanquam validum expulsiuum, hic quoque, non tamen satis tutò, vsurpant chymici.

Electuaria in hunc vsum varijs modis fiunt, quæ per se interdum, frequentius pulueribus mixta, vel sine illis dissoluta, exhibentur. Fiunt autem ex superius explicatis in aqua & infusionibus simplicibus: quibus ea quoque, quæ in substantia data operantur, in infusione verò vel destillatione minime permiscere possumus.

Qualia sunt si electuarium præseruans, vel aliæ compositiones in prophylacticis explicatæ, cum & in curatione similiter valeant, exhibeantur. Vel si puluerem in aquis curatiuis explicatum, compositum quartum vel quintum sumamus, illique species Cordiales, Margaritas, lap. Preciosos, & similia, per-

miscemus, & cum Melle, vel syrupo in formam electuarij redigamus, ita vt nouas compositiones hic explicare non sit opus.

Mixtura illa ex rad. Cucum. asinicum fol. Apij, Semperuiui, &c. vt in prophylacticis dicam, curatiua quoque insignis est, ab Hon. Castel. & Cratone etiam commendata.

Opiata antidota, cum sicuti in omnibus venenis alexipharmaca, sic & in peste esse censeantur, præsertim in vsu sunt. Quæ interdum per se, interdum diluta, interdum additis pulueribus vsurpantur, vti & aquis & infusionibus ea permixta exhiberi ostendimus.

Ex vilitatis autem antiquorū antidota sunt Theriaca & Mithridatum, quæ 3. j. pondere, per se, vel diluta aquis conuenientibus, dantur: Philonium Gesnerus quibusdam quoque permiscet. Recentiorum verò sunt Diafcoridium Fracastorij, Antidotus Matthioli præ cæteris laudata. Aliaque multa, à varijs (vbi quilibet suam compositionem extollit) prædita: inter quæ electuarium illud de Ovo, seu Diacroceum tantopere ab omnibus æstimatur. Vel parentur sequentibus modis.

Primo: R. Theriacæ, vel Mithrid. vel Antidot. Matth. vel elect. de Ovo 3. j. dissolue cum decocto Zedoariæ, adde syrup. Acetof. simp. 3. j. fiat potio.

Secundo: R. Theriacæ 3. j. succi Scabiosæ, Cardui ben. an. 3. j. dissoluatur cum vino.

Tertio: R. Theriacæ, vel Mithridati 3. j. rad. Angelicæ, sem. Acetofæ, ras. cornu Cerui an. 3. j. aquarum Angelicæ q. s. misce.

Quarto: R. Theriacæ 3. j. pul. Verbenæ 3. j. Croci gr. vij. aquæ Nucum recent. 3. iij. Bibatur calidum, Helidæus.

Quinto: R. Theriacæ 3. j. Boli præpar. 3. j. spec. Diamarg. frig. spec. Liberantis ana 3. j. aquarum Scabiosæ, Acetofæ, Cardui bened. ana 3. j. syr. de succo acido Limonum vel Citri 3. j. fiat potio.

Sexto: R. Theriacæ, Mithridati ana 3. j. el. de Ovo 3. j. spec. Liberantis 3. j. Boli præpar. 3. j. misce cum syrupo de acetof. Citri fiat electuarium. Dosis 3. ij.

Septimo fit addita camphora: R. Theriacæ 3. j. Verbenæ 3. j. Croci, Camphoræ an. 3. j. aquæ Nucum q. s. Aceti parum, fiat potio.

Octauo, ad formam pulueris supradicti ex

camphora curatiui, mixtura quorundam: R. Theriacæ 3. iij. Camphoræ, Zingiberis, Saccharicandi ana 3. j. fiat mixtura: Detur cum aquis, vel per se, pondere 3. j.

Nono, camphorata quoque compositio: R. rad. Tormentillæ, Dictamni, Angelicæ, ana 3. ij. Zedoariæ, Gentianæ ana 3. j. Scordij 3. ij. Verbenæ 3. j. Zingib. Camphoræ, Croci ana 3. j. fiat puluis, & cum Theriacæ, Mithridati ana 3. ij. fiat electuarium: Datur 3. j. per se, vel cum aquis.

Decimo, cum cæpa à multis probatum remedium, in qua cum coquant theriacā, nos rectius sic parabimus: R. Cæpam parum coctam, infunde in Aceto & postea succum exprime, cui adde Theriacæ 3. j. syr. de acetof. Citri vel Limon. 3. j. Bibat. Ex Allio, vel allio & cæpa simul, simili modo fit in robustioribus efficax medicamentum.

Vndecimo, cum castoreo: R. Castorei 3. j. rad. Arist. Gentianæ, Theriacæ an. 3. j. Detur cum Aceto acerrimo, & aqua Acetofæ.

Duodecimo, aliud mirificum ex succis, Elect. Lupi Monspessuli vocatum remedium: R. succorū Rutæ, Saluiæ, Pimpinellæ, Centaurij, Pulegij, Absynthij, Valerianæ, Matricariæ, Nucum iuglandum immaturarum ana part. æq. Mellis ad medietatem totius decoquantur ad consistentiam syrupi, summe huius confectionis 3. j. Theriacæ 3. j. Boli Armen. terræ Sigillat. ana 3. ij. cum Aceto, vel cum Vino, si non magna adsit febris, Sumat statim correptus.

Decimo tertio, cum sulphure tale fit: R. Sulphuris 3. j. Croci 3. j. Thuris 3. j. Theriacæ 3. j. Cum aquis detur conuenientibus.

Decimo quarto, oleo vitreoli addito: R. Theriacæ 3. j. el. de Ovo 3. j. ol. Vitreoli gur. 7. Aceti fortis. 3. j. aquæ Acetofæ, Borræg. an. 3. j. fiat potus.

Decimo quinto, ex calidissimis & causticis: R. rad. Ari. Serpentar. 3. j. vel an. 3. j. rad. Angel. 3. j. fol. Rutæ, Verbenæ an. 3. j. Croci 3. j. Camphoræ 3. j. fiat puluis: Derur 3. j. cum Theriacæ 3. j. dissol. Aceto & aqua Scabiosæ.

Decimo sexto, ex laureola tale paratur, quod cum valde vrens sit, aceto in præparatione corrigitur: R. antidoti Saxonica contra venena, Theriacæ an. 3. j. dissolue in aqua Acetofæ,

Acetosa, addendo Aceti ros. 3. vj. syr. de Limonibus 3. β. fiat potio.

Suffitus aliqui ad sudores proliciendos quoque hoc modo adhibentur: R. Acetosa, Rutæ, Scabiosa ana. M. j. cum Aloe, Myrrha, Mastice, Croco, in Aqua & Aceto macerata prius, calenti lapidi iniiciantur, fumusq; toto corpore excipiat.

Quidam ad sudores eliciendos, in decocto Guaiaci, radices Tormentil. Ebuli & Bardanæ decoquebat, illiq; parum Sublimati addebat, eoq; linteamen madefaciens, peste laborantes, eo madido calidè inuoluebat.

Sunt qui Cinnabaris fumo, eadem ratione ut in Venerea lue, sudores ægrotis, additis etiam fortioribus, ut Antimonio, commouent.

Frictiones ad exteriora quoque euecant, sudoresque promouent, & sic per illum, vel saltem insensilem transpirationem, per habitum corporis euacuant: uti & alij corporis motus, qui cum ob imbecillitatem obiri nequeant, frictio quæ ab astantibus fit, illorum vices obibit. Hæ autem ante sudoris eruptionem fieri debent, & sursum deorsumq; corpus fricari: Quod & commodius, si manus aqua calidâ prius madefiant, aut si panno rubro scarlato fricentur, præstatur: eatenusq; melius humores euocantur. Quo facto, corpus calido lecto inditum, linteaminibus, vel panno rubro, ut aliqui volunt, inuolutum, ad sudores disponi, & quietum esse debet. Sed & maculæ si erumpere incipiant, ut melius prodeant, frictio instituitur.

Vomitio inter euacuantia remedia interdum locum habet: non tantum, quando sponte ad eam inuitantur: vel quando propter hoc symptoma, ut illud emendemus, vomitu vomitum curamus: sed & ad venenatæ illius qualitatis propulsionem, quod per hanc violentam corporis commotionem fieri quoque posse creditur, bubonesque citius, vnâ cum vomitu erumpere, vomitoria exhibent. Quod alij mox ab initio: alij prius in lecto clysmate: alij prius antidoto exhibito, facere iubent: alij primum post sanguinem missum vomitoria exhibent, atque se miracula fecisse prædicant.

E quibus leuiora ex relaxantibus & incidentibus acidis, ut syr. Acetoso parant. Vel

ex succi Erysimi 3. ij. cum aquis Scabiosæ, Cardui ben. & Buglosi, potionem propinant. Quidam vomitorio ex aq. Acetos. syl. Aceto & tantillo ol. Vitreoli parato, mira se expertum in peste infectis scribit. Sunt qui Azarû, nucem Indicam, Ricinum, eo nomine exhibent.

Fortissima quoq; dant Empirici, aliquiq; Medici, seq; multos hoc pacto sanasse gloriatur. Ex Chalcantho preparato, vomitorio parato, chyrurgum mira effecisse scribit Droëtus, quod mox post venâ sectam propinabat.

Stribij grana quinq; cum electuario Liberantis porrigit Matthiolus: Quem & empiricus quidâ An. 64. hic apud nos imitabatur.

Argentum vivum præcipitatum ex Rhodofaccharo exhibet Matthiolus.

Deiectiones per alvum hoc modo, per clysmata, tum per exhibita, instituuntur.

Clysmata venæ sectioni, si illa locum habet, præmitti solent. Quorum loco & supposito-ria indi possunt. Sed & si vena minimè aperta, ante expulsum, clyster iniiciatur, ut melius & rectius antidotus operetur, facit. Vnde quidâ se tribus hisce auxilijs, clystere, venæ sectione & antidoto exhibito, maturè vsurpatis, certò peste sanare solere gloriatur. Ob quam causam, cum per enema subita fiat operatio, nec illud reliquorû vsum remouetur, in impuris præsertim corporibus, ante omnia, vel etiâ post sudores, & in morbi progressu, cum non debilitet, eo uti possumus.

Et quod laxando simul abstergat, putredinique resistat, eligendum. Veluti commune, in cuius decocto Cassiâ, Catholicâ, Tryptophera dissoluntur. Decoctum Veronicæ cum Butyro bene salito iniicit Crato. Alij cremorem Hordei, ad humores, ut inquirunt, contemperandos infundunt.

Purgatio per cathartica exhibita, cum seminarium pestis non expellat, ad curationem vix aliquid facit, nisi fortè ex fortissimorum supra infraq; deiciendum medicamentorum exhibitione, statim ab initio propinatorum, natura commota, aliquid etiam de hac noxia qualitate propellat: quod tamen periculosum admodum existit, cum vires sic vehementer, quæ aliàs hic mox debilitantur, deiciantur. Dein & quia alioquin ad alui fluorem propensi sunt, metuendum, ne

eo concitato, nec cessante, æger intereat: sicuti cuida ex nostris, cui Empiricus stibium, quod præsentaneum remedium vocabat, dederat, accidisse vidi, qui ex immoderata subsecuta vomitione & diarrhoea, in ipsa sella deiectionis adhuc sedens expirauit. Diligenter itaque ante omnia, an pestis purum aut impurum corpus inuaserit, considerare oportet: & si purum sit, non temerè cathartica exhibenda, cum illud sine vsu, & cum noxa potius (cum nec febris alia tunc sit, quam synochi simplicis instar) fieret. Sin verò impuro corpore peste correptus existat, vnde febrem putridæ instar, pestilentem, tunc fieri diximus, non veneni, sed febris putridæ pestilentis nomine, purgantia aliquo pacto conferre possunt. Omnitamen cura virium interim ratio habenda, quæ si prostratæ mox sunt, ea omittere satius erit, & ad declinationem morbi, cum iam status præterijt, differre. Quod si verò constent, ab initio facta aliquomodo prodesse potest. Licet & tunc plerique, si bubones vel alia, vti consuetum ferè est, eruperint, à purgantibus abstinere iubeant: quibus tamen si vitamur, sic instituenda erunt, ne præcipuorum remedium, quæ expulsua esse diximus, vsu retardent, cum illa alijs omnibus præmitti semper debeant, naturaque mox in prima febris inuasionem sponte eò vergat, quò & ducenda erit. Postquam verò iam per sudores (quod cito sæpè, vel saltem primo die fit, & per horam vnam aut alteram durat) facta fuerit euacuatio, viresque constent, & videamus febris putridæ accidentia veneni noxis præualere, medicamentum catharticum, sed leue, ad putredinis aliquam portionem quæ in corpore continetur, febremque auget, exturbandam, exhibere possumus: vt sic eà expurgatà, natura vilidius morbum euincere queat. Neque hic longà ante purgationem præparatione, vt verò aliqui docent, vti, tempus patitur: nisi quatenus in processu morbi alterantia, vti dicitur, ad putridos humores contemperandos, & simul corroborandum, exhibentur, & postea quoque etiam discussa iam venenata qualitate, relictà interdum febre putrida, ad febrem illam putridam exactè sanandam, præparantia & eua-

cuantia repetimus, eodem omnino modo, sicuti in febre putrida ea exposuimus.

Ergo cum necessitas exigit, habita ratione ætatis, corporisque constitutionis, talia purgantia ex vsu præsertim erunt. Tryphera, (quæ ab omnibus commendantur) Persicæ vel Sarracenicæ, quæ melior hic quibusdam esse censetur ʒ. j. cum aquis Acetosæ, Scabiosæ, Buglossæ propinata.

Vel sic: R. Myrobal. citrin. chebul. an. ʒ. j. β. Tamarind. ʒ. j. flor. Cordialium & Scabiosæ an. p. j. fiat decoctio, infunde in col. Rhabarb. el. ʒ. j. Cinamom. ʒ. β. fiat expressio: dissolue Tryphera Persicæ ʒ. ij. syr. Ros. lax. ʒ. β. fiat potio: quæ optima est & tuta.

Potionem Rufi, quam nunc in forma pilul. dant, exhibere, etiam in ipso mox principio, non inutile erit: quâ datâ, anthracem statim postea erumpere, aliquoties obseruauit.

Extractum Rhabarbari, cum & proprietate veneno rhabarbarum resistat, quo nomine antidotis inditur, vile quoque erit.

Quæ violenter ex Stibio & Præcipitato parata purgat: in vomitorijs, cum vomitum simul moueant, fuerunt descripta.

Alterantia, quæ venenata qualitati resistunt, antipharmaca, cum non tantum vim illius infringant, sed & venenum euocent, & propellant, iam in illis quæ per habitum corporis euacuant, proposita fuerunt. Quæ verò febris calori & putredini interdum, quæ nonnunquam in corporibus impuris, vt dictum fuit, accedit, contraria sunt, in alijs febribus putridis quoque explicata sunt. In quibus tamen hic maximè ea eligimus, quæ præter quòd calorem contemperant, putredinem arcant, veneno quoque resistunt, & cordi maximè, quod hic præsertim patitur, appropriata sunt, quæ & ad virium conseruationem plurimum faciunt. Illisq; intrinsecus, extrinsecusq; vtimur.

Intrinsecus varijs ea formis, modisq; hoc modo exhibentur.

Aqua frigida, in qua rasura cornu Cerui vel Eboris, vel Aurum macerantur, vel decoquuntur, vel in qua aurum extinguitur, loco potus sumpta proderit.

Vel decoctum rad. Acetosæ, vel Tormentalis in aqua, pro potu vsurpatum.



Senecionis decoctum, si in Ceruiffa fiat, valde commendat Crato.

In ferculis, Acetofa, Borrage, Portulaca, Lactuca, Scabiosa, Cichorium, Endiuia, decoquuntur.

Succi acidi, Limonū, Citri, Arantiorum, Granatorū, Acetum, Agresta, Ribes, Berberis, iusculis induntur, & potui permiscantur.

Aquæ item Acetofæ, Rosarum, flor. Labruscæ, Scabiosæ & similes.

Syrupi acidi varij, præscripti in febribus continuis hic quoque conueniunt.

E quibus syrupis, aquis & succis, iulepi fiunt. Primus hoc modo: R. syrup. de aciditate Citri vel Limonum, de Acetofa ana ʒ.ij. de Granatis ʒ.j. aquarum Acetofæ, Buglosi ana ʒ.v. fiat iulep.

Secundus: R. syrup. de Ribes, vel vini Granatorum ʒ.ij. succi Pomorum acid. ʒ.j. aquæ Acetof. Scabiosæ, Melissæ, Buglosi ana ʒ.iiij. fiat iulep.

Tertius: R. succi Acetofæ, Borrage, Pomorum redol. Scabiosæ, ana ʒ.j. ʒ. Aceti ros. ʒ.ʒ. aquarum Cardui bened. (loco succi, quia nimium amarus) Rosarum, Scordij ana ʒ.iiij. decoquantur, fiat iulep, clarif. & aromat. Santalis, addendo Camphoræ gran. v. Vtatur frequenter.

Quartus: R. aquarū Ros. Acetof. Borrage ana ʒ.ij. aquæ Cinamom. ʒ.j. Vini albi od. ʒ.ʒ. syr. de acetof. Citri vel Limon. ʒ.j. ʒ. Manus Christi perl. ʒ.ʒ. Boli Armen. ʒ.j. ras. cornu Cerui ʒ.ʒ. bulliant parum, colentur: Vtatur.

Vel cum decocto sic miscentur: R. radic. Tormentillæ ʒ.j. radic. Angelicæ ʒ.ʒ. Zedoariæ ʒ.j. flor. Cord. & Scabiosæ ana p.j. fol. Acetofæ rotundo folio m.j. Santal. omnium ʒ.j. fiat decoctio, & in col. adde syr. Acetofæ, de acetof. Citri vel Limonum ana ʒ.j. misce, vtatur. Vnicornu pro magnatibus addunt.

In substantia puluerizata varia cōmixta, diuersimodè propinantur. Primò: R. Boli præpar. loti ter in aqua Ros. Coralli ana ʒ.j. rasuræ cornu Cerui, Eboris ana ʒ.ʒ. Cinam. ʒ.ʒ. Manus Christi ʒ.j. fiat puluis. Capiat per se vel cum Vino, vel iusculis.

Secundò: R. confect. Alkermes, si non adfit fluor alui, ʒ.j. spec. Diamarg. frig. ras. Eboris, cornu Cerni ana ʒ.ʒ. Boli præpar. ʒ.j. syr.

de Limonibus ʒ.ʒ. aquarum Acetofæ, Scabiosæ ana q.s. fiat potio cordial.

Tertio: R. confect. de Hyacintho, quæ huic morbo peculiaris ʒ.j. syr. de Limonibus ʒ.j. Detur cum aquis.

Quartò: R. succorum Scabiosæ, Verbenæ, depuratorum ana ʒ.j. syr. de acetof. Citri vel Limonum ʒ.ʒ. spec. Diamarg. frig. el. de Bolo, de Gemmis ana ʒ.ʒ. aquarum Rosar. Buglos. Acetofæ q.s. fiat potio.

Aquæ destillatæ, Instauratiuæ dictæ, huc quoque referuntur, quæ hic huic veneno accommodandæ sunt: R. fol. Scabiosæ, Melissæ, Acetofæ, Verbenæ ana m.j. rad. Tormentil. Distamini ana ʒ.j. fl. Ros. Viol. Buglosi vtriusque, Scabiosæ an. p.j. f. Acetofæ ʒ.ij. f. Citri ʒ.ʒ. fiat decoctio in iure Pulli, quod postea fume, addendo sp. Diamarg. frig. el. de Gemmis, Bezoartici, vel de Bolo ana ʒ.j. succi Pomorum redol. ʒ.iiij. Cinamom. ʒ.ʒ. Santal. omnium ʒ.j. destillentur in balm. Mar. Detur de illa aqua cum iusculis vel aliter.

Aliter ex capone sic fit: R. Caponem præparatum, coquatur, addēdo, micæ Panis albi ʒ.ʒ. Limonia mala incisa, duo, fl. Borrage p.j. feminis Citri ʒ.ʒ. sem. Coriandri ʒ.j. ras. cornu Cerui ʒ.ij. puluerizentur, adde Vini generosi ʒ.iiij. confer. Cordialium ana ʒ.j. destillentur: Detur aqua per se vel in iusculis, vel cum aqua Cinamom. iulep. Rosaceo, aut Oxyfaccharo.

Instaurans magis nutriens, & roborans: R. caponem euisceratum, & a pinguedine mundum, incidatur cum ossibus, adde carnis Vitulinæ frustum: incisis, permisce Salis parum, addendo spec. Diamarg. frig. ʒ.j. conf. Acetofæ, Nenuph. & Buglos. ana ʒ.j. Cinamom. ʒ.iiij. aquæ Ros. ʒ.j. Vini odorati ʒ.j. decoquantur in vase duplici, effundatur liquor, fiat congelatum.

Ex conferuis & conditis, laudantur conf. Rosarum, Viol. Buglosi vtriusque, Nenupharis, Acetofæ, flor. Garyophyl. hortensium, Scabiosæ, Melissæ, Anthos: Plantago condita: Cōditura item cort. Citri, Fructuum acidorum, Fragorum.

Quæ p se dantur, vel alijs cōmixta, in forma boli: Vt cōserua aliqua permixta Theriacæ, vel Mithridato, p vices, tertio semper die.

Vel additis pulueribus, syrupis conuenientibus, alijsve electuarijs fiat electuarium: Vt R̄. conseruarum Cordialium iij. ana ʒ. j. con. flor. Scabiosæ ʒ. j. β. cort. Citri cond. ʒ. j. Boli Armen. præpar. ʒ. j. Coralli ʒ. β. rasuræ Eboris ʒ. j. Santali rub. ʒ. β. spec. Diamarg. frig. ʒ. j. pul. Bezoartici ʒ. β. f. Citri, Acetofæ, ana ʒ. j. cum syr. aliquo, vt de Limonibus fiat electuarium.

Aliud valde cordiale: R̄. conf. Cordial. iij. Acetofæ ana ʒ. j. β. conf. Melissæ ʒ. β. cort. Citri cond. ʒ. j. Boli præpar. Coralli præpar. ana ʒ. j. Margarit. præpar. ʒ. j. ras. Eboris, cornu Cerui, vel Vnicornu in magnatibus ana ʒ. j. f. Citri, Coriandri præpar. Acetofæ an. ʒ. β. fragm. lap. Præciosorum ʒ. j. lap. Bezoar. ʒ. β. fol. Auri n. x. Camphoræ gr. v. misceantur omnia, fiat electuarium.

Tabulæ interdū ex vſitatis speciebus, vt Diamarg. frig. de Gemmis, puluere Bezoartico, de Bolo, alijsq; paratæ dantur. Et ad Hepatis alterationē tab. Triafantali & Diarrh.

Vel hæ: R̄. Santali rub. & albi, cort. Citri ana ʒ. β. Cinam. ʒ. ij. Coralli, Boli præp. an. ʒ. j. Margarit. ʒ. j. Ros. rub. ʒ. j. lap. Sapphyri, Smaragdī, Granati, Rubini ana ʒ. β. Auri limati ʒ. j. ras. Eboris, cornu Cerui ana ʒ. β. fiat puluis, & cum Saccharo albif. q. f. dissoluto in aqua Ros. & succo Limonum fiant tabulæ.

Formulæ sequentes in fine iusculorū bulitæ, illa efficacia reddunt: R̄. seminum Acetofæ ʒ. β. f. Melonum ʒ. ij. f. Citri ʒ. β. Santal. omnium ʒ. ij. Coralli ʒ. j. Boli ʒ. j. β. spec. Diamarg. frig. ʒ. β. fiant formulæ.

Pilulæ ex trochiscis de Camphora, cum syr. Limonum, cordiales sunt, & veneno resistunt: quarum duæ vel tres aliquando exhiberi possunt.

Aurum potabile Chymici vehementer extollunt.

Oleum Scorpionum ad ʒ. β. infecto Crato porrigit.

Extrinfecus cordis, pulsuum, hepatis, renum, cerebri, ventriculi regionibus, testibus item, & extremitatibus, varia applicantur: arque aer quoque, qui attrahitur, corrigitur.

Cordi & pulsibus epithemata, statim post sudores & morbi progressum, applicantur, hoc modo: R̄. aquarum Acetofæ, Scabiosæ,

Melissæ, Verbenæ, Rosarum ana ʒ. ij. Aceti ros. ʒ. j. succi Limonum ʒ. β. Vini maluat. ʒ. j. Santali rub. & albi ʒ. j. cort. Citri ʒ. j. troch. de Camphora ʒ. j. spec. Diamarg. frig. ʒ. j. misce, fiat epithema.

Vnguentū, quo cordis regio, & pulsuum, inungi debet, vel peria ex scarlato vel carmascino, & bis in die applicari: R̄. Theriacæ ʒ. β. succi Limonum, vel Citri ʒ. β. Aceti ros. ʒ. ij. Camphoræ ʒ. j. Croci ʒ. β. Moschi gr. iij. misce, fiat inunctio.

Vel vngatur Aceto, in quo rad. Angelicæ macerata fuerit.

Emplastrum hoc idem præstabit: R̄. Rosas rubras puluerifatas: coquantur in aqua Rosarum ad consistentiam: addendo parum succi Pomorum, & Aceti, adde cort. Citri, Santalum: Applicetur emplastri instar pulsibus.

Oleo Scorpionum composito contravenena, pulsus inungit Marthiolus.

Quod & Balsamis dictis, sicuti in prophylactis dictum est, fieri potest.

Sacculus loco epithematum, vt illic quoque ostensum, cordi & pulsibus apponitur.

Hepati epithemata & vnguenta refrigerantia, roborantia, vt in febribus putridis explicatum, adhibebimus, Vti & renibus, si illi nimium incallescant.

Cerebri causâ, capiti Oxyrrhodina, si incaluerit, imponuntur.

Ventriculi quoque habetur ratio, eum inungendo si debilitatus sit.

Testibus etiam ad moderandum calorem & refocillationem, cum magnum consensum cum principibus partibus habeant, aliqua admoveantur: Vt, R̄. aquæ Ros. ʒ. iij. Aceti ros. ʒ. β. Vini generosi ʒ. j. succi Granat. ʒ. β. Madeſiant panni & applicentur.

Aëris locique emendatio plurimum ad alterationem facit. Quod fit, si ab alijs ægris infectis in locum salubriorem separentur: Aër salubris intromittatur: Industria, lintamina, lecticinia, culcitæ, conclauia, sæpe permulentur: Atque cubiculum Aceto ros. aquâ Lauandulæ, Rosarum, Citrangulorum, irroretur, illisque fornax hyemis tempore conspergatur. Vti æstate, si herbis & fructibus illud fiat: Suffumigeturque, vt in prophylactis

phylacticis dictum fuit: Et suauia æger, vt illic quoque ostensum, odoretur.

Virium autem conseruandarum causâ, viuendi ratio talis instituitur.

Cibus (secus ac in alijs febribus continuis acutis) sæpè illis exhibendus, idque propter vires, quæ subitò restaurari debent; Parùm tamen per vices, ne grauet, offerendo: Et si comedere nolint, eos cogendo: Euchymus autem, & qui parua quantitate multum nutrire & roborare possit, dandus.

Veluti iusculum & caro pulli, hœdi, autum nemoralium, perdicum, vituli: è quibus varia fercula & inprimis congelata, vt superius dictum est, fiunt. Oua cum faciliè corrumpantur, vt in pingua, festius omittuntur. Fructus aliaque, vt in febribus putridis dictum, conceduntur. Cibique aceto, succis acidis, & alijs, condiuntur & corriguntur.

Potus ipsorum Aqua præp. Iulepi, decoctum vel aqua Caponis, virium causâ esse debet. Vinum bene dilutum eadem ratione conceditur, quod tamen temperatè bibant.

Somnus, dum sudant, inhibendus. Quem aliqui ante viginti quatuor horarum spacium, præsertim anthrace apparente aut bubone, non concedunt. Qui tamen cum vires restaret, & in somno ad exteriora potius quàm interiora calor, vt alibi ostensum, feratur: non vltra modum inhiberi debet.

Lætetur & bene speret, spe vitæ præsentis retinendæ diutius, vel æternæ obtinendæ.

Symptomata, quorum in febribus pestilentibus potissimum est habenda ratio, sunt sequentia, Bubo & Anthrax: quæ duo, quâ ratione gubernari, & in ea loca, vbi hæc se manifestant, venenum trahi, & postea curari debeant, suis locis explicabitur.

Virium prostrationi inprimis, sicuti in alterantibus & viuendi ratione explicatum, subueniendum. Et si Syncope superueniat, vel Cordis palpitatio, cordialia enarrata, intrus forisq; administranda. Quod si syncope stomachi causâ accidat, ventriculus inungendus, fouendusque. Vinumq; laudatum exhibendum. Panisque in succo Granat. Agrestæ & Vino intinctus propinandus. Manusq; & pedes in aqua calida immergenda. -Extremaque, & facies fricanda.

Delirium & Vigiliæ, Catulo applicato, Opiatis, Extremitatum lotionè, alijsque, corriguntur. Somnus si profundus sit, cum obstit, impediri & Oxyrhodinum applicari debet.

Sitis, potu, iulepis, alijsq; iam dictis corrigitur: quod & iulepus hic præstabit: R. aquæ ex Acetosa, & Panis è Rocka recentis destillatæ, quæ valde dulcis & suavis ana ʒ. vi. aquæ Ros. Scabiosæ ana ʒ. iiii. aquæ Verbenæ, Buglosi an. ʒ. ij. fiat iulep. cum Saccharo: Detur tempore sitis.

Vel conditum: R. confer. Acetosæ, Rosarum an. ʒ. j. rob de Ribes ʒ. j. β. spec. Diamarg. frig. ʒ. j. Sacchari ros. tab. q. s. fiat conditum.

Diarrhœa si accedat, cum periculosa sit, Clyster abluens ex aqua Hordei cum Saccharo inieitur.

Et: R. rad. Tormēt. ʒ. β. Boli Arm. Cum Vino stiptico datur. Vti & aliæ confectiones ad hanc rem vtiles. Venterq; stipticis inungitur.

Abortus mulieribus grauidis peste laborantibus facillimè superuenit: quem, cum lethalis ferè sit, cauere oportet.

Reliqua symptomata, vt Linguae & Faucium vitium, aliavè, hic nihil peculiare, ab illis, quæ in febribus putridis accidunt, in emendatione requirunt.

Venenatæ febres, quæ à veneno, per mortuum virulentæ bestiae cor inflammante accidunt, paucis horis, vel primo die, sæpè, nisi suppetias feramus, interficiunt.

Curatio autem harum præcipua in eo consistit, vt venenum illic, vbi corpus subijt, & plaga apparet, retrahere varijs artibus studeamus. Atq; antidoto, prout venenum fuerit, illius vires infringente vtamur. Sicuti hæc alibi in venenis copiosè explicata sunt.

Febris autem occasione, si ea magna sit, Alterantia, Vinum animiq; defectus causâ, cordialia extra intusque vsurpata, sicuti iam sæpè ostensum est, conueniunt.

Hæctica febris solitaria, siue febres continuas, diarias, vel putridas diuturnas, ardentis (non ea quæ colliquans dicitur, & ardentis febris est symptoma, non noua febris) vel intermittentes, aut hæmitritæos sequatur, sitque iam simplex & sola, & à febre, quæ eam præcessit atque excitauit, libera, (nam de alia in compositis febribus agemus) tunc

prout vel non ita pridem incepit, vel aliquotusque progressa, vel iam confirmata est, prædictionem & curationem instituere oportet.

In iunioribus adhuc & infantibus, vti facile cordis ipsorum, vti dictum, temperamentum, etiam leuioribus de causis alteratur, & mutabile est, ita & facilius in illis alteratum ad temperiem rursus reducitur. Ob quam causam & hæctica in illis, nondum tamen confirmata, sæpe quoque sanatur. Quæ in adultis longè difficilius, atque ea tantum quæ vel incipit, vel nondum diu perstitit, sanatur. In senibus verò quocunque modo se habeat, incurabilis ferè existit.

Curatio tamen in omnibus tentanda. In qua morbi causa, cum sit temperamenti cordis, & solidarum partium in calidius & siccus permutatio permanens, nec humor aut excrementum illud amplius foueat, corpusq; iam à febre prægressa inanitum exiccatumq; sit: euacuantia hic prodesse non possunt, catharticaq; proin locum minimè habebunt, nisi fortè excrementorum & cruditarum in hoc longo morbo prouentus id exigat, tunc enim leuiora clysmata vel laxantia tantum id præstabit. Sed alterantibus in temperiem hanc corrigere vel reducere studebimus: Viresque quæ labuntur, sustentare: Et accidentia, si quæ accedunt, grauiora corrigere.

Alteratio in principio præcipuè humectantibus siccitatem illam partium & cordis, leuiterq; simul refrigerantibus, cum calor tam intensus minimè sit, & moderate frigidis vel temperatis contemperari quoq; possit, perficitur. Proin & narcotica, quæ maioris refrigerationis causâ aliqui exhibent, nos verò cum minimè frigida esse, & potius corpus inde incalefcere, alibi ostenderimus, studio, nisi vigiliæ vrgeant, omittimus. In progressu verò cum iam consumptio incipit, reficientibus, tunc maximè opus erit. Quod alimentosis, humectantibus potius quam alijs vehementioribus remedijs præstatur, cum illa ad partes nutriendas tracta vndiq; in corpore suas vires rectius exerant. Hæc autem internis, externisque remedijs hoc modo fieri poterit.

In cibis commodè hæc, quæ exhibentur, dantur, cum & alimenta quædam, præter

quam quòd reficiunt, simul humectant. Quæ proin hic eligimus, illisq; interdù, quæ humidiora magis sunt restauratq; permista, propinamus. Qui elixi magis humectant, sed aysi humiditatè substantificam magis augent.

Caro vitulina, hædina, & porcellorū laudatur. Cerebrum item porcellorū, & vituli.

Gallinacea item caro. Capi vel pulli gallinacei si nutriantur hordeo, vel saginentur pasta intrusâ formâ pilularum, quæ paratur ex carne cancrorum fluuiatilium, & ranarum cum farina tritici, vel hordei subacta, in hoc casu vtilissima.

Auēs quoq; competunt, elixæ potius vel leuiter assæ, nam in bilem, si nimis torrentur, facile conuerti Gal. testatur, quod ego tamen lardi causâ potius euenire puo. Harum cerebrum & testes præcipuè profunt.

Pisces saxatiles conueniunt, Canceri fluuiatiles, Testudines nemorales, & aquaticæ, Ranæ præsertim, hæcticis accommodati sunt cibi, Limaces quoq; aliqui probant, alij, nec immeritò, cum tenacissimi sint, improbant. Contusum Carthusianorum ex caudis Cancrorum fluuiatiliū, Hordeo, Amygd. & Saccharo paratum, mirè commendatur.

Oua probantur, vitelli imprimis, maximè cum Vino & Saccharo cocti, vti nostrum Weinwarm / Caseus item recens & Recoctum non improbantur.

Ex cerealibus, Panatella dicta vtilis, quæ ex Pane loto, expresso cectoque in brodio paratur. Vel tale ferculum: R. medullæ Panis lotæ in lacte, & postea cum Lacte amygd. aqua Rosar. & Saccharo permixtæ. Psisana item seu cremor Hordei, qui si ex auena paratur, cum decocto carnis, vt humidior sit, misceri debet.

Amygdalæ, Pinei nuclei, Pistacia, per se, vel cum Lacte, vel Saccharo prius obducta, comesta, aut alio modo ferculis permista.

Ex oleribus in cibis, rad. Eryngij, Satyrionis, & Tragopogi flore purpureo, Portulaca, Buglossum, Malua, Violaria, Endiua, Spinachia, Beta, Caules, Fructusque humidi varij: diuersimodè præparata, vsurpantur, alijsq; supradictis permiscuntur.

In potu, quo ægri magis delectantur, & reficiuntur, & recreantur, cum & sitim illis perferre



ferre fit noxium , hæc commodè exhibebuntur.

Vinum vinosum , hoc est medium inter dulce & acidum , quia temperatum est , & inter omnia reficientia præstantissimum confuetis conceditur . Si fortius sit , diluendo contemperamus . Quod dulce est , sæpè nimium bibitum corpus accendit , nec in hac specie , vt si cum phthisi hæctica copulata est , tussisq; adsit , vti & alia dulcia competunt .

Lac , vbi manifesta iam apparet consumptio , & nulla suspicio amplius seminum relictorum putridæ febris adest , vtilissimum est . Exhibetur autem longo tempore , indies : primum 3. iij. & ab illis ad ℥b. j. sensim ascendendo . Muliebre , si à muliere , quæ à partu menses quatuor superauerit , desumantur , optimum est . Inde primas tenet asininum , quo si vllò modo hæctica sanari potest , sanari posse creditur . Caprinum deinde , butyro prius detracto , præ cæteris laudatur : in quo si corruptio timetur , addito Saccharo præcauetur . Si alui profluuium metuitur , chalybeetur : Reliqua in phtyficis , quibus potissimum conuenit , explicabuntur .

Lac Amygdalinum , præstantissimum est remedium , additis interdum Pineis , f. Cucurbitarum & Melonum emulsionibus : vel etiam feminis Papaueris .

Vel si decoctum Capi , colatum à pinguedine , continuò bibant . Vel ex pulpa Capi & caudis Cancrorum decoctum in vsu habeant .

Decoctum Hord. in iure Pulli factū , vtile .

Iulepus talis exhiberi potest : ℞. aquæ Violarum , Rosar. an. quart. j. Sacchari albif. ℥b. β. aquæ Buglossi 3. ij. coquantur in formam iulepi : Viatur cum Aquâ coctâ , vel Iure non pingui , vel Hordei decoctio .

Vel sic : ℞. succi Portulacæ ( quem mirè in hoc casu extollunt ) 3. iij. succi Buglossi 3. j. depurati prius , coquantur cum Saccharo ad formam iulepi mediæ consistentiæ , Cuius bonam portionem frequenter capiat .

Pimpinellæ & Raparum succos sunt qui commendantur .

Syrupus alius : ℞. radic. Bugloss. Eryngiorum rect. an. 3. ij. Satyrionis 3. j. Liquiri-

recent. 3. iij. Lactucæ , Portulacæ an. M. j. flor. Viol. Buglossæ , Borrâg. an. P. j. Iuiub. Sebesten an. P. viij. seminum Cucurb. conuas. 3. ij. fiat decoctio & colaturæ adde Sacchari q. s. arom. 3. j. Sant. rub. fiat syrupus , decoctus ad consistentiam , vt diu asseruari possit , Vel bibat illum per se vel dissolutum .

Aquæ Portulacæ & Scabiosæ , infantibus præsertim , cum ægrè medicamentosa sumant , dantur . Carnis item & imprimis Limacum & Cancrorum fluuiatilū aquæ , & è Sanguine humano recenti extracta , valde quoque commendantur : quæ si confert , & illa quæ è Lacte recenti elicitur , æquè erit vtilis .

Vel composita hæc : ℞. iuris Caponis bene cocti , de pulposa ipsius carne , mens. j. adde carniū Testud. nemoralium vel Cancrorum , vel Ranarum an. P. j. conf. Rosar. Borrâg. Bugloss. Scabiosæ , Violarum an. 3. j. spec. Diamarg. frig. Diatragac. frig. an. 3. j. Cinam. 3. ij. eliciatur aqua sec. art. Aurum & alia inutilia hîc omittimus .

Confectiones variæ restaurantes potissimum sunt , quas gratas quoque , cum diu illis in hoc morbo diuturno vti debeant , quoad fieri poterit , parabimus .

Martius panis dictus , & gratus , & conueniens illis erit . Qui & sic fieri poterit : ℞. pastæ , ex quo Martius fieri solet , ℥b. j. adde nucleorum Pinearum quartarium β. & sem. Cucurb. mundata ad 3. j. in Lacte prius macerata , & postea contusa , spec. Diapen. Diatrag. frig. an. 3. j. Diamarg. frig. 3. β. misce. formetur placenta , coquatur sec. art. .

Vel sic : ℞. pulpæ Caponis , pulpæ coxarum Ranarum , pulpæ caudarum Cancrorum fluuiatil. coctarum in aqua Portulacæ & Rosarum an. quartarium β. contundantur optimè , addendo Amygd. dulc. mund. 3. ij. nucleorum Pinearum & Pistaciorum macerat. parum in Lacte prius , an. 3. j. f. Cucurb. mund. 3. β. Amyli 3. ij. Sacchari albif. quart. j. Margarit. contus. 3. β. irrorentur paucâ aquâ Cinam. fiat pasta cum Lacte , & Vitellis ouorum duorum , coquantur in clibano , fiant parui panes : Viatur .

Vel hoc modo : ℞. pulpæ coxarum Ranarum , & Cancrorum fluuiatilium an. quar-

tarium.  $\beta$ . vel Testud. nemoral. si haberi possunt, coquantur in aqua Portulacæ & Hordei mundi, addēdo quatuor seminum Frig. mai. rec. mund. an.  $\mathfrak{z}$ . j. feminis Papau. albi rec.  $\mathfrak{z}$ . ij. Passul. enucl. Sebesten. an.  $\mathfrak{z}$ . j. dein hisce pulpis permisce, spec. el. Resumptiui, Diatragac. frigid. Diapenid. sine speciebus an.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . nuclé. Pini & Pistac. an.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Sacchari penid. candi, an.  $\mathfrak{z}$ . ij. cum inf. gummi Tragac. facta in aqua Ros. (sic enim minus corrumpuntur) hant tabulæ, vel pandalia, vel aliæ placentæ ad vsum.

Saccharum Rosarum tabulatum in frequenti vfu habere debent, vel illius loco saccharum in aqua Violarum, Portulacæ, coctum in tabulas, vsurpare.

Condito hoc quoq; vti possunt:  $\mathfrak{R}$ . conf. Viol. Portulacæ, Buglosi an.  $\mathfrak{z}$ . j. conf. Ros.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . sp. Diamarg. frig.  $\mathfrak{z}$ . j. Sacchari q. f. fiat mixtura.

Inter externa remedia. Aër vduus non nihil, & gelidus, magis illis quàm calidus & siccus conuenit.

Balnea corpus humectantia & leuiter refrigerantia, cum hecicorum partes aridiores & calidiores sint, relaxantiaq; vt sic nutrimentum melius eo peruenire possit, easque alere, valde hecicis conueniunt. Quæ veteres tribus modis hoc ordine administrabant. Primumque ex aqua calida, vt relaxaret: secundum ex tepida tantum, vt humectaret: tertium ex frigida, vt poris condensatis humiditas attracta minus expiraret, parabant: vel aqua frigidâ illius loco post balneum corpus perfundebant.

Nostro verò sæculo, ex aqua fit fluuiali, vel pluuiali, quæ melior censetur, eousq; calefacta, vel si nimium incaluit, rursus sponte refrigerata, vt illius vfu, nec corpus ultra suum naturalem calorem incalescat, aut eger sit corripitur, nec sudet, quod hic minime requiritur. Quo & non longius quàm hora vna semel aut bis in die, ante cibum corpus reficiendum erit, aut si illud bene ferre possit, paulò diutius in eo moram trahere sinemus. Sed & vaporem balnei per pannu lineum vt excipiant, antequam corpus balneo immergant, aliqui vtile esse censet.

Artificiale balneum ex radic. Althææ,

Malua, Violaria, Portulaca, Buglossio utroque cum radicibus, flor. Chamamel. in decocto pingui vel Intestinorum, & capitis Vituli, vel Veruecis, decoctis præparatum, accommodum erit. Cui in diuitibus, Lac. Oleum, Butyrum permixta, illud efficacius reddent.

Thermas Sulphureas, si ad manū essent, successiue & per horas, vti dictum, vsurpatas, cum admodum corpus inungant, sicuti experientia comperi, non improbarem.

Inunctiones post balneum, vel etiam extra hoc tempus manè & vesperi, eiusdem utilitatis causâ instituuntur. Sic spinam dorsif. hypochondria, ventrem, oleis relaxantibus vngimus.

Vel sequenti:  $\mathfrak{R}$ . mucilag. semin. Psyllij, Cydon. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . gummi Tragac. infusi in Lacte  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Butyri rec.  $\mathfrak{z}$ . j. axung. Gallinæ puli, quæ albâ est, & Anatis an.  $\mathfrak{z}$ . j. olei Amygd. dulc. ol. Violacei ana  $\mathfrak{z}$ . ij. Cerae albæ parum, fiat linimentum.

Pectoris & cordis regio hoc modo inungi potest:  $\mathfrak{R}$ . ol. Violar. ex semine Cucurbit. Amygd. dulc. an.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . axung. Anatis  $\mathfrak{z}$ . j. vngatur pectus, quod & vnguento Resumptiuo commode præstat.

Sunt & qui hepatis regionem ipsam inungunt, quod tamen, cum hic multum iuuare non possit, ventriculum verò nimis laxando plus noceat, omittimus. Multò minus carnes, vt aliqui fecerunt, vnguentis permiscemus.

Epithemata pectori vniuerso, & cordis præsertim regioni, & pulsibus quoque, cum & arteriæ calidiores sint, vtiliter adhibentur. Quale hoc est:  $\mathfrak{R}$ . emuls. Amygd. factæ cum decocto Hordei & Portulacæ, & Violarum q. f. adde Butyri rec. axung. Capi portionem, & in eo intincti panni tepide pectori applicentur.

Cordiale epithema:  $\mathfrak{R}$ . aquæ Violar. Ros. Portulacæ, Scabiosæ, Borrag. Bugloss. ana  $\mathfrak{z}$ . ij. succi Pomorum  $\mathfrak{z}$ . j. succi semperuiui, vel Lactucæ  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Vini albi  $\mathfrak{z}$ . j. succi Limonum  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . (acerum propter illius siccitatem omititur) misce.

Ventriculo Portulaca contusa si applicetur, à multis iuuare in hecica censetur.

Frictiones extrinsecus, post balnea, sed leues, vt corpus melius nutriatur, profunt.

Virium causâ iam enarrata quæ exhibentur alimentosa, illas simul restaurant. Imprimis verò in victus ratione sæpe & parum eum sumere, vti omnium qui imbecilles sunt, & restauratione opus habent, & quorum corpus absumitur, sic & hecticorum est conueniens regula.

Verum & per clysmata injecta, in extreme debilibus, præsertim si ob cibi fastidium, aut aliud incommodum, eum difficulter sumât, nutrirî eos posse persuasum multis est, hoc modo: R. Lactis tb. ß. brodij Caponis ʒ. ij. vitellos Ouorum ij. Injiciatur, diuq; retineat, & sæpe repetat.

Præcipue verò quæ vires dejiciunt, vitanda. Vti inedia, cum & famem tolerare malû sit. Item motus validi corporis & animi. Vigiliæq; cum somnus illis plurimum conducatur. Omnisq; inani coitus in primis nocet.

Accidens præcipuum, cuius ratio habetur, si superueniat, alui fluxus est, qui si perseueret mortem accelerat: cui symptomati inunctione ventris, alijsq; prospicimus.

Interim tamen constipatio alui, si consuetâ sit, illis negotium quoq; facessit: cui medebimur clysmate injecto, quod & simul humectet & leniat, hoc modo: R. brodij Pulli, vel intest. Veruecis, bulliant in eo sol. Lactucæ & Maluæ, dissolue in col. Cassiam vel pulpam Tamarind. ad ʒ. j. ol. Violarum Nemph. an. ʒ. ij. Mellis ʒ. j. Detur.

Vellenis exhibetur potio: vt Manna cum Pulli brodio, vel Cassia, vel syrupus Ros. sol. aut Violarum.

Compositas febres eas potissimum esse diximus, cum diuersi generis febres simul ægrum occupant. In quibus etiam præcipue cura variat: Nam si ex illis quæ vnius sunt generis putridæ duæ, vel tres etiam febres, vt duæ continuæ, vel duplices intermittentes, aut triplices concurrant: cum ratione causæ non aliter, quàm quod diuersis in locis in iisdem tamen vasis, putrescens, diebus non iisdem exacerbetur, febres hæ inter se differât, pluresq; proin potius quàm compositæ tunc se offerant febres: curatio quoq; eadem, ac si vna tantum esset, vti iam

in putridis intermittentibus & continuis dictum fuit, adhibetur.

Diuersi verò generis si febres inuicem componantur, quod duobus præcipue modis fieri diximus: Cum nimirum putrida continua, cum putrida intermittente copulatur: Vel putrida continua aut intermittens cum Hectica iungitur: cum causæ diuersæ admodum concurrant: curatio vtriusq; tunc accommodanda est, & à simplicium curatione non nihil eatenus offert.

Continua namque putrida si intermittēti, in Hemitritæo dicto iuncta sit, cuiuscunq; speciei ea sit, cum causâ gemina adsit, & putredo tam in venacaua quàm in venis mesentericis consistat, & non solum indefinenter ægrum grauitè affligat, sed & altero tertio die, nouo horrore superueniente, caloreque, & illius symptomatis, magis augeatur, periculosam eam omnem esse prædicere possumus. Præsertim si graue symptoma, vt syncope, in ea quoq; quam Syncoalem vocant, tunc quando febres concurrunt, se offerat. Sed & eo nomine hemitritæus noxius, quod in hecticam sæpe conuertatur, vel hydropem post se relinquat, esse solet.

Curationem verò hemitritæi eandem quam in reliquis febribus (in facibus communibus primùm educendis: venæ sectione vtriusque materiei; purgatione: & per vrinæ sudoresque euacuatione, vna pluribusque repetitis vicibus) Præctici instituunt, & humoribus singulis, vel biliosis, vel pituitosis, vel atrabiliariis, prout febrem ab illis nasci putant, accommodant. In primis verò ad syncopen emendandam omnes remedia describunt, & cordialibus etiam, quæ venenis resistunt, & pestilentie antidota sunt, permiscunt.

Nos verò, cum hoc symptoma vrget, in primis quoque huic attendendum cordialibus remedijs, vt in syncope aliarum febriū dictum fuit, intus forisque admotis, censemus. Et quod febrem attinet, pro ratione corporis constitutionis, & humoris prædominantis, sic remedia, euacuantia, præparantia, alterantia, dirigenda, vt prout vel paroxysmi vrgerent vel cessant, sicuti in continuis

& intermittentibus dictum fuit, remedia ea, qualia illis quoque locis dicta fuerunt, disponamus. Et si reliqua quoque præter animi defectionem accedant symptomata, ea, sicuti in fine singularum febrium, tam continuarum quam intermittentium dictum fuit, corrigamus.

*Hæctica  
campu-  
rida fe-  
bre co-  
pulata,  
cura.*

Hæctica, si febrem, à qua prodijt, adhuc comitem habeat, vix synochus pura, cum illa non supra triduum aut quatrivium perseueret, erit. Sed vel putrida quædam continua diu perseuerans: (cui hæcticam copulatam esse, ex consumptione corporis maiore, quam alias fieri solet, cognoscimus) vel intermittens potius aliqua diuturna tertiana, vel quartana: tuncq; non solum ex marcore, sed & ex pulsu febrili, paroxysmo cessante, hæcticam deprehendimus. Quod cum fit, vtriusq; ratio habebitur, sequenti modo.

In concoquenda materia, obstructionibus aperiendis, hæcticæ causâ quædam adjiciuntur, hoc modo: R. syr. Endiuie Viol. an. ʒ. j. aquæ Endiuie, Portulacæ an. ʒ. ij. misce. aromat. sp. Diam. frig. Capiat per aliquot dies.

Purgetur leuioribus hoc modo: R. Rhabbari el. ʒ. j. infunde in aqua Endiuie, Portulacæ, exprimat, adde syr. Ros. sol. Man. an. ʒ. j. fiat potio.

Quæ præparantia & purgantia, si febris illud exigat, nec hæcticæ obsint, reiteranda quoq; erunt.

Alterantia egregiè hic humectare, propter cordis intemperiem, in hæctica debent, ob quam causam potus liberalior in illis conceditur. Lac verò propter putridam febrem, in qualac, vti & capite dolentibus dare malum, vt inquit Hippoc. non conceditur, nisi fortè ob consuetudinem extra paroxysmum aliquid illis permittatur.

In iulepis, conseruis, alijsq; formis exhibendis, humectantia in hæctica explicata, illis quæ ratione febris continuæ, vel intermittentis, obstructiones soluere debent, vel putredini resistere, & refrigerare permisceri, sicq; vsurpari possunt.

Epithemata in primis, tum cum metuitur hæctica in febribus, & cum iā adest, cordi, pulsi, & hepatis, eò frequentiora, magisq; refrigerantia & humectantia apponi debet.

Balneum quoque si nihil aliud impediatur, præsertim in quartanis, eò citius, imperare conueniet.

Comitatæ febres alio aliquo morbo, siue primariæ sint & morbum præcedant, siue symptomaticæ & morbum sequantur, curâ quoque potissimum differunt: quatenus, vel cum erysipellate, vel bubonibus, vel cum morbis alijs calidis, vel cum ecchymatibus aut exanthematibus, vel cum pustulis alijs, vel cum phthisi, aut cachexiâ, vel cum alijs accidentibus retentorum in corpore, hæc febres se produnt. Sicuti singulis sex generibus comitatarum febrium curationes hoc ordine subijciemus.

Cum erysipellate, vel bubonibus quæ se Synochum offert febris, si adsit, quam synochum seu ephemeram hisce comitatam appellauimus, nostriq; Carsum el vocant: eodem modo quod febrem attinet, vti solitaria, nisi quoque permurentur, finiuntur: nec aliter affectus hic, nisi hoc tumorum, quos produxit, causâ fiat, vti mox dicetur, periculosus est. Eo tamen nomine, quod sæpe in quibusdam naturis: quibus vti podagra familiaris, annuatim, vel etiam frequentius redire solet, quod eo sæpe affligantur, debilitenturq; præsertim si etiam podagra illos infestet, vti sæpe fit, molestus grauisque existit: idque senibus præsertim, quibus & hic affectus infensus esse solet, eosque frequenter inuadere, accidit.

Quorum causâ & quia grauius accidens metuitur, non solum ob tumores quos protrudit, verum & quia inflammationes internas etiam proferre posset, in primisque vti obseruaui, peripneumonias & pleuritides: vt illa declinemus, tum antequam inuadit, febrem hanc præcauere, tum quando inuasit, eam decenter curare, sicuti breuiter declarabitur, oportet.

Præcauebimus autem hanc febrem synochum comitatâ, si sanguis redundet, prouentum illius impediendo: si calidus & feruidus, eum contemperando: si tenuis, illum incrassando: si impurus, eum ab ichoribus, serositatibus, alijsue excrementis repurgando. Quod sequentibus præsidij perficitur.

Venæ sectio in plethoricis faciendâ annuatim



nuatim veris & autumnis, & si opus sit, inter-  
medijs quoque temporibus.

Scarificatio ad præcautionem à Germ. no-  
fris singulare censetur esse præsidium. Vn-  
de singulis mensibus ad impediendum hunc  
affectum in scapulis scarificatione, adhibitis  
post eam cucurbitulis, vti solent.

Purgationes hoc nomine, bis quoque an-  
no, post & ante hyemem, instituuntur, qui-  
bus corpus ab excrementis supradictis mun-  
dum reddere studebimus: atque etiam, si ca-  
cochymia adsit, frequentius. Intempestivas  
autem & violentas purgationes, hæc febres  
promouisse potius, commotâ materiâ, quàm  
impediuisse obseruauimus.

Serum caprinum, in quo teneritates Lu-  
pulorum, Fumariæ, Sambuci germina noua,  
Sena, Epithymum, Polypodium decocta,  
quantitate conuenienti, fuerint, toto Maio  
mense, vel aliquandiu vsurpatum, nisi aliud  
impediat, in robustioribus & iunioribus val-  
de conuenit.

Apozemate hoc illius loco diu vti poteris;  
℞. Polypodij querc. rec. ʒ. iij. vel sicci, fol. Sen-  
næ ana ʒ. j. β. Carthami ʒ. j. Thymi, Epithy-  
mi ana ʒ. β. Tamarind. ʒ. ij. rad. Lapati, ʒ. j. Li-  
quiritæ ʒ. j. β. rad. Cichoræ ʒ. ij. herb. Viol.  
Endiuia, Lactucæ, Buglosi ana m. j. Pruno-  
rum, Sebesten an. p. xx. Passul. p. x. sem. Anisi  
ʒ. β. flor. Cord. an. p. j. f. Cucurb. ʒ. β. fiat deco-  
ctio, & in tñ. col. dissolue succi Rosar. & Bu-  
glosi ana ʒ. j. succi Pomorum redol. ʒ. iij. vel  
Sapæ ex pomis ʒ. j. Sacchari q. s. fiat syr. clarif.  
& arom. pauco Cinam. coquatur ad mediam  
consistentiam vt diutius remaneat. Capiat  
ab ʒ. j. ad maiorem quantitatem ascenden-  
do, per se, vel cum fero, aut alio liquore.

Acidarum aquarum potus aliquandiu con-  
tinuatus, vt consuetum est, septimanis ali-  
quot, nisi quid obstat, multos ab hoc affectu,  
prius illis familiari, præseruauit.

Quarum loco & alijs quæ assumuntur, he-  
par calidius, aliaque viscera, spiritus & san-  
guinem contemperantibus, præcautionis  
loco, vti possunt.

Sudores frequenter & decenti tempore  
mouere, hic vtilissimum, quibus sanguinis  
massa à tenuioribus præsertim excrementis,  
bene repurgatur. Quod exercitijs & stuphis,

nonnunquam & exhibitis eos promouen-  
tibus, molimur.

Victus inprimis decet quantitate & mo-  
deratione obseruatâ. Cauendoque ab omni-  
bus quæ sanguinem, spiritusq; facile accen-  
dunt, illiusq; fluxum concitant.

Curatio autem huius affectus, partim febrî,  
partim morbi comiti accommodatur. Et quod  
febrî attinet, quod natura in hac febre spon-  
te mox ab initio tentat, per transpirationem  
sudoresve, euaporationes illas à sanguine ac-  
censo eleuatas discutere, & per corporis ha-  
bitum occultè manifestè expurgare: illud  
idem nos tentare, naturæq; hunc motum iu-  
uare, studebimus: vt sic aliquâ portione de  
causa morbifica detracta, nulla, vel non ita  
magna sanguinis in adenes, aut cutis super-  
ficiem, & præsertim in alia loca interna, quod  
grauius esset, effusio fiat: inprimis vt per hanc  
viam causa morbi potius resoluitur, quàm  
in alias, in quibus novum dâmmum adferret,  
& morbum, propellatur. Ob quam causam,  
si natura, quod aliàs in syncho solitaria tar-  
dius facit, hic mox aggrediatur, & ad sudo-  
res corpus inclinare videatur, statim ab ini-  
tio quæ illos euocant, non tamen violenter,  
ne corpus iam prius supercalefactum magis  
accendatur: aut quæ facilius saltem sudent,  
adiumentum præbent, adhibebimus.

Quo nomine æger quietus & rectus esse  
debet, & ne aëri frigidiori se exponat cau-  
endum: in quo si peccetur, cum in periculum  
magnum aliquos adduxerit; tantopere fri-  
gida & madida in hoc affectu extrinsecus ad-  
hibere nostri metuunt, nec etiam vt erysipe-  
lari adhibeantur, permittunt.

Decoctum Hordei vt affatim bibât, aliqui  
docent, & vt materia melius euocetur, len-  
tes in eo decoquunt, & sicuti in cethymatum  
febris ad sudores eliciendos, exhibent.

Aquæ variæ stillatiæ propinatae idem  
præstant. E quibus tamen hic temperatioris  
ratione febris potius sumenda sunt: vt Vio-  
læ tricoloris, quæ mirè in hoc casu commen-  
data est. Fumariæ item, Cardui ben. Calen-  
dulæ, Cerefolij, quæ etiam quando an pestis  
sit dubitatur, cum simili modo, sicuti dictum,  
hæ febres inuadant, quippe quæ in vtrisque  
conueniant, certius exhibentur.

Quibus aquis interdum rob Sambuci, vel Ebuli vulgò & nonnunquã syrupus de Ambrosia, Theriacaq; permiscuntur. Interea tamen dum sudant, nonnihil quoque & præsertim eo peracto refici debent.

Sanguinis emissio non tantopere hîc vt in solitaria necessaria est, nisi plethora & metus grauioris internæ inflammationis ex illius præludijs quibusdam conceptus, eam suadeat, cum quæ in emunctoria corporis & extremitates hîc sit sanguinis profusio, non adeò sit metuenda, vt sanguinis detractione impedienda sit.

Alvus verò si constipata sit, eo modo, vt in synocho solitaria lenienda erit, & nonnihil quoque si cacochymia adsit, sed lenibus, vt Cassiâ, Mannâ, sollicitanda.

Exhibenda quoque alterantia eadem, & si magnus calor sit, extrinsecus etiam adhibenda, quæ in solitaria exposita fuerunt.

Accidentia febris alia, vt illic quoque explicatum, corriguntur.

Bubones quod attinet, sponte plerunque iterum dissipantur, nec illis aliud quid applicatur, nisi quod si in nudis locis, vt collo erumpât, pannis aut pellibus inuoluntur, & ab aëre muniuntur. Non recte tractati aut irritati nonnunquã in abscessum, sicuti in bubonibus in praxi nostra explicatur, vertuntur.

Erysipelas quod concernit, illud quoque, vel mox postquã febris desijt, aut paulò post, remittit, discutiturque. Quod si verò admodum dolore ardoreve virgeat, vti suo loco explicabitur, sanatur. Sæpe malè curatum in erysipelas exulceratum, indeq; in deteriores affectus, aliquando & in gangrænâ, conuertitur. Quæ & causa, vt tam solliciti in hoc ne quid peccetur, existant: & quicquid illis, vel diu postea accidit, præsertim quæ externa vlcera, tumoresve, & lepra ipsa se offerant, à malè curato erysipelate, vel madefacto, vulgus hoc prodiisse sibi persuadet.

*Synochus* Cum morbis calidis, & præsertim inflammationibus, illorumq; accidentibus, si se febris synochus dicta aliquando (neque enim semper adest) offerat: fitque externa aliqua inflammatio cum tumore, vel contusione, vel vulnere, aut ictu sclopeti se manifestans, febremq; inducens: Si levis duntaxat sit fe-

bricula, illius causâ, non aliquid singulare tentatur, nisi quodd quæ tumorum horum causâ vsurpantur, febribus quoq; accommodantur. Qualia sunt venæ sectio, quæ revulsionis causâ, inflammationis nomine facta, hîc quoq; competit. Vti & alui lenitio, aliaq; alterantia varijs formis modisq; propinata & adhibita, è quibus aliqua in alijs febribus descripta hîc quoque conueniant.

In internis verò inflammationibus, & præsertim pulmonum, in pleuritide, peripneumonia, vel hepatis, lienis, aliorumve viscerum, ad inflammationes potius, quàm febrem, remedia diriguntur, cum febris hîc non adeò, vti hæc, virgeat, sponteque morbo declinante, nisi, vti in causis dictum, recrudescat, cesset. Ita tamen hæc administrantur, vt & febris nihilominus habeatur ratio, ne eam augeant. Quæ si, & morbo, & febri simul contraria sint, eo efficaciora erunt. Quod in sequentibus maximè obseruatur.

Sanguinis missio vtriusque nomine sumè conuenit, cum & in febre synocho præcipuum illius sit remedium, & inflammationis incrementum, cum à parte nobili sanguinem reucllat, impediât. Ob quas commoditates minimè negligitur, sanguisq; copiosè extrahitur, & phlebotomia interdum, nisi quid impediât, reiteratur.

Alvus si laxa seruetur, & clysmate alijsq; lenioribus laxantibus, & inflammationibus eiusmodi, & febribus, vtile. Validiora verò cathartica vtriusque noxia sunt, cum præter quàm quodd de causa morbi nihil educant, interea tamen corpus inflamment, sanguinemque fluentem in inflammationibus amplius concitent, viresque, quæ hîc maximè requiruntur, deiciant: eoque magis fugienda, scilicet vfu diarrhæam, quæ in internis inflammationibus periculosa & lethalis, ne superueniat, metuemus: Ab illorum itaq; vfu, in quo tamen empirici plerunque delinquant, cauendum.

Quæ exhibentur frigida, etsi & febri, & inflammationi contraria sint, hîc tamen habitâ ratione partis sic dirigenda, ne dum vni pro sint, alteri noceant. Etsi enim potus aquæ frigidissimæ febris synochi sit conueniens remedium, in internis tamen inflammationibus

nibus subitanèa repercussione noceret, ob quam causam minùs frigida exhibetur, sicq; præparata, vt parti simul appropriata sit: vt cum in pectoris affectibus expectorantia, in hepatis, obstructions soluentia, illi permiscemus. Ita & quæ acida sunt, etsi & febri, & plerisq; internis inflammationibus competant, tamen in pectoris affectibus, maxime si vim aliquam astringendi & austeritatem habeant, locum minimè habent. Quod non solum in potu, sed & in alijs medicamentis, iulepis, syrupis, conseruis, &c. obseruandum.

Extrinsècùs adhibita remedia, sic quoque vt vtrisque vtilia sint, instituuntur: inprimis verò inflammationi non obsint: vti epithemata, etsi in alijs omnibus febribus, cordis regioni adhibita profint, in pulmonum tamen inflammationibus obessent.

Vicinus ratio, quæ febris nomine tenuis esse debet, inflammationis causâ, præsertim dum materia adhuc fluit, talis quoque requiritur, vt sic dum partes ieiunæ alimenti loco sanguinem ad se rapiunt, minùs ille in partem affectam fluat.

Verùm quâ ratione inflammationes internæ, vt & alij morbi, quos febris comitatur, eosque vel præcessit, vel sequitur, tractari debeant, plenius in horum singulis affectibus in praxi nostra explicatur.

*Synochos, putridarum, malignarum, pestilencium febrium, Ethymatibus, Exanthematibus, & iudicantur, & tractantur.*

Cum ethymatibus, vel exanthematibus quæ se manifestant febres, quas Synochos, rariùs non putridas, frequentius putridas, frequentissimè putridas malignas, aliàs etiam pestilentes, hisce eruptionibus seu efflorescentijs comitatas esse diximus, pro diuersitate causæ, atque etiam ægrotantis ætatis, & iudicantur, & tractantur.

Minùs periculosæ sunt, si non à maligna causa prodierint: & tunc eundem decursum, vti synochus solitaria putris, aut non putris, seruant. Quod si maligna insuper accedat causa, nondum tamen sit pestilens: neq; hæc febres in infantibus per se sunt exitiosæ, si natura causam, quæ in sanguine est putris & maligna, egregiè per hæc eruptiones, maturè & copiosè erumpentes, in exteriora propellat: vti verò si hoc non fiat, periculo non carent, & præsertim si morbilli dicti,

fauces, pulmones, oculos infestantes, hisce partibus noceant. In adultis verò, siue pustulas siue maculas protrudēs sit febris, cum semper maligna subsit causa, eaque quæ diu sæpè antè in sanguine latuit, primisque annis aut nunquam in illis, qui non in iuuentute hæc passi sunt, vel non sufficienter in alijs fuit expurgata: periculosa omnis existit, processumq; malignarum febrium populariter aliquando grassantium seruat: licet hic affectus rariùs & priuatis tantum accidat. Ex pustulis tamen quoq; signa prognostica desumentes, si signis concoctionis apparentibus in vrinis, pulsu meliore existente, & reliquis febris accidentibus nonnihil remittentibus, erumpant, bonum; è contra malum. Febris autem pestilens si talis, quæ hæc potius quàm alia externavitia proferat, quod tamen rarum, regnet, plerunq; exitiosa existit: quâ ratione multa millia infantum aliquando è viuis sublata diximus.

Curatio præcipue in eo versatur, vt cum febris inuasit, & de illis efflorescentijs suspicio ex eo nascitur, vel quod tunc in locis vicinis inter infantes regnet, aut iam vestigia quædam illarum apparere incipiant, vt naturæ propellentis motum, eas quoque euocando, eoq; magis, si maligna subsit causa, expulsiuis dictis remedijs exhibitis, admotisque adiuuemus, alijsque & euacuantibus atque alterantibus febrem decenter regamus, viribus prospiciamus, & si quæ grauiora impendent symptomata, corrigamus. Quod hoc ordine fere perficitur.

Expulsiua dicta medicamenta exhibenda, quæ & putrem, & malignam materiam à centro ad superficiem propellunt, statimq; à principio vsurpanda: pro ratione causæ variantia, prout illa vel putris, vel maligna, vel pestilens esse iudicatur: ætatis causâ in iunioribus mitiora, in adultis efficaciora: Hoc modo, à leuioribus exordiendo,

Ex ficubus, lentibus & hordeo decoctum loco potus propinatum vtile est, hoc modo: R. Ficuum sicc. n. xij. Hordei, Lentium ana p. j. decoquantur: Bibat.

Vel: R. Lentium excort. Hordei ana p. j. Ficuum sicc. n. xij. Iuiubarum n. xv. Dactylo- rum n. iij. Passul. p. xx. rad. Liquir. 3. β. fiat de-

coctio, cui addi potest Saccharum, interdum Croci parum.

Vel, iam dictæ materiei, adde sem. Fœniculi 3.ij. sem. Cydon. gummi Tragac. Laccæ ana 3.j. Croci 3.β. fiat decoctio: Bibat.

Arabes hoc modo parare solent: R. Ficuum pinguium sicc. 3.ij. Lentium excort. Laccæ ana 3.ij. gummi Tragac. sem. Fœnic. ana 3.ij. decoquantur in aqua ad tertias.

Si obstructions adsint, & corpus caco-chymicum existat, hoc modo exhiberi poterit: R. rad. Graminis, Asparagi, Fœniculi ana 3.j. Liquirit. 3.j.β. fol. Acetosæ, & Capill. Ven. ana M.j. flor. Cord. P.j. Ficuum n.xx. Passul. enucl. P.xij. sem. Fœniculi 3.j. fiat decoctio. In dosi vna dissolue syr. de acetos. Citri, vel Limonum 3.β. Mithridati 3.j. vel plus, cum aquis Acetosæ, Calendulæ: Detur.

Item: R. seminum Cardui ben. 3.j. f. Napi 3.j. f. Citri 3.β. f. Acetosæ 3.β. contundantur, adde aquæ Cardui ben. Acetosæ, Veronicæ ana 3.j.β. exprimatur emulsio, adde syr. de acetos. Citri, vel Limon. 3.j. cornu Cerui vsti 3.j. Margarit. 3.β. Boli præp. 3.β. sp. Diamarg. frig. 3.β. fiat potio.

Vel: R. decoctionis Hordei & Lentiū q.f. adde f. Acetos. 3.j. gran. Paradisi 3.j. f. Citri 3.β. decoquantur: adde Terræ sigil. 3.j. Bibat.

Vel detur pulvis noster Prophylacticus, si non magnus adsit calor.

Velfic: R. rad. Myrrhidis (quæ nunquam omittitur si haberi potest) incisæ 3.ij. rad. Tormentil. Fraxinellæ an. 3.ij. f. Cord. an. P.j. Acetosæ M.j. Lentium M.β. Terræ Lemniæ 3.j. bulliant in aqua ad tē.ij. arom. Santal. citrin. adde Sacchari 3.v. Bibat sæpe ad libitum.

Vel detur sequens, quod valde convenit, & cuius usu, statim erumpūt maculæ vel pustulæ: R. Rhapont. veri. rad. Tormentil. Fraxinellæ. Graminis an. 3.j. aquæ Fontis mens. j. maceretur, postea bulliant ad consumpt. tertiæ partis, adde Sacchari 3.ij. Aceti 3.j. vel succi acetos. Citri 3.j. vel syr. illius 3.j.β. Bibat per biduum, vel triduum.

Vel si febris magna adsit: R. syr. de acetos. Citri, vel Limonum, de Acetosæ: vtatur. cum aqua costæ, vel alijs aquis, vt Acetosæ, addendo Bolum, vel puluerizatum Bezoarticum.

Inunctiones spinæ, quas & reliquo cor-

pori aliqui adhibent, morbillos quoque euocant, hoc modo: R. olei Amygdal. dulc. 3.j.β. ol. Chamæm. 3.β. Vnguenti resumpt. 3.j. Vngatur spina.

Fotus interdum eo nomine adhibentur calidi, R. fl. Chamæm. Meliloti, ana P.j. Maluæ M.j. fiat decoctio; pro fotu partium.

Sed & in lecto se contineant: aëriq; frigidò minimè exponant.

Scarificationes, adhibitis cucurbitulis, in dorso, pustulis & maculis etiam apparentibus, eas prouocant.

Frictiones panno, vt volunt, rubro, egregiè illas eliciunt.

Intuitum rerum rubrarum exanthemata rubra admodum prouocare vulgò creditur, eoq; nomine rubris quoq; integunt pannis: inter quæ ex scarlato tincta efficaciora esse creduntur.

Sanguinis detractio per venæ sectionem in brachio facta ab initio, si synochi hæc sint febres, cuiuscunq; generis, ad sanguinis accensi, vel simul putridi, vel maligni etiam portionem educendam, causamque sic minuendam, in adultis, plurimum competet. Quæ & infantibus maioribus, cum in minoribus natu non liceat, non inutiliter administraretur. Quæ tamen, si iam maculæ & pustulæ eruperint, ne naturæ motus impediatur, omittenda erit.

Si maligna admodum sit febris, vel etiam pestifera, quæ eiusmodi eruptiones exitiosas & contagiosas proferat, & præsertim in adultis, sequentiâ exhibere possumus.

Aluum tum ante venæ sectionem: tum si ea non fiat, in principio, si illa astricta sit, ne sæces calorem augeant, sed leuibus tantum laxamus. Idq; vel Clysmate iniecto.

Vel exhibita potione, qualis hæc exempli loco erit, in adultis, & infantibus quoq; sed minori quantitate, conueniens: R. flor. Viol. P.j. Sebesten. iuiub. an. n.x. Tamarind. decoctio diss. Mannæ 3.j. Cass. 3.x. fiat potio.

Fortioribus si vtendum est, quod in adultis interdum conuenit, nec ea tamen fortius operari debent, ne diarrhœa, vel dysenteria quæ meruuntur, superueniant: addendo illis semper quæ malignitati huic resistent.

Quale hoc est: R. Rhabab. el. 3.ij. Spi-cæ 3.β.



cæ ð. ß. Scordij 3. ß. Myrobal. citrin. 3. j. ß. infundantur simul in aqua Acetosæ, & Cardui bened. & in expressione dissolue syr. de floribus Persicorum, & Ros. sol. cum inf. Senæ ana 3. j. misce.

Vel: R. Trypheræ Persicæ, quæ valde laudatur, 3. vj. Mannæ 3. j. ß. syr. de Limoniibus 3. j. syr. Viol. Ros. sol. qui omnes cordiales simul sunt ana 3. j. aquæ Acetosæ, Scabiosæ, Cardui ben. q. f. fiat potio.

In forma pilul. hoc modo: R. Aloës ð. ij. Rhabbarbari ð. j. Myrob. ð. ß. Agar. ð. j. cum succo Acetos. fiant pilulæ.

Clysmata per vices injiciuntur, uti priora, vel hoc huic feбри accommodatum: R. Maluæ, Betæ, Mercurialis, Acetosæ, Buglossæ, Borrag. ana m. j. Melissæ m. ß. fl. Cord. Furfuris, Hordei an. p. j. fiat decoctio, dissol. in col. q. f. Trypheræ Pers. 3. j. Cassiæ 3. vj. Mellis 3. j. olei Viol. 3. iij. Salis parum, fiat Clyster.

Alterantia quod attinet, Refrigerantia & putredini simul & malignitati resistentia, eadem quæ in putrida febre continua & maligna descripta sunt, hic quoq; cõpetunt. Extrinsecus verò frigida, actu præsertim, applicare, ne fiat repercussio, non satis est tutum.

Vires resciantur iisdem. Et in cibo Lentæ & Hordeum quoq; competunt; Vinumque non nisi in declinatione conceditur.

Accidentia quod attinet potiora; Quo pacto pustulæ gubernari debeant, maculæq; alibi dicitur.

Diarrhœa si nimium molestat, præsertim in principio (cùm in fine sæpè morbum soluat) vel etiam Dysenteria, malignis & perniciosis humoribus ad intestina detrusis, sequatur: priuatam quoq; curam requirunt. In qua trochisci de spodio expulsiuis eo nomine permiscantur.

Colicus dolor, Clysteribus, vel exhibitione ol. Amygd. dulc. mitigatur.

Vomitum vehemens, crustâ panis in aceto intinctâ, exhibitâ, adhibitâq; comescitur.

Syncope si infestet, Cordialia vsurpantur. Inter quæ & hoc iuuat: R. Margarit. 3. ß. Boli 3. j. Auri limati, Unicornu an. ð. j. f. Citri 3. ß. frag. Lap. prætoriorum an. ð. j. Sacchari albiss. dissoluti in aqua Ros. q. f. fiant rotulæ.

Somnus profundus, si attonitus reddat,

Frictionibus, Ligaturis, Cucurbitulis pellitur. Reliqua suis locis explicabuntur.

Cum pustulis alijs, ut Anthrace nondum pestilentiali (de illo enim in peste egimus) si febris se offert Synochus nõ putrida, vel putrida simpliciter, vel maligna simul, non tamen pestilens, de qua in peste agemus; Nec tunc quod febrē attinet, aliter quàm in iam prius dictis, pustulas quoq; proferentibus febribus comitatis, procedimus. In illorum v. su quæ causam, si præsertim peruersa sit, euocant; quo nomine & anthraci ea, quæ virus hoc alliciant, imponuntur. Dein & venâ aperimus; Aluū lenimus; Atq; internis externisq; cordi admotis refrigeratibus putredinem & malignitatem arcentibus, corroborantibus, utimur, Viribus aspiciamus; Accidentiaq; grauiora emendamus; Atq; anthracem, sicuti alibi docebitur, sanamus.

Cum phthisi aut cachexia quæ se offert febris Lenta symptomatice, si in Hecticam symptomatice conuertatur, ut in phthisi plerunq; fit, non alia ratione, quàm ut hectica solitaria tractari debet: quæ tamen incurabilis, cùm & altè impressa sit, & morbus qui eam excitat, non desinat, existit. Quod si verò in principio, & antequam in hecticam conuertantur, hæ febres adsint, cùm lentæ sint, & proin calor in illis exiguus, illiusq; accidentia leuia, illorum causâ priuatim vix quid tentatur, sed tota cura morbo comiti, cuius symptomata & noxæ magis vrgent, uti in hisce morbis alibi explicabitur, accommodatur, ita tamen ut febris interim habeatur ratio.

Cuius tamen causâ, si sanguis morbi cachexiam producentis nomine detrahendus est, nec plus, nec minus educitur.

Purgantia verò si in cachecticis necessaria sunt, febris occasione ne nimium corpus accendant, mitiora & leuiora exhibentur.

Alterantia quoque, si calidiora forte morbi comitis causâ requirerentur, minus calida propter febrē, ne ea augeatur, eligimus. Et in phthisi eadem quæ in hectica humectando potius quàm vehementer refrigerando, febris causâ vsurpantur, ut illic dicitur, hic quoq; etiam antequam hectica perfecta sit, competunt.

*Lenta-  
rum se-  
brium à  
Secundi-  
na, Fe-  
tus mor-  
tus, &  
Sanguis  
con-  
creti re-  
tentione  
prode-  
ntium cu-  
ra.*

Cum reliquis accidentibus retenturum  
secundinarum: foetus mortui: sanguinis con-  
creti, febris si iuncta sit, Lenta quoque sym-  
ptomata: nec in ea aliter, quam iam dictum  
procedendum erit: Nisi inflammatio quæ-  
dam iungatur: tunc enim sicuti in febribus  
cum inflammatione copulatis cura instituitur.

## DE CAPITIS DOLORE.

### CAPUT III.

#### Genera.



APITIS dolores interni, qui  
contactu sicuti externi (de qui-  
bus suo loco) nisi ad exteriora  
eodem quoque pertingant, non  
acuuntur, alij sunt insoliti, alij consueti: alij  
solitarij, alij comitati: unde præcipua ipso-  
rum exurgunt genera.

*Cepha-  
lalgia,  
Soda  
Arab.*

Insolitos vocamus eos, qui recentes &  
noui sunt, hoc est, de nouo à causa aliqua re-  
centi prodeunt, nec ægro prius consueue-  
rant: quod genus Cephalalgiam propriè vo-  
cant, Arabes Soda: In qua caput vel indi-  
stinctè hinc inde, vel distinctè certo aliquo in  
loco dolet.

*Grave-  
do capi-  
tis, Ce-  
phalal-  
gia spe-  
cies.*

Indistinctè totum caput in cephalalgia a-  
liquando, non certa aliqua tantum in sede  
dolore afficitur, Vago, hac illave in parte ma-  
gis urgente: Nunc distendente ac si caput  
esset divulsurus, quem caput premendo li-  
gandove mitigari non nihil sentiunt: Nunc  
pulsante & feriente, in temporibus præser-  
tim: Nunc pungente in auribus potissimum:  
Nunc graui & ponderis sensum præbente,  
qui & peculiari nomina Grauedo capitis  
dicitur.

Aliàs verò distinctè dolorè anteriore in ca-  
pitis sede, circa tempora sentiunt, latere dex-  
tro vel sinistro, vel utroque, & in fronte at-  
que oculorum radicibus, hoc est in oculo-  
rum orbitis, ac si oculi prolapsuri essent, sen-  
sum præbens, oculis tunc ferè rubentibus,  
temporibusque pulsantibus, comitantibus  
in auribus quandoque punctionibus: quæ  
frequentius in cephalalgijis eueniunt. Non-

nunquam verò posteriore loco circa, occi-  
put, dolor ponderis sensum præbens, sæ-  
pius in mulieribus, in viris rarius se offert.  
Interdum superiore loco circa verticem do-  
lor residet.

Consueti capitis dolores sunt, qui vel leui  
de causa commoti redeunt: vel alioquin in-  
ueterati sunt. Et nunc vtramque, aliàs ve-  
rò alterutram capitis duntaxat sedem oc-  
cupant.

*Cepha-  
lea.*

Vtramque seu maiorem capitis partem  
cum afficiunt, priuatim hoc genus Cepha-  
lea dicitur. In qua dolor vel continuus est, qui  
diu perseverat, nec omnino cessat, cum etsi  
interdum aliquomodo mitior sit, mox tamè  
rursum exacerbetur. Aliàs verò in ea in-  
termittit penitus dolor, & per intervalla ve-  
luti per paroxysmos redit: Qui vel sunt or-  
dinati, certis diebus septimanisue, vel ma-  
ne, vel sub noctem redeunt: Vel inordina-  
ti, tunc plerumq; cum à causa aliqua externa  
vel leuissima excitantur, remeantes.

*Hemi-  
crania.*

Alterutram partem, dextram vel sinistram  
duntaxat, exquisitè, ac si caput, per medium  
diuisum esset, si infestet dolor, Hemicrania  
vocatur: Quæ à temporum pulsatione ferè  
incipit, & ad futuram sagittalem, caput per  
medium longitudinis diuidentem, proten-  
ditur, & per circuitus tertianos vel quarta-  
nos, quod tertio vel quarto die redire so-  
leant dictos, ferè ægrum exercet.

Solitarij capitis dolores sunt, qui per se in-  
cipiunt nullo prægresso morbo, à causis (vti  
dicitur) externis internisue cephalalgia:  
Quarum illa quæ à vino oritur, peculiariter  
Ebrietas dicitur, incipitque ferè postquam  
mentis alienatio & stupor à vino cessarunt.

Comitati capitis dolores sunt, qui alios  
morbos comites habent, quos & plerumq;  
sequuntur, illorumque existunt symptoma-  
ta. Sicuti febres, quas & continuas & in-  
termittentes, cephalalgia ferè semper comi-  
tatur, præcipuumque interdum in illis, quod  
affligit, est symptoma. Vel aliæ cephalal-  
gia & cephalæ, quæ morbos alios capitis,  
vt melancholiam, epilepsiam comitantur.  
Vel quæ in coryza, alijsque catarrhis occur-  
runt grauedines capitis circa frontem aut  
posteriora. Aut quæ in morbis partium na-  
tura-

turalium eueniunt, quos diuersa alia accidentia, vt cachexia, mensium suppressio, & cætera eiusmodi comitantur. Vel quando in lue venerea, cephalæa tantopere molesta est, noctu plerumq; non tantum circa interiora, sed & circa exteriora affligens.

*Causa.*

*Pars affecta.* **I**nter caluariam causam doloris residere, vel in meningibus cerebri, vel cerebro ipso, cum nihil aliud illic occurrat, necesse est.

In meningibus autem cerebri dolorem hunc fieri posse, quod sensu tactus prædicæ sunt, documento est. Quæ cum geminæ sint, crassa nimirum & tenuis, illæque artè inter se coniunctæ, valisq; cohærentes, dolorem, ab vtralibet primùm incipiat, ferè communicant: ita vt aegrè, quænam ex illis potissimum afficiatur, liceat discernere, nisi ex eo coniecturam aliquâ capiamus; quod cum affectus in exteriori crassa membrana potissimum residet, ad exteriora capitis dolor quoq; propter pericranium illi connexum, aliquomodo pertineat: si verò interior tenuis tunica magis afficiatur, profundior tunc, cerebroque veluti immersus esse videatur. In vtraq; tamen affecta, dolor ad oculorum radices, cum oculi globus à cerebri membranis tunicas accipiat, potest pertingere. Sed & cum ambæ tunicæ in duas veluti partes vnà cum cerebro per longitudinem mediæ caluariæ examusim distinctæ sint, fit, vt si affectus in vna saltem illarum parte vel latere consistat, medium quoque tantum capitis latus in hemicrania patiat: si in vtroque sit, in vtriusq; simul dolor, & nunc in hac illaue capitis parte, plus minúsue prout causa residet, molester.

In cerebri substantia, cum insensibilis esse credatur, dolorem fieri minimè posse, plerique statuunt. Verùm cum cerebri illas portiones quibus tenuis meninx proximè adnascitur, quæ nervos sensorios promit, sensu adeò penitus destitui minimè credamus, eas quoq; vel per se, vel potius meningum causâ per consensum affectas, non tamen eo usque, vt mente læsa, stupeant potius quàm sentiant, dolori occasionem etiam præbere cum meningibus, existimamus. Et in gra-

uedine capitis, quam vocant, circa frontem & posteriora capitis, ponderis illum sensum, ob cerebrum ea sede, quâ nervos & dorsalem medullam promit, molestatum, ægros sentire putamus.

Affectus autem meningis cerebri, illiusue portiones sensiles nervorumque initium occupans, qui causa efficiens est doloris capitis, est vel manifestus, intemperies calida partes enarratas accendens, vel frigida conuellens, aut solutio continui vellicans, distendens aut grauius lædens. Vel est occulta qualitas hisce partibus aduersa, easque molestans. Adiuuans verò causa, partium harum ad patiendum dispositio. A quibus causis, si leuiiores sint, leuis duntaxat fit affectio; si grauiiores, aut plures concurrant, permanens & grauior nascitur affectus.

Calida intemperies, per frequens capitis doloris causa existit, cum caput facile ob sanguinis spirituosum copiam (vt mox dicetur) incalcescat, atque calorem præternaturalem concipiens, doleat: eoq; magis, si vti ferè accidit, accedente materia aliqua calorem hunc excitante, ab ea simul vellicetur, vel distendatur: aut qualitas quoque aliqua in illis sit cerebro noxia: Sicuti à vapore humoreq; calido, sanguine scilicet & bile solet accidere.

Vapores, subtiliores præsertim, cum caput in eminentissima corporis sede positum facile suscipiat, illud calefaciendo vel vellicando, doloribus capitis per consensum factis & appellatis, sæpe occasionem præbent. Quod extrinsecus à vehementer odoratis exhalantes, naribusq; assatim excepti & in caput delati interdum faciunt: vnde tamen, vt consuetus potius prius capitis dolor redeat, vel recrudescat, quàm q; nisi aliud accedat, nouus inde suboritur, accidit. Quod & ab assumptis vapore suo caput ferientibus eodem modo euenit: à quibus etiam noui capitis dolores, si id vaporibus admodum impleant, excitari possunt: veluti à vino immoderatiùs hausto in ebrijs fit, à quo vapores tenuissimi eleuati, caliditate sua cerebrum accendendo & vellicando potius, quàm distendendo, accedente interim aduersa cerebro & nervis vi (vt postea dicetur) dolorem capitis pariunt; qui plerumque cessante so-

mno & stupore, à narcotica vini vi excitatis, remanenteq; diutius illi impressa caliditate, se exerit, & aliquamdiu adhuc, donec sternutatione ferè vapores hi excutiantur, persequerat. Ab humoribus calidis, biliosis, putridis, in venis, vt in febribus dictum est, collectis, vapores capiti demandati, in eo dolores capitis, plerisque febribus consuetos excitant: qui & extra febres è præcordijs fursum elati, hemicranie paroxysmos inducunt: bilisq; in ventriculum effusa, euaporans, vti suffusiones, vertigines, sic & capitis dolorem per consensum efficit.

*Sanguis  
in capite  
causa Cephalal-  
gia.*

Sanguis spirituosus & copiosus, cum in cerebri amplis & multis sinibus seu ductibus contineatur, nimia copia illos adimplens, distendendo, vel calidior factus, accendendo (nondum tamen omnino inflammando, vnde delirium potius sequeretur) Cephalalgia seu foda sanguinea dicta, per frequens causa existit. Cuius plures differentias, prout sanguis qui exuperat vel incaluit, vel tenuis vel crassus aut crudus (vt volunt) existit, statuunt & Cephalalgias biliosas, melancholicas, pituitosas nominant. Coaceruatur autem ille sanguis in capite, vel ob plethoram in corpore redundantem, quæ varijs de causis accumulatur. Vel alioquin eò attractus aut impulsus: vt calore solis, balnei, hypocausti: vel clamore, tussi, ictu, casu motuue nimio corporis aut animi affectu vehementiori. Calidior quam par est ab iisdem causis quibusdam fieri potest: Imprimis verò in morbis calidis, quorum symptoma cephalalgia hæc existit: & potissimum in febribus, in quibus sanguis cum spiritibus, vti in maioribus venis, sic & in hoc loco accenduntur: sicuti & in plerisque febribus, capitis dolor, tunc hanc ob causam, tunc ob euaporationes, vt dictum, tunc quia in omnibus febribus, vti omnes corporis partes, sic & cerebrum calidius redditur, molestus est. A sanguine autem capitis dolorem exortum esse, tum à prægressis, tum pulsante dolore, oculorumq; rubore, alijsq; causis facileprehendimus.

Bilis excrementitia, si qualis in capite à fero segregata in aures mera & pura expurgatur, talis ad meninges cerebrumq; effunderetur, dolorem quoque sine dubio pun-

gentem efficeret, sed vix nisi fero diluta, vti dicitur, eò peruenit: nec tunc semper (cum ictericis caput, nisi alia accedat causa, minime doleat) dolorem parit.

Frigida in emperies, vti in membranosis nervosisq; partibus corporis hinc inde non solum constringendo & mordicando, sed & aduersa sua hisce partibus exquisitè sentientibus qualitate ita & in capite dolorem excitare potest. Quod à pituitosis cerebri excrementis, non cerebrum (inde enim sopor vel stupor sequeretur) sed membranas potius refrigerantibus, accidere potest: vti in coryza, actu frigida quandoq; è naribus effluere, iisque fluentibus dolore capitis remittere aut cessare videmus. Sed & ab actuali externa aliqua frigiditate, vel quia astringit aut alioquin inimica est, dolor oboritur: ab aëre scilicet, ventoq; imprimis, alijsq; foris capiti adhibitis frigidis: à quibus dolores capitis, si ad interiora capitis vsque frigus penetrat, sæpe procedunt. Quin & leue frigus externum, illis quorum caput doloribus facile potest affici, & quibus consueverunt illud testum seruare, si diutius aperto sint capite, dolore infert, ob eamq; causam illud tam studiosè muniunt, vel vt testum sit, pilos nutriunt. Quos hi qui à calore facile offenduntur detondent, & si prolixiores gestent, capitis potius dolorem se percipere fatentur: quod in senibus quoq; caluis præsertim qui dies noctesq; capite nudo esse gestiunt, enenire obseruauimus. Ex accidenti etiam frigus externum calore ad interiora propellendo (maximè si à frigore passio, in calidum locum se subito quis conferat) caput calefaciendo potius quam refrigerando, capitis dolorem adfert.

Solutio continui manifesta ab externis causis facta, vti ab ictu vel vulnere ad meninges cerebri vsque penetrante, dolorem capitis internum cum externo coniunctum facit. Quæ verò vellicando & distendendo fit, partim à vaporibus humoribusq; iam enarratis calidis (vti dictum) partim verò ab alijs iam dicendis proficiscitur. Pituitosa enim & serosa cerebri excrementa, copiosius congesta retentaque, non tam copia sua, quam frigiditate interdum (vti prius ostensum) vel acrimoniâ, quam ex corruptio-

*Frigida  
inter  
vires  
br: causa  
Capitis  
doloris.*

*Vellicatio & distensio  
in cerebro, causa  
Capitis doloris.*



ne aut falsedine adipiscuntur, accedente a-  
stuali interdum quoque calore quem simul  
conciipiunt, doloré capitis, nunc circa fron-  
tem, nunc circa occiput prout humor ille  
anteriorē posteriorē mēue cavitatem im-  
plet, ponderis instar grauāntem, distenden-  
tem quoque & vellicantem simul, interdum  
efficiunt. Qualis dolor, nunc breuior, prae-  
fertim si non subsistat hęc excrementa, nūc  
diuturnus, si aliquamdiu perseuerent, occur-  
rit: interdum verò capitis aliquos alios affe-  
ctus, vt vertiginem quandam, & imprimis  
defluxiones quasdam præcedere & comita-  
ri solet. Quem ab eiusmodi humoribus ex-  
crementitijs prodijisse, redundantis ipso-  
rum copię indicia manifestant, humorque ille a-  
queus, tenuis, acris & calidus, in coryza di-  
cta, cum capitis hoc dolore coniuncta, ex o-  
culis naribusq; exstillant, quæ nam & qua-  
lis illius causa fuerit, & qualis in alijs etiā  
esse possit, satis demonstrat. Quorum & im-  
mensam copiam, non solum ē naribus, sed  
& ex auribus aliquando effluxisse, capitisq;  
dolorem diuturnum soluisse, vidimus.

Qualitas  
cerebri  
sui  
mica,  
causa  
Capitis  
doloris.

Qualitas cerebri membranarum proprietate  
aliqua inimica, dolorem in illis, & per conse-  
quens capitis, vel sola vi hac occulta, vel ac-  
cedente simul manifesta qualitate, interdum  
parit. Sicuti ex narcoticorum vsu hęc ex-  
citata, postquam assumpta sunt, non solum  
cerebrum afficit, sed & dolorem capitis, quē  
cum sensus rursus ad se redeunt, demum  
perferunt, post se aliquamdiu perseueran-  
tem relinquunt, vt & in ebrijs à vini nimia in-  
gurgitatione, non tantum à calore illius &  
vapore, sed ob hanc quoq; eius vim videmus  
accidere: quemadmodum & à ceruicia, simi-  
li aliquo modo contingit, cum illa non mi-  
nus propter lupulos vim aliquam narcoti-  
cam habeat, quā eos muscas interficere ani-  
maduertimus: & post vsu opiatorum me-  
dicamentorum capitis dolorem facile subse-  
qui, sæpe obseruauimus. Quod & ab alijs nō  
narcoticis, sed alijs cerebro insensā vi con-  
tingit: vt croco, apij semine & similibus,  
non solum copiose assumptis, sed & olfactu  
perceptis. A malignis alijs vaporibus vel  
humoribus caput infestantibus, vti aliæ i-  
psi functionum læsiones, sic & capitis do-

lores suboriri possunt: sicuti in melancholi-  
cis, similibusq; cerebri affectibus accidit. In  
contagiosis morbis, vis quædam pernicio-  
sa, illud quoq; potest efficere: qualis ea est, quæ  
in lue venerea, non tantum extrinsecus pe-  
riostia & pericranium afficiendo, dolorem  
in exterioribus capitis sedibus, alijsq; locis  
(sicuti illic dicitur) parit: sed & interiores  
meninges cerebri molestando, dolorem ad  
interiora etiam vsque pertingentem, qui in  
lue hac quandoque simul occurrit, inducit.  
Quod & pestilens aut venenata qualitas in  
peste correptis, aut veneno alio infectis, ea-  
dem ratione, si non solum cordi, sed & cere-  
bro aduersa sit, potest efficere, vt videlicet ca-  
pitis dolor illis morbis aliquando, non solum  
ob febrilem calorem (vnde quoq; hic capi-  
tis dolor, si putredo maximè malignis hisce  
febris copuletur, oritur) sed & ob hanc  
perniciosam vim, vel ob vtrumq; excitetur.

Dispositio seu constitutio capitis si talis  
sit, quæ facile dolorem patiatur, occasionem  
vt sæpe leuiq; ex causa capitis dolor oboria-  
tur, præbet, nec minima cephalææ & hēmi-  
cranie causa existit. Quam dispositionem  
patibilem appellare, sed vix qualis sit, expli-  
care possumus. Nisi quod sit vel sensibili-  
tas nimia, aut alijs præternaturalis, ob quā  
citò & facile patitur: vel ab insitis causis, à  
parentibus hæreditario modo in liberos de-  
riuada, profecta: Aut ex consuetudine praua,  
in illis qui sæpe dolores capitis passi sunt,  
contracta: Vel alijs imbecillitas quædam  
capitis, non ea in qua functiones capitis de-  
bilitantur potius quàm dolor infertur, sed  
quæ, vt caput ob hanc debilitatem facilius  
patiatur, efficit: qualis post morbos capitis  
graves vel diuturnos: vt vulnera, luem ve-  
neream, alijs sæpe relinquitur: aut ob  
congeriem continuam excrementorum ca-  
pitis, tale vitium illi imprimitur.

Dispositio  
patibilis  
vel  
imbecillitas  
cerebri,  
causa  
capitis  
doloris.

#### Curatio.

Cephalalgia calida dicta, quæ à vapore ca-  
lido, vel bilioso, vel putri, aut sanguine  
nunc puro nunc impuro, nimium caput ca-  
lescente, aut distendente, aut vellicante na-  
scitur: & vel à causis externis vel internis,  
per se vel per consensum, in ventriculi alia-

Cepha-  
lalgia,  
Cepha-  
lææ He-  
micra-  
nia à  
quacum-  
que cau-

rūmque partium morbis, calidis præsertim, vt in febr. potissimūm prouenit, si per se sanguine fiat eò affluente, is statim à capite retrahendus, repellendus, & calor inde excitatus contéperandus aut restinguendus, dolorq; ne de nouo influxum moueat, compescendus, & quicquid residui mansit, discutiendum absfumendumq; est. Quod si verò per consensum à vaporibus sursum eleuatis fiat, cura morbis, quorum cephalalgia hoc symptoma existit, potius accommodanda, huiusq; symptomatis causa, imprimis focus, vnde vapores exsurgunt, repurgandus erit, vaporesq; intercludendi, & à capite quoq; reuellendi, repellendi, discutiendiq;. Cephalalgia verò frigida dicta, si à frigore externo fiat, facile per se, vel calore temperato sensim corrigitur remittitq;. Quæ verò pituitosa dicitur, quam nos ab excrementis alijs quoque cerebri nasci posse ostēdimus, si cephalalgia recens sit, vel cephalæa aut hemigrania antiqua existat, quæ difficulter admodū sanantur, tunc in hisce tam nouis quam consuetis capitis doloribus, ab eiusmodi cerebri superfluitatibus dependentibus, eadem ratione vt in alijs à similibus excrementis generatis cerebri morbis euacuationibus generalibus & particularib; varijs, cerebrum repurgare studebimus, atq; illud alterare, roborare, humoresque in illo collectos discutere, & per vias occultas aut manifestas, natura arteq; patefactas educere. A narcoticis, & à vino præsertim, aut alijs noxijs vñ caput molestantibus: vel à malignis vaporib; alijs, capitis dolores inducti, harū causarum euacuatione, & virium illarum repressione, curantur. Si à lue venerea, pertinax ille capitis dolor affligat, nō nisi multis magnisq; euacuationibus sanatur: sicuti hæc in morbis illis quorum capitis dolores symptomata sunt, explicata fuerunt. Quid verò potissimū huius symptomatis causā sit faciendū, nos hic qd per euacuantiā & alteratiā remedia (quæ singulis dolorū generib; & causis interim accommodabimus) præstari possit, ostendemus.

Quæ euacuationis, potissimum causā adhibentur remedia, vsurpantur. Vel vt sanguinem præcipue, sæpeque cum eo ad alios humores & vapores à parte affecta retrahāt:

idq; vel per emissionē sanguinis; vel suctionem; aut calorem: Vel vt humores alios, aut deorsum per aluū, per os & nares; vel fursū per vomitum; vel hinc inde è corpore, per sudores; vel priuatim per cutē capitis, educant.

Sanguinis emissionē phlebotomiā potissimūm molimur. Quæ, si sanguinis copia aut caliditas capitis dolorem inducat, tum vt is à loco affecto reuellatur, tum deriuetur, instituitur. Reuellimus illum è distantioribus venis sanguinē emittēdo, quod mox à principio dum sanguis adhuc affluit, fieri debet: sed & successiue veris & autumnii tempore, in plethoricis quib; caput frequenter, dolore solet, hoc modo generalem sanguinis detractionem faciendo, capitis consuetus dolor præcauetur. Fitq; hoc brachij, vel etiam pedis lateris dolentis vena aliqua patente secta, cōmuniter cephalica dicta in cubito incidi solet: vel ea quæ in pollice pedis apparet, quæ peculiariter in capitis affectibus incisā prodesse credunt, cephalicamq; ob id quod appellāt: in sceminis malleoli interioris saphe-na dicta, præsertim si menses non recte procedant, tundi solet. In quib; omnib; quātitas decēs ex eo maximē, vt in pura plethora copiosius, in impura parcius sanguis detrahatur, viriū interim & corporis constitutionis habita ratione, estimatur. Et si morā morbus ferre possit, alius primum leniatur. Deriuamus è vicinis capiti venis apertis sanguinē educendo, si is copiosus in partem iam influxus sit: idq; præmissa primum illarū venarū sectione, quā sanguinem reuellimus, cum iā fluxionis impetus cessauit, neq; nouus affluxus timetur. Quod iugulari externā in lateribus, colli sectā commodè (vti & Arabes iubent, alijq; in diurnis capitis doloribus prodesse decēt) præstaretur, nisi periculū, quod vulneratā, ob amplitudinē, & quia in valida spiritus retentione & conatu ac vociferatione admodū tumet, ægrè sanguinis fluxus iterū sisti queat, impediret: eoq; magis quod ea incisa, si Hipp. credimus, ob copiosā fortē hēmorrhagiam, quæ inde sequitur, sterilitas viris succedat: rectius proin rami ipsius minores cutem capitis perreptantes in temporib; vel in fronte potius, maximē si pars capitis posterior doleat, aperiuntur: in quo tamē faciendū,

faciendo, cum vt venæ se patefaciant, colli constrictione opus sit, eaq; sanguis ad cerebrum pellatur, tutius erit, si venæ sub lingua tundantur, cum iugularis interioris os subuentis sint propazines; vel alij illius rami ad nares dispersi, frictione aut alio modo, vt sanguinem profundant, irriterentur; Vel ad motus sanguisugis nasi extremo, sanguis eliciatur; aut ille post aures, vel supra externas colli iugulares venas adhibeantur.

Arterotomiam, in contumaci dolore & perseverante cum pulsationis & caloris sensu, sæpe iuuisse multi testantur, præsertim si vertigo adsit: quæ eodem modo, vt illic explicatum fuit, in frontē, aut temporibus, aut post aures fiat.

Suctio per cucurbitulas fit: quæ, cum sugendo sanguinem à parte affecta trahant, & si scarificatio accedat, simul euacuent, in causis, in quibus phlebotomia conuenit, idem quod illa præstabit, & proin illius loco, quippe cuius vices obeat, vel post illam factam, vt illius actionem iuuent, vsurpantur. Quæ colli lateribus, summo humero, scapulis, brachijs, coxis, suris & natibus quoq; eo nomine adhibentur: sensim à superioribus versus inferiora cucurbitularum applicatione procedendo, repetendoq; eodē vel etiam sequētib; diebus: adhibita simul postmodū scarificatione, si validius à parte trahere velimus. Priuatim scarificatio in manu inter pollicē & indicē facta, in capitis dolore, vt & vertigine laudatur: vel si in carpi regione fiat: sunt qui & in auriculis scarificationē factā pbant.

Calore attrahimus per frictiones, quæ ad reuulsionem nō solum sanguinis, sed & humoris & vaporis, capiti dolorem inferentis similiter iuuant: si in extremitatibus, hoc est brachijs & pedibus, vel in dorso, à scapulis ad pedes vsq; descendendo fiant. Et si caput peccatur frequenter: vnde si pestem leuiter ducatur resolutio aliqua fit, si fortius, ipsiusq; dentes acutiores sint, etiam ad superficiem capitis aliqua ab intimis attractio: Quod in antiquis capitis doloribus, vel declinatione in reliquis locū habebit. Ligaturæ extremitatū, potentiū adhuc quàm illarum solæ frictiones reuellūt. Quod & ablutiones extremitatum ex decocto actu calido factæ, addi-

tis herbis capitalib; præstant, admodumq; à capite humores vaporesq; reuellunt. Quæ simul & dolorem, vt in alterantibus dicitur, mitigare possunt.

Peraluum deiectiones, iniecta in aluum clysmata efficiunt, quæ venæ sectioni præmitti solent, aluum lenientia & feces eluentia: & postea quoq; ad reuulsionem sanguinis, spirituum & vaporum, quæ simul stimulant commodè injiciantur: & in diuturno dolore sæpe repetuntur, præsertimq; si aluus constipata sit, cum ex retentis excrementis vapores eleuati, morbum irritare, aut si consuetus sit, promouere soleant.

In causa calida, præsertim in febrilibus tale poterit injici: R. Maluæ, Altheæ, Violaria, Betæ, Mercurialis, Brassicæ rubræ quæ præterquam quod stimulat, vapores reprimat, vnde ebrietatem arcet) an. M. j. Betonica (vt capiti approprietur clyster) M. ß. fl. Viol. P. j. fl. Chamom. P. ß. Hordei, Furfuris an. P. j. sem. Cucurbitæ ʒ. ß. f. Foeniculi ʒ. j. fiat decoct. & in col. quant. suff. dissolue Sacchari rubri, Mellis viol. an. ʒ. j. succi Betæ vel Mercurialis ʒ. j. ß. Cassiæ ʒ. j. ol. Viol. ʒ. ij. Butyri ʒ. j. Salis parum, fiat Clyster.

In alijs causis, maxime in diuturnis doloribus: R. rad. liliorum ʒ. ij. herb. Emollitiu. Betæ vel Mercurialis, Brassicæ rubræ, Parietaria, Betonica, Saluix, Hysopi an. M. j. flor. Chamom. Lauandulæ vel Stœchados, Anthos, Furfuris an. P. j. Ficum n. x. f. Anisi, Foeniculi an. ʒ. j. fiat decoct. dissol. in col. suff. quant. Hieræ picræ. Diaphæn. an. ʒ. ij. Sacchari rub. Mellis anthos. an. ʒ. j. ß. succi Mercurialis vel Betæ ʒ. j. ol. Chamom. Liliorum an. ʒ. j. ß. Salis parum, fiat Clyster.

Exhibitis, deiectiones mouemus: purgatiq; si ab humoribus aut inde eleuatis vaporib; aut alia qualitate maligna capitis dolores fiant, aut alioquin corpus impurū morbū augeat aut foueat, varia exhibentur: qualia etiā in alijs capitis affectibus à simili causa natis vsurpari solent, variantia hīc pro ratione causæ, & corporis constitutionis diuersitate. Leuioribus minusq; calidis vtendo in causa naturaq; calidiore: fortioribus verò & calidiorib; in alijs: quæ omnia capiti accommodata esse debent. Præmissis feces eluen-

tibus ante venæ sectionem loco clysmatis. Dein præparato prius humore antequâ purgetur, si opus sit; Inde semel multotiesue purgando, & repetendo quoq; si causa persistat: sicuti & in dolore capitis in lue venerea, non nisi sæpe repetita purgatio eum sanabit. Quæ sequenti modo vsurpari possunt.

Præparatur humor ante purgationem in corporibus biliosis hoc modo: R̄. syr. de Endiuiā 3.ij. syr. Viol. Acetos. simp. ana 3. j. aquarum Cichorij, Buglosi an. 3. iiij. aquæ Verbenæ (quæ peculiaris est in capitis dolore) 3.ij. aq. Betonicæ (propter caput) 3. j. misce, Vtatur pro tribus vicibus: Capiat tabulam vnam Dyarrh. post singulos haustus.

In melancholicis hoc modo: R̄. syr. de Buglosso vtroq; an. 3. j. β. syr. de Scolopend. de Epithymo ana 3. j. aquarum Buglosi, Verbenæ, Melissæ, Betonicæ an. 3. ij. misce: Vtatur vt prius.

In pituitosis & antiquis doloribus, vbi calor non est magnus: R̄. Mellis ros. Oxymel. simp. syr. Capill. Ven. an. 3. j. β. de Hyssopo, de Stœchadē an. 3. j. aquarum Maioranæ, Betonicæ, Verbenæ, Melissæ, Hyssopi, Saluiæ ana q. f. Detur vt supra per triduum, sumendo semper postea tabulam vnam Diamosci.

Vel hoc decocto vtatur: R̄. rad. Fœniculi 3. ij. Acori veri 3. j. Liquiritiæ 3. j. β. herbar. Betonicæ, Maioranæ, Saluiæ, Verbenæ ana m. j. fl. Lauandulæ, Stœchados, Anthos ana r. j. f. Anisi, Fœniculi an. 3. j. Passul. enuc. 3. ij. fiat decoct. & in col. q. f. dissolue Mellis q. f. denuò coquatur, despumentur, arom. Nucemosc. & Cin. Capiat trib. vel iiij. matutinis.

Purgationes quod attinet: Si ab humore calido sanguine vel bile fiat, vel alioquin in constitutione calidiore, sicuti in febrib. aut alijs morbis calidis capitis dolorem inferentibus dictum fuit, purgandi sunt.

Vel leuiore hoc: R̄. pulpæ Cassiæ, Tamarind. Prunorū an. 3. β. addito Sacchar. vel sine eo, Comedat, vel diluat sero lactis & bibat.

Vel hoc modo: R̄. pulpæ Cassiæ 3. vj. electuar. de succo Rosar. 3. ij. Diaprunis sol. 3. j. Syr. Ros. sol. 3. j. β. cum aqua Buglosi & Ros. (quæ priuatim capiti conuenit) fiat potio.

Vel hoc decocto: R̄. rad. Betæ rec. 3. j. rad. Lapanij mai. 3. β. fl. Viol. 3. ij. flor. Buglosi 3. j.

(si recetia haberi possunt dupletur pondus) femin. Cucurb. Melonum, Viol. (si inuenitur) ana 3. ij. f. Anisi 3. j. Prunorum Tamarin. à nucleis repurgat. an. p. vj. radic. Polypodij 3. vj. fol. Senæ 3. β. fiat decoctio & in col. pro vna dosi, dissolue Syr. Rosar. sol. 3. j. vel cum infus. Rhabarbari, si efficacius esse velis medicamentum 3. vj. fiat potio. Quæ si opus sit repeti poterit: vel duplicatis aut triplicatis simplicibus, statim ad plures vices sumendo, decoqui.

Vel detur hæc infusio: R̄. Rhabarb. 3. iiij. Myrob. citrin. 3. ij. Spicæ 3. β. contundantur, irrorentur parum Vino absynthite, donec mollescant: postea infundantur in Sero lactis vel aqua Endiuiæ & Verbenæ: expressioni adde Diaprun. sol. 3. ij. syr. Violar. 3. j. misce, Capiat.

In biliosioribus hoc apozemate pluries vti possumus, quod simul humoris feruorem temperat: R̄. rad. Cichoræ, Buglosi, Betæ, an. 3. j. herbar. Endiuiæ, Cichorij, Borrag. an. m. j. Mercurialis m. β. flor. Cordialium an. p. j. sem. iiij. frig. maio. an. 3. ij. f. Portulacæ, Lactucæ, Anisi an. 3. j. Cicerum rub. p. j. Passul. enuc. Tamarind. an. 3. j. β. Prunorum n. xij. Sebesten paria x. rad. Polypodij 3. ij. fol. Senæ 3. j. sem. Carthami 3. j. fiat decoctio, in col. q. f. dissolue succi Ros. 3. ij. Mannæ 3. j. (in diutrib. Rhabarbarum infundi potest) Sacchari q. f. aromat. parum Cinam. fiat apozema: Pro trib. matutinis vtendum.

Vel si mauelit pilulas æger, leuioribus vtatur, Assaiereth dictis, quæ etiam cum ventriculi causa caput dolet, conueniunt. Vel fortioribus, Agregatiuis, Vel sine quibus appellatis 3. j. quantitate eas sumendo.

In melancholicis minusq; calida causa & constitutione, purgantur vt in alijs morbis melancholicis capitis dictum. Vel datur sequens: R̄. Catholici 3. β. Diaphoen. 3. ij. Hammech. 3. j. Sumat per se cum Saccharo, vel addito Syr. de Fumaria ad 3. j. Cum sero lactis, aut decocto Galli antiqui diluta, bibat.

Vel hoc decocto vtatur: R̄. rad. Bugl. 3. j. cort. Tamaricis 3. β. fl. Buglosi vtriusque, Scabiosæ an. p. j. fl. Stœchados p. β. sem. Melonum 3. j. β. f. Anisi 3. j. Passul. repurg. 3. j. Prunorum n. x. Dactyl. n. v. rad. Polypodij 3. vj. fol.



fol. Senæ 3. β. Thymi summit. 3. ij. fiat decoctio & in col. q. s. infunde Myrobal. indarum, chebul. an. 3. j. fiat expressio, dissolue syr. Ros. fol. & de flor. Persicorum an. 3. β. Sacchari q. s. aromat. parum Nuce mosc. fiat potio: Repe-  
tatur si opus sit, aut pluribus vicibus vtatur.

Syrupus de Pomis Mesuæi ex helleboro nigro paratus valde utilis censetur, vel is qui à Rondel. correctus, Helleboro albo substituto describitur, ad 3. j. β. plus minusve exhibendo: per se, vel dilutum prius liquore conuenienti.

Cuius loco ex plurimis talis componi poterit: R. rad. Aperit. macer. in Aceto, cort. Cappar. & Tamaricis ana 3. vj. rad. Liquiritiæ 3. j. herb. Buglosi vtriusque cum radicibus, Fumariæ, Lupuli sum. Eupatorii Mesuæi, Capilli Ven. Ceterach. Chamædreos, Chamæpitheos ana M. j. herb. Melissæ, Sampfuci ana M. β. flor. Cord. Tamaricis ana P. j. flor. Stœchados & Chamom. ana P. β. femin. Anisi, Fœniculi ana 3. ij. sem. Petroselin. Cuscutæ an. 3. j. Passul. enucl. 3. j. β. Ficum, Prunorum ana P. x. Dactylorum n. vj. rad. Polypodij 3. ij. f. Carthami 3. j. fol. Senæ 3. j. β. Thymi sum. Epithymi ana 3. β. Hellebori albi 3. j. vel plus, Schœnanthi 3. ij. fiat decoctio, & in fine adde Myrobal. chebul. beller. indarum ana 3. j. β. & in col. q. s. adde succi Pomorum dulcium redolent. f. β. Sacchari q. s. fiat apozema pro tribus vel iij. vicibus, vel coquatur in formâ syrapi: Et vtatur loco syrapi de pomis compos.

Pilulæ horum loco tales fieri possunt: R. pilul. Indar. 3. ij. Agregat. 3. β. cum succo Fumariæ vel aqua Melissæ fiant pilulæ.

Vel vsuales: R. spec. Hieræ sine croco 3. j. β. extracti Polypod. & Myrobal. omnium ana 3. ij. Hellebori, pul. Scammon. an. 3. j. lap. Lazuli præp. 3. β. ol. de floribus Lauandulæ guttas iij. cum syrup. Fumariæ fiat massa. Detur à 3. β. ad 3. j. prout operabitur.

Si à pituitosis & serosis cerebri excrementis cephalalgia fiant aut etiam diurnæ cephalæ aut hemicrania, sicuti in alijs eiusmodi cerebri morbis ostensum alibi, purgandum erit, vel hoc modo.

Pilulas leuioribus de Hierâ vel Alephanginas sæpe deglutiat, quæ & si à ventriculo vapores eleuari caput molestant, compescuntur:

Vel fortioribus vtatur, Coccijs, Fœtidis: aut medijs de Sarcocoll. vel Agarico.

Vel sequentibus: R. spec. Hieræ picræ 3. ij. Agarici troch. Turbith ana 3. j. troch. Alhandal. Diacrydij. Nucis mosc. ana 3. β. Zingib. 3. j. Salis gemmæ 3. β. Masticis 3. β. ol. Garyophyl. f. Lauandulæ ana gut. ij. syrapi de Stœchade q. s. fiat massa: Capiat 3. ij. repetendo in diuturnis cephalæis: acuendoq; pilulis Coccijs si minus validè operentur.

Puluere hoc horum loco vti poterit: R. Turbith 3. ij. Diacrydij gran. iij. Tartari vini albi, Zingib. flor. Lauandulæ ana 3. j. Sacchari q. s. fiat puluis: Detur cum iusculo.

Vel tabulæ Diacarthami exhibeantur: aut electuarium Diaphœnicon, aliæve.

Aut hæc potio: R. rad. Liquirit. 3. vj. rad. Acori veri 3. β. herb. Hyfopi, Maioranæ ana M. β. flor. Stœchados, Anthos ana P. j. Ficum P. v. Dactylorum n. iij. sem. Anisi, Fœniculi ana 3. j. fol. Senæ 3. ij. sem. Carthami 3. iij. fiat decoctio & in col. q. s. inf. Agarici 3. j. Zingib. 3. j. fiat express. dissolue Diaphœnic. el. Indi ana 3. j. fiat potio.

Aut hoc Apozema aliquoties sumendum: R. rad. Liquiritiæ 3. β. rad. Graminis, Petroselin. ana 3. j. rad. Acori, Ireos, Galangæ ana 3. β. herb. Betonicæ, Saluæ, Maioranæ, Hyfopi, Verbenæ, Capill. Ven. ana M. j. flor. Rosmar. Stœchados, Lauandulæ, Buglosi vtriusque ana P. j. femin. Anisi, Fœniculi ana 3. ij. sem. Petroselin. Carui, Seseleos ana 3. j. sem. Pæoniæ 3. j. β. Passul. enucl. P. xij. Ficum P. viij. Dactylorum, P. v. Prunorum dulc. n. viij. rad. Polypod. 3. ij. fol. Senæ, seminis Carthami an. 3. j. β. Agarici 3. β. Turbith 3. iij. fiat decoctio, & in col. q. s. adde Mellis q. s. aromat. Cinam. 3. ij. Zingib. 3. j. Cubeb. Nucis mosc. ana 3. ij. fiat apozema pro tribus vel iij. vicibus: quod & auctis singulis in syrupum vsualem decoqui potest.

Per nares & os quæ caput purgant, caput purgia dicta, ori & naribus indita, in cephalalgijs & cephalæis, in quibus pituitosi & serosi in capite redundant humores probantur: eoque magis si illorum effluxus per hæc loca prius confusus fuerit, nuncq; substitute-  
rit. Sed & in biliosis & melancholicis eiusmodi doloribus, vti vocant, locum interdum

habent. Quibus tamen post alias saltem euacuationes vtimur, illisq; tunc successiue caput purgamus. Quæ sternutationem ex illis mouent, dolorem capitis grauem nonnunquam irritant: si verò à vaporibus caput tentatum doleat, eum mox leuant, cum & sponte ebrijs eo nomine superuenire soleat, & dolorem tollere. Hæc autem, vti & in alijs capitis morbis sic parantur.

Masticatorium sequens vsurpari potest. **R.** Masticis 3.ß. seminis Angelicæ, Nucis mosc. ana ʒ.j. Puluis horum Cera exceptus, vel panno linteoinuolutus masticetur.

Fortius sic fit: **R.** Masticis 3.ij. sem. Staphis. agr. rad. Pyreth. an. 3.j. Piperis longi, Cubeb. Nucis mosc. an. ʒ.j. fiat pul. excipiat paucæ Cera, fiant formulæ ad masticandum.

Collutio oris vel gargarisma idem præstabit: **R.** rad. Ireos, Capparium, Pyrethrian. 3.ß. radic. Imperat. 3.ij. Hyssopi, Origani, Saluiæ, Thymi an. M.j. flor. Steechad. Anthos an. P.j. sem. Sinapis 3.ß. sem. Vrticæ 3.j. Nucis mosc. 3.ij. fiat decoctio in Vino & Aqua, & in col. t3.j.ß. dissol. Oxy mel. scyll. 3.ij. Vtatur.

Errhinū quod naribus attrahi debet, sic fit: **R.** succorum Maioranæ 3.j.ß. Betæ, Anagallidis, Aceti scill. an. 3.j. Mannæ 3.ß. Vtetur.

Velinungantur nares hoc linimento: **R.** Scammoneæ 3.j. seminis Nigellæ, rad. Pyrethri, Cyclaminis ana ʒ.j. Fellis piscis alicuius gut. v. Oxy mel. scill. q.s. in formam vnguenti reducendum.

Aut indat pessarium: **R.** materiam prædictam, adde farinæ Orobi q.s. ad inspissandum, truat in nares: Vel Maioranam contusam, aut rad. Betæ, detracto interno cortice; Aut fibræ Hellebori illiusve interius filum, medullam referens, si sternutationem mouere animus sit: vel puluis illius attrahatur: quod & odor Flammulæ contusæ efficiet multumque humoris euocabit.

Per vomitum expurgatio, si per consensum ventriculi à vaporibus inde suscitatis, vti & in ebrietate, dolor capitis fiat, cum causam subito euacuet, conuenientissima erit. Quæ etsi maturè antequam vapor exurgat & caput tentet, fiat, vt citius desinat, efficit. Ob quam causam nisi spontè à natura concitetur, actiue irritando fauces succedat,

propinatis quoque vomitorijs illum promouebimus. Sicuti & in alijs capitis affectibus à consensu quoque simili factis, in vertigine & ebrietate, alijsque in locis dictum fuit. Cæterum in alijs causis cum per idiopathiam, præsertim dolor capitis sit, non temerè dum caput vehementer dolet, proritandus, cum per validum illum qui vomendo fit conatum, sanguine, spiritibus, humoribusque ad caput impulsis, capiteque concusso, dolor exacerbetur: nisi hoc extra paroxysmum in quibusdam, ad excrementorum prouentum impediendum concedatur.

Per sudores factæ euacuationes, si, quia cerebrum aqueis excrementis multis abundat, dolores capitis fiant, plurimum, prius tamen generali prægressa purgatione, competunt, cum ab intimis excrementa euocent. Vnde in diuturnis cephalæis instituuntur, & in lue venerea, vti eam sanare, sic & symptoma hoc illius graue tollere solent: ob quæ causam decocta sudatoria exhibentur, & obseruata simul parca cibandi ratione, per dies aliquot vel septimanas quoq; (sicuti alibi dicitur) continuantur. Verum in causa cephalalgia calida, & quando caput æstuat, cum non nisi calore vehemente adhibito sudores proliciantur, ij, quippe qui dolorem tunc augerent, conuenire minimè possunt.

Per cutem capitis euacuationes peculiæres (nam & sudor, sed generatim per hanc viam vniuersum corpus euacuat) vi eorum quæ capiti applicantur factæ, & quibus insignes euacuationes efficiuntur, ideoque reliquias tantum applicatæ, quæ discutunt, in alterantibus postea explicantur, in pertinacibus & diuturnis cephalæis, hemicranijs, vt excrementa à cerebri membranis euocent, illisq; viam interdum aperiant, tanquam extrema remedia in extremis hisce morbis vsurpantur. Qualia sunt calidissima metafyncritica, quæ ex alto humores attrahunt, attractosq; absument, lixiuua, vnguenta. Quod & cucurbitulæ capiti affixæ præstant: Vel hisce validiora, partem nonnihil accendendo, rubificantia dicta: Vel etiam adurentia vesicatoria: Aut crustam facientia cauteria, actu potentiue illud agentia, quæ capitis sedi platiore aut etiam humiliori, in ceruicis posteriore

posteriore sede applicantur: cuiusmodi in alijs capitis affectibus quoque passim sunt descripta.

Sectiones in cute capitis factæ, vel etiâ trepanationes, ablata portione calvariæ, ut humor illic latens per vias apertas effluat, in antiquis & desperatis capitis doloribus, interdum tanquâ extrema adhibentur remedia.

Quæ alterationis potissimum causâ vsurpantur remedia, non aliter quàm in alijs capitis affectibus pro ratione humorum prædominantium & morbi, nunc refrigerantia, nunc calefacientia, & imprimis caput corroborantia, ac si ventriculi causâ fiat, ea quæ vapores reprimunt, bilis efferuescentiam infringunt, sicuti illis in locis descripta sunt, exhibeda. Quæ tamé in victus ratione quàm medicamentis administrantur.

Imprimis cauendum ab illis, quæ odore vehementi aut vapore dolorem capitis promouent; ut vino, sinapi & similibus: quæ tamen in certa causa, pituitosa scilicet, in capitis dolore quoque iuvare possunt, sicuti de sinapi dicitur: & vinum insuper, quia caput demulcet, nonnunquam iuvat, propriam noxam interdum corrigit: unde ebrios non prius leuamen sentire videmus, donec denudò vinum bibant, & præsertim cibum simul capientes, sic vapores reprimant. Quo nomine & lac potum, etsi cum corrumpitur dolores capitis pariat, hoc modo eosdè nonnihil mitigare potest.

Stupefacientia sensum, in summo capitis dolore, præsertim si vigilie quoque adsint, exhibere, necessitas quandoque cogit, idq; maximè in causa calida. Tuncquæ syrupum de Papauere: vel alia narcotica leuiora, ut puluerem Diapapaueris exhibemus. In alijs verè causis narcotica non faciliè dantur, præsertim cum (sicuti alibi dictum) postquam suas vires exercuerunt, capitis dolores post se relinquere soleant: nisi fortè illa sic contrèmoda sint, ut minus noceant; sicuti Theriacam, Michridatum tutius eo nomine, vel Diacodium, Requiémve Galeni, minima tamen quantitate damus: quod & Vinum generosum largius sumptum, ob narcoticam vim illius præstare potest.

Capiti extrinsecus quæ adhibentur alte-

rationis præcipuè nomine remedia, in tres classes, nimirum refrigerantia, anodyna & calefacientia rediguntur. Refrigerantia, si à causa calida cephalalgia fiat, vsurpantur, eaq; astringentia in principio, quando sanguinis affluxus adest vel metuitur: mox etiam humectantia, ad calorem restinguendum, illis permiscenda. Anodyna, quæ vel calore moderato nec nimis sicco demulcent partem, vel somnum aut stuporem inducèdo, ut minus dolor sentiat, efficiunt, cum admodum virget, etiam in principio, ne illius causâ defluxio magis cõcitetur, capiti, rarius sola, frequentius frigidis iam dictis permixta, apponuntur. Calefacientia & quæ simul siccando humores vaporesve tenuiores discutiunt, in declinatione etiâ calidarum cephalalgiarum, ut quod residuum remansit tollatur, parsq; debilitata firmetur, locum habent: primumq; prædictis permixta, mox sola vsurpantur. Quibus omnibus vel ex alto caput perfunditur, aut abluitur: aut stuppæ, panni, spongiæ in illis madefactæ, fronti & temporibus applicantur: vel hæ partes istis inunguntur: aut hæc alio modo in sacculis, cucuphis madidis aut siccis, applicantur. Quorum formulæ sequenti modo distinctæ adhibentur.

Cum refrigerare & simul repellere volumus, oxyrhodina dicta magis consueta sunt, quale vsitatum ferè hoc est: R. aquæ Rosaceæ ʒ. iij. Aceti albi vel Rosacei ʒ. ij. ol. Rosacei ʒ. j. misce: Infundatur vel applicetur: quod si magis astringere volumus, acetii dosi augetur.

Admixtis succis efficacius fiet hoc modo: R. aquæ peculi Rosi ʒ. iij. Aceti ros. ʒ. j. succi fol. Salicis & Plantag. an. ʒ. j. album. Oui n. j. (ut diutius mador hæreat) misce: Si ab ebrietate fiat, succus Hederæ addatur.

Vel decoctum hoc repellens ampliusq; refrigerans vsurpetur: R. fol. Plantag. Salicū, Vitis, Solani an. m. j. Ros. rub. p. j. fiat decoctio, & in colat. ʒ. vj. adde succi Plantag. & Semperuiui ana ʒ. j. Aceti ros. ʒ. j. misce.

Vnguentis repellentibus frons temporaq; illini possunt: ut vnguento vel cerato Albo Galeni, vel Rosaceo.

Vel: R. oleo Rosacei, succi Salicum, Aceti ros. Album, oui ana æquas partes, agi-

tentur & conquassentur diu, illinatur vel applicetur.

Vel fiat tale vnguentum: R̄. olei Myrtillorum ʒ.ij. ol. Ros. omphacini ʒ.ij. succi Granat. acid. Aceti ros. ana ʒ.ij. Omphacii ʒ.ij. sem. Myrtill. Berberis, Coriandri ana ʒ.β. Lariceæ q. s. misceantur & agitentur: Vtatur vt prius.

Vel emplastrum hoc applicetur: R̄. succi fol. Salicis & Vitis vel Plantag. hyemis tempore, & Semperuiui ana ʒ.ij.β. Aceti ʒ.ij. subigantur farinâ s. Lini, & Album. oui, fiant emplastra duo, vtrinque ad tempora.

Ex Ros. rubris in Vîno maceratis frontale Galenus parat, quod efficacius erit, si rubrum & stipticum sit vinum: aut Acetum illius loco sumatur.

Folia Salicis & Vitis recentia applicata, idem præstant, magisque si parum conquassata aut contusa sint, aut sicuti de ros. dictum, macerata.

Quod si repellendum & dolor simul sedandus: R̄. aquæ Ros. ʒ.ij. aquæ Plantag. ʒ.ij. succi fol. Salicum vel Plantag. ʒ.ij.β. aceti flor. Papau. Rhœas, sicuti parare solent ʒ.ij. ol. Ros. Viol. ana ʒ.vj. Album. oui, mucilag. s. Psyllij ana ʒ.ij. agitentur probè ad vsum.

Vel vtatur hac cucupha aut frontali: R̄. Ros. rub. ʒ.ij. flor. Viol. Nenuph. ana ʒ.ij. sem. Coriandri præpar. ʒ.ij. sem. Myrtill. ʒ.ij.β. sem. Lactucæ, Papau. albi ana ʒ.ij. cort. Mandragoræ ʒ.β. Santali rubri ʒ.ij. Coralli rubri ʒ.ij. fiat pulvis.

Si refrigerare & humectare simul volumus, sequentibus vtimur: R̄. aquæ Lactucæ, Nenuph. Solani ana ʒ.ij. Aceti ros. (ad penetrationem & aliquâ repercussionem) ʒ.β. misce, Pro epithemate capitis.

Quo nomine & Solanum & Portulaca, recentia capiti admouetur, quæ si prius contundantur, melius operabuntur.

Quod si simul dolorem lenire cupimus: R̄. aquæ Lactucæ, Solani ana ʒ.ij. Aceti ʒ.β. mucilag. sem. Altheæ & Maluæ an. ʒ.β. Camphoræ ʒ.β. misce.

Vel hoc decoctum: R̄. rad. Altheæ, fol. Lactucæ, Solani an. m. ʒ. Semperuiui m. ʒ. s. Ros. Viol. Nenuph. ana p. ʒ. Hordei integri p. ʒ. sem. Lini ʒ.β. fiat decoctio in aqua, & vtatur.

Vel hoc epithemate admodum dolorem

compescente: R̄. aquæ Ros. ʒ.ij. aquæ Hyosciami ʒ.ij. Aceti ʒ.β. emulsionis ʒ.β. nucleorū Persicorum, factæ cum iam dictis liquoribus, ol. Ros. ʒ.β. misce.

Vel vnguento hoc anodyno vngatur: R̄. ol. Ros. Viol. ana ʒ.ij. ol. de semine Papau. de semine Lactucæ, Chamomil. ana ʒ.β. Aceti ros. ʒ.ij. Lactis ʒ.ij.β. Album. oui n. ʒ. misce.

Potentius sedat sequens: R̄. ol. Viol. Ros. ana ʒ.ij.β. ol. ex semine Papau. ʒ.β. succi Semperuiui, Solani ana ʒ.ij. Aceti ʒ.β. coquantur ad succorum consump. adde Santali albi & rubri, cort. Mandragoræ ana ʒ.β. feminis Lactucæ, Portulacæ ana ʒ.ij. mucilag. sem. Psyllij ʒ.ij. Camphoræ dissolutæ in pauca aquæ vitæ ʒ.ij. Ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum Populeon vsitatum dolorem sedat.

Vel hoc cataplasma admoueat: R̄. nucleorum Persicorum & Amygd. dulc. an. ʒ.ij. contundantur, addendo Amyli ʒ.ij. far. sem. Psyllij ʒ.β. s. Hyosciami ʒ.ij. ol. Ros. Viol. ana ʒ.ij. Lactis q. s. fiat cataplasma.

Quæ doloris tantum ferè compescendi causâ adhibentur, sunt sequentia.

Anodynum embrocū vel epithema. Lac recens tepens sumitur: adde Albumen oui vel Mucilaginem aliquam, benè conquassata, misceantur, & vtatur.

Vel decoctio: R̄. decoctionis capitis Vernicis vel Vituli: in quo rursum decoq; Maluæ m. ʒ. s. Chamomil. p. ʒ. feminis Lini ʒ.ij.β. feminis Psyllij & Papau. albi ana ʒ.β. fiat decoctio. Vtatur.

Vel linimenta hæc, quæ & auribus instillari possunt: R̄. olei Viol. & Salicum ana ʒ.β. ol. ex sem. Papau. ʒ.ij. misce, illinatur frons & tempora.

Aliud: R̄. olei ex fructu Momordicæ, vel Solani pomiferi, per macerationem facti, vel de vtroque ad ʒ.ij. mucilag. sem. Psyllij, cremoris Lactis ana ʒ.β. misce.

Item ex opio parata stupefacientia vnguenta: R̄. aquæ Vitæ ʒ.ij. Opii ʒ.ij. Croci ʒ.β. macerentur, vel parum bulliant in duplici vase: Illinatur tempora.

Alij hoc modo vtuntur: quod rectius sic parabitur: R̄. cremoris Lactis pinguis ʒ.ij. Opii ʒ.β. Croci gr. vj. Spodij, Amyli ana ʒ.ij. misce pro



ſce pro illinitione: Vel oleo Nenupharino aut Violaceo hæc admifcent.

Papaueris, Mandragoræ, Hyoſciami folia recentia, per ſe capiti admota, ſtupefaciendo dolorem compescunt, & validius, ſi prius contundantur, illud facient. Aliqui ſtuppis canabinis folia Hyoſciami prius inuoluta, ſub cineribus coquunt, & ſic poſtea emplaſtri inſtar adhibent: quæ tamen maniam excitare Rond. ſcribit.

Si ſimul diſcutere volumus, eaquæ refrigerantibus & dolorem ſedantibus permifcere, tunc hac embrocha vti poſſumus: R. rad. Altheæ ʒ. j. fol. Salicis vel Plantag. Betonicę an. m. j. fl. Roſ. Chamom. Sábuci, Anethi an. p. j. Senæ (quam admodum probant) ʒ. iij. ſeminis Anethi ʒ. ij. fiat decoctio in Aqua & Vino: Utatur.

Vel hoc emplaſtrum applicetur, quod & nonnihil diſcutit: R. fl. Viol. Nenuph. an. p. j. fl. Meliloti, Anethi an. p. β. ſeminis Papau. albi & Lactuæ an. ʒ. j. pulueriſentur, adde farinæ Hordei ʒ. j. cum Oxyrhodino ſubigan- tur, fiat emplaſtrum.

Sunt qui conſeruas flor. Viol. & Nenuph. loco plantæ ſumunt, additiſque reliquis, frontale parant.

Vel ſic: R. fl. Roſ. Viol. Anethi, Chamom. an. p. j. granorum Iuniperi p. β. coquantur in Lacte, & contundantur, adde farinæ Fabarũ ʒ. j. farin. f. Papauer. albi ʒ. ij. f. Lactuæ ʒ. j. olei Roſ. Chamom. an. ʒ. j. β. fiat frontale.

Anethum capiti adhibitum, quocunque modo, diſcutit, dolorem ſedat, & ſomnum conciliat.

Validius diſcutit ſequens: R. meli. Anethini ʒ. j. ol. Liliorum, Chéirini an. ʒ. β. ſucci Verbenæ ʒ. j. aquæ Vitę infuſionis fl. Lauendulæ ʒ. β. coquatur ad conſumptionem ſuccorum, adde Axungię Capi ʒ. j. Cera parum, fiat vnguentum.

Inprimis verò vnguentum Alabaſtrinum diſcutiendo iuuat, & in omnibus capitis doloribus vtiliſſimum cenſetur, quod ſic fit: R. ſucci Chamemeli (ex odoratiore) ʒ. iij. ſucci Roſ. & rad. Altheæ an. ʒ. ij. ſucci Rutæ, Betonic. an. ʒ. j. β. olei Omphacini t̄b. j. β. Alabaſtri puriſſimi & albiſſimi ſubtiliſſimè triti ʒ. iij. macerentur aliquandiu poſtea lentè

coquantur, additaquæ Cera fiat vnguentum: cui cimas Rubi, Album oui & Rutam aliqui addunt.

Dialtheæ vnguentum vtile quoque.

In antiquis dolorib. emplaſtrũ de Ranis vel Vigonis dictum, ſi capiti raſo applicetur, remedium eſt præſtantiſſimum: continuo vſu tandem multa efficiens.

Pulvis pro cucupha vel frontali, leniēs & nonnihil diſcutiens hic erit: R. ſeminis Coriandri præpar. ʒ. iij. ſeminis Anethi ʒ. ij. ſeminis Lactuæ, gr. Tinctorum, fl. Roſ. rubr. Anethi an. ʒ. j. Santal. omnium an. ʒ. β. Nucis moſch. ʒ. ij. miſce: fiat pulvis.

Alter diſcutiens & reborās: R. f. Coriandri præpar. ʒ. β. ſeminis Anethi ʒ. j. β. fl. Chamom. Melilori, Anethi, Lauandulæ an. ʒ. j. fol. Majoranæ, Meliſſæ, Anthos an. ʒ. β. Santal. citrini ʒ. j. Gariophyl. ʒ. β. fiat pulvis.

Proprietate quadã amuleta hæc creduntur iuuare. Verbena ſertæ inſtar capiti impoſita, capitis dolorem arcere dicitur.

Hedera ſi ebrijs imponatur, dolorem capitis mitigat, cum & ebrietatem impedi- at.

Senecta Anguium capiti circumdata; Lapis item Ophites geſtatus, iuuant in dolore capitis.

Naribus quoque alterationis cauſã quædam adhibentur. Inter quæ, odores non nimium caput ferientes; ſed illud mulcentes, prodeſſe quoque poſſunt.

Vt ſi frequenter Camphoram in Aceto & Aqua roſacea diſſolutam olfaciat.

Vel hoc modo: R. Camphoræ ʒ. β. olei Styracis ʒ. j. β. (quod Dioſc. probat) miſce diligenter: adde parum Ladani, fiat maſſula vel globulus, quem ſæpè odoretur.

Vel ſic: R. fl. Roſ. rubr. Viol. an. ʒ. j. fl. Anethi, Chamomil. nobilioris an. ʒ. β. f. Coriandri præpar. ʒ. j. f. Lactuæ ʒ. β. Santal. omnium an. ʒ. j. Camphoræ ʒ. β. fiat pulvis, quem in ſacculo vel nodulo ligatum, aquaquæ Roſaceæ & Aceto madefactum, naribus frequenter adhibeat.

Vel ſuſcitum huius decocti dum calet interdum naribus hauriat, qui dolorem ſedat & ſimul diſcutit: R. fol. Salicis, Solani, Lactuæ, recent. an. m. j. flor. Roſ. Viol. Nenuph. Anethi, Melilori, an. p. j. ſeminum Lactuæ

3.ij. seminis Papaueris satiui 3.j. seminis Oci-  
mi 3.ß. decoquantur, & colaturæ aquam Ro-  
faceam & Acetum Ros. permisce: Vtatur.

Aut in nares aquam Rosaceam cum pau-  
co Aceti, errhini instar attrahat.

Aut sequenti eas inungat, quod & stupo-  
rem faciendo dolore leuat: R. olei Nenu-  
phar. 3.j. Opii, Camphoræ an. gr. vj. misce: fiat  
instar linimenti.

Quod & auribus instillatum valde prode-  
rit: vti & reliqua olea vel linimenta infra di-  
cta refrigerantia, anodyna, & calefacientia,  
cum discutiendū erit: vti si oleum Anethinū  
addito tantillo olei Croci, auribus indatur.

Ablutiones extremitatum à genu & cu-  
bito factæ deorsum, non tantum à capite vti  
dictum diuertunt, sed & somnum simul cō-  
ciliant, dolorem mitigant, & si cephalalgia  
calida sit, in super refrigerant. Quæ ex folijs  
Salicis, Lactucæ, Violaria, Vitis albæ, Nenu-  
pharis cum floribus: additis Malua, Chamo-  
millæ floribus, & capitalibus interdum, Be-  
tonica, Calamenta, Abrotano, nonnunquam  
& narcoticis, cap. Papaueris decoctis in a-  
qua: addita interdum portione Vinivel Li-  
xiuij, parantur.

Ablutio faciei aquâ Rosaceâ cum pauco  
Aceto, similiter prodest.

~~~~~

DE OCVLORVM

D O L O R E.

CAPVT IV.

Genera.

OMNES dolores qui in oculi nudo globo,
illiūve canthis dictis seu angulis vtrin-
que, tum maiore interno ad radicem nasi po-
sito, (qui Rantir dicitur) tum minore exte-
riore, aut palpebrarum interna & nuda ru-
bicundaq; nonnihil superficie occurrunt, o-
culorum doloris nomine hic comprehendimus:
reliques palpebrarū externos affectus
dolorificos qui ad interiora minimè pertin-
gūt, ad externos cutaneos affectus relegan-
tes. In quib. nudis iam dictis locis, cum do-
lores oriūtur, aliq; nullo aliās apparente ac-
cidente fiant: alij verò alia simul manifesta
accidentia, quæ apertis oculis patent (siue
morbi aut causæ illorum, vel alia sympto-

mata sint) simul coniuncta habeant: inter
quæ præcipue elucet, vel rubedo, vel tumor
aut inflammatio in oculo, aut maiore illius
angulo; aut vesicula in oculo nata; aut inæ-
qualitas in palpebris; aut excoriatio, exul-
ceratio, vulnus in oculo illiūve palpebris,
pro diuersitate iam dictorum accidentium
patentium, horum dolorum genera sensi-
bus manifesta statuemus.

Nullo alio affectu in hisce locis apparente, ^{Pruritus}
dolores seu molestiæ potius eas sedes impe- ^{Punctio,}
tere possunt. Vt pruritus: sicuti interdum fit ^{Contra-}
in sanis alioquin, à vento aliisque de causis, ^{stio in o-}
vel in vigilijs, qui tamē nisi mox cesset, præ- ^{culo, nullo}
sertimq; si ad oculi frictionē impellat, statim ^{lo appa-}
ruborem conciliat. Punctiones item in ocu- ^{rente in-}
lo, nulla alia noxa præsentē depræhendun- ^{dicio a-}
tur: idque interdum per se; aliās in cepha- ^{lio.}
lalgia, in qua dolor ad radices oculorū quoq;
sæpè pertingit. Conuellens item quidam
dolor in quibusdam, post somnum, oculos
palpebrasque somno adhuc grauatas, ali-
quamdiu non sine dolore aliquo oculos ape-
rire mouereque sinit: sicuti in spasmo oculi
demonstratum fuit.

Cum rubore, citra tumorem & exulcera- ^{Oph-}
tionem, frequenter molestiæ vel dolores in ^{thalmia}
oculis se manifestant, Ophthalmiamque, sed ^{nō vera}
falsam, ad differentiam illius quæ cum in-
flammatione facta vera dicitur, vocant. Ru-
betque tunc vel oculi album totum, vel ali-
quousque saltem: vel palpebrarum tantum
interna superficies, non solum naturali ru-
bore, sed intensiore & veluti cruento rubet,
vel ambo simul, non tamen adeo vt in vera
ophthalmia venis amplis aut dilatatis. Vti
neq; tunc tantus adest ardor, sed lancinans
interdum solum dolor, quem Schmirgen vo-
cant: vel pruritus in oculorū præsertim an-
gulis palpebrarumque marginibus diuexat.
Xenophthalmiam eoq; nomine appellant. ^{Xenoph-}
In hac specie oculi plerumq; madet, lachry- ^{thalmia}
mæq; subtiles ab initio, mox tenaciores ex ^{Pseudo-}
oculo emanant: quæ si admodum copiose ^{phthal-}
fluant, illiq; affectui, vti dicitur, causam præ- ^{mia}
buerint, Epiphorā tunc ob hunc fluxū, idq; si ^{stet-}
palpebræ præsertim laborent, nominat, alij ^{cies.}
Taraxim, alij Lippitudinem humidam quo- ^{Epipho-}
que indigitant: in quibus tandem purulen- ^{ra, Pseu-}
ta exit. ^{doph-}
^{thalmia}
^{species.}

*Taraxi-
Lippitu-
do.*

*Scleroph-
thalmia,
Epiphora
va spe-
cies.*

*Xiropht-
thalmia,
Pseudo-
phthalmia spe-
cies.*

*Oph-
thalmia
vera.*

*Chymo-
sis oph-
thalmia
puerilis.*

ta exit materia, fordescuntq; affecti oculi anguli, ciliaque inuicem lentore humoris conglutinata, praesertim inter somnum oculis clausis cohaerent, nec ea donec purgetur separari, oculisve sponte aperiri potest: Arenaeque tum separatae tum compactae in oculorum angulis & ciliis vndique accrescunt, Sclerophthalmiamque inde nuncupant. Nonnunquam & palpebrae vtrinque intumescunt etiam extrinsecus, moxq; iterum subsident rursumque inflantur. Aliquando vero oculi rubri, sicci sunt, minimeque madent, tuncq; Xirophtalmia dicitur. Eiusmodi autem oculorum affectus cum rubore, interdum recentes sunt, à causa aliqua noua suscitati; alias diuturni, epiphora praesertim, in qua palpebrae tantum rubent & madent, oculo nihil vel parum mutato. Vnde vulgò fenestras minimè, sed ambirum quibus includuntur, affici tantum dicitur. Quod vitium senibus atq; ebriis adeò consuetum, vt vix in illis emendari possit, nec iis magnam, nisi aliud accedat propter pruritum aliquando & lincinationem aliquam, aut sensum asperitatis parit molestiam: quos etiam Lippos vocare solent. Quòd si rubicundi & calidiores solito tantum, sine dolore tamen fiant oculi: vti accidit interdum, cum corpus admodum calet; à causa externa, vel in febribus, vbi tamè dolor capitis ad radices oculorum vsque saepè pertingens, illic quoq; dolorem mouet, hæc cum ad deformationes potius, vti & fuggillationes illic factae, & palpebrae inuersae pars interior rubrè & turpem oculi aspectum praebens, pertineant, illic describuntur.

Cum tumore seu phlegmone & rubore interdum dolor se offert, in Ophthalmia vera tunc dicta. In qua totum oculi album vehementer rubet, venaeque alias obscure in hac sede, tunc in palpebris conspicuae euadunt, plenaeq; apparent. Tumetq; adeò saepè hæc pars, vt elatior quàm fusca esse appareat, saepeque illi obducatur, & quia tunc hiatus veluti in oculo apparet, Chymosis dicitur. Sed & pugni magnitudine oculum inflammatum cum palpebris intumuisse obseruauimus. Ardor in vera ophthalmia vehemens affligit, ita vt nullo modo, vel quàm minimè oculum aperire queant, In palpebris solis inflammatio

vera vix fit (cuius tamen meminit Dioscor.) quin ad adnatam quoque perueniat.

Cum tuberculo & rubedine dolor aliqua- *Aegy-
lops.* do (accedente interdum capitis tempore, vti & in vicinorum loco affecto dolore, vti & in ipso oculo pulsatione) oritur in maiori oculi angulo, in affectu qui Aegylops dicitur. In quo tuberculum inflammatum in medio, rubore in ambitu circumfusum prominet, dolorq; lancinans, summus interdum, molestus. Sed & palpebras malamque oculo subjectam simul inflammari obseruauimus.

Cum vesica oborta in oculi albo, dolor *Vesicae
oculi.* lancinans nonnunquam molestat, illaq; vti & eius ambitus rubet. Quae si in fusca sede oboriatur, dolorè minimè parit, pellucidaq; omnino est Phlistena, alibi explicanda: vti & aliae pellucidae, maculaeque illius loci, visui potius incommodantes, quàm dolorem adferentes.

Cum inaequalitate aliqua & non decenti *Asperitas
in oculo.* lauitate, quae in oculo & palpebris esse debet, asperitatis quidam sensus & molestia in palpebrarum interioribus, praesertim dum mouentur, saepè sentitur. In quo casu, interdum aliquid, quod hunc sensum mouet, in oculo haeret: alias verò minimè: interdum quoq; etsi quod illapsum fuit, palpebrasque exasperauit, rursum exciderit, aut exemplum sit, sensus tamen ac si adhuc haereret, nihilominus aliquamdiu manet.

Cum erosione vel excoaratione, idè asperitatis sensus, dolorq; simul lancinans & pruriens in angulis oculorum interdum occurrunt, cuius & Dioscor. cum remedia ad erosos oculorum angulos praescribit, meminit. Frequentius verò in palpebrarum interioribus hoc accidit, vt aliquomodo erodantur: tuncque saepè crusta illi innatae scabiem, in ciliis potissimum apparentem, ibi generant: diciturq; vitium hoc Pforophthalmia, Scabrities vel Scabies oculorum: quae & sicca Lippitudo, & Xirophtalmia ab aliquibus vocatur.

Cum vlcere in interno oculi angulo dolor *Vlcera in
catho
malis
oculis.* lancinans & pruriens saepè oritur, idque fere post aegylopem in abscessum conuersum & ruptum: Vnde vlcus illic vel simplex remanet, è quo pus coctum plerumq; exsudat, vel ferpens & malignum, & vt vocant, phagæda.

*Phagedenica
& Sinuosa
ulcera
canthi
maioris.*

*Fistula
lachry-
malis in
catho-
culi.*

nicum fit, tuncq; pus nunc album & coctū; nunc aqueum & crudū ex oculi angulo, & præsertim cum premitur, emanat. Aliquādo verò sub inferiore palpebra alicubi sibi viam faciens, tuberculum in cute facit, eoq; disrupto, vlcusculum illic quoq; factum, aquosam purulentamq; hanc materiā profundit. Sæpius etiā, si abscessus post ægyloperm relictus tardius rumpatur, vlcus sinuosum relinquitur, cuius latera callosa & dura sūt, mediūq; foramine lachrymali dicto, quod etiam naturaliter ex hoc angulo in nares fertur, peruium est, eoq; amplius dilato in fistulam conuertitur, Fistulaque lachrymalis dicitur: in qua per nares quoque proximam pus illudq; sæpè graveolens effluit, lachrymisque continuo oculi stillant. Interdum etiam diuturnitate & malignitate vlcis, absumptā carunculā, illius anguli, eoq; latiore facto, os tenue illic oculi orbitam foramenq; lachrymarum fluxui paratū formans, exesum perforatumque conspicitur: cuius osis portionem cum pure crasso & foetido diutius illic retento, è nare procidisse vidi. De quo vitio in deformationibus agemus.

Vlcera oculi globuli.

In oculi globo, cum vlcere dolores quandoq; etiam se proferunt. Quod aliās superficiarium tantum est, rubore subcreueto, in eo loco vbi vlcus est, ardore cæterisq; accidentibus, vt ophthalmia molestant, inflammationemq; aliquādo accersens. Aliās profundum, inflammationes in abscessus maturatas sequens: quod cum sordidū fit & purulentū, Epicauma dicitur: si duris constet labijs, Condyloma: quod sanatum cicatricem post se relinquit: in oculi verò cauum penetrās, humorum profusionem facit, quos aliquando quatriddo post inflammationem ex vitro oculo effluxisse, crystallinumque in barba hæsisse vidimus.

*Epicauma vlcus oculi.
Condyloma oculi.*

Vulnera in oculo.

Cum vulnere in oculi globo punctum factumve factū, aut contuso, dolores se etiam patefaciunt: quos non solum rubedo & dolor lachrymarumq; fluxus, sed & vera inflammatio nonnunquam comitatur: & si vulnus oculi globum penetret, humorum sequitur effusio, oculusq; concidit. Intrinsecus quoq; palpebræ, ab illapsis acutis si vulnerentur, dolores cum rubore, vti in excoaratione di-

ctum, maioresque adhuc, si magna sit læsio, excitantur.

Causa.

CAusa omnis doloris in oculorū sede vniuersa dicta occurrere, morbus est, in parte aliqua oculi sensibili consistens: sentiunt autem in dicta oculi sede, tunica externa illius exquisitè admodum, quæ palpebras vndiq; succingit, & angulis vtrinque, oculiq; albo aliquoulsq; obducta est, cum adnata illi in externo oculi cantho caruncula: multi item & crassi muscoli oculum ambientes. Præter quæ, oculi globus ex cornea tunica constitutus, alijsq; membranis compositus & humoribus, plenus, nullibi (sicuti ex cataractæ punctura, quæ sine dolore in cornea fit, obseruare licet) sentit, nisi extrinsecus illic vbi tunica adnata illum, vti dictum, in circumferentia eius apprehendit: cuius causā dolores in oculorum morbis ad oculi globum vsq; pertingunt. Morbi verò dolores in hisce locis producentes, sunt, vel intemperies: vel humoris sanguinei aut serosi affluxus: vel solutiones continui occultæ manifestæue.

Intemperies calida simplex nondum fluxionem concitans, calorem potius & pruritum quàm dolorem in oculis excitat; qui si superveniat fluxionem, mox commouet. Qualis à calore externo atque interno in morbis calidis & febribus, in cephalalgijis & delirijs, in quibus oculos prurientes perfricare solent, subsecuturæ interdum narium hæmorrhagiæ, sanguine calidiore eò vergente, indicium, in oculis nonnunquam excitari solet: quæ & punctiões interdum in oculis mouet. Dein & frigida intemperies à vento frigido præsertim, alijsq; prodiens, mordicando oculos vt pruriant facit. Siccitas insuper nimia, asperitatis sensum & pruritum etiam excitare potest: quæ & fortè causa est, quòd vigilantibus diutius, tùm in morbis, tùm extra hos, oculi qui tunc & nonnihil rubent, adeò pruriant, vt eos fricare cogantur: nisi fortè grauedo oculorum, quæ cum somnus inuitat adest, occasionem huic præbeat.

Cum affluxu humoris sanguinei, intemperies calida si oculum palpebræve occupet.

*Calida,
Frigida
& Sicca
intemperies,
causa
Punctiões
in oculo.*

*Siccitas
causa
Asperitatis
in oculo.*

*affluxu
sanguini-
um, cau-
sa Oph-
thalmiæ,
non vera
illiusq;
speciem.*

pet, ruboremque illic excitet, nec dum vera adhuc sit inflammatio, ophthalmiam falsam dictam, quæ mitior quàm vera est, procreabit: eamque humidam, si lachrymæ ob molestiam partis summè sensilis proritatæ, simul hunc affectum comitentur: vel siccam appellatam, si hæ (quod fortè quia caput in illis minus humidum est euenit) desint: vel etiam aridam seu duram vocatam, si serum tenacius, quod lachrymas parit, palpebris adhærens illas conglutinet, suamque terrestre itatem illic deponens (sicuti seri causa arenas gigni alibi docuimus) arenas palpebris accrescentes, procreet.

*Inflam-
matio o-
culi, cau-
sa Oph-
thalmiæ
vera.*

Quod si verò in hoc sanguinis influxu, sanguis non solum in venas, sed & in tunicam oculo adnatam, palpebrisque succinctam erumpat, veramque inflammationem pariat, ophthalmia tunc vera dicta sequetur, in qua proin omnia accidentia grauiora existunt, dolorque magis intensus, & propter pericranij cum tunica adnata consensum & connexum, caput quoque interdum afficiens, vrget: grauior adhuc si in musculos oculorum hic sanguis defluxus etiam feratur: qui & in corneam tunicam, & sub eam nonnunquam effunditur. Dolor quinetiam eò maior erit, quo sanguis qui defluxit calidior, biliosus acriorve existet. Quo priuatim in maiorem oculi angulum incidente, illicque inflammationem excitatè, ægylops dictus, eam partem præcipuè torquens, sequitur. Causa verò, quæ hunc influxum sanguinis in oculos efficit; est vel illius plethora, vel tenuitas aut caliditas, siue acrimonia: cuius nomine cum illis in locis redundat aut turget, à natura propulsus, in hanc partem potius quàm aliam propellitur, Ophthalmiaque tunc ex plenitudine facta vocata sequitur. Adiuuantè interdum ad hoc oculi dispositione ad suscipiendum apta, si oculorum venæ vel per se, aut quia defluxione hac priùs sæpè infestatæ fuerunt, ampliores sint. Plerumque tamen huic influxui in oculos, vnde calefiunt vel inflammantur, causæ aliæ, quæ eos accendendo vel irritando, grauiusve lædenda, defluxionem in ipsos mouent, occasionem præbent, eoque facilius, si supradictæ quoque accedant, Vti

*Inflam-
matio o-
culi cau-
sa ibi, cau-
sa Ægy-
lopiæ.*

à splendore nimio fieri potest: quem proinde ophthalmiâ laborâtes nulla ratione, vti nec aliquam lucem, si grauis sit ophthalmia, ferre possunt, ab eaque grauius adhuc afficiuntur, & proin oculos vix aperiunt, aut non diu apertos retinent. Quod & interdum ab aëre calidiore æstuatè, & oculos accendente euenire solet. Et à vento frigido oculos mordicante. A fumo acri oculos vellicatè. Vel ab aliis oculo illapsis quibuscunq; cum contactum alienū oculus minimè ferre possit, sed eo molestetur, eoque magis, si simul acuta & aspera sint, vt pulueres, muscæ, aliæve, quæ oculum rodunt vel pungunt. Quod & pili in cilijs curuati in oculum, nonnunquam faciunt. Vel si calida & adurentia sint, vt piper: vel acria alioquin, vt sal vinumq; inspersa, & similia. Læsiones item grauiiores oculi, vnde & vlcérantur vulneranturque, quæ in illa oculi dolorum causa explicabuntur, ophthalmiam, quæ hosce illius alios morbos comitatur, tam veram quàm falsam concitare possunt. Lachrymæ item ophthalmiæ interdum superuenientes, ab eaque illiusq; causis commotæ, tum etiam ab aliis causis excitatæ eam præcedentes, si acres sint & calidæ, ophthalmiam vel de nouo excitare, vel iam factam deteriorem reddere possunt. Quæ omnes causæ enarratæ oculum molestantes, si pruritus simul moueant, illeq; vt oculum affectum ægri fricare cogantur, impellat, fit, vt ob frictionem illam, à qua sibi vix temperare possunt, grauius oculi afficiantur, nouaque sæpè concitetur defluxio.

Serosus humor simplex, pituitæ, aliisve humorib. permixtus, in oculos palpebrasq; potissimum decumbens & defluens, si plus ad pituitæ aqueæ naturam accedat, vix dolore vehementiore, vti verò cōtinuo lachrymarum fluore, nonnunquam & tumore palpebrarum externo, molestiam parit: de quo vitio in lachrymarum nimio fluore agemus. Si verò serosus sit, falsedinisque particeps, nonnihil pruritus mouet: sin acris insuper calidusve existat, tunc rubore, pruritu, ardore, plus minusve dolorem inferens, lachrymarumque instar continuè ex oculis destillans, epiphoram dictam parit: idque nunc in vno solum, nunc in vtroq; (cum vno oculo

*Serosi hu-
moris in-
fluxus,
causa
Pruritum
in oculo
& Epi-
phora.*

fluxione tentato, alter facile illi cōsentiāt) oculo: quæ & epiphora nonnunquā, si dolore admodū ex cruciat, sanguinis influxū simul concitans ophthalmiæ in super, quæ epiphorā tunc sequitur, occasionem præbet. Causa verò huius defluxionis materialis, est humoris huius serosi qualiscunq; in capite, intra vel extra caluariam redundantia, sicuti eiusmodi excrementa illic frequenter congesta, defluxionibus occasionē præbere solent. Efficiens verò mouens defluxionem in hanc potius oculorū sedem causa in illis consistit, quæ oculū irritare, & sicuti naturales lachrymas, sic & præternaturalē hunc humorem, ut vna cum lachrymis, huc fluat, cōmouere possunt: qualia in sanguinis influxus in oculos causis, cum & hunc quoq; proritare possint, explicata sunt, partimque in lachrymarum causis, in excretis demonstrabimus.

Atque hæc omnia adiuuat oculorum dispositio ad suscipiendum apta, si sæpe fluxionibus tentati laxiores imbecillioresque redditi sint: vnde etiam euenit, ut malum hoc hisce postea consuetum & diurnum sit, si causæ hæc concurrant, ut palpebris rubentibus & madidis cōtinuò, pro ratione humoris defluentis plus minusve afficiantur: nonnunquam & palpebræ exulcerentur, interdum & nullum ferè dolorem, sed leuem pruritus tantum sentiant.

A flatibus dolores oculorum ophthalmiasque fieri posse aliqui scripserunt, verum cum status nullibi oculū subire possint, nec locum ubi in oculo colligantur vacuum habeant, & si illic nascerentur, oculi globū spissum aded dilatare nequirent, aut cum insensibilis sit tantopere afficere, nō video quomodo hac ratione fieri queat. Extra oculi globū verò si vapores halituosi dicti musculorum interstitijs se inferant, accedente lassitudine, nictationem illam oculorum potius, quam dolores fieri in motu deprauato ostendimus: nisi fortè copiosius collecti, aded eos distendant, ut (sicuti dictum) conuellens dolor, oculos aliquandiu, antequam post formnum aperiuntur, nonnunquam affligens, oriatur: accedentibus insuper alijs causis, sicuti in spasmus flatulento nominato hoc explicatum fuit.

Solutio continui in oculi sedibus facta, diuersa, prout ea vel leuis vel grauis existit, molestiarum dolorumq; oculi inducit genera. Si enim occulta adhuc sit & vellicatio tantum, nondum aliquid in oculo separans aut diuellens, pruritū statim & asperitatē parit: & si perseveret doloremq; grauiorem faciat, ut dictum, ophthalmijs & epiphoris causam præbet. Si verò manifesta sit solutio, tunc si adnata tunica à subiecto oculo separatur, atque illud spatiū impleat, vesica nascetur. Vel si tunica illic aut in angulis vel palpebris separatur, erosiones, abrasiones, scabies, vlcusculaq; sunt. Si verò profundior sit soluta continuitas, vlcus vel simplex vel cauū, vel fistulosum, vel vulnus gignentur. Quorum omniū variæ sunt causæ. Alias enim ab extrinsecis iniurijs hæc in oculo contingunt: inter quas perfrictio frequēs & valida, quam variæ causæ pruritus in oculo excitates (ut prius dictum) vrgere & cōmouere possunt, oculi phlyctenas & excoriationes quoque promouere potest. Incidentia in oculum aspera si sint, non solum oculum exasperare, eundemq; sensum ut aliquamdiu retineat, efficere, sed & aded ut abrasiones tunicæ sequatur, afficere possunt: quæ verò simul vrit aut acria sunt, si oculo illabantur, non solum (ut dictum) illum inflammare, sed & vrendo, ut tunica abscedat, phlyctenas & erosiones excitare possunt, sicuti ex succo cucumeris asinini, fructu maturo disrupto, & in oculum casu effuso, vidi accidere. Frequentius à collyrijs fortioribus, quibus maculas extergere voluit euenit: quæ omnes erosiones in verū vlcus degenerare possunt. Quod si ea quæ secant vel pungunt in oculum, incidunt, eum non solum irritare sed & vulnerare possunt. Quod & ab ictu puncturaque oculo sæpe accidit, tum casu: tum cum in oculi suffusione ad detractionem pelliculæ acui, necessariò oculi globus perforatur: quas oculi solutas continuitates, inflammatio (ut ostensum) sæpe comitatur. Lachrymæ quoque vel alius serosus humor à causis supra enarratis; oculum diu madefacientia & irritantia, tandem partes hæc erodunt, scabiemque palpebrarum inducunt, vlcusque verum interdum procreant: quæ vitia epiphora

Vapores,
causa
conuel-
lens dor-
loris in
oculo,
sive con-
tractio-
nis.

Pellicula
in oculi
causa
Pruritus
Asperitas
tatu in
oculo,
Ophthal-
mia, &
Epiphora.
Solutio
continui
manifesta,
causa
Vesica,
Scabries,
Vlcus,
Fistula,
Vulnus
in oculo.

phoram sæpè comitantur nonnunquam sequuntur Morbi prægressi alij, hisce solutionibus continui ansam frequenter præbent. Sic phlyctenæ ruptæ excoarationem post se relinquunt. Ophthalmia vera, inflammatione non discussa sed suppurata, in abscessum conuertitur: quo rupto vlcus profundum interdū manet. Aegylops quoque phlegmone in abscessum abeunte, eo rupto in vlcus plerumque abit. Quod vel simplex est: vel malignum, si sanguis qui inflammationem hanc genuit deterior fuerit: vel sinuosum, si pure acri, ob abscessum non maturè apertum, remento, aut alioquin in vlcere hærente, illud locum illum exedat. Vnde tandem, si labra diuturnitate vlceris callosa fiant, tunicæ vel illis accrescat, fistula suboritur, in narium profunditatem descendens: absumptisq; ab eodem pure aut acribus medicamentis, quibus vlcus sanare nituntur, caruncula anguli illius, carneq; affectus qui Rhyas appellatur, sequitur: aliquando & os vicinum tenueroditur & deperditur.

Curratio.

PRO diuersitate causarum, diuersorum dolorum oculi generum; prædictio & curatio instituitur.

Intemperies calida simplex sine affluxu alicuius humoris, pruritū tantum, interdum punctiones accersens, si in cephalalgijis accidat, dolorque in illis ad oculorum quoque radices pertingat, dolori capitis cura potius accommodatur. In quibus calor & rubedo oculorum venarumque dilatatio, indice die præsertim vrgens, hæmorrhagiæ narium superuenturam portendit. Si verò ob causam aliam extra hos morbos: vel calidam, vt æstum, motum vehementem: vel frigidam, vt ventū: aut vigilias, oculi pruriant & rubeāt, sublatis causis & correctis, aëre temperato, quiete & somno hæc remittunt, aut leui negotio (vti in topicis dicitur) emendantur.

Post somnum remanens grauedo oculi & palpebrarū tāta, vt oculū veluti cōtorqueat, nec aliquamdiu sine molestia aperiri sinat, capitis grauedinem vaporumq; & humorū copiam præfagit: quibus nisi sæpè negotium faceffat, corrigendis potius hoc indice ad-

moniti, quā vt huius levis impedimenti causa aliquid moliamur, intenti esse debemus.

Ex sanguinis affluxu, si ophthalmia nondū vera nascatur (nisi hæc in verā transeat) minus est periculi. Si verò oculi sequatur inflammatio, periculosior est vera hæc ophthalmia: eoq; deterior, si tumor magnus nigrum oculi obducens, adsit: pessima autem ea est, quæ suppurata in abscessum cōuertitur, qui in vlcus abit, quod si profundum sit, in periculum de oculi amissione inducit. Sed & nō suppurata ophthalmia, tam vera quā non vera, diuturna tamen, pupillam tandem obfcurans, aut maculam in ea relinquens, visus obscuritatem vel cæcitatem potest efficere: Inflammatio verò, in externo oculi angulo in ægylope facta, aliās citò euanescit, frequentius neglecta, suppurata, diuturno & peruerso vlceri occasionem præbet: quod in fistulam conuersum ægrè amplius sanatur.

Ex serosi humoris influxu, epiphora pertinax quoque est admodum, sæpè multos dies, aliquando menses, totum interdum hyemen, nonnunquam, in senibus præsertim, ad extremos vitæ dies vsque persistens.

Phlyctenas à causa externa natas, pellucidas, sine rubore, sponte iterum subfedisce atque euanuisse vidi. Quæ cum rubore & dolore eueniunt disrumpæ, excoarationem post se relinquunt.

Excoarationes & scabies non tam citò ob loci madorem sanantur; difficilius si in vlcus abeant. Quod si purulentum sit aut callosum, curatu pertinax, nonnūquam & immedicabile oculum penetrans, illius amissionem parit, vel callo obductum & cicatrice visui incommodat.

Ex vulnere oculi corneam penetrante, humores effundantur, oculusque collapsus fit inutilis. Superficiarium vulnus in vlcus abit, curatu (vti dictum fuit) facile vel difficile. Punctura inflammationem, nisi caueatur, causat.

Cæterum quod curationem attinet illorum affectuū qui illam requirūt, nec sponte sanari possunt, causis hæc primū accommodanda est. Quæ vel extrinsecus adueniunt, vt sunt corpora dura oculo illapsa: vel piliciliarum oculos subeuntes, aut aer &

Oculorum
dolorum
omnium
generum
vt Pruritus,
Punctio-
nis, Con-

solen-

Rhyas,
caruncula
oculi
absum-
ptio.

Pregno-
stica in
singulis
Oculorum
dolorum
generib.

*tractio-
nis, Oph-
thalmia
falſa &
vera.
Aegy-
lopi-
asperi-
vati-
Scabri-
vici. Pl-
cerum,
Fistula,
Vuln-
eris,
in oculo,
per can-
ſa abla-
tionem
curatio.*

ſplendor oculis moleſtiam adferētia. Vel ab-
aſſumptis: aut motu corporis & animi ocul-
orum noxæ. Vel alia ſunt impedimenta, vt
fordes, lachrymæ oculis moleſta. Quas cau-
ſas ſi morbos hoſce, vt ophthalmias, exulce-
rationes, ab initio procrearint, nec dum age-
re ceſſent, vel poſtmodū ſuperuenientia ma-
lū augeant aut irritēt, prius remouere opor-
tet, vel auertere, aut emēdare, vel vt ab illis ſi-
bi æger caueat, procurare. Si verò à deſluxio-
ne humoris ſanguinei in oculos, ophthal-
mia, aut ſeroſi, epiphora nata ſit, aut oculi
iam prius affecti nouis deſluxionibus ſuper-
uenientibus moleſtentur, tunc euacuando
per phlebotomiā arterotomiā, aut cutis pa-
renteſim vel uſionem, per cauteria; aut
attractionibus inſtitutis per cucurbitulas,
hirudines, frictiones, vel expurgationes, a-
lias per aluum, nares, os, vomitum, ſudores,
vrinas, humorem expurgare, aut ab oculis
aliò dirigere & deriuare debemus: eumque
exhibitis admotisq; abſumere, atque influ-
xum in oculos extrinſecus admotis impedi-
re. Morbi verò ipſius cauſā, pro eius diuerſi-
tate, topicis oculo appoſitis medebimur.
Quæ omnia ordine enarrato cauſis morboq;
vt dictum accommodato, ſequenti modo
perficiuntur.

Illapſa in oculos ſponte frequenter rur-
ſum ex oculis, ſi fluida ſint, emanant; & ſi ſo-
lidiora ſint, motu oculi & palpebrarum pro-
pulſa, lachrymisque quæ mox ſuperuenire
ſolent abluta, ſæpe recedunt. Si verò ſub-
ſiſtant arte vt inde auferantur procuran-
dum.

Quod fiet eò facilius, ſi ea vel in angu-
lis hærentia, oculo aperto vel palpebris
elevator ſub illis poſſunt conſpici, tuncque
panno linteo in forma turundæ forma-
to, aliòve ſtylo molliore, indiſtriē eximi
debent.

Quod ſi verò in abdito latētia minimè cō-
ſpiciantur, aut prius viſa dum tanguntur eò
retrocedant, aut motu oculi propellantur:
tunc leuibus lubricisq; in oculum impoſitis,
grauiuſculis præſertim, oculoq; conuoluto,
ex profundo in apertum horū impulſu ſunt
prius propellenda, poſteaq; eximenda: ſicuti
lapillis exiguis & planis id cōmodè præſta-

tur. Vel vulgaribus ſilicibus, quos Ophthal-
micos huius uſus cauſā vocāt. Vel prætioſis
lapidibus ſic formatis: inter quos lapis Che-
lidonites dictus, ac ſi ab hirundinib. deſum-
ptus, in oculorū affectibus peculiarem vim
haberet (cū tamen ex marmore vel iaſpi-
de fului coloris ſic formetur, aut alioquin in
ſaxis inueniatur) præſertim uſurpari ſolet.
Vel lapilli illi aſtacorum fluuiatilium, quos
Oculos cancri vocant, ad hoc præſtandum
formam à natura adepti, in eo, quòd in vna
parte parum caui, altera parte rotundi, pal-
pebrarum conuexo & oculi globo egregiè
ſe accommodant.

Quod & Rhazis piſtillo exiguo reſinā pi-
nea illito, per oculum ſub palpebris ducto eò
rectius fieri poſſe docet, quòd huic glutini,
quod tamen ſtatim oculi madore madefa-
ctum inutile fit, res illapſæ adherentes com-
modius ſic poſſint extrahi.

Sternutatio vel emunctio frequens, ad ex-
cutiendas, vel ſaltem ex alto prouocandas
res in oculo ſubſiſtentes, tum per ſe, excuſſu
aëris valido per nares facto, quo & oculi im-
pelluntur, tum intermedio lachrymarum
quas ſimul concitat, admodum iuuant.

Alia quoq; quæ lachrymas mouēt, eluen-
do hæc, proderunt. Vti & mōtus oculi fre-
quens, ſi palpebræ apertæ interim retinean-
tur, res extrorſum promouet.

Incurui & deorſum contorti ciliorū pili ſi
oculos pungant, quod fit cū ob ſlāmam o-
culis propinquā ex parte uſti vel inflexi cur-
uantur, aliā uero externam ob cauſam, ſi am-
putentur, nullum ampliùs recrescentes pili
cū recti ſint, damnum adferūt. Si verò qui
recrescunt tales cauſā pororum quoq; ſiant,
eos cōtinuò abſecare vel euellere neceſſe eſt,
aut vrendo cilia ne recrescant procurare:
quod cū non tantum cum dolore fiat, ſed
& indecorum ſit, ciliis carere, vt recti ſiant
ſicque retineantur, in ſuſione gummi Traga-
chati, aliòve viſco, vel Maſtiche diſſoluta in-
uncti firmantur, inuicemque glutinati ne o-
culum ſubintrent, cauetur: ſicuti muſtacem
ne os ſubeat, ſed tranſverſim rigeat, ſic illi-
nendo aliqui procurant, quod & quibuſdam
pulchrum eſſe videtur.

Aër calidus oculis rubicundis & inflāma-
tis

tis cū obfit, avertendus vel contemperandus, aut etiam refrigerandus: cū aër frigidiusculus, oculis sic affectis proffit. Summè verò frigidus, vento præsertim agitatus, in omnibus oculi læsionibus nocet. Vti & is qui fumo aut etiam aliis tenuioribus exhalationibus perturbatus, acrisque factus, oculos mordet & irritat. Sicuti & à vehementer odoratis quibusdam, vt oleo spicæ & fœtidis, vt extrementorum nidore oculos vellicari videmus. Quæ proin omnia oculis dolentibus noxia, vitanda sunt.

Vti & inprimis splendor tum solis tum flammæ, quem oculi dolentes pati minime possunt, ab eoque grauius læduntur. Sed & lucem quoque, si vehementius affecti sint, cū ferre nequeant, oculos vix ægri aperiūt. Et proin in hisce morbis, ægri oculum affectum obiectum velo atro, nisi hoc aliis fiat oculo applicatis, lucem arcere, vel in tenebris se continere debent.

Cibi à quibus corpus accenditur, vnde facies & oculi, illis sumptis rubent, vt inprimis à vino forti; vel hi à quibus vapores calidi exurgentes, oculum vellicando lachrymas eliciunt: vti ex cōsuetis bellaria & condimenta ex capis, & sinapi & raphano, aliisque parata, vitandi. Sed & tenui vti victu, & aliquādo à cœna abstinere, plurimum in epiphora prodest.

Commotio oculorū indecens vel nimia, oculis dolentibus quoque est noxia. Vti in illis qui alias lucem ferre possunt, intuitio rerum sedula vel lectio nimia. Motus corporis vehemens aut validus aut indecens, per capitis præsertim inclinationem: ob quam causam erectus potius stare & supinus dormire debet, in latere oculo dolenti opposito. Aut frictio oculi; à qua sibi ob pruritum cū vix temperare ægri possint, malū frequenter exacerbant.

Animi diuturnior commotio per vigiliis nocet quoque. Vel perturbatio tanta, vt ploratum causet, quo valde cū lachrymæ affluant, oculus læditur. A quibus omnibus æger quantum fieri potest, sibi cauere debet.

Vti & ab illis quæ casu extrinsecus accidentia, vel quæ dum oculis mederi volumus, illis indūtur collyria, quia nimis acria,

oculos lædere possunt: sicuti & ab illis quæ alioquin in aëre volitantia, vt pulueres, muscæ, quæ facillè oculos subeunt, eosdemque affligunt.

Impedimenta alia quoque remouenda, quæ in oculo se offerunt. Vt sunt cilia inuicem conglutinantia, quæ oculum quò minus aperiri & non sine vi & dolore possit, retinent: quorum gluten, limum & arenosam materiam adhærentem pilis, manibus placidè & sensim, ne oculum dolentem irriteremus, ab illis detrahenda oportet. Et nisi facillè cedant, prius ea humore aliquo, vt cedere possint, emollire: vt Aqua tepidula simplici vel Rosarum: aliæve oculo affecto commoda: in qua mucago vel albumen, cū magis emollire volumus, dissoluimus.

Sordes aliæ quoque oculis inhærentes, quando pupillæ præsertim præpositæ visum impediunt, leuiter & molliter palpebrā versus angulos fricando, ducendæ, indeq; tum hæc tum aliæ illic collectæ, vt de aliis illapsis dictum, eximendæ.

Lachrymæ cū fluunt, quò minus exterguntur, eò minus oculus offensus prius irritatur: cū verò vrgent, non sapè & validè linteo eum fricando, sed tantum adhibendo leuiterque apprimendo, eas excipere auferreque oportet.

Phlebotomia, si à sanguinis affluxu fiant dolores, cōuenit: vt in ophthalmia & ægylope: Et in aliis causis, vt in vlcere vel vulnere: si ob dolorem noua defluxio sanguinis in oculos metuatur, ad præcautionem quoq; proderit: eoque magis si inflammatio adsit vel imminet, corpusque sit plethoricum, tunc enim copiosius sanguis detrahi debet, & nonnunquam repeti, illudque vel in eadem vel diuersis venis. Aperitur autem revulsio- nis causâ cubiti vena humeraria; vel ea quæ magis illic patet, eiusdem lateris cū oculo affecto, quam in opposito latere, dum adhuc sanguis in oculum fluit, Arabes tundere iubent. Fit & in pollice manus, vel in pede eodem nomine venæ incisio. Eamque quæ inter spatulas est, aliqui secant, E propinquiore vena, cū è loco affecto melius educere & deriuare sanguinem iam fluxum cupimus, emittitur; vt frontis vel temporum,

vel linguæ venâ. Vel vt aliqui voluerunt, etiam syncipitis.

Arterotomia in capite, vt in dolore capitis dictum, facta in ophthalmia graui vel diuturna, magnum adfert adiumentum. Et in epiphora perseuerante, qualis sæpe esse solet, si serosus humor lachrymâtes oculos causans per exteriore venas descendat, eam præceteris omnibus sanare, aliqui docent.

Paracentesis, cute capitis ad radicem occipitij perusâ facta, & transmissio filo crasso aut chordâ fericeâ, vel sericeâ, aperta aliquâdiu retenta, in epiphorâ fluxu diuertendo, vltimum ferè est remedium.

Cauterium actuale vel potentiale in ceruice è regione oculi dolentis, vel in medio nuchæ, vel in capite ad futuram coronalem, adhibitum, tanquam extremum efficacissimumque præsidium, in perseuerante ophthalmia & epiphora, necnon aliis fluxibus in oculos, vsurpatur.

Cucurbitularum applicatio in omnibus fluxibus, tam à sanguine quam seroso humore ad oculos factis competit: vel sola, vel adhibita simul scarificatione: in primis si fluxus sit sanguineus. Quæ colli lateribus, in summo humero, scapulis, brachijsq; vel simul vel separatim vno aliquo in loco affiguntur, & perseuerante morbo sæpe repetitur: cum hac ratione magna fiat reuulsio deriuatioq; Auriculæ in latere oculi dolentis, scarificationem, sunt qui magni in hoc casu momenti esse censeant.

Hirudinum applicatio, eo modo, vt in dolore capitis dictum: venæ sectionis vices supplet.

Frictio extremitatum aliquo pacto quoq; reuellit.

Per aluum euacuationes, in fufis clysteribus, vel intrufis suppositorijs instituuntur: quibus excrementa obuia ante venæ sectionem, vel alia purgantia, non nihil prius eluuntur. Quæ & tunc & postea quoque iteratæ, si defluxio quæcunque in oculos, dolores pariat, vel ea timenda sit, egregiè reuellant: quæ vel emollire vel stimulare plus minusve, prout morbus exigit, debent. Qualia passim hinc inde describuntur.

Propinquantur purgantia ad eiusmodi per

inferiora excretiones moliendas, leuiora: tum vt alui constipationem, quæ oculorum affectibus incommodare solet, soluamus: tum vt primas fæces, vti de clysteribus dictum, eluamus. Quæ & in omnibus causis, si prædicta hæc alui solutionem requirant, vsurpari possunt. Vti & in oculorum inflammationibus ne exhalationibus, tetris malum irritetur, hoc pacto præcauemus; abstinendo tamen à calidioribus, contemperandoque ea frigidioribus. Quæ & in ophthalmia falsa, etsi nulla inflammatio, calor tamen & rubedo adsint, cõueniunt: in qua & paulo fortioribus vti possumus: idq; præsertim in pgressu morbi, cum lachrymæ oculo molestæ esse incipiunt. Quorum exempla in biliosis affectibus hinc inde proponuntur, & in capitis dolore à causa calida ostensa sunt: addendo interim ea, quæ ea oculis appropriata, hæc illis accommodent.

Præparatione præmissa hoc modo: R. syrup. Viol. 3. j. syrup. Nenuph. de Rosis rubris siccis ana 3. ʒ. aquæ Verbenæ, Rosarû, Plantag. an. q. s. fiat Zulapium: Capiat aliquoties.

Purgetur dein. R. syr. Ros. sol. 3. j. ʒ. syrup. Viol. 3. j. Diagr. gr. ij. vel iij. dissolue cum aqua Endiuæ & Rosarum: Bibat.

Vel: R. syr. Ros. sol. cum inf. Senæ (quæ oculis appropriata esse dicitur) 3. j. ʒ. diluatur sero Lactis.

Vel: R. Calsiæ rec. extr. vel ext. cum Sena 3. j. elect. de succo Rosar. 3. ij. cum Saccharo fiat bolus: vel dissoluatur aquâ Buglossæ, & sumat.

Aut: R. Rhabarbari el. ʒ. iij. Myrobal. citrin. 3. j. irrorentur pauco vino vt vis eliciatur melius, postea infundantur in aqua Rosarum & Viol. fiat expressio, adde syrup. Rosar. sol. 3. j. fiat potio.

Vel decoctum hoc: R. rad. Fœniculi 3. ʒ. flor. Cord. p. j. semin. Fœniculi 3. ʒ. sem. Vio-larum 3. j. Tamarind. 3. j. Prunorum num. vj. Myrobal. citrin. 3. iij. fol. Senæ 3. ij. fiat decoctio: diss. in s. q. syr. Ros. sol. vel Viol. 3. j.

Pilularum Sine quibus (oculis appropriatarum) 3. ʒ. idem efficiet.

Fortioribus cathartics & calidioribus, si humores serosi ad oculos defluant, lachrymæque copiosè infestent, præsertim in epiphora,

phora, tum in ophthalmia, vbi non tantus calor est, & in oculi viceribus cum fluxibus, vt in fistula lacrymali vtimur; lisdem ferè, quæ & in capitis dolore melancholico & pituitoso explicata sunt; quæ & oculis hoc modo appropriantur.

Præparatione præmissa: R. Mellis ros. ʒ. j. syr. de Betonica, Capill. Ven. ana ʒ. ʒ. aquarū Chelidonij, Buglosi, Cichorij an. q. s. arom. Santalo: Vtatur pro vna vice, & repetat.

Vel cum fluxus potius quam calor adest: R. syrupi de Hysopo ʒ. j. de Stœchade, de Betonica ana ʒ. ʒ. aquarum Fœniculi, Verbenæ, Euphrasie q. s. Vtatur vt prius.

Postea euacuadi, cum rubedo & calor adhuc sunt in oculis, catharticis, minus corpus inflammantibus: si verò fluxio lachrymæq; magis infestent, etiā istis, quibus serosos & pituitosos humores educimus, vtimur. Quæ & si diuturnæ sint epiphoræ vel ophthalmiæ vel exulcerationes, sæpe repetenda sunt.

Pilularum forma magis hic consueta est: vtimurque illis potissimum, quæ oculis appropriatæ sunt: vt sunt pilulæ Fumariæ, Sine quibus, & Lucis mai: quibus ʒ. j. pondere separatim vel inuicem permixtis vtimur, aquæque Euphrasie, Verbenæ, Fœniculi: vel syrup. de Stœchade emollimus formamusque. Sed & Coccia & Aggregatiua vsurpantur.

Vel Diacarthamo, Diaphœnico, Diacario nostro, aliisque tabulis aut electuariis phlegmagogis, hydragogis, dissoluendo ea in aquis oculis appropriatis, illud effcimus.

Vel hoc decocto: R. rad. Fœniculi ʒ. j. ʒ. rad. Acori veri & Liquir. an. ʒ. j. herb. Fœniculi (si recens haberi potest) Euphrasie, Verbenæ, Chelidonie, Fumariæ an. m. j. Rutæ m. ʒ. fl. Rosmarini. Stœchados, Rosarum an. p. j. seminum Fœniculi, Sileris mont. an. ʒ. ij. fol. Senæ ʒ. ij. ʒ. sem. Carthami conuass. ʒ. ij. fiat decoctio, & in col. calente, infunde Agar. trochisc. ʒ. iij. Rhabarb. ʒ. ij. (quo in fluxionibus serosis vti solemus) Spicæ ʒ. ʒ. fiat expressio, arom. Cinam. & dulcoretur Saccharo: Vtatur tribus matutinis.

Et si post vsum huius apozematis nō sufficienter purgatus fuerit, Pilulis exhibitis ea quæ supersunt, educantur.

Plura eiusmodi, & in hisce affectibus oculorum conuenientia purgantia, in visus imbecillitatis à serosis & pituitosis cerebri redundantibus profectæ curatione, copiose tradita sunt.

Vbi & qua ratione tum cum præparantia dantur, tabulas simul exhibere, & quo pacto post purgationes caput, ventriculum denuò roborare debeamus, ostensum fuit.

Per nares & os cerebri excrementa repurgantia caput purgia, in causa calida, quia nares faucesque accendendo vicinos oculos quoque inflammant, sanguinisque influxum commouent, non conueniunt: minusque errhina cum sternutationem moueant, quæ oculos admodū ad rubedinem lachrymasque solet impellere. In reliquis verò causis, cum lachrymæ citra calorem alioquin, vel etiam in exulcerationibus manant, quando masticatoriis aut gargarismatis, per narium amplitudinem ad fauces trahuntur, eas ab oculis diuertant, caputque ab humoribus euacuando, post purgationes alias vsurpata, profluxionem hoc modo impediunt. Quod & errhina, nisi sternutatione mouendo (vti dictum) oculos irritarent, facerent, cum ex oculorum orbita per foramen lachrymale dictum in nares lachrymæ naturaliter, vt & præternaturaliter cum puræ ferantur, quam euacuationem promouendo, nisi aliam ob causam nocerent, prodesse possent.

Per vomitum cum oculi dolent, expurgationes non sunt instituendæ, cum in hoc impulsu valido sanguis in oculos propellatur, lachrymæque proluciantur, causaq; mali sic augeatur, vel de nouo prouocetur, dolorque exacerbetur.

Per sudores, euacuationes (vti in dolore capitis dictum) cum non, nisi corpus caleat, prodeant, dum oculi calent, si promouerentur, obessent. Si verò sine calore & ardore adsint vlcera, lachrymæque infestant, tunc quia corpus siccant, excrementaque absumunt, vtiliter prouocantur: nec tantum vnâ duabusque vicibus, sed & continuis aliquamdiu; adhibita insuper, vti fieri tunc solet, in cibis abstinentiâ: sicuti in lachrymarum fluxu in reiectis, quo pacto hoc cum diæta fieri possit, & vtile sit, demonstrabimus.

Quo & balnea referri debent, quæ in ophthalmiæ declinatione, si in illis se lauent, quod reliquum est per corpus excernunt dissoluuntque. Quo nomine & meri potus tunc laudatur, cum alio tempore calentibus adhuc oculis, hæc duo potius obsint.

Per vrinas serofi humoris redundantia, atque vnà cum eo corporis excrementa, quæ oculorum morbis vel causam præbuerant, vel adiumentum saltem attulerant, si expurgentur, ad curationem quorundam illorum affectuum aliquid præstare poterit: Cuius præcipuè nomine, præter quàm quòd siccando easdem redundantias absument, & proprietate sua aliquid fortè præstant, potiones in fistulis oculorum sanandis propinare solent.

Hoc modo: R. fol. Tanacet. Cauliū rubr. Agrimonie, Filicis maris, Filipedulæ, Pimpinellæ, Ceterach M. j. Oleæ syl. turionum vel fol. Myrti M. ß. rad. Glyzyrizæ ʒ. j. Cicerum rub. P. ij. fiat decoctio: sumatur de colatura pro ʒ. dosibus, dulcoretur Saccharo, & vtatur in fistula lachrymali.

Absumentibus humores superfluos capitis, in epiphora atq; exulcerationibus quoque, cum illi oculos frequenter petunt, vtimur: quibus caput siccatur roboraturque; Idque diuersimodè, exhibitis forisq; capiti admotis, iisdem ferè, quæ & in capitis dolore & vertigine, aliisque morbis à defluxionibus genitis etiam competere, illis locis proposuimus.

Quo & referri possunt, quæ inspecta aut gestata, in illis affectibus iuuare creduntur. Veluti in ophthalmiis Achatem lapidem inspicere, Lapatij vulgaris radicem, luna crescente effossam gestare, lapidem Bubuli fellis naribus indere, vtilia esse & prodesse scribuntur.

Impedimus fluxionem in oculos, siue à sanguine, siue à seroso fiat humore, illis quæ viam per quam fertur, constringendo eum nonnihil remorantur, humoremque frigiditate sua aliquo modo repellunt. Quibus & in ophthalmia & ægylope mox in principio, & in epiphora sæpè adhibitis: & in aliis quoq; causis cum defluxio timetur, humorum influxum reprimere tentamus. Eaque

oculo vicinis locis frequentius, nonnunquā & oculo, clauso tamen prius, applicamus.

Vicinis oculo sedibus illis, per quas defluxio fertur, hæc admouentur: vt fronti & temporibus, ea regione vbi oculus dolet, vel si ambo affecti sint, vniuersæ illi sedi, ab vna aure ad alteram vsque; interdum & in oculi ambitu, ad buccas vsque descendendo aliquando. Quæ & in ophthalmia, vt sanguinis impetus compescatur, si supra iugulares venas apponatur, vel etiam iuxta occipitiū, proderunt. In quibus omnibus locis, ea quæ potentiùs astringunt, siccant & emplastica sunt, refrigerantque & potentiā & actu, tutiùs quàm supra oculum adhibentur.

Epithemata panno vel spongiā excepta, rursumque ex illis, ne in oculum defluant, nonnihil expressa, in ophthalmia præsertim vera, aut alioquin, cum magnus in oculo calor est, sic admota, profunt: Validiusque reprimunt, si actu frigida vsurpentur: ad frigidissimam tamen, & niue (vt aliqui docent) refrigerata, vix procedentes, cum visioni hoc damnum inferre posset, indeq; cecam quandam factam obseruari. Quorum formulæ in capitis calidis morbis describuntur: si illis, omisissis oleo & aceto, quæ oculis inimica sunt, vtamur; Quæ tamen si non fronti, sed iugularibus apponantur, negligi non debent, & summè frigida quoque illic adhiberi possunt.

Ex Plantaginis succo epithema valde est vtile: cui Albumen oui bene conuassatum nonnunquam permiscemus.

Emplastra cum diutius hæreant, nec ab illis aliquid in oculos destillet, potiùs dictis locis adglutinantur vel alligantur, diuque, si perseveret, defluxio retinentur, triduoq; renouantur. Quibus in omnibus defluxionibus vti possumus. Qualia multa alibi in aliis defluxionibus explicantur.

Vel sic paretur: R. Masticis, Thuris, Vernicis an. ʒ. ij. Amyli vel Farinæ volatilis ʒ. j. excipiantur Album. oui & infusi gūmi Tragac. pro emplastr.

Aliud: R. Picis q. s. dissoluatur paucio oleo Myrtino, adde Vernicis, Thuris masculi, an. mediam partem, formetur emplastrū: quod & occipitio applicatum proderit.

Vel hoc valde astringens: R. Boli Arm. 3. Sanguinis draconis, Acatiæ an. 3. ij. cortic. Granat. Gallarum an. 3. j. fiat pulvis: excipiat Album. oui & paucō aceto rubro, fiat emplastrum pro fronte & temporibus.

Operosum magis: R. Boli Arm. Gypsi vsti, lap. Hæmat. an. 3. ij. Vitreoli 3. β. Asphalti, Thuris, Mastice, Vernicis an. 3. j. sang. Draconis, Acatiæ, Hypocist. Picis an. 3. j. Balustiorum, cort. Granat. Gallarum, nucis Cupressi an. 3. β. pulueriscentur, adde Amyli 3. β. cum infus. gummi Tragach. & Vitello oui & paucō Aceto, oleoque Rosaceo, formetur magdaleon ad vsum.

Vsitata emplastra de Mastice, & pro Ruptura Comitissæ dicta, horum vices supplere possunt.

Sunt qui si Opij circiter 3. j. pro vno emplastro addatur, admodum fluxiones sistere doceant. Quod verò si capitis adsit simul dolor, iuuare credimus: quo nomine & loco feminis Papaueris albi, quod etiam permiscet, syrupo Papauerino rectius emplastra excipiemus, cum aliud sit inualidum, vti & reliqua frigida quæ istis commiscuntur.

Defensivum commune ex Bolo puluerizato & subacto cum Aceto & Album. oui fit: cui & æqualis cum bolo si Gypsi portio addatur, fiet efficacissimum: quod & post aures in ophthalmia applicatum conuenit.

Ex prædictis, additis oleis, vngueta quodque fiunt, quibus ambitus oculi dolentis illinitur, præsertim si is facile intumescat, vti sæpè fit; quæ tamen crassiora vt hæreant, superciliisque sustentari possint, ne in oculum perueniant, esse debent: noctuque præsertim dum oculi clausi manent, illiniri.

Qualia etiã ex succis hoc modo fieri possunt, omisis pulueribus, ne siccatis vnguētis oculo illapsi, eū molestant: R. succi Plantag. 3. ij. Aceti rub. 3. j. in quo Vitreoli albi 3. j. dissolutus sit, Sanguinis draconis, Acatiæ, Hypocistidis, Ladani ana 3. β. dissoluantur omnia: addendo Album. oui & ol. Ros. q. s. fiat instar nutriti, sed spissi, additā paucā Laricē.

Oculo clauso eiusmodi remedia quæ fluxiones cohibent, nonnunquam apponuntur, supra palpebras, nam fortia hæc astringen-

tia in oculum immittere, cum oculum exasperarent, qui læuis & lubricus esse debet, minimè tutum.

Veluti hoc emplastrum: R. Boli albi vel rubr. pinguis 3. ij. farinæ Hordei 3. j. β. infus. gummi Tragach. factæ in aqua Myrti vel rosac. 3. j. Camphoræ 3. β. Lactis cremoris (ne induretur siccando) & succi Plantag. an. q. s. ad subigendum, fiat emplastrum, Quod supra pannum dilatum oculo clauso applicetur.

Hoc idem præstant refrigerantia repellendo. Qualia in topicis ad sanguinis influxum potissimum repellendum in principio mox explicabimus: & quæ lachrymas siccando simul astringendo nonnihil, in fluore serosi humoris in oculos ad eum sistendum adhibentur.

Oculo affecto quæ applicantur topica remedia: Vel aperto oculo induntur, Et vel instillantur, liquores tum simplices, tum permixti cum materia solidiore; quos collyria vocant, etsi propriè inde habeant nomen, si prius trochiscos vel alias formas redigatur, vt postea cum illis vt volumus, præsto ad manum sint & ad vsum dissoluantur. Sed & iniiciuntur atq; interdū in sinus illic factos: vel imponuntur si spissiora aut sicciora sint, idq; ferè in oculi angulos, maiorem præsertim: aliàs palpebris apponuntur. Alij stylum argenteum vel osseum politum in pulueribus liquore intinctis volutum, transfuersim oculo impositum, clausisq; palpebris tractū, vt pulvis in oculis maneat, sic oculo indunt: aliisve artibus adhibent. Nonnunquam & pulueres subtilissimè, vt achool, sicuti vocat, in cote triti oculis insufflantur. Interdū emplastra exigua oculi angulo affecto maiori imponunt, sic vt simul circa nasum cuti illic adhæreant. Alia verò oculo clauso foris emplastri modo, vel foris cum panno, bombace, spongiolâ applicat. Quæ remedia pro diuersitate causæ & affectuum variant, & præcipuè prout vel intemperies est simplex a calore, frigore, siccitate; vel grauedo; aut cum affluxu sanguinis, ophthalmia vel ægylops: vel serosi humoris, epiphora; aut cum solutione cōtinui, phlctena, excoriatio, vlcus, fistula, singulis accommodantur: sequenti modo.

Topica
in Ocu-
lorum do-
lorib. cu-
iuscumq;
generis
remedia.

*Pruritus
Pūctio-
nis in o-
culo ab
intempe-
rie reme-
dia.*

Intemperies simplex calida, sine affluxu humoris, pruritus tantum adferens, ne fluxum concitet, frigidis actu & potentia adhibitis, astringentibus, mox corrigitur.

Si ex frigore oculi pruriant & rubere incipiant, idem tentandum, maximeque siccantibus & nonnihil quoque mordacibus, si pruritus perseueret, ille sedandus. Quorum remedium formulæ in ophthalmiis & epiphoris explicabuntur.

Ex siccitate palpebrarum si oculi pruriant aut asperi fiant, lenientibus anodynis emendantur. Iuuat & vapor aquæ calidæ oculo exceptus, similiaque.

*Contra-
Etionis in
oculo re-
media.*

Si grauedo oculorum (vbi vocant) post formum (sicuti dictum) molesta sit, sensim, non vi ductis palpebris, caloreque actuali manus aut alterius rei adhibita, leuique frictione palpebrarum facile remittit.

*Ophthal-
mia fal-
sa & ve-
ra reme-
dia.*

Si cum affluxu sanguinis vel sine inflammatione, vel cum inflammatione, ophthalmia falsa vel vera dicta fiat, nunc topica ab initio dolorem mitigantia, humoris influxum cohibentia, postmodumque simul siccantia, tandemque aliquid quoque digerentia, & in fine, quod residuum est, discutientia adhibere hoc ordine oportet.

Dolorem lenientibus anodynis & narcoticis quoque, si admodum vrgeat, subito, non tantum quia agro molestus præcipue est, sed & quia defluxionem auget, succurrendum: simulque mox refrigerantibus & nonnihil astringentibus fluxus inhibendus; quin & calor, tam diu quam hæc perseuerant, contemperandus erit. Vel separatim illis, nunc hoc illi, prout dolor fluxusque magis vrgeat, vel inuicem commixtis cum simul infestant, vtendum. Quorum simplex forma talis erit.

Albumen oui agitatum donec aquæ instat fluat, spumâ demptâ, plerumque ad dolorem sedationem vsurpatur: tum per se, tum cæteris additum medicamentis. Vtilis & liquor illius, qui dum ouum affatur exsudat, oculo inditus. Vitellum item oui solum, vel simul cum Albumine tostum vel coctum.

Lac quoduis, quia anodynum est, imprimis muliebre, frequenter reliquis permiscetur medicamentis.

Cæsus recens non salitus, applicatus, idem facit.

Caro vitulina recens abluta, singulare Empiricorum in dolore oculorum est remedium.

Pomorum dulcium afforum prius ad ignem vel sub cineribus, vel decoctum pulpa, cum dolor sedandus, valde est vtilis. Sunt qui ex semiputridis pomis parum assis pulpam præferunt. Idem faciunt, & adhuc validius, poma matura Amoris, Strychnodendri & Mandragoræ, contusa, vel decocta prius. Quando verò fluxus reprimendus, Poma acida, Pyra austera vel Cydonia, eodem modo (vt de dulcibus dictum) parata, sumuntur.

Sedum maius, Portulaca, & folia Solani, Hyoscyami, Mandragoræ, viridia contusa, vel inuoluta panno & sub cineribus parum cocta, apposita dolorem compescunt. Et si astringendum, Plantaginis & Rubi & Myrti folia recentia, vel decocta parum & contusa adhibita. Quibus omnibus polentam seu farinam Hordei, vt melius hæreant, veteres permiscebant.

Aqua rosarum valde in vsu est: tum per se vsurpata, tum cæteris permixta: quæ ardorem mitigat: & cum astringere magis volumus, aquam Calicum rosarum potius sumimus: vel Plantaginis, Prunellæ aut Myrti: vt si leniendum, aqua Portulacæ, Solani vel Lentis palustris, vel Fragariæ vtimur. Aqua album. Quorum coctione induratum, elicit quoque confert.

Composita forma ex hisce variis modis fit. Vt cum dolorem sedare & ardorem compescere volumus, sequentibus potius vtimur.

Primum: R. Albumin. oui vnius mediocris, agitatum: adde tantundem aquæ Ros. & Lactis mulieris parum. Si decoctum Papau. albi loco aquæ Ros. sumatur, magis fiet anodynum.

Secundum: R. sem. Fœnogræci 3. s. sem. Papau. albi 3. ij. coquantur in aqua Ros. decoctoquo albumen Oui permisceatur.

Tertium: R. Panis medullam maceratam per noctem vel decoctam in aqua Ros. vel Lactē, vel vtroque, applicetur: Vel succus expressus instilletur.

Quantum : R̄. Poma dulcia eodem modo decocta & vsurpata. Vel medulla Panis pulpæque Pomorum sic præparata simul administrata.

Pilulam Sambuci in aqua communi vel Rosar. maceratam, aliæ conuenienti, chirurgi applicare solent.

Aliud anodynum : R̄. mucilag. vel Psyllij, vel Cydon. vel Fœnogræci, vel gummi Tragachanti; Arabici, & cum aqua Ros. & Lactē dissoluta, vsurpentur.

Si dolor admodum vrgeat: R̄. mucilag. f. Psyllij & Fœnogræci an. ʒ.ij. infus. gūmi Tragach. factæ in aqua Ros. Album.oui ana ʒ.ʒ. Camphoræ gr.v. Opii gr.ij. Croci grana aliquot addunt quidam.

Vel hoc emplastrum : R̄. Panis medullæ maceratæ in Lactē, & in pultem cōtusæ, pulpæ pomorum dulcium assorum prius, farinæ Hordei an. ʒ.ij. ʒ. mucilag. seminis Psyllij & Fœnogr. ana ʒ.ij. Vitellos ouorum num.ij. Camphoræ ʒ.ʒ. Croci gr.ij. Opii gr.ij. Rosacei recentis non rancidi, vel Butyri recent. aut cremoris Lactis ʒ.vj. (quæ pinguiā aliquin oculo nō vitia, ne aridum factum medicamentum, oculum premat, adduntur) fiat cataplasmatīs instar: imponatur oculo clauso. Sunt qui fronti potius applicari volunt, & sic quoque dolorem compescere. Interdum & succi permiscuntur refrigerantes, vt Portulacæ vel Solani, si magnus sit ardor. Potest & ex paucioribus parari.

Anodynum Diof. remedium : R̄. Vitellum oui tostum; misce cum pauco oleo Rosaceo & tantillo Croci: dolorem admodum compescit.

Idem facit hoc quoque anodynum: R̄. succi Chamomil. Meliloti ana ʒ.ʒ. vel vnus ʒ.ij. Lactis mulieris, Album.oui ana ʒ.ij. aq. Ros. ʒ.ij. agitentur simul: & panni madefacti oculo applicentur. Si Opii gr.ij. permisceantur, magis dolorem mitigabit.

Vel decocto hoc anodyno foveatur oculus : R̄. fl. Maluæ, Viol. Ros. ana p.j. flor. Chamom. Meliloti an. p.ʒ. sem. Fœnogr. ʒ.ij. sem. Lini, Psyllij ana ʒ.ij. sem. Papau. albi ʒ.ij. decoquantur pro foru oculi.

Cataplasma anodynum : R̄. florum Chamom. Meliloti ana p.j. seminis Fœnogræci

ʒ.ij. coquantur, & in colatura decoque Micæ Panis ʒ.ij. Vitellos oui num.ij. Croci ʒ.ij. Lactis parum, fiat cataplasma.

Cum verò potius repellere & astringere animus est, & refrigerare: R̄. aquæ Rosarum calicum ʒ.ij. succi Plantag. ʒ.ij. Alb. oui conquass. ʒ.ʒ. misce. Succus rubi fructus exiccatus prius si addatur, efficacius repellet.

Decocto hoc vti possumus cum astringere volumus : R̄. fol. Plantag. Ros. rubr. aridorum ana ʒ.ij. Balauſtiorum ʒ.ij. decoquantur in aqua Peculi ros. & Plantag.

Vel cum astringere & dolorē simul lenire volumus : R̄. fol. Plantag. Portulacæ vel Sedi, hyemis tempore, Solani an. m.ʒ. flor. Ros. Viol. ana p.ʒ. seminum Psyllij, Papau. albi an. ʒ.ij. decoquatur in aqua: si radicis Mádragoræ ʒ.ij. addantur, dolorem citius compescet.

Idem facit hoc cataplasma: R̄. pulpæ Pomorum acidorum, vel Pyrorum vel Cytoniorum, decoctorum in aqua Rosar. & Plantag. vel in decocto supradicto astringente, vel Vino, vt vult Galenus, fiat cataplasma.

Aur tali vtatur : R̄. pulu. Cyton. costorū, vel si desint, aliorum, vt dictum, ʒ.ij. farinæ Hordei ʒ.ij. Sumach. cort. Gran. an. ʒ.ij. succi Portulacæ vel Sedi & Plantag. an. q.ʒ. ad subigendum, fiat cataplasma.

Siccantia nonnunquā citra morſum, prædictis repellentibus & dolorem sedantibus, ad humiditates absumendās permiscuntur: quorum & quantitas sedato aliquantū ardore, cum morbus declinare incipit, augetur, tunc quoque nonnihil digerentibus.

Ex Cerusa lota prius, collyria alba in hūc vsum parantur : R̄. Cerusæ ablutæ aqua Rosar. ʒ.ij. aquæ Plantag. vel Myrti, si repellendum: si leniendum, Lactis mulieris ʒ.ij. Alb. oui conquass. ʒ.ʒ. misce.

Vel : R̄. Cerusæ ablutæ ʒ.ij. mucilag. sem. Psyllij vel Cyton. vel Lini vel Fœnogr. ʒ.ij. aquæ Rosar. & Lactis q.ʒ. misce.

Trochisci albi ex cerusa, è quibus collyria alba fiunt, sic parari possunt : R̄. Cerusæ lotæ ʒ.ʒ. Amyli ʒ.ij. gummi Tragach. infusi in aqua Ros. donec mollescat in mucaginem ʒ.ʒ. fiant trochisci: quibus & Opii ʒ.ʒ. si dolor vrget, addi potest. Qui cū aquis & lacte cum iis vti volumus, dissoluuntur.

Hisce Sarcocolla, cum nonnihil digerendum, simul permiscetur: sicq; trochisci Rhazis albi dicti parantur: R. Cerusæ lotæ 3.x. Sarcocollæ nutritæ in Lacte mulieris 3. iij. gummi Tragach. 3.j. cum aq. Ros. fiant trochisci: qui cum 3.β. Opij aliquando, aliàs sine illo parantur.

Additur & Camphora interdum, vt: R. Cerusæ lotæ 3.ij. Amyli 3.j. mucilag. semin. Psyllij & Lini vel Fœnogræci an. 3.β. Sarcocollæ nutritæ 3.j. Camphoræ 3.j. aquæ Ros. 3.ij. Lactis, Album. oui ana 3.β. misce: possunt & gr. vj. Opij addi: vel cum decocto Papau. aut fol. Hyosciami hæc dilui. Et Croci grana tria vel quatuor, maximè versus augmentum addi possunt: quod tamen aliqui ratione opij, cuius correctiuum esse putant, quotiescunque illud collyrijs additur, simul permiscet: sed tunc collyrium album non ampliùs erit dicendum, sed luteum.

Ex Cadmia fornacum quam tuthiam vocant, hæc plerunque sunt, quæ oculis tantopere appropriata esse censetur. Quæ ad vsum vsta lota quæ præparatur, aliisque modis parata vsurpatur: veluti hoc modo. Abluitur aquâ frigidâ: dein puluerisata maceratur in succo Cydoniorum, vel in malo Cydonio, illius laminis per transversum sectis interspersa; postea quo stuppis panno inuoluto in furno coquitur: rursusque inde abluta in Aceto albo infunditur: iterumque siccata puluerisataque, denuò in aqua rosarum mergitur: postremoque vt achool. cōminuta ad vsum feruatur.

Sic vsurpari potest: R. Tuthiæ præpar. 3.β. aquæ Ros. 3.j. Album. oui agitati 3.β. misce.

Additâ camphorâ tale fit: R. Tuthiæ præpar. 3.j. Camphoræ gr. iij. aquæ Plantag. calicum Rosar. & Fœniculi ana 3.j. misce: validius erit si Sumach vel Lycij ex eo facti 3.j. addatur. In vigore Sacchari candi 3.β. additur.

Cerusâ additâ, collyrium album dictum Gal. sic parat: R. Tuthiæ lotæ 3. iij. Cerusæ 3.j.β. Amyli, gummi Tragach. an. 3.j. cum aqua pluuiæ, fiat collyrium. Additur in dolore Opij 3.β.

Vel sic: R. Tuthiæ præpar. 3.j.β. Cerusæ lotæ 3.j. Amyli 3.β. mucilag. f. Fœnogr. 3.β.

aquæ Fœniculi 3.j. aquæ Ros. 3.ij. misce: potest & Camphoræ 3.β. addi.

In dolore summo collyrium Citrinum dictum sic fit: R. Tuthiæ vstæ & in Lacte mulieris extinctæ & lotæ 3.β. Cerusæ lotæ 3.j. gummi Tragach. 3.j. Croci 3.ij. Opij 3.β. aquæ Pluuiæ q. s. vsus illius cum Ovi albumine.

Vnguentum de Tuthia, vel de Nihili vstata sunt ad hunc vsum pro oculis affectis remedia.

Quorum loco sequenti vti possumus: R. Butyri vel Axungie porci, vel ol. Rosacei, recentia omnia vel diligenter lota: addita interdum Ceræ albæ, aut Vnguenti Rosacei vel Alabastrini 3.j. Tuthiæ præpar. 3.j.β. Pompholygos 3.β. misce diligenter: efficacius fit si Camphoræ 3.j. eoque magis, si Antimonij 3.β. addatur.

Quando verò digerere magis volumus, circa declinationis ophthalmiæ principium, sequentibus, in quibus digerentia prævalent, vtimur.

Ex sarcocolla puluis Citrinus Rhazis oculo inditus illud præstat: R. Sarcocollæ 3.v. Aloës, Croci ana 3.j. Myrrhæ 3.β. Lycij 3.j. terantur subtilissimè in cote.

Vel sic, dolore adhuc remanente vel redeunte: R. Sarcocollæ 3.v. Aloës lotæ in aqua Ros. 3.j. Tragach. 3.β. Opij 3.β. & gr. vj. Croci gr. vj. misce.

Thus extinctum in aqua Rosacea aliquoties vel Lacte, vel vtrisque, & liquor oculo inditus, idem facit.

Vel hoc collyrium: R. Thuris 3.β. Sarcocollæ nutritæ 3.j.β. Aloës 3.β. Croci 3.β. mucilag. Fœnogr. 3.β. aquæ Euphrasie, Rosarum ana 3.j.β. in declinatione, cum aqua Fœniculi.

Collyrium ex Thure Rhazis digerit quoque, & quando ad suppurationem tendit ophthalmia, maturat: R. Thuris 3.v. Sarcocollæ, Ammoniacy ana 3.ij.β. Croci 3.j. læuigata, Fœnogræci succo excipiantur.

Vel vbi magis siccandum & dolor adhuc adest, collyrium Thuris Galeni: R. Thuris, Tuthiæ ana 3.v. Cerusæ 3.x. gummi Tragacant. Opij ana 3.j.β. cum aqua Pluuiali conficiatur: Pompholygem alibi addit.

Cum siccandum & digerendum: R. Sarcocollæ

cocollæ nutritæ 3.j.ß. Tuthiæ præparat. 3.j. Aloës 3.j. Myrrhæ 3.ß. mucilag. sem. Fœnogræc. 3.ß. aquæ Verbenæ 3.ij. aquæ Fœniculi 3.j. misce.

Vel si calor adhuc super sit: R. Sarcocollæ nutritæ 3.iiij. Tuthiæ præparat. 3.ij. Aloës 3.j. Sacchari candi 3.j.ß. Caphoræ gr. iiij. Croci gr. iiij. aquæ Rosar. 3.iiij. misce: macerentur diu, sæpè agitando: Vtere.

In prurientibus & rubicundis oculis: R. Tuthiæ præparat. 3.ß. Aloës, Sacchari an. 3.v. Camphoræ gr. ij. Vini albi, aquæ Fœniculi ana 3.ij. misce.

Vt discutiatur penitus residuum, in declinatione ophthalmiæ, sequentia adhibemus.

Fotus oculi ad ophthalmiæ reliquias tollendas: R. herb. Euphrasiæ, Pulegij ana M.j. fl. Chamom. Meliloti, Rosar. rubr. Paleæ Avenæ ana P.j. sem. Fœnogr. 3.ij. f. Fœnic. 3.j. fiat decoctio, addendo parum Vini: intincti pāni vel sacculi oculo applicentur. Suffitus etiam decocti huius oculo exceptus, idem facit.

Cataplasma hoc itidem præstat: R. Abrotani M.j. fl. Chamom. P.j. sem. Fœnogr. 3.j. sem. Fœnic. 3.j. sem. Cimini 3.ß. coquantur & subigantur, adde farinæ Fabarum 3.j. mucilag. sem. Lini & Fœnogr. ana 3.ß. Croci 3.j. Lact. pinguis q. f. fiat catapl.

Vino astringente aquâ Fœniculi diluto, postremo ad oculi corroborationem aliqui eum fount.

Ouum coctum detractâ testâ, Pomum item putre, calida, oculo admota ruboris reliquias absumunt.

Si in abscessum abeat inflammatio, maturandus ille erit, quod fiet maturante emplastro supra oculum posito: quod & hoc modo parari poterit: R. rad. Altheæ 3.j. Maluæ M.j. flor. Chamomil. P.j. decoquantur in Lacte, contundantur, adde farinæ Hordei, sem. Fœnogr. ana 3.j. olei Chamomil. parû, fiat cataplasma.

Idem facit collyrium è Thure Rhazis: & vnguentum de Tuthia superius explicata, applicata.

Abscessu rupto, vlcus, sicuti dicitur, curandum.

Si sanguine bilioso in maiorem oculi angulum illabète, ægylops nascatur, remedia

topica, si inflammatio manifesta sit, repellentia doloremque sedantia, vt in ophthalmia vera, adhiberi debent: indeque statim tumorem discutere, illic quoq; explicatis collyriis, quæ siccant & digerunt simul, antequam suppuretur, quod mox fieri solet, oportet: idq; ed citius, si exigua aut ferè nulla adsit inflammatio, sensimq; tuberculum illud ægylopi natum sit.

Discutientis remedij forma talis erit: R. Plantag. Maluæ, folia & flores Chamomilæ, recentia omnia & contusa: permisce Nucum iuglandium veterum nucleos contusos, ligetur instar cataplasmatidis supra oculi angulum: si parû Salis addatur & Fimi Galinacei, efficacius erit.

Ægylops herba, contusa & apposita, singularis censetur Diofc.

Emplastrum Diapalma, Diuinum, Cero-neum, alij imponunt.

Quòd si in abscessum tumor cōuersus fuerit, citò aperiendus perforandusque erit, ne pus retentum vicina exedens, sinuosum vlcus, vti plerumque incuriâ fit, reddat. Deinde vt vlcus, sicuti in vlcerebùs mox dicitur, curandum.

Si à ferofi humoris influxu, in palpebras potissimû, epiphora suboritur, & cum rubore, ardore, pruritus & dolor adsint, à principio hunc defluxum reprimere, doloremq; & pruritum compescere, iisdem remediis in ophthalmia expositis, oportet: quibus tamē siccantia humiditates, quæ hîc copiosæ sunt in hoc casu, mox permiscere debemus: collyriaque ex cerusa & tuthia parata illic descripta, adhibere.

Sed & in perseverante diuturna epiphora, in qua lachrymarum fluxus & pruritus cum rubore tantum citra ardorem molestiâ præbent, vehementius adhuc siccantibus vtendum. Qualia sunt quæ sequuntur.

Pruritus admodum compescens collyrium: R. Antimonij præpar. 3.ß. aquarum Ros. Fœniculi an. 3.ij. colentur sæpè ad vsum.

Pulvis: R. Cadmiæ fossilis, quam lapidē calaminarem vocant 3.j. Tuthiæ præpar. 3.j. Coralli, cortic. Myrobal. torrefacti an. 3. fiat pulvis, indatur oculo.

Vel vtatur sequenti: R. Antimonij præ-

R R

par. 3. β. Tuthiæ præpar. 3. j. Coralli 3. iij. Margarit. 3. ij. Cryſtallini humoris piſcium oculorum coſtorū 3. β. fiat puluis ſubtiliſſimus.

De Hæmatite collyrium, in hoc caſu quoque uſitatum eſt. Cuius loco ſequens parari poteſt: R. Lap. Hæmatitis, Antimonij loti ana 3. j. Tuthiæ præpar. 3. ij. Cadmiæ ſoſs. 3. j. Aloës ſuccocitrin. 3. j. Camphoræ 3. j. oſium Myrobal. combuſtarum 3. β. Vini granat. 3. ij. aquæ Roſ. 3. iij. miſce.

Cum ſimul digerendum eſt, ſic paramus: R. Antimonij loti, Tuthiæ præpar. ana 3. j. Sarcocollæ nutritæ 3. j. β. Myrrhæ, Aloës ana 3. j. Croci 3. β. diſſoluantur in aqua Fœnic. Euphraſiæ, & pauco Vino.

Huc referri poteſt ſumus ab illis quæ citra morſum ſiccant accenſis excitatus, oculiſque obiter exceptus: qui eos mirabiliter ſiccant. Qualis à Thure, Pice aliisque uſtis fieri poteſt: cauere tamen illis utendo.

Suffitus ex Sale decocto exceptus, citra morſum admodum ſiccant.

Hiſce adhuc validius ſiccantia, ex acribus ſuccis parata collyria, quando pertinax eſt epiphora, & pruritus admodum diuexat (qui mordacibus non nihil iuuatur, cum alios dolores alioquin exaſperare ſoleant) uſurpantur hoc modo.

Vitreoli albi portiuncula diſſoluantur in Aqua communi vel Roſarum, aut alia appropriata, ea quantitate quam oculus ferre poteſt, oculiſque indatur: quo ſoliciſſimè uti poſſumus in pruritu, rubore, & calore oculorum in epiphora, ob quem ipſius inſignem uſum Germ. illud Augſtein vocant. Vnde & non nihil adhuc inflammatis oculis aliqui id adhibent. Chymici olei vel ſpiritus Vitreoli guttam aquâ diluunt, ſicq; utuntur. Alij Sal Vitreoli albi potiùs probant, aquâq; miſcēt.

Alio modo: R. Vitreo. albi 3. j. β. gr. xij. Tuthiæ præp. 3. β. album. Quorum cocta priùs, nu. iij. in panno lineo incluſa, piſtentur ſenſim affundendo aquæ Roſ. 3. iij. colentur per philtrum: hæcque aqua frigida oculis inſtilletur, iſdem affectibus.

Aliter: R. Vitreoli 3. β. Album. ouorum n. xv. Aquæ 3. β. j. miſceantur, & coquantur in vaſe teſſaceo bene clauſo, dein in vaſ vitreū effundantur, addendo Camphoræ in modum

lo ligatæ 3. j. & ſic uſui accommodentur.

Vel ſic: R. Vitreoli albi gr. ij. Camphoræ gr. iij. Tuthiæ præpar. 3. β. Pomphol. albi gr. vj. aquæ Roſ. 3. j. aquæ Fœniculi 3. β. fiat collyrium.

Vel: R. Vitreoli albi 3. ij. Camphoræ 3. β. Tuthiæ præp. 3. j. Aloës ſuccocit. 3. j. Sacchari cadi 3. ij. fiat puluis: miſceatur cum aquis, Roſarum, Fœniculi, Verbenæ, Chelidoniæ, cum Vino elicitis, q. ſ.

Additis aromatibus, ſi nullus timetur ardor, ſic fit: R. Vitreoli albi, Tuthiæ an. 3. j. Nucis moſch. 3. β. Sacchari albi 3. β. Vini albi 3. ij. aquæ Chelidoniæ 3. β. decoquantur, colentur, ſeruentur in vitro.

Vel ſic: R. Vitreoli albi 3. β. Camphoræ 3. j. Tuthiæ præp. 3. ij. Zingib. Gariophyl. an. 3. β. pulueriſatis adde Vini albi veteris, in quo chalybs ignitus extinctus ſit 3. j. aquæ Roſ. Chelidoniæ, Fœniculi an. 3. ij. coquantur vel macerentur ad uſum.

Puluis ocularis: R. Vitreoli albi 3. β. Camphoræ 3. j. Tuthiæ 3. ij. Pompholygis, Ceruſæ, Cadmiæ ſoſſilis, Coralli, Matris perlarū, cort. Myrobal. citrin. an. 3. β. Aloës ſuccocitrini, Myrrhæ an. 3. j. Sacchari candi 3. j. Zingib. albi, Gariophyl. an. 3. j. fiat puluis ſubtiliſſimus: Ponatur lentis inſtar in oculum.

Vnguentum, quod pro ſingulari experimento habetur: R. æruginis Aeris gran. xij. Camphoræ 3. j. Tuthiæ præp. 3. β. aliàs 3. j. β. Butyri rec. quod cum aqua Roſ. liqueſcat, & parum bulliat, 3. vj. miſceantur decenter, fiat vnguentum: indatur piſti magnitudo in oculi canthum maiorem, leuiterq; vngantur palpebræ: eſtque ad epiphoras, & pruritus ſingulare experimentum.

Aqua æruginoſa valde excellens: R. peluim ex Orichalco Chirurgoꝝ, & Melle inunge, eamque inuerſam in oculi per dies quatuordecim collocato: totidemque dies Fraga matura in vitro obturata in ſimo equino immerſa ſeruato, exactoq; tempore, peluim dictam fragis diligenter abluito, ſciſcandoque abſtergito, per pannum deinceps fraga colando: quibus Camphoræ portionem Vitreoliq; albi parumper permisceto.

Alia: R. Peluim, ut dictum, ſterne in ea Fragoꝝ 3. vj. Salis 3. ij. ſtratam ut vocant,

ſupra

supra stratum ponendo: in caua subterranea per tres septimanas retineantur, donec liquor inde emanet, colentur: liquorq; quiescat donec sal fundum petat: à quo separetur: iterumque quiescat & repurgetur, donec nihil ampliùs salis in fundo remaneat: fundatur hæc aqua in vas stanneu, tunc dulcescit aqua: quæ ad vsum asseruatur.

Vesica in oculo remedia.

Si adnata oculi tunica à cornea separata vesicam excitet humore acri plenam, unde dolor & rubedo quoque superueniunt, dolor mitigari, humor influens repelli, fluxusque sicari, vt in epiphora, remediis in ophthalmia expositis, debet. Si disrupta vesica erosionem aliquam post se relinquat, vt erosio sanari. Curatur autem levis erosio seu exoriatio, siccatis sine morfu medicamentis, in ophthalmia & epiphora explicatis, & in vlcerebus quoque dicendis.

Scabrities & abrasio nis Oculi tunica remedia.

Si abrasa in palpebris tunica, palpebrarum scabies aut scabrities dicta, sequatur: tunc si rubedo & calor & dolor adhuc adsint, iisdem remediis quibus in ophthalmia vtimur, hæc emendamus: dein ad siccantia accedimus, quæ si scabies tantum infestet, nec dolor impediatur, validiora adhiberi debent. Qualia in augmento ophthalmiæ remedia proposuimus, & in vlcerebus reliqua adijciemus. Quibus & hæc addi possunt.

Tuthia præparata, præsertim cum succo Cyton. & Aceto, vt supra dictum, puluerizata, palpebris addita, scabiem illarum sanat.

Vel hic pulvis: R. Tuthiæ præp. 3. j. testarum Ouorum in Aceto maceratarum prius 3. β. ossis Sepiæ 3. j. fiat pulvis subtilissimus, qui imponatur.

Tertius pulvis: R. Tuthiæ præp. 3. j. Pumicis 3. β. Coralli vsti & loti 3. j. pulueriscentur.

Vnguentum conueniens: R. Tuthiæ præp. Acatiæ vel Omphacij an. 3. j. lap. Hæmatitis, Antimonij an. 3. β. excipiantur gummi Tragach. infusione & Melle vel Pomada: Vnguentum palpebræ.

Aliud: R. Tuthiæ præpar. Cerusæ lotæ, Mareasitæ in aceto extinctæ an. 3. j. Antimonij, Hypocistidis, cort. Thuris an. 3. β. Spodij, Pumicis, ossis Sepiæ an. 3. j. pulueriscentur, excipiantur vt supra, ad vsum.

Acribus abstergentibus nisi cedat malum

vti oportet, & si dolor aut ardor inde sequatur, postea compescendus.

Dioscoridis remedium: R. succi Cæparum & Spodij, æquas portiones, misce.

Aliud: R. Fellis carpi, alteriusve piscis, ossis Sepiæ, æquas portiones, misce.

Lac sicuum inungit Diosc. quod cum exulceret, temperari quoque Tuthiâ aliisve siccantibus potest.

Ex Vitreolo albo & Aeris ærugine supra dicta remedia in epiphora, hic quoq; locum habent.

Abraditur interdum scabies palpebrarum specillo, vel panno lineo, aut foliis nonnihil asperis, vsque dum sanguis effluat, posteaq; siccantia adhibentur remedia.

Si vlcus verum excoriationem prægressum sequatur: aut post abscessum ruptum in ophthalmia relinquatur: tunc primum abstergi, dein siccantibus consolidari, cicatrixque generari debet.

Vlcus in oculo remedia.

Abstergentia leuiora, si non adeo vlcus fordescat: fortiora si admodum sit sordidum Epicauma dictum, aut labiis duris; Condyloma appellatum existat; adhibenda. Qualia multa in maculis oculorum & pelliculis, in visus imbecillitate proposita sunt.

E mitioribus: R. Lactis caprini vel humani 3. j. Saccharicandi 3. j. β. Myrrhæ 3. j. misce: abstergit vlcera.

Vel: R. aquæ Mellis 3. j. Saccharicandi 3. β. Stercoris lacerti 3. β. misce.

Aqua ex Laricea elicitæ, admodum ad abstergendum est utilis.

Egregium abstergens & consolidans: R. Laricæ 3. β. & de Vitello oui parum, agitentur probe, dilueque aquâ Plantaginis & Rosarum, vt liquidum fiat, & oculus ferre possit.

Si validius abstergendum callusque vlcere extergendus, iisdem hoc fiet medicamentis mox explicandis, quæ & fistulæ calum abradunt.

Post hæc ea quæ vlcera siccant, oculo intendenda: qualia multa iam prius in epiphoris explicata sunt: præter quæ & sequentia competunt, ea veluti in formâ vnguenti redacta oculis imponendo, vel palpebras illis illinendo.

Album consolidans: R. Cerusæ lotæ aquâ

Plantag. 3. j. β. Amyli 3. j. Coralli albi & Cornu cerui, vstorum & lorum an. 3. β. mucilaginis rad. Consolidæ 3. β. succi ex attritu lap. Galactidis facti cum aqua calicum Ros. q. s. misce.

Rubrum consolidans: R. succi Hypocistidis vel Lycij, Sanguinis draconis an. 3. β. Aloës 3. j. Myrrhæ 3. β. cort. Thuris 3. β. infus. gummi Tragachan. in aqua Platag. 3. β. succi lap. Hæmatitis fricati cum aqua Equiseti q. s. misce.

Nigrum collyrium consolidans: R. fuliginis à Pice exceptæ, instar auellanæ, Omphacij tantundem, excipiantur Vitello oui: Et vtatur. Tale ad erosos oculorum angulos probatur Diosc.

Vel: R. fuliginis ab accēso Thure & Larice exceptæ, instar auellanæ, Acatię 3. β. album. Oui agitati 3. β. & syrup. de Rosis rubris siccis q. s. misce.

Aliud collyrium: R. Sarcocollæ nutritæ, Thuris an. 3. β. Myrrhæ, Aloës, Lycij ana 3. j. Tuthiæ præp. 3. β. Antimon. 3. j. puluerisata excipiantur Melle rosaceo.

Vel potentius: R. Tuthiæ præp. 3. Antimon. 3. j. Aëris, Plumbi, Coralli, Cornu cerui, omnium vstor. & lorum aquâ Equiseti an. 3. β. Sacchari 3. ij. excipiantur Vitello oui coctione indurato prius; ad vsum.

Ex Plumbo collyrium Rhazis: quod suppuratone iam facta post inflammationem & in vlcere conuenit: R. Plumbi vsti & loti, Antimonij, Pompholygis ablutæ, Aëris vsti & loti, Antimonij, Pompholygis ablutæ, Aëris vsti, gummi Arab. Tragach. an. 3. iij. β. Opij 3. β. gr. vj. trita excipiantur aquâ pluuiali.

Elseifer collyrium Rhazis: quod cum abscessu magno facto, post inflammationem, ex vlcere procidentiam pupillæ meruimus, vtile est: R. Antimonij, lap. Hæmatitis an. 3. v. Acatię 3. j. β. Aloës 3. β. excipiatur succo Cyton.

Polycreston collyrium Rhazis, carnem in vlceribus regeneras, & pupillæ procidentiam interim prohibens, cicatricesque extergens: R. Tuthiæ, Pompholygis, Cerusæ, ablutorum, Antimonij, Thuris, an. 3. j. Myrrhæ 3. β. Sarcocollæ 3. ij. gr. vj. Cinnabaris, Aloës, Opij, an. 3. β. fiat collyrium.

Vlcus post abscessum ruptum aut apertum

in ægylope relictum abstergendum, siccandum: sicuti & in aliis oculi vlceribus diximus: fortiora eligendo, cum pars hæc admodum humore & sordibus cōtinuò madeat.

Lixiuio commodè hoc fiet, quo vlcus abluatur, vel fouetur; vel quod etiam si profundum sit, per syringam infunditur, unde sæpe per nares effluit. Quoduis lixiuium ex cineribus atque ossibus vstis factum conueniet: mitius potentiùsve (quod ex glutinositate illius cognoscitur tale esse) prout ferre poterit, eligendo.

Idem Vrina simili modo vsurpata p̄stabit.

Efficacius lixiuium: R. Lixiuij tb. j. β. Aceti ros. 3. β. Balauft. Gallarum an. 3. β. fol. Rutæ m. β. coquantur, & vtatur.

Aliud: R. Lixiuij tb. β. Aluminis 3. β. Vitreoli albi 3. j. immittatur. Quæ omnia, prout oculus ferre potest, in quantitate moderari debent.

Decoctum siccans & abstergens: R. rad. Bistortæ, Tormentil. Tapsi, siccarum an. 3. β. herb. Agrimonie siccæ m. j. Rutæ, Chamom. (quæ in hoc affectu laudatur) an. m. β. Nucis rancidæ nucl. j. Balauft. Gallarum an. 3. β. decoquantur in Vino rubro, addendo parum Aceti rubri: Vtatur.

Vnguentum abstersiuum: R. Aloës 3. j. Myrrhæ 3. β. Mellis 3. j. Fellis, Croci an. 3. β. resinæ Laricæ q. s. fiat instar vnguenti.

Aliud: R. succi Plantag. Agrimonie an. 3. j. succi Rutæ, Aceti rub. Mellis an. 3. β. ol. Rosacei 3. j. coquantur ad spissitudinē aliquam, addendo Laricæ parum, fiat vnguentum.

Vlcus iam abstersum sanans vnguentum: R. Antimonij, Plumbi vsti & loti: Tuthiæ, Lythargyrii an. 3. j. Aluminis vsti 3. ij. Aëris æruginis 3. β. lap. Hæmatitis 3. j. Sanguinis Draconis, Aloës, Sarcocollæ dissolutæ in Aceto an. 3. β. Aristoloch. rot. 3. ij. Spodij, Coralli vsti an. 3. j. excipiantur comminuta & dissoluta Melle & Laricæ vnguentum.

Vel sic: R. Scorie ferri 3. j. Chalcitidis vstę 3. β. Aluminis vsti 3. j. Plumbi vsti, Antimonij an. 3. ij. puluerisata excipiantur paucobutyro & Cerâ albâ.

Emplastrum efficax, ad vlceris sanationē: R. Boli 3. j. β. Sanguinis draconis, Mumie, Acaciæ, Hypocist. vel Lycij (si verum haberi potest,

Ulcus in
catho
oculi re-
media

potest, si non, succedaneum eius ex fol. Sumach non periclymeno, paratum) Thuris, Mastice an. 3. β. capul. Glandium, rad. Aristoloch. Gallarum, nucis Cupressi ana 3. ij. Ichtyocollæ in Aceto infusæ q. s. fiat sicuti emplastrum: cuius portio exigua supra linteum diducta paruum, applicetur in angulum oculi, illicque cuti nonnihil adglutinatum retineatur.

*Fistula
lachry-
malis re-
media.*

Si fistulosum fiat vlcus, fistulaq; perpetuo lachrymarum fluore molestiam exhibeat: tunc vt sanari possit, callosa illius interior superficies detrahenda, & si os vicinum cariosum quoque sit factum, ossis læsi portio auferenda erit: quibus factis, sarcoticorum vsu facile dein cuitas hæc vel penitus, vel ex parte, relicto exiguæ foueæ vestigio, opletur, affectusque sanatur.

Callum fistulæ erodunt vnguentum Ægyptiacum, cum turunda sæpe impositum. Aut aliud vnguentum abstergens, cui ærugo æris additur. Vel aquæ Fortis contemperatæ tamen, si nimis vrat, portio. Vel aqua decoctionis Sublimati. Vel ipsum Sublimatum immissum: aliæve in fistulis alibi dicenda.

Ego cauterij mei potentialis indolentis micam aliquando in foramen intrusi, vnde eschara nata fuit. Quod citius cauterio actuali, locum illum atque os quoque subiectum vrendo perficietur, si præsertim iam cariosum factum sit: quod carne nouaculâ parum apertâ, vel sublatâ, manifestum fiet. Sicq; vri debet, Oculum prius panno lineo, in albumine Ovi aquâ Ros. intincto, tegendo, cochlearique argenteo muniendo, dein candentis ferri per cannulam transmissi capitulum rotundum, loco dicto, semel iterumque imprimendo. Vel aliàs ferrum sine cannula studiosè, ne oculus palpebræve lædantur, loco affecto adhibendo.

Quæ actu potentiaue agentibus cauteriis facta, donec eschara cadat, Mucilagines cum Ovi vitello, Butyroque adhibenda.

Indeq; sarcoticis vlcus, vti cætera quoq; sanandum hoc modo: R. Aristolochiæ rot. rad. Ireos, cort. Thuris ana 3. j. β. Myrrhæ, Mastice. Sarcocollæ, Aloës, Cædmiæ fossilis an. 3. j. Mellis parû, fiat vnguentû, cui æruginis Æris pauxillum nonnunquâ permiscetur.

Vidimus in diuturno hoc affectu, supra anni spacium & vltra perseuerante, post tentata aliqua remedia, portionem ossis exesi in angulo maiore oculi, vnâ cum carne fœtida illi adnata, à parte sana, sponte regressam, in narium amplitudinem subito delapsam, excretamque fuisse, indeque nec pus, nec lachrymas amplius ex oculi sede profluxisse, sed per hanc viam in nares descendisse, partemque sarcoticorum vsu carne obductam rursus coaluisse.

Si ab ictu vel vulnere oculus læsus sit, sanguinem sistentibus, siccantibus & consolidantibus mox vitendum.

Sanguis Columbæ vel Gallinæ vel Tururis tepidus, si oculo læso indatur, hæmorrhagiam sistit.

Idem facit & simul siccatur sequens: R. lap. Hæmatitem vel Galactitem, fricetur supra cotem cum Lacte, donec succum, ille rubrû, hic album copiosè reddat: è quibus vnus, vel ambo simul permixti oculo indantur.

Vel: R. succi rubri Hæmatitis ex attritu cum lapide emulsi 3. j. album. Ovi agitati 3. β. succi Hypericonis 3. j. Thuris 3. β. misceantur: potest addi parum Opij si dolor vrgeat.

Postea sequens adhibeatur: R. album. Ovi agitati, mucilaginis rad. Consolidæ ana 3. β. Cerusæ, Tuthiæ lotæ aquâ Plantag. ana 3. β. Antimon. 3. j. aquæ Hyperici, Chalybeatæ 3. j. misce.

Stœbis folia emplastri modo imposita laudat Dioscor.

Dein vt vlcus, sanare oportet, iisdem quæ in vlceribus dicta sunt.

~~~~~

## DE AVRIUM

DOLORE.

CAPVT V.

Genera.



AVRIUM dolorum, qui interiora illarû occupant (nam qui in vano aurium externo, aut post aures se offerunt, in externis explicabuntur) genera, potissimum diuersitate proprietatis dolorum, & prout aliquid in illis, vel nihil, se manifestat, statuuntur.

*Pruritus  
in auri-  
bus.*

Pruritus interdum duntaxat aurium interna diuexat: adeò molestus quandoque, vt vt qui eum patiuntur, digito vel auriscalpio aliòve intruso, partem prurientem perficere cogantur.

*Dolor  
puncto-  
rius, di-  
uellsens,  
pulsans,  
ardens in  
auribus.*

Punctorius aliàs & pulsans dolor, nonnunquam & diuellens, hanc sedem, nunc grauissimè, nunc mitiùs impellens, infestat: Cù ardoris interdum sensu. Idque cum capitis, illius lateris præsertim dolore, aliàs sine eo. Qui dolor contactu eorum quæ auribus induntur, vel exacerbatur, vel minimè.

Apparet interdum in eiusmodi doloribus morbus aliquis. Vt rubedo ad exteriora vsque huius meatus, nonnunquam & ad aurium vñum vsque diffusa: quæ & aliàs in profundiore nonnihil sede, adhibitâ luce, conspicua fit. Vti & exulceratio. Frequenter aliquid ex aure emanat, vt sanguis, sanies: aliquando & pus, quod diu sæpe sponte certis horis effluit, aliàs cum regio sub aure premitur, tunc primum prodit. Nonnunquam & serum, copiosè profluxisse vidimus: Rariùs & vermiculos emeruisse. Interdum nullis eiusmodi indiciis se offerentibus, dolor in profundo excruciat.

### *Causæ.*

*Ex omni  
fectus &  
morbi.*

**C**um inter ea omnia quæ in omnibus latent, solæ membranæ, cavitates succingentes, sensu tactus sint præditæ: harum affectuum causâ dolorem fieri necesse est. Idq; vel in exterioris auris cavitatis ante tympanum cutaneâ membranâ: quæ cum exquisitissimè sentiat, grauissimos dolores patitur: qui & cum eousque contactus exterior progredi possit, eo exacerbantur. In interioris cavitatis post tympani membranâ, ex nervo dilatato per anfractus illius loci expansâ, dolores si fiant, cum sono aliquo alieno, aut tinnitu coniuncti, plerumq; molestiam pariunt. Affectus autem in membranis hisce, dolorem adferetes, sunt, intemperies calida vel frigida, vel maligna: irritatio, distentio, & læsio manifesta.

*Calida  
intempe-  
ries cau-  
sa Pruri-  
tus in au-  
ribus.*

Calida intemperies pruritum saltem aliquè in auribus gignere solet: si verò inflammatio vera nascatur, vti alibi in membranis dolorem, sic & in his si sic afficiantur, parit:

eumq; punctorium, pulsantem & diuellentem, qualis circa membranas solet fieri, accedente quoq; interdum ardoris sensu: qui dolores eo sunt atrociores, quo sanguis qui isthuc defluxit, est feruentior, maiorque inflammatio existit. Eosque febricula nonnunquam cum horrore & calore se prodens comitatur, vñ cum dolore, vt dictum, capitis. Et cum inflammatio in abscessum conuertitur, dolor augetur; eodemque disrupto dolor remittit, pusque saniosum primum, mox coctum, aliàs coloratum & virosum ex aure affecta effluit: quod retentum, pruritum & nouum quandoq; accersit dolorem: putrescensque aliquando vermes, qui postea prodeunt, procreat. Hoc pus ab vlcere quodam extra auris canalem fistulosum factum prodire interdum, ex eo quod cum pars auri vicina premitur, primum pus emanat, coniecimus. Huius autem intemperiei calidæ causa est, vel dolor ab externis iniuriis inductus, in hac sede hanc defluxionem concitans: vel sanguinis plenitudo & feruor in venis, in hanc sedem, præcedente plerumque febricula doloreque capitis, se effundens.

*Frigida  
intempe-  
ries, cau-  
sa Dolo-  
ris in au-  
ribus.*

Frigida intemperies, extrinsecus ab aëre frigidissimo, cum ille præsertim per flatum venti in aurem impellitur, inducta, membranas exterioris auris cavitatis afficiens, dolorem in illis conciliat. Quod & ab aqua frigida in aures illapsa fieri potest. In intentione auris camera idem ex defluxione serosi vel pituitosi humoris quandoque euenit, vt si ille admodum sit frigidus, qualem è naribus nonnunquam exstillare deprehendimus, frigiditate suâ membranis illius loci molestiam hanc pariat.

*Mali-  
gna quo-  
litas, cau-  
sa Dolo-  
ris au-  
rium.*

Maligna qualitas, dolores illos acerbos inducens, qui circa perioestia potissimum capitis in Cephalæa diuturna, tum etiam circa alias nudas osseas sedes, in capitis dolore, qui in lue venerea occurrit, se offerunt, hæcæ membranæ quæ aurium cavitatibus attextæ sunt, cum aliis infestans, dolorem in auribus, punctione præcipuè molestū, cum iam dictis aliis doloribus concurrentem in modo commemoratis affectibus parit.

Irritatio pruritum vel titillationem in exterioriore

*Irritatio  
aurium.*

causa  
Pruritus  
& Titil-  
lationis  
in illis.

teriore maximè cavitare occurrentem, frequenter efficit. Quæ vel à sanguine calidior in membranarum harum vasis pruriente: vel pure, vel aurium biliosis & acris sordibus: aut aliis illapsis in aures, membranam exteriorē potissimū vellicante, nascitur.

Distensio  
in auribus,  
causa  
Doloris  
in illis.

Distensio, per quam membranæ hæ ab ossibus quibus connexæ sunt, veluti auelli videntur, dolorem distendentem in auribus parit. Quod à flatibus fieri posse plerique statuunt: à quibus tamen sonus in auribus potius alienus excitatus quàm dolor, molestia, vt in auditus læsione diximus, parit: nisi ille interiorem auditus cameram adeò repleat, vt premendo membranas, dolorem aliquem quoque procreet: vel sub membranarum exterioris quàm interioris cavitatis genitus, (vt flatus in vniuerso corpore gigni, & sub membranarum maximè coerceri solent) eas ab ossibus separando, diuellentē & veluti lancinantē seu lacerantē dolorem inferat.

Vulnus  
aliæve læ-  
sionis, causa  
Doloris  
in auribus.

Læsio manifesta ab externis iniuriis, illapsis, intrusis, vnde punctum sectimque aurium membranæ diuiduntur, dolorem efficit: in qua prægressa violentia & sanguis prodiens, vulnus adesse patefacit. Cui si accedat inflammatio, dolor augetur, eoq; magis, si abscessus sequatur, quo rupto sanies vel pus effluunt.

### Curatio.

**P**ro ratione morbi, prout vel intemperies calida, inflammatio, vlcus, aut intemperies frigida, maligna, vel alia irritatio aut læsio est, curatio variat.

Pruritus  
aurium  
ab intem-  
perie ca-  
lida, cu-  
ratio.

Si ab intemperie calida, aures tantum intrinsecus pruriunt, sponte, aëre præsertim subeunte frigidiusculo, remittit: vel immixtis nonnullis refrigerantibus, mox dicendis, corrigitur. Vel si in vasis adhuc permanens sanguis calidior, pruritus excitet, eo reuulso; vt iam dicitur, purgatoque & refrigerato, rursum emendatur. Si verò inflammatio dolorem gignat, influxus sanguinis, reuellentibus illum à parte affecta ab initio mox retrahendus, & ne influere amplius possit impediendus, dolor comescendus; calor restringendus, demumque quod residuum est, discutiendum, vel si in abscessum vergat,

Inflam-  
mationis  
aurium  
curatio.

eoque rupto vlcus post se relinquat, vt in ea causa dicitur, procedendum. Quæ sequenti modo fieri debent.

Venæ sectione, Scarificatione, Cucurbitularum & Sanguisugiarum applicatione; Frictione, eodem modo vt in ophthalmia vsurpatis, sanguinis affluxum reuellimus, & deriuamus.

Iniectionis clysteribus; exhibitis purgantibus, præsertim si aluus stricta sit, excrementorumque adsit redundantia, iisdem ferè quæ illic quoque exposita sunt, idem aliquo pacto molimur.

Propinamus, refrigerando & in crassando sanguinem fluentem, calidiorē præsertim, sistentia. Et quæ proprietate aurium dolorem sedare creduntur, sicuti Glirium carnem melle subactam comestamque illud efficere posse, aliqui scripserunt.

Extrinsecus, iugularibus venis & temporibus adhibitis, similibus remediis quibus in ophthalmia vsi sumus, fluxionem impedimus. Et si dolor capitis simul adsit, oxyrhodinis quoque aliisque capiti ad motis, vtrique dolori occurrimus.

Parti affectæ, auri scilicet, varij induuntur liquores: ex quibus gutta vna aut altera vel plures instillandæ, qui & si aurē impleant, postquam tamen latera bene madefecerunt, ne auditum diutius impediunt, præsertim si fortiora fuerint, ne tympanū lædant; vt rursum effluant, capite inclinato, curandum. Vel extrinsecus cataplasmata tepida supra aurē dolentem apponuntur, ita vt & illius cauum non nihil impleant: vel fofus cum spongia noua adhibetur: à quo & suffitus dum calet, in aures intronitti potest. Vtimurq; dolorē sedantibus quodcumq; ille vrget, & mox ab initio repellētibus, si fluxus adhuc fiat, & refrigerantibus: atq; in progressu & declinatione digerentibus; & si in abscessum vergat, maturantibus: Sequentibus modis & formulis.

Ad dolorem sedandum. Lac recens tepidum in aures immixtum, iuuat. Itē Albumen oui, prius agitatione in liquorem redactum; Adepsq; anseris vel gallinæ, vel alius recens, Olea insuper Amygdalis dulcibus, & vitellis ouorum expressum: & in quo Lumbrici, Cochleæ, exēptæ prius ex testis cum mucos,

Mille-

Millepedes, Scarabæi decocti fuerint. Validius id præstant: oleum ex semine Hyoscyami vel semine Papaueris elicium: succusq; Papaueris vel Hyoscyami.

Vel hæ compositiones auri instillantur: R. Lactis recentis (mulieris, si haberi potest, præfertur) ʒ.ij. Album.oui agitati ʒ.β. axungia Anseris dissoluta ʒ.ij. misce.

Alia: R. mucilag. semin. Psyllij & Fœnogr. album. Oui agitati ana ʒ.β. adipis Anserini ʒ.ij. diluantur oleo Amygd. & Lacte: si Opij gr. iij. vel iij. addas, efficacius erit.

Tertia: R. olei Amygdal. dulc. ʒ.ij. succi Maluæ ʒ.β. Myrrhæ ʒ.β. Croci ʒ.β. Opij gr. iij. vel iij.

Quarta: R. ol. sem. Hyoscyami (albi præfertim) ʒ. j. Croci & Castorei an. instar pisi: misce.

Emplastrum anodynum foris applicandum: R. medullæ Panis tb. j. coquatur in Lacte, adde farin. sem. Lini & Fœnogr. an. ʒ. j. ol. Chamom. ʒ.β. Croci ʒ. j. vitellos Ouorū numer. ij. misce: si Opium addas, magis sedabit.

Vel: R. rad. Altheæ ʒ. j. fol. Maluæ, Solani, Hyperici ana m. j. flor. Anethi, Chamom. Rosarum ana p. j. sem. lini ʒ.β. sem. Altheæ, Maluæ, Papau. ana ʒ. ij. fiat decoctio in aqua vel Lacte, pro fotu, vel fuffitu: si addas fol. Papaueris vel Hyoscyami aut radic. Mādragoræ, vel cap. Papaueris, cū dolor vrget, proderit.

Vel: R. residentiam huius decocti, pistetur, addendo axung. Porci, medullæ Viruli, mucilag. seminis Psyllij & Fœnogr. an. ʒ. j. ol. Chamomel. Violacei an. ʒ. j. Butyri recent: ʒ. j.β. Croci ʒ.β. fiat catapl.

Cū repellere & dolorem sedare volumus: R. ol. Rosacei, Violac. Amygd. dulc. an. equas partes, injice Lumbricos, Millepedes, Cochleas, addendo parū Vini: decoque & cola ad vsum.

Vel: R. ol. Ros. ʒ. ij. Aceti ʒ. j. Croci ʒ.β. Opij gr. iij. vel iij. coquantur ad aceti consumptionem, si loco Opij & croci, Philonij Rom. ʒ. ij. addas, & in oleo & aceto decoquas, idem præstabit.

Ad refrigerandum & repellendum, ol. Violaceum, Rosaceum induntur: & succi Plantag. Lactucæ, Solani, Salicis, Vmbilici veneris, similesque.

Vel sequens, ex his inuicem compositis: R. ol. Rosacei ʒ. j. succi Granat. Plantag. an. ʒ. β. Aceti albi ʒ. ij. coquantur ad succorū consumptionem: Vtatur.

Vel fiat fotus extrinsecus: R. fol. Plantag. Salicum, Violariæ, Lactucæ m. j. fl. Ros. rub. p. j. Balauft. p. β. cort. Granat. ʒ. β. fiat decoctio in Vino rub. siptico: vel addatur parū Aceti: Foueatur auris.

Vel: R. residentiam huius decocti: adde far. Lentium p. j. ol. Ros. & Myrtillorum an. ʒ. j.β. Ouum crudum vnum: fiat cataplasma supra aurem.

Ad discussionem inflammationis, calida prædictis permiscuntur, & circa declinationem sola vsurpantur: veluti ol. Chamom. de Meliloto, Anethinum, Liliorum, auribus instillantur: aliæve calida intus forisque applicantur: qualia si à causa frigida dolor oritur, dicuntur.

Si ad maturationem tendat inflammatio, illudque expulsum, & dolore non remittente, sed aucto potius cognoscatur, maturantia, vt vnguentum Basilicon dissolutū in oleo Lini auribus imponitur.

Foris cataplasma sequens applicatur, quod dolorem admodum quoque compescit: R. bulbom vnū Cepæ maioris, & radices duas Liliorum alborum: coquantur sub cineribus, contundantur, adde farinæ f. Lini ʒ. j. Butyri ʒ. j.β. ol. Chamomil. Lini an. ʒ. β. Croci ʒ.β. fiat Cataplasma.

Abscessū maturatū aperit succus Cepæ, in quo Fermentum dissolutum sit, instillatus.

Si vlcus post abscessum ruptum sequatur, abstergentibus primū pus erit auferendū: quibus mox vlcus siccantia permiscuntur: tandemque illis solis vlcus est sanandum.

Abstergentia eadem quæ in auditu à pure impedito descripta sunt, hic quoque competent: quibus sequentia addimus.

Leuiora sunt, Saccharū simplex vel candum: aut Mel dissoluta in sero Lactis vel decocto Hordei.

Validius abstergunt, Mel scylliticum, succi Apij, Fœniculi, Betæ, Ceparū, Porri, Prasij, Absynthij, Cetaurij, per se vel addito Melle instillati.

Decoctum Lupinorum, Agarici, idē præ-  
Vrina

Abces-  
sus in au-  
rib⁹ post  
inflama-  
tionem il-  
lius secu-  
ta, cura-  
tio.

Vlcus  
aurium  
post abs-  
cessū re-  
licti cu-  
ratio.

(stant.



Vrina infusa egregiè abstergit: vri & Li-  
xiuium: quibus & alia permisceri possunt.

Laricea dissoluta cum Melle, additis, Vi-  
no vel iam dictis liquoribus, idem facit.

Fel tauri, aut alterius animalis, cum sero  
Lactis & Melle, egregium est absterforium.

Potentius omnibus est vnguētum Ægy-  
ptiacum: quo, cum admodum sordidum est  
vlcus, vtimur, succo vel Melle diluto, & con-  
temperato si nimis sit efficax.

Ad siccandum & consolidandum succi  
frequentes conueniunt: Plantag. Burfæ &  
Virgæ pastoris, Scabiolæ, Aristolochiæ, Po-  
lygoni, Psyllij: & ex inspissatis succis, Agre-  
sta, Omphacium, Hypocistis: per se, vel Vi-  
no, Aceto, Melle permixta.

Vel decoctum, Aristolochiæ, Gallarum,  
cort. Granatorum, aliorumque siccantium  
in Vino, aqua Chalybeata factum, additis  
interdum quoque alijs.

Ferri scoria in vino stiptico, vel cui parum  
Aceti permixtum sit decocta, efficacissimū  
est præsidium. Eodem modo Lithargyrium  
decoctum prædest.

Efficacius adhuc fiet hoc modo: R. lima-  
turæ Ferri subtiliss. 3.ß. Vitreoli 3.j. coquan-  
tur in Vino & Aceto, vel solo Aceto, si vali-  
dius esse velis, colatura indatur.

Linimentum conueniens: R. Cinnaba-  
ris, Lithargyrij an. æquales partes: excipe  
Melle rosaceo vel syrupo de Rosis rubris  
siccis, fiat linimentum: cuius portiuncula  
inspilletur, vel cum lana specillo obuoluta, &  
in eo intincta, in aures immittatur.

Vel tale sarcoticum: R. Cerusæ, Tuthiæ  
præp. an. 3.j. rad. Arist. Myrrhæ, Sarcocollæ,  
Aloës an. 3.ß. rad. Ireos 3.j. fiat pulvis subri-  
liss. excipiantur Melle & succo Agrestæ vel  
Omphatij, fiat Linimentum.

Fortius erit, si tantillum æruginis Aeris  
addas, & scoriam Ferri, in Aceto extinctam  
& tritam: præsertim cum cicatrix inducen-  
da est.

Collyria varia siccantia in oculorum vlce-  
ribus descripta, & validiora quoque in Epi-  
phoris explicata, hic locum habere possunt,  
cum auri minùs ab illis quàm oculus læ-  
datur.

Præter quæ fumus siccans, fuliginosus,

intra aures admittitur, cum penitus eas sub-  
eat, admodumque siccet, plurimum ad cura-  
tionem vlceris proderit. Qualis erit, si ex Pi-  
ce, Laricea, Thure alijsque gummosis sic-  
cantibus accensis suscitetur: vel alijs enar-  
ratis pulueribus carbonibus iniectis: impri-  
mis si Cinnabaris portiuncula addatur, cu-  
ius fumus validè siccando, operatur.

Si Vermes ex pure aurium vel sordibus *Vermes  
aurium  
illorumque  
curatio.*  
nati irritent, eadem ratione & extrahendi &  
necandi, vri in auditus defectu ab illapsis fie-  
ri debere docuimus.

Imprimis verò illos enecant succi Absyn-  
thij, Centaurij min. Persicariæ & fol. Persici,  
Vermicularis herbæ, Cucum. asinini.

Vel decoctum horum: vri & Lupinorum,  
præcipueque Colocynthidis & Hellebori  
albi in Vino & Aceto factum.

Fella item animalium indita.

Oleaque amara, præsertim nucleorum  
Persicorum, & Amygdalarum amararum.

Vel sic: R. Colocynth. 3.ß. Hellebori albi  
3.j. Aloës 3.ß. cum succo Persicariæ fiat instar  
linimenti: Indatur illis portio.

Si à frigida intemperie simplici vel cum *Doloris  
aurium  
à frigida  
intemperie  
vri & dis-  
sentione  
curatio.*  
materia, aut à flatibus dolor oriatur; tunc si  
humor aut flatus adsint, quæ hæc reuellunt,  
vt Cucurbitulæ, Frictiones, vsurpantur: &  
Clysteribus iniectis, Purgantibusque exhi-  
bitis, idem facere, humorūq; redundantiam  
simul euacuare, studebimus. Per os & nares  
materiam simul deriuare, sicuti in auditus  
læsione ab hisce causis facta, fieri debere, o-  
stendimus. Balneis etiam alijsque sudorifi-  
cis eam discutere oportet. Vel si intemperies  
tantum sit, calefaciendo eam alterare; Vi-  
tusque ratione calida idem efficere; in qua  
Glinum caro, vri superius dictum, proprieta-  
te etiam quadam iouat.

Auribus quoque eadem quæ in auditus de-  
fectu explicata sunt, induntur, forisque ap-  
plicantur: quibus & sequentia addi possunt,  
doloris potissimum mitigandi gratia.

R. ol. Amygd. am. è nucleis Persicorū ex-  
pressum, Chamomel. de Meliloto, Anethi-  
num, separatim vel simul mixta vsurpata.

Cum dolor immitis admodum est: R. olci  
ex semine Hyoscyami 3.ß. Castorei 3.ß. Cro-  
ci gr. vj. misceantur.

Vel: R. Capam excauatam, inde; Castorei, Euphorbij an. ʒ. ʒ. Opij gr. vj. imple oleo Amygd. amar. vel alio ex supradictis: coquatur sub prunis: coletur & vtere.

Aur: R. senectæ Anguium portionem, decoque in oleo Lumbricorum, addendo Millepedes, si haberi possunt, colatumque adhibe: cui ol. Scorpionum parum addere potes: vel per se eo vti.

Vel: R. succi Parietariæ, Marrubij vel Mentastri an. ʒ. j. ol. Laurini ʒ. j. ʒ. fellis Tauri ʒ. j. axung. Gallinæ parum, coquatur ad fucorum consumpt. Indatur illius portio & extrinsecus auris vngatur.

Spongiola intincta in Aceto, in quo Salis portio prius dissoluta fuerit, admodum probatur, auribus adhibita, vel etiam impressa.

Decocto sequenti fouetur auris, vel suffitus ab eo aure excipitur: R. fol. Origani, Pulegij, Rutæ, Lauri an. m. j. Absynthij m. ʒ. fl. Chamom. Meliloti, Anethi an. p. j. baccarū Lauri, Sambuci vel Hederæ an. ʒ. j. feminis Fœnogr. ʒ. ij. femin. Carui ʒ. j. fiat decoctio in Vino & Aqua, ad vsum dictum.

Sacculi ex aridishisce fieri possunt & apponi.

Vel sic: R. Panici p. j. Origani, Maioranæ an. m. j. fl. Chamom. p. j. Croci ʒ. ʒ. puluerisentur, fiat sacculus.

Cataplasmata idem præstabit: R. bulborū Caparum & Porrorum tostorum sub prunis an. ʒ. ij. contundantur, adde farinæ seminis Lini & Fœnogr. an. ʒ. ʒ. nucleorum Persicorum ʒ. j. coquantur in Lacte & contundantur, adde axung. Anseris ʒ. j. ol. Anethini vel Lumbricorum aut alterius supradicti, vel Butyri ʒ. ij. Croci ʒ. j. misce.

Si Allio auris fricetur, dolorem sedari scribunt: cum reuulsionis causâ ab interioribus ad exteriora materiâ eliciat. Quod validius, si rad. Scyllæ vel Cyclaminis aut Ari vel Serpentariæ illud fiat, præstabit.

Qualitas maligna in cephalæa diuturna, & in lue venerea, si punctiones in auribus, cum tinnitu vna cum alijs accidentibus procreet; Vsurpatis primum magnis multisque per varias vias & imprimis per sudores euacuationibus, tandem cum affectu cessant:

vti in illis affectibus explicatum fuit. Et si quid remanserit, iisdem topicis vt in frigida causa, & in tinnitu aurium dictum fuit, quoque tollitur.

Irritationes, pruritus & dolores alij in auribus, si à sordibus biliosis alijsve excrementis illic natis, aut etiam ab extrinsecus illapsis & in auribus hærentibus fiant: quâ ratione ea eximere debeamus, in auditu læsione, cum & huic impedimentum adferunt, explicatum fuit.

Læsiones verò adeò violentæ, vt vulnus inde sequatur, non alia ratione quàm aliæ puncturæ, vulneraque sanantur. Primumque si inflammatio metuitur, vt in auris inflammatione prius dictum, sanguis emittitur retrahiturque, inditisque auri repellentibus propellitur. Dein quæ dolorem sedant, sanguinis fluxum compescunt (vt suo quoque loco dicetur) immittuntur: Tandem ad liccantia & consolidantia, sicuti in vlcerebus dictum, transitur.

DE N A R I V M

## D O L O R E.

C A P V T V I.

G e n e r a.

G e n e r a.

**D**OLORVM qui in interioribus narium sentiuntur genera, præcipue ex varietate dolorum deumuntur.

Pruritus sæpè naribus accidit: estque vel levis tantum titillatio: vel admodum quoque pruriunt: quibus sternutatio quandoque succedit; aliàs nulla: interdum & nares simul stillant.

Ardor aliquando vrget, calentque plus minusve nares & rubent, aliàs etiam veluti accensæ esse videntur: accedente nonnunquam intrinsecus tumore apparente, seu inflammatione, narium transitum impediente vel etiam obstruente.

Vlcerosus dolor, vlcere sensum præbens nonnunquam adest: Emungiturque interdum nunc sanguis, nunc sanies, nunc crustula, in vlcere simplici dicto. Aliàs mucus seu pus graueolens, sætorque adest narium, quem

Doloris  
aurium  
a mali-  
gna qua-  
litate  
curatio.

Doloris  
aurium  
Pruritus  
ab irri-  
tatione  
curatio.

Doloris  
aurium  
vulnere  
curatio.

Pruritus  
& Titil-  
latio in  
naribus.

Ardens  
dolor in  
naribus.

Vlcerosus  
dolor in  
naribus.

quem astantes magis quam ægri persentiscunt, in ozænis appellatis: Accedit quoque sæpius nasi deformitas, quo collapsio, vniuersa facies deformatur. Vox rauca & veluti ex cauo prodiens (vnde caua hōle Ned German. dicitur) redditur: Palatumque exesum amploque sæpè foramine peruium esse videmus. Respiratio item nonnihil impedita est: vt in elephantiasi ferè semper in lue venerea aliquando hæc superuenire videmus.

*Causa.*

**A** Morbo procedit: qui est vel irritatio, vel intemperies calida, vel solutio continui.

*Irritatio narium, causa Pruritus & Tussilatiōis.* Irritantur nares cum sint admodum sensiles faciliè, vnde titillatio saltem vel molestus quoque pruritus, accedente nonnunquam & sternutatione oriuntur. Ab iisdem penitus causis à quibus & sternutationem prouenire diximus; externis nimirum: splendore & luce nimia. Odore vehementi & pungente. Immissis acris adurentibusve errhinis, vel casu illatis: Vel ab internis humoribus; vt sanguine tenuiori in vasis, sicuti in auribus, vt illic dictum, ita & in naribus pruriente: aut seroso, pituitoso, acris, falso humore cum lachrymis, aut aliter à capite huc defluente naresque vellicante: cui & bilis, quæ ad aures alias expurgatur, permixta, hucque delata, idem facit.

*Calida intemperies & Inflammatio narium, causa Doloris ardentis in ipsis.* Calor intensus narium, ardentem in naribus interdum dolorem parit: cui vera nonnunquam cum tumore & obstructione narium accedit inflammatio. Sicuti à læsione aliqua externa, maiore quam vt tantum irritet, potest euenire. Vel interna quoque causa vehementius vellicante: vnde tamen etiam ferè extrinsecus nares simul afficiuntur, sicuti in coryza, nares non solum intrinsecus, sed & alas ipsarum extrinsecus valde calere, rubere & nonnunquam inflammare videmus, veluti in externis doloribus exactius ostendetur.

*Excoriatio, Vlcus, Vlcus, causa Doloris.* Soluta continuitas intrinsecus in nasi internis lateribus, vel excoriatio vel vulnus aut vlcus existit, ad exteriora quoque aliquid pertingens. Quæ ab externis

iniurijs, pungentibus, vel vulnerantibus, vt & ab vnguibus, dum nasus purgatur; contudentibus, vrentibus item errhinis aliisve medicamentis, quibus in polypo sanando vtimur, fieri possunt. Nonnunquam & ab acris defluxione diu per has vias profluente, nares intrinsecus & in ambitu quoque exulcerantur, adiuuante ad hæc vi illa quæ in frequenti emunctione, quæ tunc ferè fit, adhibetur.

In profundo narium vbi ossa fungosa sunt, & in illarum amplitudine vlcera nascuntur putrida, pertinacia, diuturna; interdum serpentina, alias carcinomatis naturam habentia; alias quoque in narium amplitudine palati crassam tunicam perforantia, nariumque sæpè interstitia exedentia, vnde nasus collabitur. Sæpè & ossa maxillæ superiori vicina, quæ magno spacio corrupta abruptaque postquam reiecta fuissent, amplam foueam in palato reliquisse vidimus, vnde tantus fœtor exhalabatur, vt vniuersum conclauē eo repleretur. Sed & Vermiculos ex putredine hac natos aliquando prodijisse constat.

Talia autem ab iisdem causis iam explicatis, si in profundo nares ab illis lædantur, vlcusque negligatur, aut ob loci humiditatem, & ad quem remedia facile peruenire non possunt, nō facile sanetur, fieri possunt. Imprimis verò ab affluxu humoris adurentis vel maligni, in hunc locum à natura propulsi, Ozænæ hæc nascuntur, & narium vlcera sicuti in alia loca effusi, tumores & vlcera peruersa ac cancrofa, generantur. Quod cum non solum in hoc loco fit, sed & malignus humor & qualitas alijs locis præcipueque in membranosis insidietur, vt in elephantiasi, lueque venerea (ea ratione sicuti illic explicabitur) tunc vnà cum alijs malignis vlcerebus & vitijs, etiam nasi hæc putrida nascuntur vlcera, nasum vicinaque ossa, vt dictum, deuiastantia, aliisque illius rei causâ dicta accidentia producentia.

*Curatio.*

**S**I ab irritatione tantum nares pruriant, causa primum siue externa siue inter-

ab irrita-  
tione cu-  
ratio.

na sit, amouenda, & si non mox cessat, vti fe-  
rè sit, nares irritatæ demulcendæ: sicuti hæc  
in sternutatione, quæ tunc vtplurimum se-  
quitur, dictum fuit, atque in defluxione in  
nares & coryzâ explicabuntur.

Inflama-  
tione &  
caloris  
narium cu-  
ratio.

Si nares incallescant nimium aut inflam-  
mentur, quia tunc rubedo, calor atque tu-  
mor extrinsecus quoque apparent, illicque  
frequentiùs occurrunt, quâ ratione mederi  
oporteat, in doloribus qui ab affectibus in  
superficie corporis euenientibus prodeunt,  
docebitur.

Vlcerum  
in narib.  
curatio.

Exulcerationes narium internæ simpli-  
ces adhuc sine pure aut fœtore, siccantibus  
admodum, cum locus sit valde humidus, san-  
nantur. Purulentæ verò priùs abstergi de-  
bent, eoque validiùs, quò maior in illis puris  
est copia, magisque adhuc si putredo simul  
adsit, aut carnis excrescentia, quæ ægrè san-  
nantur: nonnunquam & insanabilia fiunt,  
interdum post se nasi deformitatem (vti de-  
claratum est) relinquunt. Quibus topicis,  
expurgationes excrementorum, si vlcera  
hæc procrearint vel foueant, præmitti de-  
bent. Imprimisque si à prauis & malignis  
procedât humoribus, varijs euacuationibus  
totius corporis generalibus, in elephantiasi  
factis, & per sudores præsertim, in lue vene-  
reâ, hæc ab illis vitia nata, vti & alia, sicuti il-  
lic ostendetur, curare studebimus.

Naribus induntur hæc remedia, formâ  
vel errhini naribus attractâ, vel vnguenti,  
cum bombace, aut suppositorij in nares im-  
missâ: vel fumi naribus excepti, vel pulue-  
ris insufflati. Quæ ne in fauces per narium  
amplitudinem cadentia noceant, si aqua ore  
interim retineatur, prohibetur.

Abstergentia leuiora ex sero Lactis cum  
Melle, vel Saccharo rubro permixto fiunt:  
vel ex Vinomelite: aut fortius paulò ex  
Oxymelite.

Magis abstergit Lixiuum & Vrina: eoq;  
amplius si Aluminis addatur portio: vel si  
hec in vase Aeneo parum retenta æruginem  
côtrahant. Quod & Omphacium hoc modo  
Æruginè permixtum facit.

Decoctum ligni Guaiaci factum in lixi-  
vio, addito Melle quando magis abstergen-  
dum: quando verò plus siccandum, in Vino

astringente, in lue præsertim venerea, vlce-  
ra narium sanat.

Succus Hederæ putredinem in narium  
vlceribus cohibet & emendat: vnde ad na-  
rium tænia à Diosc. præscribitur.

Abstergens & siccans errhinum sic fit:  
R. succi Granatorum, Plantag. an. ʒ. ij. Mel-  
lis, Vini an. ʒ. j. misce addendo Aluminis &  
Vitreoli parum.

Aliud in forma vnguenti: R. succi Hede-  
ræ & Plantag. an. ʒ. ij. vini Granatorum, ace-  
ti Ros. mellis Ros. an. ʒ. j. ol. Ros. & Myrtini  
an. ʒ. j. β. coquantur ad consumpt. adde Cerae  
viridis cum æruginè Æris coloratæ, fiat vn-  
guentum.

Vnguentum Ægyptiacum in putridis  
admodum adhibetur vlceribus, dilutum nō  
nihil prædictis liquoribus, vel per se cum  
magis absterfione opus est, & caro putris  
adest.

Aqua Fortis vel Sublimati, Spiritus Vi-  
treoli: parum diluta, penicillo, cautè vlceri  
adhibetur: Quod & aqua, in qua Calx ex-  
tincta fuerit, facit.

Siccans & consolidans errhinum hoc mo-  
do paratur: R. sol. Plantaginis, Equiseti, A-  
grimoniæ, Rubi, Polygoni maris vel mino-  
ris Herniariæ dictæ an. m. j. cort. Granat. ʒ. j.  
Gallarum, rad. Consolidæ an. ʒ. β. fiat deco-  
ctio in Aqua & Vino rubraustero, vel mixto  
cum paucis Aceto, exprimantur, addendo  
parum Mellis: misce.

Vel sic, cum cartilagine narium erodi  
incipiunt, naresque resimæ fieri: R. succi  
Plantag. Agrimonie, Pilosellæ, vel Polytri-  
ci, Pimpinellæ, succi Rosarum & Apij an. ʒ. j.  
Aceti, Mellis an. ʒ. β. Aluminis ʒ. ij. cort. Thu-  
ris, Myrrhæ an. ʒ. j. Calcytidis ʒ. j. misceantur  
diligenter pro errhino.

Vnguentum ad idem: R. Lithargyrii,  
Cerae lotæ aquâ Plantag. an. ʒ. β. Tuthiæ  
præpar. Plumbi vsti & loti an. ʒ. ij. Myrrhæ,  
cort. Thuris an. ʒ. j. rad. Aristoloch. rot. ʒ. β.  
succu Plantag. & ol. Ros. omphacini an. q. s.  
ad incorporandum vt indi possit.

Vel sic: R. rad. Aristoloch. rot. cort. mali  
Granati vel Balauft. an. ʒ. ij. cort. Thuris,  
Myrrhæ, Aloës, Ladani, Sanguinis draco-  
nis, gummi Tragach. parum alsi an. ʒ. j. Cal-  
cis



cis sæpius extinctæ 3.ij. Aluminis, Chalcydis an. 3.ß. Omphacij 3.ß. mucilaginis factæ ex Ichtycolla infusa in aqua Plantag. 3.j. olei Ros. omphacini q. s. ad incorporandum, addendo parùm Ceræ rubræ, cum Cinnabari præparatæ, fiat instar linimenti, vel vnguenti spissioris, aut etiam magdaleonis, qui intrudi possit.

Pulvis qui in nares insufflatur: R. Thuriæ præpar. Coralli vsti & loti an. 3.j. cort. Thuris, rad. Aristolochiæ an. 3.ß. fiat pulvis subtilissimus: Qui & ex alijs, in vnguentis enarratis pulueribus parari potest, & in forma pulueris vsurpari.

Multa alia in oculorum & aurium vlceribus exposita remedia, tam abstergentia, quam consolidantia hic quoque prodeunt.

Fumi, qui rectius cæteris remedijs ad vlcera si in abdito sint, perueniunt, eaque vndique attingunt, ad exiccationem illorum, tum vi siccante, tum fuligine sua, quam dum vruntur vel accenduntur reddunt, plurimum conducunt. Qui dum excipiuntur naribus, si à vehementioribus aut malignis affurgat, spiritus interim retineri nec respiratione attrahi debet, & relaxatione concessa, fumi per intervalla intromitti.

Excitatur hoc modo: R. Thuris, Masticis, Ladani an. 3.ij. Storacis, Benzoini, gummi Iuniperi an. 3.j.ß. Santali odor. 3.j. ligni Aloës 3.ß. fiat pulvis: cuius portione carbonibus ignitis inspersa, fumus fit.

In deterioribus vlceribus: R. Pulverem prædictum, adde Myrrhæ 3 j. Marcasitæ, Auripig. rubr. Cinnabaris (in lue venerea præsertim) an. 3.ß. fiat pulvis pro fumo: vel extractus Laricæ aut inf. gummi Tragach. in trochiscos prius redactus, vnus ex illis vratur.

Fumus Cinnabaris, quo vniuersum corpus in cura luis venereæ suffumigatur, ad nares quoque perueniens, non solum generale huius morbi est remedium, sed & topicum in narium vlceribus sanandis fit, si caput in hoc fumo eo nomine aliquantisper contineatur.

Candela vlcera hæc sanans fit ex Cera rubra, Minio vel Cinnabari colorata, accensa,

rursumque extincta; quo modo & fumus commodius naribus excipitur.

Vel sic: R. Ceræ instar nucis, in loco calido collocetur, donec ita mollescat vt manibus malaxari possit, permiscendo diligenter pulueris primi vel secundi portionem, indeque in formam candelæ manibus diducendo, cui secundum longitudinem ad medium vsque sectæ, elychnium imponatur, rursumque voluatur: quæ deinde in eisdem vsus accenditur extinguiturque.

Aliud valde efficax, copiosam fuliginem reddens, & denigras: R. Picis, Resinæ, part. aq. Sulphuris tantillum, dissoluantur ad ignem, atque intincto aliquoties elychnio fit candela, à qua accensa fuligo assurgens ad nares per canalem deriuatur, sed mox iterum amouetur.

Si crustæ in naribus vlceri obnaſcantur, potenterque hæreant, nec facile cedant, Butyro, Mucilaginisve, vti escharæ casus, sic vt & hæ sensim abscedant, procuratur.

Si illis curatis caro luxurians quæ excreuit relinquatur, ea, sicuti in polypo dicitur, auferenda.

Vulnera narium interna, eadem ratione, vt si in auribus fiant, illicque dictum, immixtis sanguinem cohibentibus, mox siccantibus & consolidantibus, curantur: si in vlcus abeant, vlceris iam explicata cura adhibetur.

~~~~~

DE ORIS DOLORE.

CAPVT VII.

Genera.



DOLORVM, qui in oris carnosissimis fedibus, nimirum lingua, gingiuis, buccis & palato occurrunt, & vel separatim in quibusdam hisce partibus, vel pluribus simul se manifestant, nonnunquam & ad fauces pertingunt (de quarum doloribus postea peculiari capite agemus) genera distinguuntur primum, quatenus hi dolores cum sensu asperitatis aut caloris seu ardoris vel lancinationis, aut vlceris, apparentibus aliquibus vitijs, vel nullis, se representant.

*Asperi-
tas lin-
guæ &
oris.*

Cum asperitatis sensu solo molestia in lingua & ore quando sentitur, quia gustui & loquelæ quoque incommodat, in vtriusque læsionibus explicata fuit.

*Punctio
& ardor
linguæ,
nullo ap-
parente
morbo.*

Cum ardore & punctione in linguæ lateribus & apice, nullo in lingua morbo apparente, dolores sæpè redeunt, diu & multis quoque annis affligere aliquos vidi; interdum in hac solum parte, aliàs etià in labijs, aliisve in locis corporis quibusdam partium extremitatibus sese patefacientes: sicuti de hoc affectu in habitus corporis doloribus quoque mentio fiet.

*Calor so-
lus: vel
cum tu-
more &
ardore:
nonnun-
quam
pensione
& pustulis
in linguæ
oribz
partium.*

Calore solum lingua interdum molestatur: aliàs etiam cum ardore, morboque tunc se manifestante in illa, afficitur: & tunc non ut aliæ partes quæ albæ sunt exactè rubet, sed potius puniceo colore prædita est: tumetq; interdum & inflàmata est: nonnunquam & simul sicca aridaq; existit, & finditur: pustulæque quandoq; in ea eleuantur: quæ adeò sæpè inualescunt, ut ad loquelam ægrè & non sine dolore moueatur, balbutiantq; ob id ægri: & vicinæ ori partes, faucesq; interdum simul, sicuti dicitur, afficiantur, anginaque dicta tuncilli comes fit, & æger in suffocationis periculo versetur. Quæ per se rarius, sæpius in febribus, sicuti in illis ostensum, eueniunt, & præsertim in continuis malignisq; adeò vrgent, frequentiaq; sunt, ut vltus hunc affectu, ob hoc graue & manifestum symptoma, linguæque puniceum colorem, Breune/sicuti in febribus dictum, vocet. Verùm & hæc oris partium inflammatio, in lue venerea, dum ea hydrargiri vsu sanatur, superuenire solet.

*Breune
Germ.*

Tument & calent gingiuæ sæpè intus forisq; ad radices dentium: tumore foris aliquando se quoq; manifestante; tum in prædictis oris affectibus, tum in dentium dolore, cum vicinis illis sedibus nonnunquam inflàmatur: dolorq; intensus, præsertim cum suppuratur inflammatio, existit, sicuti in dolore dentium quoque explicabitur.

Sed & buccæ palatumque, tum per consensum iam dictarum partium, tum per se inflammari & tumere solent.

*Rana
sub lin-
gua.*

Sub lingua in carne laxa, quæ linguâ vinculi instar nescit, talis interdum nascitur cum

tumore & inflàmatione dolor, in Batrachio seu Rana dicto affectu: vterius quoque in proximas partes se quadoq; diffundens, qui suppuratus in abscessum plerunq; conuertitur. Equo & calculum oblongum in quo-
*Calculus
dam, postquã magnos diu cruciatus passus sub lin-
guæ.*
fuisset, prodijisse vidi. De indolente, qui in eodem se interdum loco offert tumore, alibi dicitur.

Vlcerosus, lancinans cum ardore, vel sine eo dolor, in varijs oris locis frequenter accidit: Occurritque is nunc cum pustulis vel in lingua vel palato vel buccis vel gingiuis erumpentibus diuersimodè: & plerumque in infantibus à morbillis per oris sedes hinc inde dispersis.

*Vlcerosus
dolor,
nunc cu
excoria-
tione,
nunc fis-
suris, nunc
exulce-
ratione,
in ore &
lingua.*

Aliàs verò cum excoriatione aliqua in iisdem locis facta, ex pustulis disruptis relicta, vel alijs de causis, excitata.

Cum fissuris & scissuris in lingua, in longum & transversum ductis, dolor quoq; se offert: vehemens interdum: cui nonnunquam lingue ariditas, aliàs etiam inflàmatio illius, uti superius dictum, copulata est. Qui dolor, uti & alij grauiore in ore facti, ab ingestis, calidis præsertim seu acris cibis, exacerbatur.

Cum exulcerationibus veris dolor se manifestat sæpius: quæ interdum post excoriationem relinquuntur: aut pustulas suppuratas, & in vlcus conuersas, aut variolas in infantibus: aut post inflàmationem aliquam in abscessum mutatam, præsertimq; sub lingua factam, aut in radice gingiuarum, in dolore dentium.

Aliàs verò parua sunt vlcuscula, quæ Aphitas vocant, Arabes Alcolas, buccas, linguæ latera & radices, gingiuas, palatum occupantia: nunc vno, nunc duobus, nunc pluribus in locis: admodum frequentia, in iunioribus præcipuè, & in lue venerea sæpè occurrentia. Suntque parua ab initio lentis instar ampla rotundaque, alba in medio, in ambitu verò rubra & veluti inflàmata, doloremque inferentia, quæ tamen mox dilatantur, admodumque nisi caueatur, serpunt, & vicinas partes corrumpunt.

*Aphita,
Alcola
Arab.*

Vlcus malignum ex aphtis sordidis neglectis, in infantibus præsertim, aliisve de causis natum, gingiuas ferè sine dolore aut non

*Cancer
vel Her-
pes ex-
densus.*

gingivum
Durchs
feule
Germ.
magno occupat: quod Cancrum gingiv-
rum, Herperem exedentem Rhazis, Germ.
Durchseule vocant. Purulentum & album
primum est, mox flavescit, inde nigrescit,
serpit & cauernosum fit, gingivasq; eo loco
ubi est, penitus depascitur, sepe & subiectam
maxillam vitians, in sphacelum abit: à qua
corruptam portionem illius cum dentibus à
reliqua maxilla abscedentem exemptam
vidi: vnde facies postea eo loco deformata
manet.

Scorbu
rus.
Echora
bust.
Huc quoque gingiviarum tumor & exul-
ceratio, in affectu illo maritimis Septentrio-
nalibus populis cōsuetō & epidemio, quem
Scorburum vulgo vocant, referri debet: In
quo gingivæ intumescunt, cruoremque ex-
sudantes, putrescunt & corrumpuntur, at-
que adeo absumuntur, vt dentium radices
nudæ pateant. De quo affectu, cum etiam
alia corporis loca, pedesque imprimis, mac-
ulis, tumoribus, interdum & vlcerebus infi-
ciat, nos pleniorē tractationem illius in af-
fectibus corpus defœdantibus, vbi & de alijs
contagiosis eiusmodi malis, vt elephantiasi,
hæc venerea agemus, instituemus: hîc tan-
tū quatenus os infestat, illius mentionem
facientes.

Cum vulnere dolor interdum occurrit:
quod punctum vel scutum, vel morsum &
inæquale est. Cui inflammatio aliquando
iungitur. Quod si buccas penetret, ad exte-
riora pertinet.

Causæ.

Morbus qui causam præbet hisce oris do-
loribus: vel in nervo consistit, nec appa-
ret: vel in iam enarratis partibus oris sensi-
bilibus quibusdam existit & manifestus est.
Estq; is vel intemperies calida sola, vel cum
inflammatione: vel solutio continui.

Nervi
affictus,
causa
Punctio
nis &
Ardo
ris lin-
guæ, nul-
lo appa-
rente
morbo.
Calida.
Nervi affecti causâ, ardor ille in lingua,
nulla illius læsione apparente, diuturnus sæ-
peq; excrucians fit. Qui quo pacto affectus,
hunc dolorem in lingua procreet, vti & alijs
in locis, partim in stupore, partim in paraly-
si declaratum fuit, atque in habitus corporis
doloribus explicabitur.

Intemperies calida sola, molestiam illam
calore solo se exerentem in lingua potissi-

mum parit. Si cum inflammatione sit, dolo-
rem & ardorem cum tumore procreat. Quo-
rum causâ ab externis procedit, illis nimi-
rum quæ linguam adurunt, pustulæ atque
excoriatio simul adsunt. Ab interna verò
causa hæc plerumque nascuntur: vt vapore
feruente, in morbis calidissimis & febribus
ardentibus & malignis, sursum euaporante,
hasque sedes accendente, atque inficiente:
vnde & Breune dicta, semper cum febre cō-
tinua copulata nascitur: cui & angina, si in-
flamatio linguæ, affluxum sanguinis ad fau-
ces vicinas calore & dolore concitaret, iungi
potest. Ab humore sanguineo puro vel im-
puro vel maligno, affluente ad has sedes i-
dem potest fieri, linguæque & gingivæ potis-
simum inflammari: quod vt in varijs mor-
bis, sic & in lue venerea, vti dicitur, accidit.
Vel si in subiectam linguæ carnem laxam
fluat, illic tumorem cum inflammatione ex-
citât, eoque suppurato, in abscessum conuer-
titur. Cui influxui, calculus ea in sede ex se-
roso humore natus, doloremq; immensum
antequam prodiret causans, vt & in alijs lo-
cis, ob dolorem, phlegmoni partium, sic &
hîc in eo qui talem ex eo loco excreuit, oc-
casionem præbuit. Frequentius autem ex
dolore dentium, vt illic dicitur, defluxio in
gingivas concitata, ibi inflammationem tu-
moremque, quæ in dolore dentium super-
uenire solent, efficit.

Solutio continui, oris partium dolores
cum pustulis, excoriatione, fissuris, vlcere, se-
proferentes, facit. Quæ vel ab illis quæ vul-
nerant hasce sedes proficiscitur, ori inditis:
frequentius verò à morsu proprio, casu lin-
guæ buccis læsis.

Adurantia actu potentiaque assumpta, tu-
nicam eleuantia, vesiculas, illisque ruptis
excoriationem pariunt. Quod & acria sola
in ore tenero præcipue, vt infantium, pos-
sunt efficere: vti & à lacte acri & pane à mu-
ribus atroso, aphtas gigni scribunt: quod po-
tentiùs acria facient, si vim penetrandi simul
magnam habeant: quâ ratione si nucleos,
nucum recentes, vuasque eodem tempore
comedant iuniores, linguam ipsorum findi
admodumque dolere in me ipso & alijs sæpe
obseruavi.

Verum

Verum & nimium exiccata lingua arefactaque, à causis in gustus læsione explicatis, adeo sæpè vt vulnerata doleat, finditur.

A sanguine calidiore, feruentiore, biliofiore, atrabiliario, acri & salso, redundante, vt alia in superficie corporis vitia, sic & in hisce locis humidis & tenerioribus, pustulæ, aphtæ, aliaque vlcera, eaque interdum maligna, si talis subfit causa, excitari possunt.

Quod & à sputo, quo hæ partes continuò madent, si talis illi commisceatur materia, vnà cum sero eò delata illique permixta, fieri potest: qualem ex hydrargyri inunctione vel suffitu ad os copiosè cum sputo, peculiari quadam & ferè propriâ argenti viui vi propulsam, oris non solum inflammationem, sed & vlcera gignere obseruamus.

A morbo alio prægresso hæc quoque nascuntur vlcera, vel immutantur. Veluti ex abscessu post inflammationem factò ruptoq; relinquitur vlcus sordidum. Vulnus aut excoriatio simplex, ob loci humiditatem facillè in verum vlcus abeunt. Aphthæ neglectæ in peruersa degenerant vlcera. In elephantiasi & lue venerea etsi hydrargyro minimè vti sint & scorbutò appellato affectus, ob venenatam illam vim morbi, vt illis in locis dicitur, in ore ac faucibus, vt & alijs in locis vlcera peruersa, quemadmodum illic explicabitur, se quandoque exerunt.

Curatio.

Inflammatum caliditatem linguæ gingivarum buccarum & palati curatio. Inflammationes & calores præternaturales oris partium, si à morbis alijs, calidis præsertim, & febribus potissimum proueniant, hisce primum cura generatim adhibetur, sicuti in morbis eiusmodi & febribus præcipuè explicatum fuit: Harum scilicet febrium causâ, quas propter linguam tunc adeò affectam *Orune* (vt dictum) vocant, vt in reliquis, sanguinem emittendo; sudores prouocando; per exhibita ad morsaue cordi, hepatis, renibus, refrigerando; putredinem malignitatemque refringendo; viresque conseruando. Imprimis verò linguæ tantopere affectæ causâ, ne si huius inflammatio negligenteretur, ad fauces quoq; se extendens, anginam simul induceret, mortisq; asserret periculum (vnde tam studiosè vt linguæ

potius quàm febris ratio habeatur, cum aliquos inde suffocari vident, vulgus vrgere solet) vena sub lingua, etsi ratione febris iam prius alibi secta fuerit, nisi quid impediât, deriuationis causa aperitur: diuersionesque à superioribus deorsum per cucurbitulas, scarificationes, frictiones, sedulo faciendæ repetendæque: & quæ euaporationes tetras sursum factas reprimunt, caloremque illum immensum extinguunt, non solum febris causâ, sed & huius affectus potissimum, frequentius vsurpanda: quorum exempla in febribus enarratis multa proposuimus. In reliquis causis diuersiones quoque faciendæ, quemadmodum si hæc in febribus eueniant, dictum fuit: sanguinem emittendo retrahendoque. Vti & si gingivæ in dentium dolore inflammentur: sicuti illic ostendetur.

Quod si verò ab inunctione hydrargyri os inflamet, hoc ne fiat, prius antequam vngatur, os sæpè Lacte, Infusculo pingui abluendo, Butyro oleoque Amygdal. dulc. recentibus linguam reliquumque os inungendo, præcaueri debet.

Topica verò, quibus os colluitur, vel quæ in ore retinentur, vel alio modo adhibentur, si simplex sit calor, refrigerare & propter siccitatem quæ simul copulatur, humectare & emollire, si inflammatio adsit vel metuetur, astringere potius & repellere debent: quibus abitergentia, propter limum, qui in ore facillè colligitur, sensim permiscemus: nonnunquam & vim malignam si adsit refrigerantia: indeque ad digèrentia procedimus: & maturantia quoque, si in abscessum vergat.

Quæ calorem & ariditatem linguæ contemperare possunt, in gustus læsione ab hac causa, explicata sunt.

Cum verò in inflammationis principio refrigerare & repellere simul volumus, tunc sequentibus utimur.

Aqua fontis, quæ si frigida sit actu refrigerat, vel putei, cisternæ aut pluuiæ, quæ nonnihil quoq; astringunt: Acetum album vel rubrum vel rosaceum astrictiōis quoque causâ, eâ mensurâ, vt decentem aqua acquirat aciditatē permiscetur, eaque os abluatur. Idem præstabunt aquæ stillatiæ refrigerant-

rantes, Violarum, Nenupharis, Solani, Portulacæ, Lactucæ, atque astringentes, florum vel calicum Rosarum, Plantaginis, Ligustri, Caprifolij, Myrti : & imprimis aqua Prunellæ, quæ adeo efficax in Breune dicto affectu sanando censetur, vt nomen ab eo planta obtinuerit : quæ cum refrigerare volumus, Aceto permixta vsurpatur, per se, vel alijs aquis frigidis miscetur, cum ipsa non adeo refrigeret.

Vel hoc pacto aquis vtimur in collutionibus : R. aquæ Prunellæ ʒ. iij. aquæ Rosarum, Plātaginis, Fragariæ, Portulacæ an. ʒ. ij. Aceti ros. Mellis ros. an. ʒ. j. si tantillum Aluminis vel guttam vnam aut alteram Spiritus Vitreoli addas, potentiùs astringet.

Succi acidi vel austeri fructuum ; vt Mororum, Ribes vel Berberis, Vuarum, Cerasorum, malorum Arantiorum, Limoniorum, Citriorum, herbæque Acetosæ ; Aceto permixti vel soli vsurpati idem præstabunt. Lactucæ quoque succus imprimis utilis censetur. Vel si hæc, cum ingrata minimè sint, sepe mastitentur, aut succi hi lambantur.

Vel si fructus ipsi decoquantur, decoctoq; os colluatur.

Vel si succi prædictarum plantarum, quarum aquæ conueniunt per se aut cum Melle permixti adhibeantur.

Aut syrupi ex hisce succis parati, vel rob, Diamoron imprimis, oris collutionibus permisceatur, aut eclegmatis instar lambantur. Syrupus Violaceus, cum decocto Hordei & Rosarum, in lue venerea inflammationem corrigit.

Aqua quæ ex acido liquore in quo brassicam capitata nostri condire solent & asseruare, Gumpistrey dicto, exstillata, vulgò magno successu vsurpatur. Vel liquor ipse, si glutinosus sit conuassatus. Quibus & alij succi misceri possunt.

Decoctum refrigerans & repellens : R. fol. Viol. Lactucæ, Plantag. Prunellæ, Salicis, Acetosæ, Vitis, Fragariæ recent. an. M. j. fl. Ros. rubr. & Antirrhini mai. Maluæ autum. Hordei integri an. P. j. feminum Cucurb. ʒ. ij. Berberis ʒ. j. Cerasorum acid. sicc. paria x. Prunorum acid. n. vj. fiat decoctio in aqua & Vino acido : adde parum Sacchari vel Mellis ros.

Vtatur hoc modo, aut succis, syrupis aut rob. permixto.

Aliud magis astringens : R. fol. Pilosellæ, Ligustri, Prunellæ, Caprifolij, Plantag. Rubi, Lentisci vel Myrrhi an. M. j. flor. Ros. rubr. & Nymphææ, Hordei. Lentium an. P. j. Prunorum vel Cerasorum, Sorborum vel Carnorum vel Cotoneorum, recentium vel exicc. paria aliquot, fructus Berberis & Ribes, similiter siccatorum vti hæc ad vsum asseruari solent, si eo tempore non recentia habeantur ad ʒ. j. decoquantur in Vino rubro stiptico, & in col. Mens. j. dissolue Mellis ros. ʒ. iij. syrupi Granat. ʒ. ij. misce, fiat oris collutio.

In progressu inflammationis, digerentia permiscenda hoc modo : R. Glycyriæ rasæ ʒ. j. Prunellæ M. ij. Plantag. M. j. Hyssopi M. ʒ. fl. Maluæ autum. Ros. rubr. an. P. j. fl. Saluiæ vel Rosmarini P. ʒ. Lentium, Fabarum an. ʒ. j. feminum Lini & Fœnogr. an. ʒ. ʒ. capul. Glanidium ʒ. vj. Ficuum num. x. Passul. non enucl. P. xx. fiat decoctio in aqua, addendo parum Vini : dissolue in Mens. i. Mellis ʒ. ij. syrup. de Ros. rub. siccis ʒ. j. Diamoron ʒ. ʒ. misce.

Vel hoc pacto : R. Prunellæ M. ij. Senecionis, Cruciatæ, Aquilegiæ, Plantag. Hyssopi, Saluiæ, Capill. Ven. an. M. j. fl. Ros. rub. P. j. Myrrhæ ʒ. ij. Croci parum, Mellis ʒ. ij. decoquatur in aqua, addendo Aluminis parum : Vtatur.

Vel sic ex aquis : R. aquæ Prunellæ ʒ. vj. aquæ Plantag. Rosarum, Saluiæ, Hyssopi an. ʒ. ij. Mellis ros. q. f. Aluminis tantillum, misce.

Priuatim verò in inflammationibus iam in vlcera abeuntibus, ex vsu hydrargyri natis, aliqui Theriacâ cum aqua vitæ & Aceto permixtâ, partes inflammatas inungunt. Vel aquam prius ex illis elicitam adhibent : cui Bolus aliaque similia siccantia miscent : quibus argenti viui venenatam vim infringi credunt. Quo nomine & Guaiaci decocto os ablueri iubent.

Cum ad maturationem tendunt inflammationes : R. rad. Altheæ ʒ. ʒ. Caricarum num. xij. Dactylorum num. vj. Tamarindorum, vel Cassiæ grana recentia cum pulpa num. x. semin. Lini & Fœnogræc. an. ʒ. ʒ.

fl. Maluæ & Chamomil. an. p. j. fiat decoctio in Lacte caprino: dissolue Alumen oui vnius agitatum, Croci parum & Mellis. ad dulcorationem: Utatur.

Foris quoque, si inflammatio non in sola lingua, sed cæteris quoque sit partibus, vel tantum in illis, vel si sub lingua sit, sub mento inunctiones vtiliter fiunt; ab initio ex oleis repellentibus, vt Rosaceo: mox discutientibus, vt Chamomelino, Liliorum.

Et si ad suppurationem vergat sub lingua inflammatio, cataplasmata ex rad. Altheæ, semine Lini & Farinis parata, cum Croco, applicataque dolorem compescunt atque egregie maturant, vel si hæc in Lacte cocta in ore retineantur. Quorum formas, tum eorum quæ abscessus aperiunt, tum aliorum multorum, quibus inflammationes hæc tractari curarique debent, in faucium inflammationibus, quarum remedia quædam hic quoque locum habent, copiosius explicabimus. Quæ & si angina linguæ inflammationi coniuncta sit, vel eam sequatur eo citius sunt vsurpanda.

En, Pustulas, Excoriationes, fissuras, Ulcerum lingua, oris, & c.
In solutionibus continui: pustulis nimirum, excoriationibus, fissuris, vlceribus curandis, si hæc a causa interna profiscantur: illa: primum euacuantibus est auferenda: vel licet aliunde proueniant, si tamen in corpus cacoehymicum aut plethoricum cadant, eo prius repurgato, facilius sanantur. Vel si maligna causa subsit, ea sicuti in lue venerea & elephantiasi & scorbuto explicabitur, primum est exterminanda: quæ si auferri nequeat, ægre vel nunquam hæc inde nata vlcera curari possunt. Quibus omnibus præmissis aut simul vsurpatis, vel illis etiam omisis, si nullam causam quæ illas foueat, habeant, topica alia pustulis, alia fissuris, alia excoriationibus & vlceribus adhibenda.

In pustulis si inflammatio simul adsit, eadem quæ illic dicta sunt remedia, conueniunt: si sine illa fiant, sponte mox disruptæ, vlcusculum post se relinquunt, quod vt aphthæ, sicuti dicetur, sanatur. Si diutius persistant & molestant, ad eas maturandas Fermentum applicatur: vel Amylum cum sapa-

permixtum: cui oleum nonnunquam additur, adhibetur.

In scissuris linguæ si quoque inflammatio adsit, huic potius curandæ intendendum. Si ex ariditate fiat, cura vt in gustu deprauato, qui tunc quoque adest, dictum, instituenda. Si profundæ sint fissuræ, linguam admodum diuidentes doloremque inferentes, siccantibus vti cæteræ exulcerationes sanandæ, addendo interdum propter linguam quæ humida & mollis naturaliter esse vult, lenientia; quæ tamen simul glutinent. Qualia in externis scissuris labiorum & cutis quoque describentur.

Quibus & hoc exempli loco potest adjici: R. Alumin. vlti 3. β. Boli ping. albi vel rubri 3. ij. Mellis ros. & mucilag. gummi Tragach. vel Psylli an. q. s. fiat instar vnguenti: quo lingua fissa sæpe vngatur.

In exulcerationibus reliquis, siue excoriationes tantum sint, siue vlcera in lingua, buccis, palato, siue vlcuscula illa adeo frequentia aphthæ, & gingiuarum vlcera, tam communia quam serpentina, easque corrumpentia, topica admodum exiccantia, ob loci humiditatem, eaque sæpe validissima, adhibenda; quibus detergentia, si vlcera simul sordida sint, carnemque putrem exedentia vel auferentia, si putrescant, permiscenda; Et si inflammatio vlceribus copuletur, frigida repellentia simul addenda: Eaque remedia, tunc ferè adhibenda, quæ in inflammatione oris dicta sunt: cum & hæc astringendo siccant, proindeque multa ex illis et si calor non adsit, hic quoque in vlceribus sanandis conferre possunt: sed & quæ malignitatem vlcerum reprimunt, quandoque si maligna sint, apponuntur.

Quæ remedia diversimodè administrantur: atque os illis vel generatim collui potest, vel masticando imbui, aut suffumigari: vel priuatim hæc vlceribus tantum ferè adhibentur.

Quæ ad os communiter colluendum vel abluendum vsurpantur: licet & saltem in oris sede vbi vlcera sunt, aliquandiu retineri possint, aut vlcera quoque illis fricari, ex varijs fiunt hoc modo.

Ex decocto, siccans & abstergens oris fit collu.

collutio: quod ex plantis varijs austeris, astringentibus, & nitrosis abstergentibus fit: veluti ex folijs Ligustri, Plantaginis, Pilosellæ, Agrimonie, Caudæ equine, Heliæthemii, Cyani maioris, Oleæ, Bellidis, Caprifolij, Virgæ aureæ, Rubi, Milij folis, Geranij Robertiani, Pyri sylvestris, Fagi, Polygoni vel Herniariæ, Ceterach, Myrti, Lætisci, Arbuti: ex radicib. Pentaphyli, Pruni sylu. Cōsolide: cort. Oxychantæ, Granatorum: ex floribus Ros. rubr. Balauft. Cap. glandium, Labruscæ, Oxyacathæ ex Hordeo, Lentib. non ex cort. fructu Cupressi, ex seminib. Myrtillorū, Coriandri: ex baccis Pruni sylu. Sumach: fructu Mororum, Sorborum, & ex Gallis. Quibus, si lentor in ore simul adsit, & putredo, calida quoq; vt Saluia, Serpillum, Origanū, Mentastrum, fol. Lauri, radixq; Ireos adduntur. Atque imprimis in Scorbuto Cochlearia, Nasturtium, Sympbrium. Ex quibus enarratis simplicibus vel pluribus vel paucioribus decoctum ex Aqua, quæ si prius ferrata aut chalybeata sit, etiam astringit, paratur: addendo interdū & Vini, mediam, tertiam, vel quartā partem, nonnunquam & Aceti rubri vel rosacei tantum donec acefcet: & vt gratū magis sit, abstergatque ampliū, Mellis vel Sacchari simplicis vel rosacei: vel syrup. Rosac. Myrtillorum & Diamoron, tantum donec dulcescat: & si potentius illud operari volumus, succos aliquos à dictis plantis expressos vt Granatorum, Acetū, & Salis vel Aluminis, aut Vitreoli eam quantitatem, vnde falsedinem vel nitrositatem aliquam adipiscatur: Vel Bolum etiam, aut lap. Hæmatitis attritum succum elicited.

Aliud decoctum ex terrestribus solis fit, cum admodum ficare volumus: R. Boli Armen. 3. j. Gypsi vsti 3. β. Aluminis 3. ij. Vitreoli 3. j. Vini albi mens. β. coquantur parū & os colluat.

Ex aquis enarratorum simplicium, & imprimis in quibus astrictio aliqua remanet, vt Rosarum florum & calicum, Ligustri, Plantag. Caprifolij, similiaque collutiones hæ sunt, si loco decocti fumantur, in illisq; iam dicta, eo modo vt ostensum, dissoluantur, aut etiam illarum dosi, cum aquæ minū, quàm decocta siccant.

Fiunt & ex aqua destillata aluminosa appellata eiusmodi collutiones, quæ in omnibus oris vlcibus sanādis quibusdam in locis in vsu est, quæ R. Vuarum viciū sylvestrium nondum plenè maturarum ʒ. iij. fol. Portulacæ, Plantag. recentium an. ʒ. ij. Album. ouorum num. vj. Aluminis ʒ. j. ex his contusis inuicemque mixtis, aqua elicitur, eaq; vlcera lauantur vel fricantur.

Efficacior fit, si antequam aqua extrahatur, cort. malorum Granatorum recent. ʒ. j. Vitreoli ʒ. iij. Aceti ʒ. iij. addas.

Priuatim in vlcibus in lue venerea hæc aqua venenatam illorum vim reprimens laudatur: fumendo Theriacam, & cum æquis partibus Aquæ vitæ & Aceti miscendo aquamque eliciendo. Vel hoc gargarismo vtendo: R. aquæ Ros. Plantag. an. ʒ. ij. Aquæ vitæ, Aceti an. ʒ. β. Diamoron Mellis ros. an. ʒ. iij. Theriacæ, Boli vel Terræ Lemniæ an. ʒ. β. misce.

Ex succis fructuum quorundam gratorū & copiosum succū reddentium potius quàm herbarum, cum ingrati illorum sint succi, hoc modo vsurpati, collutiones sunt hæ aliquando, maximeque absterfionis causā, vt succo vel vino dicto Granatorum, vel Vino ex vuis facto, rubro vel austero; vel etiam Aceto, & præsertim rosaceo, & si admodum abstergere velimus Scyllitico, per se, aquæve prius nonnihil temperatis: quibus vlcera abluta adeo expurgantur, vt veluti excocta post illorum vsum esse videantur. Quo nomine, & vt siccantia postea melius agant, hisce os prius interdum colluitur. Sed & Cytoniorum succus, cum siccandum, in ore retineri potest.

Quædam commansa seu masticata, vires suas in ore exerunt, vlceraq; sanant: vt sunt Fructus esui apti, austeritatem aliquam præsertim ante perfectam maturitatem habentes: imprimis Mora, Corna, Cytonia, Mespila, similiaque: minusq; grata sed efficacia tamen folia Ligustri, quæ comesta aphtas sanant. Qua ratione & aliæ multæ plantæ in decoctis explicandæ; mansæ proderunt.

Fumi fuliginosi, quales in narium vlcibus conferre diximus, ore excepti, siccando quoque proderunt. Illique qui ex suscit

hydrargyri sunt, et si inde vlcera nata sint, in os tamen obiter intromissi, eadem curant.

Quæ priuatim vlceribus tantum ferè adhibentur, & quibus ea tantum vel illinimus, vel aspergimus, aut etiam vt putredo simul auferatur, fricamus, adeoq; sæpè vt sanguis exeat, vel si validissima sint, bombace aut linteo obuoluto exceptis, solum tangimus: sunt sequentia.

Ex Melle rosaceo & Alumine crudo vstro ve mixtura, à chirurgis plerumq; ad vlcera abstergenda, os inungi solet.

Ex succis prædictorum fructuum vel herbarum, Melle permixtis vel inspissatis coctione, idem fieri potest: Suntque præsertim in vsu succi ex moris & vuis acerbis cocti, Diamoron & Omphacium dictum: quæ adhibita, vlcera hæc sanant: & cum simul abstergere volumus, Alumen aut Vitreolum album addimus.

Ex plantis, ficcis aliisve comminutis vel vstis, pulueres facti, per se, vel etiam Melle, Omphacio, Diamoro excepti, vlceribus, vti dictum, adhibentur.

Siccans pulvis sic paratur: R. sem. Myrtillorum, fol. Lauri, Cornu cerui vel Eboris vsti vel Spodij an. 3. β. Coralli vsti 3. j. fiat pulvis.

Alter magis efficax: R. Gallarum, cort. Granat. an. 3. j. ofsium Dactylorum, capul. Glandium vstorum, rad. Cyperi an. 3. β. Ros. rub. 3. j. misce.

Validior adhuc tertius sic fit: R. Acaciæ, Hypocist. an. 3. j. Vitreoli albi 3. β. Salis gemmæ 3. j. rad. Angelicæ 3. β. fiat pulvis.

Abstergens simul, qui in vlceribus sordidis qualia gingiuarum ferè sunt, sic paratur: R. Pumicis 3. ij. cineris testarum Cancrorū & Cochlearum vstarum an. 3. j. Tuthiæ præpar. Aluminis, Tarrari an. 3. β. rad. Ireos 3. ij. fiat pulvis.

Alter pulvis bryoniæ nominatus, in cancro dicto gingiuarum vsurpari solitus & excellens: R. Tuthiæ præpar. cum aqua Rosar. 3. ij. gummi Arab. Tragach. torrefacti an. 3. j. Sarcocollæ, Thuris, Masticis an. 3. β. rad. Ireos, cineris. Calamenti vsti an. 3. β. fiat pulvis subtilissimus, qui succo Bryoniæ permiscetur, donec in pulvem veluti subigatur;

dein in calore solis vel fumi exiccetur, rursumq; puluerifetur succoq; eodem irroretur & exiccetur: qd' vbi quinquies factū fuerit, Puluere hoc solo vel prius Melle excepto, gingiuae putrescentes fricentur, adeo sæpè tum in hoc tum alijs affricando, tamque diu, donec putri hac materiâ abrasa, sanguis prodeat.

Vnguentum Ægyptiacum putridis & serpentibus oris & gingiuarum vlceribus, illorum loco aliquando inungitur.

Cum gingiuae consumi incipiunt, isto vtimur: R. rad. Consolidæ, cort. Granat. an. 3. j. Thuris, Myrrhæ an. 3. β. Chalcitidis vstæ 3. j. Vitreoli albi 3. β. fiat pulvis.

Ex liquoribus validis & erodentibus parantur remedia, quibus vlcera pertinacia tacta, vel si lata sint etiam fricata, sanantur: post quorum vsum, ne quid in faucibus hæreat, os vino liquoréve alio abluimus, sunt sequentia.

Atramentum scriptorium licet denigret, adhibitum egregie ea siccatur: quod validius, si æruginem Æris illi addas, operabitur.

Aqua sequens viridis appellata, si vlcera ea fricentur maximi est vsus. R. Æruginis æris 3. j. Auripigmenti 3. j. β. terantur subtilissimè & coquantur in Vini albi 3. iij. ad consumpt. mediæ partis, vbi refrigerit adde aquæ Ros. & Solani 3. j. β.

Quæ & hoc modo paratur: R. Æruginis æris, Auripigmenti, Nitri, Aluminis an. 3. j. (Addunt & Gallas aliqui, sed denigrant) coquantur in aquis Ros. Plantag. ad 3. iij.

Decoctum sublimati simplex. Quod fit si 3. j. illius in aqua comm. ros. vel plantag. coquatur, si eo vlcera leuiter madesiant, idem facit. Quod mitius fiet si 3. j. illius aquæ, solani, vel alt. 3. ij. diluatur.

Vel hoc, quod R. Sublimati 3. iij. Minij 3. j. β. æruginis Æris, Vitreoli an. 3. β. Aluminis vst. 3. j. Bol. Arm. 3. ij. Vini albi 3. x. aquæ Ros. 3. ij. coquatur ad consumpt. aliquam: Vtatur.

Aquâ forti appellatâ, vel eâ quæ ex Chalcantho elicitur, parum dilutis, vti narium vlcera tacta, sic & aphtæ, si illis leuiter madesiant, vel etiam alia vlcera sordida, curantur.

Cauteria potentialia ex calce & facce vini parata, ita adhibita vt vlcera tantum tangant,

nec vllibi alias partes inficiant, quod arte fieri potest, in quibusdam locis, idem faciunt. Sed certius est actuale cauterium, si subito vratur pars, hinc enim escharâ factâ, si ea auferatur, vlcus sanabitur.

~~~~~

## DE DENTIVM D O L O R E.

### CAPVT IIX.

#### Genera.



**D**OLORES qui in dentium regione occurrunt, cum sic appellantur, nos hoc nomine quoque eos significamus: qui primum in eo, quod vel verò dolore exeruciant: vel molestiam saltem quandam pariunt, distinguere possunt.

*Dolor in dentiu.*

Verus dolor circa regionem vnius dentis; vel etiam plurium rarius anteriorum sed plerumque lateralium, in vno vt plurimum latere, alias vtroque; & nunc in superiore, nunc inferiore maxillâ, rarius in vtraque occurrit: Dentiumque propriè dolor dicitur, frequens admodum & grauis.

*Dolor in dentio-  
ne in-  
sa. tiom.*

Infantibus, cum dentes molares illis prodire incipiunt; sæpè superueniens: quem ploratu & inquierudine exprimunt. Cognosciturque, quod illic in latere loci affecti, malæ rubent & calent, atque è gingiuis tumidis dehiscen- tibus dentes se manifestant. Fabriculaque, calore alijsq; indicijs se prodens, comes plerumq; est. Nonnunquam & conuulsiones, non tamen adeò periculosæ, vt si alijs de causis fiant, sequuntur.

Sed & postmodum omni ætati dentium dolor accidere solet, vt vix aliquis ab eo immunis euadat, præsertimque hi quibus dentes caui, fracti vel alioquin vitiati sunt, huic subiecti sunt. Qui atrox sæpè, nunc per seuerans aliquamdiu, nunc per vices affligens. Distentione ferè, & cum pulsationis sensu aliquando, quem in dente ipso dolente se sentire putant, se prodens. Gingiuis eo loco interdum tunc plus iusto calentibus, rubentibus, sæpeque etiam tumentibus, vnâ cum vicina buccarum regione, quæ frequenter in tumorem quoque attollitur,

dolorque tunc dentium remittit, aliquando verò, abscessu intrinsecus circa radicem gingiuarum genito, inualefcit, eoque rupto statim cessat, purulentaque materia, quæ nonnunquam putris & foetida est, expuitur: atque interdum vlcus illic aliquandiu permanet, alias quoque sinuosum factum, maxillam inferiorem penetrans, ad exteriora se aperit, illicque aqueam purulentamque materiam diu sæpè profundit.

Fit quoq; vt hisce minimè apparentibus, dolor grauis dentium sedem diuexet, qualis à frigore in manibus circa radicem vnguû vehemens quandoque sentiri solet. In quo & multum expuunt ægri, & si dentes caui sint, ex illis auram frigidam prodeuntem linguâ admotâ, sibi videntur sentire.

Ad dentium dolorem & ille referri potest, qui cum dentes vi euelluntur euenit, in alijs tolerabilior, in alijs vehementior, sed qui euulso dente plerumq; mox remittit: nisi forte illo sede sua dûtaxat moto, aut per instrumentum tractorium confRACTO, aut portione tantum illius ablata, cum adhuc impedimentum hæreat, dolor qui ob hanc vim vel primum obortus est, vel prius, ob dolorem dentium, cuius causâ dens extrahi debebat, iam adfuit, & de nouo hoc impetu irritatur, perseueret augeaturve.

*Dolor euulso dente.*

Molestia potius quàm dolor in dentibus tantum inter masticandum sentiri videtur, in affectu quem Hæmodiam vocant, & stuporem dentium esse existimant: quem exprimere non aliter possumus, quàm quod cum inter mordendum dentes premuntur, titillatio quædâ molesta suboritur, & quod cum longiores cæteris esse tunc videantur, eo nomine magis premi inter mordendum existimeretur.

*Hæmodia.*

#### Causæ.

**E**Am partem in dentium dolore affici necesse est, doloremque sentire, quæ sensu tactus prædita est, eoque exquisitissime, quando dentium dolor, vtî sæpè fit, est acerbissimus. Verum dentes non solum exacto hoc, sed & omni sensu destitui, alibi ostendimus; hæcque præsertim agunt, quod toti

*Pars affe-  
secta.*

sint ossei cæterisque ossibus duriores, nec perioestio, vti cætera ossa, obducuntur, nervusque corpus illorum nullibi subeat. Ob quam causam non dens, sed pars alia sensilis, & quæ denti propinqua atque contigua est, cum dentes dolere videntur, patitur: fitque huius vicinitatis & contactus cum dente causâ, ut in ipso dente tunc dolor esse existimeretur. Hæc autem pars frequenter est membrana, alveolos quibus dentium radices infixi sunt, succingens, dentiumque radices proximè ambiens, ad quam nervorum ad maxillam utramque delatorum fibellæ dispersæ dilatataeque sensum exactum illum conferunt, quâ affectâ, dolor non tam in profundo, quam ac si in ipso dente esset, per sentitur.

Sed & gingivæ ipsisque subiecta maxillæ perioestia, si ex graui offensa dolorem patiantur, eum dentibus vicinitatis nomine communicare quoque videntur.

Affectus autem quibus hæ partes affectæ hunc circa dentium regionem apparentem dolorem efficiunt, sunt vel intemperies calida; vel frigida; aut irritatio; vel continui solutio.

*Calida  
intemperies  
&  
Inflam-  
matio,  
causa  
Dentium  
doloris.*

Calida intemperies cum influxu sanguinis, accedente sæpè inflammatione, membranas hæc afficiens, non solum quod illæ tunc accensæ distentæ sint, sed & quod tumefactæ, in loco arcto, à dente duro ipsis infixo nunc præmantur, dolorem eo modo, vti dictum, dentium existimatum & vocatum parit, eumque distendentem & pulsanter, cum & pulsatio, quæ tamen in subiectis sit membranae arterioli, à quibus dens pulsatur, sentiantur tam aperte, ut & Galenus pulsationem hanc vti & inflammationem in dente ipso fieri, (quod tamen in osse tam solido quod nec venas nec arterias admittit, ut inflammetur aut pulset fieri nequit) crediderit, atque in seipso se expertum esse scripserit. Ceterum accidit quoque, ut si hic sanguinis influxus simul in gingivas perioestiaque illic substrata feratur: quod vel mox in principio, vel postmodum, perseverante dolore, novamque fluxionem concitante, fit, dolorem augeri, eoque amplius, si abscessus illic gignatur, donec illo rupto vlcus genitum, pus intus, sæpè & foris, vti dictum est, profundat.

Huius autem influxus causa non alia, quam illa quæ alias quoque sanguinis fluxiones concitare solet, existit: Illius nimium plethora & caliditas, vel dolor alius prægressus ab alijs causis, hunc influxum concitans, doloremque geminans: Vel causæ aliæ externæ hunc commouentes.

Frigida intemperies inimicâ suâ nervoso & membranoso generi qualitate, hæc circa dentium sedem partes afficiens, dolorem parit, ob vicinitatem, vti dictum, dentium etiam appellatû: Acerbum quoque, adeoque frequentem, ut non immerito frigidum dentibus inimicum esse, vulgò dici soleat.

*Frigida  
intemperies,  
causa  
Dentium  
doloris.*

Quod à causis externis; aëre, assumptis, potuque imprimis frigido, dentes subito affatimque refrigerantibus, adeo ut ipsorum frigiditatem membranae vicinæ etiam sentiant, fieri solet: eoque citius, si dente non integro, sed cauo aut fracto, frigiditas mox membranas tangat: unde & dentibus vitiosis existentibus frequentius dolor commouetur, dentium quoque putatus, cum tamen illo vitio adeo sint corrupti, ut non amplius viua, sed mortua sint corpora, quæ tunc sentire, nemo possit dicere.

Quod eadem ratione à defluxione frigida pituitosi humoris, non in dentem, qui eam admittere non potest, sed subiectas membranas factâ, contingit, dentiumque dolor nullis apparentibus caloris, sed frigoris potius, ac si status frigidus, vti dictum, è dente cauo efflaretur, indicijs, nascitur; nisi dolor hic sanguinis influxum quoque, vti sæpè fit, moueat, tunc enim calor, tumor, abscessus, ut prius dictum, subsequi quoque possunt.

Irritatio membranae huius nervosæ summeque sensilis, molestiam eam quoque parit, quam dentium dolorem vocant.

*Irritatio,  
causa  
Dentium  
doloris.*

Quæ illi à dente proprio, cum illius contracti tantum quædam remanet portio, aut situs peruertitur, aut alioquin ille fit inutilis, evenit: tunc enim tanquam corpus alienum membranam inter manducandum premens, afficit, & quò minus in latere affecto cibum masticare possint, impedit.

Quod & ab alijs in dentem cautum perforatumque dum repurgantur, immixtis: vel etiam à cibo solidiore inter masticandum in-  
in-ru-

intruso, cum contactum hæc membrana alieni corporis ferre nequeat, contingit.

Sed etsi adhuc integris dentibus existentibus, vis talis inferatur, ut non decenti modo impellantur, præsertimque cum dolent: vel si interstitijs ipsorum, aliquid vi intermassicandum impressum, pertinaciter inhæreat, quia tunc dentibus ab inuicem ad latera detrusis, radices membranas ipsis adnatas coarctant, molestia quoque inde nascitur: unde cum aliquid in dentium cavitatibus aut interstitijs hæret, in illis repurgandis adeo sunt occupati.

*Asperitas  
raden-  
tium causa  
Flamma  
dicitur.*

Cæterum dentium causâ, non solum hac ratione cum vitiatum sunt, vel stricti, aut aliter impulsivi, membranae hæ irritantur, sed & quando dentes adeo exasperantur, ut læuitatem dicentem amittant, tunc asperitatem & inæqualitatem hanc quoque membranae perferentes, molestiam quandam quotiescunque dentes masticando impelluntur, premunturque, ac si alieni quid membranis infixum esset, qualem in hæmodia accidere diximus, patiuntur: accedente præsertim stupore aliquo tunc quoque harum membranarum (sicuti in stupore in tactus læsione diximus) quem à frigiditate eorum quæ dentes exasperant, per contactum veluti simul concipiunt, adeo ut dentes tunc, quorum causâ hoc membranis accidit, stupere (quod tamen cum non sentiant, fieri nequit) existiment. Quæ exasperatio frigiditasque, dentibus, & per consequens membranis, ab esu fructuum quorundam, nonnunquam etiam ab humore simili eo defluxo, vel potius vomitione per os reddito, euenit: si acida & austera simul ferè sint, cum non solum hæc potenter asstringendo exasperent, sed & aciditate (quæ nervoso generi ossibusque inimica est) penetrantia, dentes & vicinas illis membranas, uti dictum, afficiant. Idque eò citius, si dentes molliores adhuc, nec vetustate penitus indurati existant: unde & iunioribus hoc frequentius quam senioribus solet accidere.

A defluxione, tenuis, acris vel salis, serosi pituitosive humoris irritatae hæ membranae potius quam refrigeratae (de qua refrigera-

tione iam dictum) dolor dentium dictus molestus, etiam inducitur: Illis consuetus, qui hisce excrementis & proin defluxionibus obnoxij sunt: Et in quibus eò potius quam aliò defluxio, ob viarum eo pertinentium laxitatem aut imbecillitatem loci, quæ dentium vitiatorum causâ præsertim accidit, fertur, aut alioquin allicitur: Quibus & humor defluens ex ore copiosus simul plerumque emanat expuiturque, & ad nares quoque delatus, per illas exstillat.

Solutio continui manifesta in hisce sedibus facta, dolorem dentibus adscriptum parit. Si dente à subiecta membrana adnatisque gingivis per vim auulso, vel penitus extracto, dolor suboritur: qui eò maior, si distantem radicem, qualem maiores dentes habere solent, habeat: eaq; maxillæ, sicuti aliquando fit, aliqua ex parte penitus connata sit, adeo, ut maxillæ portio illi adhærens simul cum dente interdum euellatur, unde & maxilla per hanc violentiam tracta laborat, admodumque patitur, inde & graviora interdum sequuntur accidentia. Quod facile accidere posse, si canini dentes, quos quia oculos spectant, oculares vocant, extrahantur, vulgus chirurgorum credit.

*Solutio  
continui  
causa  
Doloris  
dentium.*

Sed & dentes, maiores præsertim, gingivisque; obtesti, adhuc in infantibus dum crescendo gingivas perforant, easque diuellunt distenduntque, dolorem illum qui illis eo tempore peculiaris est, infantesque admodum afficit, procreant. Qui dolor etsi gingivarum causâ tantum accidat, nihilominus dentium quoque dolor dicitur: uti & alij dolores ex solutionibus iam dictis facti, in quibus tamen partes enarratae sensiles potius quam dentes patiuntur.

#### *Curatio.*

**P**RO causæ diuersitate instituenda: quatenus ea procedit vel à defluxione humoris sanguinei, aut alterius excrementitij: vel ab intemperie frigida: vel irritatione profecta à dentibus vitiosis, vel alioquin impulsis aut exasperatis: aut soluta continuitate, cum gingivæ perforantur aut dentes euelluntur.

Si ab influxu humoris sanguinei aut se-

*Dentium  
doloris  
ab intem-  
perie ca-  
lida, fri-  
gida ob  
influxu  
sanguinis  
pituitae  
ve, cura.*

rosi vel pituitosi, dolor dentium oboriatur. Tunc causa defluxionem mouens, si adhuc agat, tollenda: humor defluens, ne in partem feratur, aliò ducendus, repellendus, defluxus absumendus: & intemperies quæ inde nata est, corrigenda: dolorque interim sedandus. Quod sequentibus fiet prædijis.

Venæsectio, si à sanguinis influxu dolor fiat, capitisq; præsertim dolor eum comite-  
tur, à principio facta eum reuellit.

Scarificatio & cucurbitularum applicatio, in collo, scapulis, humeris facta, in quacunq; defluxione, eam deriuat. Quibus & certo tempore factis, dentium dolorem præcauere vulgus solet: & ad eum tollendum, priuatim scarificationem in carpo, aut manus externâ sede inter pollicem & indicem, eo latere vbi dolor est, instituunt.

Vesicatorijs & cauterijs vti alias defluxiones, sic & has, si sæpè superueniant, auertimus. Et vesicatoria quoque carpo & manus sedi dictæ, priuatim huius doloris causâ adhibemus. Quod & bulbus Allij contusus, supra dictas partes ligatus, facit.

Frictiones & ligaturæ reuulsionis & deriuationis causâ, locum hîc quoque, vt in cæteris defluxionibus, habent.

Per nares caput expurgantia, in pituitosorum seroforumq; humorum defluxione, admodum à loco affecto eos diuertunt. Quod per frequentem emunctionem fieri, quæ & plurimum iuuat, potest. Vel errhinis naribus immixtis præstabitur. Inter quæ succus Anagallidis, & Calendulæ priuatim in dentium dolore iuuare creditur.

Per os pituitam educantia hoc idem præstant: quæ cum in ore continèantur, & proin topica simul sint remedia, mox inter ea explicabuntur. Quæ particulares tamen per os & nares factæ euacuationes, si humoris magna sit copia, eaque adhuc in fluxu sit, ne humorè magis ad partem affectam præcipitèt, quam deriuent, rectius generali purgatione prius præmissa, administrabuntur.

Per aluum, in humorum illorum redundantia, varijs purgantibus exhibitis iniectionisque quoque purgatio instituitur. Iisdem remedijs, quæ & in cæteris eiusmodi defluxionibus conueniunt.

Temporibus, ea quæ fluxiones sistunt, à quocunq; humore fiant, ne ad dentes ferantur, applicantur. Ea quoque remedia vsurpando, quæ in oculorum fluxionibus illas impedire diximus: præsertimque emplastra, quæ rectius retinentur, vt illic dictû, in fouea, quæ media est inter frontē & tempora, è regione sedis laborantis collocando, & dies noctesque gessando: quæ adeò illic humorem fluentem interdum retinent, vt dolor in subiecta maxilla cesset, in temporû verò dicta regione suboriatur.

Dentium regioni, si defluxio calida sit, ab initio dum adhuc fluit, ea quæ astringendo citra calorem eam repellunt, postquam verò fluere desijt, quæ calore aliquo discutiunt & absumunt: in frigida verò defluxione, calida ab initio repellentibus permixta, postea etiam calidissima sola, adhibentur: dolorem sedantibus, si ille intensus sit, in omnibus causis semper additis. Quæ diuersâ formâ, nunc in oris sede vbi dentes dolent, vel retinentur, vel alijs modis dentibus apponuntur, aut etiam si caui sint imponuntur: aut dentes ipsi suffumigantur: Ex sequentibus parantur.

Cum astringere præcipue volumus defluxionemque sic cohibere, decocta in ore tepida retinenda sic parantur. Ex selectioribus simplicibus solis factis, probatur imprimis decoctum Tormentillæ, item Verbenæ, in Vino facta, & corticis interioris Frangulæ.

Vel compositû ex paucioribus pluribusq; sequentibus decoctum: R. rad. Tormentill. Pentaphyli, Bistortæ, Tapfi barbati an. 3.ß. rad. Cyperi 3.ij. cort. Buxi vel Mori, Capparorû an. 3.ß. fol. Hederæ, Verbenæ, Plantag. an. M. j. fl. Balauft. Ros. rubr. an. P. j. nucû Cupressi, Gallarum, capul. Glandium an. 3.ij. seminis Coriandri, Myrti, Santali rub. an. 3. j. coquatur in Vino rub. stiptico, addito si magis astringere volumus etiam Aceto.

Aqua Rosarum astrictionis causâ similiter conuenit: cui & aqua Plantaginis miscetur. Vinumq; interdum rubrum, vel etiam Acetum.

Aqua Tapfi barbati efficax à quibusdam esse censetur.



Stipticum admodū decoctum fit hoc pacto: R. scoriz Ferri 3.j. Vitreoli 3.j. coquantur in Vino & Aceto.

Defluxione iam factā, addūtur calida quedam hoc modo: R. rad. Pentaphyli vel Tormentillæ 3.j. rad. Pyrethri 3.β. rad. Cyperi 3.ij. fol. Hederae, Saluiz, Hyfopi an. M.j. fl. Ros. rub. Lentium an. P.j. seminis Papau. albi 3.ij. Piperis longi 3.j. coquantur in Vino.

Vel sic: R. Saluiz, Hyfopi, Verbenz an. M.j. coquantur in Vini tñ. adde Aluminis 3.ij.

Vel: R. Gallarum, rad. Bistortæ an. 3.ij. radic. Ireos 3.j. Hyfopi M.j. Thuris, Sandaracæ an. 3.ij. bacc. Iuniperi 3.j. coquantur in Vino rubro.

Aut: R. Mastichæ 3.j. Saluiz, Hyfopi an. M.j. coquantur in Aceto & Vino, partibus æqualibus.

Vel pulvis hic vsurpatur: R. rad. Bistortæ 3.j. Aluminis & rad. Pyrethri an. 3.j. fiat pulvis: Applicetur vel affricetur.

Cum calefacere potissimū volumus, decocta sequentia in ore retēta iuuabunt. Ea q; actu eousque calida, vt saltem non vrant: ob quam & causam cum citò calor remittat, bis tēre expui, repetiq; debent.

Pyrethri radice vel Piperis, vel Zingiberis, decocta in Vino, vulgus sic vsurpare solet: quæ & simul decoqui in hunc vsū possunt.

Aliud: R. herb. Calamentæ, Origan, Pulegij, Hyfopi, Saluiz an. M.j. Maioranæ, fol. Laurian. M.β. baccarum Iuniperi P.β. decoquantur in Vino.

Vel sic, quod sæpè profuit: R. Serpilli, Saluiz, Rosmarini an. M.j. Zingib. 3.j. seminis Carui 3.β. Cicerum rubr. Salis an. P.j. decoquantur in Vino albo.

Vel compositum, hoc modo: R. rad. Pyrethri 3.β. radic. Angelicæ, Imperatoriz, Ireos an. 3.ij. (posset & Allium & Raphanus addi, si ea non fastidirent) herb. Hyfopi, Satureiz, Saluiz, Maioranæ, Pulegij, Serpilli, fl. Rosmarini, Ros. rub. an. 3.j. vel manipulum si recentia sint, Piperis longi & nigri, Cubeb. gr. Paradisi, Gariophyl. seminum Sinapis, Nigellæ, Staphis agr. an. 3.β. Salis communis vel niri 3.ij. conqassentur, & affuso Vino parū coquantur: vel in infusione stent aliquandiu, & colatura vsurpetur.

Colocynthis decoctum in Vino factū, amarum admodum, sed valde efficax est.

Aqua Saluiz, Rosmarini in Vino destillata & adhibita, vtilis.

Aqua Vitæ seu spiritus Vini, vel baccarum Iuniperi, admota, citò & valde operantur.

Vel quæ sic composita & grata simul fit: R. Piperis, Zingiberis, gr. Paradisi ana 3.j. Gariophyl. 3.ij. Cinamom. 3.β. affundatur Aqua vitæ, donec in pultem redigatur, maceretur vel destilletur ad vsū.

Vel hoc modo: R. rad. Pyrethri, Piperis longi & nigri an. 3.ij. seminis Sinapis, Nasturtij, & Nigellæ an. 3.j. puluerisentur, & affusâ Aquâ vitæ, ad vsū, vti de priore dictum, paretur.

Vel ex simplicibus in decocto precedenti composito calido expositis, aridis, puluerisatis, talis cum Aqua vitæ fiat infusio, vel exstillatio.

Oleum baccarum Iuniperi vel Spicæ, vel Aromatum, destillatum, si bōbace excepta dentibus imponantur, efficaciter operantur.

Sacculi interdum vsurpantur dentibus impositi vel interpositi, ita vt à dente dolente mordeantur: qui sic sunt: R. Saluiz folia aliquot, pistentur; addendo parū Salis & Piperis, impleatur sacculus.

Vel sic: R. rad. Pyrethri, Piperis, seminis Sinapis, Salis an. æquas partes: puluerisentur, imponantur in sacculum, qui madesiat Aceto calido.

Vel sic: R. rad. Pyrethri, Piperis longi, seminis Staphis agr. an. æqu. part. fiat pulvis, qui sacculo exceptus, irroratus aquâ Vitæ, adhibeatur.

Quæ fauces inflammant, quandoque adhibentur: vt cort. Laureolæ, detractâ prius externâ membranâ duriore. Item radix Tithymali & Ranunculi, teste Dioscoride: quæ ne fauces vrant, denti dolenti supponuntur illicq; morsu retinetur, ita ne partes vicinas admodum tangant. In Aceto decocta mitiora sunt, aliterque tunc quoque vsurpari possunt.

Hoc pacto & sequens decoctum ore teneatur: quod ex radic. Sigilli Salom. & Hellebori albi, & cort. Laureolæ in Vino & Aceto decoctis fit.

Quæ anodyna sunt, in omni causa, cum defluxio præsertim substitit, & quæ proprietate quadam potissimum operatur, sequentia usurpari possunt.

Lactepidum, Butyrum, oleum commune recens. vel Amygdalinum ore contenta vel apposita.

Panis masticatus, atque ita cataplasmatibus instar dentes & buccas retentus.

Iuscula tepida, & Pulvis.

Decoctum radic. Altheæ, Panis, seminis Lini, in lacte.

Aliud pituitam quoque eliciens: R. radic. Altheæ, Liquirit. ana ʒ. j. Salviæ m. j. Ficum ping. numero xij. seminis Fœnogr. ʒ. j. decoquantur in Aqua.

Guaiaci decoctum laudatur: cui Sal interdu permiscetur.

Fermentum cum Aceto subactum, applicitum, iuuat: vel decoctum quoque illius, buccis retentum.

Conuenit admodum & sequens: R. gummi Sandaracæ seu vernicis scribarum ʒ. ʒ. Vini vel Aceti, vel vtriusque ʒ. iij. vel vj. coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & teneat in ore. Vel dissoluatur Sandaraca in Aceto, & adhibeatur.

Gummi Galbanum, Ammoniacum, Serapinum, emollita per se, vel cum Aqua vitæ aut Aceto, cauis dentium imposita, vel supra linteolum extensa, & dentibus emplastri instar apposita, doloribus dentium medentur.

Plurimum & hoc conducit: R. Camphoræ ʒ. ʒ. Aquæ vitæ ʒ. j. coquantur donec camphora dissoluatur, denticule adhibeatur. Vel cum Aqua vitæ aliqua composita permisceatur. Vel addito Vino vel Aceto, denuò parum bulliat, & sic usurpetur.

Confert & Camphora cum oleo stillatio Gariophyl. vel expresso ex Amygdalis, dissoluta. Vel oleum Camphoratum arte elicium, adhibita.

Exuuiæ seu senecta Serpentis, cocta in Vino vel Aceto: Vel exiccata in furno aut combusta puluerisata & cum Oleo mixta, donec vnguenti instar dentibus inungi possit, laudatur.

Rastinacæ piscis caudæ aculeus, si denticulis adhibeatur, illorum dolorem com-

pescere, scribit experientiss. Dioscorides.

Stupefacientia, dolore urgente, nonnunquam adhibentur, cauendo ne si validissima sint, deglurantur.

Opiatas antidotos, recentes præsertim, vt Philonium Rôm. Theriacam, Mithridatum aliàsve vsitatas, vel de nouo paratas, dentibus affricamus, vel alioquin apponimus aut imponimus. Quibus ʒ. j. pondere interdum vt spissiores fiant, rad. Pyrethri, & seminis Nigellæ ʒ. j. puluerem addimus, & gr. j. Opij, vt vires opiatarum augeantur.

Opij solius emolliti manu pilula vna denti intrusa, dolorē mox tollit: cui ne diffluat, Cera momentum prius, dum manibus subigitur, permisceri potest.

Vel sic magno cum successu usurpari: R. Opij, seminis Hyosc. an. gr. iij. seminis Paludapij gr. ij. cum aqua Vitæ, fiant pilulæ.

Vel hoc pacto: R. Camphoræ ʒ. j. coquantur in ʒ. j. Aquæ vitæ donec dissoluatur: in fine adde Opij gr. iij. vel iij. dilueque, & bombacis pilulam in eo madefactam, intrude in dentem.

Alia narcotica fiunt ex Hyoscyami seminis, Piperis, rad. Pyrethri & Aluminis (aliàs vsti) æquis partibus, cum aqua Vitæ in massula redactis: Quæ applicatur vel imponitur.

Vel sic: R. seminis Hyoscyami ʒ. ʒ. radic. Pyrethri, Zingib. an. ʒ. ij. semin. Apij ʒ. j. Mastichæ ʒ. iij. Ros. p. j. bulliant in Vino vel Aceto pro collutione.

Vel: R. radic. Mandragoræ ʒ. j. seminis Hyoscyami ʒ. ʒ. Piperis, Cubeb. sem. Staphisagriæ an. ʒ. j. rad. Pyrethri ʒ. ij. cort. rad. Mori vel Cappar. ʒ. iij. coquantur in Vini rubri Mensur. ʒ. ad consumptionem tertiæ partis: Utatur vt prius.

Vel: R. rad. Hyoscyami ʒ. j. Vini albi lb. ʒ. coquantur, & vtatur.

Oleum ex semine Hyoscyami expressum, impositum denti cauo, prodest.

Suffritus per infundibulum in os ad dentes dolentes admissi conueniunt. Qui ex Absynthio & Satureia similibusque calidis, in Vino & Aqua decoctis parantur: vaporque dum adhuc decoctum feruet, excipitur: cui decocto si semen Porri addas, efficacius erit.

Fumus exiccatus à Sandaracha carbonibus igni-

ignitis iniecta, idem præstat. Vel si à semine Porri & Cæparum vitis fumū excipiat: quibus puluerisatis, vt spissior sit fumus, Cera vel Pix quandoq; permiscuntur. Hyosciami seminis vsti fumus imprimis ad dolorem sedandum probatur.

Malæ regioni extrinsecus loco dolenti correspondenti quædā apposita, dolorem compescunt.

Emplastrum anodynum: R. medullæ Panis & pulpæ pomorum an. ʒ. iij. coquantur in Lacte, adde farinæ seminis Lini, ol. Ros. vel Chamom. an. ʒ. j. Croci ʒ. j. cōtundantur.

Theriaca, vel aliæ Opiatę emplastri instar quoque supra genam applicata, iuuant.

Aliud cum successu expertum: R. Albumen oui: quod cum aqua Rosarum cōquassetur, & supra stuppam cannabæa extensum effundatur, aspergēdo primum Piperis puluerisati, atque parti dolenti ita applicetur, vt totam malæ sedem comprehendat.

Vel sic: R. Vitellum oui, & cum Aqua vitæ distempera, addendo parū croci, applicetur, & resoluēt tumorem. Possunt & farinae addi.

In causa calida præsertim vtile: R. succorum Solani, Semperuiui an. ʒ. ij. aquæ Ros. Lactis an. ʒ. j. β. ol. Ros. Omph. ʒ. j. agitētur, pānusq; lineus in eo madefactus applicetur.

In causa potissimum frigida hoc pacto: R. bulborum Cæparum ascorum sub cineribus ʒ. iij. ol. Anethini, Chamom. an. ʒ. j. far. seminis Fœnogr. ʒ. j. β. fiat emplastrum.

Vel hoc: R. rad. Liliorum ʒ. iij. Maluæ M. j. flor. Chamom. Meliloti, Anethi an. p. j. seminis Fœnogr. Lini an. ʒ. β. seminis Caulium ʒ. ij. nucleorum Persicorum vel Amygd. an. ʒ. j. decoquantur in Vino: foueatur mandibulæ pars exterior. Et residua decocti contundantur, atque oleo Anethino & Chamomel. additis, fiat cataplasma.

Sacculi item posunt foris adhibiti, ex Milio vel Panico, Absynthio, flor. Chamomil. Anethi & Sale.

In aurem è directo partis affectæ immissa quædam, dolores dentium quoque compescunt: vt succi Allij, Rutæ, Hederæ & Asphodeli radicum.

Olea item aliqua calida: vt Rutaceum,

Laurinum, Costinum, Lumbricorum: quibus Castoreum incoctum, ea efficaciora facit. Efficacissima sunt olea stillatitia calida.

Vel si Hederæ grana quinque cum ol. Ros. fac. in cort. Granatorum effervescent, & instilletur: teste Dioscoride.

Allij bulbus detracto cortice in formam suppositorij scissus, & in aurem partis dolentis intrusus, mirè iuuat.

Inter amuleta, Lepidij radicem collo suspensam, dentium dolorē tollere, docet Diosc.

Si tumor in genæ regione, vbi dentes dolent, intus forisve aut vtrinque prodeat, dolorque remittat: tunc sponte, vel iam dictis sacculis adhibitis, vel inunctione oleorum calidorum facillè discutitur.

Si dolor verò cum tumore augeatur, quia abscessus tunc generatur: vt ille maturetur, eadem anodyna cataplasmata iuuabunt.

Imprimisque si farina sumatur Tritici vel Speltæ, & in Lacte coquatur, Olibanumque puluerisatum in fine illi permisceatur, appliceturque, abscessum maturabit.

Quod & fiet, si intrinsecus in ore Lac tepidum contineat, in quo rad. Althææ, seminis Lini & Semperuiui maioris squamæ aliqua, decocta fuerint.

Abscessus maturat<sup>9</sup>, intrinsecus in ore ruptus, per se, aut apertus vngue aut phlebotomo, in vlcus abit. Quod sponte vel remediis in vlceribus oris dictis sanatur. Si extrinsecus sub cute collecto pure, illic abscessus fiat, sicut in vlceribus externis dicitur, aperiatur & curetur. Sæpè autem si vitiosi dentes illic sint, vlcusque adeos pertingat, vix, donec illic extracti sint, sanabitur: reliquæ sæpè post illius curam cicatrice profundâ, vnde oris quædam tortura appareat: sicuti suo loco explicabitur.

Si ab intemperie frigida, à materia eò defluxa, nata, dolor fiat dentium, curatio iam in defluxione pituitosi humoris fuit explicata, & qua ratione calidorum adhibitione emendetur. Quæ etiam, si à simplici intemperie fiat, eandem quoq; corrigunt. Tunc potissimum ab omnibus actu frigidis, aëre, cibo, potu, medicamentis, ne dentes horum frigore, vel prius affecti, magis, vel de nouo aficiantur, cauendū: cum frigidū adeo den-

*Dentium doloris ab intemperie frigida simplici, curatio.*

tibus hisq; sedibus inimicum sit, vt neq; in causa calida actu frigida apposita, etsi leuamen aliquod primo impetu adferre videantur, conueniant, sed malum potius augeant.

Si à dentibus vitiosis dolor dentium suam trahens originem; aut aliis de causis primum factus, ægrè horum causâ sanetur, vel facile iterum redeat: Tunc si defluxio accesserit, vti in defluxione dictum, curatio erit instituenda.

Dentium verò vitiatorum causâ, si caui aut perforati sint, ne quid eos subintret, sicq; molestiam pariat, cauendum. Quod fiet, si cibos non in latere ægro, sed sano potius mandere affuescant. Idem si cera aut mastiche prius mastigando emollitis, alijsve dentis foramen obtureretur, præcaueri posse, docent: vnde tamen non minus locum hunc affici, quàm si cibo impleatur, experientia demonstrat: & proin hoc potius in oris fœtore, ne is ciborum retentorum in dentibus putrescentium causâ oriatur, vsurpari debere, eo loco ostendemus.

Imprimis verò cum dentes vitiiati molestiam tantum adferant, dolorique etiam ex leui causa occasionem præbeant, & vicinos quoque tandem inficiant, maximeq; si iam omnino sint inutiles, vel sunt euellendi, illis artibus, sicuti in ossibus corruptis explicabitur: vel locus illis subiectus, ne ab iis veluti alienis continuò molesteretur, insensibilis reddi debet. Quod fiet, immisis in dentis cavitatē causticis: vti Aquâ forti, quæ communiter vsurpatur: vel lacte Ficulneo aut Tithymali, aut Sori, vt vult Dioscorides, bōbācis pilula prius exceptis aliāve arte administratis & inditis, ceraque postea, ne hæc elabantur in fauces, occlusis: quæ & frequentius præsertim adhibita, tandē vt & dentes frangantur cadantque, efficiunt. Quod &, si ferro ignito dens corruptus tangatur atque vratur, vt sensum subiecta pars vicinitatis causâ compatiens amittat, densque tandem excidat, perficitur.

Si molestia aliqua sequatur inde, quia dentes ab illis quæ interstitiis ipsorum validè intrusa sunt, cōstringuntur, facile, si dentiscalpio (quod ex Lentisco lignoque Iuniperino alijsve factum vtilius censetur) ex interual-

lis impedimētum hoc extrudatur, ea emendabitur. Quod tamen si accidat, cum dentes dolent, placidè admodum, ne iam prius dolentes amplius irriteremus, faciendū erit, cum & tunc à quouis fere contactu offendantur, quemadmodū & cum linguā continuò dens dolens pulsatur, vel digitis frequenter prehenditur (quod plerumq; sic se dolorem declinare posse existimantes, ægri facere solēt, vt & dentium spacia, ac si quid illic inhæret, repurgare) dolor dentium quoque exacerbari potius, quàm leuari solet.

Si exasperatis dentibus in Hæmodia, manducatio ciborum molesta reddatur, Portulacæ recentis folia in loco affecto tamdiu mastigata, donec impedimentum hoc non amplius sentiat, certissimum & subito iuuas est auxilium.

Tardiùs illud faciunt, si medulla Panis recentis, aut caseus parum tostus, vel Vitellus oui coctione induratus, dū adhuc calens, dentib. affectis mordeantur, atq; stringātur.

Item si Amygdalæ aut Auellanae excorticatæ: vel Cera Sale subacta, mastigentur.

Si ob gingiuas à dentibus perforatas, infantes cum dentiunt, dolorem sentiant: tunc ad dentitionem facilitandam Cerebro cuniculi vel leporis cocto in Vino: vel Butyro recenti, cum Melle permixto, alijsve lenientibus & emollientibus relaxantibusque gingiua infantium leuiter & sæpe vngendæ.

Idem facere lapidem in capite Limacum nudorum inuentum, si adalligetur, testatur Matthiolus.

Alia accidentia quæ tunc superueniunt, quomodo tractanda sint, suis singula locis exposita sunt.

Ob euulsionem dentis qui nascitur dolor, mox eo ablato remittit, & simul ille qui præcessit, cuius causâ dens extrahitur, tunc cessat. Si verò loco moueatur tantum vel frangatur dens, deterius fit malum, vbi postea quando denuò euellitur, fragmentaq; rupti dentis eradicantur, duplici ratione patitur eger. Vt hæmorrhagia sistatur, Vino os colluunt. Quæ si perseueret, in periculum aliquando inducit ægrum, arteriā præsertim ruptā: cuius cura in hæmorrhagijs explicabitur.

Dentium  
doloris  
ab irrita-  
tione à  
dentibus  
vitiatis,  
vel con-  
fractis,  
curatio.

Hæmo-  
dia cu-  
ratio.

Doloris  
in denti-  
tione in-  
fantium  
curatio.

Doloris  
euulso  
dente cu-  
ratio.



## DE FAUCIVM

## DOLORE.

## CAPVT IX.

## Genera.



**D**OLORVM genera quæ in fauciu aut gutturis sedibus occurrunt: vel superiore, quæ ore diducto apertoq; linguâq; depressâ patet, cameraq; est, in quam vtrinque ad latera prominentiæ duæ, quas tonsillas vocant, isthmi alicuius instar feruntur: & cui in medio caruncula, quam gargareonem appellant, à palati extremi media sede producta, præponitur: Vel quæ in ima ipsarum sede in collo recondita, sentiuntur: Idq; vel separatim vno aliquo in loco, vel pluribus; nonnunquam & ad oris partes aliquas enarratas disparguntur: distinguuntur primum, quatenus diuersum sensum mouent. Cum sit nunc saltem asperitas, vel quædam irritatio molesta: nunc dolor verus, isq; vel distendens vel ardens, vel vlcerosus.

*Asperitas faucium.*

Asperitas faucibus interdum molestiam exhibet: quæ tamè cum voci potius incommodet, in raucedine descripta fuit.

*Irritatio molesta in faucibus. Gargareonem lasus.*

Irritatio faucium molesta, cum conatu aliquo continuo ad deglutitionem, vel si magis vrgeat, etiam vomitione, incitante quandoq; sentitur. Tuncque vel aliquid faucibus inhaeret, vel gargareon longior crassiorque factus in fauces dependet: quas si aliquo pacto obturet, spirandi vocisq; edendæ difficultatem quoq; aliquâ adfert: tuncq; sic adausus propriè Columella, *niou* vocatur, vel illius casus lapsusve, hic affectus appellatur.

*Columella.*

*Dolor distendens in faucibus cum difficultate respirandi. Angina notha illiusq; species.*

Distendens seu tensiuus quidam dolor in faucium interioribus occurrit, cum cauitate in ceruice apparente, ob luxatam illic vertebra: Respiratione tunc admodum intercepta: in cuius defectu de hoc affectu egimus: quem ob similitudinem aliquâ quam cum angina habet, in spiritu impedito, sextâ Anginæ faciunt speciem: quæ rarissima est.

Frequentius à defluxione (vbi dicitur in causis) subortus dolor tēsiuus, etiam sine ardore seu inflammatione fauces afficit, cum

angustia quoq; aliqua interdū spirandi: præsertim verò cum deglutitionis aliquando & vocis impedimento. Idq; aliàs nullo tumore: aliàs cum tumore aliquo in faucibus, vel extrinsecus in colli aliqua regione apparente: hicque affectus Angina notha dicitur.

*Paristhmia.*

Pluries tamen eū anginæ nothæ accidentibus, tonsillæ vtrinque, vno vel vtroque latere globi instar protuberantes, porisq; manifestis spongiæ instar apertæ & porosæ videntur: quem affectum Paristhmia vocant.

Ardens, acutus & pungens dolor in faucibus occurrit in affectu quem Anginā veram vocant, cum respirationis difficultate, quæ parua & frequēs est, interiectisq; sæpe suspiriis ducitur, nonnunquā & suffocationis adferens periculū, ad eū, vt non nisi erecti spiritum trahere queāt, oreq; aperto canū instar hiantiū vel furiosorum hient, vnde & malū tunc Cynanche vocant. Deglutitio quoq; in hoc affectu vel fieri nequit, potusq; si eū deglutire contendat, per narēs rursus resilit, vel ægrè admodum deglutiunt, doloremq; conatus ille exacerbat. Adhuc febris plerūq; (neq; enim semper) huic malo comes est, illiusq; aliqua accidentia, in calore, rubore faciei, siti, pulsib. & vrinis sese exerunt. Tumor vel nullus vel aliq; se manifestat, cuius causa in tres species angina distinguitur: nam si nullus tumor seu inflammatio intus forisve appareat, primam in qua accidentia fauissima occurrunt, statuunt speciem: si verò is in faucium angustis appareat, secunda est species, graui quoq; secum ferens symptomata: quod si verò foris potius in collo tumor se offerat, tertia est species, mitiores quam priores duæ producens effectus.

*Dolor inflammans in faucibus cum difficultate respiratione. Angina vera illiusq; species. Cynanche.*

Priuatim quoq; tumor inflammans cum rubore & calore in tonsillis enarratis occurrit: quas sic affectas Antiades vocant. Nonnunquā & in gargareone is deprehenditur vultusq; propriè tunc, cum tumescēs ex inflammatione nigricat, dicitur. In quibus vitis, accidentia quæ in anginæ mitiore specie adesse diximus, nisi illa quoque adsit, vel sequatur, adhuc leuiora occurrunt. Quæ in hisce tribus locis inflammationes, si in abscessum abeant, dolor cæteraq; accidentia augentur, eodq; rupto mitigantur, vlcusque sequitur.

*Antiades.*

*Vultus.*

*Dolor vi  
cerosus  
in fauci-  
bus.*

Vlcerosus dolor in faucibus quandoque perſentitur: illeque vel in manifestis locis, vt in gutturis superiori fede, vel in tonsillis aut gargareone: in quibus & tunc exulceratio aliqua adesse cernitur, in palatum sæpe quoque producta: nonnunquam & absumpto vel ex parte, vel omnino quoque gargareone. Vel in profunda fede ſentitur, anginamque dictam ſequitur: pusque tunc simul excreatur. Vel si per se accidat, deorsum dolor ille ad ventriculi regionem vsque cum ardore summo, præsertim inter deglutendum porrigitur, & proin etiam deglutitione impedit: vti & si in superioribus locis fiat, & deglutitioni, respirationi & voci tunc simul incommodat.

### *Causa.*

*Sedes af-  
fecta.*

**C**AUSA horum affectuum: nimirum molestiæ cum irritatione, (de asperitate faucium alibi egimus) & dolorum, cum distentionis, inflammationis & vlcis sensu se offerentium, vel in partibus abstrusis latitat, vt musculis fauces vicinaque illis loca occupantibus: vel glandulis humilioribus asperæ arteriæ adnatis: vel ductibus qui per interiora colli feruntur, œsophago plerumque; (nam asperæ arteriæ affectus eiusmodi, in respirationis defectu & depravatione, cui potissimum incommodant, potius describuntur.) Vel in manifestis faucium locis residet, vt tonsillis, gargareone, aut tunica illic cameram hasque sedes ambiente, vnde sæpe in palatum vicinaque loca extenditur. Estque dolorum omnium in hisce omnibus fedibus causa, vel influxus humoris sanguinei vel excrementitij: vel soluta continuitas. De soluta contiguitate à luxata cervicis vertebra, anginam sextæ speciei excitante, in respirationis defectu egimus.

*Inflama-  
tio fau-  
cium, ton-  
sillarum,  
gargareo-  
nis, cau-  
sa angina  
vera, Antia-  
gna, vnu-  
de.*

Sanguinis influxus si in fauces obsidentes musculos diffundatur, inflammationem, veram anginam appellatam parit: seu iorem, tolerabilioremve, prout defluxio interiora exteriorave magis possidet. Nam si in interiores musculos laryngis & faucium ac ossis hyoidis, qui respirationi, voci & deglutitioni inferuiunt, procumbat, cum vehementer tunc angat & veluti suffocet, prima & dete-

rior erit anginæ species. Si verò in exteriores potius collum illic occupantes feratur musculos, cum minus hisce functionibus tunc incommodet, mitiorem, & quæ tum tumore externo sese quadoque manifestat, tertiæ speciei, dictam procreabit anginam. Quod si verò tam ad interiores quam exteriores se musculos dispergat defluxio, medio modo se habens, secundæ speciei appellata nascetur angina: in qua cum tumor non ita collectus & abditus vt in prima sit, ille in faucium interioribus se nonnihil profert, ibique potest conspici. Quæ ratione & rectius differentię anginæ veræ explicantur, quam si, prout in in hos illosve musculos defluxio cadit, cum in illis in abdito occultatis hoc discernere nequeamus, alia insuper ipsarum genera statuamus, & pro horum differentiis, cynanchas, paracynanchas, synanchas, parasy-nanchas appellemus. Cæterum si sanguis in glandulas illic positas potius defluat, illasque inflammet, præsertim humiliores asperæ arteriæ vtrinque adstratas, quæ propter venas quibus intextæ sunt & nigricant nonnihil, facile inflammantur, anginæ quoque erit species, eoque magis cum & tunc vicini quoque musculi ferè inflammentur: deterior, mitiorve, prout se in musculos dictos diffundit inflammatio. Si verò in glandulas elatiores tonsillas scilicet, vel gurgureonem feratur, harum partium inflammationes, antiadum & vuulæ nominibus expressas parit: quæ ad vicinas quoque sæpe partes expanduntur, frequentiusque quam anginæ sunt: cum sanguis in laxas hasce glandulas magnis venis adstratas, citius quam in alias cum fluit, feratur. Quod si in gulæ seu œsophagi sedem potius descendat, quod rarum est, dolorem grauiorem longè, præsertim in deglutitione, à principio gulæ ad ventriculum vsque sese exerentem, sed non cum tanta spirandi difficultate, nisi ad vicinas partes quoque se extendat, procreat.

Cuius influxus sanguinis atque inde natæ inflammationis causa quoque eadem, quæ cæterarum inflammationum existit, nimirum plethora, sanguine in corpore admodum redundante, vel feruentiore & tenuiore existente, eoque se potius quam aliò, ob par-

*Oris  
in  
ma-  
tio,  
cuius  
cau-  
sa*

tium dispositionem exonerante: idque plerumque per febrē synochum, sanguine prius in venis accēso, portioneque illius eō (vt in febribus dictum) effusa, vnde anginae, aliæve faucium partium, vel etiam gulæ, vti & oris & linguæ (sicuti ostēsum) inflammationes, eiusmodi febrium plerumque sunt symptomata, mox cum illis incipientia, vel postmodum superuenientia. Sed & sanguis aliis de causis eō allicitus, inflammationes in gutturis sedibus potest efficere: quas tamen vix dū febris, nisi aliis de causis accedat, comitatur. Quod nunc ob dolorem quem hæc partes aliorum morborum causâ patiuntur, potest accidere: Vel quia ab assumptis quibusdam actu potentiâve calidis, vt piperatis, vel aro, laureolâ, quæ aliquando per iocum propinquantur, fauces nimium accenduntur: Aut quia à potu summè frigido, dum præsertim corpus calet, ob subitam percussione, refugiente sanguine, & cum impetu rursum remeante, sanguis concitatus, è venis effunditur: nisi hoc prius febre accensâ synocho, quam inde quoque excitari posse, in febribus declarauimus, vt dictum fuit, accidat. Sed & per conatum nimium in partu, sanguine in venas superiores colli impulsio, hoc euenisse, in puerpera, quæ inde occubuit, obseruauimus: idque ab aliis quoque conatibus, qui vociferando aut spiritum retinendo, in deiectionibus fiunt, accidere posse, verisimile est.

*Defluxio in fauces, tonsillas, gargarionem, causâ Anginæ, Paristhmiam, Columellam.*

Excrementitius, serosus & pituitosus humor à capite defluens, & sub palati tunicâ descendens si in guttur occupantes musculos feratur, Anginam notham procreabit: vehementius minúsve angentem, prout quoque defluxio in musculos interiores exterioresve, vt de sanguinis influxu dictum, procumbit: eademque ratione tumorem etiam apparentem vel minimè patentem efficiet. Quod si verò defluxio glandulas potius elatioris tonsillas impleat, nec ulterius alia loca occupet: vel gargarionem, qui quia laxa & mollis est caruncula, facile defluentes humores suscipit, imbuat, affectus Paristhmia & Columellam appellatos, generabit.

Quorum omnium defluxionū causa non alia, quam & reliquarum defluxionum tam

materialis quam efficiens existit: Adiuuans itidem, harum scilicet partium ad recipiendum aptitudo, tum quod capiti mox subiectæ sint, tum quod laxæ aliquæ sint, aliæ imbecilles sæpe fiant: quæ illis vti aliis quoque de causis, sic si affectus aliquos passæ sint prius, facile euenit.

Solutio continui dolorem vlcis sensum exprimentem parit: Quæ est vel vlcus aut excoriatio vel vulnus, in diuersis iam dictis faucium locis contingentia, à variis causis pronata. Frequenter post inflammationes dictas faucium, tonsillarum & gargarionis suppuratas & in abscessum conuersas, postquam ille disrumpitur, vlcus illarum partium nascitur. Aliàs à defluxione acris, vel tumorem prius excitante, vel statim exulcerante, faucium elatioris sedis, tunice succingentis, tonsillarum & gurguleonis, interdum & œsophagi sequitur excoriatio: palatum quoque sæpe, interdum & oris partes alias simul inficiens, vicinasque sedes aliquando exedens. Quod & à maligna illa materia, quæ in elephantiasi & lue venerea, membranoso generi tantopere insidiatur, in omnibus illis faucium, vti & oris sedibus (sicuti illic ostēsum) potest accidere: vnde tam peruersa in palati posteriore & faucium sedibus vlcera, in narium amplitudinem serpentina, glandulas & columellam sæpe depascentia, in illis morbis prodeunt, cernunturque. Verum & ab exhalatione calida, & acris in febribus ardentibus & malignis, œsophagus quoque findi nonnunquam & excoriari aliquo pacto potest, vnde diu postea inter deglutendum, vti dictum, ardentis illos dolores à summo ad imum vsque protensos patiuntur. Ab acutis pungentibus, secantibus, in fauces œsophagumve casu irruentibus, hasque partes vulnerantibus, dolor quoque acris suboritur, maior si inflammatio insuper accedat. Quæ vulnera si ab externis progressa, ad eas partes pertingant, in externis vlnis tractabuntur.

#### Curratio.

Si à defluxione humorum in faucium partes, oriatur hi affectus; Tunc si sit inflammatio faucium in angina vera primæ speciei,

*Vlcus in faucibus, tonsillis, gargarionem, causâ Doloris vlcis in illis, & Gargarionis, absorptionis.*

*Vulnus in faucibus, œsophago, causâ Doloris vlcis in illis.*

cici, acutissima eff, decem & octo horarum  
spacio hominem sæpe strangulans. Altera  
acuta quoque, vt quæ secundo, tertio, vel ad  
summum die quarto iudicetur: in cuius cu-  
ratione tamē spes maior existit, cū tumor  
se in illa proferens remedia melius quàm in  
prima, cū tunc in profundo lateat, admit-  
tat, suppuratusque rectius expurgari queat.  
Tertia verò minùs periculosa, cū tumor ad  
exteriora se dispergat, existit, curatuq; ob id  
facilior. Quæ glandulas occupat humiliores,  
prout anginæ speciem aliquam comitè ha-  
bet, vti ferè fit, plus minùsve dubia est. Hisce  
omnibus tutior est inflàmatio tonsillarum  
& gargareonis, cū melius adhuc pmineat  
tractarique possit. Vel etiam gulæ seu œso-  
phagi, quo & per deglutitionē remedia per-  
uenire possunt: nisi hæ inflàmationes in vi-  
cinas sedes expansæ, maius inducant peri-  
culum. Si verò defluxio alterius excremen-  
titiij humoris anginam nothâ procreet, nec  
hæ periculo vacat, si interiora obstruat: tu-  
tior quoq; quæ ad exteriora tendens, tumo-  
rem in colli lateribus ferè apparentem pa-  
rit. Quæ tonsillas & gargareonem implet,  
facilius quoque curari potest.

Quod verò curationem attinet, variat hæc præcipuè, prout vel defluxio est à sanguine, seu inflammatio, eaque vel faucium seu angina: vel tonsillarum, vel gargareonis, vel œsophagi: quorum cura in multis conuenit. Vel defluxio humoris alterius excrementitij, in fauces in angina notha: vel in tonsillas & vuulam, vel gulâ; tunc enim curatio magis adhuc à priori discrepat. In quibus tamè omnibus causis, modis curandi sequentibus procedimus.

Vena aperienda in quavis faucium illius-  
ve partium inflammatione, cum ea magna  
est, aut ne talis fiat ob dolorem, metuitur:  
idq; corpore præsertim plethorico existente.  
Præcipuè verò in angina citò illud admodum  
feri debet: reuulsionis causà primùm bra-  
chij venam patentem aliquam, vel si com-  
munem morem observare velimus, vnam  
ex cephalicis dictis venis, qualis in brachio  
est humeraria, in manu ea quæ iuxta polli-  
cem apparet, tundendo: sanguinemq; iusta  
mensurâ, nisi quid obstat, emittendo, iterum.

que sæpe, si malum vrgeat, repetendo. Mu-  
lieribus venam sub mammis quoque aperi-  
re iubet Hipp. Quibus & si menses substitute-  
rint, vena malleoli vtiliter aperitur: nec in  
gravidis sanguinis missio omittenda, parcius  
tamen facienda. Sed & derivationis nomi-  
ne sub lingua vena, reuulsione præmissa, vel  
eodem die, vel mox postea cum morbus sit  
acutus, secanda. Frontis venâ aperit Archi-  
genes. Alij etiam eam quæ in ceruice est. In  
alia defluxione frigida, si dolor aut angustia  
vrget, illa quoque minimè omittitur.

Cucurbitulæ scapulis, collo, & sub mâmis affixæ idè præstant, & præsertim si in angina in ceruicis initio iuxta secundâ vertebrâ apponantur, vt liberius spirare & deglutire possint, magnû adferunt adiumentum. Potentiusque operabuntur si scarificatio in illis locis simul fiat. Quæ & sub mento & in maxillis facta prodest. Cuius loco & sanguifugæ prædictis locis adhibentur. Maximaq; urgente necessitate, vesicatoriis & cauteriis, ceruicis initium, vel capitis eminentior sedes, vritur: quod & præcautionis loco in illis qui huic affectui obnoxij sunt, commodè instituitur. Quæ omnia & in aliis defluxionibus locum habent.

Frictiones & ligaturæ, lotiones extremitatū, reuulsionis causâ in omnibus defluxionibus competunt. Et imprimis in carpo facta frictio, cum tonsillæ tument, probatur.

Capiti applicamus quæ fluxiones pituitæ  
sistunt, caputque roborant, si sæpe fluxioni-  
bus fauces impetantur: idque purgato prius  
corpore.

Emplastra ad mouenda vertici vel occipitio sequenti modo: R. Picis naualis ʒ.ij. Thuris, Mastichæ, Ladani an. ʒ.ij. gūmi Ammoniacci dissol. in Aceto forti q. f. fiat emplastrū rotundum & latum.

Fortius & attrahens sic fit: R. Fimi columbini & Muris ʒ.ij. semin. Melathij prius infusi in Aceto ʒ. j. Thuris, Mastichæ an. ʒ. j. β. Galbani dissoluti in Aceto & Mellis Anacardini q. s. fiat emplastrum.

Pulvis capitis capillis inspergendus manē  
& vesperi: caput prius panno vel pectine pa-  
rum fricando, idem præstans: R. Mastichæ,  
gum. Hederæ, an. ʒ. j. β. cort. Citri, rad. Galan-  
gæ, Ros.



gæ, Ros. rubr. Origani, sem. Nigellæ & Coriandri præp. cū Aceto, baccarum Lauri, Santali rub. an. 3. j. Nucis mosc. Gariophyl. an. 3. β. granorum Kermes 3. ij. Salis 3. j. fiat pulvis.

Inijciuntur clysmata potissimum purgationis causâ, cū alia medicamēta ægrè deglutiant. Quæ venæ sectioni vti consuetum & consultum est, ad aluum fluidam faciendam, præmittuntur: & postea quoq; si aluus non respondeat, ad eam sollicitandam, & simul à superiorib. reuellendam infunduntur.

Si ab influxu sanguinis inflammationes fiant faucium, cuiuscunq; generis, emollientes, refrigerantes, passim expositi in febribus clysteres cōpetunt: vti & hic, qui R. decocti communis Clysteris q. f. dissoluendo Calsiæ extr. 3. j. Sacchari adhuc impuri 3. j. β. ol. Violacei 3. iij. Salis parum, fiat clyster.

Quādo magis stimulare & reuellere à superioribus volumus: R. Maluæ, Betæ cum toto ana M. j. Furfuris P. j. fiat decoctio, & in col. f. q. dissolue Mellis viol. 3. j. β. el. de succo Ros. 3. β. Hieræ picræ 3. ij. ol. Violacei 3. iij. Salis parum (si succi Mercurialis vel Betæ 3. j. addas, efficacius stimulat) fiat Clyster.

Si à defluxione aquei humoris angina notha fiat, vel tonsillarum tumor, aut columellæ elongatio, clysmata in similibus defluxionibus descripta conuenient.

Quibus & hic potest adijci: R. Maluæ, Altheæ, Attriplicis cum toto ana M. j. rad. Ireos 3. j. Saluæ, Maioranæ an. M. β. flor. Chamomil. Meliloti, Lauandulæ, Furfuris an. P. j. semin. Carui 3. ij. fiat decoctio, in col. q. f. dissolue Hieræ colocynt. 3. iij. Mellis rosar. 3. ij. ol. Chamo. Nucū an. 3. j. β. Salis q. f. fiat Clyster.

Naribus errhina interdum, quæ pituitam defluentē ad tonsillas & gargareonem præcipuē à faucibus ad nares diuertāt, indimus. Quod masticatoriis, pituitam incidentibus, & à faucibus elicientibus quoque fit, quæ & topica, cū ori indantur, sunt remedia.

Exhibentur purgationis causâ interdum quædam loco clysmatum, si deglutire possunt, eaque formâ, vt facilius descendant, ferè liquidâ. Quæ in inflammationibus faucium, ex Calsia, Tamarindis, Manna, syrupis, Rosaceo & Violaceo: alijsq; leuioribus, corpus minimè accendentibus parantur. Quorum

exempla passim in febribus occurrunt. In aliis verò defluxionibus validius adhuc corpus, remedijs vndique in eiusmodi morbis explicatis, purgamus: inter quæ imprimis Hiera picra in angina notha sumpra laudatur: cuius quoq; in forma pilular. pōdere 3. ij. post frugalē cœnam vsu, plurimos anginâ quæ Romę grassabatur, multosq; suffocabat, effugisse scribūt. Decoctū ex Turpethi 3. j. cū Liquiritia factū, additâ Mânâ vel Calsia, sepe exhibitum, in angina admodū iuuare docet.

Præparationis humorum causâ, dantur tum quæ humorem in crassando sistunt, præsertim si calidus sit: vt syrupus Violaceus, de Papauere, Emulsio feminum papau. cum aqua Ros. vel Diacodion simplex: aliaq; quæ in catharris conueniunt.

Vel si iam defluxus sit, quæ eundem præparant, & concoquunt, vt syrup. Capill. ven. cum aqua Buglossæ Scabiosæ ve.

Vel sic: R. rad. Liquirit. 3. j. Capill. ven. Buglossi ana M. j. flor. Viol. Scabiosæ an. P. j. Passul. enucl. Iuiub. Sebesten an. P. vj. Hordei P. j. 4. semin. frig. mai. an. 3. j. β. fiat decoctio, & in tb. j. β. dissolue Oxy. simpl. Mellis ros. ana 3. j. β. Sacchari 3. j. fiat iulep. pro trib. vel quatuor vicibus: arom. puluere Diatrag. frig. 3. j.

Decoctum florum Violarum, vel conserua illarum, cum aqua Violarum hausta, in infantibus probantur, nec non & in adultis conueniunt.

In causa frigida detur syrupus de Hyfopo, Prassio, de Liquiritia, cum aquis Tusilagin. Marrubij, alijsve.

Vel sic: R. rad. Enulæ 3. ij. Liquirit. 3. vj. Hyfopi M. j. Ficuum n. x. Dactylorum n. v. seminis Anisi 3. ij. fl. Rosmar. P. j. fiat decoctio & in tb. j. β. dissolue Mellis anthos. 3. ij. Sacchari 3. j. β. Sacchari candi 3. j. fiat iulep, pro aliquot vicibus, arom. 3. j. spec. Diarēos.

Loco affecto topica remedia intrus forisq; adhibemus. Intrinsecus faucibus ea quibus eas abluimus, vel alioquin lambendo deglutendove (si modò deglutire possint) illimus: aut quæ alio modo illis apponimus vel insufflamus, aut per suffitū admittimus. Extrinsecus verò, quæ collo applicantur. Quæ prout diuersæ partes in faucibus affectæ sunt, sic vsurpantur.

Angina vera & falsa topica remedia.

In angina à quacunque defluxione nata, ab initio dum adhuc materia fluit, repellentibus vtendum; additis simul refrigerantibus, si vera sit: omiſſis illis, si notha exiſtat: addendo ſimul in vtraque ſpecie, cum iam defluxio facta eſt, concoquentia & reſoluentia. Quibus & tandem ſolis quæ materiam digerunt, vtimur: ſemper interim per totum morbi progreſſum, cum dolor & anguſtia vrgent, ea quæ dolorem leniunt viasq; dilatant vſurpando, reliquisque permiscendo: vt & ea quæ pituitam limumque tenacem, qui in defluxione frigida præſertim illic hære ſolet, abſtergant: quorum exempla hæc ſunt.

Repellentia ab initio talia adhibentur. Gargarisma primum: R. aquæ Roſarum, Plantag. vel Capriſolij ana 4. j. adde Aceti, vel illius loco Vini granat. aut alterius acidi fructus, ſucci tantundem, donec aceſcat, & vtere. Addi quoque poſſunt Diamori 3. ij. vel Mellis roſacei.

Aliud: R. aquæ Plantag. 3. iij. aquæ Roſar. 3. ij. Sacchari Roſ. vel Mellis roſ. 3. j. Aluminis 3. j. diſſoluantur vel bulliant parum ad vſum.

Tertium: R. cort. Granat. Balaustiſtorum, nucum Cupreſſi ana 3. j. ſem. Myrtil. 3. ſ. femin. Plantag. 3. ij. fiat decoctio in aqua & Melle, & in tſ. j. diſſolue Diamori, Vini granat. acid. ana 3. iij. ſi tantillum Aluminis addas, efficacius erit: miſce.

Pulveres repellentes fiſtulâ interdum inſuſſantur: ex ſol. Plantag. Roſis rubris, aliisve ſimilibus.

Repellentia & nonnihil reſoluentia, & abſtergentia, in progreſſu morbi ſic vſurpantur gargarismata: R. aquæ Prunellæ, Plantaginis, Salicis ana 3. iij. Caſſiæ extractæ, Dianucum, Sapæ, an. 3. j. miſce.

Vel: R. rad. Liquiritiæ 3. j. rad. Cyperi, cortic. Granat. ana 3. ſ. Balaust. 3. ij. Roſ. rub. p. j. Ficuū n. vj. Daſtyl. n. iij. Paſſul. p. xij. Iuiubarum, Sebeſten ana p. vj. Hordei p. j. ſemin. Lini, Fœnogr. ana 3. ſ. fiat decoctio, & in tſ. j. col. diſſolue Diamori compoſ. cum croco & myrrha 3. ij. (vel illius loco Myrrhæ 3. j. Croci 3. ſ.) Mell. Roſ. vel Diamori 3. ij. Caſſiæ pulv. 3. j. Oxymell. ana 3. j. miſce.

Propinatus ſuccus Hederæ arboreæ ad deglutendum à 3. iij. ad 3. ſ. repellendo & digerendo, valde prodeſt. Quam plantam in colli vitiis emendandis adeo efficacem cenſent, vt & cochlearia ex Hederæ ligno facta, iuuare vulgò credantur.

Reſoluentia potiſſimum & concoquentia & abſtergentia, tandem ſic adminiſtrantur.

Gargarismus: R. aquæ Ebuli, Prunellæ an. 3. iij. aquæ Hyſopi, Roſarum an. 3. ij. Vel hoc decoctum: R. rad. Liquiritiæ 3. j. rad. Ebuli, Raphani Ireos ana 3. ſ. flor. Roſar. rubr. Maluæ autumnalis, Chamomil. vel Samburci ana p. j. Hyſopi m. ſ. ſeminis Raphani 3. ij. ſeminis Fœnogr. 3. ſ. Ficuū nu. x. Daſtyl. num. v. Furfuris p. j. fiat decoctio, & in 3. x. huius decocti, vel prædictarum aquarum, diſſolue Sapæ, Mellis roſar. an. 3. j. ſ. Nidi Hirundinum 3. ij. Myrrhæ, Mumie ana. 3. ſ. Croci, Salis ammon. an. 3. ſ. miſce.

Idem præſtat eclegma ſequens: R. ſpec. Diaireos ſimpl. 3. j. Piperis 3. ſ. Myrrhæ, Croci an. 3. ſ. ſucci Liquir. 3. j. cum ſyr. de Hyſopo 3. ij. fiat looch.

Vel ſic: R. Piperis 3. ſ. Croci, Myrrhæ an. 3. ſ. rad. Ireos 3. j. Mellis 3. iij. miſce. Vel eclegmate Scribonij Largi, vtatur.

Stercus Canis album & ſiccum, quod album Græcum vocant, ſubtiliſſimè tritum & inſuſſitatum, vel hiſce eclegmatis permixtum, vtiliſſimum facit medicamentum: vel ſi per ſe iam dictis ſyrupis excipiat, ſicque vſurpetur. Hoc idem ſtercus Anſerinum ſiccum & adminiſtratum, facit.

Hirundinum ſalitarum & exiccatarum pulvis, 3. j. pondere cum aqua conuenienti exhibitus, à Dioſc. in anginis commendatur.

Item Dentis apri 3. j. pulvis, cum oleo Lini propinatus, vtilis cenſetur.

Suffitus Succini, ore per inſundibulum exceptus, admodum quoque iuuat.

Lenientia & dilatantia, cum dolor vrget & anguſtia, talia conueniunt.

Gargarismus ex Lacte tepido: vbi Caprinum præſentur.

Aliud: R. Lactis tſ. ſ. Album. oui bene agit. n. j. mucil. ſemin. Lini, vel Cytonior. vel Pſyllij 3. j. Penidiarum 3. ſ. miſce.

Panis micæ, vel furfuris Tritici, in aqua

coſtorum, ſucci bene expreſſi, idem faciunt. Vel lac ex Amygdalis expreſſum.

Trochiſci lenientes, ſub lingua tenendi, conueniunt Albi communes.

Vel: R̄. ſpec. Diapapau. Diatragach, frig. an. ʒ. j. excipiantur pulpa Tamarindorum, ſiant trochiſci.

Vel tabulæ Diatragach, frig. & Diapapaueris, ore retentæ.

Vel eclegmata: R̄. ſpec. Diatragach. & Diapapau. an. ʒ. j. ſyr. Violar. de Iuiubis an. q. ſ. fiat looch.

Lenientia & abſtergentia ſimul ſimul, ſic fiunt; Gargarismus: R̄. rad. Liquirit. ʒ. ij. Ficum nu. vj. Paſſul. enuch. ʒ. j. Furfuris p. j. ſeminis Lini & Altheæ an. ʒ. ʒ. Mellis ʒ. j. coquantur in aqua ad aliquam conſiſtentiam, Et vtatur.

Eclegma: R̄. Penidiarum ʒ. ʒ. pulpæ Paſſul. mai. ʒ. ij. ſucci Liquirit. ʒ. ʒ. gummi Tragach. infuſi in aq. Roſ. q. ſ. fiat looch.

Alterum quod in progreſſu conuenit: R̄. ſpec. Diapenid. Diarir an. ʒ. j. ſyrupi de Liquiritia, de Hyſopo q. ſ. fiat looch.

Extrinſecus in angina tā vera quā nōtha, collo ſub mento vel in lateribus, vel ſi tumor aliquis apparere incipiat, eo loco ubi prodit, in principio, non quæ repellunt, ſed ē profundo educunt, relaxantia apponantur ſequentia.

Oleis relaxantibus, temperatis, vt oleo Oliuarum, Amygd. dulc. Violaceo: vel moderate calidis, vt Chamomel. Liliorum, Irino, Cheirino, aliisve, hæ ſedes inunguntur: poſtea que Lana ſuccida imponitur, vel lana hiſce imbuta apponitur. Oleum Ranarum probat Dioſcor. illudque in quo Millepedes coquantur, vtile eſt.

Vnguentum Dialtheæ, & Reſumptium idem præſtant, quibus & olea dicta, Crociq; exiguum addi poſſunt.

Foot interdu hiſce vnctionibus præmiſſo: qui ex fl. Chamomel. Liliorum, Meliloti, ſemineq; Lini & Fœnogræci parabitur.

Cum verò humores non ſolum elicere, ſed eoſdem ſimul exiccare, abſumere, digerereq; animus eſt, ad ſequētia progredimur.

Ex Nido hirundinum præparato, hoc eſt repurgato & pulueriſato, vel cocto in aqua

& vino, & per ſetaceum tranſmiſſo, medicamentum ſit vſitatum & præſtans, ſi puluis illius cum oleis vnguentisq; ſupradictis relaxantibus permixtus vſurpetur. Vel ſi ſaltem digerere volumus, ſi cum Melle ſubigatur, donec illini vel applicari poſſit.

Stercora Hirundinum vel Cineres illarū crematarum, aut pulueres, in furno prius exiccatarum, eadem ratione reliquis permixcentur, vel ſola cum Melle vſurpantur: vt & ſtercus Caninum ſiccum: nonnunquam & ſtercora alia auium; imprimis Gallinarū & Columbarum: nam humanum, vt aliqui docent, adhibere, nec neceſſarium, cum aliis ſuppētant, nec decorum.

Millepedes item ſiccati, pulueriſati, & cum Melle inuncti.

Ex aliis quoque quæ digerunt, talia applicantur: R̄. Aloës ʒ. ij. Fellis tauri ʒ. j. Piperis ʒ. ʒ. Aluminis ʒ. j. excipiantur Melle, ſiat inſar linimenti.

Alterum: R̄. ſucci Ebuli, & mediā partem ſucci Cucum. aſinini, ſi haberi poteſt, ʒ. ij. Fellis tauri ʒ. ʒ. Mellis q. ſ. coquantur parum: Inungatur.

Mel Anacardinum Rhazes etiā applicat.

Applicatio alia: R̄. ſucci Ebuli ʒ. ij. ſucci Abſynthij, Vini albi an. ʒ. j. Mellis ʒ. ʒ. Fellis taurini, Salis an. ʒ. j. miſceantur, & intinctum linteolum in eo, applicetur tepide.

Vel hæc formā: R̄. ſucci Ebuli ʒ. ij. ſucci Cæparum ʒ. j. & Cucum. aſinini tantundem, ſi haberi poteſt, olei Irini, Liliorum an. ʒ. j. ʒ. coquantur ad conſumpt. adde Nidi Hirund. præp. ʒ. ʒ. Lithargirij ʒ. j. ʒ. Cæræ parum, ſiat linimentum: vel additā Pice & Cæræ quantitate auſtā, ſiat emplaſtrum.

Aut cataplaſma iſtud: R̄. bulbos Liliorum alb. & Cæparum, mediocres an. nu. iij. coquātur ſub prunis parum, adde Pomi putreſcentis portionem quæ computruit, ad mediā ſuperiorum partem, Abſynthij inſi m. j. coquantur leuiter in Vino & Aqua, & contundantur, permixcendo farinæ Fabarum ʒ. ij. olei Chamomel. & Cheirini an. ʒ. j. ʒ. ſtercoris Gallinæ vel Columbarum ʒ. ij. ſiat Cataplaſma.

Absceſſus in angina ſi generari incipiat (quod ex dolore aliſque auētis accidenti-

*ſu in angina, curatio.*

bus cognoscimus) nec humor iam dictis internis externisque remediis digeri resoluique possit, maturantia intus forisque administrantur.

Intrinfecus hoc gargarismate maturamus: R. rad. Liliorum, Cæparum vel Porrorum an. ʒ. ij. radic. Liquiritiæ ʒ. j. Hyssopi, Scabiosæ an. M. j. Ficum num. vj. Passul. enucl. ʒ. j. seminis Fœnogræci, Lini an. ʒ. ʒ. seminis Maluæ & Caulium, nidi Hirundinum an. ʒ. ij. coquantur in Aqua, addito Melle, fiat gargarisma.

Extrinfecus admota hæc, abscessum maturant.

Puls ex farina seminis Lini, cum Lacte caprino facta, cataplasmatibus instar applicata, plurimum iuuat.

Vel sic: R. farinæ seminis Lini, Fœnogr. an. ʒ. ij. micæ Panis ʒ. iiij. Axungia porci & ol. Amygdal. dulc. q. f. fiat instar pultis.

Vel tale cataplasma, ex pluribus istis vel paucioribus compositum: R. Altheæ, Maluæ cum toto, Morfus Gallinæ, Parietariæ ana M. j. rad. Liliorum recent. ʒ. ij. rad. Ireos vel Bryoniæ recent. ʒ. j. flor. Chamomil. Vio. lar. an. P. j. Caricarum num. xij. Dactyl. num. v. decoquantur & contundantur, addendo farin. seminis Lini & Fœnogr. Hordei an. ʒ. ij. Butyri, Axungia gallinæ, ol. Amygd. & Chamomel. an. q. f. ad subigendum, misce.

Abscessus in angina suppurata factus, nisi sponte rumpatur, vt aperiatur etiam ante perfectam maturationem, mox procurandum. Quod variis modis fit.

Vt gargarismate hoc: R. succi Cæparum vel Porrorum, & Fermenti æquas partes, dissoluantur, & admixto Lacte caprino, sæpe gargarizet calidè.

Vel: R. Gargarismatis supradicti maturantis t̄b. j. & in eo decoque vel permisce radic. Pyrethri, seminis Sinapis an. ʒ. ij. Myrrhæ ʒ. ʒ. Croci ʒ. j. Oxymel. simpl. ʒ. j. misce ad vsu.

Fortius hoc erit: R. Bellarij quod ex Sinapi paratur & Melle, dissoluatur in aqua Malsa, addito paucio Aceto: Vtatur.

Vel in penuria illius: R. seminis Sinapis ʒ. ij. puluerifetur. Oxymell. ʒ. j. Aceti scyllit. Vini an. ʒ. ʒ. misce.

Vociferatio, vt rumpatur, aliquid efficere potest. Magisque adhuc illud faciet deglutitio, si cum conatu valido fiat, aliquidque solidius quod impellat abscessum, vt crusta panis, deglutiat. Vel si spongiæ, aut carnis salis porcinae cruste portiuncula filo appensa deglutiat, rursumque extrahatur.

Instrumentis certis abscessum aperimus, si ille conspici, instrumentaque eousque adigi possint. Quod vel digito immisso, vngueque eum vulnerando: Vel candelâ cereâ, aliove instrumeto ligneo aut ferreo eum tridendo, vel acuto secando, perficitur.

In tonsillarum & vuulæ inflammationibus, intrinfecus quoque, vt in angina, astringentibus à principio, mox additis resolutivis, tandemque solum deglutientibus vt murmur. Permixtis semper, propter lentoris copiam, quæ adhærere solet, detergentibus: doloremque, si vrgeat, mitigantibus. Ita vt & multa remedia quæ in angina explicata sunt, hic quoque conueniant: sicuti & quæ in oris partium inflammationibus exposita sunt. Quibus & sequentia addi possunt.

Astringens & refrigerans gargarismus: R. aquarum Ros. Caprifolij, Ligustri, Plantag. an. ʒ. ij. succi Ribes vel Berberis. vel Granat. aut Ceras. acid. ʒ. ij. succi Cydonior. Rosarum vel Acetosæ an. ʒ. j. Diamoron, Aceti Ros. vel Agrestæ ʒ. ʒ. misce.

Vel hic, non ingratus: R. Prunorum acid. sicc. num. xij. Cerasorum acid. par. xij. Pyrorum exsiccat. num. v. fol. Acetosæ rotundi fol. Portulacæ recent. an. ʒ. j. Ros. rub. P. j. fiat decoctio, dissolue in t̄b. j. rob. de Ribes, Diamoron. an. ʒ. ij. Aceti ros. q. f. misce.

Cum potius est astringendum: R. radic. Mori ʒ. j. ʒ. b. capularum Glandium, cort. Granat. an. ʒ. j. summit. Rubi, Plantag. Agrimonie, Polygoni, Bursæ pastoris, Linguae Ceruinæ an. M. j. fl. Ros. rub. P. j. Balauft. ʒ. ʒ. Gal. larum ʒ. ij. fiat decoctio, & in t̄b. j. dissolue syrup. Cydon. de Ros. rub. siccis, Vini granat. an. ʒ. j. ʒ. Aluminis parum, misce.

Pulvis repellens in inflammatione vuulæ fit ex lap. Agyrato Gal. vel Hæmatitide: qui vuulæ apponitur, vel cum cannula insufflatur.

Quando astringendum & simul detergentium

Tonsillarum & Gargarismatis in inflammationibus seu Antididum, & Vuulæ topica remedia.



329

dum erit, sic parabitur: *R. rad. Liquiritiæ 3.ij. Agrimonie, Verbenæ, Cauliũ an. m. j. fl. Ros. rub. & Maluæ autum. an. p. j. Hordei, Lentiũ, Fabarum conuass. an. p. j. Ficum n. vj. fiat decoctio in Aqua & Vino rubro, & in tñ. j. dissolue Oxymell. simpl. 3. iij. Dianucum 3. b. succi Ros. depurati 3. j. Miuc cydon. 3. j. misce.*

Ad detergendum, eclegmata quoque parari possunt, in angina exposita, oreque retineri, abstergentia: Inter quæ & Saccharatæ & Mellitæ placentæ, panes, similiaque, locum habent.

Cum abstergere & simul absumere residuum vel digerere volumus: *R. rad. Liquiritiæ 3. ij. rad. Acori veri vel Galangæ crassæ 3. b. Hyssopi, Pulegij, Satureiæ an. m. j. flor. Rosmar. Viol. Maluæ autum. an. p. j. Hordei integr. p. j. Passul. enucl. 3. ij. Dactyl. num. vj. Ficum nu. xij. Myrrhæ, Thuris an. 3. ij. fiat decoctio in Vino rubro parum diluto aqua Chalybeatâ: dissolue in tñ. j. Mellis Rosacei 3. iij. syrapi de Liquirit. 3. ij. syrapi de Hyssopo 3. j. fiat gargarismus.*

Pulvis digerens in inflammationis vuulæ progressu conueniens: *R. rad. Ireos 3. b. Thuris 3. j. far. Orobi 3. b. Croci 3. j. fiat pulvis.*

*Paristis  
miamm  
topica  
remedia*

In tumore amygdalarum ex defluxione pituitæ, eadem remedia conueniunt: minus tamen refrigerantibus vtendo, admiscendoque quæ potentiùs detergant, moxque digerunt.

*Garga-  
reoni p-  
lapius  
seu Colu-  
melle to-  
pica re-  
media.*

In laxitate vuulæ ex defluxione frigida, astringentia & siccantia validissimè, vt statim siccata abbrevietur & restringatur sursum, nec ita in fauces propendeat, subito vsurpanda. Quod tñ enarrata validiùs siccantia præstant remedia; tum maximè sequentia.

Gargarismus: *R. rad. Chelidoniæ 3. j. fol. Agrimonie, Linguae cerui, Prunel. Virgæ aureæ, Viburni an. m. j. Ros. rubr. Hordei an. p. j. Gallarum 3. b. decoquantur in Vino rubro, addendo parum Aceti, & in tñ. b. dissolue Diamori 3. j. misce.*

Vel: *R. cort. Granat. 3. ij. Balauft. 3. b. Ros. rub. Lentium an. p. j. sem. Myrti 3. ij. fiat decoctio vt priùs. In progressu parum Piperis & rad. Pyrethri, floresq; Chamomil. adduntur.*

Aqua Phyllitidis seu Linguae ceruinæ gargarizata laudatur.

Item Acetum & Aqua simul permixta. Succus ite Mali granati, & Omphacium. Trochisci ore retinendi: *R. Acaciæ, Hypocist. an. 3. j. b. Terræ vel boli pinguis 3. j. Amydi 3. ij. rad. Bistortæ 3. b. cum infus. gummi Tragachant. fiant trochisci.*

Puluere subtilissimo posito in paruo cochleari, vel supra spatulam, atque depressâ priùs linguâ, in fauces immisso, si tangatur vuula bis terve, statim restringitur, abbreviaturque.

Qui communiter fit ex Pipere, præsertim longo.

Vel ex Alumine, aut Sale ammoniaco, vtis: aut Aeris flore. Dioscorides.

Aut: *R. Salis, instar auellianæ: vratur in cochleari ferreo, donec rubere incipiat: adde Piperis longi 3. j. Zingib. rad. Pyrethri an. 3. b. fiat pulvis.*

Cochleæ putamen vltum, Anethum cum radice & semine vltum: Nucum corticum exteriorum pulvis.

Sandaracæ gummi, item pulvis.

Vel: *R. Gallarũ, vel cortic. Granat. 3. j. Boli ping. Mastic. Myrrhæ, Acaciæ vel Hypocist. an. 3. b. rad. Pyreth. Piperis an. 3. j. fiat pulvis.*

De sectione iam dictum est.

Extrinsecus, siue in tonsillas tantum aut gargareonem defluxio delapsa sit, foris sub maxilla inferiore, ab initio non quæ relaxant, vt in angina (cum non tantum hic sit periculum, vt statim ex alto humorem euocare necesse sit) sed quæ & humores exicant, & partes simul has laxas astringant nonnihil, applicanda erunt.

Quæ ex supradictis, in angina explicatis, humores absumentibus & digerentibus remediis, si illis astringentia quædam permisceantur, parantur.

Vel hoc pacto: *R. nidi Hirundinum præpar. 3. ij. stercoreis Canis sicci, nucum Cupressi an. 3. j. Aristoloch. rotund. 3. b. Ros. rubr. 3. j. excipiantur Oxymell. & applicetur.*

Vel sic: *R. Nidi hirundinum præp. 3. j. Lythargyrii 3. b. Aloës 3. iij. Aluminis 3. ij. Salis 3. j. excipiantur Melle ros. vel Oxymellite.*

In progressu, solis digerentibus, sed admixtis in tonsillarum tumore emollientibus, ne in scyrrum indurentur, vtendum. Qualia

in scrophulis absumentis vsurpari solent. Quæ si in scyrrum abierint, tunc ea quæ illis locis explicabuntur, locum habent.

Si inflammatio aut vuula, in abscessum tonsillarum vergat, maturantia, vt in angina adhibentur.

Abscessusque maturus, nisi sponte rumpatur, vt & illic dictum, aperitur: quod eo facilius, cum ad hæc loca peruenire rectius queamus, perficitur.

Quod & in vuula fieri debet, in qua tamē & antequam suppuretur, vt præueniamus, scarificatio proderit.

Si curari nequeat vuula, sed post inflammationem corrupta & subliuida maneat, corruptum à sana parte auferendum erit. Aut si alioquin longior maiorve ex defluxione permaneat, quia impedimenta iam dicta adfert, summitas illius adimenda.

Quod forpice acuta eam præscindendo commodius & citius perficitur. Quo facto, sanguinem frigidis & astringentibus oris collutionibus, vel causticis adhibitis, vt in hæmorrhagiis dicemus, sistimus.

Idem cauterio actuali, per cannulam eo vuulam, tangendo vrendoq; perficitur: dolorem postea anodynus, vt Lacte ore retento, aliisque mulcendo. Quod potentiali cauterio non adeo commodè fieri potest.

*O sophagi inflammationis & abscessus topica remedia.*  
In œsophagi inflammatione, astringentibus ab initio, mox digerentibus vtendum: remediaq; intus adhibenda, illa plerumque, quæ si fieri possit, vt rectius ad partem deueniant, deglutiantur. Qualia multa iam prius dicta sunt. Quibus & hæc lenientia addi possunt.

Cremor Hordei, Mucilagines, Albumen & Vitellum oui, cum Saccharo deglutita.

Vel: R. Sebesten par. xij. sem. Cydonior. 3. ss. seminis Psyllij & Papauer. albi ana 3. ij. Hordei mundi p. j. decoquantur: & in colatura mucilaginosâ dissolue Penid. ad vsum.

Extrinfecus, etsi œsophagus in profundo lateat, eadem quæ in reliquis faucium inflammationibus externis adhiberi solet, hic quoque proderunt.

Abscessus si in gula post inflammationem nascatur, nec per se rumpatur, ea quæ in angina, deglutita, abscessum disrumpunt, hic

cum ad partem affectam ipsam perueniant, citius illud præstabunt. Qui & instrumentis, quibus in œsophago hærentia extrahere solemus, vt in transglutitionis difficultate ostensum, aperiri potest.

In aurem si oleum Amygd. dulc. infundatur tepidum, in omnibus faucium partium inflammationibus competere, valdeque utile esse censetur.

Amuleta probantur, Viperæ caput in lin-teolo collo appensum.

Si filo serico rubro charmesino, vel ex bysso facto, vipera stranguletur, illoque postea collo circumdetur, mirè iuuare tradunt, docetque idem Gal.

Pæoniam similiter probant.

Et in vuulæ affectibus rad. Brassicæ in collo suspensam.

Quod accidentia reliqua attinet, præsertim in angina, Virium causâ victus conceditur, sed tenuissimus. Potusque refectionis causâ & sitis, si modò deglutire aliquid possunt. Si Hordeum, Passulæ, Saccharum, similiaque illis permisceantur.

Somnus non nisi breuissimus conceditur. Aër purus & gelidus.

Ob suffocationis quoque metum æger erectus cubare debet: cæteraque quæ morbi causa quoque competunt, viresque interrim conseruant, & angustiam emendant, administranda.

Si vlcus post abscessum ruptum in angina se offerat, quod ex puris excreatione, cognoscitur, cauendum ne illud ad pulmones descendat, vel alioquin dum in fauces fertur, deglutiat, ideo continuo expuendum. *Ulcus, post abscessum, in angina, topica remedia.*

Vlcus quoq; diligenter ab eo abstergendum. Quod gargarismate ex Aqua mulsa facto, commodè perficitur.

Vel Lacte illiusve sero tepido, cui Saccharum permixtum sit.

Aut decocto Hordei, Lentium, Ficum, in quo decocto Mel Rosaceū dilutum fuerit.

Postea siccantia quæ vlcus consolidant, vsurpanda: vt Lac chalybeatum: vel in quo radix Consolidæ decocta sit: vel cui Bolus permixta sit. Aliaque quæ in oris & faucium vlcerebusiam explicandis competunt.

Si vlcus ad exteriora feratur, illicque se

ape-

333

Tonfilla-  
rum &  
gargareo-  
nis vlce-  
rum to-  
pica re-  
media.

aperiat, vti externa vlcera solent, sanabitur.

Tonfillarum & gargareonis vlcera, si post inflammationem suppuratam relicta sint, aut ab aliis causis externis nata, statim topicis adhibitis sananda. Si verò in morbis aliis à prauis oriantur humoribus, morborum istorum cura prius erit instituenda: sicuti suis locis dicitur. Vti & si à defluxione originem traxerint, illius causâ, corpus prius purgandum, diuersionesque variis modis faciendæ erunt: sicuti in defluxionibus fieri solent, & prius quoque in morbis aliis dictis faucium à defluxione factis, quomodo fieri debeant, explicauimus.

Et hisce præmissis vel simul vsurpatis, topicis abstergentibus & siccantibus, admodum validis, vt in oris vlceribus diximus, hæc quoque profundius in faucibus latentia vlcera sanare debemus. Quæ proin illic explicata remedia, hisce partibus quoque accommodari possunt. Quibus & sequentia iungimus, vuulæ vlcera & putrescenti præsertim destinata.

Lac caprinum, vaccinum vel ouinum, si in eo filices vel chalybs extinguantur, vlcus abstergit & consolidat.

Aquæ Consolidæ maioris, Agrimonie, Plantaginis, Solani, Endiuie, præsertim conueniunt.

Succi item Agrimonie, Caulium, Verbenæ, Bursæ Pastoris, vel Diamoron.

Decoctumque herbæ Lingue canis, & Geranij pedis columbinij, & Robertiani, Pimpinellæque.

Quibus & aquis & succis, & decoctis, vel folis vel inuicem mixtis, si Saccharum vel Mel, rosacea addantur, magis abstergent: Et adhuc efficacius, si Oxytel, scyll. præsertim, sumatur: & Alumen in hisce dissoluatur, vel coquatur.

Adhibentur item vuulæ, Mel rosaceum, Alumine mistum.

Item, cum admodum ficcare volumus: B. Boli puriss. 3.ij. sanguinis Draconis 3.j. Cerusæ, Tuthiæ an. 3.ß. Cornu cerui vsti 3.j. cum succo Bursæ pastoris, vel aliis supradictis, fiat instar linimenti.

Thus, Myrrha, Sarcocolla in Vino coquantur: Pro ablutione.

Aqua Aluminosa in oris vlceribus descripta, utilis.

Vel hæc: R. Sacchari tß. ß. Aluminis 3.ij. Salis 3.j. ponantur in alembico, & eliciatur aqua.

Aqua extinctionis Caleis quoque conuenit. Aqua item decoctionis Sublimati, diluta parum: si hisce validioribus cautè tangatur vuula.

Puluis: R. Sulphuris viui 3.ij. Aluminis 3.j. Masticis, Thuris, Myrrhæ an. 3.ß. radic. Pyrethri, Cornu cerui vsti ana 3.j. fiat puluis subtilissimus: cui 3. quatuor Vini sublimati addantur, ad vsum.

Si vlcus in vuula sanari nequeat, maturè antequam vicinas sedes & palatum quoque exedat, vti ferè fit, abscindatur, vel vratur: eodem modo, vt in superioribus ipsius affectibus dictum fuit.

Oesophagi excoarctatio vel vlcus, si à defluxione acri eo descendente, vel vapore feruenti ascendente, oriatur, hæc primum, si adhuc persistant, auertenda erunt, defluxioque sistenda, faucesque leniendæ, sensusque non nihil obrundendus. Vel si vulneratus ab acutis sit, illaque adhuc hæreant, illis artibus, quæ in deglutitione difficili explicatæ sunt, prius eximenda.

Postea topicis adhibitis vlcere mendum. Ea potissimum eligendo in simplici excoarctatione, quæ leuiter abstergendo & siccando eam sanant, & vt ad partem affectam perueniant, innoxie deglutiiri possint.

Qualia in faucium vlcere post anginam gargarizata prodesse diximus: quæ si deglutiant, gulam hoc pacto læsam sanare quoque possunt.

Imprimis autem Albumen oui fortiter agitatum: aut infusio gummi Tragach. facta in aqua Rosar. & Plantaginis, Saccharo dulcorata, si frequenter sumant, iuuant.

Quod si vlcus profundius fuerit & sordidum, validius etiam abstergendum siccandumque erit: Vti & si vulneratus alioquin ab assumptis fuerit, remedia in gargareonis & tonfillarum vlceribus exposita, quæ Terras pingues, Armenam vel Lemniam vocatas, Succosve alios fructuum siccantes, vt Acaciam, Omphacium, & Sanguinem draconis

Oesophagi excoarctatio  
pica remedia.

conis appellatos: Vel gummofa vt Thus, recipiunt; Aliaq; ex astringentibus & ficcantibus in inflammationibus faucium explicatis, quæ nullam in se vim deleteriam habent, vſurpari debent.

Fumi ex ſuffitibus, qui & in oris vlceribus commendantur, deuorati, aliquomodo hîc quoque ſiccando proderunt.

Externaq; remedia in angina explicata.

~~~~~

DE PECTORIS DOLORE.

CAPVT X.

Genera.



PECTORIS dolores qui in interiorib. illius potiſſimū accidūt: Alij moleſtiæ tantum ſunt, quæ in variis pectoris anguſtiis, ſecundum diuerſos illius affectus occurrunt: in quibus tamen cum reſpiratione impedita vel deprauata, plus negotij facieſcit, eæ in reſpirationis læſionibus explicatæ ſunt.

*Pleuritis
falſa.*

Dolorum verò qui reuera in pectore ſentiuntur: alius ſolitariuſ eſt, alij comitati: Solitariuſ, in quo citra grauiora alia accidentia punctorius tantum dolor latus alterutrum, præſertim cum ſpiritus ducitur, certo aliquo illius in loco, & veluti in puncto, nunc fixus, nunc vagus diuexat & pungit: vnde & Latèris dolor, Punctura, Pleuritis ſiue Pleuriſis, ſed falſa dicitur, German. *Stich*; cum non vt vera aliàs appellata, cum tuſſi & febrî, niſi aliud quid accedat, implicata ſe offerat. Reſpiratione tamen, ſi vehemens ſit punctio, parua eſt, eoq; nomine etiam frequens, cum per eam, ſi valida ſit, dolor irriteretur, ideoque vt hoc caueatur, leuiter ducitur. Huius duæ ſunt ſpecies, cauſâ differentes: quamobrem alia flatulenta, alia pituitoſa dici ſolet. Quæ ſi in exterioribus pectoris penitus ſe offerât, cū dolore & tumore, ad externos tumores, in habitu corporis explicandos, pertinent.

*Pleuritis
vera,
Brustgeſchwer.*

Comitatorum autem aliis affectibus; & imprimis cum tuſſi ac febre, dolorum in pectore occurrentium, alius punctorius quoque eſt, Pleuritisque vera dicitur: German.

Brustgeſchwer / & eadem ratione vt in falſa, nunc in latere dextro, nunc ſiniſtro, certâ aliquâ in ſede pungit, maximeque ſpiritu per reſpirationem attracto, quæ proin, vt dictū, parua, ſed cita ducitur: anhelitusque calidus efflat. Qui dolor, decubitu in latus ſanum factu, exacerbatur, ſi verò in latus punctione affectum, aut ſupinus fiat, mitigatur.

Alius dolor in pectore, prædictis accidentibus comitatus, occurrens, grauiſ potiùs eſt, ſternum dorſumque veluti contrahens & clauiculam quaſi detrahens, maioreq; pectoris anguſtiâ angens, interuenientibus nonnunquam quoq;, præſertim ab initio, in pectoris ſede anteriore poſteriorëve, vel etiâ lateribus, punctiõibus quibuſdâ interdum nullis aut obſcure admodum: diciturq; hic affectus Peripneumonia: per cætera, niſi quod dolorem attinet, pleuritidi omnino ſimilis. Eoque magis, ſi dolor in latere ſimul adſit punctorius, tunc enim ruſum pleuritidis ſibi nomen vendicat. Vel Pleuritis cum peripneumonia comitata dici poteſt.

Tuſſis in vtraque ſpecie occurrît, nunc leuior, nunc vehementior, admodum dolorem, præſertim ſi punctorius ſit, augens. Per quam ab initio, nunc citiùs, nunc tardiùs, ſputum ſanie vel cruore plus minùsve permixtum excreatur: aliàs etiam quod rariùs ſit, nequaquâ hiſce tinctum redditur. Poſtea verò purulenta materia, nunc ſubcruenta adhuc, tandem verò pus verum album vel ſubflauum, aliàs ſubuiride vel ſuſcum vel nigricans, nunc coctum, nunc crûdum, nunc tenax, interdum inodorum, aliàs foetidum, expuitur.

Febris tam in pleuritide ſtatim cum punctorio dolore, vel etiam ante illum, quàm in peripneumonia, mox initio ſe manifeſtat: & vterque affectus cum horrore vel rigore incipit, ſubſequentē febrili calore, quo corpus ipſorum nonnihil accenditur: reſpiratione concitatur, vt & pulſus; arteriâ durâ & ferræ inſtar aſperâ ad tactum (quem tamen pulſum mollem ſeu vnduſum in peripneumonia priuatim eſſe putant) ſe offerente; Tinguuntur vrinæ; Sitisque admodum vrget. Et quod peculiare peripneumoniæ ſignum cenſetur, facies ac imprimis malæ rubore ſuffun-

suffunduntur; Perseuerante tamdiu continua hac febre, quæ non nihil noctu ferè, diebus imparibus exacerbationes aliquas quoque habet, donec morbus ipse declinare vel mutari incipiat: sicuti in febribus hæc explicata fuerunt.

Verùm & alia symptomata utrique speciei quandoque accedunt, si vicinarum partium, ut in causis dicetur, concurrant morbi: Veluti delirium, syncope & similia. Sed tunc hi affectus complicati cum alijs existunt.

Pleuritis à cæteris differens.

Præter hæc, & dolor quidam punctorius cum ardoris sensu in latere, & febre quadam, tussisque coniunctus contingit, pleuritidis quoque speciem quandam referens, nisi quod in hac nihil cruenti aut purulenti rejicitur, tussisque non magna simulque sicca existit. Et quod ad exteriora pectoris usque hic dolor plus minusve pertingens, tactu non nihil exacerbetur, sæpeque illic tumore aut rubore se prodit. Quam proin quoque, sed loco affecto à priore distinctam, ut in causis dicetur, Pleuritidem succingentis tunice appellamus.

Causa.

Locus affectus.

IN thoracis interioribus, affectus hi, qui dolores hosce in pleuritidis diuersis speciebus, & peripneumonia occurrentes pariunt, consistunt. Et sunt vel distentio vel inflammatio.

Distentio tunicæ succingentis thoracis internam cameram, eousque facta, ut veluti à costis & musculis intercostalibus aliquousque si non auellatur & laceretur, tamen attollatur & veluti trahatur, dolorem punctorium illum causat, qui in falsa dicta Pleuritide sentitur. Quod & à flatu ac humore proficisci potest.

Distentio à flatib. causa Pleuritidis falsa. Flatulenta nominanda.

Flatus sicuti alibi in corpore, interstitijs quæ inter carnem membranasque illi obtenant, fibrisque hærentes occurrunt, se insinuans, eas diuellendo, flatulentos dictos dolores parit: sic & in thorace, in spatia illa intercostalium musculorum irrumpens, succingentem eos membranam distendendo, punctorium dolorem, qui Pleuritidis flatulentæ nomine exprimitur, eo in loco ubi collectus est, parit.

Qui flatus ex cruditate & flatulentorum assumptorum frequenti usu nati, uti cæteris in locis, sic & hic modo enarrato incommodare possunt. Et priuatim quoque in thoracis hac sede colliguntur citius, si thorax extrinsecus nimium refrigeretur. Vel hinc in magnis conatibus per vociferationem, tussim, aliisque, musculis admodum distentis, impellantur. Vnde & postquam pectus frigori expositum fuit, ac post validos eiusmodi motus, punctorios dolores subito oriri videmus. Idque in flatibus præcipue obnoxijis corporibus: Et calore & quiete rursum, ut in curatione dicetur, mitigari.

Humor aqueus seu pituitosus, à superioribus in thoracis musculorum intervalla defluxus, suâ copiam distendens, sicuti punctorios dolores, qui frequentius extrinsecus in thorace sentiuntur, (de quibus in externis doloribus agemus) excitat, sic & si ad interiorum hanc thoracis succingentem membranam usque feratur (quod, si tenuis admodum sit, facilius accidit) interioribus illis quoque doloribus punctorijs, qui & extrinsecus tunc etiam ferè non solum in thorace, sed & scapulis vicinisque locis molestant, occasionem præbet, falsæque dictæ Pleuritidis alteram speciem, quam pituitosam vocauimus, constituit. Præterquam, alia quæ à pituita à capite delapsa in succingentem, illicque inflammationem excitante, oriatur (sicuti eam descripserunt, pituitosamque ideo appellarunt) non inuenitur: cum omnem inflammationem uti mox ostendetur, à sanguine fieri necesse sit.

Inflammatio in pulmonibus plerumque facta, aliquando & in succingente annexisque illi partibus, vel etiam in intersepiete membrana: hisce partibus vel simul cum pulmonibus, vel separatim inflammatis, prout has vel illas sedes occupat, Peripneumoniam vel Pleuritidem veram, vel illam, quam priuatim Succingentis pleuritidem vocauimus, vel solas vel inuicem commistas inducit. Quod quâ ratione fiat, explicabimus.

Inflammationem tunicæ succingentis, pleuritidem veram, pulmonum vero peripneumoniam efficere communis est opinio. Nos. verò non tantum in peripneumonia,

Defluxio pituita, causa Pleuritidis falsæ, Pituitosa appellata.

Inflammatio pulmonum causa Pleuritidis veræ, & Peripneumoniam. Inflammatio tunicæ succingentis, causa Pleuritidis succingentis dictæ.

verum etiam in pleuritide quam veram vocant, pulmones inflammatos fuisse, præterquam quod in mortuis aliquoties pectore aperto spectauimus, vt vel solum hoc ad sententiæ nostræ veritatem cōprobendam posset sufficere, etiam rationibus hisce certis, sic se habere euidenter possumus demonstrare. Quod sanguis quem tam subito excreat, à tunica succingente inflammata, tam citò præsertim, per pulmones illiusque vasa ad expuitionem penetrare, nec suppuratā eā, pus ex eo loco transitum sibi per pulmones, illis non læsis aut vlceratis facere, & sic ad excretionem vsque perferri minimè potuisset: sed potius si inde emanaret, in thoracis cavitatem deflueret, atq; illic empyema gigneret. Quæ proin cum in pleuritide statim & copiose interdum excernatur, vt in peripneumonia, hæc à pulmonibus prouenisse, nec aliunde eò peruenire potuisse, satis declarant. Sicuti & accidentia reliqua vtriusque affectui communia, eadem sedem affectam, pulmones scilicet, ambobus esse, luculenter ostendunt. Vnico hoc excepto, quo & solum ferè pulmones in pleuritide nō inflammari vt crederent & docerent fuerūt moti: quod nimirū dolor punctorius, qui in pleuritide manifestus est, in peripneumonia obscurus, vel nullus non possit propter pulmones affectos accidere, quippe q in parte sentiēte & membranosa, cuiusmodi pulmones minimè sunt, tantum fieri queat. Cæterum nec hoc, etsi punctiones hæ, succingētis membranæ causā accidāt, pulmones propterea minùs inflammari in pleuritide quàm in peripneumonia, cui in ceteris omninè similis est, sufficienter euincere, sed hoc saltē inde effici potest: quòd nimirum si (vti & res reuera habet) pulmones tantum inflammantur, quod in vno latere, cum pulmones distincti sint mediastino, plerumque accidit, magisq; circa interiora quam externam ipsorum superficiem, peripneumonia fiat, in qua nullæ pūctiones sentiuntur. Quòd si verò circa ambitum pulmonum, ipsarumq; tunicā inflammatio sit, ipsius tunicæ causā, punctiones aliquæ cum nō sit pulmo omninò insensibilis, sed leniores sentiantur. Sin autē adeò ad exteriora vsq; extendatur inflammatio, vt pulmones per sam-

plus iusto distenti, præsertim quādo inspirato aëre exsurgūt & dilatātur (quò tempore solum punctiones sūt) fibris quibus succingenti connectuntur & continuātur affectis, eam, etsi minimè inflāmata sit, à thorace (vti de flatibus diximus) auellant, tunc & punctiones hæ in latere sentiuntur: quæ grauiorres fiunt, cum per consensum pulmonū inflammatorum, hæc quoque aliquid patitur, incalescit & nonnihil intumescit.

Id autem ita fieri, succingentemque tunicam quoque inflammari posse nō negamus, vti & vicina illi perioestia: (quæ tamen separatim nonnunquam inflammari, indeq; priuatam aliquam pleuritidis speciem nasci, vti aliqui scripserunt, cum adeò pertinaciter succingenti vbi costis illa obducitur hæreat, concedere minimè possumus) quod tamen cum sit, nō inflammatis simul pulmonibus, pleuritis illa quæ vera dicitur nō erit, in qua cruentæ & purulentæ sunt per sputum excreationes, cum succingens eò se exonerare minimè possit, sed illa eius species, quam peculiariter Succingētis pleuritidem nominauimus. In qua, si magna præsertim sit inflammatio, sine dubio etiam pressio thorace, dolor nonnihil exacerbat, & ad exteriora se aliquousq; extendit, cum inflammatio tunc adeò in tenui succingente membrana vel perioestij collecta, subsistere nequeat, quin ad musculos illi connexos quoque se dilatet, & proin extrinsecus etiam cum thorax adeò spissus nō sit (vti & peritonæo inflammato videmus accidere) tactu percipiatur. In qua insuper specie, si inflammatio suppuratur, extrosum potius abscessus, quàm introsum vergit, illicque se aperit: vel si is in interioribus persistens illic disrumpatur, pus in cavitatem pectoris potius, quàm pulmones, ad quos tam citò perferri, eosque penetrare minimè posset, effundit.

Verum enimvero hoc ita euenire, vt hæc comprobant, sic & verisimile videtur, si succingens pulmonum inflammatorum causā simul inflammetur, & vtriusq; partis concurrat inflammatio, discuti tunc eam potius quæ in succingente sit, quam suppurari: cum tanta copia sanguinis tunc in pulmones infusa, in tenui succingente tunica non facile eoli-

342

ligatur: aut si illud fiat, ad exteriora potius ferri, uti ostensum, musculosque illos quoque implere illicque; suppurari. Atque inde est, ut post pleuritidem veram, licet succingens simul inflammetur, nihilque foris appareat, rarius, uti tamen aliquando fit, empyema subsequatur.

Quod & eadem ratione si intersepiens membrana, una cum pulmonibus inflammetur, accidere probabile videtur. In qua quoque veluti diuersa à reliquis specie, & præsertim si eousque tunc procedat inflammatio, ut & ad cordis capsulam & diaphragma, uti aliqui eam descriperunt, usque pertingat, sine dubio grauissima, quæ & vitæ & menti insidiantur, sequuntur symptomata.

Hæ verò inflammationes tam in peripneumonia quam pleuritide vera, in pulmonum aliqua sede accidententes, uti & cæteræ alijs in locis, à sanguine procedunt: Quo cum vniuersus pulmo, in vasis amplis & multis quibus intextus est, redundet, isque propter arterias & vicinum cor feruidior existat, facilius inflammatur, crebrioresque cæteris pro in inflammationibus internis hæ pulmonum inflammationes existunt. Quæ à sanguine, uti & reliquæ inflammationes fiunt, quando is è vasis suis, vena arteriosa & arteria venosa, non in asperæ arteriæ ramos, effusus (alioquin enim hæmoptoica fieret passio) sed per pulmonum substantiam diffusus, eos adimplens & attollens, gravitatem & compressionem pectoris angustiamque parit, caloreque suo vicinū cor, iam prius febre ferē, uti dicitur, accensum, amplius calefacit, perque tussim, quæ commouet, portione illius in asperæ arteriæ ramos impulsā, sanie primum tenuiore, mox cruore sputū imbuit, tandemque maturatus & calore cæctus suppuratusque, tam diu donec penitus expurgatus, seu ut vocant, expectoratus fuerit, excreatur: illas tamen pulmonū substantiā, alioquin enim eā exulceratā, phthisis, sicuti cum hæc leditur fit, illaque interdū post hos morbos relinquitur, sequeretur. Quemadmodū & sæpè sanguine tantum, uti & alios humores, in pus cōverti, nō suppuratā interim partis substantiā & ulceratā, tū in oculis pure sordidistū alijs purulētis è pulmone alijs de causis factis excre-

tionib., fieri videmus. Sed & euenire potest, ut pulmonum inflammatorum causa, in vicino latere sanguis in succingentem quoque membranā infusus, eam inflāmet, quod tamen non ita frequenter, cum exigua pauca vasa eam peruadāt, venaque illa cui potissimū causam attribuit, azygos dextrum tantū latus perreptet, pleuritis verò sæpè etiam sinistrū latus occupet, accidit: uti verò frequentius, quod pulmonum inflammatorū causā, in pleuritide vera, attractis fibris, succingente membranā tractā nonnihilque; auulsā, hoc pacto, uti dictū, punctiois dolor suboritur. Vnde & pleuritides quàm peripneumoniæ crebriores existunt, cum non adeo sæpè interiora tantum pulmonū, ut in peripneumonia contingit, inflāmentur, sed vterius quoque ad exteriora illorū se extendat inflāmatio, & vicinū latus, ut dictum, afficiat. In quo dolores punctioij eo magis virgēt, quando decubitu in latus sanū factō, suspensus pulmo inflammatus, & pondere suo validius membranā succingentē trahens, amplius vellicat, quàm cum in latus ægrum decumbens, sustentatur, idque eō magis, si hæc quoque, uti dictum, inflāmata sit. In quā si tantū sanguis, alijs de causis influat, eamque inflāmet, nō affectis pulmonibus, alia pleuritis à vera hac diuersa, uti ostensum, in qua excretiones eiusmodi minimè existunt, prodibit.

Quæ omnia cum hoc modo in pleuritide diuersis speciebus accidant, ita & peripneumoniæ, quæ non infrequentes quoque sunt, & nunc per se incipiunt, nunc prægressā pleuritide & postea denique collectā circa interiora materiā, prodeunt, cum cor amplius tunc accendatur, febrem acutam magis procreant, per quam sanguis in superioribus illis locis quoque calefactus, ea rubore tingit, qui & in facie malisque obseruatur. Quod peculiare huius affectus signum esse censetur, forteque in peripneumonia quam pleuritide magis obseruatur, quod cum senibus hic morbus familiaris sit, si illis malæ rubeam, tanquam insolitum in ipsis potius notetur.

Pro varietate autem sanguinis, inflammationes hæ pulmonum generis sunt diuersi. Nam si ille purus fuerit, qualē arteria vena-

lis continet, simplex erit phlegmone: in qua quod expuitur sanguine syncero mixtum esse apparet. Si verò tenuior, feruidiorve sit, qualis in venali arteria existit, phlegmone erysipelatodes dicta, nascetur: in qua febris vehementior: Vti & si syncera bile perfusus, sanguis inflammationem pariat, accidit, sputumque tunc cruentum subflauum redditur. Quod cum frequenter eueniat, causam præbuit, vt peripneumoniam ab erysipelate pulmonum prodire aliqui scripserint. Fit tamen quoque vt si bilis atra fuerit, quæ sanguini dum phlegmonem parit commisceatur, fusca & subatra, sputo cruento quod excreant, commixta esse videantur. Quemadmodum & extra hosce morbos, sputa eiusmodi etiam non cruenta, subflaua, subviridia, subatra excreta, à biliosis humoribus sic colorari cernuntur. Impurus quoque alius aliquo modo sanguis, vitiosis humoribus perfusus, impuram phlegmonem parit. Sed & à crudo, seroso, pituitosoque sanguine, si phlegmone fiat, œdematodes erit: mitiora proferens accidentia, sputumque tunc minus coloratum erit: sicuti in cruda ob id dicta peripneumonia euenit. Verum & pro diuersitate hac sanguinis, si in succingente fiat inflammatio, illa mitiora grauioraue proferet symptomata.

Ab alio humore à sanguine separato, cum phlegmone nulla fiat, non possumus vel pituitam, aut alium humorem defluxione in pulmones delapsam, aut per congestionem illic collectam, veræ pleuritidis aut peripneumoniam causam, vt aliqui fecerunt, pituitosasque vocarunt, statuere: cum si in pulmonibus coaceruentur, alios illius morbos respirationi potius incommodantes, sicuti in illius defectu ostensum, pariant: si in thoracis musculos aut sub succingentem ferantur, falsam nominatam pleuritidem, vt prius dictum, efficiant.

Influxus autem huius sanguinis, phlegmones hæc excitantis, causa plerumque febris est synochus, quæ à sanguine in venis inflammato accesa, portionem illius in pulmonum substantiam effundens, inflammationes hæc illorum, febre hac synochia, à qua ortum traxerunt, comitatas, parit. Et

proin eadem causæ, quæ synochorum sunt februm (quas in febribus illis explicauimus) etiam per consequens harum sunt inflammationum. Inter quas crapula & vinolentia, quia plenitudinem accersunt, sanguinemque calidiorem reddunt, febrium synochorum in adultis vt & in senibus, illis qui genio indulgent, per frequentes causæ sunt, idè & peripneumoniam & pleuritidis causas præcipuas statuunt: & proin à vino, vt & ab esu carnum frequenti & pingui, præsertim piscium, vt anguillarum, mugilum, peripneumonias nasci docuerunt: cum & à pinguibus cibis sanguis pinguior redditus, eò facilius inflammetur: nisi & iam dictorum piscium caro, peculiarem vim, vt lepus marinus pulmones exulcerandi, sic etiam hæc inflammandi habeant. Vnde & verno tempore ac cœli constitutione eâ, quæ synochi hæc febres regnare solent, inflammationes eiusmodi frequentius accidunt: in illis præsertim naturis, inter quas & senes comprehendimus, quæ synochis ob causas dictas, non solum erysipelate externo comitatis, sed & huic quæ peripneumoniam profert, sunt obnoxia.

Quæ inflammationes in pulmonibus potius quam alibi sunt, si causis illis quæ synochos accendunt, adiuvans accedat dispositio pulmonum ad suscipiendum apta: Quæ tum naturalis est, vt dictum, sanguinis in illis copia & caliditas, ipforumque substantiæ raritas: tum aduentitia, imbecillitas, à morbo ipforum contracta, præsertimque si propter ipsam, tussiendo multa passi sint.

Quod & referuntur aliæ causæ, sanguinem vt ad pulmones copiosius feratur, vel è vasis elaboratur, concitantes. Quales sunt intemperies ipforum calida: ab aëre calidissimo attracto, ira, vel morbo calido, vt febre aliqua contracta. Frigus quoque extrinsecus pectus, vel per inspirationem aëris frigidi, pulmones subito afficiens: vnde venis constrictis quoque hic effluxus fieri potest. Motus item nimius, per validam exsufflationem. Dolor circa pectoris regionem. Aut alia quæ sanguinem ad pectus alliciunt: vt in ea muliere, quæ iam senescens cum cœcepisset, crescentibus mammis, quæ prius flaccidæ erant, as-

fluenteque eo ad sanguinis generationem sanguine, in pleuritidem incidit.

Quæ tamen causæ, nisi febris, sicuti dictum, accedat synochus, quam & illæ excitare possunt vixdum solæ pulmonum inflammationem efficient, sed hæmoptoicam potius passionem. Aut si inflammationem aliquam in pectoris regione, non interueniente prius febre syncho, procreabunt, musculis tantum & succingente affectis, priuata hisce partibus, quemadmodum ostensum, nascetur pleuritis: Vel si pulmones tunc quoque simul ab eadem inflammentur, in vtrisque, febris quæ inde prodibit, non primaria illa quam synochū vocauimus, & quæ in peripneumonia & pleuritide plerumque illarum, vti dictum, proxima causa existit, atque vnâ mox cum hisce inflammationibus incipit, vel eas quoque præcedit, sed symptomatrica erit. Sicuti in hisce febribus hæc prolixius explicata sunt.

Curatio.

Variat curatio, prout morbus, qui diuersa hæc genera doloris punctorij in pectore parit, est vel inflammatio pulmonū in pleuritide vera, & peripneumonia: vel succingentis, in illius pleuritide: vel distentio à flatu, humoreve, in falsæ dictæ pleuritidis flatulentæ & pituitosæ duobus generibus.

Prognostica Pleuritidis vera & Peripneumonia.
Inflammatio pulmonum tam in pleuritide quam peripneumonia periculosa est: in peripneumonia tamen, quia cordi magis est vicina, deterior. Vtraque, aliàs subito die 4. vel 5. occidit: aliàs 7. vel 8. primū, nonnunquam ad decimum quartum vel vigesimum vsque producta, tamē mortem adfert. Cum ad salutem tendit, soluitur nunc primā septimanā, nunc alterā, interdū tertiā: cessantq; primū punctiones, mox & febris; tandem & purulenta excretio: quæ si supra dictum tempus prorogetur, febrisq; non cesset, sed lenta fiat, in empyema vel phthisim morbum desisse suspicio est.

Cæterum quò nam euasuri sint hi morbi, sequentia indicant: Per tussim, si statim aliquid à pulmonibus inflammatis excreent, quod spuro permiscetur, bonum est: præsertimque si tussi non adeò validā existente fa-

cile propellatur, è contra verò malum. Hoc autem si sanies sit, vel cruor, qualia à parte inflammata, pulmonibus scilicet prodire solent, probatur. Si verò sanguis copiosior ab initio, maximeque diebus aliquot continuis reijciatur, aut semel cessans rursus redeat, pulmonum grauiorem læsionem portendit. Quò citius autem saniosum sputum purulentum, album coctumque euadit; & quò facilius copiosiusque tunc expuitur, eò est melius: nisi tantā copiam reijciatur, vt sicuti aliquoties in peripneumonicis morituris accidere vidi, peluim adimpleat, quod inflammationem maximam fuisse, magnamque supurationem inde subsecutam, & proin mortis imminētis signum est. Purulenta expuitio etsi subflaua sit, nondum est, nisi admodum flauescat, mala; quæ virescit deterior est; eoque magis si atra sit: quæ alba tenax & pellucida, morbum prolongat. Quæ à sanguine puro sit inflammatio, mitior est; quæ à bilioso vel impuro, deterior & breuior; longior verò necita acuta, quæ à pituitoso sanguine nascitur. Quæ alios morbos sequitur diuturnos & acutos, minus quoque curatur. Quæ senibus & debilibus accidit, peripneumonia præcipue; lethalis ferè existit.

Anhelitus difficultas summa, magnitudinem inflammationis portendit, vel etiam puris magnam collectionem. Quo nonnunquam subito & affatim in asperæ arteriæ ramos irruente, amplius anguntur, spiritumq; cum stertore ducunt, & nisi mox excreent, suffocantur.

Extremorum frigus: Facies collapsa. Pulsus paruus, mortem hic, ut in alijs morbis similibus antecedunt & prænunciant.

Febris si intensa fuerit, calore, siti, vigilijs, periculum auget; mitior minuit.

Delirium si accedat, quod alioquin adesse hisce affectibus minimè, nec ratione febris illius comitis superuenire consuevit, cum sepro affecto hoc contingere soleat, mortale est signum.

Hæmorrhagia narium tum ratione febris, tum reuulsionis causā, in principio morbi obesse nō potest: sed circa finem plus debilitat quam iuuat, immoderata præsertim.

Mictio copiosa, vti & sudores, febrem, si idoneo tempore superveniant, interdum solvunt. Et si purulenta sit mictio, per ea à pulmonibus materiam suppuratam expurgari quoque posse autumant, ac proin per hanc viam pleuritim & peripneumoniam solui. Quod si fit per venam cauam, tanquam viam manifestam, pus à pulmonibus ed deferri potius, quam per alias obscuras venas, à pectore, cum emulgentibus continuas, (quas tanto studio quærunt, seque invenisse gloriantur) quod & in alijs morbis talis fieri possit transitus, indicio est: hoc tamen rarum admodum est, cum etiam in extremè phthisicis & empyematicis tale quid vix deprehendatur.

Diarrhoea cum morituris frequenter pervenire soleat, mortem præfagit. Vix enim de morbi causa aliquid per hanc sedem, vti tamen aliqui crediderunt, expurgari potest. Ab initio si ob alias causas accidat, nec persistat, innoxia esse potest, præsertim si illuiem aliquam quæ febrem augere valeat, tollat.

*Pleuritis
du vera
& Peri-
pneumonia
curatio.*

Curandi autem methodus tam in pleuritide vera quam peripneumonia, in eo versatur, vt sanguinem fluentem ad partem hanc nobilem, varijs modis aliò auertamus, illudque quod influxum est, pulmonesque inflammat, sic præparemus, vt cum sputo per tussim & excretionem expui possit, cum per alias vias, vt vrinas vel secessum hoc educere, nisi natura sponte id faciat, consultum minimè sit. Dolorem interim, qui in pleuritide adest punctorius, leniemus. Pectusque in vtrisque casibus dilatabimus, Viresque conservabimus, Febris nihilominus semper habitâ ratione, sicuti in febribus dictum est: cuius causâ à calidioribus abstinēbimus, ac temperatis & ad frigiditatem aliquam inclinantibus quibusdam potius utemur. Quæ omnia sequentibus curandi modis perficiuntur.

Per venæ sectionem sanguinis ad locum affectum influxus potissimum auertitur, febrilisque calor temperatur, ob quam causâ non temerè erit negligenda: Nec in iunioribus quidem, cum ab ea, sicuti experientiâ compertum, vti nec ab alijs hæmorrhagijs

casu factis, non tam facile, vt creditur, lædantur, sed contra potius in hoc morbo magnâ ex ea emolumentum sentiant: cuius causâ nec in grauidis nec in senibus quoque omitenda: vti neque etsi à sanguine impuro & bilioso fiat, aut dolor ad hypochondria descendat: quorum omnium tamen causâ, moderatè potius erit instituenda, quam omninò intermittenda. Subitò autem dum adhuc in fluxu materia est, facienda, die mox primo: quacunque diei vel noctis horâ: vel si neglecta fuerit, die altero aut etiam tertio: vel vnâ vice insignem quantitatem, vicibus singulis ad uncias sex, si supradicta non, vti dictum, eam temperent, educendo: vel partitis vicibus singulis ad uncias sex, bis eodem die, vel duobus diebus sanguinem mittendo: vel etiam necessitate urgente, tertio etiam die repetendo. Post quod tempus, vel quartum diem ad summum, nisi nouo affluxu sanguinis concitato, morbi augmentum vel noua recidiva timeatur (quam ob causam etiam post plures dies, si hoc fiat & vires consent, repetita proderit) non temere venæ sectio vel incipienda aut reiterenda.

Venam autem in brachio, iuxta cubiti anteriorem sedem (cum maiores illic sint venæ locoque affecto proximiores) incidere oportet: eamque quæ vel in medio illic fertur: vel (quod satius est) quæ magis turgida conspicuaque existit. Quacunque enim sectâ, siue hoc in dextro aut sinistro fiat latere, à vena caua, cuius elatiori supra cor sede, brachij venæ continuantur, sanguine deriuato, per consequens etiam à cordis dextro sinu, in quem vena caua antequam ascendit, aperitur: & sic quoque ab arteria venali, per quam à dextro sinu in pulmones sanguis influit, consecutione hac, sanguis à pulmonibus inflammatis reuellitur. Nisi fortè, quia vena caua dextrum latus magis occupat, dextroque cordis sinui sanguinem infundit, venamque sine pari, dextro lateri tantum propagat, restitutione seu *scilicet* hac vasorum obseruatâ, in dextro brachio venam tundere, magis consultum esse censeatur, quod in peripneumonia fieri debere plerique docuerunt, atque in pleuritide etiam aliqui hoc semper rectè fieri,

feri, scripserunt. In qua tamen pleuritide, quia latus dolet, à brachio eiusdem lateris sanguinē detrahare potius, quam ex opposito (vti verò Arabes ex aduerso latere primum reuulsionis, mox ex eodem deriuationis causâ sanguinem emittunt) vilius censebitur; non tam rectitudinis vasorum occasione, quæ tunc lateris affecti causâ magis obseruatur, cum in pleuritide pulmonibus quoque vti dictum affectis, vt in peripneumonia similis venæ sectio, competere possit: sed quod in pleuritide, ob dolorem dolentis lateris, venæ magis quam sani lateris sanguine impleantur: quo nomine si in dextro latere dolor sit, tunc hâc ob causam, tum ob priores, in dextro brachio venam aperire multas vtilitates adfert, si in sinistro, propter affluxum sanguinis à dolore concitatum, ab ea parte sanguinem reuellere conuenientius erit. In manibus quoque, si cubiti vena vel non inueniatur, aut alioquin secari commodè non possit, venâ apertâ in latere conuenienti, vti dictum, vices alterius geret: per quam, si sanguis admodum fluat, maior fiet reuulsio, minor, si lentè procedat. In pede quoque iuxta malleolum vel circa digitos vena incisa, præmissâ præsertim sanguinis in cubito detractione, in mulieribus maxime, quibus menses suppressi, plenitudini huic, è qua affectus hi nascuntur, occasionem præbuerunt, proderit.

Cucurbitulæ scapulis, emunctorijs, inguinibus appositæ reuellunt, eoque validius, si scarificatio accedat: quæ venæ sectionis operationem adiuuant: vel quando eâ vti licet, vices ipsius obeunt.

Frictiones, & Ligaturæ extremitatum diuertunt etiam: Lorioque adhibita cum frictione manuum & pedum ex decocto aliquo, quod tamen corpus minimè calefaciat.

Sunt qui cauterio lateri adhibito, nō satis tutò, nec commodè illud efficere tentât. Vti nec cucurbitulis pectori admotis, quod tamen aliqui vtile esse censuerunt.

Injiciuntur enemata ad aluum leniendam ante venæ sectionem: tum aliàs, si astricta sit, laxantia & refrigerantia, in febribus & alijs internis inflammationibus, vti & in angina descripta hisque similia. Sed & alia cir-

ca finem, si pus à pectore ad secessum vergat (vti fieri posse crediderunt) ne intestina lædat, illud clysteribus abstergi debere, nimis sollicitè docent.

Exhibentur laxantia potius quam purgantia, cum in thoracis inflammationibus cathartica exhibere non conueniat: tum quia per aluū illorū materia expurgari minimè possit, tum quia corpus accendunt & diarrhœa, quæ aliàs facile superuenire nocereq; solet, promouent. Eliguntur autem laxantia quæ & pectori amica sunt: qualis imprimis est Manna, hîc præcipuè commendata.

Dein & Syrupus Violaceus ad ʒ. iij. vel Cassia aut Diaprunis simplex ʒ. ij. pondere: per se, vel cum decocto pectorali exhibita.

Vel sic: R. Prunorū dulc. Passul. enuel. an. ʒ. j. florum Viol. p. j. coquatur, in col. dissolue Cassiæ ʒ. ss. Mannæ ʒ. j. fiat potio.

Post septimum ad fortiora purgantia venter transibant, præparato prius humore: quæ tamen in falsa pleuritide potius, vti dicitur, locum habent, vel si iam cessarit vera pleuritis, propter alia accidentia, quæ restât, vel si superuenerunt vsurpata proderunt, aliàs magis nocent.

Propinantur per os expuitione promouentia seu sputū facilitantia, Expectorantia dicta, cum per aliam viam humor pulmonibus, nō succingenti tunicæ impactus, rectius euacuari nequeat. Hoc autem perficitur illis quæ vias leniūt: & materiâ ab initio incrassando, vt sanguinis influxus aliquo modo compefcatur & si tenuis sit, ad excreationem aptior reddatur, & vt vocant præparetur, efficiunt: Postmodū verò ea exhibendo, quæ eandem concoquant, abstergant, & si tenax sit nihil quoq; incidant, portionemq; illius resoluant: Vel si in pus conuertatur, quæ illius maturatione & excreationem promoueant, ne si diutius hæreat, pulmonum inde corruptio phthisiq; sequatur: vel si natura per urinam & secessum illud euacuare tētet (quod rarum & fortè imaginarium) quæ hunc naturæ conatum promoueant. Quæ omnia frequentibus modis præstantur.

Eclegmata, aliaq; quæ sensim deglutiuntur, cum vires suas pulmonib; affectis rectius sic communicent, eo nomine primas tenent.

Vt tabulæ vſitatae Diatragach. frig. & Diapenidij ſine ſpeciebus, ore donec ſponte fundantur, retentæ vel comestæ.

Vel ſi ex tabulis hiſce vel ſpeciebus ipſarum, cum ſyrupo Iuiubino vel Violaceo eclegma fiat, illudq; ſenſim lambatur.

Aut ſi tale paretur: R. ſpec. Diatragach. frig. 3. ij. Penidiar. 3. j. excipiatſur ſyrupis prædictis, fiat looch. Additur interdum Diacodium ſimplex, ſi tuſſis admodum vrget, ad 3. ſ. Conſeruam Violarum aliqui, non aded tamen commodè, cum lambi debeat, permifcent.

Horum loco tale eclegma fieri poterit: R. Penidiar. 3. j. nucl. Pinearum, Amygdalar. excortic. an. 3. ij. medullæ ſeminum iij. frig. mai. ſ. Papau. albi an. 3. j. Amyli 3. ſ. ſucci Liquiritiæ 3. j. gummi Tragach. & Arab. an. 3. ſ. infuſorum in aqua Violac. donec benè intumeſcant, pulpæ Paſſul. 3. ſ. miſceantur, fiat eclegma: cui ſyr. de Papau. vel Diacodij 3. ſ. permifceri poterit. Et feminis Maluæ & Bombacis an. 3. ſ.

In progreſſu morbi, declinante febre, vtimur tab. Diaireos. ſimp. Diapenid. cum ſpeciebus, looch de Pino.

Vel ſic: R. looch de Pino 3. ſ. ſpec. Diatragach. 3. j. ſpec. Diairis 3. ſ. Penid. 3. ſ. excipiantſur ſyr. Capill. ven. & de Liquiritia fiat looch Conſeruam Capill. ven. quoque interdum addunt.

Vel ſic: R. Sacchari candi, Penid. an. 3. ſ. nucl. Pinearum 3. ij. 4. ſ. ſeminum frig. mai. an. 3. j. radic. Ireos 3. ij. gummi Tragach. infuſi in aqua Capill. ven. interdum & mucilag. ſeminis Cyton. 3. ſ. pulpæ Ficuum. vel Daſyl. 3. ſ. ſucci Liquirit. 3. j. cum ſyrupo de Hyſopo fiat eclegma. Si rad. Bryoniæ & feminis Vrticæ an. 3. ſ. addantur, efficacius erit.

Validioribus adhuc expectorantibus & incidentibus quoque vtimur, quando pus expuunt, ſi illud crudum præſertim ſit & tenax; febreque remittente tamen non ceſſet puris excreatio. Vt looch de Caulibus, de Tuſſilag. de Præſſio, Sano & experto: alijsq; in alijs pulmonum à pituita & pure vijs explicatis alibi præſidijs.

Ex pinguibs eclegmata facta admodum peſtus dilatant, leniunt, ſputumq; faciilitant.

Quod Butyrum, Saccharo albo, cando, vel violaceo in formam looch redactum efficiet; Vel pulſ illa Maialis, Meyenmuſ Germanic. ſumpta.

Oleum Amygdalarū dulcium, vel ſeminis Lini oleum, recentia, ſi ſenſim lambantur, addito Saccharo, vtiliſſima ſunt: & præſertim ſi cum brodio vel decocto aliquo affatim bibantur, dolores pleuriticos admodum mitigant. Quibus & ſuccum Altheæ aliqui permifcent, ſicque exhibent. Oleum Nucū recens, in progreſſu tamen morbi datum, admodum materiam concoquendo, ad expulſionem aptam reddit.

Ex quibus & tale looch formatum cum ſucceſſu ſæpè vſurpatum fuit: R. ol. Amygd. dulc. vel Lini, vel vtriuſque. Oxy mel. ſimp. vel ſcyllit. ſi tenax ſit materia an. 3. ſ. Sacchari candi q. ſ. miſce.

Decocta quoque etſi minùs diu in via hæreant, tamen, tùm ratione febris, tùm enarratæ inflammationis cauſa commodè exhibentur, & hauſtus illorum ſemel in die vel bis quoq; & ſequentibus etiam diebus propinatur hoc paſto:

Hordei decoctum, ſeu vt vocant aqua hordei, ſi incrassandum, leniendum eſt, ex Hordeo excorticato ſeu mundo, vt appellant, & tanto Aquæ vigefies ſumpto, præparatur: Quod ſitum compeſcit, & ſi hordei quantitas augeatur, etiam nutrit: ſi verò abſtergendū magis, ex integro ſit hordeo: Cui decocto, Paſſulæ, Liquiritia, aliaque dulcia interdum ſimul incoquuntur: aliàs Saccharum, ſyrupi etiam, vt Violaceus, Iuiubinus, Capill. ven. permifcentur.

Cum incrassare volumus & expectorare ab initio ſequens detur: R. rad. Altheæ 3. j. fl. Viol. Bugloſi vtriuſque an. p. j. Iuiub. Sebeſten an. par. vj. Hordei mund. p. ſ. quatuor ſeminū frig. mai. an. 3. ij. fiat decoctio ad tñ. j. dulcoretur Saccharo penidiato, vel Syrupis mox dicendis.

Papaueris erratici florum rubentium decoctum, factum in decocto Hordei vel Iuiubarum, addito interdum Saccharo, datum in principio, influxum ſanguinis admodum ſiſtit, inflammationemque vehementer mitigat. Datur decoctum ad 3. ij. repetiturque.

Tandem & in aqua Pimpinellæ & Scabio-
fæ coctum exhibitumque materiam conco-
quit. Decocti loco & aqua illius propinata
proderit. Item si flores siccati, puluerifati,
cum brodio vel aqua Viol. vel alio liquore
bibendi dentur. Nec adeo frigiditatem il-
lius, ut aliqui faciunt, vereri debemus, cum
vis illius attenuandi & digerendi, quam Ga-
lenus ex acrimonia illius conijcit, atque in-
esse testatur, longè aliud, uti & in cæteris
narcoticis, quæ frigida non esse alibi osten-
dimus, demonstrat.

Cum abstergere potius volumus, Saccha-
ri decoctum, seu Hydrosaccharum, aut Aqua
ut dicunt sacchari, conuenit: ex viginti par-
tibus aquæ additis, & ad dimidium coctis:
& si magis abstergendum, sacchari ad qua-
druplum aquæ auctâ dosi: quæ & Cinamo-
mi momento addito maiorem acquirit gra-
tiam, & odore potius grato quàm calore im-
buitur.

Aliud abstergens & leniens, quod diebus
sequentibus bibant: R. rad. Liquirit. 3. j. β. fl.
Viol. Buglosi an. p. j. Ficum paria vj. Passul.
paria x. Iuiub. paria vj. Prunorum dulc.
num. v. Hordei integri p. β. seminum Cuc-
urb. & Melonum an. 3. ij. fiat decoctio ut
prior, addendo Saccharum album & can-
dum, vel syropus.

Cum concoquere & præparare crassam
magis materiam volumus, circa finem pro-
derit Mellis decoctum, Melicratum voca-
tum, seu aqua mulla: quod loco saccharatæ
aquæ in senibus, vel in minus calido mor-
bo, circa finem maximè vsurpari potest: Cui
& alia addi & incoqui possunt. Hoc poten-
tius est, Hydromel dictum, cum magis inco-
quendo feruescendoq; calidius & vinosum,
sicuti arte parari solet, ut maluatium vinum
adaquet, fiat.

Decoctum Cardui benedicti vel Lactei,
vel Leucacanthæ radices, & Anthemidis flo-
rum probantur.

Aliud concoquens & præparans: R. rad.
Liquiritiæ 3. j. rad. Enulæ 3. ij. Capilli Ven.
m. j. Hyfopi & Tragorigani in peripneumo-
nia præsertim an. m. β. florum Viol. Buglosi
alterutrius an. m. j. fl. Anthemidis m. β. Passul.
paria xij. Ficum num. x. Dactyl. num. v.

sem. Melonum vel Cucurbit. 3. ij. seminum
Bombacis, Maluæ & Fœnogræci an. 3. ij. se-
minis Anisi 3. j. fiat decoctio ut prius, & Sac-
charum vel Sapa, vel Mel vel Syrupi permi-
scentur.

Syrupi ad vsum parati vsurpantur; cum
incrassare volumus Violarum & Iuiubinus;
cum detergere, de Liquiritia; cum simul
concoquere, idem, & Capillorum Vene-
ris, addendo Oxymel si tenax sit materia.
E quibus conuenientes, singulis decoctis,
pro vno haustu, syroporum ad 3. ij. permisti
bibuntur. Nonnunquam & in aquis viri-
bus illorum correspondentibus, ut Violarum,
Buglosi vtriusque, Capilli Veneris, Scabio-
fæ, Hyfopi dissoluti, iuleporum instar exhi-
bentur. Vel iulep Violaceum sumitur. Vel
hi syrupi per se lambendo sumpti, illud quo-
que efficiunt.

Aquæ Spinachiae, Cardui benedicti vel
Lactei: florum item Anthemidis, bibitæ,
proprietate iuuare creduntur. Item Lentis
palustris, in peripneumonia.

Hederæ terrestris aqua, si ad 3. quatuor à
pleuritico bibatur, idq; in die quater repeta-
tur, à purulenta materia pectus repurgari, &
ab empyemate & phthisi præmuniri, tra-
dunt.

Potiones aliæ, quibus quædam in sub-
stantia permiscuntur, tum certâ vi, tum oc-
cultâ proprietate, propinatæ iuuant, ex se-
quentibus paratæ.

Dentis apri, Maxillæ lucij piscis, Oculo-
rum cancri, Priapi tauri, pulueres, separatim
simulve, à 3. j. ad 3. j. β. cum Brodio vel Vino
vel Aqua cardui benedicti, Violarum, aut A-
qua mulla vel decocto Hordei aliòve modo
bibiti, plurimum iuuare, experientiâ potius
quàm ratione cognitum. Si cum ol. Amygd.
dulc. vel Lini exhibeantur, præsertimque
Dentis apri scobs, in pleuritide ut & in An-
gina vtilissimum est medicamentum.

Asphodeli, Orchidis, Lappæ, radices vel
flores Lappæ, & Chryfocome, Pulmonaria,
in peripneumonia, Pastinacæ erraticæ, Car-
dii benedicti semina, Auellandarum vel A-
mygdalarum cortices; puluerisata, à 3. j. ad
3. j. β. cum supradictis liquoribus exhibita
probantur.

Centaurei mai. **Aristolochiæ** rotundæ & **Costi** radices, **Agalochū**, **Æthiopim**, & **Trifolij** **asphaltitidis** folia & semen, **Myrrham**, **Bdellium**, **Affam** fœtidam, in lateris dolore, **Diosc.** cum aqua & **Vino** pota commendat. Non nominatâ tamen causâ, dubium proin an in vera vel falsa pleuritide conueniant, vti fortè & multa ex iam dictis.

Experientiâ compertum, sequentia præsertim profuisse in pleuriticis, statimque dolorem mitigasse vel fustulisse. Si **Dentis** apri scobem à ʒ. j. ad ʒ. j. cum oleo **Amygdal.** ʒ. ij. vel iij. aut quatuor bibant. Quod & si cum oleo **Lini** fiat, vt & in angina, sic & in hoc commendatur.

Aliud experimentum: R̄. cort. **Auellanarum**, **Coralli** rubri an. ʒ. j. fiat puluis: Detur cum **Vino** albo, vel **Mulsa**.

Probatum & hoc summo opere: R̄. rad. **Aristoloch.** longæ, **Bryoniæ**, **Pæoniæ**, **baccarum Lauri** an. ʒ. ʒ. nucleorum **Mespilorum** ʒ. j. rasurâ **Eboris**, **Myrrhæ** an. ʒ. ʒ. fiat puluis: Detur cum aqua **Tamarisci** & **Vino**.

Millefolium herba vel radix contusa, & cum **Aceto** exhibita, laudantur.

Resina Terebinthi vel **Laricea**, quouis modo propinata prodest: tum per se, tum diluta cum **Vitello** oui & aqua **Violarum** vel alia. Tum in pilulas cum **Saccharo** cando, puluere **Liquiritiæ** formata.

Pix liquefacta in pilulas redacta & exhibita, abscessum factum aperire dicitur: Quo nomine & semen **Nasturtij** & **Sinapitunc** exhibent.

Flores Sulphuris per se, vel cum **Nitro** purificato exhibent **Chymici**. Item salia **Polypodij** vel **Hypericonis** cum **Vino**.

Ad bibendum potus ordinarij, & imprimis sitis pellendæ, quæ illos affligere solet, gratiâ, tum etiam ad expectorationem facilitandam, aquæ frigidæ & vini loco, quæ hic minimè competunt; decoctum conuenit **Hordei simplex** vel compositum, prius in decoctis recensitum: quod tamen actu tepidulum vel saltem non nimis frigidum, vti omnia quæ bibuntur, esse debet, ne sputum retineant pectusque lædant. Vinum refectiōis potius quam sitis causâ, in summe debilibus, vix tamen ante septimum conce-

ditur, sed moderatè sumptum, dilutum decocto **Hordei**, vel **Sacchari** vt dulce fiat & abstergeat simul.

Alantur interim virium conseruationis nomine cibo, sed tenui: veletia tenuissimo ad dies duos vel quatuor vsque, si perferre queant: eoque qui expectorationem simul iuuat. Veluti solo cremore vel succo **Hordei**, ptisana dicta. Vel emulsione **Amygdalarum**, lacte vocato: dilutiora magis minusve, prout hæc nutrire volumus ea propinando. Vel **Pruna** dulcia, **Passulas** cœctas, addito **Saccharo** exhibendo.

Postea ad pleniorē accedendum, maxime post septimum, aut citius si vires deficiant. Vt **Panem** lotum cœctū, **Panatellam** dictam. Vel **Martium** panem, aliâve quæ ex **Amygdalis**, **Pineis** coquuntur, danda. Iusculisque carniū, contusis & congelatis, coctione, vel etiam (vti probare quoque solent) destillatione præparatorum nutriendi rescindique. Qualia multa in hæctica febre, alibiq; proposita sunt.

Hocque exempli loco adijcitur: R̄. **Caponis** vel **Gallinæ** antiquæ vel iunioris musculos alas mouentes, sterno ipsius instratos: coquantur in aqua, permiscendo in fine aquæ **Violæ**. **Buglossi** alterutrius vel amborum, **Scabiosæ** an. ʒ. ij. vel plus: postea detur iusculum cum **Butyro** recenti, **Salis** exiguo conditum. Cui si pulpa carnis iam cœctæ, contusa & cum iusculo percolata misceatur, efficacius erit, contusum dictum.

Vel si in priori decocto, **Panis micæ** ʒ. iij. simul decoquas, & ad ʒ. j. iusculi addas conseru. **Viol.** **Buglossi**. **Capill. Ven.** an. ʒ. j. v. spec. **Diatrag.** frigid. & **Diapenid.** an. ʒ. j. **Diamarg.** frig. ʒ. ʒ. quatuor sem. frig. mai. mund. seminis **Bomb.** & **Malu.** an. ʒ. j. **Sacchari**, pen. ʒ. ij. & per destillationem liquorem elicias, plus restaurando quam nutriendo vires conseruabuntur.

Vti verò validius nutriet, si **Caponem** præparatum, additâ **Vitulinâ**, in duplici vase tamdiu decoquas, donec ius ab eo effusum congelari possit, sicque per se exhiberi vel prioribus misceri. Vel si succus expressus **Caponis** aspi detur.

Huc & referuntur ex alimentis ea, quæ

357

vt medicamenta potius exhibentur: qualia sunt:

Cochleæ cum decocto Hordei coctæ & comestæ. Matt.

Item si Pomi dulcis pars superior orbiculatim amputeretur, inferior exciuetur, impleaturque Thure masculo puluerisato, repositaque abspecta parte, tanquam operculo, stuppis inuoluta seculigata simul, sub prunis coquatur: vel in fornace hypocausti, & postea comedatur: quod ad pleuritidem sanandam & præcauendam, quoq; vtile censetur.

Eadem ratione Pomum succo Glycyrizæ, Saccharo & Amylo impletum coctumque & deuoratum probatur.

Porriguntur & à quibusdam medicamentis circa finem, si pus à pectore per vrinas à natura propellatur, quæ conatus illius adiuuent, diuretica.

Veluti decoctum rad. Fœniculi, Asparagi, Rusci, Liquiritiæ, Cicerum rub. Capill. Ven. & seminum frigid. mai. Qualia in febribus, cum illarum materiam per vrinas euacuare volumus, proposita sunt.

Nonnunquam & quæ, si ad secessum feratur (quod vix potest fieri) quæ illud quoque abstergant & euacuent. Vti de clysteribus diximus.

Extrinsecus pectori remedia applicata, siue dolor punctorius in pleuritide, aut nullus vel exiguus in peripneumonia existat, conuenire quoque possunt, etsi affectus non in pectore sed in pulmonibus propriè resideat, cum eò quoque horum remediorum vires penetrare possint. Non tamen calida & flatus discutientia experiundi causâ, an vera vel falsa sit pleuritis ab initio, vti aliqui docent, adhibenda, cum hæc inflammationem magis accenderent, & pleuritis vera à falsa alijs signis, citra periculosam hanc experientiam discerni queat. Nec quoque ea omnia vsurpanda, quæ communiter in pleuritide, inflammationi accommodarunt, quam in succingente membrana non pulmonibus fieri crediderunt, & præsertim abscessus causâ, quem illic inde nasci putant, ad eum suppurandum aperiendumque foris adhibere solent: nisi hæc quoq; succingentis inflammationis, pulmonum inflammationi accedat,

vel sine ea per se oriat: sicuti in pleuritide succingentis explicabitur. Sed præcipuè foris loco dolenti, si dolor adsit punctorius in pleuritide ea applicanda, quæ dolorem, qui in pectore ob eas causas dictas sentitur, mitigat, sedant, pectusq; vt liberius expuere possint, dilatant, & simul materiam in pulmonibus concoquunt digeruntque. Quod anodynz temperata vel leuiter saltem calefacientia & relaxantia præstant: vel si dolor nullus adsit in peripneumonia, quæ refrigerando inflammationem simul nonnihil retundunt, & postea eadem quoq; maturant resoluuntq;. Quæ tamen omnia admota actu calida esse debent.

Fotus autem præcipuè cum dolor vrget, locum habent. Qui & ex sola Aqua calefacta, in vesica aliòve modo adhibita, eum mitigant, simulque relaxant.

Magis adhuc hæc præstabit, simulq; concoquet & maturabit, si sequentia in ea decoquantur: R. herb. Maluæ, Bismaluæ cum radicib; Parietarig. an. M. j. fl. Viol. Chamom. Meliloti an. p. j. seminis Lini 3. j. Furfuris p. j. Ficuum paria x. seminis Anisi 3. ij. fiat decoctio pro fotu.

Addi potest & Brancæ vrsinæ & Brassicæ an. M. j. seminum Fœnogr. 3. 6. seminis Maluæ 3. ij. atque in progressu, si calor non sit intensus, radice Liliorum alb. 3. j. 6. & Vini albi parum, penetrationis causâ. Cum dolor admodum vrget, Papaueris folia, capita vel semen, addita eum leuant.

Furfuribus frumenti si sacculus impletur & decoquatur, expressusque apponatur, dolorem mitigat. Quibus & alia ex supradictis decoctis addi possunt, sicque in sacculo, vel prius decocta applicari.

Cataplasmata admota anodyna & maturantia sunt, ex residencia decocti pro fotu, ex pluribus paucioribusve facta, si contundantur, farinaque Hordei p. j. addatur, & Axungię porci, Butyrique rec. an. 3. j. ol. Violacei 3. ij. ol. Amygd. dulc. Chamom. vel de Meliloto vel Anethini an. 3. j. misceanturque.

Vel: R. farinæ Hordei 3. iiii. seminis Lini & Fœnogr. an. 3. ij. cinerum Caulium viridiū combustorū 3. ij. Sagapeni 3. j. axungię Porci, Anseris an. q. f. fiat cataplasma.

Parietaria cum Oleo vel Butyro frixa, cōtusaque & apposita, magnopere laudatur.

Cochleæ decoctæ contusæ, & loco dolenti cum panno admotæ.

Epithema pectori, cum nullus punitionis sensus in peripneumonia adest, non incommodè ex lenientibus & refrigerantibus simul nonnihil, actu tamen quoque calidis, apponitur.

Quod ex decoctionis Hordei P.j. seminũ Cucurb. & Lini an. ʒ.j. fl. Violarum P.j. paratur. Aliòve in hectica febre explicato pectori apponendo epithemate.

Inunctiones lateris sunt ex iisdem, in principio, quæ & relaxando & refrigerando in peripneumonia competunt: R. ol. Violarum, Amygd. dulc. an. ʒ.j. Butyri recent. ʒ.ß. mucilaginis feminis Cyton. vel Lini ʒ.vj. Cereæ albæ parum.

Possunt & olea Cucurbitarum & Lini seminum, recenter expressa adji.

Cum dolor admodum vrget in Pleuritide: R. ol. Amygd. dulc. ol. Chamomel. vel de Meliloto aut Anethini an. ʒ.j. axungie Anatis vel Anseris, Gallinæ vel Capi an. ʒ.ß. mucilag. sem. Lini & Foenogr. an. ʒ.vj. Galbani, Terebinth. an. ʒ.j. Croci ʒ.j. Cereæ q. s. fiat linimentum.

Omentum pingue calefactum, lateri admotum, anodynum est.

Vnguenta & emplastra vřitata, cōuenientia sunt: Resumptium, ex Adipibus, Pectorale, Dialtheæ, filij Zachariæ, Mesuæi.

Post inunctiones, si folium Brassicę parum calefactum & inunctum imponitur, ipsarum actionem iuuat.

Vel si cineribus Brassicę combustæ locus vnctus conspergatur.

Quod si vnguento Dialtheæ prius pectore inuncto, seminis Cimini pulvis postea inspergatur, singulare remedium in pleuritide esse à multis prædicatur. Vti & radic. Ireos pulvis inunctionibus inspersus.

Cubet in ægro latere æger, quia sic minus dolor vrget, capite thoracq; eleuatis nonnihil, vt facilius spirare possit: Caueatq; ab omnibus motibus & corporis & animi violentioribus.

Symptomatum aliorum causâ: si vigilie

vrgeant, hisce subuenitur, illis quæ affectui quoque conuenire possunt, vt Lactæ amygdalino, cum emulsione seminis Papauer. & Croco dato: vel syrupum de Papauere reliquis commiscendo. Aliisve, vt in vigilijs dictum.

Diarrhœa si infestet, cum periculosa, vti dictum, existat, syrupus Myrtinus, qui eam sistit & nihilominus expectorat, exhibendus reliquisque permiscendus. Venter renesque stipticis inungenda: sicuti in deiectione nimia dictum est.

Inflammatiō si in tunica succingente fiat, quæ tunc ad musculos interiores thoracis conuexi, sine dubio quoq; se extendit, quam pleuritidem priuatim tunica succingentis à vera dicta diuersam nominauimus, idq; pulmonibus simul inflammatis eueniat; tunc eadem cura quæ veræ pleuritidi competit, hic quoque, cum ea simul adsit, multaq; remedia quæ veræ accommodantur huic quoque profint, conueniet. Comitis verò huius inflammationis causâ, topica externa, qualia illi, si sola sit, adhiberi decere iam dicemus, tunc quoque ex vsu erunt.

Quod si verò latus tantum intrinsecus inflammetur, non pulmones, tunc reuellentia quoque & deriuantia, per venæ sectionem, scarificationem, cucurbitulas, aliæve, vt in vera pleuritide dictum, locum hic habebunt: Vti & quæ injiciuntur clysmata aut exhibentur alium lenientia medicamenta.

Ea verò quæ expectorationis causâ exhibentur in pulmonum inflammationibus, cum si extra hos sit in thoracis succingente, ad locum affectum peruenire minimè possint, neque materia inde ad fauces penetrare (vti demonstratum) expuique, hic iuuare vt non possunt, sic expuitionem, sreatum & tussim mouendo, latusque dolens sic concutendo potius malum irritabunt. Et proin tunc non ijs quæ sputum mouent, nisi aliud quid accedat, exhibendis, laborandum: Sed ea potius quæ proprietate quadam in pleuritide vera iuuant, illic descripta, hic quoque propinata competere possunt: quemadmodum & illa, quæ ad sitim sedandam, alendumque, in ea exhiberi consueta, illic explicata sunt.

Pleuritis
du seu
Pers.
pneumo-
nia, &
illius
quæ
Pleuritis
succin-
gentis, si
simul
concur-
rant, cu-
ratio.

Pleuritis
du quæ
succin-
gentis
tantum
est tuni-
cæ cura-
tio.

Sed & topica externa remedia quæ in vera pleuritide adhibenda esse descripsimus, in hac quoque specie, cum dolorem sedent, pectus relaxent, materia inque impactam concoquant, proderunt, eoque magis, quod lateri dolenti extrinsecus apposita, loco affecto, proximiora sint, viresque ob id citius rectiusque, quam si pulmones affecti essent, exerant. Proindeque fotus, cataplasmata, inunctiones, vnguenta & emplastra illic exposita, hic quoque vt eadem præstent, adhiberi possunt: maximeque cum & simul relaxando, materiam, vti & in angina hoc consultum esse diximus, ad exteriora euocent, & si inflammation magna non sit, vti ferè in ea sede permanens, nec ad exteriora quoque tumorem proferens (de qua in externis dicemus) accidit, discutiant resoluantque: quod sicut in illa, vt à faucium angustijs cedat, ita hic, vt ab interioribus pectoris extrorsum feratur, ne illic in abscessum conuersa, eo rupto, empyema post se relinquat, fieri maxime debet. Quo nomine & ab initio ab omnibus repellentibus in vtroque casu abstinemus, non quòd hæc pectus astringendo respirationi incommodent, vti communis est opinio, cum adeò illud constringere nequeant, & si externa omninò esset inflammatio, quò minus ijs vti deberemus, hoc minime impediret, sed iam dictam ob causam: ob quam & vt materiam euocemus potius quam repellamus, Cucurbitulæ etiam pectori quandoque opponuntur, aliaque ex alto trahentia: vt Pix malaxata cum oleo calido, additâ resinâ Abiegnâ vel Lariceâ, & tantillo Sulphuris, vel Sapone nigro dissolutò oleis, quæ omnia & simul attractum resoluunt & concoquant, transeundo mox ad relaxantia iam dicta. Quibus si inflammatio euinci nequeat, circa finem calidiora adhuc in thoracis hac inflammatione, vt materiam, si fieri possit, ne in pus conuertatur discutiamus, vel si hoc effici nequeat, sed in abscessum abeat, quæ eum maturant, ac vt ad exteriora potius quam interiora se aperiat, vti tumor auctus ferè facere solet, promouent, secus ac in vera pleuritide, pectori apponimus.

In progressu itaque thoracis internæ in-

flammationis, postquam externis remedijs in pleuritide explicatis anodynis & relaxantibus vsi sumus, doloreque remittente, nondum tamen penitus cessante, vt reliquias inflammationis euocemus discutiamusque, sequentia vsurpanda.

Fouemus latus dolens hoc pacto: R. rad. Liliorum rec. ʒ. quatuor, radic. Ireos rec. ʒ. ij. herb. Maluæ. Marrubij, Calamenti an. M. j. flor. Chamomil. Sambuci an. p. j. fl. Rosmarini p. ʒ. sem. Fœnogr. vel Lini ʒ. vj. semin. Carui, Cimini an. ʒ. j. ʒ. Ficum paria vj. decoquantur in Aqua & Vino pro fotu.

Cataplasma ex residenti decocti contusa paratur: cui adduntur farinæ Fabacæ ʒ. ij. cinerum Caulium ʒ. ij. olei Liliorum ʒ. ij. Mellis ʒ. j. & apponitur. Si Fimi columbini ʒ. j. ʒ. addatur, potentiùs eliciet.

Oleo Liliorum, Irino, Cheirino latus affectum inungitur.

Silana succida hisce oleis intincta applicetur, vel illis superponatur. Vel folium Brassicæ, admodum euocat & resoluit. In quem vsus & Lanam sulphuratam solam adhibitam laudant.

Vel vtantur hoc vnguento, admodum discutiente: R. olei Liliorum ʒ. ij. ol. Irini, Anethini an. ʒ. j. succi Ebuli vel Ceparum ʒ. j. ʒ. aquæ Vitæ ʒ. ij. coquantur ad aqueorum consumptionem, adde rad. Ireos ʒ. j. ʒ. sem. Cimini ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. Galbani, Sagapeni, dissol. in aqua Vitæ an. ʒ. j. Laricæ vel Terebinth. ʒ. ij. axungia Porci, Oesypi an. ʒ. ʒ. mucilag. semin. Fœnogræc. ʒ. j. Ceræ q. s. fiat vnguentum. Cui & Fimi caprini vel columbini si addatur, & Sulphur. an. ʒ. j. potentiùs operabuntur.

Vnguento Dialtheæ si pectus inungatur, semenque Cimini inspergatur, peculiare & hic vt & in vera pleuritide, remedium erit.

Emplastrum Diachylon iteratum pectori admotum idem præstabit.

Quòd si verò post anodynorum vsus, signum dictum, dolor non remittat, sed augeatur potius, & præsertim si contactu dolor exacerbetur, magisque adhuc si tumor extrinsecus aliquo pacto appareat, cum tunc ad suppurationem tendat, quæ eam promoueat, applicantur. Qualia in angina collo-

foris ad mota, hic quoq; apposita proderunt: vti & sequentia.

Fotus id efficiens: R. rad. Altheæ ꝓ. iij. rad. Liliorum ꝓ. j. Maluæ, Scabiosæ, herbæ Vitrian. M. j. flor. Meliloti & Aneth. an. ꝓ. j. Ficuum paria vj. sem. Lini ꝓ. j. fiat decoctio in Aqua vel Lacte pro fotu.

Residentia contūdatur, adde farinæ sem. Lini ꝓ. j. mucilagin. rad. Altheæ & Cydon. an. ꝓ. j. Butyri ꝓ. ij. fiat cataplasma.

Maturabit efficacius sequens & abscessum aperiet: R. Cæparum & Liliorum bulbos, coquantur sub prunis parum, contundantur, adde ad ꝓ. vj. rad. Altheæ puluerisatæ ꝓ. j. farinæ Cicerum ꝓ. ij. fermenti Tritici vel Speltæ ꝓ. j. ꝓ. pulpæ Ficuum ꝓ. j. adde Butyri & axung. Porci q. s. fiat cataplasma. Quod abscessum citius disrumpet, si Stercoris caprini vel Columbini ꝓ. j. addatur, & sem. Sinapis & Nasturtij an. ꝓ. j.

Quod & motus thoracis vehemens, vt citius abscessus rumpatur, per clamorem, sterutationem, vomitionem, sed non satis turō efficiet.

*Pleuritis
diu falsa
& flatu-
lenta,
& Pitui-
tosa di-
cte cu-
ratio.* Distentio in succingente ab humore eō defluxo, vel flatu illuc irrumpente facta, si punctorios dolores in pleuritide pituitosā & flatulentā, ob hæc illorum causas dictā, faciat, ea quæ humorem, si adhuc fluat, à pectore auertere, vel si flatus sint, eos ne generentur, & ne eō ferantur, impedire possunt, vsurpanda, locoque affecto in vtraque causa, quæ hæc discutiat, & digerant & absument, adhibenda exhibendaque.

Diuerfiones sunt per Cucurbitulas, Frictiones, Lotiones extremitatum, aliaque quæ catharos fiunt, in defluxionibus auertendis vsurpari solita, quæ & flatu aliō rapiunt. Venæ autem sectio, non nisi quando ob dolorem summum metuitur inflammatio, in plethoricis tantum, aliàs minimè, locum habet.

Iniecta clysmata stimulantia reuellunt quoque & ad flatu e corpore exturbandos calida, & flatu discutientia injiciuntur, in illisq; Hiera dissoluta plurimum laudatur.

Exhibita purgantia (præmissis si opus sit præparantibus) idem præstant. Non

solum leuiora reuulsionis causā, sed & fortiora ad humores & flatu, qui ab illis prodeunt expurganda, exhibendo. Quod & rectius hic fit, quàm si in pleuritide ab inflammatione nata (vti aliqui in ea quam pituitosam vocant, & ab inflammatione quoque prouenire putant, faciunt) illis vtamur. Et proin hic potius Rhabbarbarum, Agaricus & hisce fortiora Scammoneata, Colocynthidea, & quibus veteres quoque vsi sunt Helleborata, imprimisq; Hiera colocynthidis à Galeno in pleuritide sananda commendata; quàm in inflammationibus internis, in quibus nullo vsu sed damno maximo cathartica damus fortia, vsurpari possunt. Quorum descriptiones passim in morbis à defluxionibus natis, præsertim hinc inde in habitum corporis, vt hic in pectus cadentibus & palpitationibus à flatibus factis, proponuntur.

Vti & alterantium: quæ horum omnium causā propinantur.

In reliquis quæ exhibetur, hic vt in pleuritide vera, expectorantia, nisi defluxio in pulmones quoq; delabatur, propinare nullius erit utilitatis. Ex illis tamen quæ occultā vi iuuant, si modò non siccante & digerente id faciunt, quædam illic descripta, in hisce speciebus pleuritidis quoque probantur, & iuuare possent creduntur.

Quales sunt Aquæ à carduis quibusdam (nisi forte quia pungunt, punctiones sanare posse, occasionem hoc illis attribuendi, præbuerit) exstillatæ. Cardui imprimis benedicti forte ob hanc causam appellati, & Lactei, quem religioso ob id nomine S. Mariæ appellant. Quorum & Semina eo nomine exhibentur: Vel Emulsionem lacteam ex illis expressam: vt & à sem. Cannabis propinant. Vulgus mulierum ex Glacie mensis Martij aquam elicitam in hosce vsus asseruant.

Alia quoque illic proposita, à recentioribus veteribusq; obseruata & descripta, quæ aliā vi potius quàm becchicā in pleuritide iuuant; Qualia sunt ex Dente apri, alijsque animalium partibus & plantis parata, hic quoq; conuenire possunt. Atq; multa ex ijs fortè in hac pleuritidis specie magis quàm in

in vera, cum varia ex illis quæ calida vel sicca sunt, ut in inflammationibus certa ratione, nisi abdita hoc faciant, competere nequeunt, sic manifesta quoque vi non solum occulta hic operantur: atque inter ea præsertim quæ Diosc. in lateris dolore, non nominata illius specie, vtilia censet.

Sed & quæ exhibita pectus dilatando dolores mulcent, ut oleum Amygdalarum dulcium, Lini, assatum propinata, hic quoque proderunt.

Potus autem nomine, Vinum hic, nisi aliud accedat impedimentum, non improbat. Vti & alia in potu & cibo, quæ in defluxionibus & morbis flatulentis usurpantur, hic quoque vtilia erunt.

Extrinsecus quæ lateri dolenti apponuntur, humorem flatumque resolvere & discutere debent, doloremque compescere.

Cucurbitula maior illic cum flamma admodum, humorem & flatum vi tractorice, non calore flammæ, ut putant aliqui (cum non ut pectus calefaciat, sed ut cucurbitula hæreat adhibeatur) evocat, extrorsumque rapit & dissipat.

Calor actualis adhibitus idem facit, qui si blandus fuerit dolorem lenit, si validior discutit absumentque tenues humores & flatum, uti solis calor nebulas. Quod quibusvis pannis, pulvinis aliisque indumentis, integumentis, prius calefactis & admotis fieri potest. Vti & aqua calida, quæ ut adhiberi possit, caloremque diutius retinere, vesicæ, vel in vas æneum infusa, applicatur: Quod ut thoraci quadret, formari debet, id eoque pectorale dicitur. Quæ temperatè calida adhibita, etiam in vera dicta pleuritide, ut illic dictum, dolorem quoque non nihil sedant.

Fotus autem imprimis actu potentiaque calidi validius id præstabit, humoresque & flatum absument. Qui in spongia, philtro, lana, aliisve in hisce imbutis, & ne nimium madeant parum iterum expressis, vel in vesica potius quam vase æneo, cum vis tunc minus penetret, apponuntur, & cum frigescente incipit, repetuntur, vel alio, quod præstare esse debet, permittantur.

Paranturque hi fotus ex decoctis: quale

illud est, quod in inflammatione succingentis cum in fine digerere volumus, præscriptum fuit.

Vel hoc: R. radic. Althææ ʒ. j. radic. Ireos, Galangæ an. ʒ. ʒ. herb. Calamenti, Absynthij, Origani, Thymi an. m. j. florum Chamomel. Meliloti, Anthos, Stechados an. p. j. feminum Carui, Cimini, Fœniculi an. ʒ. ʒ. feminis Fœnogræci vel Lini ʒ. j. baccarum Lauri ʒ. j. ʒ. conqassentur, decoquantur in Aqua & Vino, pro fotu.

Singulare experimentum in omnibus laterum punctiōibus cuiusdam hoc est: R. aquæ seu spiritus Vini ʒ. vj. Camphoræ ʒ. j. ebulliant parum, donec camphora dissolvatur: adde dum adhuc feruet Santali odorati pulverisati ʒ. j. ʒ. madesiant hoc liquore panni & calidi applicentur.

Sacculi ficci, calefacti, præsertim in flatibus dissolvendis hic in usu sunt; Hicque fere in usu est: R. Furfuris, feminis Milij integri, cuius loco & semen Panici & Avena sumi potest an. p. ij. Salis ʒ. j. fricentur parum in sartagine, sacculoque imposita calida lateri applicentur: sæpeque, ut de fotu dictum, reperantur vel permutentur. Meliusque operabuntur, si vino dum torrentur parum conspergantur, addendo interdum etiam parum Aquæ vitæ, aliquando & Acetum album ad penetrationem.

Efficacior hic erit: R. baccarum Lauri p. j. bac. Juniperi p. ʒ. feminis Carui, Cimini an. ʒ. j. feminis Fœniculi ʒ. ij. herb. siccarum Hyssopi, Satureiæ, Thymi, Origani, Maioranæ an. ʒ. j. fl. Rosmarini, Chamom. an. ʒ. j. ʒ. radic. Ireos ʒ. j. Salis ʒ. ʒ. fiat pulvis pro sacculo: vti prior administrandus.

Residentia decocti, ex quo fotus parari diximus, si in sacculum fundatur, isque inter duos orbes, ne madore stillat, exprimatur, & sic calidè applicetur, idem efficit.

Cataplasmata quoque ex illa residentia facta, eadem ratione, ut in fine succingentis inflammationis docuimus, hic quoque proderunt.

Præsertimque si farinæ sem. Carui & Cimini an. ʒ. vj. quoque addantur, oleique Rutæ & Irini an. ʒ. j. Fimi columbini vel caprini ʒ. ʒ. Vitelli ovorum num. ij.

Qui.

Quibus oleis & vnguentis illic quoque expositis, & hic latus inunctum, præcipue si vt illic quoque dictum sem. Cimini postea inspergatur, quod in omnibus causis omnes probant, ad humores absumendos & status discutendos, vtile existit.

Quod & ceratum hoc applicatum faciet: R. Thymi, 3. j. β. Spicę, Gariophyl. Santali rubri an. 3. β. Styrcis calam. 3. j. Cerę rubr. 3. j. β. axungię Porci pauxillo subigantur, fiat ceratum rotundum. Cui & rad. Iręos 3. j. addi potest.

Emplastrum de baccis Lauri per se, malaxatum sacibus ol. de Lilio, & applicatum proderit: Vel permixtum cum æquali portione prædicti cerati.

Vel hoc: R. gummi Opponacis, Galbani, Serapini, Sagapeni an. 3. ij. dissoluantur in æquis partibus aquę Vitę & Aceti albi, adde pulueris feminis Cimini 3. β. sem. Carui, Seseleos, Leuistici an. 3. j. Rutę fol. sic. 3. β. Sulphuris 3. j. subigantur oleo Rutaceo vel de Pulegio, additā paucā Laricę Rini fiat emplastrum.

Alia applicatio ex Mellis & ol. Absynthini æquis partibus inuicē parum coctis subactisque facta conuenit.

Huc & multa remedia referri possunt, in externis doloribus, qui in habitu corporis ex defluxionibus vel flatibus prodeunt, explicata.

DE CORDIS DO-

LORE.

CAPVT XI.

Genera.

Cordis
dolor,
Cardial-
gia Ven-
triculi
seu Sto-
machi
dolor.



CORDIS dolor Cardialgia, Hæstec Stomachi dolor, seu Ventriculi ille communiter appellatur, qui proxime sub pectoris anteriore sede in molli & nuda, illic vbi costę ab inuicem dehiscunt regione, quę fouea cordis dicitur, occurrit: ad sinistrum latus & dorsum vsque protensus. In quo loco præ omnibus alijs dolores frequenter oboriuntur & molestiæ. Qui primum variant: quod vel non consueti, vel consueti

existunt. Non consueti dolores sunt, qui de nouo superueniunt: ob causam aliquam nouam exorti: vel in morbo aliquo, cuius sunt symptomata. Quorum genera manifesta, prout sensum diuersimodē mouent, sic statuuntur.

Comprimens dolor vel distendens, quem vulgus Germanorum, Compressionem cordis, Hæstuckē vocat, Peryodina quorundam, ille est, in quo in dicta cordis fouea pressio quędam vel distentio sentitur: Nunc leuius molestans, nunc grauius angens, cum appetitu ferē prostrato, nonnunquam & nausea, superuenientibus insuper ructibus interdum, aliquando & vomitu, nonnunquam & diarrhœa; quibus etiam leuantur.

Hoc genus per se frequenter oritur a causa aliqua recenti, & vel aliquamdiu permanet, vel post cibum sumptum primum suboritur, eoque digesto remittit. Alias multorum morborum symptoma est. Adeo vt nullus ferē sit, qui non vel dum alio morbo teneretur, aut etiam extra morbum, eum sæpius senserit.

Rodens dolor, Cardiogmos, Cordis rosio & morsus vocatur. In quo erosionis & mordicationis sensus cum punctionibus interdum quibusdam in cordis dicta regione sentitur, accedente nonnunquam compressionis, aliis etiam ardoris sensu.

Quod vt in multis morbis, ita & in sanis alioquin quibusdam & præsertim dum ieiuni sunt, sæpē euenit: alijs ante prandium si illud diutius differant, qui Picrocholi vocantur, quibus eiusmodi rosiones familiares sunt. Cum oris amaritudine, alijsque capitis & visionis impedimentis se plerumque offerentes: sicuti illic quoque ostensum fuit.

Alijs ante cœnam potissimum hoc accidit, si scribendo inclinantes huic sedi, seu vt vocant, ventriculo incumbant, tunc eiusmodi incommoda sentiunt, appetitum quę omnem cœnandi amittunt. Qui & hoc metuentes, stantes ante pulpitem altius erecti legendo vel scribendo, hoc vitium præcauent.

Sed & summo mane antequam è lecto surgunt, hoc quibusdam contingit, si vigilēs diutius

Comprimens vel distendens cordis dolor.

Rodens cordis dolor seu morsus, Cardiogmos.

Picrocholi.

diutius iaceant: quod tamen postquam surrexerunt, aluumq; reddiderunt, aut flatu, mox iterum remittit. In aliis verò hoc primum postquam surrexerunt, subito accidit, & sternutatione ilico facta, iterum euanesceat.

Nec solum ieiunis, sed & post cibum, illius immoderati & prauis vsus causâ, rosio hæc cum compressione sæpenuerò accidit. Cuius priuatam quandam speciem Bairus statuit: si post cibum cum compressione sensu & summa anhelitus difficultate, frigore corripiantur, pulsusque debilis sit; atque ratione causæ, Conuersionem cibi in phlegma, hunc casum vocat: cuius & Galenus meminit.

Sed & omni tempore, aliis etiam de causis, sicuti in illis explicabitur, cardialgia, qualis ante vomitionem ventriculum affligere & perturbare solet, molesta interdum est. Vti & alia, quæ ab externis iniuriis, frigoreque imprimis, vti dicitur, prouenerit. Vel quæ ab assumptis ventriculum grauiter lædentibus cum punctione simul euenit. Cæterum huic doloris generi, si animi defectus aliquis accedat, vti sæpe fit, tunc & priuatim, vt in animi defectu dictum, Cardiacæ dicitur.

Ardens dolor, qui calore vehementi ac veluti vrendo molestat, etiam sanis alioquin sæpe molestus & frequens esse solet, tum cibo sumpto, tum ieiunis accidens.

Inter quos frequens ille est, in quo cum eructare volunt, vehementem ardorem sentiunt, intercluso veluti aëre flammeo in gula, nec erumpere valente, idque post cibum sumptum præsertim, corporeque validius per equitationem aut cursum, aliumve motum validiorem tunc commoto: quem affectum Germ. Sodr vel Sutt, quod ebullitionem significat, vocant: nosq; Ardorem ventriculi ebullientem vocare possumus: cuius etiam mentionem in eructandi difficultate fecimus.

Multorum morborum ardens dolor quoque est symptoma: Imprimisque priuatus quidam & summus dolor, ac veluti inflammans in morbo ventriculi graui (vti dicitur) occurrit, pungens, distendens & pulsans, qui cōactu illius loci & pressione exacerbatur, & in dorsum vsque protensus, ac si

cingulo corpus illic stringeretur, ardeat, scapulasque deorsum trahere videtur. In quo deglutitio & eructatio non sine labore doloreque fieri possunt: Dispnoea adest: Respiratio cita & parua ducitur. Febrisque interdum illi comes continua: cuius causa pulsus citus vrinæque tinctæ sunt: Cruentumque nonnunquam aliquid aut pus euomitur. Qui affectus Inflammatio vel phlegmone ventriculi, à morbo vnde prodit, vti dicitur, appellatur: & Apostema ventriculi à multis vocatur, licet si in abscessum abeat, rectius tunc sic dicatur.

Alter quoque ardentissimus dolor, cum vomitu aliisque accidentibus periculosis simul tunc infestantibus, accidere potest: ex morbo alio ventriculi, erysipelate scilicet, sicuti in causis dicitur, obortus, & Erysipelas quoque ob eam causam appellatur.

Consuetus dolor seu molestia, in cordis regione dicta, sæpe & leuem ob causam recurrens, Cardiacæ ad differentiam cardialgiæ (sicuti capituli dolores hoc pacto quoque distinguuntur) dici potest. Suntque duæ illius species, pro diuersitate naturarum, quibus hæc accidere & consuetæ esse solent, distinctæ, & ex eo potissimum cognitæ, quod in aliis appetitus est languidior, in aliis verò vehementior.

Languidiore appetitu constantes naturæ, aliisque accidentibus, quæ a concoctionis imbecillitate prodeunt, ventriculi doloribus cōsuetis obnoxie sunt, qui cōprimendo & distendendo, grauiusque interdum quoque vt rodendo molestant, & leni assumptorum peccato, aliarumve externarum, vt frigoris præsertim occursum, contra quod ventriculum perpetuo munire coguntur, excitantur. Qui dolores, cum à causa, quæ est Imbecillitas ventriculi, oriantur, sub eo quoque describuntur, eodemque nomine appellantur.

Vehementioris appetitus naturæ, auidiusque ob id cibos appetentes, eoq; se implentes, ventriculi dolores eos facilius patiuntur, cuiusmodi à causis eum vellicantibus & irritantibus rodentes & ardentes, vt in causis explicabitur, contingere solent. Qui vt in illis à vehementiore tantum excessu fiunt, sic

iusdem etiam ob leue commissum, acrisque alicuius cibi aut falsi vsus contingunt familiaresque sunt. Qui dolores pro ratione causæ itidem, sub Calidâ constitutione describuntur, necdum aliter nominantur. Germ. & symptoma & causam exprimentes, *Heißhungerig* eos vocant.

Causæ.

Locus seu pars, quæ in sede dicta, quam cordis regionem vulgò appellant, afficitur & dolet, non est cor: cum neq; huic subfit, neque cum insensibile sit, vt aliàs ostendimus dolere possit. Sed vel ventriculus, qui eam sedem occupat: vel coli & septi transuersi portiones eouque pertinentes.

In ventriculo causa cordis doloris.
Ventriculi potissimum causâ hanc sedem ad sinistrum latus vsque occupantis, cum sit admodum sensibilis, illiusque maximè introitus superior, quem stomachum vocant, propter insignes neruos quos recipit, exquisitissimè sentiat, hi dolores eo in loco prodeunt: illiusq; maximè orificij causâ quod cardiacan, cor appellant, idque quia cordi vicinû est, cum proximè sub corde descendat, illique statim septum permeans, ventriculo continetur, illius dolores ac si in corde fierent, sentiuntur, cordique veluti communicantur, cum si graues sint, syncopem, vt in cardiaca dictum, inducât. Dolores hi proin, & quicunque in hac sede sunt, cordis dolores seu Cardialgiæ vocantur. Facile itaque propter eximium hunc illius sensum, cum ventriculus afficiatur, illudque frequenter fiat, propter iniurias, quibus cum in eum varia assumantur feranturq; quiaq; foris prominet, expositus est, dolores qui ventriculo accidunt, varij & multi existunt. Qui vel primario, & per se ventriculo affecto contingunt, à causa hos efficiente, morbo scilicet: qui est intemperies calida, frigida, distentio, & aggrauatio, vellicatio, irritatio. Idq; maximè accedente causâ adiuuante: dispositione nimirum ventriculi, quæ facile patitur, qualis est imbecillior aut calidior illius constitutio. Vel per consensum hi dolores ventriculo, neruorum ipsi insertorum causâ accidunt. De quibus singulis hoc ordine quo id faciunt, agemus.

Calida intemperies sola sine materia vix Calida dolorem efficit, cum calidis potius gaudeat *intemperies ventriculi causa cordis doloris.* & iuuetur ventriculus, vel si admodum incalcescat ab assumptis & in morbis calidis, vt in febribus, hepatis calore aliusve, nisi aliud accedat, sitis potius, quàm dolor affligat: nisi ex accidenti, alia interueniente causâ, vt in constitutione calida ventriculi ostendimus, hoc fiat.

Inflammatum nonnunquam ventriculus ita *Inflammatio ventriculi causa Ardens cordis doloris.* accensus, vt è venis quibus abundat, sanguis in substantiam illius effundatur, sequiturque tunc ardens ille dolor, quem inflammationem quoque vocauimus. Quæ nunc pura est: aliàs verò erysipelatodes, si sanguis qui in fluit tenuior calidiorque fuerit, tuncq; maior quoque ardor erit. Rarius tamen in ventriculo inflammatio, cum noxas suas præsentens, statim sursum deorsumq; propellat, & vix dum nisi à causa violenta, suboritur. Qualis confusio ventriculi, dum præsertim cibo turgeat, facta, vna esse potest. Vel si calidissima actu potentiave, vt cantharides, sublimatum, sumpta; eum subito inflament. Potest tamen & ob feruorem sanguinis in venis meseraicis, in febribus, aliisve morbis in eum effusi, hoc sine causa externa accidere. Quæ inflammatio & in abscessum nonnunquam conuertitur, tuncq; dolor augetur, eoque rupto, pus vomitur.

Frigida intemperies ventriculi causa Roderens cordis doloris.
Frigida intemperies simplex, siue humida, siue sicca simul fuerit (etsi hoc aliqui negent) vt nerueis partibus, sic & ventriculo aduersa, dolorem in eo non infrequenter eum parit, qui cum rosionis sensu, accedente veluti animi defectu, sese offert.

Quod ab externo aëre frigido, si nudam ventriculi regionem subito refrigeret, sæpe accidit: in macilentis præsertim, cum hanc sedem non bene integunt, vel dum calent & sudant, apèrto thorace pectus subito denudant, aërique frigido exponunt: vnde grauius ipsos de cordis dolore, vt aiunt, conqueri, animoq; interdum deficere sæpe obseruauimus. Quod & ab aliis frigidis actu subito admotis, vt aqua, integumentis aliisve potest accidere.

A potu frigidissimo, aque præsertim, quæ

373

ferè congelata erat, vel vini, quod glacie imposita magnates summè frigidum reddunt: vel aliis, vt lacte, idem cōtingere potest: idq; præcipuè; si, dum corpus admodum calet, vti ferè illis consuetum, hoc faciant: vnde postea etiam grauiora sequuntur accidentia.

Ab humore frigido, subito & affatim in ventriculum à capite defluente, idem potest euenire, vnde nausea & compressio quoque cum cæteris molestat: vel si vitrea pituita acidave in eum subito irrumpat. Nam quæ sensim in eo generatur, humectando, eumq; sic relaxando, potius imbecilliores ad functiones edendas, quàm quod dolorem adferat, reddit; nisi copia suâ quoq; grauet & repleat: sicuti in eo dolore causa explicabitur.

Distentio, aggrauatio, compressio ventriculi, causa Compressio mæris cordis, nonnunquam & Rudentis. Distentio ventriculi illiusve aggrauatio, vel etiam cōpressio intus forisve facta, compressiūm dolorem illius, vel simplicem vel rodentem quoque nonnihil parit. Quæ à variis causis sequentibus illi euenire possunt. Assumpta, cibis magis quàm potus (cū citius pertranseat, & vt inquit Hippocr. facilius sit impleri potu quàm cibo) copiosius ingesta, ventriculum grauant, distenduntq;: quod notu præsertim cœnâ liberaliore prægressâ, quibusdam familiare est, huicq; sententiæ vulgò receptæ occasionem præbuit: vt sit nox levis, sit tibi cœna brevis. Qui si admodum se ingurgitauerint, septi transuersi liberum motum impediendo, dyspnœam aliquam simul patiuntur: adeo vt & in suffocationis periculum nonnunquam veniant. Quo aliquem fuisse periclitatum, qui panes plures præmio posito, deuorarat, aliamque quandam virginem, quæ castaneis se impleuerat, idem passam fuisse vidi: mulieremque senem, quæ in die paschatis adeo carne & ovibus se ipsam effarferat, exin stam, obseruauit. Idem quoque, si aliud quid duri quod ventriculus concoquere & euincere nequeat, vt sunt lapides cerasorum, affatim deglutiantur, euenit. Vel alia dura corpora ingerantur, sicuti ille circulator lucri causâ, silices deuorare solebat.

Inflatio ventriculi illiusq; causa. Flatus ventriculum implens, distendentem illius dolorem parit, quem Inflationem ventriculi ob flatum vocant. Qui vel in ventriculo ex cibo potuue, crudis, aqueis, flatu-

lentis existentibus, humorēve tali, vel à ventriculi cruditate, aut diminuta vi cōcoquendi nascitur, in eoq; colligitur, ventriculumq; distendit, & si copia simul adsit excrementitij humoris, vnde originem trahit, simul grauat. Ab intestinis si in eum irrumpat, quod tamè rariùs fieri, ex eo cū ructus qui tunc eduntur, non excrementosum, sed acidum aut nidorosum odorem spirent, colligitur, idem quoque accidere potest.

Aër per gulam edelatus ac deglutitus, quod nonnunquam auide bibendo aëremq; simul hauriendo fit, si copiosus esset, illicque subsisteret, idem faceret, sed quia mox iterū cibo ab œsophago in ventriculum delapso, per eandem viam liberâ denud per ructum erumpit, rariùs illud accidit. Si tamen cibo hinc inde confusus, subsistat, vt in sarciminibus, cum carne dum illa intruditur, commisceri videmus, tunc hisce concurrentibus citius grauatur ventriculus & distenditur.

Humor excrementitius, crudus, pituitosus, in ventriculo ex cruditate congestus, vel à cerebro defluxus, non solum si frigidus sit, intemperie suâ, sed & si copiosus sit, eum grauando compressionis hunc sensum præbet, & si in flatus cōuertatur, admodum angit. Quæ cruditas ab imbecillitate ventriculi, vel cibi indigestione proficiscitur. Aqua, si phlegma crudum tale, quale describunt, gignatur, tunc priuatim species illa à quibusdam annotata, quam conuersionem cibi in phlegma vocant, prodit.

Tumor præter naturam durus, magnus, si in ventriculo generetur, vt callus, post læsionem illius remanens (qualem insignem in porci ventriculo bacillo perforato, & in vesica vaccæ contusa ex casu, vidi) vel aliàs scirrhus illic natus, aut durities quædam exorta, eum grauando quoque sine dubio, magisque cibo sumpto, molestat.

Adiacentium viscerum causâ ventriculus quoq; sic afficitur, si ab illis nimium impletis, obstructis, tumetibus, induratis prematur, aut etiam inflâmatissimè simul accendatur, vnde compressiūm aliūve illius occurrit dolor. Qualem in hepatis illi incumbētis, & lienis eidem succumbētis, eiusmodi vitiis, & renibus quoque non procul disitis,

aut septo adiacente, inflāmati, & colo ventriculo substrato & adnato, distento admodum, ventriculus perſentit. Quinetiam frequenter accidit, vt introrſum flexo oſſe xiphēidi, ſicq; ſubſiſtente & confirmato, ventriculus cibo plenus & diſtētus, in illud impingens, ab eoq; preſſus, moleſtiam tam diu ſentiat, donec, cibi digeſtione factā, illerurſum ſubſideat, vel decubitu in dorſum, ab eo retrocedat. Sicuti hoc vitium multis vidi contingere.

Ab externis ventriculo incumbētib; duris aut grauib; idem poteſt fieri. Sicuti non tam muniendi ventriculum, quā corporis gracilis, quod elegans eſſe exiſtimant, ſingendi gratiā, pectoralia admodum ſuffarcinata & ſpiſſa gerentes, hoc incōmodum, poſtquam præſertim ſe cibo impleuerunt, ſentientes, illud, vt ſuperbiæ locum dent, patienter ferunt.

Vellicatio vetriculi, cauſa Rodens cordis doloris.

Vellicatio, vel etiam titillatio ſola ventriculi, conatum ad vomendum, vomitumq; ipſum concitando, ventriculumq; (vt vocant) ſubuertendo, dolorem illum qui hæc præcedere ſolet, procreant: grauiorem diutiusq; in illis perſeuerantem, qui ægrè vomere vel minimè poſſunt, leuiorem in aliis. Sicuti ab omnib; illis, quæ nauſeam vomitumq; excitare poſſunt, & in omnib; morbis, in quib; eiſmodi ventriculi ſubuerſiones adeſſe ſolent, tales cardialgiæ ventriculi gignuntur. Lumbrici quoque in ventriculum irrepentes, eum motu ſuo potius quā ſuſtione, præſertim circa oriſiciū ipſius ſenſiſſe, ſi eò aſcendant, ſic moleſtant.

Irritatio grauis vetriculi, cauſa non Rodens, nūc Ardens cordis doloris.

Irritatio grauior eundem magis adhuc ſubvertit, offēditq;. Quæ à vomitoriis exhibitis diſtis, vehementioribus, & quæ vel vi acri, vel adurente, vel erodente, eum ſtimulant, vt helleborus, ſtibium, præcipitarum, ſimiliaque, procedit. Aut aliàs à veneno aliquo ſumpto, quod venenatā ſuā vi & ventriculo & cordi inſidiatur, atque cardialgiā & cardiacā mox paſſionem ſimul procreat.

Vel à cibo ex ſua natura acri, veluti cæpis, porris, alliis, caſeo putri: vel adurente, naſturtio, ſic prætenuæ, ſimilibusque: poſt quorum aſum, qui calidioribus præſertim ſunt:

ventriculis, ſingultiunt, ruſtant, roſionem ardoremq; ſentiunt. Quod & à cibo, licet per ſe non tali, ſed corruptione primū acrimoniā adipiſcente in ventriculis, qui cibos facilè corrumpunt, euenit: vt à dulcibus, pinguib; rancidis præſertim & humidisq; veluti ouis, lacte, cucumeribus, ſimilibusq; fruſtibus horariis, qui corrupti nō in frigidam, vt exiſtimatur, ſed acrem & bilioſam materiam degenerantes, iſdem tunc accidentibus ventriculum moleſtant. Quæ & ciborum prauitas aut corruptio, in calidioribus præſertim ventriculis, huic priuato ardori, quem Ebullientem vocamus, occaſionem præbere poteſt: ſi ſuccus vel humor ille calidus & ardens, qui inde gignitur, & veluti ebulliē, quod maximè, dum concoctio ciborum ſit, accidit, eoq; magis ſi per corporis commotionem vehementiorem eo tempore ventriculus conturbetur, eaq; quæ continet, inuicem confundantur, è bullis diſruptis halitum ardente, flammæ inſtar, diſſundat. Qui dum per ruſtum erumpere nititur (ſicuti in erudandi difficultate hoc quoq; oſtendimus) in anguſtias ſtomachi oriſici ſenſiles admodum perueniens, illud vehemente vrit, ſed mox, diſſipato eo, iterum ceſſat, rurſumq; nouā expirationē redeunte (veluti in oſſa dum coquitur, bulliente, illud fieri videmus) redit, idq; tam diu, donec concoctione abſoluta ceſſet, aut aſſumptis humidis aliisve, ardor ille reſtinguatur, vel horum permiſſione ſucci huius acrimonia contemperetur & compeſcatur.

At bilioſo humore ac ſtauo & viridi magis adhuc, & denique atro adhuc ampliùs, ventriculus frequenter irritatur, & ſi pertinaciter illi adhæreat, veluti eroditur & vritur, dolorq; Rodens & Ardens oboritur.

Quæ bilis interdum in ipſo vetriculo naſcitur, ex aſſumptis, quæ ob illorum prauum ſuccum, quem in ſe continent, in bilem degenerant, vel ex cibis aliis, qui ex ſua natura multum bilis generant: Vel in illū per duodenum inteſtinum inſuſa, morſiones & roſiones vetriculi, dum ieiunus præſertim eſt, quia tunc faciliùs aſſicitur, in picrocholis conſueras parit.

Quæ si in ventriculi substantiam dalata, cum bile imbuat, diuturnior tunc illius sequetur ardor. Sicuti contingere potest, quando ob contactum bilis vesiculæ, ventriculi regio illi incumbens, & contigua inficitur, croceoque colore tingitur maculaturque, ad interiora illius maculæ crocæa quandoque penetrante: quod sectione in illis sic se habere, quibus ardor ventriculi perpetuo ferè molestinus erat, inuenimus. Quod & illis potest accidere, quibus ferè copiosior in cysti fellis bilis colligitur, eaque diluta magis transudat, & vesiculam perfluit, vicinaque (sicuti sæpe spectauimus) intus forisque inficit. Eoque citius in illis, quibus ventriculus raro vacuus, sed semper crapulâ distentus est. Vel qui, dum scribendo aliudve agendo, dum corpus inclinant, ventriculum ad bilis vesiculam validius premunt, eamque veluti exprimunt: quo tempore & tunc maiores fiunt ardores.

Erysipelas ventriculi

Sicuti & ardentissimus sine dubio dolor erit, & periculosus, si erysipelas ex sincera bile, in substantiam illius infusa, nascatur. Quod quoque fieri posse, morbumque grauem & periculosum, cum vomitione continuo infestantem, ventriculo perpetuo irritato, nasci credibile est.

Ab acutis casu deglutitis, ut spinâ, acuto, vitro fracto, (quod ebrii desperati homines interdum denubus scindentes & cominuentes, studio deuorant) similibusve, si ventriculus punctim sectimve vulneretur: non solum rodens, sed & pungens lancinansque dolor vrget.

Ab aliis malignis & venenatis humoribus in corpore genitis, ventriculus offensus quoque in eiusmodi morbis, dolores patitur, vna cum lipothymiis, quæ tunc superueniunt.

Imbecillior ventriculi constitutio, causa illius molestia, quæ Imbecillitas dicitur.

Imbecillior ventriculi constitutio, Imbecillitas ventriculi appellata (quam alij, si ab intemperie aliqua prodierit, non ea quæ dolorem perse inducit, de qua dictum, sed dumtaxat labefactat, prout illa fuerit, vel frigidam vel humidam, vel siccam stomachi intemperiem quoque appellant) vti seignius ipsius functiones peragendo, & imprimis difficilem & tardam concoctionem, Brady-

pepsiam dictam, & cruditatem inde natam efficiendo, varia inde nata symptomata producit, ut appetitum prostratum, nauseam, ructus, cachexiam similiaque, aliis locis, quomodo hoc fiat, explicata: ita & doloribus, ob excrementorum prouetum, à quibus postea ventriculus molestat, occasionem præbet, quos consuetos Cardileæ nominatæ speciei, Imbecillitatem quoque ventriculi vocatam, constituunt.

Talis autem ventriculi imbecillitas à caloris ipsius insiti seu natiui penuria ab ortu, ab ætate in senibus, quæ & insita est & permanens, proficiscitur. Alias verò à morbis diuturnis, ventriculo sæpe labefactato, ab euacuationibus nimis, & venere, uti vniuerso corpore, sic & ventriculo debilitato, prouenit. Vel à frigidityte & humiditate, unde ventriculus laxior; aut siccitate, unde astrictior, cibos rectè amplecti nequit: quæ intemperies à causis externis internisve, vel morbis, diu vel admodum ventriculi temperaturam in frigidiorē, humidiorē, vel sicciorē, imbecillitatemque ab his causis natam, peruertentibus, proficiscuntur. Sed & organi alio vicio, hæc ventriculi imbecillitas aliquamdiu vel semper durans, nascitur. Inter quæ ipsius tenuitas, ob nimiam & sæpe iteratam illius ex crapula distentionem, nata & permanens, occasionem huic imbecillitati sæpissimè præbet, cum, quò crassior est ventriculus (exemplo auium, quæ, quòd crassimos habeant ventriculos, durissima legumina conficere possunt) eò rectius & citius res quoque concoquat & euincat.

Calidior ventriculi quoque constitutio, Calidior ventriculi constitutio, causa illius molestia, quæ Calidior ventriculi molestia esse dicitur. etsi naturaliter adhuc ab ortu progressa sit, vel postea continuo vsu calidorum, vel quia citius quam par erat, iuuenes illis vtuntur, contracta, vel quòd talis post morbos calidos, veluti empyreuma quoddam relicta sit, quamuis per se, si rectè gubernetur, morbo-
sa nondum existat, tamen, quia ut facile cibi corrumpantur aliqui, & in bilem acresque succos abeant, occasionem dat, per accidens sic cardialgiis iis, quæ ab humoribus illis, vti dictum, nascuntur, causam præbet. Quæ dispositio ventriculi maximè ex eo cognoscitur.

scitur, quòd sitibundi sint, acidis delectentur & iuuentur, dulcia auersentur, illisque offendantur, vt & calidis cibis, acribus, aromatizatis, falsisque; & potu vini meracioris potentiorisque; duros cibos citò concoquant, alios facillè corruptant.

*In nervis
ventriculi,
causa
doloris
ventriculi.*

Nervorum quoque causâ, quibus stomachus circa introitum refertus, & duobus nervorum generibus intextus est, accidit, vt in omnibus ferè morbis dolorem intesum adferentibus, ventriculus per consensum hunc nervorum quoque aliquid patiatur. Vnde & in colicis, nephriticis aliisque; intensis cruciatibus, etiam in procul disitis locis euenientibus: vti & à vulneribus, contusionibus profectis, non solum compatiante ventriculo, appetitum prostratum adesse videmus, sed & condolare, adeò sæpè, vt si ventriculo pleno existente hæc accidant, contenta in eo nonnunquam euomant.

Sed & eorundem nervorum causâ accidit, vt ventriculus sensu exquisitiore quam par erat, præditus, facilius incòmoda, etiam leuia alioquin persentiens, doleat, & à grauioribus affectibus, grauius offendatur, adeò vt ad syncopen ægrum impellat. Dein & ob hunc consensum, in animi grauioribus affectibus, cordis dolor ventriculi quoque offensi causâ euenit, aliæque ventriculi functionum læsiones, imprimisq; appetitus deiectus, sese manifestant.

*In colo
intestini,
no. causa
doloris
cordis
Redditur.*

Coli intestini dolores, illic vbi ventriculi fundo colon attenditur, atque omenti intermedio proximè illi connectitur, facti, ad cordis dolores quoque referuntur: cum eâ in regione quæ cordis esse dicitur, se quoque tunc manifestent. Quemadmodum si à flatibus aut excrementis illic subsistentibus, colon ibi distendatur aut irritetur, accidit, vt si in ventriculo ille esset dolor, vix tamen diutius fixus, sed vagus, qui ad hypochondria & in latera deorsum vsq; excurrit, sentiatur. Veluti & in aliis cordis cruciatibus, eos quoque eò vsque sursum porrigi, & circa ventriculi sedem etiam deprehendi, experimur. Adeò vt coli intestini dolores aliqui, ventriculi esse censeantur.

Hincque fit, vt manè decumbentibus in lecto diutius, nec dormientibus, quia eo tem-

pore alui excrementa, quæ surgentes mox reddere solent, in coli superiori sede retenta, nec propter decubitus descendunt, colon illic vellicant, & per consensum ventriculi simul irritant, & nausea & cardialgia quædam aliquamdiu molesta interdum fit: quæ tamen mox è lecto surgentibus, descenduntibus hisce tunc excrementis, præsertimque flatu aliquo erumpente per aluum, vel excrementis deiectis, cessant.

Atque inde etiam fit, quòd medicamento cathartico assumpto, post horas aliquot cum operatio illius incipere debet, transeuntibus tunc excrementis prauis per coli hanc superiorem viam, tamdiu donec deiectio sequatur, murmura illic sentiant, & grauis sæpe cardialgia, adeò vt in syncopen interdum cadant, affligat, vomitus vrgeat, & cum deiectiones redeunt, repetat. Quæ omnia causam horum in colo intestino, non ventriculo existere, satis demonstrant: cum si in ventriculo illa esset, mox ab initio, dum medicamentum sumptum in ventriculo adhuc hæret, vti quandoque fit, dolor ille, non tunc demum quando diu post vltius cum excrementis ad colon vsq; progressum, versus exitum contendit, suboriretur.

Septo transuerso affecto, cum illud ventriculum non solum posteriore totâ sede tangat, sed & stomacho connascatur penitus, dolores ea in sede, quæ cordis nominatur, interdum quoque se produnt. Cum illud prauis aut multis euaporationibus in incubo, vteri suffocatione, aut alio morbo molestatum, præter dyspnœam quæ sequitur, dolorem, qui cinguli instar corpus in eo loco ambit & stringit, infert: & si ventriculus consentiat, illi quoque condoleret. Sicuti & ventriculi affecti causâ septo impedito, dyspnœa, illius quoque causâ adest.

CURATIO.

Curatio secundum causas instituitur, illisque accommodatur hoc ordine. Primum ventriculi affectibus medendum, unde cardialgiæ diuersæ species functionumque ipsius, & concoctionis præsertim læsiones, cruditasque prodeunt, quorum curatio eadem operâ explicatur. Sunt autem hi morbi, ven-

*His septo
transuerso
causa do
loris Com
pr. mœu.*

bi, ventriculi inflammatio, refrigeratio, diffrentio, inflatio & aggrauatio, vellicatio, irritatio: vel aliàs, ipsius imbecillitas, calidiór que constitutio. Vel affectus per consensum neruorum causâ. Dein ex colo septóue affectis, si illorum causâ cardialgiæ sequantur.

*Inflam-
mationis
ventriculi
curatio.* Inflammatio ventriculi, cum rariùs, & vix nisi à causa violenta accidat, eo maius, cum sit in parte nobili sum meque sensibili, adfert periculum, præsertim si magna sit, cum tunc & dolor grauissimus conuulsio- que interdum sequantur. Cûraturque rectius si resoluator: nam si suppuretur, in abscessum, inde in vlcus versa, nudum inducit morbum æque noxium, qui ægrè sanatur, & quandoque post se duritiem callosam ventriculo quoque incommodantem, relinquit.

Scopus curandi est, vt, si in principio adhuc existit, augmentum illius impediamus, caloremque restinguamus, dolorem leniamus, febris interim habitâ ratione, & animi defectus, quem facillè patiuntur, & vt dein materiam fluxâ resolvere studeamus, quod si fieri nequeat, maturemus, vlcusque sanemus. Quod sequentibus remediis præstatur.

Sanguinis detractio per venæ sectionem in brachio facta, in principio confert: etsi enim à venæ portæ ramis ventriculi venę deriuentur, tamen à venæ cauæ ramis sanguinem extraxisse, quod tû ratione febris, si adfit, conferat, & hoc modo quoque alia fiat reuulsio, iuuabit.

Iniecto clysmate, reuellimus & refrigeramus, doloremque lenimus: cum illud ad colon vsq; ascendens, vires suas ventriculo cui colon proximè subtensum est, cõmunicet.

Purgantia fortiora minimè exhibenda sũt, cum locum affectum, quod statim perueniunt irritando, dolorem vti & intemperiem calore suo augerent. Laxantia tamen temperata in progressu morbi præsertim data, nocere minimè possunt. Vti Cassia, quæ & dolorem simul lenit: pulpaq; Prunorum & Tamarindorum, hisque affinia.

Alterantia potentia acriusque frigida, quæ ab initio dum materia fluida, leuiter quoque asfringere debeat, postea humectare, permi-

stis illis quæ dolorem leniunt, variis modis propinantur.

In cibis vsurpata varia condimenta, quæ in calida ventriculi constitutione vtilia esse, mox explicabimus, & refrigerare, hîc quoque competunt.

Brassica, & imprimis capitata, Rape, Fructusque alij, cocta asseruataque, donec ace- scant, vti condire nostri solent, comesta, calorem admodum restinguunt.

Aqua fontis actu frigida loco potus vsurpata, quam niue & glacie summe infrigidatam exhibere, vti aliqui docent, non satis tutum, cum subitanea hæc repercussio nõ fiat sine periculo. Si, aceto addito, aciditatem aliquam adeptâ sit, ab initio conuenientior erit: & gravior, si Saccharo quoque addito, in Zulapij formam prius coquatur.

Lac frigidum potum idem facit, & dolorem simul lenit.

Lac seu emulsio quatuor feminum frig. mai. dolorem sedat, & calorem contempera- rat. Si semen Papaueris album illis addatur, dolorem magis mitigabit.

Aquam lentis palustris cõmendat Diosc. Conferunt & aquæ Plantag. Rosarum & Acetosæ exhibitæ.

Iulepi item Rosarum & Viol. per se vel diluti dati.

Vel: R. aquæ Ros. ʒ. iij. aquæ Plantag. ʒ. ij. succi Acetosæ vel Vini granat. ʒ. j. Sacchari ros. tab. ʒ. j. ebulliant parum, & colentur: Capiat ad ʒ. ij. pro vice.

Decoctum Hordei frigidum bibitû proderit. Cui, si Violæ, recentes præsertim ad- dantur, efficacius erit.

Vel sic: R. Hordei mundi p. j. vel ʒ. j. ʒ. ʒ. feminum Cucum. excoct. ʒ. ʒ. rad. Glycyrizæ rec. ʒ. j. coquantur in Aqua mens. j. despu- mentur; Et bibat.

Quod cordiale simul esse debet, sic paratur: R. rad. Glycyr. ʒ. j. cort. Citri ʒ. ij. fl. Cordialium an. p. j. fl. Nymphææ p. ʒ. Hordei p. j. feminum quatuor frig. mai. an. ʒ. ij. feminis Portulacæ & Papaueris albi an. ʒ. j. feminis Citri ʒ. ʒ. fiat decoctio ad mensuram vnam, dulcoretur Saccharo, vel Syrupis mox dicendis.

Syrupi per se exhibiti, vel cum aqua frigida aut

da aut alia stillaticia supradicta, sunt conuenientes in principio, qui refrigerant cum astringitione quadā, de Rosis rubris siccis, Cydoniorum, de Agresta, de Ribes, Granatis acidis, de Berberis, vel Rob horum. In progressu qui refrigerant & humectant, vt Violarum, Portulacæ, Nymphææ. Et si hepar simul incaluerit, vti ferè fit, & ratione febris, syrupus Endiuia & Cichorij simplices. Et quia facile animo deficiunt, syrupus de vtroque Bugloflo. Et ad doloris mitigationem, syrupus de Papau.

Ex his talis componitur: R. syrupi Violar. Cydonior. an. 3.j. syr. de Ribes vel Granat. de Endiuia an. 3.β. de Papau. 3.ij. Detur per se, vel dilutus.

Conseruæ & condituræ supradictarum herbarum & fructuum, similiter cōueniunt: vti & carniū Citri, Cucurbitarum & Lactucæ caulium.

Ex quibus & tale conditum potest fieri, refrigerans & cordiale simul: R. conseruæ Ros. 3.j. conseru. Viol. cort. Citri conditi, rob de Ribes an. 3.β. spec. Diamargarit. frigid. & Diarrhodon, Coralli rub. an. 3.j. Sacchari ros. tab. q. f. fiat mixtura.

Ad resoluendum residuum inflammationis seu apostematis ventriculi, vt vocāt, circa finem sequentibus vtimur.

Aqua Chamomillæ cum aqua Endiuia primū propinatur, mox sola ad 3.vj. exhibetur, repetiturque.

Vel: R. aquæ Chamomillæ & Endiuia an. 3.j.β. Vini Maluatici 3.β. vel spiritus Vini destillati 3.j. Detur. Si Olei Vitreoli gutta vna vel altera addatur, efficacius operabitur.

Vel detur iulepus: R. syrupi de Endiuia, de Absynthio an. 3.j. aquæ Mentæ & Enulæ an. 3.j.β. misce, aromat. speciebus Triasantali 3.β. Capiat aliquoties.

Terebinthina lora cum aqua Absynthij, si bis, tēve detur, vel resoluat vel maturat ventriculi apostemata.

Extrinsecus refrigeratiā & anodyna ventriculi regioni apponantur, addendo semper quæ ventriculo robur addant.

Vnguento hoc ventriculus illinatur: R. olei Rosacei 3.j.β. ol. Violacei, Aceti Ros. sacci Hieracij an. 3.j. coquantur parū ad

ad succorum consumptionem, miscendo Santali rub. 3.j. Ros. rubr. 3.β. Spicæ 3.j. Camphoræ 3.β. Ceræ albæ q. f. misce, fiat vnguentum.

Cataplasma hoc conuenit ab initio admodum, ætatis tempore sic paratum: R. fol. Violariæ, Hieracij, Vitis viniferæ an. M.j. flor. Ros. Viol. Consolidæ regalis an. P.j. contundantur, addendo farinæ Hordei seu Polentæ q. f. fiat cataplasma.

Cum dolor, qui admodum vrget, sedandus: R. florum Chamomil. Meliloti, Ros. Violarum an. M.j. Absynthij M.β. coquantur in lacte, contundantur, addo farinæ Hordei 3.vj. seminis Coriandri, Santal. omnium an. 3.ij. olei Chamomel. Anethinian. 3.j. misce, fiat cataplasma.

Fotus talis factus, inflammationem compescit: R. aquæ Rosarum, Plantag. an. 3.ij. aquæ Absynth. 3.ij. Aceti ros. 3.j. Santali rubri 3.ij. fiat epithema.

Epithema hoc in erysipelate ventriculi commendatum: R. aquæ Ros. Acetosæ, Solani, Cichorij an. 3.ij. aquæ Absynthij, Vini albi an. 3.β. Aceti ros. 3.ij. spec. Diarrhodon 3.j. Coralli, rasuræ Eboris an. 3.β. Epithemetur ventriculi regio.

Resoluentia apostema post hæc adhibentur: fitque hic focus cum spongia: R. Absynthij, Mentæ, Hieracij an. M.j. florum Chamom. Anethi P.j. seminis Fœnogr. Fabarum conuass. an. 3.j. Mastichæ 3.ij. Nucis mosch. 3.j. decoquantur in Aqua & Vino, pro fomentatione.

Dein inungitur ventriculi sedes: R. olei Absynthini, Chamomel. an. 3.j.β. Terebinth. 3.β. mucilag. seminis Altheæ & Fœnogr. an. 3.ij. Mastichæ 3.β. Gariophyll. 3.j. Ceræ q. f. fiat vnguentum.

Vel hoc cataplasma: R. Absynthij recen. M.j. Mentæ rec. M.β. contundantur diligenter, addendo farinæ Fabarum & seminis Lin. an. 3.j. florum Rosarum, Chamomil. puluerisatorum an. 3.j. Maceris 3.β. olei Absynthini q. f. misceantur diligenter: Applicetur. Idem facit emplastrum de Meliloto adhibitur, oleo Absynthij emollitum.

Si in abscessum vergat inflammatio, vt is abscessus vestri culis post maturetur, quædam remedia in angina suppurata,

385

inflama-
tio
curatio.

purata, per os exhibita, hic quoque proderunt.

Vbi & extrinsecus adhibita, illic explicata, nisi quodd hic partis nobilioris ratione, quæ eam respiciunt, quoq; adjicienda erunt.

Taleq; cataplasma huic parti tunc admo- ueri poterit: R. rad. Ireos, Liliorum an. ʒ. ij. Absynthij, Maluæ an. M. j. fl. Chamomil. Ro- sarum an. P. j. fiat decoctio in Vino & Aqua, pistentur, adde farinæ Frumenti ʒ. quatuor, far. fl. Lini ʒ. j. Santali cit. ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. olei A- mygd. dulc. ʒ. ij. fiat cataplasma.

Emplastrum Diachylon ireatum, oleo de Mentha malaxatum, idem præstat.

Vt abscessus iam suppuratus aperiatur, ea- dem quæ in angina dicta sunt, assumpta, ad- motaq;e, profunt. Sicuti & hoc: R. farinæ Frumenti ʒ. iiij. Fermenti ʒ. j. stercoreis Co- lumbini ʒ. ʒ. olei de Absynthio ʒ. j. Mellis ʒ. j. fiat emplastrum.

Eundem disrumpit, si vociferatione, ster- nutatione, tussi, frictione ventriculus con- curiatur, maximeque per vomitum.

Si eo apertus euomant, ad vlcera ab- stersionem, decoctum Hordei vel Sacchari bi- bant, addito Melle ros. aliisque in exulcera- tione ipsius dicendis, vlcus sanetur.

Inde ventriculus hisce casibus debilita- tus, roborabitur; de quibus in imbecillitate illius agemus.

Cardial-
gie are-
frigerat
ventri-
culi, cura-
tio.

Refrigeratio ventriculi, si, quia externis iniuriis expositus fuit, aut potu frigido alte- ratus, eueniat, cardialgamque inducat, cali- dis actu potentiaque admotis exhibitisque corrigitur, dolorque sic compescitur.

Quæ omnia, cum & in ventriculi imbe- cillitatis causa à caloris natui defectu (quæ quoque frigidam ipsius intemperiem vocant) conueniant, sæpeque hæc refrigera- tio, imbecillitate ventriculi post se relinquit, illic quo pacto hæc usurpari, diuersisq; mo- dis administrari debeant, explicabitur.

Vti & si ab humore hoc accidat, non so- lum illum refrigerante, sed & grauante: cum & hoc ab imbecillitate illius proueniat, vel eius quoque sit causa, eadem operâ eodem in loco exponetur.

Quod si verò refrigeratio tanta fuerit, vt non solum ventriculus, sed & viscera vicina

per eam adeò alterentur, vt cachexia & hy- drops (quod præsertim, si dum corpus ad- modum calet & æstuat, frigidam affatim bi- bant, euenit) sequantur: quid tunc agendū, suo loco in viscerum læsionibus ostendetur.

Distentio, inflatio & aggrauatio ventricu- li à diuersis causis profecta, cardialgas effi- ciens, prout causa fuerit, curatur.

Nam si à flatu, ex cibo, humore vel debili concoctione genito, inflatio ventriculi fa- cta, dolorem distendentem pariat: cum ad flatuum materiam impediendam, idonea vi- sibus ratione & euacuatione opus sit, & ad imbecillem concoctionem iuuandam, fla- tusque dissipandos, calida ventriculumque roborantia remedia intus forisque adhibita, requirantur, hæcque cum illis quæ in imbe- cillitate ab humoribus crudis & frigidis pro- ueniente, in pluribus conueniant, illic quo pacto huic quoq; causæ accommodanda sint, simul cum aliis remediis proponentur.

Quod si ab aëre cum potu simul hausto, vt dictum, ventriculus distendatur, nisi rur- sum per ructum erumpat, vti ferè fit, eadem ratione, vt de flatu dictum, huic incommo- do medebimur.

Si ab ingestorum copia distentio & gra- uedo eueniens, dolorem compressiuium fa- ciat, concoctione factâ, si concoqui possit, & digestionem, quam exercitium promouet, sponte cessat.

Si verò grauius afficiat, nec ob copiam aut per tinaciam, quod assumptum fuit à ventri- culo euinci queat, vt per superiora illud rur- sum rejiciat per vomitum, vel per inferiora deiciat, clymate aut medicamento procu- randum, ventriculusque labefactatus refi- ciendus. Quæ omnia cum & in aliis quibus- dam vitiis ventriculum debilitantibus quo- que usurpari soleant, atq; imbecillitas ven- triculi, vt etiam nō magna repletio, sed pau- lo plenioris cibi ingestio eum premat, oc- casionem det, omnium horum cura, etiam in ventriculi imbecillitate describetur.

Vti & si ab humore excrementoso crudo- que hæc distentio vel grauedo accidat, cum & ea imbecillitatis, hæcque illius sit causa.

Si à tumore præter naturam duro, veluti à callo, post ventriculi læsionem relicto, vel

scirrhus illic exorto, grauedo in ventriculo fiat, etsi difficillimè hæc auferri queant, & proin semper ponderis aliquem sensum, si præsertim etiam cibi accedat copia, sentiant vti & imbecillitatem, & proin tunc ea cura tantum quæ & imbecillitati confert, sustententur: Tamen cum horum tumorum suspicio est, tentandum mox emollientibus remediis eos emollire, & si fieri potest, absumere.

Quod Mastiche emollitâ, gummi Ammoniaco, & Terebinthinâ in pilulas formatis, sæpeque deglutitis commodè tentabitur.

Vel si tales fiant pilulæ: R. gummi Ammon. in succo Ireos emolliat, Mastichæ ana 3. j. Styracis, Myrrhæ, Ladani ana 3. β. cum succo Ireos fiat massula: Capiat 3. β. frequenter.

Olei Myrrhæ vel Mastichæ guttula vna aut altera, cum Saccachro, aliòve modo sumpta, proderit.

Foris verò ea quæ in hepatis & lienis duritie admoda conueniunt, hic quoque competunt.

Quibus & hoc addendum: R. Maluæ, Abfynthij ana M. j. flor. Chamom. P. j. Squænanthi 3. ij. Ficum num. xij. coquantur in Vino, contundantur, adde gummi Ammon. Bdellij diss. in Vino decoctionis prædictæ, Myrrhæ ana 3. ij. Mellis q. s. fiat cataplasma.

Vicinarum ventriculo partium, vt hepatis, lienis, renum, coli, septi, obstructorum, distentorum, tumescentium, aut induratorum inflammatorumve causâ, si ventriculus compressus, aggrauationem hanc sentiat: curatio hisce morbis, vt in illis docebitur, debetur: cum nisi hi affectus sanentur aut mitigentur, compressus hic dolor stomachi, accedente interdum dyspnœa, non tollatur, de quo tamen plerumque magis quàm de aliis illorum symptomatis conquerantur.

Quod si à cartilagine Xiphoeidi introrsum curuatâ, ventriculum premète hoc fiat, quia ægrè reducitur, incurabile quoque hoc plerumque vitium, quod post cibum sumptum gratat aded, vt nullam quietem, donec supini recumbant, ventriculo à parte affectâ tunc recedente, sentiant, vel absolutâ ciborû digestionem ventriculus subsideat.

Ab aliis externis, grauibz vel duris, si

ventriculus comprimatur, quia hæc seponi & amoueri possunt vel corrigi, de illis ultra non erit laborandum: nisi vitium aliud inde ventriculo contingens, curam illi debitam, requirat.

Vellicationi ventriculi, si nauseam potius, quàm grauiorem molestiam concitet, vti in nausea dictum, medebimur. Si à lumbricis titillatio ventriculo molesta sit, illis pellendis, vti & si à morbo alio proueniat, ei curam accommodabimus.

Irritatio cum dolore, veluti erodente, punigente ardenteve, si casu à deglutitis quæ ventriculum vulnerant, proficiat: Tunc primùm, vt, si fieri potest, vis illa à ventriculo propellatur, procurandum; non vi, vt per vomitum (sic enim constricto ventriculo, fortè arctius quæ ipsum lædunt, infigerentur) sed iis, quæ viam faciendo, eaq; ablundo, vt descendant, promoueat: quæ eadem operâ, ne intestina in transitu lædantur, efficere possunt. Quo modo & præcauemus, quid acuti deglutierint, ne quid inde patiantur: quod & ferè alias fit, cum non tam facile illic subsistant, aut in se infigant, sed à ventriculo & intestinis, vti alia dura sponte propellantur, & per aluum, vbi quandoque primùm propter angustiam podicis subsistunt, reddantur. Vix enim, sicuti aliqui prodiderunt, per venas meseraicas in venas transire, & alicubi in corporis habitu per cutem sibi viam facere, illicq; prodire, nisi prodigiosè hoc fiat, posse credimus.

Abluuntur autem liquidis quibusdam assatim bibitis, pinguibz præsertim, quæ vias simul relaxant: vt Iusculis, Lacte, Oleo, Butyro, similibusque. Quibus factis, si ex dolore, vel acum vel spinam, vel tale quid infixum esse suspicemur, tunc ne fiat inflammatio, aut si iam facta sit, vti in inflammatione dictum, in dolore sedando, inflammationeq; arcendâ, procedemus. Et si ob magnam læsionem sanguinem vomant, quæ illius fluxum sistunt (vt in vomitu sanguinis dictum) vsurpanda. Ac si pus postea reddant, quæ vlcus abstergunt (sicuti in inflammatione in abscessum, eoque rupto, in vlcus conuersâ, & in œsophagi fauciumque exulcerationibus ostensum) propinando, dein sicantibus

Cardial.
gia à Vel-
licatione
ventricu-
li leui-
titilla-
tione, cu-
ratio.

Cardial.
gia ab Ir-
ritatione
ventricu-
li, à casu
degluti-
tis, ab as-
sumpto

medica-
mento,

veneno,
cibo no-

xio; ab
humore
bilioso,

vel alio-
quin præ-
no, cura-
tio.

cantibus (illic quoque explicatis) vlcus sanare tentabimus. Quod tamen ægrè in parte hac nobili vlcera perficitur: & si succedit, callo ferè tunc relicto, imbecillitatem post se relinquit: quæ duo quo pacto tractanda, in hisce vitiis explicatur.

A medicamentis violentis, vomitoriis, catharticis, venenis, cibo pernicioso, assumptis: vel humore bilioso, aut succo alioquin prauo vel venenato, in ventriculo ex cibo genito, aut in ventriculum delato, si cardialgiæ fiant, inter quas & cardiaca, illaque species, quam ardorem ebullientem vocauimus, occurrit; tunc hoc modo, habitâ ratione causæ, per purgantia & alterantia procedendum.

Vomitum, siue ab assumptis, vti dictum, aut bile, aut prauis succis ventriculus impetatur, cum hæc excutiat, proderit. Et licet sponte ille infurgat, ventriculo ab enarratorum vi irritato & peruerso; tamen si minùs promptè succedat, aut non sufficienter fiat, noxamque extrudat, nihilominus natura iuuanda.

Exhibitis iis, quæ humore multo ventriculum eluant, & vomitionem faciliorem reddant. Vt si Aquam tepidam, Iuscula, Potumve alium copiosè bibant: permiscendo pingua, oleaginosa, butyrosa, quæ ventriculum vngendo subuertant, humorumque acrimoniam compescant. Vel dulcia, Mel & Saccharum, quæ simul ea à ventriculo abstergant. Quo nomine tunc & Hordei decoctum valde proderit.

Vel in bilioso & acri succo, quæ simul ipsorum vim infringunt: vti si Aquam aliam vel liquorem cum Aceto, syrupove Acetoso, Oxymellite, acidam factam bibant. Aliæve in febribus inter vomitoria diuersis in locis explicata.

Clysmata iniecta laxantia leuiterque ad excitationem stimulatia, vt citius noxa descendat, ventriculumque relinquat, reuellendo promouent. Et si sponte hoc fiat (vti diu illic subsistere nequeunt, sed expultricem vim irritando se ipsa promouent) nihilominus leniendo simul dolorem tum in ventriculo, cum per colon ad ventriculum usque etiam ascendere possint, tum in intestinis, demulcent.

Suppositoria naturam sollicitantia, ad reuulsionem horum aliquid quoque præstare possunt: Quorum omnium exëpla passim, in colicis præsertim doloribus, proponuntur.

Purgantia exhibita, in bilioso humore & acri succo, si subsistant diutiùs, præsertim locum habent, cum ab aliis assumptis violentis, vel catharticis vel venenatis ventriculum lædentibus, alius sponte nimiumque ferè moueatur. Possuntque cholagoga varia hinc inde descripta, in febribus biliosis præsertim, exhiberi, sic tamen ea componendo, ne ventriculum nimium exagitent, hac ratione hisceque formis.

Datur Cassiæ pulpa ad 3. x. vel electuariû Catholicon ad 3. x. aut de Rosarum succo, molle vel tabulatum ad 3. iij. aliæque similia, vt Diacytonites cum Scamonea, per se hæc exhibendo, vel addito Saccharo in forma boli: vel dissoluta cum aqua Absynthij, aut Endiuæ, cum bilis contemperanda est, quando verò abstergenda, cum decocto Hordei aut Cicerum: cum magis laxare volumus, cum Decocto florum & fructuum, vel Iure galli antiqui: quibus Ius piscium quoque addit Rondel. vel Sero lactis, Aqua casei: vel si amaritudinem non metuant, cum decocto aut infuso Absynthij, quod bilem abstergendo quoque subducit, & in bilioso æque ac pituitoso conducit ventriculo.

Vel exhibetur syrupus Ros. sol. ad 3. iij. aut si magis laxare volumus, cum infusione Rhabarbari aut sol. Senæ factus ad 3. j. si similiter dilutus: vel syrupus de Cichorea cû Rhabarb. duplicato: Syr. de Absynt. affatim propinatus, vti dictum, bilem deturbat.

Vel hoc decoctum: R. Prunorum dulc. & Tamarind. an. 3. ʒ. Endiuæ rec. M. j. fl. Viol. p. j. Hordei p. j. fol. Senæ mundat. ab 3. ʒ. ad 3. vj. rad. Polypodij tantundem, Epithymi 3. ij. feminis Anisi 3. j. fiat decoctio, dulcoretur Saccharo vel syrupo Viol. aut Ros. solut. Capiat vno haustu.

Vel hæc infusio: R. Rhabarbari ʒ. iij. fol. Senæ 3. ij. Absynthij 3. j. Spicæ ʒ. ʒ. contusa irrorentur Vino albo, atque vbi parum ebullierint, affundatur aqua Endiuæ v. Absynthij q. s. stent in infusione, exprimantur, addatur syrupus Ros. lax. ad 3. j. misce & pro

vna vice. Possunt & alia huic infusioni & decocto priori permisceri ex laxantibus supradictis.

Alia infusio in vino solo facta absynthite, longè ventriculo est accommodatior, Veluti: R. fol. Senæ 3. j. Rhabarbari 3. j. β. Myrobala. citrin. 3. iij. Absynthij 3. ij. fl. Cord. 3. j. Spicæ 3. j. seminis Fœniculi 3. j. conquassata macerentur in Vino albo tenui, non tamè admodum potenti: exactis 24. horis vel pluribus, bibat haustum, diebusque sequentibus alterum, augendo minuendove mensuram, prout operabitur.

Pilulæ idem prestantes: R. Aloës (quæ & in bilioso vti pituitoso ventriculo conuenit, extergendo vt absynthium) 3. j. Rhabarbari 3. β. Spicæ gr. iij. Scamoneæ gr. ij. vel iij. cum succo vel syrupo Rosarum, fiant pilulæ pro vna exhibitione.

De Rhabarbaro vocatæ pilulæ vfitatæ ad 3. j. sumi possunt. Et si necessitas vrgeat, etiâ fortiores scamoneatæ.

Alterantia exhibentur, si à cathartico violento, aut alio medicamèto vel veneno sumpto ventriculus irretitus, vel erodatur, vel vrratur: quæ diluendo, & humiditate suâ contemperando ea, vim illorum reprimunt, vel ventriculum illinendo leantoreq; obducendo, vt minus patiatur, efficiunt: & si grauius ab illis afficiatur, erosiones illis leniunt & sanant: ac quæ venenorum vim proprietate quadam refringunt.

Lactepidum affatim bibitum: lacteus item cremor Amygdalarum, Pinearum, seminumque Cucurbitacei generis: vti & cremor Hordei, leniunt & mitigant.

Succus lacteus Tragopogi, Hieracij, Sonchi, Sycomori, in erosionibus illius propinatur.

Vti & mucilagines seminum Lini, Psyllij, Pomorum, Pyrorum & Cydoniorum.

Decoctum seminis Lini erosiones ventriculi à cantharidibus sumptis factas corrigit, & pro antipharmaco illius habetur.

Aliud ad erosiones eiusmodi: R. rad. Altheæ 3. j. rad. Consolidæ 3. β. seminis Lini & Cydon. an. 3. j. decoquantur in Aquæ bonæ quantitate, colentur, alde Saccharum: Et bibat de eo.

Oleum Amygdalarum dulc. affatim bibitum conuenit: & Sesamum in erosionibus laudat Diosc.

Theriaca, Mithridatum, aliaque antidota opiata, si à veneno vetriculus afficiatur, cum sint alexipharmaca & narcotica simul, vtroque nomine, tum quia causam auferunt, & dolorem simul tollunt, iuuant. In cathartico quoque violento sumpto, plus sensum obtundendo, & facultas expultrix irritata ab opere cesset, dolores & deiectiones corrigantur, quàm vi alexiteriâ, vti creditum est, efficiunt.

Antidota alia quoque sine opio, quæ peculiari proprietate. certis venenis contraria sunt, si ab eiusmodi veneno sumpto ventriculus afficiatur, vel etiam alia quæ in genere venenis resistunt, quocunque veneno is peccatur, exhiberi possunt: qualia multa in peste, in morfu & ictu venenatarum bestiarum dicta sunt.

Si à bile vel alio succo acri, irritationes & ardores sentiat ventriculus, danda, tum quæ aqueâ humiditate vel aciditate frigidâ acridinem ipsius infringunt, vel quæ eam diluunt, ventriculû irritare non sinunt: aut quæ sensum ipsius minuendo, dolori succurrunt. Qualia sunt sequentia.

Ex comestis in cibis & condimentis, fructus acidi ardorem ventriculi compefcunt, vt Citriorum, Limoniorum, Arantiorum, Granatorum, Pomorum, Prunorum, Cerasorum, Vuæ crispæ, Fragarum: imprimis racemi Ribes & Berberis.

Olera item humida, Lactuca, Intybi genera, Violaria, Borrago: & ex acidis Acetosa, Trifolium acetosum, fol. Vitis imprimis, Capreoli vitis, fol. Berberis, quæ quoque acida sunt: in acetariis aliòve modo vsurpata.

Simplicia quædam in ardore ventriculi, quædamque ex illis calida, comendat Dioscor. veluti Scordium, Puiegium, Nardum, Apium, Consolidæ regalis flores, luncum odoratum, Pæoniæ semen, Chamædaphnen, Liquiritiæ succum.

Aquæ, ardorem ventriculi compefcen-tes humiditate sua, per se bibitæ, vel cum syrupis in iulepis formandis mixtæ, sunt aquæ Acetosæ, Endiuæ, Cichorij, Buglossi,

Lentis palustris, quam probat Dioscorides.

Decoctum iusculi cum herbis refrigerantibus & humectantibus: vti & decoctum Hordei affatim bibita, idem præstant: maxime additis Aceto alijsq; acidis: quod & decoctum Absynthij facit.

Vti & succi prædictorū fructuum olerūmve acidorum, per se vel additis Saccharo, vel Syrupis, si nimis acidi sint, exhibiti.

Vini Absynthitis haustus bibitus, cum, vti dictum, non solum pituitam, sed & bilem abstergat & deturbet, in bile affecto ventriculo admodum & subito sape iuuat.

Syrupi imprimis id præstant acidi, vel per se sumpti, vel prius aquis aut decoctis diluti & bibiti: veluti syr. Acetosus simpl. cum aceto paratus: vti & OxySaccharum, succum granatorum simul recipiens: & syrapi ex succis fructuum Granatorum, Pomorum, Prunorum acidorum, Limonum, Citri, Vuarum immaturarum, qui de Agresta vel de Omphacio vocatur, Ribes, Berberis, foliis Acetosæ: vel ex succo Cydoniorum coctus: aut Miua cydoniorum, cui Vinum dum coquitur, additur: quod hinc vtilius, si Acetum illius loco sumatur, sit, vt sic maiorem syrupus acquirat aciditatem: quâ ratione & alij syrapi enarrati, in quibus dulcedo ferè præualet aciditati, aceto addito acidiores. facti bilem melius retundent, quàm aliàs nimis dulcia generant. Proin & syrup. Violaceus, Rosaceus: vel horum iulepi, item de Endiua, de Cichorea, de Nenuphare, similesque qui quoq; exhiberi solent, non nisi bene diluti aquis aut decoctis, tunc enim non refrigerando, sed & diluendo bilem madore suo operantur, illius acrimoniam compescunt: idque potentius si acidi syrapi succive illis permisceantur. Quibus omnibus & syrupus de Absynthio, vt bilis magis abstergetur, quandoque additur.

Conseruæ & condituræ fructuum & herbarum, ex quibus syrapi parantur, idem efficiunt: cauendo semper à nimis dulcibus, cum bilem vt effeuefcat concitent, & præter hæc carnis Cydoniorum, Citri, Cucurbitarum: Lactuæ caulium conditum.

Rob fructuum acidorum idem præstant: soque magis si sine saccharo, vti veteres so-

lebant, & extracta nunc sunt, parentur, nisi Aceto addito aciditas ipsorum acuatur. Vfitata sine saccharo sunt, rob de Ribes, Berberis, de Agresta, Omphacium dictum: Quâ ratione & alia parari possunt.

Electuaria ex mitione horum sunt: vfitatum est Diacydonites sine speciebus dictum: quod ex pulpa Cydoniorū cocta cum Melle & puluere diacydonite mox describendo, componitur.

Vel sic: R. conf. Ros. & Acetosæ, cond. Cydon. an. ʒ. ʒ. rob. de Ribes ʒ. j. Myrobalanum conditum n. j. pul. Diacydonites nostri, vel Triasantali, aut Diarrh. ʒ. j., cum syr. de Agresta vel Acetosæ, fiat electuarium.

Conditum siccum: R. cort. Citri conditi, Cydonior. cond. conf. Ros. an. ʒ. j., rob. de Ribes sine saccharo, bene ficcari ʒ. ʒ. pul. Diacyd. nostri, Cinamom. an. ʒ. j. Sacchari cum aqua Ros. cocti vel tab. q. s. fiat conditum.

Panis medullâ in succis acidis intincta, Granatorum, Limonum aliorūmve, exhibita, prodest: quæ efficacior fiet, si Acetum, gratior si aqua Rosarum, addatur.

Hordæi farina cum brodio Caponis cocta, addito succo Granatorum, remedium Hippobilis ardorem & irritationem sedans.

Pineæ excorticatæ sumuntur, & superbatur succus Portulacæ ad ardorē stomachi.

Pulueris vfitati in ventriculo bilioso aut calidiore, sunt Diatrionsantalum, quod nulla alia aromata, sed semina frigida, rosas, gummi, amyllum, succum liquiritiæ, spodium, camphoram, & vnâ cum illis rhabarbarum simul recipit: & Diarrhodon abb. quod præter hæc omnia quæ & hanc compositionem ingrediuntur, alia præterea frigida, & mastichen ac aromata & semina in super calida, & cordialia quædam continet.

Diacydonitis sine speciebus calidis aromaticis parati puluis, qui huic electuario, cum minimè calefacere, sed refrigerare potius volumus, addi solet, & in forma pulueris quoq; vsurpatur, pulueribus post pastum vsurpari solitis permixtus: & paucioribus, vt triasantalis, seminibus berberis & acetosæ, rosis & spodio compositus.

Cuius loco, cum nulla cydonia reperipiat, vt rectius puluis Diacydonites vocari possit,

& ad differentiam alterius, frigidus, illis additis, sic vtilior correctiorq; erit: R. carnium Cydoniorum exicc. (vti fructus siccare & asseruare nostri solent) ʒ.β. Santalorum trium ana ʒ. j. Ros. rub. ʒ. ij. seminum Acetose, Berberis an. ʒ. j. Antispodij parati ex cydoneis, vt docet Diosc. ʒ.β. misce, fiat puluis: permiscendus pulueribus post pactum, vel electuariis.

Trochiscorum de spodio, de Camphora, de Berberis pulueres ad bilis feruorem extinguendum, reliquis pulueribus quoq; permiscuntur: In quibus, cum spodium omnes recipiant, antispodium ex cotoniis illius loco in vetriculi hisce affectionibus sumendum erit.

Horum omnium & puluerum loco, præsertim diatrionis fantali & diarrhodon, puluis in calidioribus ventriculis, ex tanta congerie simplicium diuersorum virium concinatorum, hic fieri poterit: R. Cytoniorum exicc. ʒ.β. cort. Citri ʒ. j. Santali rub. ʒ. ij. albi ʒ. j. rad. Liquiritiæ ʒ. ij. Ros. rubr. ʒ. ij. β. florum trium Cord. ʒ. j. seminum iij. Frig. mai. ʒ. ij. Minorum an. ʒ.β. seminum Acetose, Portulacæ, Berberis, Coriandri præp. an. ʒ. j. seminis Papau. albi, gummi Tragach. Arab. an. ʒ.β. Coralli ʒ. j. Antispodij parati ex ebore vel cornu cerui ʒ.β. & ad gratiam & ventriculi causâ, cum tantopere calefacere nequeant Cinamomi & seminis Anisi an. ʒ. j. Santali odorati ʒ.β. fiat puluis: cui & Mastiche potest addi. Hic Saccharo rosaceo tabulato imprimis pmixtus vsurpatur: vel in tabulas prius redigitur, saccharo in aquis supradictis dissoluto: quibus si tantillum succi permisceas Limonum vel Aceti, efficacior erit.

Amarus puluis paratu facilis ad bilem abstergendâ: R. Absynthij ʒ. j. summit. Centaurij, rad. Imperat. an. ʒ.β. fiat puluis subtilissimus. Bibat cochleare vnum cum Vino.

Ad ardorem stomachi quem Ebullientem vocauimus, Sodæ a nostris appellatæ, vsitatus puluis: R. Cretæ albæ ʒ.β. Nucis mosc. ʒ. j. Sacchari ʒ. j. fiat puluis: capiat cochleare j. per se, vel alio modo.

Vel hic: R. Capillorum in cancriis, quos illius oculos vocant, ʒ. ij. Poli arm. ʒ.β. Ros. rubr. ʒ. j. Sacchari ros. tab. ʒ.β. misce: Vtatur, vt de priore dictum.

Sensum ventriculi minuenda in summis

cruciatibus exhibentur, veluti opiata electuaria: vt sunt antidota in causa frigida, mox in imbecillitate explicanda: quæ, si præsertim recentia sint, etsi multa calida recipiant, hic quoque conueniunt. Inter quæ Philonium Rom. ad ʒ. ij. in pilul. aut elect. de succo Ros. in bile educenda permiscunt, sicque exhibent. Requies Nicol. ʒ.β. ponderet cum Vino quoque propinatur.

Vel datur hic potus: R. syr. de Papau. ʒ. vj. syr. Ros. & de Absynthio an. ʒ. j. Detur cum Aqua conuenienti vel Vino.

Si omisso syr. de papauere, Opij gr. j. in syr. leui ebullitione bulliat, dein cum Iure bulli detur, singulare aliqui statuunt remedium.

Horum loco, alia ab aliis obseruata, & nostra elegantia narcotica, necessitate urgente, sine periculo dantur, interdumq; aliquoties repetuntur.

Foris ventriculi regioni, ad ardorem illius & rosionem, a causis quibuscumque, maxime a bile excitata, compescenda, quibus & vtimur ad bilis influxum ab hepate repellendum, apponimus refrigerantia & constringentia, additis semper quibusdam calidis ventriculo appropriatis, cum extrinsecus admota adeo minimè calefaciant, sed potius eum roborent, ad penetrationem aliquid conducant. Quæ omnia non actu frigida nimium, sed tepida potius adhibentur.

Ex oleis vsurpantur vsitata frigida, Rosaceum, magisque astringit omphacinum ex vuis immaturis paratū, Cydoniorum, Myrtinum & Myrtilorum, Lentiscinum: temperata, Mastichinum: calida, quæ istis quandoque permiscuntur, Absynthinum, & de Menta, & Nardinum. In quibus Acetum interdum, maioris refrigerationis & penetrationis gratiâ, vel Vinum corroborationis causâ incoquantur, donec absumentur, vel mista adhibentur, aut manus hisce tempore inunctionis madesunt.

Vnguentum ex illis refrigerans & roborans simul, fit hoc pacto: R. olei Rosacei, Cydoniorum an. ʒ. j. ol. Myrtini vel Lentiscini, de Absynthio vel Menta an. ʒ.β. Aceti ros. ʒ. vj. bulliat ad acetum consumptionem, addendum frigescere incipit, pulu. cortic. Citri, semin.

min. Coriandri, Ros. rubr. fol. Absynthij an. 3. β. Coralli 3. j. Santali rub. & albi an. 3. β. Spicænardii 3. ij. Camphoræ 3. j. penetrationis potius quam refrigerationis causâ, Ceræ q. fiat linimentum: Ex quo, additis Ladani 3. ij. Aloës 3. j. cum Terebinthina q. s. fieri potest emplastrum.

Vnguentum Gal. rosaceum infrigidans, & Ceratum santalinum in stomachi ardoribus æquè ac aliorum viscerum conueniunt.

Quando magis refrigerandum, in summo ardore: R. ol. Rosacei omphacini 3. ij. succi Sonchii, Polygoni, Acetian. 3. β. Alabastris puluerisari 3. β. Lâriceæ loræ q. s. fiat instar nutriti.

Vel vtatur vnguento in inflammatione ventriculi descripto.

Cataplasmata in ventriculi inflammatione proposita hic quoq; competunt. Vel fiant ex plantis recentibus, Portulaca, Solatro, Polygono, Viti vinifera, Soncho, Phyllitide, Umbilico ven. rad. Nympheæ, fl. Labruscæ, Rosarum, addito Absynthij vel Menta, vel etiam flor. Chamomil. dolore virgente: vel sunt ex illis partim recentibus, partim aridis in aqua coctis, addita interdum aquâ Rosarum & Phyllitidis, beneque contulis in formam pultis: miscendo pro vna dosi ex oleis supradictis ad 3. ij. pulueris Mastichæ 3. β. Alabastris 3. ij. fol. Phyllitidis puluer. 3. ij. Santal. omnium, Gariophyll. an. 3. j. fiat cataplasma.

Vel si dolor admodum vrget, vtamur anodyno cataplasmate in inflammatione ventriculi explicato. Vel isto: R. Panis crustas vel laminas parum tostas, & Aceto ros. irrigatas 15. β. pulpæ Cydoniorum ex recentibus vel ficis rursus maceratis desumpta, parum coctæ 3. ij. (in quorum penuria Diacydonitis simpl. sumantur 3. ij.) & affuso Vino rubro & succo Cydoniorum (si haberi potest) adde pul. Mastichæ 3. β. Absynthij succi 3. ij. fl. Chamom. Maceris an. 3. j. ol. Rosacei & Chamom. ana 3. j. misceantur & applicentur.

Eotus ardorem compescens in inflammatione expositus, etiam hic proderit. Vel pareretur ex decocto enarratarum herbarum in cataplasmate explicatarum. Vel etiam ex

oleis cum aceto vel succis herbarum mistis.

Si dolor vrgeat hoc pacto: R. flor. Rosarum, Labruscæ, Chamom. Meliloti vel Anethi an. p. j. Absynthij vel Mentæ m. β. rad. Altheæ 3. vj. sem. Coriandri, Myrtill. an. 3. β. Mastichæ 3. ij. Gariophyll. Santali an. 3. j. Aquæ & Vini rubr. q. s. equantur pro fomentatione.

Epithema refrigerans ex solo Aceto ros. Aqua ros. diluto fieri potest: in eo intingendo pannum linteum, vel crustam panis tostam, & applicando.

Vel: R. aquæ Rosarum 3. ij. aquæ Phyllitidis, Absynthij an. 3. j. Satal. omniū vel pul. Diatrionis fantali 3. ij. sem. Coriandri, Antispodij an. 3. j. misce, applicetur. Vel vtamur illo quod in inflammatione descriptum fuit.

Puluis pro sacculo, vel inspergendus post vntiones, in ardoribus ventriculi sic potest fieri: R. feminis Coriandri præp. cum Aceto 3. β. sem. Myrtill. vel Berberis, fl. Ros. rubr. Santali rub. cortic. Citri an. 3. j. β. Absynthij, Coralli rub. an. 3. j. Santali od. Nucis mosch. an. 3. β. fiat puluis.

Cucurbitula hepatis fedi affixa, si bilis ab hepate in ventriculum regurgitet, eam retrahendo, vt putant, iuuabit, doloremque sic leuabit aut tollet.

Imbecillior ventriculi constitutio & functiones ipsius labefactans, excrementisque atq; propter ea cardilæis seu consuetis ventriculi doloribus & molestiis occasione præbens, si à caloris ipsius natiui penuriâ, ab ortu vel ætate, vel morbo graui prægressâ oriatur, & ventriculo insita & consueta sit, quia tunc reparari minimè potest, saltem vt per viuendi rationem decentè medicamentaq; stomacho appropriata, & proin stomachica dicta, ventriculum leui & grata illi astrictione roborantia, simulq; calefacientia, robur illi addatur, & caloris natiui defectus suppleatur, prouidendum. Quod si verò ob temperaturam ipsius frigidiorē redditam & humidiorē hæc imbecillitas nascatur, eaque iam sit permanens & ventriculo im-

Imbecillitas ventriculi, ab ipsius caloris natiui defectu, intemperie frigida & humida, refrigeratione actuali, distentione, inflammatione, alicuius organis vitio pro-

ta.

eodem ferè modo, magnisque adhuc calidioribus stomachicis medicamentis cauetur. Quæ verò est aduentitia, frigida & humida ventriculi intemperies: prius sublatis excrementis quæ inde proueniunt, calidis stomachicis tollitur. Organi verò vitio, nimium laxato & attenuato ventriculo, quæ prodit illius imbecillitas, etsi quoque vix in melius reduci queat, tamen astringentium vsu, & simul calidorum, in ventriculis frigidioribus & humidioribus, vel temperaturum in aliis eum ad pristinum statum reducere studebimus. Si verò constrictior quàm par sit & siccior existat, contrariis, eum potius humectantibus relaxabimus.

Quæ curandi methodus tum in hisce diuersis imbecillitatis causis (siccitate ipsius exceptâ, quæ diuersa ab his remedia requirit, sicuti in fine imbecillitatis curæ explicabitur) tum in prædictis, vt ostensum, aliis ventriculi morbis, vt refrigeratione aliâ, ab actu eum refrigerantibus natâ, distentione ob ingestorum copiam, vel humorem crudum frigidumque: & inflatione à flatibus, locum habet, sicuti in ipsorum cura expositum fuit: & pro ratione affectus & causæ illius diuersitate, remedia hæc hisce ventriculi affectibus conuenientia, quædam pluribus simul, alia aliis magis, idque variis modis in diæta per victum aliasque viuendi rationes, euacuationibus per vomitum, ructus, clysteres, purgantia, alterantia, intus forisq; vsurpata, vt iam describetur, sunt accommodanda.

In victus seu cibandi ratione imprimis in hisce ventriculi affectibus, vt ea decenter seruetur studendum: cum cibis ad ventriculum rectâ perueniat, in eoque conficiendo illius opus sit operâ, & ne in ea peccetur, vnde plerumque ventriculi morbi originem primum trahunt, aut iam prius imbecillior, magis labefactatur doletque, cauendum. Quod fiet, quantitatem qualitatemq; victus decemtem insituendo.

In quantitate cibandi hæc potissimum in imbecilliore ventriculo obseruanda erunt. In cibi quidem demenso, vt parum pro vna vice comedant, cum alioquin difficulter cibum concoquant: hunc modum seruando, vt aliquo pacto non tamen plenè satiati, post

cibum sumptum nullam grauitatem aut compressionem circa præcordia sentiant, nec minus liberè quàm dū ieiuni erant, spirent. In modo verò cibandi, cauendum ne nimium auidè cibum ingurgitando, ventriculum subito cbruant, sed paulatim (sic enim auidius eum amplectetur) offeratur: ita tamen ne diutius cibum protrahendo, vel concoctione iam incipiente, nouum continuò cibum obtrudendo, concoctio lædatur. In refectionum numero, hi quibus calor natiuus languidior est, cum parum comedere pro vna vice cogantur, eò frequentius quàm qui validiorem habent ventriculum, cibandi erunt. Rariùs verò quibus frigidior est ventriculus excrementitiusque, qui non prius quàm priore cibo confecto, appetituque denudè inuitante, nouo refici debent: vnde quoque semel in die si illis, quorum ventriculus sordibus inquinatus est, cibum offeratur, sufficit. Omnino quoque hi quibus ob copiam ingestorum stomachus distensus dolet, à cibo donec dolor remittat, abstinere debent. In tempore idoneo eligendo, vt hoc sanis competit, sic & illis maximè quibus ventriculus debiliior, frigidior aut sordidior existit: vt post somnum manè horis quinque vel sex, & sibi in die cibum sumere possint, ante somnum vesperti horis tribus circiter, primum cibum sumant, idque cum post somnum ante prandium plurium horarum interuallo, prioris cibi in cœna sumpti demum fiat digestio, & vix dum ante ventriculus ad nouum suscipiendum, fiat aprus, eumque appetat. Dein & vt ante somnum post cœnam antequam superdormiant, prius concoctione aliquo pacto factâ, vapores qui copiosi ab initio suscitantur, ex parte per vigilias dissipentur, nec per somnū, si statim caperetur retenti, caput magis petant & oppleant, tantisper eum differre vtilius erit. Quod tamen in senibus & debilioribus, qui nocturni somni tempus plerumque non adimplent, non adeo strictè seruandum, quin illis etiam mox à cibo sumpto post cœnam & à prandio circa meridem, somnus qui eo tempore maximè eos inuitat, concedatur, cum plus inde recreentur reficiantq; quàm à vaporibus, qui cum minus

Imbecillitati ventriculi conuenientia diæta, seu viuendi ratio.

iuuenibus comedant pauciores etiam sunt, lædantur.

In qualitate ciborum, substantia succusq; horum & temperies consideranda. Cibus eupeptos seu concoctu facilis esse debet, ne si tardius concoquatur, ventriculus interea laboret, aut si concoqui nequeat vel non sufficienter, cruditas excrementorumq; & flatuum prouentus sequantur. Qualis ex sua natura iuniorum animalium existit caro, vel alioquin cibus tenerior, mollior succosusq;, qui facilius conficitur; vti verò difficilius, si durus, siccus, crassus, tenaxve sit: nisi arte sic præparetur, vt concoctione citius euincatur: quod eum elixando, assando, comminuendo, massando, alijsque præparationibus & condituris perficitur: quibus tamen quoque artibus, veluti suffumigando, saliendo, alioue modo cibus interdum deprauatur. Euchymus, qui boni succi sit cibus eligendus quoque, vt sic quibus calor natiuus debiliore est, melius citiusque reficiantur: paucioraque excrementa gignantur: quod in omnibus ventriculis imbecillioribus requiritur. Talis autem omnibus alimentis, siue ab animantibus aut plantis petantur, quæ verè nutrimenta sunt, nec medicamentosa vi alterata (quorum prauitatem vel sapor vel odor ab alimentoso alienus prodit) succus laudatus inest, nisi hæc sit, rancore, foetore, ad putredinem & corruptionem tendentia cacochema fiant, aut eam naturam habeant, vt in ventriculo primum corrumpantur, aut ob humidum crudum succum, qui simul adest, excrementis flatibusque gignendis materiam præbeant: vel alioquin ob substantiam illorum duram ægre concoquantur: Cum hæc in cibis, vt & euchymi & eupepti sint, nec flatulenti, concurrere debeant: quos omnes sigillatim describere nimis prolixum esset. Temperatus quoque in suis qualitatibus, qui ad nutriendum aptus sit cibus, esse debet, sed ad caliditatem aliquam in frigidioribus & flatulentis ventriculis inclinans. Qualis admistione calidorum & conditura reddi solet, tum ad consuetum cibandi usum, tum vt medicamenti instar, sicuti postmodum in illis explicabuntur, eo vtamur.

Quod alias res, corporis scilicet animique motus attinet. Exercitium ventriculo debilitato valde quoque proderit, ante cibum factum, quod si validius fuerit, illudque perferre possint, calorem natiuum suscitando corpusque calefaciendo, vti functiones illius alias, sic ventriculi plurimum promouebit. Sed & post cibum exercitium, non tamen validius, per quod cibus in ventriculo conturbatur, sed lenius, quod stando ambulandoque perficitur, cum sic cibus fundum ventriculi petens rectius concoquatur, conueniet iuuabitque. Quies quoque moderata corporis, vigiliarum tempore, cum vires refocillet, actiones ventriculi iuuat: satiusque cibo sumpto, dum concoctio fit, quiescere, quam validioribus, vti dictum, motibus, vt cibus in ventriculo, corrumpatur, vel incotus maneat, ansam præbere. Quies autem per somnum inducta, si concoctionem iuuat, ex accidenti (cum non illius causâ propriè, sed vt per eum & corpus & animus quiescat, data fuerit) hoc pacto iuuare aliquomodo posset: quod animalibus functionibus tantisper quiescentibus, naturales validius suas vires exercere videantur. Concentratio enim illa caloris, quam tempore somni factam, hoc efficere docent, pro causa vera adferri, cum dormientibus magis quam alio tempore calor ad exteriora vergat, quo nomine & tunc citius sudant, nequit, & proin ab alia causa hoc prodire potius, si modo somnus concoctionem iuuat, dicimus, cum vigiliarum tempore propter motus, vti dictum, & concoctio & distributio ciborum, citius fiant. Et si infomnes, cruditates sentiunt, hoc illis, quod forte nimio vel non conuenienti cibo se intemperantiùs ingurgitarint, quo repleti dormire nequeunt, accidit. Excrementorum dein indies idoneoque tempore naturalis expurgatio, per alui deiectionem maximè certum ordinem in alui redditione seruando, vel etiam si facile subsistant, alio modo ea promouendo, si fiat, vt ventriculus minus grauetur, opitulabitur. Nimia verò euacuationes, illaque imprimis quæ per venærem fit, in qua luxuriæ causâ frequentius peccatur, vt totum corpus debilitant, sic ventriculi actiones plurimum labefactant.

Vti & animi perturbationes eodem modo nocent; Recreationes verò iuuant.

Imbecillitati ventriculi com. petentia euacuanda. Inter euacuantia Vomitus in omni repletionem ventriculi conuenit. Nam si à cibi nimia ingurgitatione ventriculus admodum distentus doléat, vomitione factâ subito alleviatur: si modò vomere possint, cum sæpè nimium à cibis dilatato ventriculo, hoc ægrè fiat, & si dyspnœa simul adsit, eam augeat. Præsertim verò si ab humorum crudorum pituitosorum repletionem grauedo hæc fiat, competit. Vti & in imbecillitate ventriculi inde profecta: in qua si singulis mensib. repetatur, proderit: Alias enim nisi excrementorū adsit prouentus, ventriculum potius debilitaret, quàm iuaret: præsertim si ad vomendum inepti, aut non consueti sint. Vti & in flatibus, si citra materiam ventriculum distendunt, non temerè concitandus erit.

Promouetur autè ille, cum opus erit, tum actu irritando fauces, ventriculumq; fricando. Vel exhibitis vomitoriis quæ citra magnam molem, si iam prius repletus sit, illum queant subuerrere. Vel si tenax in eo sit pituita, quæ eam abstergant & incendant: vt Oxymel simpl. vel compositum, vel diureticum vel scylliticū: aut syr. Acetosum dandum aqua tepida vel decocto rad. Raphani fol. Betæ, sem. Attriplicis, Azari & Agari: vel aqua stillatitia Nucum, Raphani similibusque. In imbecillitate verò addendo calefacientia & incidentia amaraque: vt si vinum Absynthites manè bibant, & postea se ad vomendum sollicitent: aut syrupū de Absynthio cum aquis aut decoctis prioribus bibant.

Ructus plurimum alleviat in omnibus hisce causis, nam in flatu causam ipsam subito euacuat, in cibi & humoris copia ventriculi distentionem minuit.

Erumpit autem is vel sponte, præcipuè repleto ventriculo maximè si corpus inclinèr, aut alio modo moueât. Ex voluntate nostra ructum retinere sed emittere vix possumus: cum qui sonum talem instar eructationis cum volunt edunt, non flatum è ventriculo eructent, sed aërem potius, quem prius antequam hoc tentant ore hauriunt, & aliquotq; deglutiunt, ex œsophago potius quàm

ventriculo rursus eiusmodi bombo, vnde nihilo alleviantur, emittant.

Vt is promoueat, foru & assumptione calidorum actu; potentiaque, efficitur: Qualia postmodum explicabuntur.

Clysteres, si ventriculus vel cibo vel humore repletus grauetur, aut à flatib. distendatur, naturâ sollicitado sicq; revellendo, & viam ad inferiora aperiendo, cum intestina exinaniât, plurimum iuuant. Et in imbecillitate ventriculi, si alius minus rectè respondeat, per vices vsurpati profunt; præsertim si purgantibus fortioribus ob ventriculi imbecillitatem vti non liceat, & mitiora in illis, vt ferè fit, parum operentur.

Acribus autem vtendum, vt à superioribus maior fiat diuersio; flatusq; discutientibus, si inde procedat: Quorum exempla in colicis doloribus multa explicabuntur.

Purgatia exhibita, si ab humore crudo vel pituitoso vel flatib. inde genitis ventriculus impetatur, aut hæc in imbecillitate illius sæpius congerantur, locum habent. Illaq; interdum aliquoties repetuntur, & per vices vsurpantur: si præsertim leuiores sint, nec fortioribus ventriculū offendere volumus. Quibus tamen etiam cum necessitas vrget, vt mur, admiscendo semper ea, quæ vim illorū ventriculo aduersam corrigant, eumq; simul si imbecillis sit, roborent. Quorum formulas quasdam ventriculi affectibus iam dictis tantum accommodatas proponemus, cum ea, quæ ad ventriculum purgandum, in aliis morbis qui illi affecto copulantur, vsurpantur, passim hinc inde describantur.

Pilularum forma propter aloën, quæ potissimum in ventriculo purgando utilis censetur (cum tamen tetro odore, nauseam vehementer moueat) magis in vsu est, cum alia ratione ob amaritudinē & insuauitatem vix assumi queat Aloë (succus scilicet illius inspissatus sicuti ad nos adfertur), quæ quò magis rufâ est, hoc, est ex rubro flauescit, eò præstantior est, aloëque tunc Succotrina, rectius Succocitrina dicitur: vti & si hepatis modo coacta intusque foueæ modo excava- ta & friabilis existat, Aloëpatia ob id vocata. Sed & vt melior fiat, præparatione efficitur: quando puluerizata prius obiter diuta-

405

xat, nullā illius portione succulentā effusā, à sordibus sabuloque aquā abluitur: quæ vera est illius lotio, vnde nihilo fit ad laxandum, vti verò putatur, inualidior. Verum & efficacior fit, quando contrita & in liquore conuenienti infusa dissolutaque maceratione, succus illius innatus à subsidentia effunditur, aliquotiesque hoc iteratur, rursusque calore quod effusum purius est, inspissatur & concreuit: qui liquor si Vinum fuerit, illiusve spiritus dictus, aut aliud aromaticum vinum, aut decoctum, eò magis simul ventriculum calefaciet roborabitque: & si in Vino absynthite hoc fiat, aloës vis ad laxandum abstergendumque ventriculum erit validior.

Ex Aloë, sic præparata præsertim solā, cum leuiter laxare, concoctionemque non lædere sed iuuare volumus, pilulæ parantur, & à 3.ß. ad 3.j. semel atque iterum, aliàs pluries, & per vias, prout necesse est, cum liquore conuenienti exhibentur.

Permissio aliorum succorum sic sunt efficaciores, & ventriculo admodum conuenientes. Aloës subtilissimè trita, succo Rosarum irroratur siccaturque, rursusque trita, eodem succo imbutur, denuoque siccatur, fitque hoc ter vel amplius: demum vsurpatur, minusque tunc calefaciet, Aloësque rosata dici potest.

Idem si succo Absynthij fiat, ventriculo magis competet. Cuius macerationis loco succus illius inspissatus, quod rob antiqui, neoterici extractum vocat, aloi permixtum, idem præstabit.

Additis aliis quoque alterantibus pilulæ ex aloë, prout eas præter laxationem operari volumus, parantur. Vt cum ventriculum calefacere simul volumus, aromata: Cum roborare, mastiche, rosæ, spica: Cum validius detergere, azarum, myrrha: Cum concoquere, crocus, hisque similia adduntur. Sicuti hoc pacto vsitate quæ id præstant sunt pilulæ de Hiera simplices dictæ, & Alephanginæ, ob copiam aromatum Aromaticæ appellatæ. Et quib. in laxo & debili potissimè vtimur ventriculo, Stomachicæ ab vsu dictæ, pilulæque Assaiereth, quæ & myrobalanos recipiunt.

Purgantibus aliis quoque permixtis, mi-

tioribus tamen nec ventriculo aduersis, pilulæ efficaciores ad eum expurgandum, cum magis est impurus, sunt. Sic consuetæ parantur, rhabarbaro addito pilulæ Ante cibū. Aggregatiue minores Mes. & de Rhabarbaro & de Eupatorio vocatæ, hepatis quoque appropriatæ, vel addito agarico, pilulæ Mastichinæ: vel vtrisque permixtis, pilulæ de Tribus & Imperiales, quæ & senam recipiunt & Sebelliæ: aut quæ turpethum continent, & quia stomacho accommodatæ sunt, pilulæ Turpethi stomachicæ vocantur. Quæ pilulæ tum per se, tum inuicem permixtæ, variis modis pondereque iam dicto vsurpantur.

Has quoque, cum magis purgare volumus, aliarum fortiorum pilularum admistione acuiamus: imprimisque illarum quæ scamoneam potius quam alia ventriculo magis noxia cathartica recipiunt.

Ad quorum omnium imitationem de nouo pilulæ stomachicæ sic componi possunt, eâ intentione maximè, vt ventriculus ab excrementis expurgetur: additis paucis corrigentibus, actionem ipsarum iuuantibus potius, quam quæ admodum simul alterent, cum hæc sine purgantibus rectius administrantur.

Leuiore sic sunt in frigida causa: R. Aloës præparati seu extracti cum Vino simplici vel composito, vt dictum, 3.ß. Gariophyl. Nucis mosch. vel Maceris an. 3.ß. Piperis vel Zingiberis 3.j. Croci, si caput nō doleat 3.ß. cum syrupo de Menta fiat massula: Capiat 3.j. duabus horis ante cibum.

Vel vt minori quantitate ad 3.ß. exhibitæ idem præstent, additis oleis sic fiunt: R. Aloës præparatæ, vt dictum, 3.ß. olei per expressiōnem facti, Maceris vel Nucis mosch. 3.ß. olei per destillationem elicti, Maioranæ, Mentæ, & in ditioribus Cinamomi, suauioris odoribus causâ an. guttas iij. vel iij. cum syrupo vt dictum, subigantur.

Vel sic cum purgare & simul roborare laxum ventriculum volumus: R. Aloës præpar. cum succo absynthij 3.ß. Mastichæ, rad. Galangæ. an. 3.ß. Ros. rub. Spicæ an. 3.j. cum syrupo de Absynthio fiat massa: Vtatur vt de prioribus dictum.

Cum magis ventriculū purgare & abstergere volumus: R. Aloës præp. cum succo rosarum 3.ß. Myrrhæ, radic. Azari an. 3.ß. Zingib. 3.j. cum melle ros. fiat massa.

Ex aliis quoque purgantibus additis, paulo magis laxabunt: R. Aloës selectæ vel præpar. 3.ß. Rhabarbari, Myrobal. citrin. puluerifatarum, & Vini prius irroratarum & parum maceratarum, potius quàm vt in oleo fricentur an. 3.j. Mastich. 3.ß. Gariophyll. Spicæ an. 3.j. cum succo Absynthij parum inspissato, fiat massa. Sumatur 3.j. vel plus.

Amplius adhuc alium mouebunt hoc pacto: R. Aloës selectæ vel præpar. 3.ß. Rhabarbari & Agarici troch. an. 3.j. Myrobalan. Chebularum indarum præparatarum vt supra dictum an. 3.ß. Zingib. Cardamom. mai. an. 3.j. Spicæ 3.ß. cum syrupo rosar. solut. fiat massa.

Cathartica fient magis, si enarratis compositionibus quibusuis, Scammoneæ cum succo Cydon. aut alio pacto ritè (ne ventriculo noceat) præparata 3.ß. vel paulo plus permisceas; aut Turpethi etiam rectificati ad 3.j. vel trium quantitatem.

Vinum medicatum, quando ventriculū purgare volumus, conuenientissimum est, cum nauseosa, qualia ferè purgantia sunt reliqua, etiam, præter aloë, quæ vino non ita commodè permiscetur, vini hoc odore gratiora fiant, & si absynthium addatur (vti ferè fit) cum ad eò ventriculo conueniat, non solum bilioso, sed & pituitoso, quem amaritudine suâ vt aloë abstergit) hoc illorum odorem penitus retundat, & cum vinum ventriculo amicum sit, minus sic à purgantibus perturbetur. Et præsertim cum validius purgandum est, vina rectius quàm pilulæ, cum exigua quantitate eas sumere cogamur, nec purgantia leuiora, vti vino, tantâ copâ pilulis permisceri possint, operantur.

In frigido humore, & flatibus, ventriculū molestantibus sic purgamus: R. Agarici vel Mechoacæ 3.j. vel 3.ij. fol. Senæ repurg. 3.vj. herb. siccatum Absynthij 3.ij. Maioranæ 3.j. Mentæ 3.j. seminis Fœniculi 3.j.ß. Zingib. 3.j. conuassentur, infundantur in 1b.ij. Vini generosi fart. pro tribus vicibus.

In laxo & debili ventriculo pituitoso, sic

purgamus: R. Rhabarb. 3.ij. Mirobal. citrin. Chebul. an. 3.j.ß. fol. Senæ 3.j. cortic. Citricci 3.ij. radic. Galangæ 3.j. Absynthij 3.ij. Ros. rub. p. j. Mastichæ 3.ij. Spicæ 3.ß. conuassentur, fiat infusio: Vtatur præcedenti modo.

Cum maiori absterfione & purgatione opus est: R. fol. Senæ mundat. 3.j.ß. Turpethi 3.ij. Agarici troch. 3.ij. Rhabarbari 3.ij. Tartari 3.j. rad. Azari 3.j. Absynthij 3.ß. Maioranæ 3.j. Mentæ 3.j. rad. Galangæ & Acori veri an. 3.j.ß. seminis Fœniculi 3.ij. Zingib. 3.j. Spicæ 3.ß. conuassentur, ad mensur. j. Vini vel 1b.ij. Pro quatuor vicibus.

Inter electuaria molliora ventriculo purgando præsertim accommodata ex aloë parata, præcipuum est, Galeni Hiera, ob insignem illius vsum; & simplex, quod non aliud purgans præter aloë recipiat, & picra ob insignem illius amaritudinem vocata, cuius causâ & eam vix assument ægri: cum præsertim ad 3.j. vt alium moueat, illius sumere oporteat: quam Rhazes sine croco, cuius magnam alias quantitatem recipit, parat.

Quæ & odore suauior & non nihil ad laxandum aptior sic componi potest: R. Absynthij m. j. Majoranæ m.ß. Rosar. rubrar. p. j. Schœnanthi 3.ij. Cubebarum, Carpobalsami an. 3.ij. seminis Fœniculi & Sileris mont. an. 3.j. infundantur in 1aenfur. j. Vini & Aquæ: bulliant parum in duplici vase, colentur, additæ Mellis vel Sacchari 1b. j. decoquantur despumando donec syrupi instar inspissentur: cui additæ Aloës selectissimæ puluerifatae subtilissimè 3.vj. Mastichæ 3.ij. Cinam. 3.ß. rad. Azari 3.j. Spicæ 3.j. Croci 3.ß. fiat electuariū. Cuius 3.ß. media est, quâ interdum maior, alias minor exhibetur quâtitas. Hoc ad purgandum efficacius fiet, si folia Senæ infusioni addideris.

Vel hoc pacto parabis, si præsertim obstructiones simul adsint, sicuti aliqui bono successu vtuntur: R. rad. Liquiritiæ 3.j. Fumariæ, Linguae ceruinæ vel Ceterach potius an. m. j. Eupator. m.ß. fl. Cord. p. j. Passul. 3.ij. rad. Polypodij 3.j. fol. Senæ 3.vj. decoquantur in aquarum Fœniculi, Anisi an. m.ß. & in colatura dissolue Aloës 3.v. exprimantur, decoquantur ad consistentiam electuarij, miscen-

miscendo in fine pul. Mastichæ 3.j. Thuris 3.j.β. Hoc ad purgandum efficacius fiet, si fol. Senæ 3.ij. vel iij. infusioni adlideris.

Vti & Hiera Gal. si Agaricus cum suo correctiuo Zingibere: aut Rhabarbarum, cuius operationem Spicæ quæ hieram subit, dirigit, addatur, ipsius effectus acuitur, vt tunc etiam minori quâtitate exhibita (quod maxime experunt) officium suum faciat. Longeque magis si Scammoneâ rectè præparatâ admixtâ, vis ipsius adeo intendatur, vt etiam per drachmas sumpta purget: quæ Colocynthiden recipiunt Hieræ, quarum plures sunt, ventriculi affecti causâ minime exhiberi debent.

Ex aliis laxantibus & purgantibus non adeo vt aloë amaris, vîsata quoque vsurpantur electuaria tam leuiora quam fortiora, passim hinc inde descripta, minus ventriculo noxia, quibus in illius affectibus vtendum, vt sunt elect. Lenitium, Diacatholicon, Diaphœnicon, de succo Rosarum, similiaque.

Diaspoliticon à Galeno descriptum electuarium, ex nitro paratum, ad ventriculum à flatibus & pituita expurgandum, & extergendum compositum fuit.

Gratum & efficax tale potest fieri conditum: R. Agarici troch. 3.β. Rhabarbari el. 3.j.β. Senæ mundat. 3. quatuor. Cinamom. 3.β. Zingib. 3.j. infundantur in Vini maluatici t̄b. quatuor & succi Cydon. t̄b. j. macerentur aliquamdiu, leuiter coquantur & colentur; addendo pulpæ Cydoniorum & Sacchari an. quartam. j. coquantur ad spissitudinem electuarij vel conditi, vti cydoniatum fit congelatum. Cuius 3.ij. exhibentur vel iij. Et si fortius esse velis, vt minor illius quantitas idem efficiat, Scammoneæ extracto ritè parato perficitur, cum hoc adeo ventriculo nocere minime possit.

Puluis pro purgâdo ventriculo vtilis, sed amarus: R. Agarici troch. Rhabar. el. an. 3.j.β. Turbith. 3.ij. Tartari 3.j. Zingib. 3.β. Spicæ 3.j. rad. Gentianæ, Zedoariæ an. 3.β. fol. Absynthij 3.j.β. sum. m. Centaurij, seminis Fœniculi an. 3.j. fiat pulvis subtilissimus: Datur ad 3.ij. cum Vino, cui & Aloë, si huius ingratiam ferre possent, addi posset. Si Diacrydio

acuatur efficacior fit, minori que quantitate tunc exhiberi potest.

Ex eo, addito Saccharo dissoluto in aquis Absynthij vel Mentæ vel Cinamomi, iustâ quantitate tabulæ formari possunt.

Potio purgans stomachica: R. Agarici troch. 3.j. Rhab. el. 3.ij. Spicæ 3.j. infundantur in Vino forti, fiat expressio, adde syrupi Ros. fol. cum inf. Senæ 3.j. syrupi de Absynthio 3.β. misce, pro vna vice.

Vel cum decocto hoc pacto: R. radic. Galangæ 3.β. rad. Azari 3.j. Absynthij 3.ij. Mentæ 3.j. fol. Senæ 3.β. seminis Fœniculi 3.j. fiat decoctio, infunde Rhabarbari & Agarici, vt supra.

Reliqua exempla ventriculum purgantium medicinarum, in morbis variis, quibus ventriculus occasionem præbet, aut illi huius affectibus, proponuntur.

Quæ exhibentur alterantia remedia, omnia quoad fieri potest, proprietate suâ ventriculo accepta esse, eumque roborare debent: & pro diuersitate causæ, calefaciendo plus minusve, imbecillitati illius ob caloris natui defectum, aut frigidam ipsius intemperiem natæ, vel alias refrigerationi illius corrigendæ, aut humoribus præparandis, alterandis, vel flatibus pellendis accommodari: simulque, prout ventriculus humidior laxiorve existit, eum amplius parciusve astringere: & si dolor intensus vrget, eum temperie anodyna mitigare. Quod variis modis perficitur.

Inter liquida quæ bibuntur, Vina naturalia, vinosa, non acidâ, antiqua maxime, imprimisq; generosa, Muscatellina, Maluatica, dicta, aliæve, ventriculo magis accepta & grata, eum præ cæteris ferè omnibus refocillant ac calefaciunt: tum inter cibos, tum etiam, cum validius illa agere volumus à ieiunis bibita: vel cum necessitas, requirit, vt refrigerato à frigido potu ventriculo, si vinum actu calidum bibatur, mox iuuat.

Vina arte immutata, propter infusionem plantarum vel aromatum sunt ventriculo conuenientia.

Ex plantis præcipue parata talia fieri possunt: quæ vel maceratione sola, vel antecedente quoque leui coctione in duplici vase,

Imbecillitatem ventriculi alterantia introsumenda remedia.

vires suas illi communicant. Vſitatiffimum eſt, & plerisque, ob odorem gratum, etſi amarum ſit, quod ex Abſynthij infuſione ſit: eā quantitate donec amareſcat, odoremque illius ſuauem concipiat: in omnibus ſerè ventriculi affectibus à repletionē profectis conueniens.

Huic & Menta & Maiorana addita, gratius adhuc magis illud reddunt.

Vel ſic fiat: R. rad. Imperatoriæ, Galangæ, Zedoariæ an. 3. iij. cort. Citri ſucci, herb. Abſynthij an. 3. β. Mentæ, Maioranæ, ſeminum Coriandri, Fœniculi an. 3. ij. Gariophyl. Nucis moſch. an. 3. j. β. Maſtichæ 3. ij. Vini t̄b. iij. macerentur. Si maiori abſterſione opus eſt in fordido ventriculo, & obſtructionibus, ſumm. Centaurij min. 3. j. β. additur. Si amara ſaſtidiant, abſynthium & centaurium o-mittantur.

In flatulento ventriculo, Vinū cui ſemen Fœniculi additum, Fœniculatum dictum, vel Aniſum ſimiliaque ſemina, vrile.

Vel tale parabitur: R. cort. rad. Fœniculi, radic. Acori veri an. 3. β. Mentæ, Maioranæ, Spondilij an. m. j. ſem. Fœniculi, Carui, Seſeleos an. 3. ij. baccarum Lauri vel Iuniperi 3. j. infundantur in menſur. j. Vini, Si Cimini odor non impediāt 3. j. illius addita, operationem illius iuuabit. Si amarū potius optent, Abſynthium additur.

In doloribus ventriculi Melilotum in vino decoctum vel infuſum, prodeſſe docet Dioſc.

Ex aromatum potiſſimum infuſione vina hoc pacto quoque ſunt ſtomachalia, quæ vt magis pleceant, plerumque dulcorantur, & aliquoties percolantur.

Saccharo dulce redditum, vſitatu eſt Hippocraticum dictum: quod recipit Cinamomi 3. j. Sacchari t̄b. j. Vini t̄b. quatuor vel quinq;, vel minùs, prout dulce eſſe cupimus. Quod potentius fiet, ſi Piperis, Zingiberis, Cardamom. mai. an. 3. β. addatur.

Melle dulce factum Pimentum dictum, Monſp. ſic paratur: R. Cinamomi 3. vj. vel plus, & erit gratius, Zingib. 3. v. Piperis 3. ij. Cardamom. mai. Gariophyl. Nucis moſch. an. 3. j. Mellis puri t̄b. v. Vini menſur. x. mace- rentur & colentur.

Claretum vocatum à noſtris aromatariis, ex permixtione multorū aromatum ſit. Cuius loco & tale poterit fieri ventriculo acōmodatum: R. Cinam. 3. j. β. Zingib. 3. β. Cardamom. mai. & min. Piperis rot. & longi an. 3. j. Nucis moſch. Maceris, rad. Galangæ, Gariophyl. an. 3. j. β. Spicæ, Schoenanthi an. 3. β. Mellis vel Sacchari, vel vtriuſque t̄b. j. β. Vini menſur. v. paretur ſa.

In Vini ſpiritu infuſio facta talis cochlearis vnus vel duorū menſura ſumpta, valde prodeſt: R. Cinam. 3. j. Spiritus vini t̄b. j. Sacchari quar. j. inſolentur aliquamdiu. Si aqua Roſacea addatur, odoratioꝝ erit.

Vel ſic quæ vino permixta vſurpatur: R. Cinamom. 3. j. Piperis, Zingib. Gariophyl. an. 3. iij. pulueriſata, in ſpiritus Vini t̄b. j. infundantur, in eoque macerentur. Huius ſi cochleare vnum vel duo Vino permixceas, Saccharumque addas, vinum aromaticum dulce & vrile ſubito parabis, ad eodem vſus vti reliqua commodum.

Aliud valde in doloribus ventriculi commendatum, ſed rectius ſic præparatum: R. Nucis moſch. 3. ij. ſpiritus Vini 3. ij. adde Mellis roſar. donec dulceſcat: vel ſi ſubito vſurpari debet, parum bulliat: Capiat cochlearia duo vel tria. Hoc aliqui, donec aqua vitæ abſumatur, decoquant, & ſic in mixturam redactum, vt dictum, exhibent.

Infuſum Abſynthij ſol. in ſpiritu Vini fiat, illiusque guttæ aliquot vino permixtæ, bibantur, idem quod vinum abſynthites præſtabit.

Vel ſi aliæ herbæ ſtomachicæ, in ſpiritu Vini infuſæ, ſic vſurpentur.

Iuſculis in cibis vſurpari ſolitis interdum hoc præſtamus. Sicq; ius Galli ſenis potum ventriculi ſtatus pellere docet Dioſc.

Ius, Pipere, Zingibere, Gariophyllis, Nucis moſchata, Macere aliisve aromatibus, ad concoctionem iuuandam conditur, & Croco tingitur.

Baccarum lauri nucleos iuſculis vulgus incoquere ſolet, vt illis non ſolum gratiam, ſed & efficaciam concilient.

Herbis iuſcula in hunc vſum quoq; con-diuntur, vt Maioranâ, aliisve odoratis gratis in culinis vſitatis, imprimisque Menta, Hyſo-

Hyſopo, Satureia: Abſynthij brodium commendatur, ſi ob amaritudinem non duplicet.

In dolore ventriculi, Chamomillæ & Meliloti flores in iure pulli cocti, iusque bibitum, vtile cenſetur, ſi ob nauſeoſum odorem ferre poſſint.

In flatulento & debili ventriculo: R. ſeminis Carui ʒ. j. Piperis integri gr. x. bulliant in iuſculo: ſi Maſtichæ ʒ. j. addatur dum coquitur, efficacius erit.

Cuius & folius decoctio ventriculum roborare dicitur.

Syrupi uſurpantur, cum materiam preparare ante purgationem volumus, hoc paſſo: Cum magis incidendū: R. Syrupi de Menta, de Hyſopo, vel de Stœchade an. ʒ. j. Mellis anthos ʒ. ʒ. aquarum Mentæ, Fœniculi q. ſ. fiat Iulep.

Cum abſtergere ſimul volumus: R. ſyrupi de Abſynthio, de Betonica an. ʒ. j. Mellis roſ. ſyr. Acetoſ. ſimp. an. ʒ. ʒ. aquarum Abſynthij q. ſ. miſce.

Cum roborare potiùs volumus: R. ſyrupi conſervationis cort. Citri, vel nucis moſch. aut Myrobal. ʒ. j. ſyrupi de Menta vel Calamenta ʒ. ʒ. miſce: Utatur per ſe vel cum Vino, aut aqua Abſynthij, vel Maioranæ.

Côpoſitus ſyrupus ſic fieri poterit: R. rad. Fœniculi ʒ. ʒ. rad. Imperat. Acori, Zedoariæ, cortic. Citri an. ʒ. ij. herb. Mentæ, Satureiæ, Hyſopi, Maioranæ, Betoniciæ, Spondilij, Saluiæ, flor. Roſmarini, Stœchados an. ʒ. j. femin. Fœniculi, Aniſi an. ʒ. iij. femin. Carui ʒ. j. Sœœnanthi ʒ. ʒ. fiat decoctio in Aqua & Vino: aromat. Nuce moſch. ʒ. j. ʒ. colaturæ adde Sacchari ʒ. vj. decoquantur ad conſiſtentiam ſyrupi: Capiat ʒ. ʒ. per ſe vel cum Vino.

Vel: R. ſyrupi de Menta ʒ. j. ſyrupi Abſynthini ʒ. ʒ. Bibat cum Vino.

Ex ſuccis ad corroborationem detur hic potus: R. ſucci Mentæ ʒ. ʒ. ſucci Abſynthij ʒ. ij. miſce cum Vino: Bibat vno hauſtu.

Dolorem ſubito tollit ſuccus Meliloti & Chamomillæ an. ʒ. ʒ. quantitate, cum Vino aliôve modo bibitus.

Aquæ ſtillantiæ, ventriculum calefacientes & roborantes præcipuæ ſunt, ex herbis,

Abſynthij, Menthæ, Calamenthæ, Maioranæ: Quæ vel per ſe, vel cum Vino miſtæ bibuntur: vel electuariis priùs aſſumptis, ſuperbibuntur, aut illis alia quæ bibi debent diluuntur, ſicque exhibentur.

Cinamomi aqua grata & efficax; per ſe ſumpta, ſubito calefacit ventriculum, reficitque, magisque calefacit, ſi cum vino extracta ſit: cui & Saccharum nonnunquam ut gravior ſit, permifcetur.

Aquæ ſeu ſpiritus Vini guttæ aliquot ſumptæ, refrigeratum pituitosumve & ſordidum ventriculum ſubito emendant, eoq; nomine vulgo uſus ipſius perquam eſt conſuetus. Si compoſita ſit additis multis calidis ſtomachicis plantis aliisve, & poſtea aqua inde eliciatur, efficacior erit.

Thermæ naturales aliquæ bibitæ diuturnam ventriculi imbecillitatem emendant, ab humiditate nimia, aut ſordium pituitære copiam contractam. Imprimisque ex illis nitroſæ: Porectanas laudant Itali: Germani variis abundant.

Oleæ vi ignis elicta ab aromatibus vel plantis conuenientibus, cum efficaciffima ſint, vix ſola exhibentur, ſed reliquis diluta aquis aut vinis aliisve, aut reliquis formis, ſicuti illic dicitur, permixta: illorumque tantum gutta vna aut altera pro vna vice datur.

Imprimisque ex aromatibus oleum Cinamomi efficax & gratum eſt: inde Gariophyllorum: Quæ à reliquis aromatibus exſtillantur, nec adeo grata nimiumque ſerè vrentia ſunt.

E plantis oleū Maioranæ & Mentæ præcæteris eligitur. Et ex feminibus ol. Aniſi, Fœniculi, ad flatum præſertim diſſipandos.

Ab expreſſis oleis, Nucis moſch. & Maceis olea quoque profunt, ſumpta, minusque inflammant, commodeq; cum vntuoſa ſint, cum iuſculo, portiuncula illorum, aliôve modo ſumitur.

Ricinum, Cnicinum, olea bibita flatuofos ſcribunt emendare ventriculos.

Inter ea quæ in ſubſtantia exhibentur; Simplicia quædam efficacia per ſe dantur, maſtlicanturque, vel tenuiter incifa aut puluerifata, cum Vino, aut cum Aqua mulſa,

vel

vel aqua Absynthij, aliòve liquore bibenda præbentur.

Melissa, Mentastrum, Menta Græca, Salvia, Cattaria Mathiol. Nardus Indica, Celtica, Lauadula, Tanacetum, Tragoriganum, Pulegiū, Ligustici semen & radix, ad flatus: Iuncus odoratus, Mei radices, in flatibus. Diosc.

Radices Imperatoriæ, ab alpigenis, Zedoariæ, Galangæ, Acori veri, Zingiberis, ab aliis, in ventriculi doloribus sic comeduntur vel bibuntur, vti & Rhaponticum Dioscor. Aristolochiæ radix exhibita, dolores stomachi & intestinorum emendat.

Bulbos. comestos dolorem tollere, Pistacia verò & Erucam concoctionem promouere docet Diosc. Vti & Pyra & Cotonea.

Menta cum Ovis in placentas coqui solet: quas & ex Absynthio similiter paratas in aulis etiam magnatū comedi summè amaras, non tamen adeò quibusdam, quorum ventriculus amaris delectatur, ingratas.

Semina Fœniculi, Anisi, Carui, comesta, flatu discutiunt, concoctionemq; iuuant.

Piperis grana septem vel nouem confracta, non puluerizata, vti sic minùs fauces vrât, cum Vino exhibita, subito refrigeratū ventriculum iuuant. Quod & Zingiber facit.

Piper 3.j. pondere, inuolutum in nebula madefacta in Vino ardoris illius vitandi gratiâ, aliqui exhibent, tuncque Vini haustus ad 3.iiij. superbitur.

Piper cum Vino Galenus mox post cibū assumptum exhibet, si eo in phlegma, vt inquit, conuerso, frigore æger corripiatur cum angustia anhelitus & pulsu debili. Quem casum & Bairus describit, & priuatum acrarum statuit: cum tamen idem sit cum Cardiacâ.

Nux moschata comesta concoctionem iuuat, vel alio modo sumpta. Cuius puluis cum aqua Chamomillæ extillata bibitus, dolorem ventriculi mox sedat.

Gariophyli comesti idem faciunt, tum per se, tum infixi prius volatilibus asis: addito plerumque & Cinamomo. Aliæ aromata quoq; comesta profunt. Cubebæ in flatibus præsertim laudantur. Galanga in ore saltem retenta, ructum alleviare creditur.

Mastichæ grana aliquot deglutita, vel puluerisata prius & cum liquore bibita à 3.j. ad 3.j. vel saltem grana aliquot, si sæpè repetatur, admodum ventriculum roborant.

Gummi Hederæ sic quoque sumptum, magnopere dolores ventriculi sedare & arcere aliqui testantur. Vti & Ladanum sic etiam vsurpatum.

Castoreum cum Vino bibitum flatu mitigè pellit. Diosc.

Lapis Exeberos cum Vino bibitur in stomachi affectibus: Bairus.

Compositi pulueres quos species vocant, Stomachici dicti, varijs sunt: Quibus in cibis vel medicamentis, per se, vel in alias formas redactis, vtimur.

Qui ex aromatibus præcipuè parantur, sic sunt: eligenda quando admodum calefacere volumus, non nihil adurentia, grata præsertim; vt piperis genera, zingiber, cardamomum maius & minus; vel minùs his grata, in pituitoso maximè ventriculo, zedoariam, cubebas, pyrethriq; radicem. Cum verò roborare potius cupimus, & non nihil laxum ventriculum astringere, minùs acria, sed odorata, vt nucem moschatam, mace rem, gariophylos, galangam, acorum verum, cyperum: vel suauis odore prædita, vt cinamomū, cassiam aromat. lignum aloës, santalum citrinum, spicam Indicam, squænanthum. Quibus crocus concoctionis & coloris gratiâ interdum additur. Ex seminibus quoque sunt calidis, concoctionem iuuantibus, imprimis cum flatu discutiendi, vt semine anisi, fœniculi, carui, cimini, apij veri, petrosel. maced. ameos, seseleos. Ex herbis idem præstantibus, odoratoribus & gratis, vt thymo, calamenta, ligustico vel leuistico, menta, maiorana, satureia. Quibus & radix additur quandoque enulæ & cortex citri. Et cum admodum roborandum, rosæ rubræ frequenter, rariùs mastiche adduntur. Quibus & ad ventriculum extergendum radix glycyriæ, cum & dulcis sit, interdum permiscetur: item radix azari, odorati admodum, sed paucâ quantitate, ne ventriculum subueniat: nitrum Gal. permiscet. Sed & moschum & ambram, vt cordi quoque appropriet, quibusdam compositioni-

tionibus permiscant, maximè odoris gratiâ, qui quidem aliquibus gratus, aliis verò non acceptus, nauseam potius parit.

Ex enarratis varij sunt pulueres. E quibus Cibarîæ species seu pro cibo illæ dicuntur, quibus iuscula, cibi aliæque fercula piperrata & condita dicta, vt ventriculo magis accepta & vtilia sint, condiuntur. Quales à coctis, pro diversitate ciborum plurimis modis, ex aromatum pauciorum pluriumve mixture, additis odoratis & gratis interdum plantarum partibus, parari solent.

E quibus aromatarij nostri, sequentes species ex aromatibus gravioribus paratas ad cibos condiendos semper præsto ad manum habent, & venum exponunt: R. Zingib. 3. ij. ʒ. Piperis 3. j. Nuc. mosch. Cinam. an. 3. ij. misce. Si puluerem hunc, croceo colore fercula tingere volunt, Croci 3. iij. addunt, tuncq; Croceus aromaticus pulvis appellatur.

Aliter vsuatus magis gratus: R. Zingiber. 3. iij. Granorum paradisi 3. ʒ. Piperis 3. ij. Nucis mosch. Gariophyll. an. 3. ʒ. Galangæ 3. ij. Cinamomi 3. ij. fiat pulvis. Qui alias per se vsurpatur: alias quoque Croci 3. vj. additis Croceus fit & dicitur.

Suauior adhuc illis, hoc pacto parari potest: R. Cinamomi 3. quatuor, Zingib. 3. j. ʒ. Gariophyllor. 3. j. Piperis 3. ʒ. Croci 3. ij. fiat pulvis.

Dulcis & suavis pulvis, Dulcis appellatus, qui cibis & pultibus maximè vt dulcedinem & odorem acquirant, inspergitur, sic fit: R. Cinamomi 3. ij. Zingiber. 3. iij. Cardamom. mai. Piperis, Nucis mosch. an. 3. j. Sacchari ʒ. ij.

Qua ratione priores quoque Species additâ decenti Sacchari quantitate misceri atque vsurpari possunt.

Salus quoq; pulvis, vel sal compositum, pro saliendo in mensa cibis in humidioribus & laxioribus ventriculis, hoc pacto fit: R. Salis asis parum 3. j. Galangæ 3. j. Cinamomi 3. ij. cineris Intestinatorum Gallinæ 3. ʒ. fiat pulvis.

Sal cum semine Carui, ouo forbili additum, præter hoc quoddam concoctionem iuuat, ne ouum facile corrumpatur, prohibet.

Medicati pulueres seu species, ad ventri-

culum calefaciendum, roborandum, flatus arcendos & cruditates emendandas, pituitamque & sordes abstergendas, ex prædictis quoque simplicibus duobus, tribus pluribusve, prout operari volumus, sunt. Qui vel soli inuicemve permisti, per se, vel cum liquore aliquo conuenienti, vt iusculo, vino, aquis, succis, decoctis, bibuntur: vel si non ingrati sint, etiam sine saccharo admisto: frequentius tamen addito saccharo, nunc æquali pondere, vel si vehementiores ingratioreve sint, maiori, interdum & octuplo amplioriue, in tragemata dicta rediguntur, vel aliis formis vt tabulis, electuariisve induntur. Horum puluerem stomachicorum exempla quædam subijciemus.

Ex aromatibus solis compositis, cum maximè calefacere oportet, Primus aromaticus pulvis hic est: R. Piperis rot. 3. j. longi 3. ʒ. Zingib. 3. ʒ. Cardamom. mai. Nucis moschatæ, Maceris, Gariophyl. Galangæ an. 3. j. Cinamom. 3. ʒ. fiat pulvis.

Secundus compositus & medicatus magis fit, si prædictis addatur, Cardamomi min. Zedoariæ, Ligni aloës vel Santali citr. Spicæ an. 3. ʒ. Cubeb. Croci an. ʒ. j. fiat pulvis.

Tertius aromaticus, suavis, cinamomeus: R. Cinamomi 3. j. Zingiber. 3. ʒ. Cardamomi mai. 3. ʒ. Piperis rot. ʒ. j. Nucis moschat. Maceris, Galangæ an. 3. ij. Gariophyl. 3. iij. fiat pulvis.

Ex hoc puluere, additâ Sacchari ʒ. j. tragemata dictum gratum & vtile fit. Quâ ratione pharmacopœi nostri, communia dicta Tragemata componere solent: alias omisso pipere & cardamomo: alias additis quoque cubebis: ponderibus quoque variantes.

Illius pulueris loco speciebus Diacynamomi Mesuei uti possumus: quod præter hæc cassiam ligneam, xilaloën, crocum, radicem enulæ & moschum recipit.

Ex plantis concinnatus pulvis, minus calefaciens, magis roborans, Quartus: R. Calamentæ veræ, Mentæ, Maioranæ, Thymi, Satureiæ an. ʒ. j. rad. Glycyriæ 3. j. ʒ. rad. Imperatoriæ, Enulæ, Pyrethri, in pituitosis an. 3. ʒ. rad. Azari, cort. Citri sicci an. ʒ. j. Ros. rub. 3. ij. fiat pulvis.

Ex feminibus, flatu admodum discuti-

viens puluis. Quintus: R. sem. Coriandri, Anisi, Fœniculi an. 3.ß. feminum Carui 3.ij. femin. Cimini (si odor non absterreat) Ameos, Sefeleos, Sileris mont. Ligustici an. 3.ß. fiat puluis.

Ex aromatibus & plantarum diuersis partibus commistis, sic possunt fieri, Sextus numero, admodum calefaciens: R. Piperis rot. & longi an. 3.ß. Zingib. 3.j. feminis Fœniculi, Anisi, sum. Thymi an. 3.ß. fiat puluis.

Huius loco speciebus Diatrionpipereon Gal. vti possumus, quod amplius calefacit: cum maiorem piperis quantitatem accipiat: Vel Mesuæi, quicassiam, spicam, semen apij, ameos, rad. azari & enulæ addit.

Vel speciebus electuarij de Aromatibus Gal. quod multa aromata recipit.

Idem præstat & validius pituitam extergit Diaspolicicon Gal. ex pipere, nitro, semine cumini & fol. rutæ concinnatum.

Septimus puluis non adeo potenter calefaciens vt primus, magisque herbaceus: R. fol. Calamentæ vel Mentæ, Maioranæ, Thymi, feminum Leuistici, Sileris mont. an. 3.j. Piperis Zingiber. an. 3.ß. Cinamom. 3.j.ß. misce, fiat puluis.

Idem Diacalaminthes Galeni præstat, vel Mesuæi.

Octauus puluis ventriculum admodum simul roborans: R. Ros. rubr. 3.j. Cinamom. 3.ß. Gariophyll. 3.ij. Nucis moschat. Maceris. an. 3.ij. Galangæ 3.j. Piperis. longi, Cardam. mai. Xilalois an. 3.ß. Zedoariæ, Spicæ an. 3.j. rad. Glycyriæ 3.ij. fiat pulu.

Consimiles sunt species Aromatici rosati Gabrielis, tantopere vsitata: quæ sine moscho & cum moscho paratur. Vti & Aromatici rosati Mesuæi quibus insuper cubebæ, troch. diarrhodon & galliæ mosc. accedunt. Nec hisce admodum absimiles sunt species Rosatæ nouellæ Nicolai, storacem cal. quoque admittentes: & species el. de Citro Mesuæi: moschatæ insuper.

Nonus idem præstans: R. Galangæ 3.vj. Acori veri, Gariophyll. Cinamomi, Maceris. an. 3.ij. Zingib. Piperis vtriusq; Cardamomi mai. an. 3.ß. Spicæ, Ligni aloës an. 3.j. feminum Anisi, Fœniculi, Carui, Menthæ sicc. Maioranæ, an. 3.ij. fiat puluis.

Huius loco species Diagalangæ Mesuæi sumere possumus, quæ præter hæc, ligusticum & calamentum recipit.

Decimus validius adhuc operatur: R. feminum Anisi vel Cumini, aceto prius præp. vel amborum 3.j. femin. Fœniculi, Carui, an. 3.ij. femin. Ameos, Sileris mont. herb. Calamentæ vel Mentæ, Maioranæ, Satureiæ, Thymi, Leuistici, Ros. rub. an. 3.j. cort. Citri sicci, radic. Imperatoriæ vel Zedoariæ, Pyrethri an. 3.ß. rad. Glycyriæ, Nucis moschat. Maceris Gariophyll. Galangæ, Cinamom. an. 3.j. Piperis, Zingib. Cardamomi. mai. Cubeb. Schœnanthi, an. 3.ß. Spicæ, Croci an. 3.j. fiat puluis.

Huius loco speciebus Dianisi Mes. vti possumus, quæ mastichen simul recipiunt, Vel Diacumini Nicol. vel speciebus el. de Seminibus dicti.

Sunt & aliæ vsitatae compositiones stomachicæ, quarum speciebus vti possumus: veluti Diazingiberis Nicolai, quæ pleraque aromata & semina aliqua, rosas & liquiritiam, & præter hæc rhubarbarum, pistacia & pineas, alios obvsus, recipiunt.

Item Diaxyloaloes Mes. quod cordiale simul est, & præter aromata multa, herbas, rosas, mastichen, & cordialia, been vtrumque, sericum, margaritas, corallo, fuscinum, folia citri, ocymi, balsaminæ, galliam mosch. moschum & ambram continet.

Pluris arcoticon, stomachicum quoque est, Diaxyloaloes non absimile, adhæc camphoram recipiens.

Electuarij Ducis vocati Nicol. species, cruditatibus ventriculi & flatibus medentur quoque, & nephriticis colicisque doloribus accommodatum simul est medicamentum.

Dyarrhodon Abb. species per se in frigidis stomachi affectibus non vsurpatur, reliquis tamen cum calefacere volumus, ad robur addendum, commiscetur.

Præter hosce pulueres, ex amaris aliqui concinnati, in cruditatibus indeq; natis excrementis & flatibus, cochlearis mensura cum vino aliòve liquore bibiti, iuuant. Qualis ex absynthio & centaureo in biliosa causa descriptus, hic quoque prodesse potest.

Vel sic paratus: R. rad. Imp. Aristolochiæ an. 3. j. β. herb. Absynthij, summ. Centaurij an. 3. j. feminum Cimini, Carui, Zingib. an. 3. j. Croci gr. v. fiat puluis. In pilularum formam redigitur, si ægrè puluerem fumant, additurque tunc & prædictæ compositioni Castorei 3. β. & cum syrup. de Absynthio vel alio fit massa. Cuius 3. j. exhibetur.

Post cibum seu pastum, vt vocant, assumendi pulueres ad ventriculum constringendum, vt cibos melius amplectatur & concoquat, ex astringentibus, ventriculo tamen accommodatis parantur, statuumq; & vaporum prouentum impredientibus, non admodum tamen calidis, ne ciborum crudorum adhuc digestionem procurent.

Veluti hoc pacto: R. sem. Coriandri præp. 3. β. sem. Fœniculi, Anisi an. 3. ij. sem. Carui 3. j. Cinamom. 3. ij. rad. Acori veri Galangæ, cort. Citri sicci an. 3. j. Ros. rubr. 3. β. Sacchari ad pondus omnium, fiat puluis post Pastum dictus.

In ventriculi relaxatione & humiditate nimia, magis adstringentia & siccantia addimus hoc modo: R. Cinamomi 3. β. Cassiæ aromat. 3. ij. rad. Galangæ, Cyperi an. 3. j. β. cort. Citri sicci 3. β. carniū Cydon. siccatorum, Ros. rubr. an. 3. j. Antispodij ex ebore, cornu Cerui vsti, Cinerum intestinorum gallinæ an. 3. β. Coralli rubr. 3. j. (vel horum & cinerum loco, pul. Diacydon. illius quod sine aromatibus paratur, & sine speciebus nominatur 3. j.) Sacchari ref. tab. ad pondus omnium, fiat puluis, post pastum, ad ventriculum stringendum, sumendus. Si Thus Masticheque addantur, efficacior fit.

Pulueres crasso modo incisi, quos Grossos ineptè vocant, cum antequam deglutiantur, mastigentur, variis modis parantur. Quos & ante cibum, ventriculo ieiuno existente, eosdem ob vsus, vt reliquos propinamus. Vel si non nimium calefacere, sed magis astringendo concoctionem iuuare & flatus discutere velimus, statim in fine cibi exhibemus, vt de pulueribus post pastum appellatis diximus.

Ex gravioribus autem si sine saccharo exhibeantur plerumque fiunt: vt ex semini-

bus potissimum: R. semin. Anisi, quod dulce est, 3. j. sem. Fœniculi 3. β. vel si dulce quoque sit, vt inuenitur, eodem quoque cum aniso pondere, sem. Coriandri 3. ij. sem. Carui 3. ij. rad. Glycyriæ 3. ij. Cinamomi 3. β. fiat puluis crassus.

Vel sic magis aromaticus: R. prædictum puluerem, addendo Nucis mosch. vel Macearis, Gariophyl. Zingib. an. 3. β.

Compositus ex variis vsitatus quem Pabulum sacerdotum vocant, sic paratur: R. Zingiber. 3. β. Nucis moschatæ Cinamom. an. 3. ij. rad. Galangæ, Acori veri, Gariophyllor. an. 3. ij. Cardamomi mai. 3. j. β. feminis Coriandri, Anisi, Fœniculi an. 3. β. feminis Carui 3. ij. rad. Glycyriæ rasæ 3. ij. β. incidantur omnia. Hisce pulueribus semina prædicta Saccharo semi obducta quandoq; permiscant. Vel alias Saccharum puluerisatum ad gratiam addunt.

Tabulæ ex supradictorum puluerum decem generum descriptorum vel vsitatorum, vt Diacinamomo, Diatrionpipereon, Diacalamenta, Aromatico rosato (quæ tabulæ valde & admodum in vsu sunt) Rosata nouella, Diagalanga, Dianiso, Diacumino, Diazingibere, Diaxyloaloe, Pliris arcotico, Electuario Ducis, vno aliquo ex illis genere parari possunt, & ad eosdem, vt illic dictum vsus accommodari.

Aut etiam ex crassioribus illis quoque propositis pulueribus: quod nunc valde consuetum est, Pabulum illud dictum sacerdotum in tabulas amplas formatum, exhiberi. Fiuntque Sacchari permissione ad 3. j. specierum comuniter 3. j. illius sumendo, vel plus si actiores aut non ita gratæ sint species, vel minus, si per se gratæ existant: saccharumq; Aquâ conuenienti aliquâ supradictâ, vel Rosarum ob gratiam coquitur.

Ex prædictis generibus duobus vel pluribus inuicem permittis quoque fiunt tabulæ, additis aliis quoque nonnunquam, exempli gratiâ. Quando admodum calefacere volumus: R. pulueris Primi vel Secundi vel Terti, vel Diacinamomi 3. j. pulu. Sexti vel Septimi, vel Diatrionpipereon aut Diacalamentæ 3. β. Zingiber. condit. 3. j. olei

Maioranæ gr.ij. Sacchari dissoluti in aqua Calamentæ q. s. fiant tabulæ.

Ad robur ventriculo addendum: R. pul. Octau, vel Aromatici rosar. 3. j. pul. Noni vel Diagalangæ 3. β. cortic. Citri cond. vel conf. Ros. 3. j. ol. Cinamom. gut. iiii. Sacchari dissoluti in aquis Mentæ, fiant tab.

In flatuoso ventriculo: R. pul. Decimi vel Dianisi 3. j. Diacumini 3. β. conf. Mentæ vel Maioranæ 3. j. ol. Anisi vel Fœniculi vel amborum guttas aliquot, Sacchari dissoluti in aqua Fœniculi vel Anisi q. s. fiant tab.

Ex aliis aromatibus plantarumve partibus, pluribus, paucioribus, vnius alicuius ex dictis generibus, ad horum imitationem tabulæ quoq; multifariam componi possunt: additis conferuis, conditurisve, aut oleis: vel hisce omisissis.

Ex Oleis solis guttatim cā saccharo postquam instabularum formam decoctum fuerit mixtis, sic fiunt tabulæ Anisi, Fœniculi, Carui, Maioranæ, Cinamomi, Gariophyllorum, prout oleum inditur vocatæ. Quæ admodum in vsu sunt & grata, efficacesq; satis, si dum oleum saccharo calenti infunditur, non exhalat, quod arte cauere potest: aut citra coctionem saccharo permisceri.

Conferuæ & condituræ simplicium quorundam, tam humidæ quàm siccæ, cum saccharo & melle paratæ, quædam in eisdem vsus exhibentur. Suntque vsitatæ conferuæ, Mentæ, Maioranæ, Rosmarini, Stœchados, Eryngorū iuxta Rond. Betonicæ cum Melle factam conferuam concoctionem iuuare scribit Diosc. Vti & Scyllam cum melle coctam vel assam.

Ex conditis, Zingiber integrum conditum, vel puluerisatum cum Saccharo coctum, & in stiras, vti fieri solet, formatum: Acorus item verus, qui calamus in officinis dicitur, conditus, Nuces moschatae, Myrobalani embl. Citri cortex, condita, Iuglandes nuces item aromatibus confixæ, vti vulgò fit.

Ex hisce omnibus quedam conuenientia dantur, vel sola, vel inuicem permixta, dein & in aliis formis, vt electuariorum, tabularū, vti dicitur, vsurpantur.

Condituræ siccæ ex simplicibus saccharo

obductis quoque competunt, vt Cinamomi, Gariophyll. Zingiber. Zedoariæ, Galangæ, Acori veri, Citri cortic. incisæ particulæ & Saccharo incrustatæ. Item fol. Rosarum, Maioranæ aliorumque, quæ à quibusdam Saccharo quoque industrie oblinuntur. Seminum maximè status discutientium confectiones, tum ante cibum, tum post cibum exhibentur: vt Coriandri, Anisi, Fœniculi, Carui, tum per se, tum commixta interdum, & cum conditi Cydoniorum sectâ lamina, feminibus hisce, vt illi adhæreant, impressâ, sumpta. Ad quorum similitudinem multi eiusmodi parari possunt.

Electuaria varia ex pulueribus decem vel vsitatis speciebus formari possunt, si liquidiore materiâ, vt Melle despumato vel Saccharo in formam syrupi cocto, aut syrupo de Menta, de Cydoniis, vel syrupis conseruationis Zingiber. aut cort. Citri conditorum, aut pulpâ Cydoniorum, aliisve excipiantur.

Quæ formâ molliorum electuariorum, ex vsitatis speciebus pleræque in pulueribus recensitæ, Melle despumato exceptæ, à Veteribus parabantur, hacque formâ potius quàm aliâ vsurpabantur. Et miua cydoniorum aromatica à Nicol. ex miuâ cydon. & pulueribus multis paratur.

Additâ quoque carne fructuum aut radicum, vsitata sic fiunt electuaria stomachica: vti confectio Diacydonites dicta Nicol. cum speciebus: quæ ex cydoniorum carne cum melle coctâ, additis multis aromatibus fit.

Recentiores electuarium Acori dictum ad eiusmodi ventriculi affectus in vsu habent: quod ex radice acori palustris recenti in vino coctâ, additis multis aromatibus melleque subactis, paratur. Quod vtilius fiet, si loco acori palustris, et si astrictione suâ quoque conueniat, cum tamen inodora radix sit, Acorus verus, cum recens haberi possit, sumatur.

Ex raphano rusticano, electuarium Raphani marini appellatum, vulgus quoque simili modo, additis aromatibus & melle, & radice insuper gentianæ, in eisdem vsus parat.

Ex horum omnium diuersimodâ mistu-

ra, varia electuaria formari possunt, quibus conferuæ, condita, aliæque sæpenumerò adduntur. Veluti exempli gratiâ:

Cum calefaciendum: R. elect. Diatrion-piper. vel tabularum 3.j. vel specierum illius aut nostratium 3.j. conf. Mentæ, Maioranæ an. 3.j. Zingiber. cond. 3.β. misce cum syrupo de Stœchade.

Quando robur potius addendum: R. electuarij Aromat. rosar. vel Diagalangæ, vel tabularum illius compositionis 3.j. vel specierum illarum aut nostrarum 3.j. conferu. Rosar. antiquæ, cort. Citri, cond. Acori veri simpl. conditi an. 3.β. cum syr. Cydon. fiat electuarium.

Si flatuum potissimum habetur ratio: R. el. Dianisi vel Diacumini: vel tabulas vel species illas, vel nostras, pondere dicto, adde conf. Ros. Calamentæ, Nucis moschat. cond. an. 3.β. cum syr. de Menta, misce.

In laxioribus & humidioribus ventriculis, magis siccantibus vtendum, & astringentibus: R. carniū Cydon. cond. 3.j.β. cort. Citri cond. 3.j. Zingib. cond. 3.β. Myrobalan. embl. num. j. elect. Diacytonites illius quod sine speciebus dictum ex spodio constringentibusque paratur 3.β. spec. Aromat. ros. Corall. rubrar. ana 3.j. cineris Intestinarum gallinæ, antispodij ex Cotoneis vel Ebore, vel illius loco rasuræ Eboris ana 3.β. cum syr. Cydon. vel Miua Aromatica fiat electuarium: de quo post cibum instar nucis fumatur.

Huc quoque referuntur mixturæ eadem ratione factæ, nisi quod non humidis, sed saccharo sicco puluerisato addito, in formam electuarij, non aded omninò mollis, rediguntur. Exempli gratiâ.

Gratum & vtile: R. carniū Cydonior. condit. 3.β. conf. Ros. 3.iiij. confer. Maioranæ, Zingiber. condit. an. 3.iiij. spec. Aromat. ros. 3.j. Cinamom. 3.ij. Gariophyl. Nucis moschatæ an. 3.j. Sacchari ros. tab. q. s. fiat mixtura: Vtatur manè. Possunt & confectiones siccæ, Coriandri, Anisi, Fœniculi commisceri.

Post cibum ad ventriculum constringendum mixturæ hæc quoque in vsu sunt, omiffis tamen calidioribus aromatibus, hoc pacto: R. carniū Cydon. cond. 3.iiij. conferu.

Ros. cort. Citri cond. ana 3.ij. Cinamom. 3.j.β. pul. Diacyd. quod sine speciebus paratur 3.j. Coralli rubr. 3.β. femin. Coriandri 3.ij. femin. Anisi, Fœniculi an. 3.j. Maioranæ, flor. Ros. rub. an. 3.β. Sacchari q. s. Vel illius loco, semina Saccharo semicooperta duplo pondere, fiat mixtura.

Opiatæ aliquæ exhibitæ, dolores ventriculi admodum compescunt, etiam à frigida causa inductos, cum eum, vti creditur, ratione opij minimè refrigerent, sed propter multa calida quæ ingrediuntur potius calefaciant, vti sæpe ostensum.

Quapropter etiam in hisce causis cum dolor vrget, Theriaca, Mitchridatum, Asyncriton, Philonium, à 3.j. ad 3.j.β. exhibitæ iuant. Per se sumpta vel cum aliis. Post quorum vsu Vinū generosum superbibitum, operationem illorum accelerat. Horum loco & alia narcotica exhiberi possunt, additis aromatibus, similibusque.

Sunt qui eiusmodi opiatas purgantibus mistas quoque exhibent. Laudaturque Philonium cum Diaphœnico exhibitum: idque cum ab excrementis ventriculus grauatus dolet.

Extrinsècus ventriculi regio inungitur, ^{Imbecilis} vel fouetur, vel emplastratur, illis quæ calefaciunt refrigeratum, vel flatibus distentum, ^{Ventriculi altioris} vel debilem, vel astringunt laxum: eligendo ea præsertim, quæ proprietate ventriculi accommodata sunt. Quæ omnia actu calida adhibentur.

Inunctiones in anteriore regione vbi cordis est fouea dictæ, fieri debent, ad sinistram potissimum latus declinando: sed & posteriore loco è directo iam dictæ sedis, è vertebri dorsi versus sinistram sedem vnctiones si fiant, in ventriculum quoque suas vires exerunt. Postquam inunctione, pulueres mox describendi sæpe insperguntur.

Ex oleis simplicibus vel inuicem permistis hæc sunt. Sumiturque ex vñtatis, quando præsertim calefaciendum est, oleum Mentæ, Nardinum, Gelsiminum, Sambucinum, vel expressum de Nuce moschatæ, aut Macere, quæ duo & suauis odore recreant, ventriculumque admodum iuant: vel exstillatur ex Spica aut Menta,

Gariophyllis, aliive aromatibus. Quando flatus potissimum dissipandi, oleum Rutaceū, expressumve ex Lauri baccis, vel exstillatum ex Iuniperi granis, sed reliquis tantū parvā quantitate admixtis, aut seminibus Anisi, Fœniculi, Carui, Cimini, guttatim tantum reliquis permista, cum illis vti volumus. Cum potius roborandum Mastichinum, Absynthinum. Cum potentius astringendum, supradictis, Lentiscinum, Myrtinum, Myrtillorum, Rosaceum, simplex vel omphacinum, Cydoniorum, & expressum ex seminibus Vuarum, permiscemus. Cū dolor sedandus; oleo Chamomelino, Anethino, addito Nardino utimur. Quod & si post crapulam, & commessiones dolent, iuuat. Ad quorum similitudinem alia olea ex herbis stomachalibus, ipsorumve succis in coctis parari possunt.

Ad calefaciendum, flatus dissipandos & roborandum, ex aromatibus compositum oleum sic fit: R̄. Mastichæ 3.vj. radic. Acori veri, Galangæ, Cyperi an. 3.β. Nucis mosch. Gariophyllanaz. iij. sem. Fœniculi & Angelicæ anaz. ij. Vini Maluatici vel aliās præstantissimaz. ij. olei oliuarum vel Nucum q. f. vt superemineat, stent in loco calido aliquandiu, vel in vase, ne tamen adurantur, parum coquantur ad vsum.

Cum majus ventriculo robur est addendum, ex plantis compositum oleum hoc confert: R̄. herb. recentium Absynthij, Mentæ an. 3.ij. Saluizæ, Rosmarini, Lauandulæ ana 3.β. fl. Ros. rubr. siccz. iij. vel recent. duplum, incidantur minutim, adde. pulv. Mastichæ 3.j. affunde Vini rubri optimi 3.iiij. olei Oliuarum & nucum, vt tribus digitis materiam superet: coquantur, colentur.

In flatibus potissimum conueniens: R̄. feminum Cimini, Carui, Leuistici, Fœniculi ana 3.ij. baccarum Lauri, Iuniperi ana 3.β. fol. Rutæ, Leuistici: Mentæ, Lauri ana 3. iij. vel recent. duplum, puluerisatis & contusis misce Aquæ vitæ 3.ij. addendo olei oliuarum vel Nucum, & coquendo vt prius dictum est.

Vnguentā stomachica, ex oleis enarratis, additis aliis simplicibus, & aromatibus præsertim hoc pacto sunt. Quando intentio

potissima est calefaciendi refrigeratum vel imbecillem ventriculum: R̄. olei Mentæ, Nardini ana 3.j.β. olei de Absynthio 3.β. ol. Spicæ gutt. aliquot, Gariophyll. Nuc. mosch. vel Maceris ana 3.j. ligni Aloës vel Santali odor. 3.β. Mentæ sicczæ, Maioranæ vel Rosmarini Schœnanti an. 3.ij. Ceræ q. f. fiat vnguentum.

Ad inflatum ventriculum idem conuenit, præsertim si huic vnguento addatur olei Rutacei vel Laurini 3.β. vel guttæ aliquot oleorum efficaciorum exstillatorum ex seminibus supradictis flatus pellentibus, aut baccis Iuniperi.

In vtrisque quoque causis confert hoc odoratissimum vnguentum: R̄. olei expressi ex Nuce mosch. vel Macere aut vtrisque 3.ij. ol. exstillati Gariophyll. guttas. iij. ol. exstill. feminis Anisi, vel ex aliis quoque guttas. vj. Gallie mosch. 3.β. Ceræ albæ q. f. fiat vnguentum. Moschum & ambram & ol. Cinamomi in magnetibus addere possumus. Cum admodum calefaciendum ol. Euphorbij aliqui addunt.

Ad imbecillem ventriculum roborandū: R̄. ol. Mastichini, Nardini an. 3.j.β. ol. Mentæ 3.vj. rad. Galangæ vel Acori veri, Cyperi an. 3.j. Nucis mosch. vel Maceris, Ros. rub. Mastichæ an. 3.β. Spicæ 3.β. Storacis cal. 3.j. Ceræ q. f. fiat vnguentum. Species Hieræ picræ quoque addi possunt.

Ad humidum & laxum ventriculum siccandum & constringendum: R̄. ol. Myrtini vel Myrtillorum vel Lentiscini, Cydon. an. 3.j.β. ol. Mastichini 3.j. ol. Absynthini 3.β. rad. Galangæ, Bistortæ, cort. Citri an. 3.j. flor. Ros. rub. Labruscæ, Balauft. an. 3.ij. Hypocistidis, Ladani an. 3.β. Mastichæ, Thuris, Coralli an. 3.j. & si admodum astringendum, Boli tantundem, Ceræ q. f. fiat vnguentum: Alumen & Acetum cum validissimè constringendum, permiscunt.

Si dolor admodum vrgeat ventriculi: R̄. Vnguenti Dialtheæ 3.j. Mastichæ 3.ij. olei Anethini vel Chamomelin. an. 3.β. sem. Cimini fol. Mentæ an. 3.j. Ceræ q. f. fiat vnguentum.

Cerata & emplastra supra coriū pannūmve deducta, & in formam scuti formata, in ventricu-

triculo affecti, cum ventriculo apposita diutius ab ægris retineri gestarique possint, admodum conueniunt. Quæ ex enarratis vnguentis, ventriculum præsertim roborantibus & constringentibus, auctâ ceræ quantitate, si cerata, vel additis resinosis, si emplastra formare volumus, parantur.

In ventriculi imbecillitate, vsitatum est Ceratum Galeno adscriptum stomachicum, vel emendans vitia stomachi nominatum: quod ex rosis, absynthio, spica, mastiche, oleo ros. & cera paratur.

Cuius loco hoc ceratum fieri potest: R. rad. Aristoloch. longæ, Acori veri an. 3. β. herb. Mentæ, Absynthij, flor. Ros. rubr. an. 3. iij. Spicæ Ind. 3. ij. Mastichæ 3. vj. olei Nardini & Mastichini & Ceræ q. s. ad formandum ceratum.

Vel hoc emplastrum stomachale: R. Mastichæ 3. j. β. Thuris, Ladani an. 3. j. Storacis calam. 3. β. Aloës 3. ij. (nisi dolor grauis ægro molestus sit) addi possunt, Coralli rubr. 3. ij. rad. Galangæ, fol. Mentæ, Absynthij, Maioranæ, flor. Ros. rubr. an. 3. j. Gariophyll. Spicæ nardi & Celticæ, Santali od. an. 3. β. ol. Nardini & de Menta, additâ Resinâ Cera & Pice q. s. fiat emplastrum.

In laxiore ventriculo confert emplastrum consuetum de Mastiche appellatū, validius adhuc astringens. Cuius cum variæ habeantur descriptiones, hæc correctâ magis erit: R. Mastichæ 3. ij. Thuris 3. j. Storacis, Ladani ana 3. β. Hypocistidis, Acaciæ ana 3. iij. Galliæ, Alistæ mosch. 3. j. rad. Cyperi, folior. Absynthij 3. iij. folior. Mentæ, Maioranæ, Rosmar. Myrti vel Myrtillorum vel Lentisci ana 3. ij. flor. Rosar. rub. 3. β. seminum Coriandri, Cimini, Berberis, Sumach ana 3. iij. Gariophyll. 3. ij. Santal. omnium, Ligni aloës, Schoenanthi, Spicæ nardi & Celticæ ana 3. j. Boli pinguis, Corallian. 3. β. ol. Mastichini & Nardini, Resinæ pini, Ceræ, Laricæ, Picis ana q. s. ad formandum magdaleonem emplastri.

Si flatus ventriculum simul infestent, emplastrum Laureum, ex Lauri baccis, mastiche, thure, myrrha, cypero & costo cum melle parari solitum, accommodatum est.

Pro quo sequens vsurpatum efficacius erit

ad flatus pellendos ventriculumque firmandum: R. Lauri baccarum 3. j. Iuniperi bacc. 3. β. seminum Carui, Cimini, Ameos an. 3. ij. foliorum Mentæ, Rutæ an. 3. j. rad. Cyperi, Costi vel potius Imperatoriæ an. 3. β. Zedoariæ 3. ij. Mastichæ, Thuris ana 3. vj. Aloës, Myrrhæ ana 3. ij. vel spec. Hieræ picræ tantundem, excipiatur Melle anthosato & paucâ Laricæ vel Terebinthinâ, fiat emplastrū: si parū olei Nardini addatur, cum oleo aliquo stillatitio seminum, efficacius erit; nec tam subitò siccabitur.

Hierapicra simplex Galen. cum Melle in formam electuarij redacta, forinsecus quoque ventriculo emplastri instar applicata, ipsius debilitatem corrigit.

Cataplasmata citra vinctuosorum permissionem (quorum odor plerisq; ingratus est) parata, odoratiora & gratiora sunt, sed citius exiccata frequentius repeti debent.

Herbæ recentes, Absynthij, Mentæ, Saluiæ, contusæ & calefactæ, separatim simulque ventriculo applicatæ, eum reficiunt: Quæ interdum integræ supra tegulam calentem positæ parumque costæ, & vino generoso aspersæ, sic adhibentur. Vel si siccæ fuerint, vel incisæ aut puluerisatæ, vino emollitæ, hoc pacto vsurpari possunt.

Vel sic: R. herb. siccarum Mentæ, Absynthij, flor. Rosar. rubr. & Chamæmeli odoratioris an. 3. β. Panis tosti & pulu. 3. ij. coquantur in Vino potenti & applicentur. Quibus si pulu. Mastichæ, aut alij etiam in emplastris & ceratis explicati vel sequentis cataplasmatismis permisceantur, ventriculum magis confirmabit.

Ex succis ventriculo accommodatum tale fit: R. Mastichæ 3. β. Thuris, Ladani an. 3. ij. Ros. rubr. Nucis mosch. Gariophyl. Maceris, Cinam. an. 3. j. farinæ Hordei 3. j. succi Mentæ, Absynthij, Maioranæ q. s. vel omnium vel vnius cuius planta recens haberi potest, & tunc aliæ puluerisatæ hisce addi possunt: subigantur donec fiat pasta, quæ calefacta ventriculo applicabitur.

Hæc eadem, pulpâ Cydoniorum, aut Pomorum acidulorum odoratorum, prius parū coctorum, aut micâ Panis in Vino emollitâ vel parū costâ & contusâ

excipi possunt, sicque vsurpari. Hisque formis alia quoque multa ex supradictis permisceri.

In flatibus: R. Farinæ ex qua panis coquitur, vel micæ Panis, scutellam vnā mediocrem: permisce puluerem seminum Carui, Cimini, Fœniculi, baccarum Lauri an. 3. β. cum Vino subigantur, formetur placenta, quæ parum in clybano cocta, mox per medium secta vel contracta, portio illius orbiculari formâ ventriculi sedi adhibeatur: mutando vbi refrixerit, aliâ parte illius denuo calefactâ. Cui formæ & alia in emplastris, flatibus adscripta, addi possunt.

Hiscæ omnibus cataplasmatibus, si olea aliqua stomachica permisceantur, non tam citò arefcent, nec toties, vti dictum, ea renouare necesse est.

Arthemisiā tenui folio contusam, & cum Oleo mixtam, ventriculo dolenti impostam, prodesse docet Diosc.

Vsitata talia cum oleis concinnata cataplasmata potius quam emplastra, sunt, emplastrum de Panis crusta dictum Montagnanæ, ex oleo mastichino, cydoniorum, panis crustâ, farinâ hordei, mastiche, mentâ, corallo, spodio factum. Et emplastrum Diaphenicon calidum appellatum Mesuæi, ex oleis, cera, pulpis dactylorum & cydoniorum, pane, additis pulueribus variis stomachicis paratum.

Ex liquoribus, spongiis, exceptis aut linteo, vel lana aut bombace vel rasurâ dibapti, foci sunt, idque maximè dolore admodum virgente, qui focibus præsertim mitigatur, tum etiam in aliis causis, si ante vñctionum aliorumve quæ applicantur vsus fiant, vt rectius illa operentur, iuuant.

Ex decoctis vt plurimum sunt, idque in dolore summo, hoc modo: R. Absynthij, Mentæ, Serpilli ana M. j. radic. Altheæ 3. vj. rad. Aristolochiæ longæ 3. β. flor. Rosmarini, Chamom. Meliloti, Anethi an. P. β. semin. Lini, Fœnogræc. an. 3. ij. Nucis moschatæ, Maceris an. 3. j. β. coquantur in aqua & Vino ad vsus.

In intemperie frigida ventriculi: R. herb. Mentæ, Maioranæ, Balsamitæ ana M. j. rad. Galangæ, 3. ij. Gariophyl. Zingib. an. 3. ij. Pi-

peris longiz. j. bulliant in Vino veteri, odorato vel aromatico, pro foci.

Si flatibus infestetur ventriculus, idem conuenit: tuncque præsertim: R. fol. Pulegij, Origani, Calamentæ, Mentæ, an. M. j. flor. Sambuci, Chamomill. Stœchados vel Lauandulæ an. P. j. seminum Coriandri, Fœniculi, Carui, Cimini vel Ameos an. 3. ij. bacc. Lauri 3. β. Schœnanthi, Spicæ celt. an. 3. ij. Folij 3. j. fiat decoctio.

Debilem ventriculum roborans, ex pluribus paucioribusve sequentibus sic fit: R. rad. Acori veri, Imperat. an. 3. β. cort. Citri sicc. 3. ij. herb. Absynthij, Mentæ, Maioranæ, Balsamitæ an. M. j. flor. Ros. rubr. Rosmariniana P. j. Gariophyll. Nucis mosch. Galangæ, Zedoariæ an. 3. ij. Spicæ vtriusque, Schœnanthi, Santali od. vel Xyloaloes an. 3. j. Mastichæ 3. vj. decoquantur in Vino rubr. ad fomentum.

Laxum ventriculum constringens foci: R. cort. Citri 3. β. cort. Granat. 3. ij. herb. Absynth. fol. Sumach. vel Myrti an. M. j. Rosar. rubrar. 3. ij. Balauft. 3. ij. summ. Labruscæ 3. j. seminis Myrrill. Coriandri an. 3. j. β. rad. Galangæ, Cyperi an. 3. ij. decoquantur in Vino rubro stiptico.

Ex oleis quoque fiunt foci ad dolorem sedandum, hoc pacto: R. Olei cœmunis q. s. atque in eo decoquatur, Vini Maluatici vel aliâs generosi 4. pars, vel Aquæ vitæ decupla pars, ad consumptionem, & lana vel glosipium hisce intinctum, adhibeatur.

Alijs quoque oleis superius enarratis in oleis stomacho appropriatis, simili modo exceptis, fométationes, sed potissimum in doloribus compescendis fiunt.

Quæ olea & decoctis supradictis quandoque permiscuntur. Vel cum succis Absynthij, Mentæ, Maioranæ, addito Vino maluatico permista, addito Albumine Ovi, bene inuicem agitata & excepta, vti dictum,aponuntur.

Pulueres stomachici sacculis plerumque excepti, ventriculo adhibentur: qui ex syndone rubra cocco tincta facti, vtiliores censentur, atque ita consuuntur, seu, vt vocant, interbastantur, vt æqualiter pulueres dispersi maneant, interposito quandoque

gossipio. Priusque antequam adhibeantur calefiunt: nonnunquam & vini calefacti vapore suffumigantur.

Hi cum calefacere ventriculum potius, vel roborare magis cupimus, ex illis quæ fœtus in intemperie frigida & debilitate ventriculi præscriptos subintrant, commodè fieri possunt.

Vel hoc pacto pulvis vtrumque præstans, paratu facilis, sic fit: R̄. Mentæ, Absynthij an. M. j. Ros. rubr. P. j. Nucis mosch. 3. j. β. Gariophyl. 3. j. Mastichæ 3. ij. fiat pulvis, cui Corrallos rub. addunt.

Alius pulvis odoratus admodum, sic fit: R̄. Mastichæ 3. β. Gariophyl. Nucis mosch. Maceris an. 3. j. Piperis longi vel Zingib. 3. β. Cinamom. 3. j. β. Ligni aloës vel Santali od. an. 3. β. si odore moschi delectetur, Moschi vel Ambre parum: vel spec. Diamoschi vel Diambræ, vel Galliæ aut Aliptæ mosch. 3. j. fiat pulvis pro sacculo.

Cum validius astringendum, eadem quæ fotum, laxum ventriculum constringentem subeunt, pro sacculo quoque sumi possunt.

Vel hoc modo: R̄. Mastiches 3. β. Thuris 3. j. Coralli rubr. 3. ij. β. rad. Cyperi, cort. Citri, Ros. rubr. Nucum cupressi, Balauft. ana 3. β. Spongiolæ rosæ caninæ odoratæ, quæ Eglantinam vocant, Germ. Bithag. Nucis mosch. an. 3. j. fiat pulvis pro sacculo.

Ad flatus dissipandos, ex materia quam fotus, flatibus pellendis descriptus recipit, sacculus etiam fieri potest.

Vel sic: R̄. rad. Galangæ 3. β. fol. Mentæ, Pulegij an. 3. ij. Rutæ 3. j. seminis Fœniculi, Carui, & Cimini, si grauis odor non obstat, an. 3. j. Spicanardi, Schoenanthi an. 3. β. fiat pulvis: possunt & aromata quædam addi.

Ad dolorem sedandum, quæ fotum anodynum componit, in pulveres redacta, sacculus insuntur.

Vel ex hoc pulvere paratur: R̄. flor. Chamom. Meliloti, Anethi, Rosarum, summit. Rosmarini an. P. j. Absynthij M. β. confuantur in sacculo.

In dolore à flatibus præsertim, sacculus hic est vtitatus: R̄. Furfuris M. j. Milij integri vel parum conuassati P. j. torrescant & fricentur parum in sartagine pro sacculo. Sal

nonnunquam quoque additur. Si Mentæ pulvis addatur, magis ventriculo appropriatus erit.

In crusta seu orbe absceto panis calentis, modò ex clibano extracti, vel parum torrefacti, & Vino generoso seu Maluatico madefacti, pulueres enarrati compositi, simplicioresve aspersi, ventriculo quoque admoventur.

Communiterque in doloribus ventriculi pulvis Mastiches cum Gariophyllis, Nucis mosch. & Rosis, cum crusta panis, vti dictum, admoventur.

Vel etiam ventriculo prius oleis conuenientibus, vt illic dictum, vncto, pulvis iam dictus inspergitur. Vel alij qui vnguentis, vt supra ostensum, permiscantur, aut hi qui sacculis insuti alias vsurpari solent, sic quoque ventriculo asperguntur.

Ad externa referunt & ea, quæ foris admota, ventriculum ab externo aëre, contractuque aliorum frigidorum muniendo, ex accideri calefacere dicuntur. Quod magis propriè faciunt, si hæc prius actu calefiat, vel quæ potentiâ simul operantur, illis imponantur.

Pectoralia dicta eam ob causam, tum ad præcautionem, sani, imprimis verò illi quibus ventriculus imbecillior est, gestare solent, illisque ne nuda, sed bene tecta ventriculi seruetur regio, eam præmunire.

Quæ vel ex Panno laneo spisso parantur, qui si succo Chermes rubro tinctus fuerit, vti est scarlatum dictum, tunc cordialis simul esse censetur. Vel aliâ arte pectoralia ex panno linteo duplicato, interposito gossipio, seu, vt vocant, interpastato, fiuntur. Aut thorax eâ sede quæ ventriculo incumbit, cotone, tum huius vtilitatis, tum elegantie causâ infarcitur.

Quorum loco, quibus infirmior est ventriculus, vel vbi admodum refrigeratus fuerit, Pelles adhibentur: quarum pilicùm se proximius & æqualiter magis corpori applicet, rectius sic muniant calefaciuntque. In quibus delectum quoque habentes, priuatim ventriculo Vulpinas, Leporinas, Lupi catuli, Vituli abortus, præcæteris conuenire existimant. Vti & pelles detractas ab auibus plumeas, à Vulturibus præsertim, quibus singulares vires quoque attribuunt.

Et cum pennæ molliores, plumosæ, exiguæ calamis constantes, se quoque uti pili exactè corpori applicent, loco pellium, puluinis frequentius plumis refertis, Anferinis, potissimum, ventriculum, si facile patitur, & ægrè concoquit, tegere & interdiu & noctu potissimum solent.

Qui gossipio interdum loco plumarum quoque infarcti vsurpantur. Tunc ferè, quando illud præparatum prius, ut efficacius sit, in agris, veluti in Vino vel decocto, aut succo aliquo conuenienti stomachali immersum & expressum, denuo siccatum, aut pulueribus stomachicis conspersum puluinis inferimus, vel etiam alioquin applicamus. Quorum loco tamen sacculis potius utimur, sicuti in externis iam dictum fuit. Gossipij loco rasurâ Dibapi adhibitam, valde commendat Holler.

Præter hæc in agris potissimum ad calorem natium ventriculi fouendum, Corpus calidum hominis, noctu in lecto, ventriculo appressum retentumque, ut coniugis (quo remedio Dauid utebatur) vel mariti, aut infantis, vel manus sola propria vel alterius admota, iuuant.

Vti & Catellus in lecto ventriculo accumulans, qui potius quia homini familiaris est, quam quod proprietate quadam viribus possit, cæteris præfertur.

Inter ea quæ foris administrantur, Fascia ventriculum inflatum, post euacuationem factam & flatuum discussionem, sensim stringere, ut denuò subsideat: vel leui compressione id facere, non erit inutile.

Cucurbita irem magna, vmbilico apposita, flatus à ventriculo reuellendo iuuat.

Imbecillitas in ventriculo à siccitate.
Si à siccitate sine caliditate (cum qua si accidat, in calida ipsius constitutione quid agendum, explicabitur) imbecillitas eueniat, ventriculo tunc astricto duroque, nec rectè sed larante; cum hoc non nisi magnam ob causam accidat, in senibus præsertim, toto corpore simul siccis & attenuatis, vel in hæctica febre, in qua vniuersum corpus emaciaturum astrictumque est, uti & sine hæctica corpus emaciaturum sit, aliquando & ob omnimodam cibi potusque diutinam abstinentiam, ventriculo exiccato; & uti in mu-

liere melancholica, quæ venenum sibi exhiberi metuës, nihil per os admittebat: quem admodum senectus reparari minimè potest, hæctica & atrophia à siccitate ægrè curari, sic & hæc in illis curatu impossibilis, in his difficilis, nec quoque aliam priuatam ab ea, quæ in hæcticis vniuerso corpori humectando & reficiendo debetur, curandi rationem requirit. Sed uti in ea, sic & hîc præsertim per assumpta, ut Cibus, Potum, Condituras Conferuasque, aliæque medicamenta humectantia & restaurantia, in hæctica explicata, ventriculû humectare & relaxare studebimus. Quod & in ediam diu passis, facere cõuenit, modò non adeò ventriculus arefactus sit, ut emendari amplius nequeat.

Calidior ventriculi constitutio, quæ adhuc naturalis est, etsi morbosa nondum sit, quia tamen prona ad morbos, eam ob causam, quod in ea ventriculus à cibis calidioribus facillè & nimium incallescens, fitim ardoremque ventriculi pariat, & cibos facillè corrumpat, & in bilem conuertat; Ideò ne tale quid accidat, decenti victus ratione institutâ, cum, si in ea peccetur, hæc tunc primum nocere soleat, & si hoc frequenter fiat, in deterius conuerti, præcauebitur.

Quod fiet, si qui huic obnoxij, ab alimentis quæ facillè corrumpuntur, abstineant, aut sibi temperent. Qualia sunt pinguia, imprimisque piscium Pinguedo noxia. Lac quoque in calidioribus ventriculis corruptioni obnoxium: Vti & oua, quæ in bilem meracissimam sæpè conuertuntur. Quod & oua piscium, barbi imprimis, quæ purgare ob id vulgus credit, faciunt. Aliæque multa eiusmodi non solum ab animatibus, sed & à fructibus petita, quæ, licet teneriora cum sint, facillè concoquantur, in eiusmodi constitutionibus citò corrumpuntur nocentque. Sicuti verò ea quæ concoctioni in imbecillioribus ventriculis non facillè cedunt, à calidioribus sine negotio concoquantur, nec ab illis afficiuntur.

Imprimis verò cibi nimia conditura, caliditatem aliquam adepti, vel per se calidiores & medicamentosi, ipsis minus conueniunt: sicuti & illi qui ob putredinem incipientem calidiores & deteriores euadunt. Quæ

Calidior ventriculi constitutio, naturalis adhuc, ne fiat, præseruatio.

les sunt, si nimium eos aromatizando acrimoniam, & saliendo falsedinem acquirant, à quibus admodum læduntur. Vel si ob moram, rancorem, vti pingua maximè, contrahant: vel aliàs situm, vti caro ferina, vel etià ferorem, vti caseus putris, redoleant, quæ etfi abominabilia in cæteris omnibus ferè alimentis, tamen in hisce ob gulam à multis grata habentur, adèd & caseus summè putris, foetidissimus, vermibusque scatens ab illis in deliciis habeatur, à quo tamen summè quoque læduntur, ipsorum ventriculo ardorem patiente. Sed & dulcia cibus addita, vt dulciores eos reddunt, sic & calidiores corruptionique magis obnoxios, & qui in bilem faciliè conuertantur. Quæ ex sua natura quoque talia sunt, ex iis quibus vti solemus, quorum caliditatem odor, acrimonia vel dulcedo insignis arguit, illis sunt noxia: veluti vinum dulce, generosum, antiquum: fructus dulces, melones, ficus similesque: & in quibus succus quidam est prauus ad corruptionem facilis, vt in cucumeribus, & eiusmodi: atque olera acria, vt nasturtium, fion crateuæ, Cæpe, porri, allia, post quorum esum maximè eructant, singultiunt, vrunturque.

Quemadmodum autem quæ non talia, sed temperata potius, vel ad frigiditatem aliquam inclinantia existunt, illis magis conueniunt: sicuti Lactuca, Endiuia, Buglosû, Spinachia, similesque herbæ & fructus. Aquæ itidem frigida potus illis, vti aliis, nocere minimè potest, siue per se interdum, vel etiam ex cõsuetudine loco vini vel vino permixta bibatur. Acida imprimis melius refrigerantia his accepta & vtilia sunt: vt Cibi acidis conditi. Vinum vinosum aut acidulum potius quàm forte: Fructus varij acidi. Qualia multa eiusmodi alimenta nonnihil refrigerantia in ardoribus ventriculi à bile prodeuntibus, & in siti, febribusque explicata, hisce naturis quoque competunt.

Vti & medicamenta varia, quorum vsu, si calidior constitutio eiusmodi ad morbosam iam inclinare videatur, illa corrigi nonnihil, emendarique possit.

Inter quæ & thermarum acidarum potus eiusmodi naturas sæpè penitus immutat:

quæ alioquin & ætatis successione vix dum adèd caliditatem amittunt, quin calidorum prædictorum vsu tunc nonnihil, etfi minùs fortè quàm dum iuuenes erant, lædantur.

Neruorum causâ si ventriculus aliis partibus vehementer dolentibus consentiens, simul condoleat, illis potius à quibus origo mali, quàm ventriculo compatiendi cura adhibetur.

Cardialgia nervorum causâ accidentis, curatio.

Si verò ob exquisitiorem solito sensum, ventriculus facilius patiat, & doleat, maior præcautio, ne citò afficiatur, adhibenda, atq; si offensus sit, stupefacientibus antidotis, aliisque narcoticis, eò liberius sensum illum nimium retundere studebimus.

Si eorundem nervorum causâ in animi affectibus etiam ventriculus, seu, vt vocant, cor doleat, si illi emendentur vel mulceantur, hæc quoque cardialgia remittit vel cessat.

Ob colon intestinum in superiore illius sede, retentis flatibus vel excrementis, si in regione dicta cordis, cardialgia suboriatur, illis erumpentibus, sponte cessat dolor: si subsistant, quomodo subueniendum, per clysmata imprimis, in colico dolore ostensum est: vti Clystere ex Oleo, Melle & Vino paratum, mox iuuare, descripsimus, si ob moram cathartici sumpti in colo, cardialgia fiat.

Si ob septum affectum cardialgia in dicta cordis sede oriatur, cum & dyspnœa tunc molesta sit, magisq; angat, quid agendum, in dyspnœa explicatum fuit.

Cardialgia septi trāsuerfi causâ pneniendi, curatio.

DE HYPOCHONDRIACO DOLORE.

CAPVT XII.

Genera.



Hypochondriacum dolorem vocamus illum, qui in ventris inferioris seu abdominis lateribus vtrinque à cinguli sede, vt vocant, retrorsum ad spinam, deorsumq; ad lumbos, & inania vsque deductis, sede aliqua illorum, latere siue dextro siue sinistro, vel vtroque occurrit: non in superficie,

carnosa illic seu musculosa in sede, de quo in superficialiis doloribus agemus, sed in profundo, sub nothis costis, quæ hanc regionem circumscribunt, illarumque causâ Hypochondriaci dolores vocantur. Quorum Hippocr. sæpè mentionem facit: Præctici verò in morbis viscerum sub nothis costis occurrentium, dum symptomata illorum recensent, etiam horum dolorum meminerunt, doloresq; huius illiusve visceris nominant. Qui variant primum in eo: quod præcipue grauitatis vel ardoris, vel punctionis vel dilacerationis sensu molestiam doloremve pariunt.

*Gravis
obtusus
dolor in
hypochondrio.*

Grauitatis sensum & molestiam præbens obtusus dolor, qui tamen aliquando ob diffentionem & punctiones, quæ interdum accedunt, increscit, in latere tam dextro quam sinistro in elatiori hypochondriorum sede occurrit. Tuncque vel nihil duri aut tumen-
tis in lateribus tangitur, vel apparet: Aliàs verò duritiæve aliqua, tumore sub nothis costis prominere, vel in medio harum, ubi inuicem dehiscunt, deprehenditur, costis nothis tunc extrorsum magis quam par erat, curuatis: Dolo-
re compressio ventriculi, ut dictum, & dyspnœa aliquâ semper ferè concurrentibus, aliisque symptomatibus; Ut discoloratione in facie, primum & potissimum se pallore in cachexiâ, flauitie vel nigredine in ictero, manifestante: Vel tumore ventris aut pedum totiusque corporis, in hydropse. Quæ accidentia cum potius quam dolor ille in hisce affectibus obtusus obseruentur, magisque ægrum & astantes terreant, in illis potius horum tractatio instituetur, quorum & hic, ne quid omittatur, propter gravem dolorem qui simul adest, meminisse oportuit.

Posteriùs ad latera spinæ dorsi sub hypochondrio tam dextro quam sinistro, rariùs utroque simul, in lumborum inani-
bus, dolor ille grauitatis & ponderis alicuius sensum præbens, ut dictum, obtusus, nonnunquam tamen inualescens, interdum, ut dicitur, in acerbissimum desinens, occurrit. Quem à causa potius magna quam dolore, qui tantus non est, Calculi rentum nomine, & Lithiasin appellant. Qui dolor motu cor-

*Calculi
renum.
Lithiasin.*

poris, ut cum spina præsertim flectitur, corpusque incuruatur, uti ex decubitu, per quem locus ille premitur, magis se prodit sentiturque: Stuporque aliquis in crure affecti lateris interdum accedit. Hisce superuenit urinæ aliquod interdum impedimentum. Cum qua aliquando, maximeque si pus validius, circa lumbos præsertim agitent & impellant, per equitationem aliòsve motus, sanguis permixtus prodit, urinamque cruentam efficit: cuius sedimentum tandem nigrum in fundo vasis subsidet. Quæ & certo tempore alba & turbulenta, lactis serosi instar, in principio præsertim mictionis, mingitur, & postquam subfederit, materiam albam veluti cretaceam, copiosam quandoque in fundum matulæ deponit. Nonnunquam & sabulosum quid album, aliquando & squamosum per eam redditur. Hunc dolorem nouus & acerbissimus interdum, uti diceretur, excipit, nouisque accidentibus auget.

Ardens dolor, nunc in elatiori hypochondriorum sede, vel in latere dextro versus anteriora magis occurrit: diciturque à causa, Hepatis inflammatio, vel Hepatitis vocari potest. Vel in sinistro latere versus posteriora magis, vocaturque Lienis inflammatio, Splenitisque appellari potest. Aliàs verò in humiliori hypochondriorum regione supra-
coxendicem, & posteriore circa dorsum utrinque latere dextro vel sinistro se offert, & propter locum affectum, Renum appellatur inflammatio, vel Nephritis quoque dici potest.

*Ardens
seu infla-
mans dor-
lor in hy-
pochon-
drio.
Hepati-
tis.
Spleni-
tis.
Nephri-
tis.*

Hic dolor veluti inflammans, distendens & grauitatis sensum præbens, in omnibus occurrit speciebus: uti & pulsans, præsertim verò si in sinistro latere fiat lienis inflammatio: in qua tumor tactu deprehenditur, uti & nonnunquam in dextro latere, si hepar inflammetur, tumor apparet, prominens magis, si in dextrum latus æger corpus inclinet, sed sine rubore, uti verò si musculi illius loci inflammatione dolor ad iugulum usque extenditur: & decubitu in latus aduersum exacerbatur: qui magis ardens in erysipelate hepatis existit.

Præter

Præter quæ, tussis exigua & sicca in omnibus speciebus molestat. Singultus aliquando hepate vel liene affecto accedit. Vomitusq; vrget, per quem bilis, hepate præsertim inflâmato euomitur, os amarefcit, nonnunquam & per aluum dejicitur, os amarefcit, nonnunquam & per aluum dejicitur. hepate vel liene inflâmato nonnunquam Icterusq; adest. Cruenta interdum, hepate affecto sequitur deiectio. Mictioq; frequens cum ardore, renibus inflâmatîs molestat.

Febris omnes hæc quoque inflammationes comitatur Synochos: vel eas mox subsequens, vel prius incipiens: cuius causâ, vt & inflâmationis immensâ, Inquietudo, Sitis vrgent, Lingua arida est: Respiratio citâ, sed parua: Pulsus celer & magnus: Vrinâ tinctâ, & sub finem nonnunquâ purulentâ.

Quibus omnibus cessantibus, grauedo interdum & ponderis quidam sensus, vt superius dictum, in enarrato loco aliquo affecto remanere aliquando solet, aliaque accidentia tunc, vt dictum, superuenire.

*Puncto-
rius do-
lor in hy-
pochon-
driis.
Lienari
falsò di-
ctus do-
lor.
Mitte-
scien.*

Punctorius dolor alius, sanis alioquin, subito in latere plerumque sinistro, aliquando & in dextro oboritur, quem German. *Mil-
tefchen* / Lienis punctiorem, cum à liene illum prodire vulgus credat, falsò nominant. Acciditq; post cibum præsertim sumptum, si tunc corpus validius, equitatione præsertim, aliòve motu violentiore agitur: apparente interdum tumore, qualis in spasmo flatulento oriri solet: Admodumque hic dolor pungit & lancinat, præsertim respiratione ducta: mitescit si venter stringatur, sponteque tandem remittit.

Alius in morbis aliis partium dextri sinistrive lateris eueniens, cum obtuso & grauantè illius dolore, vt in eo dictum, iungitur: cui & alia grauiora copulantur symptomata, in quibus enarrandis etiam ille explicabitur. Qui in exteriori corporis habitu se in hypochondriis, vt & in aliis locis offert, sicuti & circa inguinâ in herniis, ad eîusmodi casus referuntur, & in illis describuntur.

*Lancinans
ex-
tensius
in hypo-
chondriis
dolor.*

Lancinans tenuius quidam dolor in lumbis oboritur, quem Vterinum, cum vteri causâ fiat, vocant: eo tempore præsertim quomenses expectantur, vel cum suppressi sunt:

& quandoque in grauidis se repræsentans: Vterinum
dolor. frequenter post partum, in aliisque vteri affectibus comes, vbi & exactius describitur.

*Diuellens
acerbissimus
mox in
hypochondriis do-
lor.*

Diuellens & quasi dilacerans pungensq; dolor, acerbissimusq; cruciatus in lumbis, illic vbi grauem illius dolore accidere diximus, alterutro latere, vix vtroq; simul, frequenter suboritur, & in quibusdam per interualla, plerumq; aliquot mensium, vel etiâ anni vnus aur alterius redit. Hunc Germani à situ doloris *lendwisch* / Lumborum dolorem vocant: qui aliâ à parte affecta Nephriticus dolor: vel à causâ, siue lapis siue arena fuerit, Calculus, Græci à nostris appellatur. Hic nunc illic persistens & fixus est: nunc ad inguinâ vsque protenditur, vel illic figitur, nec dum vt dolor colicus per ventrem vagatur. Stupetque tunc quoque crus interdum regionis affectæ.

Vomitusq; in principio plerumque molestus est: per quem ea quæ in vetriculo continentur, excrementa pituitosa & biliosa rejiciuntur. Respiratioq; citâ & parua fit.

Vrina ab initio cum difficultate aliqua, aquea penitus, & vt vocant cruda, mox turbida, aliquando & cruenta redditur. Arenulæq; interdum nunc rubræ, nunc flauæ, nunc cineræ cum vrina profluunt: aliâs inuicem concretæ, aliâs diuulsæ in fundo subsident, aliquando adeò tenues, vt in hypostasi vel pinguedine hærentes in sublime ferantur, & hinc inde matulæ adhæreât. Quæ omnia diu interdum durant: aliâs dolore ad infima ventris vsque descendente, subito & veluti in momento cessat malum: vel in ea regione, aliud incommodum, in mictione præsertim impedita, vt illic dictum, nascitur. Quod tamen minimè fit; vel si fiat, mox cessat, si calculus per mixtionem vnus vel plures erumpant. Qui nunc arenosus & friabilis est, ruber vel flauus, vel cinereus, quæ *Rit-
senden* scin nostri vocant, oblongus vel rotundus, æqualis vel inæqualis, maior minorve. Vel filiceus & solidus, tuncq; cinereus vel albus, plerûq; & variâ formâ effectus redditur.

Causæ.

Dinter partium, in hypochondriis: sub nothis costis latentium morbi, do-

loribus hypochondriacis nominatis occasionem præbent. Quæ sunt, Vel viscera carnosæ; hepar, lien, renes bini cum vreteribus: Vel portiones partium eò pertinentium: vt peritonæi, ventriculi, & colli: quorum affectus aliqui etiam sub hypochondriis sentiuntur, eoque pertingunt.

Viscerum carnosorum sub hypochondriis latentium, Hepatis scilicet dextrum latus occupantis, & ad anteriora vsque protensi, Lienis in sinistro latere ventriculo substrati, Renum vtrinque sub illis duobus visceribus vnà cum vreteribus, qui ab illis in lateribus obliquè deorsum versus anteriora vergunt, positorum, morbi aliqui dolores procreant, qui in eiusmodi locis, vbi hæc viscera sedem obtinent, latere dextro vel sinistro, vt in doloribus illis dictum, sese patefaciunt. Renisquæ dextri affectus ab hepatis affectu hoc pacto in situ distinguitur: quòd hepate affecto dolor in latere magis dextro versus anteriora, vbi maior est hepatis portio, vel etiam iuxta regionem foueæ cordis, vbi ventriculo incumbit, sentitur: renis verò dextri dolor, circa posteriora paulò humilius in dorso, eodem in loco fixus remanet. Sinistri verò renis, qui elatior est dextro, affectus à lienis affectu, ex doloris situ non tam facilè secernitur, cum lien posteriorem magis sedem, reni sinistro proximam, secus quàm communis est opinio, qui in latere sinistro versus anteriora magis lienis situm quærunt, occupet: Ita vt aliis indiciis quàm ex doloris situ, harum partium affectus sint distinguendi.

Sunt autem eiusmodi viscerum morbi, qui singulis accidere possunt, doloresque in illis procreare, inflammatio, aggrauatio, obstructio, distentiõve facta ab humore vel tumore, aut distentio à calculo prodians.

*Inflam-
tio He-
patis, Lie-
nis, Re-
nũ, causæ
ardentis
doloris
in hypo-
chondriis.* Inflammatio in hisce visceribus sanguineis, hepate, liene, renibusque, ex sanguine puriore impurioreve quandoque fit; doloremque ardentem illius loci, vbi viscus affectum latet, sicuti illic dictum, excitat: licet enim hæc viscera obtusè tantum propter exteriorè tunicam sentiant, huius tamen causâ, cum ad vicinas membranas

partes sensiles inflammatio quoque extendatur, dolor ardens magis se dilatans sentitur: cum tumore magis apparente, si in hepatis sede externa seu gibba sit inflammatio, vel lien, quod humilior nonnihil sub costis prominet, intumuerit: estque pulsatio maior, liene affecto, cum ille arteriis abundet: accedentibus quoque aliis accidentibus, vt ostensum, quando hæc viscera septo accumbentia inflammantur, cum tunc respirationi incommodent, tussiculamque proritent, & ventriculum vicinũ offendendo perturbent: bilisque hepate inflammato efferuescens effusaque, vomitus, diarrhœas, icterum pariat, renesque inflammati urinam acrem reddant. Et si inflammationem vlcus in hisce visceribus sequatur (quod vt in renibus fieri ex pure reiecto cū vrina facilè cognoscitur, sic & in hepate & liene accidere, etsi adeò manifestè non liceat dijudicare, viscerum tamen horum corruptiones, quæ in mortuis cadaueribus sæpè inueniuntur, satis ostendunt) vel inflammatione non bene discussâ, durities aliqua relinquatur, illorum postea sequantur accidentia.

Causa autem quòd hæc viscera inflammentur, in omnibus contusio aliave læsio extrinsecus in hisce locis facta, esse potest: Vt & hepatis ac lienis inflammationis, assumpta calidissima feruentissimaque, quæ non solum ventriculum, vt illic dictum, sed & hæc viscera illi accumbentia inflammant. Imprimisque quòd hepar inflammetur, si frigida affatim dum corpus vehementer calet, bibatur, propter illam subitam repercussionem, frequentior est causa: Renumque inflammationis calculus, qui dum exitum quærrens, vreteribus se inferit, dolorem immensum adfert, adfluxum sanguinis copiosum, unde sequitur inflammatio, concitat: cui calculus interdum iunctus adhuc est, malumque geminat. A quibus omnibus causis si inflammationes fiant, febrem accendunt symptomaticam. Sed & sine hisce causis sanguis in febribus synochis efferuescens, vt in febribus dictum, in quædam supradictorum viscera effusus, hæc in illis inflammationes gignere potest, quas febris præcessit,

cessit, illarumque causa existit. Quod & forte ob copiam sanguinis, etiam non præcedente, sed subsequente febre, ut è vasis erumpens inflammationes pariat, fieri potest. Qui sanguis si in hepate adhuc impurus, nec dum à bile dextrè repurgatus fuerit, phlegmonem erysipelatoden, ardoremque inde profectum vehementiorem, per quem interiora vri videntur, vnde & febrem quæ inde sequitur acutiorem, Typhodem dictam, procreabit. Sicuti & si à bile sincera è folliculo fellis per hepatis substantiam diffusa, erysipelas sincerum oriatur, eadem accidunt. Quod & à iam dictis causis alias inflammationes procreantibus, euenire potest.

*Obstru-
ctio He-
patis, Li-
enis, Re-
num, ab
humore,
tumo e,
causa do-
loris. Gra-
uis obstru-
ctio in hy-
pochondriis.*

Ab humore si hepar aut lien admodum obstruantur, aut infarciantur, adeò ut grauiora seu ponderosiora solito fiant, tunc grauedo aliqua in lateribus quoque sentitur. Quod rarius in senibus ab humore, sicuti verò à terrestri corpore, uti dicitur, accidit. Quæ grauedo amplius adhuc vrget, molis alicuius incumbentis instar, si hepar vel lien tumor aliquis durus vel scirrhus aut œdema occupet grauetque. Quod & in renibus potest ab eiusmodi tumoribus illic natis accidere, dolorque grauis, ut inquit Hippocrat. tumoris causâ, in renem cadere. Quorum omnium causas in aliis accidentibus grauioribus, quæ tunc quoque prodeunt, recensemus. A flatibus aut ventositate, sicuti aliqui docent, hepatis lienisve dolores nasci, cum in illis tantâ quantitate, ut ea distendant, congeri nequeant, nec illa sentiant intrinsecus, quo pacto hoc fieri possit, non videmus, ideoque hanc causam omittimus: Multoque minus in renibus hoc fieri posse, concedimus.

*Calculus
ex arena
in Hepa-
te illiusq;
Vescula,
causa
Grauis
obstru-
ctio in hy-
pochondriis.*

A calculo seu topho in hepate genito, aut ipsius vesiculâ, vel etiam ab arenis & sabulo copiose illic collectis retentis, grauiorem quoque aliquod eadem ratione, ut de tumore dictum, sine dubio sentitur. Quod fieri posse, uti sectione deprehensum à me aliisq; sæpe fuit: atque ex reiectis arenulis intense rubris, & veluti cruentis, copiosissime in affectu hepatis has inde produisse obseruatum: sic cum in brutorum hepate calculos sæpe

inueniamus, in homine quoque hoc fieri posse, ex eo etiam facile colligamus. Quæ cum accidunt, ab illis & molestia hæc nascitur, aliaque insuper symptomata: qualia etiam ab obstructo hepate procedunt, sicuti in illis suo loco declarabimus. Quod, an in liene quoque accidat, etsi ex eo, quod in toto corpore calculi gigni possint, aliquo modo colligatur, tamen quia nondum illud vidimus, nec ab aliis obseruatû nos legisse meminimus, certi quid asseuerare ea de re nolumus.

In renibus verò adnexisque illis vteribus, calculi diuersorum generum, arenaque contenta, frequentissime dolori nephritico dicto, occasionem præbent. Qui vel grauitatis molestiam solum adfert in renum regione, mitiorem seu valde obscuram, si in renibus arenulæ collectæ subsistant nec præterfluant, aut calculus exiguus adhuc renibus inhærescat: magis verò apparentem, si magna copia sabuli illic congesta sit, aut plures sint calculi vel maiores; accedentibus tunc nonnunquam & punctiõibus lacerationibusque, & ex compressione nervorum, in lumbis, stupore in crure subiecto: vel in magnis motibus ob calculum, renum substantiam contundentem, mictione cruentâ, tandemque & purulentâ, per quam & si quid à calculo abscedit, illud per urinam redditur. Quæ accidentia adhuc grauiora diuturnioraque sunt, si diutius retentus calculus, in molem aliquam vno in loco excrescat: maximeque si adeò augeatur, ut per omnes sinus renis dispersus eos adimpleat, renemque in tumorem attollat: quales & maximos & ramosos calculos in renibus creuisse, sectione inuenimus: Veluti & quod absumptâ renis substantiâ, calculus solâ membranâ crassâ inuolutus, tanquam in massupio suspensus, illic ubi ren fuerat, hæserit: Vnde certè dolor impedita quoque grauiora succedere necesse est: mulieremque multis annis de perseverante dolore conquestram, & sæpius abortientem, post mortem secans, hoc pacto affectam fuisse, cognoui. Quod non adeò infrequens esse, cum & alij huius rei meminerint, satis patet. Vti verò illud, quod à me deprehensum fuit, calculum in extrema pingui

*Calculus
ex Are-
na in Re-
nibus, cau-
sa Gra-
uis ponde-
ris sensu
præben-
tis dolo-
ris in hy-
pochon-
driis.*

renum tunica adnatum fuisse, qui etsi satis magnus esset, tamen quia cauus & levis omnino erat, molestiam nullam, quod audierim, peperit.

*Calculus
& Are
na in V-
reterib?
causa
Nephri-
tici dolo-
ris.*

Sæuissimus verò dolor à calculo procedit, si è renibus in vterem tendat: quem prædicta symptomata quoque comitantur. Imprimis vomitus, ventriculo consentiente: per quem, quia pituitosa quandoq; rejiciunt, inde quoque dolores hosce progressos coniecerunt, quæ tamen à ventriculo pituitoso procedit, cum à renibus huc tam subito peruenire minimè potuisset: Vrinaque tunc aquea & cruda, ob dolorem & vomitum bile aliò raptâ, apparet. Dolor autem, qui, si calculus in principiū vteris feratur, illicq; eos diuellat, circa renem affectum se offert, vbi quamdiu subsistit, vrget: quando verò iterum in suam sedem in renem remeat, dolor cessat vel mitigatur: increfcit verò, quando vterius descendens per angustos vteres, eos diuellendo in eo loco vbi hæret, dolorem parit, qui tamdiu durat, donec in vesicam per angustos vterum obliquos ductus (vbi diu sæpe subsistens vehementer excruciat) illabatur, dolorque tunc subito cessat. Qui nonnunquam etiã à sabulo tardius per vteres delato, prodire potest: in angustioribus præsertim hisce meatibus. Quos adeò dilatatos & amplos factos, in illis qui sæpius calculos reddiderunt, sectione obseruaui, vt sine labore magno, postea & arenulas & calculos, præsertim dum minores erant, sæpius excreuerint.

Causam autem generationis arenularum & calculi in renibus, pituitam esse, à calore renum adeò exiccatam, vt terrea indeque lapidosa fiat, communis est opinio. Verum cum ex pituita exiccata mucus & viscus potius fiat, nec illa vterius naturâ vel arte indurari lapidescere queat: nec etiã gypsea hæc materia que in articulis deprehenditur, à pituita prodeat, sicuti in articulo- rum morbis ostendemus; aut si prodiret, ea tamen minimè terrena sit: cumque si à pituita fieret, illic potius vbi illa in ventriculo, cerebro alijsve in locis redundat, calculi nascerentur, quàm in renibus, quò illa mucosa pituita, qualem describunt, vix peruenit,

aut si perueniret, tamdiu minimè subsisteret; hisce rationibus moti, aliisque multis huic sententiæ subscribere minimè possumus.

Verum nos potius causam materialem huius terrestreitatis in corpore genitæ, terrenam quandam substantiam, vnde hæc prodit, statuimus. Quam in humoribus alijs à pituita diuersis inueniri, sero scilicet, vti alibi pluribus, sic hisce præcipuè argumentis hic ostendimus. Quemadmodum enim aqua continuò per terræ meatus, & fluminum ac riuiulorum alueos defluens, materiamque terrestrem secum deuehens, eandem loca ficciora, vbi facilius hæret alluendo, successiuè deponens, illisque agglutinans, sabulum, tophos & stircias lapideas gignit: eoque magis citiusque si impura lutosave sit: aut si succo nativo terrestri imbuta, falsa, nitrosa, atramentosa existat: à qua, sicuti in thermarum aquâ videmus, in canalibus per quos fluit, materia terrestris illis adhærens & accrescens, calculi diuersæ formæ effinguntur: Sic consimili ratione serum ipsum concipiens salsum succum & terrestrem materiam, quæ indies à prima concoctione à sale, quo perpetuò homo vitur, aliisque terrenis generatur (sicuti in bestiis, quæ sale adeò delectantur, eoque reficiuntur continuò, murosque ob id lambunt, vti capras facere videmus, in quibus plerumque, senescentibus, præsertim, calculi inueniuntur) si eo maximè redundet serum, locis ficcioribus & angustioribus quæ peruadit, vbi & citius adhærescit, se agglutinando, arenulis & calculis postmodum inde formati, præbet materiam. Idque illis potissimum in locis, vbi à sanguine secretum serum, continuò renes peruadit, vnde & illic frequentius arenulæ primùm colliguntur: quæ quia renum substantiæ innascuntur, rubent, & si diutius retineantur, in calculos concrefcunt, qui illic subsistentes incrementum sumunt, accrescente semper nouâ materiâ: vel si in vesicam deuoluantur, illicque hæreant, eo in loco augentur: & quo antiquiores fiunt, minùs rubent, magisque pallent, solidioresque fiunt. Sed & serum, dum adhuc

huc sanguinem diluit, idem in certis ad illud aptis locis potest efficere, sicuti de hepate dictum, aliisque inde prognatis symptomatibus dicitur. Quod etiam si excrementis aliis permixtum adhuc sit, nonnunquam facit: eoque facilius si bilem diluens maiorem inde acredinem siccitatemque acquirit: unde & in vesicula bilis tam frequentes aureo argenteo ve colore, bilis flauæ causâ tincti calculi deprehenduntur, illuc cum bile terrestri quoque & falsâ repurgatâ materiâ. Quod utiâ sero, dum in corpore est, fieri obseruatur, sic & si illud è corpore per lachrymas exstillet, arenas quoque in ciliis deponere, illicque eas concrefcere, in oculorum affectibus demonstrauius. Sed & in sero iam repurgato in vesicam, urinâ scilicet quâ ratione calculi in vesicam delapsi, retentique ab eâ, eodem modo incrementum sumant, squamisq; nouis per appositionem continuam huius terrestreitatis obducantur, & in molem sæpe magnam excrefcant, colligere licet. Apertiusque adhuc in vrina reddita, in vas aliquod videre licet, quo pacto, si diutius eâdem matulâ vtantur, nec mundetur, arenosa & sabulosa illi accrescat materia, & nisi purgetur, in squamas crassas & lapideas tandem augeatur. Quod ut spatio temporis ex quibuscunque urinis, magis tamen ex illis quæ falsæ & acres sunt, sponte fieri solet, sic & si vrina coquatur, arte hoc subito fieri posse, apparet. Quâ ratione & chymici ex lixiuio, quod eiusmodi quoque terrenam in se habet substantiam, salia sua solent excoquere. E quibus uti arenulas sabulumque ab initio prodire ostensum est, ita ut hæc inuicem in tophos calculosque concrefcant, acris & falsus qui terrestreitati huic in sero & vrina permiscetur, atque inest succus, efficit, ea compingens & veluti ferruminans (quâ ratione cementum ferreum durissimum ex limatura ferri, addito succo acri vitreoli & aceto, lapidæ solent decoquere) quod à pituita, sicuti aliqui, ut saltem hac ratione illam calculi causam statuerent, prodiderunt, cum hæc, terrestria illa corpora, adeo ut in lapidem definant, congelare nequeat, fieri minimè potest.

Vti neq; calor renum, quem efficientem

calculi causam statuunt, adeo pituitam exicare, & ut veluti in cineres redigatur, adurere valet: cum & alibi frigidioribus in locis membraneis calculi nascantur. Et quod in certis locis generetur, angustia loci, cui hæc materia adhærere possit, diutius meliusque se affigere, & siccitas, vbi exiccata induretur, potius requiritur, causaq; adiuuans statui debet. Ob quam & causam quibus renes sicciores, vel ab ortu, vel postea per ætatem aut alias causas contigerunt, calculo renum magis sunt obnoxij: & si à parentibus hoc deueniat, hæreditarium est malum: eâ ætate liberos plerumque inuadens, quâ parentes laborare solebant: quam naturam à parentibus contractam, non qualis sit, explicans Fernel. arenosam tantum renum constitutionem vocauit.

Peritonæi affecti causâ dolores hypochondriaci aliqui quoque eueniunt, cum illud ventri vndique antè retroq; expansum, maiori parte suæ amplitudinis sub hypochondriis latera dorsumque occupet. Quando enim illud distentum tractumque supra modum, à partibus quarum tunicis pertinaciter hæret, veluti auellitur, dolor inde in hisce locis punctorius, si vno in loco tantum hoc fiat, vel veluti lacerans aut lancinans, si amplior illius pars sic diuellatur, suboritur.

Cuius causâ flatus sæpenumerò existit. Qui in interualla hæc peritonæi cum musculis ipsi connexis, & spatia musculorū irrumpeus, ab ea inuicem diuellendo, punctorios dolores eos, qui post sumptum cibum, cum corpus validius tunc agitur, quibusdam euenire solent, uti dictum, parit: eodè ferè modo, uti in pectore in pleuritide falsa, dolor punctorius succingentis tunicæ causâ fit. Conferat autem in hoc loco ad illud plurimū, valida musculorū abdominis attractio, per motus eiusmodi mox à cibo factos, & præsertim qui per equitationem fiunt, dum in ephippio sedentes, pedibus in stapede innixi, conatu quodam cum spiritus retentione, musculos abdominis stringunt: eâdem ratione, sicuti spasmus flatulentū in aliis corporis partibus accidere, cum de eo ageremus, ostendimus. ob quam & causam, uti in spasmo flatulento musculi in loco dolente eleuati, tumorem ali-

quem, quandoq; qui tunc illic apparet, procreant: & si stringatur cingulo latera, quem admodum in spasmo, si contrario nixu musculi retrahantur, sicuti illic exactè demonstratum fuit, dolor cessat vel mitigatur. Aded ut & hic dolor spasmi flatulenti species aliqua existat, nec aliò quàm ad affectum musculorum abdominis & peritonæi ab inuicem diuulforum, vti dictum, referri possit: què falsò vulgus lienì attribuit, quòd frequentius in latere sinistro quàm dextro accidat: quod tamen potius ventriculi causà, in ea sede latentis, & quòd in sinistro hypochondrio plures flatus colligantur, vti & in hypochondriaca melancholia hoc fit, contingit; licet & in dextro hoc quoque non infrequenter eueniat.

*Peritonæi ten-
sio visce-
rum, & va-
sorum illi
appenso-
rum occa-
sione, cau-
sa Tensio
seu lancia-
nanti in
hypochon-
driis do-
loris.*

Quæ ab aliis causis sub hypochondriis peritonæo tenso aut tracto, sentiuntur punctiones aut lancinationes, vel viscerum affectionum causà, vt hepatis, lienis, quia peritonæo appensa sunt, vel etiam vasorum vteri occasione, quia peritonæo suspensa dorso adherent, accidunt, vnde dolores illic quoque sentiunt vterinos dictos: vel quia peritonæum in tympanite validè extensum, vti & in grauidis, punctiones leues interdum parit, aut in processu suo dilaniatum, in herniis grauisimum dolorem creat. Horum omnium causæ in aliis grauioribus accidentibus, quæ tunc quoque accedunt, simul enarrabuntur.

*Ventriculi
affectus
causa do-
lorum in
hypochon-
driis.*

Ventriculus cum sinistram latus sub hypochondriis possideat, illius quoq; dolores seu cardialgiæ circa cordis foueam dictam, anteriore sede se offerentes, vti dictum, ad latus sinistram nonnunquam quoque vergentes, sub hypochondrio sinistro sese exerunt. Maxime in dolore illo qui in melancholia hypochondriaca dicta, se illic cum rugitu & ardore manifestat: sicuti in melancholia, quæ hic potius spectatur, cæterisque symptomatibus præualet, describitur.

*Coli affec-
tus, cau-
sa do-
lorum in
hypochon-
driis.*

Coli dolores propter situm illius, quo vtrinque sub ventriculo ab vno latere ad aliud protenditur, sub hypochondriis quoq; sese proferunt. Qui tamen non illic fixi permanet, sed vagi, per ventrem, sicuti in dolore colico ostenditur, vbi & describuntur, discurrunt.

Curatio.

*Hepatis,
Lienis,
Renum,
Perito-
næi affec-
tus cau-
sa obor-
torum do-
loris, qui
graves
& obusivi
sunt vel
tensivi,
curatio.*

Illorum tantum affectuum hic proponitur curatio, qui doloribus potissimum, illisq; in hypochondriis præcipue se manifestant. Nam hepatis, lienis, renum peritonæi affectuum illorum, quorum hic doloris causà quoque meminimus, curationes, cum in illis dolor obscurus sit, in aliis horum symptomatibus, vt cachexia, ictero, hydropè cæterisque, quibus se magis quàm dolore produunt, vbi de his agetur, explicabuntur. Dein & si ventriculi, vteri aut coli affecti causà dolor in hypochondriis quoque sentiatur, & eousque se extendat, quia tamen ventriculi dolor in cordis regione, coli & vteri in ventre inferiore, vbi hæ partes latent, illorum affectus & dolores inde nati, magis se proferunt, illius curationem in cordis, horum in ventris dolorum exposuimus. Itaque hic præcipue dolori, & vbi maxime ille se prodit, intenti, curationem ratione causæ partientes, prout vel ab horum viscerum inflammationibus. Hepatitis, Splenitis, Nephritis: aut à calculo Nephriticus dolor: aut causà peritonæi Spleneticus vulgò dictus dolor oritur, eam instituemus.

*Inflama-
tionum
Hepatis,
Lienis,
Renum
curatio.*

Inflammationes & erysipelata hepatis & lienis, periculosæ sunt, sæpeque lethalia, & si in abscessum desinant, vlcusq; post se relinquunt, vel si malè curentur, & durities scyrrhusque sequantur, hydropem inducunt, incurabiles post se relinquunt affectus. Renum inflammationes facilius sanantur: grauiiores sunt, si cum calculo copulentur: si vlcus relinquunt, illud quoque, vti dicetur, curatu est contumax.

In curatione tamen harum omnium inflammationum, methodus eadem quæ in aliis seruatur: vt nimirum dum fiunt, sanguinem ad locum fluentem, auertamus, à parte repellamus, deriuemus, ardorem caloremque restringamus: quod residuum discutiamus, aut si fieri nequit, maturemus. Quod si durities, scyrrhus, vel abscessus, eoque rupto, vlcus (sicuti hoc æquè in hepate & liene atque in renibus accidere posse ostendimus) relinquuntur, quid tunc faciendum, in aliis grauioribus, quæ inde sequuntur accidentibus

ribus explicabitur: Inflammationis verò causâ, vt dictum, sequentibus præfidiis vtendum.

Per phlebotomiam motus sanguinis dū adhuc fluit, aliò aueritur: idq; potissimum in hepatis & renum inflammatione, cū a vena caua ramos insignes admittant: licet & in lienis phlegmone, etsi tantum è vena porta venas accipiat, ob causas in ventriculi inflammatione explicatas, non sit negligenda. Ob eamque causam in omnium trium viscerum inflammationibus, nisi quid aliud impediatur, reuulsionis gratiâ sanguis & subito & copiosè, è brachij venâ magis patente, seu infima sit, seu media, seu superior, è directo lateris affecti sectâ, educendus: & si magna adsit plethora, vel in eodem loco venæ sectio repetenda, vel tunc in manu eiusdem quoque lateris vena apparens, siue iuxta pollicem, siue minimum aut medium, vti Rhazis voluit, occurrat, tundenda. Priuatimque in renum inflammatione è poplitis vel malleoli vena sanguis emissus, etiam cessante fluxione, ad deriuationem plurimum conuenit.

Hæmorrhoidales venæ, cū venæ portæ rami sint, si fluant, plurimum in lienis inflammatione deriuant, in aliis reuollunt. Quæ si spontè se aperiant, pro signo bono remediique vtili habetur. Ob eamque causam, in consuetis maximè, arte quoque aperiuntur.

Cucurbitulæ coxis aut naribus affixæ, è regione partis affectæ reuollunt, & in renum inflammatione admodum deriuant. Quas in dextro hypochondrio, hepate inflammato, postridie quàm missus fuerat sanguis, scarificatione prius illic factâ, applicabant veteres, & die sequente supra eundem locum denuò reponebant. Alij circa declinationem primum, ad residuum auferendum citra scarificationem apponebant.

Ligaturæ, frictions extremitatum, hæc quoque vt in aliis inflammationibus, ab initio factæ, reuollunt.

Clysmata iniecta ante venæ sectionem, tum demum quando alius astricta est, vti in hisce inflammationibus esse solet, quæ eam solunt, conueniunt. Quorum loco suppositoriis alium leuiter sollicitare possumus.

Dein & ad inflammationes horum viscerum restinguendas, clysmata, cū in colon vsque ascendant, & ad ea proximè peruenire possint, refrigerentque, in principio quoque iniecta, topicum alterans sunt remedium. Qualia multa in febribus alibi que descripta sunt.

Laxans & leuiter stimulans clyster: *R.* Maluæ cum toto, Betæ, & in renum affectu Parietariæ an. *M. j.* flor. Violarum, Furfuris ana *p. j.* sem. Lini *z. j.* Anisi (propter flatum) *z. j.* fiat decoctio, in colaturæ q. s. dissol. Mellis, Butyri, vel Olei ana *z. j.* *β.* pulpæ Prunorum dulc. vel Cassiæ *z. j.* Salis tantillum, fiat Clyster.

Refrigerans sic fit: *R.* iij. vel trium, si brancâ vrsinâ destituamur, herbarum Emolliuiarum cum radicibus, Portulacæ, & folior. Cucurbit. recentium, si inueniantur, an. *M. j.* flor. Viol. Maluæ autumn. & flor. Chamomil. an. *p. j.* feminum Lini *z. vj.* feminis Cucurb. vel iij. frig. mai. *z. j.* Hordei *p. j.* fiat decoctio, & in col. sequant. dissolue Mellis viol. *z. β.* Cassiæ *z. j.* olei Violacei, Nenuph. an. *z. j.* fiat Clyster.

Exhibentur, si excrementa retineantur, nec facile clysmata admittant, quæ vias laxando, fæces emolliendo abluendoque, eas educant: Cauendo omnibus modis à catharticeis, cū irritando fluxiones promoueant, & de nouo interiora accendant: ob quam causam & cassiam exhibere, non satis est tutum.

Damus proin ea quæ citra calorem magnumque stimulum id præstant, vt Pruna, Fructusque alios laxantes: & ex herbis Spinachiam, Maluam, Violariam, cocta in cibis, Serum lactis, aquam Casei, syr. Violaceum & Rosaceum, simplices ex infusionibus, similesque propinamus.

In declinatione tamen istarum inflammationum, vel exacto quarto die, calore cessante, ad reliquias tollendas, hepate & liene laborante, cū per venas meseraicas in intestina se exonerare possint, purgans interdum, sed leuius conceditur: idque magis si in caua hepatis sede affectus consistat, quam venæ portæ rami subeunt, & si bilis in vesicula effervescentes aut effusa erysipelas

peperit: in quibus casibus cum morbus declinat, Cassiam exhibere possumus, aut aliud leuiter purgans.

Vel tale decoctum, quod simul detergit & aperit: R. radic. Liquiritiæ ʒ.ij. radic. Graminis, Rusci ana ʒ.j. Cicerum rub. p.j. fol. Senæ ʒ.j. rad. Polypodij ʒ.j. ʒ. flor. Cord. p.j. feminis Anisi ʒ.ij. sem. Fœniculi & Cuscutæ ana ʒ.j. fiat decoctio, & in col. dissolue, syrup. Ros. fol. ʒ.j. ʒ. syr. de duabus Radic. ʒ.j. arom. Cinamom. ʒ.j. Squænanthi ʒ.ʒ. pro duabus vel tribus vicibus.

Vel hoc infusum: R. Rhabarbari ʒ.ij. Cinamom. Spicæ, Schœnanthi an. ʒ.j. irrorentur Vino albo, postea maceretur in aqua Capill. Ven. & Endiuia, fiat expressio, adde syr. Ros. fol. cum inf. fol. Senæ ʒ.j. fiat potio.

Quod si verò in renibus morbus consistat, cum nullū cum venis meseraicis commercium habeant, nisi aliud quid accedat quod hoc requirat, conuenire non possunt: cum tunc per vrinæ potiùs, Vti & si in glibum, seu elatiorem hepatis sedem, quæ venę cauę ramos admittit, illorum affectus magis inclinent, residuum in declinatione morbi expellere (vt postea ostendetur) satius erit.

Propinantur in principio tam hepatis & lienis, quàm renum inflammationum, quæ leuiter astringendo repellant, refrigerando calorem mitigent, roburq; interim, hepate & liene præsertim affectis, hisce visceribus nobilioribus addant. Postea omissis astringentibus, refrigerantibus abstergentia permiscenda erunt: sensimque ad ea quæ aperiunt, simul transeundum: quæ & tandem per vrinæ, nisi per alium hoc facere consilium, vt dictum, magis sit, residuum educat. Quorum remediorum formulæ multæ in inflammatione ventriculi explicatæ, in viscerum horum inflammationibus quoque competunt. Imprimis verò sequentia hoc pacto illis accommodantur.

Cum repellere volumus, mox à principio: R. syrup. de Ros. rubr. siccis, vel Myrtini ana ʒ.j. syr. de Ribes, vel Berberis, de Cichor. simpl. (vel rene affecto syr. de Plantag.) ana ʒ.ʒ. aquarum Endiuia, Rosarum, Plantag. an. ʒ.ʒ. misce: aromat. Santal. rub. ʒ.ʒ. Bibat manè, repetat vesperti.

Refrigerans, detergens & aperiens, in progressu exhibendus iulepus: R. syr. Viol. de Endiuia, & liene præsertim affecto, syr. Acetos. simpl. vel de Byzantiis an. ʒ.j. syr. de Portulaca, & de Nymphaea, renibus potissimum inflammatis ana ʒ.ʒ. aquarum Fragarię, Hepaticę, Lactucę ana ʒ.j. ʒ. misce.

Idem facit hoc decoctum: R. rad. Cichoreæ ʒ.j. herb. Endiuia, Acetosæ, vel Oxys, Lactucę, Fragarię an. m.j. fl. Viol. Cichorij, Consolidæ regalis ana p.j. Hordei p.j. 4. semin. frig. mai. an. ʒ.j. Prunorum acid. n. vj. fiat decoctio, & in col. diss. Sacchari q.s.

Alia ratione quoq; refrigeramus per potum ordinarium aquæ crudæ, coctæ cū Hordeo, Violis, alijsve: vel additis acidis. Vel quando condituras, alijsve, quorum passim in febribus, & in ventriculi quoque inflammatione mentio facta est, vt non opus sit omnia hîc repetere, vsurpamus.

In declinatione, cum detergere, aperire & per vrinæ ducere volumus, ad sequentia progredimur: R. syr. Capill. ven. de Byzantiis an. ʒ.j. syr. de Endiuia, de duabus Radicibus, an. ʒ.ʒ. aquarum Capill. Ven. Eupatorij, Fumarię ana ʒ.j. misc. aromat. Spicæ, Schœnanthi an. ʒ.j.

Vel detur hoc decoctum: R. rad. Asparagi, Fœniculi, Petrosel. vulg. Liquiritiæ an. ʒ.j. cort. Tamaricis, liene aff. ʒ.ʒ. radic. Ireos, Accori veri an. ʒ.ij. & liene affecto herb. Capill. ven. & hepate & liene affectis, Eupatorij, Ceterach. an. m.j. flor. Cordial. Genistæ an. p.j. flor. Chamom. p.ʒ. Cicerum rub. p.j. 4. semin. frig. mai. ʒ.ʒ. sem. Anisi ʒ.ij. sem. Petrosel. & liene affecto Viticis an. ʒ.j. Passul. ʒ.j. fiat decoctio, & in col. diss. syr. de ʒ. Radicibus, vel de duabus ʒ.j. ʒ. Sacchari q.s. aromat. Cinamom. vel supradictis: Bibat ter quaterve.

Pilulæ ad discussionem reliquiarum inflammationum, sequentes competunt: R. Terebinth. vel Laricę ʒ.ij. gūmi Ammon. dissoluti in Aceto vel Vino acidulo ʒ.j. Myrrhæ, Styragis an. ʒ.j. Schœnathi, Spicæ, Azari an. ʒ.ʒ. Sacchari q.s. fiant pilulæ: Capiat ʒ.ij. vel ʒ.j. cum decocto Hordei vel Cicerū vel Pisorum, aut Iusculo cum rad. Petrosel. cocto.

Extrinsecus refrigerantia adhibentur, quæ ab initio aliquo pacto astringant & repellant: postea:

postea resoluentia illis sunt permiscenda: & sub declinationem sola erunt vsurpanda, vt residuum inflammationis discutiant: aut si discuti nequeat, sed ad suppurationem vergat inflammatio, simul maturationem illius promoueat. Quibus omnibus, si viscera principaliora affecta sint, quæ ea simul roborant, addenda. Hæcque omnia non actu summè frigida, nec in principio quidem, sed temperata, & postea etiam tepidula erunt applicanda.

Epithema repellens ab initio: R. aquæ Ros. ʒ.iiij. aquæ Plantag. ʒ.ij. Aceti ros. ʒ. j. Santali rub. ʒ. j. Camphoræ ʒ. j. misce. (Potest succus Plantag. addi, vel Vitis aut Pyrorum seu Cotoneorum). ol. Ros. ad ʒ. ʒ. Vel Oxycrodonum vsurpari.

Dein & hoc vtendum: R. aquæ Solani, Lascuæ, Violarum, Nymphaeæ an. ʒ. j. aquæ Endiuia vel Cichoræ, hepate affecto ʒ. ij. succorum Solani vel Portulacæ vel Plantarum dictarum, quarum aquæ conueniunt ʒ. j. Aceti ʒ. ʒ. Santal. omnium ʒ. j. fiat epithema. Ol. Violarum misceri potest.

Vel in succis solis Solani, hepateque affecto Endiuia, aliisve, addito pauco Aceto, intincti panni apponi: quibus & oleum Viol. Ros. Nymphaeæ addi possunt.

Inunctio in principio istarum inflammationum: R. ol. Ros. Cydon. vel Myrtini an. ʒ. ij. succi Plantag. Aceti an. ʒ. j. & hepate affecto vel liene, succi Endiuia vel Cichoræ ʒ. j. coquantur ad succorum consumptionem, adde Santal. rubr. Ros. an. ʒ. j. Ceræ albæ q. f. fiat vnguentum.

Ceratum Santalinum hepate & liene affectis, à principio conuenit. Vti & vnguentum Refrigerans Gal. renibus inflammatis. Et Rosaceum vnguentum in omnibus.

Vel hoc cataplasma, visceribus nobilioribus affectis: R. Cotoneorum 4. j. fol. Plantag. & Phyllitidis an. M. j. Ros. rubr. P. j. Balsam. ʒ. ʒ. coquantur, contundantur, addendo far. Hordei, ʒ. iiij. ol. Ros. ʒ. ij. Santali rub. ʒ. ij. fiat cataplasma.

In progressu ad resoluendam inflammationem hepatis vel lienis: R. ol. Rosacei ʒ. ij. ol. de Absinthio vel Nardini ʒ. j. ol. Chamomil. vel de Meliloto ʒ. ʒ. Santal. omnium

ʒ. j. Spicæ ʒ. ʒ. Ceræ q. f. fiat linimentum.

Oleum ab antiquis concinnatum ad hepatis inflammationes, in quo caput Papaueris, Ruta, semen Lini & Schœnanthum coquitur, tunc potissimum locum habebit.

Vti & cataplasmata Galeni ex Cotoneis & Palmulis parata.

Vel hoc cataplasma: R. Ficum, Dactylorum enucl. Passul. non enucl. an. ʒ. iiij. Absynthij, fol. Phyllitidis an. M. j. Ros. rubr. P. j. fiat decoctio in aqua & Vino acidulo, cōtundantur, adde farinæ Hordei & Fœnogr. vel Lini an. ʒ. ij. pulv. rad. Ireos ʒ. j. Chamom. Liliorum an. ʒ. j. ʒ. Croci ʒ. j. Spicæ, Schœnanthi an. ʒ. ʒ. misce.

Emplastrum de Meliloto, Dialtheæ, Diachylon ireatum, idem in declinatione efficiunt, & si maturatione opus est, maturant.

In renum inflammatione resoluenda, oleis relaxantibus & resoluentibus, veluti Amygd. dulc. ol. in quo radix Altheæ coxerit, ol. Lini, Chamom. Liliorum, similibusq; & Axungis renum regio inungitur.

Vel vnguentis eiusmodi: quale & Resumptiuum dictum existit.

Ad quod & infessio facta in decocto Altheæ, Maluæ, Liliorum, Chamomil. seminū Lini, Fœnogræci, & similibus conuenit. Vel si hisce locus renum fomentetur.

Nephriticus dolor, ab arenulis calculove ^{Nephritici doloris ab arenulis calculove præcautio & curatio.} profectus, non solum quando vrget, curationem exigit: sed & in illis qui huic obnoxij sunt, præcautionem requirit. Præcautionem, cauendo ne arenulæ in renibus generentur, tunc, quando vel quia parentes hoc malo detenti fuere; sibi ab eo metuunt, vel quando alias ad id dispositi videntur: maximeque in illis qui iam arenulas mingunt, prouentus illorum impediendus; & ne hærenibus adhærescant, calculumq; forment, præcauedum. Et si calculi iam nati in renibus suspicio ex eo, quod iam prius eum quoque passus sint, grauitasq; aliqua in eo loco sentiatur, adsit, ne dolor inde grauis ille sequatur, illius augmentum impediendo, eumq; maturè expellendo, obuiam ibimus. Quæ omnia, si ea quæ calculo materiam præbent, renesque calefaciunt & siccant, subtrahamus, eaq; quæ ab adhæsu arenularum renes

abstergant, & quæ calculos, dum exigui & friabiles sunt, dissipare deorsumque promouere possunt, administramus, perficiuntur. In curatione verò nephritici doloris iam à calculo prodeuntis, & in viis hærentis ex-cruciantisque, vias illas laxare, calculum comminuere, eumque ex angustis illis exturbare, scopus curandi præcipuus erit. Quæ omnia, quibus artibus & modis præstentur, nunc recensebimus: tum in viuendi ratione per cibum & potum motumque corporis, tum per purgantia exhibita, injecta clysmata, per alterantia propinata, forisque administrata remedia.

In cibo & potu, cum inde materia arenularum & calculi exordium sumat, ut illius generationem præcaueamus, moderatio erit adhibenda, bonique succi cibi in usu esse debent. Imprimis verò temperatis cibus assuescere debent, & proin salitis leuiter & parcissime uti: nam à vehementer salis, omnino abstinere, uti & à terrenis & siccis, cum ab illis, uti dictum, materia huius terre-
streitatis deueniat, præcipua curationis est regula. Veluti & à vehementer acris & calidis, cum ab illis, uti ostensum, arenulæ in calculum coagulentur, renesque siccantur, & incallescant. Quæ potissimum obseruanda, & salsamenta omnia nimiumque aromatizata, similiaque potius vitanda, quam ut in crudis, glutinosis, & quæ pituitam gignere creduntur, prohibendis laboremus: cum hæc succum crassum, qui obstructions parit, quidem gignant, verum in terrestrem materiam, uti dictum, conuerti, nisi illis alia permixta sit terrestitas, quæ in sero quo diluuntur quoque, postea deponunt, uti in causis declaratum, minime possint. Quo nomine & caseum, quem tantopere, tanquam primariam calculi causam, prohibere solent, non alia ratione illi occasionem præbere posse, quam falsedine & acrimoniâ suâ, quæ in se si nimium falsus aut putris sit, qualis frequenter esse solet, continet, dicimus: alium verò qui talis minime est, sed lactis naturæ adhuc affinis, uti nec lac, nec lacticia, aut pulvis ex illis parata, similesque cibos non salios aut acres, etsi glutinosi sint, calculo causam minime præbere, asserimus.

In motu corporis, exercitium decens, singulisque naturis accommodum, rectoque tempore ante cibum factum, in arenulis exturbandis, quæ otio alioquin facile subsistunt, plurimum iuuat. Ob quam & causam, post motus corporis arenulas copiosius & frequentius, quam mane post somnum, cum vrina reddi expurgarique, & proin eo tempore, si illas diiudicare rectius velimus, inspiciendas quoque esse, experientiâ comperimus. Quæ ratione & motus moderatus, etiam si calculus in renibus hæreat, & paruus & recens sit, cum eum premoueat, conferet. Vti è contra, si maiores sint, ipsos prouocando, nephriticum dolorem proritat, & in calculo renibus confirmato & aucto, motus vehemens, per quem lumbi præsertim admodum impelluntur, quia tunc renum substantia à calculo conteritur, unde vrinæ cruentæ fiunt, renumque vlceri occasionem sæpe sic præbet, nociuus. A cibo quoque subito factum exercitium, quod cibi crudi adhuc factâ distributione, illi ad renes delatus, calculo gignendo materiam præbeat, admodum eo nomine improbat: quæ cruditæ tamen obstructions potius aliisque morbis quam calculo, nisi aliud accedat, uti dictum, occasionem dat. Venus immodica, renes exiccando & debilitando, uti eos ad generationem calculi dispositos reddit, sic, si calculi in renibus sint, sæpe diu latentes, prouocando, nephriticis doloribus vel de nouo superuenientibus, vel redeuntibus ansam præbet: Sicuti eam ob causam, eos qui diu coelibes vixerant, aut alioquin castè veneri operam dederant, quia ad nuptias nouas redibant, vel alias luxuriosè viuere cœperant, calculo primum diuexari, quem prius minime sentierant, cœpisse, sæpe etiam in extremè senibus obseruauimus. Deiectiones naturales per aluum, si indies rectè & decenti tempore fiant, quia excrementorum prouentum impediunt; Mictioque diu non retenta, sed cum virget, facta, quia sic arenulæ minus diu subsistunt, præcautionis gratiâ aliquid quoque conferunt.

Purgantia medicamenta exhibita præcautionis loco sic diriguntur, ut si corpus im-purum sit, veris & autumnis atque interme-
diis

diis temporibus, si necessitas exigat, illud ab illiue redundante expurgemus: Non tantum ad pituitam educendam cathartica dirigentes; sicuti hi qui hanc calculi causam esse censent, facere solent, sed & ad quosvis humores exuperantes, vt sic corpus purum fiat; quod & tunc vti aliis morbis, sic & calculo minus fiet obnoxium. Et si ad calculi causam auferendam purgantia accommodare velimus, potius ea exhibendo, quæ non violenter, sed blandè aluum mouendo. laxandoque à renibus falsos & serofos ichores humoresque auertant, & ab illis sanguinem repurgent, & vt inquirunt, mundificent: exhibendo illa ipsa quæ in curatione quoq; sicuti nunc proponentur, locum habent, hisque similia.

Nam cum iam calculo diuexatur æger, tunc ad facies & flatu educenda, eandem ob causam, vt de clysteribus dicetur, quibus potius tunc vtimur, aluum laxantia vel simul cum illis, vel loco clysmati propinquantur. Transeundo ab illis ad cathartica, non tamen violenta; cum tunc calculi causam, cuius in præcautione potius quam in curatione habetur ratio, exturbare nequeat, sed vt ipse calculus, dum natura purgatis stimulatur ad excretionem, ab illis simul ad descensum promoueat. Quod, vt rectius fiat, ea quæ abstergunt calculumq; comminuunt, illis simul permiscuntur. Sicuti in formulis sequentibus patet.

Cassia plurimè in hoc casu laudatur; tum ad præcautionem frequenter exhibita, tum quando calculus vrget, 3j. vel plus cum saccharo Cando vel Violaceo, exhibendo in forma boli: vel dilutam prius decocto Liquiritiæ, vel Sebesten vel alio: vel aquis conuenientibus, addendo interdum semen Alkekengi vel Milij solis, aut simile quid: vt Laricæ costæ pul. ad 3j. Magis que laxabit si oleum amygd. dulc. statim superbibatur, unde & dolor citius mitigatur.

Laricæ 3j. quantitate exhibita aluum mouet, validiusque, si dissoluta in Vitello ovi, cum liquore decenti, addito Saccharo vel Melle, bibatur. Vel si cum Cassia subacta, vel mox post eam sumatur.

Potentiusque purgabit, si cum elect. Be-

nedictæ lax. aut puluere illius ad 3j. mista, addito saccharo, in forma boli alioue modo detur.

Decoctum laxans & abstergens sic fit: R. rad. Liquiritiæ 3j. s. Passul. enucl. 3. s. Sebesten par. x. Prunorum par. v. Cicerum par. j. quatuor seminum frigidorum maiorum 3. s. feminis Anisi 3. iij. foliorum Senæ, radic. Polypodij, cum dulce sit & abstergens, ana 3j. flor. Viol. p. j. fiat decoctio pro duabus vicibus, addito Saccharo, vel syrupis, vt Violac. Rosaceo.

Calculo accommodatius fit, si prædictis sequentia addas, rad. Fœnic. Petros. an. 3j. Saxifragiæ, Althææ an. 3. s. Maluæ, Capill. Ven. an. M. j. fl. Anethi p. j. bacc. Alkekengi 3j. auctaque Senæ quantitate ad 3j. s. decoctum, vt de priore dictum, paretur, exhibeaturque. Cui si Rhabarbarum & Agaricum addas, efficacius erit.

Vinum si magis arideat, tale fiet purgans: R. fol. Senæ 3j. s. Carthami 3vj. Agarici vel Rhabarbari 3ij. rad. Liquirit. 3j. radic. Apetituarum an. 3. s. fl. Viol. Maluæ siccæ an. 3j. bacc. Alkekengi, feminis Anisi, Leuistici an. 3j. Passularum minor. quartale j. affundè Vini tb. iij. Bibat de eo ad præcautionem, & quando malum inuadit, purgandumque erit.

Electuarium frequenter ad præcautionem, vel tunc cum morbus inuadit, sumendum: R. pulpæ Cassiæ vel elect. Diacassiæ 3j. s. pulp. Prunorum vel elect. Diaprunis, pul. Sebesten an. 3j. succi Liquirit. 3ij. cum syrupo Viol. fiat electuarium: Capiat ab 3j. ad 3j. s. per sè, vel dissolutum, sicuti de cassia dictum est. Huic & lithontripica quædam mox describendâ, addi possunt, adiecto scamnoneato aliquo electuario, vt de succo Rosar. Diaphœnicon. Elefcoph. quod aliqui laudant, Benedictæ laxatur. quæ calculum spectantia quædam recipit, cum maiorem operationem requirimus, ad 3j. s. pro vna illius dosi, efficacius redditur. Sicuti & Cassiæ, si hac ratione vis illius intendatur.

Vel dantur ex leuioribus electuariis, quæ simul rhabarbarum & senam recipiunt, vt Catholicon vel Lenitium, similiaque eadem

mensurâ exhibitâ, per se, vel cum decocto priore, aliôve dissoluta.

Pilulæ horum loco leuiore aliquæ exhibentur, permittis calculum respicientibus.

Vel si fortiores esse velimus: R. spec. Hieræ & Bened. Lax. (cuius loco Rhabarbarum & Agaricus sumi potest) an. 3. s. excipiantur Lariceæ, fiant pilulæ: Pro vna vice sumendæ.

Efficaciones ex pul. Bened. Lax. ad 3. j. simili ratione parantur.

Si puluere vti malint: R. fol. Senæ 3. j. s. Rhabarbari 3. ij. Turbith 3. iij. Zingib. 3. j. Cinam. 3. ij. Polypod. 3. iij. s. Milij solis, Bardanæ an. 3. j. s. Genistæ 3. s. Ireos 3. j. quatuor semi. frig. mai. an. 3. j. fiat puluis: Capiat ad 3. ij.

Clysmata iniecta dolorem nephriticum plerumque & subito compescunt vel mitigant, tum quia feces flatusque educendo, ne dolor augeatur, quod verò si illis intestina referta sint, ob compressionem vreterum & renum accidit, præcauent: tum quia ad hasce sedes peruenientia, si anodyna sint, ea ratione quoque iuuant, magisque adhuc, si narcotica, vti in illis dicetur, addantur, & ea recipiant, quæ calculum simul propellunt vel comminuunt, triplici nomine tunc opitulantur.

Communia clysmata passim explicantur. Calculo accommodatum simul hoc erit: R. trium vel 4. herb. Emolliuiarum cum toto, Parietariæ, Betonicæ, Senetionis, Betæ vel Mercurialis an. M. j. s. Chamomil. Melilori, Anethi an. P. j. rad. Liquiritiæ 3. ij. Cicerū rub. Furfuris an. P. j. Ficuum nu. x. baccarū Lauri 3. iij. bacc. Alkekengi 3. ij. seminum Cucurb. Lini, Foenogr. an. 3. s. semin. Fœniculi, Carui an. 3. j. s. fiat decoctio in Aqua & Vino, vel iure Carnium, & in colaturæ q. s. dissolue Mellis vel Sacch. 3. j. s. Calsiæ 3. j. Benedictæ lax. vel Hieræ 3. ij. ol. Amygd. dulc. Nucum, Oliuar. vel Butyri an. 3. j. resinæ Lariceæ vel Abietinæ 3. ij. Salis parum, fiat clyster. Si dolor vehementer vrgeat, Philonij Rom. 3. ij. additæ, admodum eum sedant.

Anodynæ Clysteres in colicis doloribus varij præscripti, hic quoque conueniunt: maxime si quæ calculum respiciunt, illis quoque addantur. Vel hic: R. ol. Chamomel. Anethini, Lilior. Amygd. dulc. an. 3. j. s. ol. Scor-

pionum, Ping. Anseris & Butyri rec. an. 3. ij. resinæ Lariceæ dissol. in Vitello oui 3. j. s. vel plus, Lactis q. s. Croci 3. j. fiat Clyster. Cui si necessitas vrget, Opij 3. s. permisceri poterit.

Vel sic: R. resinæ Lariceæ vel Tereb. 3. ij. dissolue in Vitello oui & Vini tb. s. dissolue ol. Amygd. amar. 3. ij. ol. Scorp. 3. j. axun. Anseris 3. ij. misce.

Ad calculum, dum in itinere est, promouendum comminuendumque, sequens paratur: R. rad. Liliorum 3. ij. rad. Raphani, Lepidij, Apij, Petros. cum foliis an. 3. ij. herb. Parietariæ, Brassicæ, Senetionis, Saxiphragiæ cum rad. Betonicæ, Hypericonis cum floribus, Sij Crateuæ, Fœniculi mar. Pedis columbini, Aquilegiæ, Betulæ an. M. s. vel si pauciores sumas, M. j. s. Liliorum, Genistæ, Sambuci, Lauandulæ vel Stœchados an. P. j. bacc. Iuniperi 3. j. bac. Alkekengi 3. ij. seminū Milij solis, Saxiph. Petros. Apij, Cimini, Paliuri an. 3. j. fiat decoctio in Aqua & Vino: in colaturæ q. s. dissolue Mellis vel Sacchari 3. j. succi Parietariæ, Hyperici, Fœniculi vel Petros. an. 3. j. Bened. lax. vel Indi mai. 3. iij. ol. Anethini, Amygdal. am. vel expressi ex nucleis Persicorum, Scorpionum an. 3. j. resinæ Lariceæ diss. in oui Vitello 3. ij. Salis q. s. fiat Clyster. Si elect. Iustinum, Lichontripon, aliæve mox exponenda, dissoluantur, magis operabitur.

Alterantia exhibentur, quæ renes abstergendo, arenulas, ne illis, aut calculo si illic sit, adhæreant, abluunt: quæ ad calculi præcautionem, ne fiat, aut si factus sit, non augeatur, sunt conuenientissima & præcipua. Dein & quæ vias angustas illas, vbi arenæ vel calculi substituerunt, aperiendo, laxando & lubricando, vt facilius per eas descendat, patefaciunt. Et si calculus adhuc sit friabilis, necdum adeo compactus, eum, vt reddi possit, conterunt, & si vreteribus impactus hæreat, comminuunt. Quod sanè si inueteratus, compactus & siliceus fiat, per assumpta efficere impossibile est: in aliis verò illud præstant quædam, incidentia illum tenuitate suâ: vel acrimoniâ insigni veluti corrodentia: aut potenter detergentia, quæ vt arenas à renibus, sic à calculo semper aliquid abradunt comminuuntque: eoque validius,

validius, si sicca simul admodum existant, & terrestria, quæ non duritie sua, eum veluti lapidis lapidem, uti docetur, conterunt, cum non integra, sed subtilissimè attrita, si quæ ab illis ad renes penetrant, eò perueniant, sed detergèdi vi, quæ siccis hisce corporibus inest, illud faciunt: Accedente interim proprietate quadam, vsu potius, quàm ratione inuentâ, uti & in aliis multis quæ in vsu sunt, necdum de causâ constat: è quibus multa, occasionebus aliis, vel quia similia, idem facere credita sunt. Quorum omnium materiam præcipuam in illis quæ in substantia sumuntur explicabimus; nunc ab aliis formis ipsorum liquidis exorfi.

Ius alimentosum probatur ex Ciceribus rubris vel nigris, vel Pisif huius coloris, in Aqua vel Iure carnis decoctis paratum, addito Butyro: & Saccharo vel Melle: vel si dulcia respuant, ut sapidius fiat, momento Salis. Quod ad præcautionem consuetum est bibere: Addita plerumque dum coquitur rad. Petroselin: in quo & Brassica decoqui poterit, & teneritates Asparagorum, Fabæ item Phascolique, recentia.

Medicatum magis sic fiet: R. Cicerum rubr. P. j. radic. Petrosel. rec. 3. ij. rad. Fœniculi recentis & Anonidis, Glycyrizæ an. 3. j. fol. Brassicæ vel Maluæ folia aliquot, feminis Melonum 3. ij. feminis Anisi 3. j. decoquatur in Iure galli, donec redeat ad colaturæ pocula duo. Quæ duobus matutinis vel manè & vespere bibat.

Decocta medicata varia dantur: decoctumq; Alismatis, Chamemeli, Altheæ probat Dioscor. & Papaueris corniculati decoctum, illis qui crassas & arenosas vrinas habent, competere docet; His alij decoctum Saxiphragiæ albæ pilularum circa radices, radicem item Iridis, Primulæ Veris, Maluæ, fol. Umbilici Ven. & ramentorum Paliuri addunt. Dein rad. Valerianæ, & Musci terrestres ex Vino factum decoctum. Vti & Oxyridis.

Guaiaci decoctum vi suâ incidente & abstergente calculosis competere à quibusdam docetur. Ob eamque causam non solum dum torquentur illis propinant, sed & postmodum præcautionis gratiâ, ut loco potus

ordinarij diu illud bibant, iubent: additis interdum aliis quoque abstergentibus dum coquitur, ut rad. Liquiritiæ vel Anonidis, ligno Spinæ, atque in fine Saccharo vel Melle.

Ex his inuicem permistis, vel aliis quam plurimis decocta fiunt. Inter quæ leuius & gratius hoc erit: R. rad. Glycyrizæ 3. j. s. Cicerum rub. P. j. Passul. paria x. Ficuū paria v. quatuor sem. Frig. mai. & sem. Anisi & Maluæ ana P. j. fiat decoctio, in colatura q. s. dissol. Sacchari vel Mellis q. s. Bibat bis terve.

Potentius operabitur sic paratum: R. rad. Altheæ, Glycyrizæ an. 3. j. fol. Maluæ recent. M. ij. Caulium rubr. Cerefolij, Betonicæ an. M. j. feminis Melonum 3. ij. feminum Lini vel Fœnogræc. 3. j. s. femin. Petroselin. Alkekengi, Milij solis an. 3. j. flor. Chamomil. Genistæ an. P. j. fiat decoctio, dulcoretur: & vtatur vt superius.

Vel sic: R. rad. Asparagi, Anonidis, Rubi humilis an. 3. j. fol. Parietariæ, Betonicæ, Polij mont. an. M. j. Cicerum nigr. P. j. fiat decoctio in Aqua pluuiæ: dissolue. Aceti scyll. 3. j. Bibat. Cui addi poterit Sanguinis hirci præpar. 3. s. lap. Iudaici 3. j. vel alij pulueres.

Compositum ex plerisque vtilibus decoctum in formam syrupi vsualis redactum tale fit: R. rad. Aperitiuarum, quinque an. 3. s. rad. Glycyricæ, Altheæ, Filipendulæ, Pimpinellæ saxiph. Anonidis, Chamærubij, Raphani acris & Rusticani ana 3. j. rad. Distamni, Valerianæ, Rubiæ mai. Vrticæ, Lauri, Ireos, Enulæ, Aristolochiæ, Pæoniæ, Verbenæ an. 3. s. rad. Azari, Cyperi an. 3. ij. rad. Scyllæ 3. j. granorum Saxiphragiæ albæ radicū, cort. medij. Coryli & Sambuci an. 3. s. herb. Maluæ, Parietariæ, Cerefolij, Leuistici cum radic. Saxifragæ Dioscorid. (quam Dod. Serpillum esse putat) Betonicæ, Veronicæ, Trichomanes vel Adianthi, Ceterach veri, Herniariæ, Bupleuri, Hederæ terrestres, Brassicæ rub. Sij Crateuæ, Fœniculi mar. Nardi celt. an. M. j. florum Chamomil. Liliorum, Genistæ, Cheiri, Hyperici an. P. j. Cicerum rub. P. j. nucleorum Persicorum & Cerasorū an. 3. j. gran. Iuniperi, Alkekengi, Hederæ ana 3. s. quatuor femin. frig. mai. Altheæ, Maluæ an. 3. j. s. feminis Lini vel Fœnogræc. 3. ij. Passul. enucl. 3. ij. Iuiub. Sebesten an. paria v. fiat deco-

coctio, & in colatura adde Sacchari vel Mellis ʒ. vj. arom. Cinamomo: decoquatur ad consistentiam syrupi. Capiat cum necessitas exigit ab ʒ. ij. ad iij. per se, vel cum aqua conuenienti, vel Vino. Hisce decoctis, lapides, vt Iudaicum, Lyncis, aliqui sine fructu meo iudicio incoquunt.

Syrupi vsitati aperitiui & abstergentes aliqui hic quoq; conueniunt: Qui tamen rariùs soli, sed cum aliis calculum pellentibus, formis, pulueribus, electuariis permittuntur. Vt Oxy mel, Hydromel, syrup. de Liquiritia, de Radicibus, de Bizantiis.

Infusione vinum ad calculos abigendos paratur. Si baccis Alkekengi contritis Vinum affundatur, & post macerationem aliquam bibatur.

Vel si Raphanus communis, sed qui acris est, vel Raphanus Rusticanus, quem vulgus marinum vocat, incisus vel contritus, in Vino per horas ad minimum duodecim mace-retur, illudque vinum propinetur. Quod admodum iuuat.

Absynthites vinum ad calculos renum & arenulas conferre, docet Diosc.

Ex pluribus vinum per infusionem immutatum sic fit: ʒ. rad. Liquiritie, Anonidis, Pimpinellæ saxiphr. Leuistici, Fœniculi, Raphani vulg. acris vel marini an. ʒ. j. ʒ. rad. Lauri, Cyperi, cort. medij. Coryli ana ʒ. ʒ. herb. Veronicæ, Betonicæ, Herniariæ, Bupleuri, Capill. Vener. Hederæ terr. an. sicc. ʒ. iij. flor. Viol. Anethi an. ʒ. j. bacc. Alkekengi sicc. Hederæ an. ʒ. ij. feminum Petros. Carui, Milij foliis, Genistæ an. ʒ. j. conquassata infundantur in Vini mensur. duabus ad vsum.

Hedera terrestris infusa in Aqua vitæ, eam efficacem reddit ad calculos pellendos, estq; singulare quorundam experimentum.

Ex aliarum plantarum è quibus vinum infusum fieri diximus, infusarum in aqua vitæ, sunt aquæ vitæ variæ compositæ.

Lixiua ex infusionibus cinerum quorundam facta, & ad ʒ. iij. bibita, magni momenti in hoc casu, cum vehementer abster-gant, existunt.

Paranturque ex cineribus ramentorum Vitium vel stipitum Fabarum, si per eos Aqua aliquoties, donec lentorem vel acre-

dinem lixiuij adipiscantur, transfundatur: Quod efficacius fiet, si Vinum album loco aquæ sumatur, vel alia illi simul mista lithonriptica bibantur.

Aliud potentius, cuius vnc. ʒ. vel paulò plus, si necessitas vrgeat, exhibita sufficit. Fit ex cineribus combustorum stipitum potius quàm foliorum (cum vsa plus cinerum reddant) Fabarum, Cicerum vel Pisorum, Brassicarum, Verbenæ, Absynthij & caulium Allij, surculorum Hederæ lignique Iuniperi vel Lauri, & Paliari, cum haberi poterit; Si de illis quantum manu comprehendi potest, sumatur; perque eos Vinum album vel Maluaticum ad ʒ. j. cum tertia parte Aquæ vitæ, nouies ampliùsve transfundatur, & eo, vt dictum, vtatur.

Succi aliqui in hanc quoque rem bibuntur, qui subtilitate insigni aut aciditate, quæ saxa quoque dissipare potest (sicuti Hannibal aceto rupes perfregit) id præstant. Vti Vinum tenue album, Acerum dilutū aquâ, præsertim conuenienti.

Vini acidilargo potu, se quidam inebriâs, vrinamque essi misturiret, quàm diu ferre poterat, retinens, tandemque impetu quodam reddens, hac ratione calculos retentos in vreteribus, eumque affligentes, propellebat, sæpeque emingebat.

Quod Aquæ frigidæ potu largo, dum præsertim ex dolore corpus calore & siti æstuat, nisi quid aliud impediât, quoque fieri posse docet Holl. Citiùs autem illud faciet, si Aceti albi permissione acida nonnihil reddatur, assatimque bibatur. Vti & si atramentosas acidas aquas bibant, quales ad dies multos, calculum abigendi & præcauendi causâ bibere solent.

Succus Limonum ad ʒ. j. per se, addito ad gratiam, si quis velit Saccharo, propinatus plurimum efficit. Vel si cum Vini maluatici aut alterius efficacis haustu ad ʒ. iij. aliòve li- quore conuenienti bibatur. Prodest & succus acidorum Arantiorum, aliorumque acidi succi, si austeritate careant.

Confert & succus baccarum Halicacabi, & Tribuli (teste Dioscoride) & sicuti aliqui se expertos fatentur, succus Millefolij: succus item seu aqua ex perforato Betulæ caudice

dice effluens, vt docet Matth. eadem quantitate vel etiam maiore, similiq; ratione sumpti, sæpeque repetiti.

Misti inuicem sic dantur: R. succi Fœniculi mar. Portulacæ an. ʒ. β. Vini albi ʒ. j. Sacchari q. s. Bibat: vel decoquantur prius in formam syrupi.

Vel ex ipsis fit potio vtilissima: R. succorum depuratorum Parietariæ ʒ. j. β. Chamomillæ, Betonice, Mellis vel Sacchari an. ʒ. j. misce: Bibat cum decocto Cicerum, aut alio. Posset ex enarratis succis addito Saccharo vel Melle syrupus coqui, & per vices vsurpari.

Aliud: R. Raphanum acrem, contunde, affundeque Vini optimi tantum, vt post macerationem expressis omnibus totum ad ʒ. iij. vel iiij. redigatur: expressioni adde Sanguinis Hirci præpar. ʒ. j. Hoc summè aliqui commendant, quibus & alij addi possunt succi & pulueres.

Vrina Hirci quadrimi, vel Rupicapræ propinata probatur.

Aquæ stillatitiæ, quia admodum propter tenuitatem penetrant, & ad renes vsque perueniunt, exhibitæ, valde etiam iuuant. assatimque bibenda datur aqua Parietariæ ad ʒ. j. vti & Maluæ & Althææ: sicuti & florum Genistæ: florum herbarumve aut corticum Fabarum: herbarum item Anonidis, Asparagi, Saxiphragiæ, Petroselinii, Fœniculi, Olyridis. Quibus efficaciores sunt, proin & minori quantitate sumendæ, aquæ Sij Cratæ, Critmi seu Fœniculi mar. Raphani, baccarum Hederæ & Alkekengi. Compertum est à quibusdam, valde opitulari aquas Linariæ, quam osyrin vocant, dein & fol. Quernorum, & fol. & radic. Mori Celsi: vti & Linguae Canis: item Ceterach, Verbenæ, Chamomillæ: dein & nucleorum Persicorum aquas: imprimisque ex resinis Laricæ vel Terebinthinâ elicita aquam subpinguem, quæ admodum est efficax. Laudat & Matthiol. aquam ex humanis Fæcibus, alij ex Stercore columbino extillatam. Aqua vini seu vitæ simplex, summâ tenuitate calculum frangit.

Quæ aquæ vel simplices vel inuicem permistæ, per se vel dulcoratæ nonnihil Saccha-

ro sumi possunt: vel illis pulueribus aliisque permistis exhiberi. Vel ex commistis aliquibus pluribusve dictarum aquarum simplicibus destillari.

Vel hoc pacto. Sumantur radices, herbæ, semina, ex quibus vinum per infusionem fieri diximus: omnibusque siccatis & contusis addatur tantum Vini, donec in pulstem redigatur, addendo Laricæ quartar. j. exstilletur ex illis aqua: Quæ datur vt superior.

Vel si ex plerisque præcipuis in hanc rem vsurpari solitis, quæ arefacta vires suas retinent, aquam parare velimus, prædictis insuper addemus, rad. Asparagi, Apij, Petroselin. ana ʒ. β. rad. Azari, Rubiæ tinct. Valerianæ an. ʒ. ij. herb. Parietariæ, Hyperici, fl. Chamomill. Genistæ an. ʒ. ij. sem. Apij, Leuistici, Asparagi, Raphani an. ʒ. j. ex quibus puluerisatis augendo Laricæ quantitatem, destilletur aqua.

Quæ omnes plantæ si in Aqua vitæ infundantur, & destillentur, aquam efficacissimam reddent.

Vel ex recentibus plâtis dum haberi possunt, sic ad vsu præparetur: R. nucleorum Persicorum vel Ceraforum ʒ. ij. baccarum Fragorum, Chamærubii, Alkekengi, Iuniperi, Hederæ an. ʒ. j. rad. Raphani mar. ʒ. iij. Fabarum virid. cum siliquis, Parietariæ rec. an. M. j. Sij Crat. Fœniculi mar. an. P. j. e contusis omnibus simul extrahatur aqua.

Vel ex aridorum & humidorum mistura sic parata aqua: R. nucleorum Persicorum quartar. j. Sebestæ, Iuiub. an. paria. v. quatuor sem. frig. mai. ʒ. vj. bacc. Alkekengi ʒ. β. sem. Nigellæ, Apij an. ʒ. ij. rad. Raphani acris vel Rusticani ʒ. β. contundantur omnia, addendo Laricæ, Mellis an. ʒ. xij. e permistis inuicem eliciatur aqua: Datur ad ʒ. iij. per se, vel admistis aliis lithontripcis.

Vel ex succis extracta aqua: R. succi Raphani, Leuistici an. ʒ. vj. succi bacc. Alkekengi ʒ. ij. vel plus, Aceti albi ʒ. ij. destillentur: Detur ʒ. ss.

Olea propinata quædam, quia & illa ad renes cum vrina perueniunt, sicuti post eam emictam illi innatare portio illius sæpius conspicitur, vias illas laxando lubrican-

doque, vt calculus facilius per eas transeat, efficiunt.

Daturque eo nomine in summo cruciatu, calculo in itinere alicubi fixo, Oleum commune, aut Amygdal. dulc. vel Lini, recentia vel loto affatim, per se, vel in Iusculo, vel cum Lacte pingui butyroso bibenda.

Oleum commune ad 3. j. cum Vino in quo filices, è quibus ignis excuti potest, igniti sæpè extincti sint, propinatū quidam laudant.

Sed & quædam calculo ipso accommodantur: & vel per se, vel inuicem prioribusve aut aliis liquoribus permixta propinantur. Qualia sunt oleum expressum ex nucleis Persicorum vel Cerasorum, aut Amygdalis amaris, vinctissima exhibita. Vti & oleum ex maceratione Scorpionum. Quibus efficaciora sunt olea seminis Citri, vel seminum Lappæ maioris minorisve, Aliorumve semin. lithontripticorum, arte chymicâ elicita: quæ & guttatim tantum, non sola, sed & aliis permixta exhibentur. Sicuti & Terebinthina: aut Laricæ oleum: quibus & liquorem pinguem ex chalcantho elicatum, quem spiritum aut oleum Vitreoli vocant, adnumerant.

Ex diuersis simul mistis olea composita conuenientia possunt elici. Estque hoc inter cætera insigne: R. granorum Iuniperi 3. iij, cort. radic. Fraxini 3. iij, contusa subigantur, additis Laricæ 3. ij, Mellis 3. j. & postquam aliquamdiu macerata fuerint, affusâ copiosâ aquâ, eliciatur oleum: Quod à gran. vj. ad x. cum conuenienti aliquo liquore datur.

Inter ea quæ in substantia sumuntur, simplicia quædam alimentosa comesta id præstât. Vt Raphanus cum sale in acetariis, Raphanus rusticarius, marinus dictus, contusus cum Amygdalis, mensæ apponi solitus pro bellario. Leuistici radix cruda costâve, bonâ quantitate esitata; antequam balneum æger intret, valde commendatur. Petroselinî, Fœniculi radices costæ, Asparagorum teneritates & Lupuli, Brassica cruda & costâ, Portulaca. Sion Cratææ, Sifymbrium & Nasturtium in acetariis, Fœniculi marini folia condita, quæ tria admodum calculum pellunt, Limonia item mala, Vua passa, Ficus, comesta: Nuclei Persicorum Amygdalam,

Cerasorum esitati, qui maiori gratiâ sumuntur, si Saccharo, prius obducti sint. Cynosbati quoque fructus, Leporina caro, & præsertim Renes leporis, Passer item troglodytis, cuius loco Caudam tremulam quoque sumunt, assa, comesta vtilia censentur. Sanguis hirci coctus esitatus, Sanguinem vulpis cum Vino dulci generoso & Saccharo parum, & ad 3. v. vel vj. comestū, aliqui valde laudant.

Ex medicamentosis, simplicibus, Resinæ quædam, vi deterforiâ insigni & penetrante ad vrinas vsque, quas violaceo odore imbuunt, præcautionis gratiâ sæpè sumptæ primas ferè tenent: tum quando morbus inuadit, à renibus arenas calculumque abstergendo, ea ad expulsionem promouet. Communiter vsurpatur Larigna vel Laricea, vel in huius penuriâ Abiegna: quibus præfertur Terebinthina vera, si haberi potest, cui tamen viribus non cedit clara illa & fluida laricea. Daturque sola citra aliam permixtionem, non lota potius quam lota, cum illota magis abstergat, à 3. ij. ad 3. f. nebula inuoluta, aut aliter deglutienda. Vel puluere rad. Liquiritiæ aut Saccharo in formam boli redacta, sic per partes deglutitur. Validius penetrat ad vias vrinæ, aluumque simul egregiè subducit, si Vitello oui subacta, liquoreque aliquo diluta bibatur. In puluerem quoque redigi potest, si prius eousque donec effusa concre scat, & veluti vitreata fiat, coquatur: tuncque ad 3. ij. puluis illius cum liquore aliquo bibendus, aliòve modo sumendus.

Alia simplicia quæ ad calculum abigendum comminuta puluerisataque variis modis exhibentur, multa existunt. Inter quæ efficaciora esse experientia comprobauit, etiam per se sola cum Vino aliòve liquore, ex supradictis aliquo exhibita, radices Dictamni, Lauri, fol. Polygoni min. herniariæ dictæ, Bupleuri, quam plantam auriculam leporis vocant: semina Paliuri, Milij solis, Genistæ, Xanthij, baccas Alkekengi & Hederæ arboreæ.

Atque ex illis quæ ab animantibus peuntur, Sanguis imprimis hirci, hoc pasto delectus & præparatus. Ab hirco iuvene iugulato, eo tempore præsertim, quo herba viridibus aliquandiu prius pastus fuit, exci-

pitur, inter quas si aliqua calculo deputata fuerint, eo præstantior erit sanguis. Sumiturque qui medius effluit, qui postea insolatione aut alio calore sensim eousque ut citra corruptionem ad usum asseruari possit, & cum opus eo est in puluerem redigi, præparatur, pondereq; 3. j. vel paulò plus cum Vino propinatur. Quæ ratione & Sanguis leporinus præparatus propinatusque idem præstare usus comprobauit.

Vti & Leporis integri cum corio, carne, & sanguine: vel saltem pellis illius sanguine adhuc madentis, combustorum cinis, qui summo opere commendatur, eodem pondere vel mensura vnus cochlearis cum Vino generoso exhibitus.

Laudatur & imprimis Passeris troglodytæ dicti (illius quem *Zaunschliffert* nostri vocant, & malè caudam tremulam aliqui esse putarunt, & pro eo acceperunt) combusti cinis.

Efficaciaq; admodum sunt, Scorpionum, Millepedum vel Asellorum qui se in globulum complicant, Lumbricorum pulueres & cineres. Summeque vehementes, & non nisi cautè exigua quantitate vsurpandi, Cicadarum, Scarabeorum, Cantharidum pulueres seu potius cineres, ut minùs erodant.

Ex terrestribus admodum commendatur Lapis Iudaicus in cote subtilissimè tritus, qui ob eam causam Tecolithos vocatus fuit.

Præter hæc multa alia simplicia ad calculum pellendum passim describuntur, atque puluerizata, vel sola dantur, vel cum supradictis, inuicemve permista & in formam puluerum, electuariorumve aut pilularum redacta exhibentur. Quibus compositionibus, præter enarrata Lithontripica, etiam sequentia nonnunquam adduntur.

Vt radices Saxiphragæ albæ, Pimpinellæ saxiph. Filipendulæ, Anonidis, Valerianæ, Raphani mar. Rubi seu Chamæarubi, Vrticæ, Leuistici, Fœniculi, Petrosel. Graminis, Ruscii, Asparagi, Rubiæ, Azari, Scyllæ, Iridis, Enulæ, Aristolochiæ, Pœoniæ, Damasonij, Hippolapathi: cortices Glandium, Coryli medi, Herbarum itum Saxiphragæ Dioscorid. quam Serpillum nostrum Dod. esse putat,

Capillares, Nardus celt. Lauri & Brassicæ fol. Parthenium, Hedera terrestris, Pulegiu, Origanum, Polium, Calamentha, Hyssopus, Abrotonum, Chamædris, Betonica, Veronica, Chamæpithys, Querci & Salicis folia, Scordium & Empetrum, Flores Consolidæ regalis, Chamomil. Semina, Anisi, Fœniculi, Carui, Cimini, Apij, Anethi, Dauci, Sefeli, Petros. Leuistici. Sileris mont. Ammi, Petros. Maced. Coriandri, Cretæ mar. Asparagi, Bruscii, Ocimi, Raphani, Hyperici, Spinæ albæ, Vrticæ, Fraxini, Nigellæ, Nasturtij, Pimpinellæ, Saxiphragæ, Lupinorum, Vitorum: Baccæ Lauri, Iuniperi, ossa Mespilorum, nucleii Perficorum, Cerasorum, Amygdal. am. Ciceris rubri, spogioli in Gynosbato, Gummi Cerasorum, Prunorum, Iuglandis, Vitis, Arabicum, Tragachantum, Eleni, Olibanum, Bdellium: item Succinum. Dein & cineres Erinacei terrestris, Hirundinum, Hepatis asini, Plumarum palumbarum: & pulueres Renum leporis, Cranij hominis, Calorum & Vngularum equi pedum. Astragali leporis, Eboris, Maxillæ lucij piscis, Cancrorum fluuiatilium & Cochlearum, casu ut speciem addant, inuentarum, testarum: vti & Otorum, præsertim si pullus prius ab illis exclusus fuerit. Lapillorum item qui inueniuntur in Cancris & spongiis, Calculorumque excretorum ab homine, Stercoris item muriu. Et pulueres lap. Lyncis, Ochreæ terræ, Alcyonij tertij Diosc. Vitricæ combustæ cineres. Quibus compositionibus & plerumq; & ad vias vrinæ deducenda, easq; dilatantia adduntur: veluti radices Liquiritiæ, Altheæ, Vmbilici ven. flor. Viol. Semina Maluæ, Bombacis, Altheæ, Lini, Fœnogræc. Quatuor sem. frig. mai. Amygd. dulc. Fistici, Aucellanæ & Cucurbitarum cinis. Et tum ad concoctionem iuuandam, flatuque pellendos obstructionsque soluendas, tum potissimum quando eiusmodi affectus concurrunt (licet talia fortè quia à pituita calculos gigni putarunt, ut causæ huic eadem operâ prouentum illius impediendo, occurrerent excogitata fuerint) non solum ex prædictis multa quæ calculo accommodata hoc quoque & magis ferè præstant, sed ex quibuscunq; aromatibus, quædam, quibus aliqua

calculus quoque pellunt, & pleraque ex illis gratiam medicamenta addunt, immisce-re solent: Sicuti Zingiber, Galangam, Acorum, Cyperum, Cinamomum, Calsiam, Xyloaloe, Santalum rub. Nucem moschatam, Macerem, Gariophyl. Piper, Carpopalsamum, Cubebas, Spicam, Schoenanthum, Crocum.

Ex diuersis eiusmodi simplicibus quibusdam, pluribusve pulueres facti, illi per se à 3.j. ad 3.ij. cum Vino aliòve Liquore, vt aquis, lixiuiis, decoctis, infusionib⁹, exhibentur. Vel saccharo addito, in tragemata dicta, vel cum eo cum aqua decenti cocta, in tabulas: Aut mucagine seminum & gummi supradictorum, calculo competentium, imprimis tragachati in trochiscos rediguntur: Vel melle aliòve syrupo in electuaria mollia subiguntur, additis tunc quoque aliis conferuis conditisve, maioriq^{ue} quantitate à 3.ij. ad 3.iiij. propinantur. Aut si ingrata sint, additis syrupis & imprimis terebinthinâ, in pilulas redactâ, sic deglutienda 3.j. plus minusve pondere dantur. Quibus sumptis liquores conuenientes superbibiti actione eorum augent & promouent. Exempla quædam eorum quæ vsu innotuerunt, puluerum electuaria & pilularum proponemus.

Puluis primus: R^x. fol. Brassicæ siccæ 3.j. fol. Querci sicc. cort. Glandium an. 3.β. Piperis, Zingiber. an. 3.j. fiat pulu. Detur à 3.j. ad 3.j.β. vt dictum.

Secundus: R^x. nucleorum Persicorum torrefact. 3.β. feminis Melonum mundat. 3.ij. feminis Fœniculi 3.j. fiat puluis: Bibat cum Iure cicerum simplici vel cum Petroselino parato.

Tertius: R^x. feminis Milij solis, Alkekengi an. 3.j. feminis Petroselin. 3.β. puluerisfata, bibantur cum aquæ Limonum 3.v. vel alio liquore.

Quartus: R^x. femin. Genistæ 3.β. Succini 3.ij. Saccharicandi 3.j. puluerizetur: Capiat cum Vino.

Quintus: R^x. ofsium Mespilorum 3.j. Maxillæ lucij piscis 3.β. femin. Leuistici 3.j. fiat puluis: Vtatur vt ostensum.

Sextus: R^x. Oculorum cancri Astragalileporis an. 3.β. sem. Genistæ, Ocimi an. 3.j. fiat puluis: pro vna vice.

Septimus: R^x. Calculorum excretorum ab ipso ægro, si fieri potest, vel ab aliis, lap. Iudaici, æquas partes: terantur subtilissimè: Detur cum Hydromellite, vel aqua Fœniculi marini, aliàve.

Octauus: R^x. cinerum Passeris trogloditæ, vel Leporis vsi 3.j. vel vtriusque 3.β. testarum Ouorum exclusis pullis 3.ij. fiat puluis, addito Saccharo & Cinamomo: Detur.

Nonus: R^x. Laricæ vel terebinth. coctæ 3.β. pulu. Lumbricorum 3.j. Cornu cerui vsi 3.ij. lap. Iudaici 3.j. gummi Tragach. 3.β. fiat pulu. Pro vna dosi.

Decimus: R^x. Sanguinis hirci præpar. 3.j. lap. Iudaici 3.β. cinerum Lumbricorum 3.j. fiat puluis: Detur vt prior.

Vndecimus: R^x. Sanguinis hirci præpar. vel cinerum Leporis vsi 3.ij. vel vtriusque 3.j. lap. Spongia, Iudaici an. 3.j.β. sem. Anisi Fœniculi, Petrosel. Milij solis, ostium Mespilorum an. 3.j. sem. Nasturtii 3.β. sem. Melonū mundat. 3.j. rad. Liquiritiæ 3.β. rad. Pimpinell. saxifragæ 3.β. Cinam. 3.j. Sacchari 3.ij. fiat puluis: Capiat cochl. j. vel ij. superbibendo aliquid.

Duodecimus: R^x. rad. Liquirit. 3.ij. rad. Anonidis, Dictamni, Lauri, Raphani mar. Pimpinell. saxifr. Saxiphrag. albæ an. 3.ij. rad. Azari, Ireos an. 3.j. herb. Saxifragiæ veræ Dodon. 1. Serpil. Capil. ven. Bupleuri, Herniarie, Pulegij an. 3.j.β. sem. Fœniculi, Sefeli, Petrosel. Leuistici, Fœniculi mar. Raphani, Ocimi an. 3.ij. sem. Nasturtij, Nigellæ an. 3.j. ofsium Mespil. 3.j.β. nucleorum Persicorum 3.ij. gummi Prunorum 3.ij. oculorum Cancris, Maxillæ lucij. Piscis, Ouorum testarum, Hepatis lupi præpar. an. 3.j. lap. Iudaici & spongiæ an. 3.j.β. Ochrae, Vitri combusti an. 3.j. fiat puluis. Eodem modo vt priores vsurpandi, vel aliis miscendi.

Decimustertius puluis, efficax remediū: R^x. stercora glirium vel muris, siccata 5. vel 7. Olibani 3.j. sem. Fœniculi 3.β. Cinamom. 3.j. fiat puluis.

Decimusquartus magis adhuc efficax: R^x. Cicadam seu Locustam mediæ magnitudinis siccam num. j. vel 3.β. Oculorum cancri 3.ii. vel alterius pulueris, Cinam. 3.j. trita.

trita, dentur cum decocto Anthemidis vel granorum Iuniperi.

Decimus quintus vehementior: R. Cantharides siccas num. 4. lap. Spongię 3. ij. sem. Melonum medulię, vt contemperet cantharidum acrimoniam 3. j. 8. Sacchari candi 3. j. puluerisfata: Dentur cum decocto sem. Lini vel fero Lactis.

Ex vſitatis eiusmodi compositionibus, ſunt electuaria illa magna Nicolai, Lithontribon, Ducis Iuſtini appellata: Item Arnol-di Villanouani electuaria. Nephrocataſticum & Philantropos dicta: Baptiſtę item Montagnanę Diureticum nominatũ, quę, præter ea quę calculi cauſã adduntur, multa alia aromata & ſemina, ob cauſas dictas recipiunt.

Eſt & vſitatum quibuſdam electuarium Regiņę dictum, præter hæc etiam Senam & Turpethum recipiens.

Quo refertur & Rubeus pulvis vocatus, quem pharmacopolę noſtri parant, qui R. Santa i rubri, Cinamom. an. 3. j. ſemin. Aniſi Fœniculi, Petroſel. Cretę mar. Milij ſolis Alkekengi, Melonum an. 3. ij. lap. ſpongię, Iudaici, Lyncis an. 3. j. ſanguinis Hirco præpar. 3. 8. fiat pulvis.

Propriè verò calculo pellendo dictum eſt electuarium ex Cineribus Auicennę, quod paratur ex vitri cineribus, lap. ſpongię Iudaici pulueribus: ſcorpionum: leporis, ouorum putaminum excluſis pullis cineribus, ſanguinis hirci puluere: radic. braſſicę cineribus, rad. acori, herb. pulegij: ſem. petroſel. dauci, althęę, Piperis, gummi iuglandis Arab. pulueribus cum melle omnibus ſubaſtis.

Sæpè vſurpatum à me magno ſucceſſu remediũ: R. rad. Liquiritiæ, rad. Lauri an. 3. ij. rad. Anonidis 3. j. ſeminum Alkekengi, Paliuri, Milij ſolis an. 3. ij. ſem. Apij, Petroſelin. Fœniculi an. 3. j. Naſturtij 3. 8. gummi Ceraſ. vel Prunorum, Succini an. 3. j. reſinæ Lari-cę coſtę 3. 8. cineris cort. Fabarum 3. j. La-pillorum, oculorum cancri dictorum 3. j. fiat pulvis: addendo ad gratiam, Cinamom. & ad colorem Santali rubri tantillum. Cui cum dolorem ſimul mitigare volumus, ſeminis Hyoſciami 3. j. 8. addere poſſumus.

Datur per ſe 3. j. quantitate cum Sacchari q. ſ. Vel cum illius ſuſ. quant. aqua quę conuenienti formentur tabulę ſicquę exhibeantur. Aut ſyrupo exceptus pulvis in formam electuarij redigitur, vel pilularum: tuncquę nuclei Perſicorum inciuſi commodè permilſcentur, & loco rad. liquiritiæ Succus liquiritiæ emollitus additur.

Enarratę remediorum propoſitorum vtri & vſitatorum formę, per ſe, veletiam inuicem permilſte, additis nonnunquam & alijs, in forma puluerum electuariorumve vſurpari poſſunt: quibus & conſeruę interdum permilſcentur, hoc pacto: R. conſeruę vel condit. rad. Apij veri vel Ireos 3. j. conſ. florũ Geniſtę, Capill. ven. an. 3. 8. pulueris decimi vel duodecimi vel decimitertij, vel aliorum vſitatorum, vt Ducis, Iuſtini, Lithontribon 3. j. 8. Si efficaciorẽ eſſe velis, adde pulueris decimi quarti, ſucci Liquiritiæ 3. j. Syrupi ſupradicti, ex ſuccis parati, vel alterius q. ſ. fiat electuarium.

Probatur & agaricus interdum additus, vt: R. Agarici 3. j. rad. Pyrethri 3. ij. rad. Filipendulę 3. j. ſemin. Milij ſolis 3. 8. pul. Rubei 3. 8. conſ. Capill. ven. 3. 8. cum Melle Viol. fiat electuarium.

Pilulę conuenientes: R. ſemin. Paliuri, Milij ſolis, Alkekengi an. 3. j. ſem. Saxiphrag. Fœniculi mar. an. 3. 8. ſemin. Maluę aut Biſmaluę 3. ij. ſucci Liquirit. 3. j. gummi Ceraſorum vel Prunorum an. 3. 8. Bdellij 3. j. Sanguinis hirci præpar. 3. j. cineris Scorpionum vel cap. Muris, Lumbricorum, Millepedum vel Afellorum an. 3. 8. excipiantur reſinã Laricis aut Terebinthi, fiat pilul. maſſa: Capiat à 3. 8. ad 3. j.

Doloris potiſſimum ſedandi cauſã exhibentur, quę anodynã & narcoticã vi eum mitigant vel compeſcunt: permilſcendo ſemper ea quę renes calculumquę ſimul reſpiciunt.

Emulſio ſeu lac id præſtans: R. nucleorũ Perſicorum 4. j. ſem. Melonum vel Cucurb. 3. 8. ſemin. Papau. albi 3. ij. contundantur additaquę Aquã comuni vel parietarię aut Maluę tb. 8. exprimatur ſuccus lacteus, additoquę Saccharo vel Melle, Bibar ad 3. ij. vel iij.

Pulvis idem præstans : R. seminū Papau. albi rec. 3. ij. sem Hyosc. 3. j. 3. 4. sem. frig. mai. sem. Maluæ an. 3. j. sem. Milij solis, Alkekengi & Genistæ an. 3. 3. rad. Liquirit. 3. ij. rad. Anonidis 3. j. Sacchari 3. ij. fiat pulvis.

Possunt & alij pulueres calculum pellentes ad dolorem simul mitigandum parari, si illis semen Papau. albi, bonâ quantitate, vel Hyosciami, minori, cum sit efficacius, addantur. Sicuti in pulvere à me vsurpari solito ostensum fuit.

Opiatæ cum dolor summus vrget, vt in cordis dolore dictum, quoque dantur, confertque hic imprimis Asyncriton, & Philonium Rom. admiscendo aliquid de pulueribus lithontripticis: vel alia narcotica in dolore colico explicanda.

Sed & purgantibus, vt in cordis dolore quoque ostensum, narcotica mista, ad aluum mouendam & dolorem simul compescendum quandoque exhibentur: quorum stimulo forrè & calculus vt in purgantibus dictum, rectius propellitur.

Veluti : R. Asyncriti vel Philonij 3. ij. vel 3. j. Diaphoenici 3. j. 3. vel illius loco pulu. Benedictæ 3. j. 3. vel utroque omisso, Diacridij præpar. gr. vj. cum Saccharo fiat bolus. Aut diluat liquore conuenienti.

Vel hæc potio : R. fol. Senæ mund. 3. 3. medullæ sem. Carthami 3. ij. rad. Liquiritiæ, Petrosan. 3. 3. sem. Papau. albi 3. ij. sem. Maluæ, Lini an. 3. j. fiat decoctio, dissolue in f. q. Asyncriti vel Philonij 3. j. vel Mithridati 3. ij. vel syr. Papau. 3. 3.

Vel pilulæ dentur: R. spec. Benedictæ lax. 3. ij. Opij præpar. diss. in Maluatico gr. ij. Styrcis, Croci, Castorei an. gr. iij. ol. sem. Fœniculi gut. j. cum Laricea, fiant pilulæ.

Idem Clysteribus quoque cum aluum solvere & dolorem sedare simul volumus, & citius ferè & rectius præstatur, illis non solum anodyna sed & narcotica permiscendo. Vt in clysteribus prius dictum est, & in colico dolore vberius docebitur.

Externa remedia ad dolorem leniendum, angustias vbi calculus hæret dilatandas, calculum loco mouendum, vsurpantur: illudq; aliàs actu, aliàs potentiâ, aliàs vtrisque efficiunt, & ad præcautionem etiam quædam

ex illis prodesse possunt. Sequentibusque modis administrantur.

Insefsiones in balneo humido, actu calido, dolorem citò compescunt vel mitigant. Et proin dolore vrgente, statim æger corporis inferiorem sedem ad brachia vsque, vel saltem lumborum & ventris regionem, si crura libera esse velit, in proprio ad illud parato vase, Lumbario dicto, in quo sedendo crura attracta promineant, balneo immergere debet, in eoque donec dolor cesset commorari, eoque redeunte denuò illud repetere, cum hoc sit in magnis cruciatibus nephriticis remedium præcipuum.

Ex sola Aqua calefacta subito, cum necessitas non fert longiorem in præparatione moram, parata insefsio, calore actuali lenimen adfert & iuuat: cum calor ille mitis humiditati copulatus, æqualiter se corpori applicans, in dolore mulcendo plus operetur, quàm potentialis ille calor, qui huic permissione aliorum, vti iam dicitur, coniungitur.

Adduntur tamen quædam, quæ potentiali calore actionem alterius adiuvant, & simul laxando, flatu discutiendo, aperiendo, calculum commouendo, hac ratione quoque opitulentur, sumendo ea ex quibus clysmata decocta fuerunt: vel sequentia.

Paratu faciles sunt insefsiones ex decoctione herb. Maluæ, Petroselini vulgaris cum radicibus, & Chamomillæ flor. an. m. ij. vel iij. si balneum in angustiore fiat labro, plus sumendo si amplius sit.

Aliud balneum efficacius adhuc fit, si prædictis addantur, rad. Liliorum, herb. Parietaræ & Violarum, eadem mensurâ.

Tertium, ex decoctione esualium plantarum, vt Caulium, Spinachia, Attriplicis: vel rad. Raparum, Pastinacæ, Sisari paratur: potentiusque operatur, si Raphanus vulgaris vel marinus dictus addatur.

Compositum ex variis balneum sic fit in tina oblonga: radic. Althææ, rad. Aperitiuarum quarundam vel omnium, in totum lb. 3. herb. Emollitiuarum 3. vel 4. Senecionis, Polygoni vulgar. Parietaræ, Betonicæ, Verbenæ, in totum p. iij. semin. Lini, Fœnogræc. in totum p. j. sem. Apij, Petroselin. Carui,

479

Carui, in totum ʒ. j. decoquantur in aqua pro balneo.

Adduntur prædictis quibuscūq; vel omnibus quædam efficaciora, ex aliis quoq; plantis calculo pellendo accommodatis, inter ea quæ sumuntur descriptis, quæ & foris adhibita aliquo pacto eum promouere creduntur. Imprimis verò rad. Rubiæ: ex herbis Fœniculus marinus, Sifymbrium aquat. Aquileia, Filipendula, Pes columbinus, Bupleurum, Abrotanum, Artemisia Dioſc. flores Genistiæ, verbaſci: semina Milij solis, Alkekengi, & similia.

In ditionibus vt melius laxent balnea, Lac, Oleum, Butyrum, illis quoque adduntur: & penetrationis maioris causâ, Vinum.

Fomentationes, cum inſeſionibus vti non possunt vel nolunt, ex prædictis decoctis, spongiâ, stuppis, sacculis, exceptis, supra locum dolentem horum loco adhibentur. Quibus postea cum minor decocti requiratur, quantitas, Vinum, Olea rectius permiscuntur.

Embroschas seu infusiones supra peſtinē, si illic calculus subsistat, fundere, vt loco moueatur aliqui suadent. Quæ ex decoctis quoque præcedentium parantur.

Thermis acidis si aliquandiu vtantur, nō solum bibēdo, sed & in illis lauando, arenulæ & calculi diu sæpè retenta expurgantur. Sicque imminens malum vt vel tardius vel nunquam redeat auertitur & præcauetur.

Quod & Sulphureæ in quibusdam præstant thermæ.

Inunctiones regionum renum, pubis, perinæi, vbi dolor potissimum se offert, si fiant, maximè post balneum aut fotum prægressum, dolorem leniunt viamque calculo rectius patefaciunt, eumque promouent. Quæ calidè, deorsumque manu adactâ fieri debent.

Dilatans vias inunctio si renum simul adfit calor: R. ol. Viol. ʒ. j. ol. Nenuph. & in quo coxerit Althea, Butyri recent. vel Cremoris lactis, Axungie Anatis an. ʒ. ʒ. Ceræ albæ q. s. misce, fiat linimentum.

Anodynum magis: R. olei Amyd. dulc. ʒ. j. ʒ. ol. Chamom. vel de Meliloto, Anethini, Cheirini an. ʒ. ʒ. axung. Cuniculi ʒ. vj. mucil.

lag. sem. Lini vel Psyllij ʒ. j. Croci ʒ. j. Ceræ q. s. fiat linimentum.

Vel vngatur vnguento Dialtheæ aut Resumptiuo.

Cum calculum simul propellere volumus: R. olei Amygdal. am. ʒ. j. olei è nucleis Perficorum ʒ. ʒ. ol. Scorpionum, axung. Anseris an. ʒ. ʒ. Laricæ ʒ. j. Ceræ q. s. fiat linimentum.

Additis succis tale fit: R. succi Parietariæ, Maluæ an. ʒ. j. ʒ. Vini ʒ. j. Aceti albi ʒ. ʒ. olei Cheirini, Lumbricorum an. ʒ. j. ol. Scorpionum ʒ. ʒ. decoquatur ad succorum consumpt. addendo axung. Hirci ʒ. vj. Ceræ q. s. fiat vnguentum: Vel addatur succis & oleis Terebinth. & fiat instar nutriti,

Aliud vnguentum efficax: R. ol. Liliorum, Amygd. am. an. ʒ. j. ʒ. succi Fœniculi mar. vel Raphani mar. aut vulgaris, Vini albi an. ʒ. j. bulliant simul, addendo Cicadas, vel Millepedes viuos, vel si haberi nequeunt, Cantharides & Scorp. sicc. ad 12. vel plures.

Vel sic: R. ol. Amygdal. am. vel è nucleis Perficorum aut Ceraſorum ʒ. ij. addendo, si haberi potest, olei è nucleis nucularum Tribuli aquatici, quod Sericinum vocant ʒ. ʒ. Scorpionum vel Cicadarum sicc. vstarum ʒ. ʒ. Ceræ q. s. fiat vnguentum.

Compositum amplius sic fit: R. oleorum Chamom. Anethi, Liliorum an. ʒ. j. ol. Amygd. am. ʒ. j. ʒ. ol. Scorpionum ʒ. j. ax. Hirci & Taxian. ʒ. ʒ. mucilag. seminis Fœnogr. ʒ. j. radic. Rubiæ, Azari an. ʒ. j. sem. Nasturtij, Raphani, Leuistici an. ʒ. ʒ. Myrrhæ ʒ. j. cinerum Cicad. vel Scarabeorum ʒ. ij. cinerum Glandis fagineæ ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. olei Succini ʒ. ʒ. Ceræ q. s. fiat vnguentum.

Sanguine ab hirco modò iugulato sumpto, & dum adhuc calet, inunctione factam laudat Trallianus.

Cataplasma dolenti aliquando loco imponitur, quale hoc pacto fieri poterit: R. rad. Liliorum sub prunis coſtorum ʒ. ʒ. Parietariæ fixæ parum super regulam calentein & coſusæ m. ij. Chamæpytheos simili modo paratæ, vel si sicca sit, pulueris illius ʒ. ij. rad. Altheæ contusæ ʒ. ij. fl. Chamom. Anethi summit. an. p. j. farinæ sem. Lini, Fœnogr. an. ʒ. j. adde Lactis q. s. coquantur parum, adde in

fine, Butyri rec. ʒ. ij. ol. Lilliorum, de Scorpio-
nibus an. ʒ. j. Croci ʒ. j. fiat cataplasma.

Sacculi, puluini, enarratis simplicibus ari-
dis impleti, vel Auenâ & Milio, quibus in a-
liis doloribus quoque sedandis vtimur, cale-
facti prius & applicati, actuali calore potius
quàm potenciali alleuiant.

Vti & Puluini alij plumis infarcti, Pellés-
ve calidæ, admota simili ratione dolorem
mitigant: In quibus si à certis animantibus
fumantur plumæ, & pelles sint cuniculi vel
leporis, propriestate quadam idem efficere
vulgus credit.

Sicuti & lapides aliquos cingulo alligatos,
lumbisque circumdatos calculum præcaue-
re multi existimant. Inque hunc vsum lapis
subiuridis instar galactidis circumfertur
magnaibusque venditur.

Cucurbitula, non supra regionem renis,
ne latentem calculum prouocet, doloremq;
qui quamdiu vreteribus non infigitur, ma-
gnus non est, primū inferat, sed quando cal-
culus iam vretres ingressus, illic subsistens
excruciat, paulò sub doloris loco affixa, illū
loco mouet, indeque semper secundum vre-
teris ductum obliquè deorsum procedendo,
& prout dolor deorsum vergit, cucurbitu-
lam mutando, dolorisque sedi semper sub-
affigendo, donec ad vesicę regionem deuen-
tum sit, illum vt in vesicam descendat, hac
ratione promouet.

Quod frictione forti, à doloris sede deor-
sum ad pectinis regionem vsque facta conti-
nuataque, præsertim si manus fricantis aut
pannus actu calida sint, adhibitis simul oleis
relaxantibus, vti illa suo loco explicabun-
tur, similiter præstatur, maximeque si simul
postea cucurbitulæ adhibeantur. Cautione
tamen hac adhibita, ne altius ad doloris lo-
cum hisce ascendendo, dolorem irriteremus.
Frictionem quoque crurum, dum æger bal-
neo vtitur, aliqui adhibent.

Motum corporis moderatum, vti præpa-
rationis loco ne arenulæ aut calculi in renib.
subsistant, ea deorsum promouendo, prodes-
se superius diximus, sic & si calculus descen-
dens alicubi in viis hæreat, & excruciet, cor-
pus stando erectum seruare, vel eundo leui-
ter exercere, vt citius loco cedat, iuuabit.

Et si è renibus progressus calculus, statim
in vreteris initio hæreat, illicque dolorem
excitet, nec descendere possit, vt rursus in
renum cauum redeat (quod cum fit, dolor
quoque remittit) corporis situs & decubi-
tus factus, vt lumbi elatiores sint reliquo
corpore, præsertim si tunc pedes eleuati nō
nihil agitentur, opitulatur: sicque interdum
dolorem subito leuat.

Spiritus validā impulsione, quando cal-
culus subsistit, ad eum detrudendum Vom-
itus impetu suo aliquod adiuuentum adfert,
quare, nisi sponte superueniat, sicuti in pri-
ma huius mali inuasionē euenire solet, si alia
non iuuent, ad eum recurrere possumus.
Vel sternutationem eam ob causam moue-
re, cum validè quoque impellat.

Per venæ in pede sectionem, qui reni do-
lenti subest, vel in poplite aut circa malleo-
lum, vel vbi turò illic secari potest factam,
sanguis, si dolor summus vrgeat, ægerque
plethoricus sit, reuellendus, ne ob dolorem
in renem fluens, inflammationem pariat,
quæ ob eam causam calculo sæpè, vti illic
dictum, iungi solet: quod cum fit, tunc eo
magis sanguinis detractio locum habebit.

Punctorius, Spleneticus vulgò dictus do-
lor, etsi acerbis fatis sit, tamen cum à causa
vix diutius perseuerante, vt musculorum
abdominis nimia attractione & flatibus fiat,
sponte plerumque cessat, alias curatione o-
pus habet.

Quod si verò leuem ob motum, vel sæpè
molester, quiete præcauetur, motuq; corpo-
ris decenti, non inordinato aut violento, Vi-
ctusq; ratione moderatā, & quæ flatibus mi-
nimè occasionem præbeat, sed eos dissipet.
Latusque quod affici solet, diligenter inte-
gatur & à frigore muniatur. Et si necessita-
tis causā, validiores motus perficere, & præ-
sertim equitare cogantur, ne dolor hic su-
perueniat, nō statim ventriculo adhuc cibis
repleto equum conscendere debent, priusq;
fasciā latā abdomen cingere, sicuti hi qui ce-
leres cursores agere solent, inter equitan-
dum hoc pacto se, vt ferre successione pos-
sint, adstringunt.

Superueniente quoque hoc dolore pun-
ctorio, admodumque urgente, si tunc quoq;
latus

Pūctorij
Spleneti-
ci, falsò
dicti do-
loris cu-
ratio.

latus affectum cingulo vinciant arctiusque stringant, eadem ratione, vt in spasmo flatulento, cuius aliquam speciem esse hunc affectum, retractis in suam sedem musculis, dolorem remittere ostensum fuit: sic & hic cōpressis hisce musculis vinculo in suum locum, flatibusque expressis, punctiones hæ remittunt vel cessant.

Quod si post quietem vel vinculas dolor nihilominus perseueret, curatio eadem ferè quæ in pleuritide flatulenta exposita fuit, hic quoque instituitur.

Ab externis primùm incipiendo, & ad flatus dissipandos doloremque mulcendum, loco dolenti calida actu & potentia operantia, fofus, facculos, inunctiones, emplastra adhibendo, balneisq; siccis & sudorem mouentibus, flatus absumendo. Qualia multa eiusmodi in pleuritide flatulenta, aliisq; externis doloribus à flatibus, in habitu corporis excitatis, describuntur.

Quorum vsu, si nec tunc intermittat affectus, diuersiones & deriuationes quoq; per clysmata, cucurbitulas, illic explicata, faciendæ. Et vti tunc descriptum, si corpus impurum sit, purgantibus, sudorem mouentibus, alterantibusq; exhibitis quibusdam, quæ occultâ vi punctorios dolores sedare docuimus, hic quoque eos amouere studuimus.

DE VENTRIS DOLORE.

CA P V T XIII.

Genera.



ENTRIS doloris nomine eum intelligimus, qui in anteriore illius sede molli seu nuda nullisq; ossibus obfita, seu abdomine propriè dicto se potissimum manifestat. Nam de aliis doloribus, qui adnatis illi in locis, vel cum excretionem aut mictionem dolorifica, aut in pudendis vel podice maxime se exerunt, postea agemus. Hi verò qui in ventre propriè se offerunt, hicque describuntur, sedibus primùm hac ratione distinguuntur: quod alij in abdominis potiore se-

de in ambitu vmbilici se offerunt: alij in ima ventris potius sede mediâ, iuxta pectinem occurrunt, vel ad coxas & lumbos quoque extenduntur.

In ambitu vmbilici sede aliquâ dolores frequenter oboriuntur, quos pro diuersitate intestini affecti, vt in causis dicitur, distinguentes Medici, vnum Colicum, alterum Ileum appellant. In quibus hæc symptoma-
*Colicus
Iliacus
dolor.*

Dolores atroces admodum sunt, & tormentum adferentes, vnde eos Tormina vocant: & quia ægrum torquent, Germani illos *Krimmen* appellant. Qui in circuitu vmbilici alicubi, vt dictum, se manifestantes, nunc illi veluti circumducuntur: & nunc in sede inferiore superioreve, nunc in lateribus sese produnt. Interdum instabiles sunt & vagi, supra ferè vmbilicum de latere in latus, vel infra de loco in locum delati. Nunc cum caloris & ardoris, aliàs quoque frigoris sensu: Aliàs fixi certo in loco, maxime sub vmbilico, eam sedem veluti perterebrâtes, non tamen vti nephritici circa dorsum, inguina, aut circa coxam, veluti vterini hærent, nec illic potissimum se exercent.
*Tormina
Krimmen
German.*

Murmura ventris & rugitus, nunc vno in loco, nunc per varias illius sedes discurrentia, interdum deprehenduntur, tanguntur & audiuntur.

Constipatio alui plerumque adest. Nonnunquam conatus aliquis eructandi vel crepitandi, sed irritus: quæ si succedunt, aut aluius deiecit vel diarrhœa sequitur, malum leuant. Aliquando deiectio quædam purulenta succedit, non tamè vt in dysenteria cruenta. Vrina in quadam illius specie quoque suppressitur.

Nausea, cardialgia molesta sunt. Sequiturque interdum vomitio nunc pituitosæ, nunc biliosæ materiei: aliàs etiam excrementorum alui fetidorum, magno ægrorum fastidio & tædio in ea specie quæ Ileus ob locum affectum dicitur, & Eleos ob horrendum & periculosum symptoma, dignum commiseratione dici posset: cum & sic à quibusdam Miserere mei nomine exprimatur.
*Miserere
mei.
Iliaci do-
loris spe-
cies.*

Febris nonnunquam illi accedit: aliàs

præcedens illique occasionem præbens; adhuc illi comes manet: interdum colicum dolorem cessantem sequitur.

Conuulsiones horrendæ, interdum & resolutiones, hosce dolores aliquâdo sequuntur: quod veteribus plerisque incognitum fuit, nostro sæculo adeo frequens. Quæ nunc generalia accidentia cum sint, maiorem corporis partem afficiunt: nunc particularia; certas partes tantum lædunt. Sicuti in motuum læsionibus hæc abundè descripta sunt.

Distendens, circa vesicæ regionem, colicæ do. or. Inflammans, circa vesicæ regionem, do. or. In ima ventris sede media, circa pectinis regionem, dolor vehemens quandoque occurrit. Distendens vnus, qui cum vrinæ suppressione accidit: vbi & casus ille, quoque descriptus fuit. Alter cum ardore, lancinatione & pulsatione se offerens, rubore aliquo, etiam extrinsecus, nonnunquam & tumore, qui tactu deprehenditur, se patefaciens: qui à sede affecta, vti dicetur, Vesicæ inflammatio vocatur. In qua aliud vrinaq; aliquando supprimitur: illique febris illiusque accidentia, inter quæ & delirium accessisse obseruatum fuit, coniuncta sunt. Quem affectum aliquando puris mictio sequitur, aut durities circa eam sedem, post eum remanet.

Alter in inferiore abdominis sede dolor, ad coxas, & lumbos, quoque pertingens (quo nomine in hypochondriaco dolore illius mentio facta est) non infrequenter existit, & à loco affecto Vterinus vel Matricis dolor dicitur, duplici modo se habens.

Vterinus dolor, Värmutter vulgò. Distendens vnus & torquens admodum in ventre & lateribus quoque occurrit, estq; frequentior Vterini doloris vulgò appellati species, Germanicè. Mütterweh vel Värmutterweh dicta. Qualis plerumque ante menstruorum eruptionem multis virginibus & fœminis euenire, illasque donec erumpant, affligere solet: Aut alias, retentorum, vel non rectè se habentium menstruorū symptomata esse, aut etiam ob causas alias, alio tempore, alia ætate accidere. Eademque ferè ratione vt colicus dolor, in inferiore ventris sede se exerit: Ex quo factum, vt & colicos dolores incipientes vulgus vterinos appellat, idque non solum in

fœminis, sed & in masculis, quando colici dolores primùm oriuntur, nec dum rectè cogniti adhuc sunt, eodem Värmutter nomine, ineptè, ac si illi matricem quoque haberent, appellant. Quos dolores vterinos in fœminis grauiora adhuc accidentia, hysterica præsertim, vt in vteri suffocatione dictum est, interdum sequuntur, aliquando comitantur.

Est & vterinus dolor quidam, grauidis mulieribus quandoque molestus, in inguinibus se maximè repræsentans, quo & à coxendice differt, cui alioquin non omnino absimilis, nisi quod dolorem, etsi crura minimè mouent, in anterioribus magis, quam posterioribus sentiunt.

Alter quoque vterinus dolor huc refertur, puerperis peculiaris, non ille qui in partu oritur, de quo in partus difficultate egimus, sed qui post partum non in pudendis, qui illic explicatur, sed circa imum ventrem potissimùm, distendendo aliquot horis, vel etiam diebus fœmineum genus quandoque excruciat: quem & priuatim, Post partum dolorem vocant.

Inflammans Vterinus dolor, Post partum dolor alter, vterini inflammationis species. Ardens, distendens, pulsans & lacinans dolor Vterinus quoque existit, qui Vteri inflammatio à causa, vti dicetur, nominatur: Interdum & si post partum accidat, Post partum doloris vocati altera est species. Qui eodem modo vt vesicæ inflammatio, nisi quod latius se in latera, vti ostensum, extendit, affligit, & tumore & rubore extrinsecus quoque apparente, se nonnunquam prodit, aluumq; obstruit, mictioniq; impedimentum adfert, febremque comitem habet: & post se alium dolorem acrem pungentemque, ac veluti exedentem, cum saniei purisque per vteri ceruicem excretionem, duritiemq; nonnunquam relinquit, nec non animi defectum, aliaque hysterica accidentia simul, sicuti illis locis descriptum fuit, producit.

Causæ.

Viscerum neruorum trium in abdominis cauitate, seu ventre contentorum morbi, doloribus hisce causam præbent. Quæ sunt, intestina & vesica, vterusque in fœmineo sexu.

*In intestinis
causa
Ventricis
doloris.*

Intestina ventrem penè vniuersum adimplent, & cum exquisitè sentiant, dolores qui illis affectis oriuntur, acerbissimi sunt. Cumq; in tenuia & crassa tota ipsorum longitudo distingatur, horum formæ & situs diuersitatis causâ, dolores quoque distinguuntur, atq; ille qui in crassis accidit, cum maiorem illorû portionem colon cõstituat, Colicus: qui in tenuibus Ileus vel Iliacus appellatur. Et cum tenuia medium spacium in vmbilici ambitu occupent, ileus dolor in media ventris sede vmbilico proximior magis sentitur: crassa verò cum in circuitu horum sint posita, atque in elatissima sede ad cordis foueam dictam, à dextro latere in sinistrum protendantur, illicque ad podicem descendant, colicus dolor eo quoq; circumductu potissimum se exierit. Morbi verò in intestinis dolores hosce procreantes, sunt ipsorum distentio, cum irritatione aliquando eueniens, refrigeratio, phlegmone, & phlogosis.

*Distentio
intestini
causa
Doloris
ventris.*

Distentio nimia intestinorum, præsertim si irritatio simul accedat, ventris dolores frequenter parit. Quæ ab excrementis diuersis & flatibus quæ continent, proficiscitur. Quando hæc vel copiosius quàm par erat, ad intestina feruntur, eaque adimplent: vel alioquin impedita hærent, nec exitum habent, hacque ratione cumulantur.

*Copia
excrementorum
&
flatuum
intestina
peruadentiū,
causa
ventris
doloris.*

Feruntur ad intestina nonnunquam magnâ copiâ excrementa & flatus, eaque replendo distendendoque dolorem excitant. Qui, si liber eorum est transitus, vagus est, nec diutius eodem loco persistit, sed cum murmure hinc inde delatus, tādē per crepitum vel ructum, vel diarrhœam soluitur. Qualis dolor sæpè post cruditates & post fructuum fugacium esum, vini mustiporum, & similibum sequitur, & purgante medicamento sumpto, euenit; diuque sæpè antequam deiectio adsit vrget; eoque grauius, si excrementa bile simul, aliòve acri humore perfusa, non solum intestina distendant, sed & simul vellicent. Sicuti in diarrhœa quæ cum dolore eiusmodi copulatur, hæc causa vterius exponetur.

Impedita hærent accumulanturque excrementa, & flatus interdum; alicubi in in-

testinorum longo ductu, atque distensione dolorem immensum, cum alui constipatione euenientem, inducunt. Qui aliquando eo in loco fixus est, vbi causa, excrementorum progressum impediens, latet: aliàs vagus, illic vbi excrementa flatusque cumulantur & vagantur, existit.

In crassis intestinis quæ excrementis crassioribus scatent, flatusq; multos continent, hoc frequenter euenit, vt in anfractu illo magno seu reflexu coli intestini, quem in descensu, latere sinistro in recti intestini initio facit, ob hanc viæ obliquitatem excrementa eò delata subsistentia, colicum cruciatum immensum pariant: in quo excrementis exitum quærentibus & conantibus, locus veluti perterebrari videtur, tumorque eâ in sede, qui & tactu deprehenditur, eleuari, illisque in intestina remeantibus aliquoufque, donec redeant, hæc remittunt, dolorque indies prout magis magisque excrementa & flatus coaceruantur, augetur. Quod transitus impedimentum, à copia excrementorum, viam hanc ob curuitatem angustam subito implente atque obturante nonnunquam prodit: Vel à siccitate, duritie, aut tenacitate horum oritur: quæ ut illic subsistant fursumque per reflexum illum ferri nequeant, faciunt: sicuti in alui constipatione, quæ tunc semper adest, causas quare sic indurentur, exposuimus.

Verum & in coli intestini cellulis ad ipsius latera positis, & à cavitatem ipsius declinantibus, atque instar semiglobi protuberantibus, excrementa indurata & sicca, scilicet, in locis eiusmodi deuīs retenta atque interclusa, non solum grauando & distendendo quoque, si admodum coaceruentur, sed & liberum excrementorum transitum impediendo, sicq; ea cumulando, colicis doloribus occasionem præbent. Imprimisque si ex illis sedibus deuoluta diu retenta excrementa dura, eum, vt dictum, obstruant. Quod & ab aliis corporibus duris in hisce sedibus retentis, fieri potest: Veluti à comestis copiosè lapidibus fructuum nucleatorum: vel fructibus duris, vt castaneis: è quorum esu largiore aliorumve ciborum duriorum, dolores colicos cum ventris constipatione:

*In anfractu
coli subsistentia
excrementa & flatus,
causa Colici
doloris.*

*In coli
cellulis
retenta
excrementa & corpora,
causa
Colici
doloris.*

natos, aliquoties obseruauimus. Vti & ossicula è pedibus gallinarum coctis, à muliere multoties, dum curà per diatã vteretur, deglutita, multis annis in intestinis hæsisse, & demum eiusmodi casus peperisse, ex eo quod post clysterem infusum, magnâ copiâ illa reddiderit, liberataque fuerit, satis colligere potui. Quod & à caseo similiter diu ante, sæpè, & multum comesto, in colico accidisse, illius postea per clysterem magnâ copiâ deiectio, quo tempore & caseosos vermiculos viuos cum vrina eminxit, satis patefecit. Sed & à pituita concreta (si modò pituita, & non alia excrescentia fuit) colon ad eò infarctum, vt penè vnitum esse videretur, easdem obstructions colicosque inde natos dolores procreasse, sectione se inuenisse testatur Fernelius. Atque in legato quodam, corpus quoddam durum, firmum, medio ductu pertusum, in coli intestini ductu sub ventriculo transuerso hærente, sicuti ex tumore illius loci conjici potuerat, colicos dolores illi peperisse, eoque post sexennium pedis longitudine reiecto, ab illis liberatum fuisse, idem scribit. Quod eadem ratione & à calculis in intestinis natis accidere potest, quales prægrandes nucis iuglandis & castaneæ magnitudine, per aluum excretos se vidisse idem fatetur Fernelius: nosque vnum scia non veluti in saxum conuersum, similiter reiectum vidimus.

*In tenuibus
intestini
meatus
obstructione,
causa
sa Iliaci
doloris.*

In tenuibus intestinis interclusus excrementorum transitus, Iliacis doloribus diuersimodè se offerentibus, occasionem frequenter præber. Quod cum sit, in meatu illorum angustiore nonnihil, quo se in fine ipso, iuxta renem dextrum, in crasso intestino aperit, facilius quàm in reliquo ipso, ductu ampliore hoc accidit: dolorque tunc Iliacus ille atrox ad eò vulgaris nostris, vulgò quoque colicus appellatus, oritur, qui ob locum obstructum, fixus circa dextrum latus, & propter retenta excrementa in tenuibus intestinis, in vmbilici ambitu vagus se repræsentat, aluiusque, suppressis illic excrementis, tam diu, donec per medicamenta via hæc occlusa pateat, & natura simul sollicitetur. minime respondet, rursus hisce, omis, constipatur dolo-

resque redeunt, morbusque donec integrè hæc obstructio soluta sit, prolongatur. In qua si excrementa retenta biliosa sint, aut alioquin praua per se existant, vel ob moram putrescentia aut corrupta, acrimoniam & perniciosam ac malignam vim adipiscantur, cum tunc intestina simul vellicent, dolor eò erit vehementior; & licet ad excretionem suâ acrimoniam naturam nonnihil sollicitent, tamen, cum quamdiu hæc obstructio durat, ad intestina crassa ferri nequeant, aluius nihilominus constipata manet, nec ab illis ad excretionem stimulat: cum nisi impeditus hic ipso esset transitus, & alioquin in intestinorum cauitate redundarent, ea irritando, diarrhæam & choleram morbum, vel si intestinis adhærent, dysenteriam potius cum alui fluore, quàm Iliacum hunc dolorem, in quo aluius suppressa est, excitarent; quod verò in intestinis tenuibus inclusa facere nequeant, sed hinc inde diuagando cruciatus enormes illos, qui non cessant, donec, vt dictum, obstructio hæc solvatur, eaque redeunte, reciduas facere consueuerunt, excitant. Quorum biliosorum peruersorumque humorum excrementis permixtorum causâ, si diutius retineantur, alia quoque grauius accidentia, icterus, febres, tandemque nervoso genere consentiente, conuulsiones, alique nervorum affectus, sicuti illis in locis declaratum fuit, sequuntur. Sed & fit propter omnimodam illius angustii meatus intestini obturationem, vel quia diutius neglecta est, aut etiam nullis medicamentis cedere potuit, ad eò facies vt coarctentur, vt sursum in ventriculum regurgitent, & vomitio illarum abominabilis, Ileusque morbus quem Miserere vocant, sequatur.

Huius autem meatus obstructionis, tam quæ facile, quàm quæ ægrè solui potest, causa à tenacibus crassis eiusmodi excrementis procedere potest: vel à siccis in tenuibus intestinis induratis: Accedente præsertim constitutione huius meatus à natura angustiore, vel ob ætatem, vel calidiorum continuum vsum intestinis aridioribus factis, eo loco angustatis. Vti & si ab aliis assumptis crassioribus, aut natis illic duris corporibus, sicuti

sicuti in coli cellulis & anfractu iam fieri diximus, obstruatur. Quemadmodum à cydoniato, meatum illum iuxta cæcum dictum intestinum obstruente, acerbissimos Iliacos cruciatus, cum omnimoda alui suppressione, vomitioneque excrementorum & syncope, puellam passam fuisse, atque in illa ex hoc casu mortua sectaque, cydoniatum adhuc ille deprehensum fuisse, docet Fernel. tantamque congeriem excrementorum, ob oclusum exitum in intestinis tenuibus fuisse congestam, ab illisque distentionem factam, ut illis ruptis, fæces in abdomen decidisse obseruari.

Contorsio seu conuolutio intestinorum tenuis causa Conuoluti. Sed & in reliquo ductu tenuia intestina, quæ alioquin variè inuoluta iacent, si amplius conuoluantur adeoque contorqueantur, ut iam via obturata sit, & cauitas interior constricta & oclusa tunc subsistentibus fæcibus & flatibus, coagmentatisque atque intestina distendentibus, iliacus ille dolor sequitur, quem Conuolutulum vel Voluulum ob hanc intestinorum conuolutionem vocant, & in quo, fortè si non procul à duodeno fiat conuolutio, fæces alui tantopere vomunt, dolorque vagus & instabilis cum murmure & rugitu, in vmbilici ambitu accidit. Cuius conuolutionis causa, uti inflammatio, sicuti mox ostendetur, nonnunquam existit; sic & à flatibus, hoc interdum euenit, si per se, vel vnà cum excrementis tenuia intestina adeò impleant, ut penitus distenta færciminum inflatorum infarctorumque instar, supra modum contorta (qualia aliquando vidimus, flatibusque supra modum distenta inuenimus) fiant. Quod vix tamen ob solam flatuum copiam accidere potest, nisi aliæ insuper intestinorum obturationes, à causis præcedentibus progressæ, accedant, quæ ipsorum transitum, uti dictum, impediunt, ut intestina penitus repleantur, sicque conuoluantur, faciunt. Eadem contorsio, ex situs intestinorum peruersione, à prolapsu tenuium intestinorum extra peritonæi cauitatem in scrotum nonnunquam in hernia fit, si diutius illic subsistant, necdum remeare possint: eademque tunc symptomata sequuntur, nisi quoddolor tunc in inguine, vbi ruptura est perito-

næ, magis vrget: & proin in externis doloribus & in hernia species illa conuolutuli explicabitur.

Refrigeratio vehemens intestinorum, *Refrigeratio in intestinis* tormina in illis excitat, uti & in ventriculo dolores inde nasci diximus. Qui hic, uti illic, ab eadem causa quoque proficiscuntur. *Torminis ventris causa.* Ab externâ scilicet ventris refrigeratione, vel ab assumptis affatim actu nimium frigidis, non solum ventriculum, sed & intestina tenuia illi continuata, & colon vicinum, refrigerantibus: quod & ab iniectis clysteribus, nimium actu potentiave frigidis, potest accidere.

A flatibus frigidis, ex potu frigido, vel ex cruditate prouenientibus, hoc itidem fieri potest, ut refrigerando, & si copiosi sint, simul distendendo tormina ventris faciant. Humor item crudus frigidus, ex acidis potissimum copiose comestis, ut cerasis, prunis aliisve genitus, idem facere potest, ventremque refrigerando flatibusque implendo, conturbare.

Pituita etsi præcipua à plerisque doloris causa statuatur, tamen non alia quam ea quæ summè frigida est, dolores hosce procreabit: qualis vitrea dicta pituita existit, quæ in intestinis nata, illisque adherens, cum frigidissima sit, ac si ea perforaret & rodere, doloris sensum præbet. Reliquæ pituitæ species, cum non tantopere refrigerare, aut intestina implere, ut distendantur, possint, dolorem nec qualitate suâ aut copiâ insignem excitare queunt.

Inflammatio intestinorum illorum, dolori quoque causam non infrequenter præbet: Ileo si in tenuibus, Colico, si in colo aut recto inflammatio fiat: dolorque fixus, inflammans, distendens pulsansque in affecta sede intrinsecus sentitur, febrisque eum, illiusque accidentia, uti cæteras inflammationes comitantur: aliudque constipata est, licet desiderium aliquod deijciendi crassius intestinis affectis, sed inane vrgeat. Quod si verò tenuia intestina inflammata sint, tumorque magnus existat, tunc illis oclusis vel conuolutis, cum nihil per ea descendat, excrementa per os euomuntur, Conuolutuli que dicti morbi, hæc quoque magisque frequens

Inflammatio coli, causa Colicæ doloris.

Inflammatio tenuium intestinorum, causa Conuolutuli.

causa

causa existit: in quo tumor extrinsecus cum vestigio aliquo liuiditatis, sicuti obseruauimus quandoque deprehenditur. Sed & si in abscessum tandem conuertatur inflammatio, eo rupto, saniosa & purulenta deiciunt.

Huius autem inflammationis causa, sanguis venarum meseraicarum, extra venas in intestinorum substantiam infusus, existit: ob copiam vel tenuitatem eò defluens: Frequentius ob dolorem insignem qui præcessit, eò impulsus: Aut ab alia intestinorum læsione concitatus: sicuti & à vulnere aut contusione accidere potest; quæ ad externa pertinent.

*Phlogosis à bile
intestinorum,
causa
Iliaci doloris.*

Præter iam dictam intestinorum phlegmonem, phlogosis alia seu feruor illis non infrequenter accidit, maximè tenuioribus, unde Iliacus quoque dolor potius quàm colicus (licet eum etiam sic communiter appellent) sæuus, diuque durans, grauia quoque inferens symptomata, oritur. Quando nimirum (sicuti longâ obseruatione cognouimus, signisque certis deprehenditur) bilis non in intestinis retenta (sicuti in illorum obstructionibus inde quoque dolores hoscæ quandoque nasci diximus) sed in intestinorum substantiam se inferens, atque illa amplo sæpè spatio imbuens inficiensque, vellicat, rodit vritque: sicuti in ventriculo ardores illos diuturnos, simili modo interdum euenire, atque ex macula lutea post mortem sectione factâ inuentâ nos deprehendisse, illic docuimus, & hoc idem in intestinis accidere, eadem experientiâ cognouimus. Quæ & causa est, cum hoc fit, quod hærente illic bile diutius, vel continuo de nouo affluente, dolores adeò pertinaces, diuturni, & qui licet mitigentur, mox tamen redeant, accidant: eò sæuiiores, quod bilis, quæ illa afficit, deterior existit, maximeque si adeò sit feruida & copiosa, vt & verum erysipelas in illis exciter. A quibus grauius noxis, cum intestina, quæ neruosa sunt, exquisiteque sentiunt; nimium offenduntur & sollicitantur, neruoso genere tunc compatiante, præferimq; si bilis spinæ dorsif, illic vbi intestina illi mesenterij beneficio adhærent, ad illius medullam vsque pertin-

gat, illamque simul afficiat (sicuti Fernelius se in febricitante, bilem mesenterij membrana coërcitam, & spinæ quoque immerfam deprehendisse, scribit) conuulsiones tandem & paralyfes, sicuti hoc à bile quoque, prauisque aliis humoribus in intestinis obstructis, diutius retentis, euenire posse ostendimus, producantur. Ex quibus, vti bilem causam hisce præbere colligere possumus; sic & reliqua bilis redundantis indicia ex vrinis aliisque deprompta, illud patefaciunt. Quæ & bilis, cum in loco affecto hæreat, pertinacius adhuc, quàm illa quæ ob obstructionem retinetur, nec descendat & ad podicem feratur, non iam aluum ad excretionem, sicuti cum in has sedes fertur, sollicitare potest: Vnde & in hoc casu, vt & priore ab obstructione progressu, licet à bile proueniat, aluus non vt in cæteris fluit, sed potius suppressa est.

Hæc autem bilis, à vesicula fellis interdum proueniens, vti eam ventriculi substantiam imbuere posse docuimus, sic & intestinis vicinis ad quæ naturaliter quoque defertur, se inferens, noxam hanc potest efficere. Plerumque tamen hæc ex vitioso chyllo, vel succo copiosius quàm parerat, genita, in venis meseraicis sanguini adhuc confusa, nec ab eo propter illius copiam vel obstructiones sufficienter in vesiculam repurgata, redundans, occasionem huic malo præbet: si illa vnâ cum sanguine ad intestina delata, per ramos venarum meseraicarum, intestina amplexantes, illorum substantiæ, vt dictum, infundatur, illicque subsistens, veluti erysipelas procreet. Quæ vt aliàs in venis iam dictis meseraicis cæcuerata retentaque, morbis variis febribusque intermittentibus præcipuè causam præbet (vbi & prolixius biliosi huius succi prouentus causas exposuimus) sic & ad intestina à natura protrusa, nisi per oscula venarum in spatium illorum excidens, per diarrhoeas varias, quod frequentissimum est, aut cum sanguine ad hæmorrhoidales venas depulsa, per fluxum illarum, quod rarum est, expurgetur, intestina, sicuti dictum, imbuens, quod & non infrequens, dolores hoscæ graues torius se offerentes, parit. Qui &, si bilis hæc

495

hæc in venis retenta, atque ad intestina modo dicto delata, vtrinque noceat, cum aliis morbis sæpè iunguntur, eodemq; tunc tempore iliaci dolores, morbiq; alij à bilis huius prouentu geniti, vti & febres, simul affligunt: aliquando & eiusmodi morbos, bile rectè expurgatâ, sed ad intestina propulsâ, vt & febres intermittentes, sicut in illis febribus hoc abundè demonstratum fuit, sequuntur.

In vesica, causa doloris ventris circa vesicæ regionem. Vesica, cum in infima ventris regione anteriore, quam pectinem vocant, supra os pubis lateat, eoq; corpus ipsius seu fundum, maximè cum distenta est, pertingat, dolores & molestiæ illius eâ regione quoq; percipiuntur. Ceruicis verò illius, quæ subdus sub peritonæo fertur, dolorosi affectus, cum mictione dolorosâ potius se manifestent, illic explicabuntur. Morbi autem vnde vesicæ corpus dolet, sunt illius distentio atque inflammatio.

Distentio vesicæ, causa illius distendentis doloris. Distentio vesicæ amplæ cavitatis tanta, vt doleat, ab vrina potissimùm proficiscitur, quæ retenta diutius cumulataq; adeo, vt vesicam penitus adimpleat, & supra modum distendat, dolorè & molestiam in ventris ima sede, quæ & tunc tumet, sese offerentem inducit: vrinaq; effluxu penitus impedito, mictio in totum suppressa est: de quo & cum potissimùm conquerantur, in mictionis defectu illius causas afsignauimus. A flatu vix dum hoc fieri potest, cum in vesicam is minimè feratur, nisi fortè ex vrinâ retenta diutius, si cruda sit, flatus generentur, qui vrinæ commisti, vt hæc magis repleat distendatq; faciunt: qui tamen vix separati se offerunt, cum nullus flatus inter mingendum aut alioquin erumpat, vrinaq; spumosa ab aëris externi, dum mingitur, aut agitur, permissione potius, quàm flatibus internis fiat. A calculo, cum in tantam molem excrescere nequeat, distentio hæc fieri non potest, nec prius dolorem in vesica excitat, donec in illius ceruicem feratur: sed cum tunc mictioni simul incommodet, in mictione dolorosâ quo pacto hoc fiat, describetur.

Inflamatio vesicæ, causa illius. Inflammatio vesicæ, si in corpore ipsius fiat, dolorem in pubis regione molestiæ,

vti dictum, parit, & cum vesica peritonæo intexta sit, foris quoque rubedo & tumor interdum deprehenduntur: qui tumor ob vrinæ & sæcum suppressionem, quæ accedunt, maior fit. Hæc inflammatio in abscessum interdum desinit, qui dum fit, dolor augeatur, eoq; rupto vlcus oritur, mictioque purulenta & dolorosa sequitur. Scirrhum quoque inflammatio post se relinquit: qualem immensum vesicæ vaccæ, ex casu ruptæ, rursumque curatæ adnatum vidimus. In gangrænâ, malè tractata inflammatio quoque conuertitur, vidimusq; sic affectam vesicam nigram penitus intrinsecus, nâsi piscis instar, in mortuo canonico fuisse.

In Vtero, illiusq; vasis, causa Vterini doloris. Cæterum quòd inflammatur vesica, casus aliquis externus causam præbere potest, vel summus dolor prægressus, à calculo vel vlcere, quibus affectibus inflammatio interdum iungitur, sicuti & renes ab iisdem causis inflammari diximus: adiuuante dispositione plethoricâ, aptaque ad suscipiendum.

Vterus cum similiter vti vesica, sub quâ in sæminis latet, eandem ventris inferioris sedem occupet, ipsiusque fundum, distentum præcipuè in ventrem vsque feratur, dolores illius eodem in loco se manifestant: & cum ligamenta eius, quibus suspensus hæret, ad lumbos & coxas vsque ferantur, illorum causâ dolores hi eousque quoque extenduntur, & hic simul describuntur. Ceruicis verò illius in pudendum pertingentes dolores, illic explicantur. Qui verò in fundo seu corpore illius, & adnexis illi ligamentis fiunt vterini dolores, quorum aliqui ad ceruicem vsque etiam extenduntur, vti in vesica, à distensione aut inflammatione procedunt.

Distentio Vteri fundi, causa doloris Vterini post partum. Distendens vterinus dolor, qui vteri corporis seu fundi causâ sit, ab aëre externo præcipuè oritur, qui post partum, statim postquam fœtus prodit, dum vteri internum orificium adhuc amplum & apertum est, si non bene muniantur hæc loca, vterusque sensim stringatur, in vterum irrumpēs, eumque implens, dilatatum & debilitatum alioquin ex partu, non solum distendendo, sed & refrigerando, si frigidus sit, dolorem in illo excitat, quem Post partum dolorem

uterinum vocant. Alio tempore cum vterus ante conceptum parvus sit & crassus, cavitatisq; illius quam semen in conceptu implere debuit, admodum angusta, & quando concepit, ac cum fetu increvit & adactus est, toto tempore similiter interius illius orificium exacte oclusum, vterusq; ex conceptu plenus sit, ab aere externo hoc fieri vix potest. Vt neque à flatibus intrinsecus genitis, tum dictam ob causam, tum quia si in angustam illam vteri cavitatem fererentur, aut illic generarentur, cum tamen crassus sit vterus, cum adeo distendere, vt extendatur & doleat, minimè possent. Sicuti nec serosus humor, aliùsve, si in vterum influat, ob prædictas rationes hoc queunt efficere: etsi hi, qui vterum quendam magnum eumq; amplum vesicæ instar sibi fingunt, hoc fieri posse credant. Inflationemq; vteri ab aqua & flatu factam nominant & describant, multasq; illius causas assignent. Licet enim vterus amplior in quibusdam sit mulieribus, vel naturâ vel humiditate multâ relaxatus, tamè neque tunc adeo impleri aut extendi, vt dolor inde sequatur, potest: cum, si magna illic esset repletio, vt putant, pòderis tunc sensum & molestiam potius, quam doloris præberet. Sicuti à fetu grandi, si ille vterum nimium grauet, accidit: qui aliquando pondere suo, tractis ligamentis, vterinum aliquem dolorem, qui circa inguina potius, quam lumbos, vt in generibus dictum, se maximè offert, procreat. Ita vt vterinus dolor distendens alius, præter hunc qui post partum sequitur, vix adeo illius corporis, sicuti verò illius membranarum vasorumque, quibus suspensus hæret, causâ eueniat: Cum illic collectis retentisq; prauis humoribus, dolores vterini distendentes, & ad latera vsque protensi (quo nomine illorum in hypochondriacis doloribus quoq; metio facta est), qui mensium eruptionem præcedunt, aut quando alias suppressi sunt, vel non rectè fluunt, accidunt, aut alias ob impuritatem mulierum, etiam præterita ætate menstruis deputata, sæpe illis eueniant. Quæ illuies illic à sanguine vitioso, aliisve humoribus permixtis, à natura eò ad expurgationem menstruam protrusis cumulatæque, in mulieribus ca-

theticis, aut alioquin malignis excrementis scatentibus, suam originem trahit, illicq; circa vterum sedes hæsc implendo, distendendo, irritando, præsertim quando materia efferuescit, dolores hosce vterinos procreat, sursumque vapores emittendo, alia quoque grauiora accidentia, imprimis vteri suffocationem dictam, cum ab vtero causâ procedat, quemadmodum illic quoque ostensum fuit, gignit.

Inflammatio vteri fundi, nonnunquam & ceruicis simul, dolor vterinum, in illius sede occurrentem facit, accidentibus variis, vt in generibus dictum, comitatum: Quæ & post se, similiter vt vesicæ inflammatio, abscessum, vlcus, scirrhum, gangrænam relinquere valet. Cuius etiam causa externa, vt contusio, & ictus esse potest. Vel interna, sanguinis redundantia circa vterum, si retentis menstruis non per ceruicem se expurget, sed in vteri substantiam infusus, inflammationem facit, pro sanguinis diuersitate variantem. Cui si maligna vis iungatur, Cancer

in eo, qui priuatus ab inflammatione vera affectus est; quique, cum facilius in vteri ceruice nascatur, ideo illic describetur, gignit. Imprimis verò ex partus difficultate, ob summum dolorem & conatum, vterus frequenter inflammatur, tuncque vel fetu aut secundinâ remanente, aut hinc exclusis, ob subortam inflammationem, dolor & febres virgæ: causaque hæc non minima est, quod puerperæ vel in partu, vel post eum, adeo dolent & periclitantur, cum secundinæ solius retentio, hoc tam subito minimè faceret, sicuti hæc quæ sequitur, inflammatio, illas afficit, & præcipua mortis causa existit: nisi hoc ob largam sanguinis profusionem, in partu extra vterum, vel in illum factam accidat; adeo vt dolor qui post Partum mulieribus euenit, non tantum ob æteram illapsam, vt dictum, sed & hanc inflammationem frequenter fiat: quorum ille tamen solo dolore, hic verò grauioribus accidentibus maioriq; periculo affligit.

Cratio.

Pro ratione sedis affectæ & causarum varietate, alia accommodatur intestinorum disten-

Distensio
vteri va-
fori, cau-
(a fre-
quentior
vterini
doloris.

Inflama-
tio Vteri
fundi,
causa in-
flama-
tis illius
doloris.

Cancer
vteri.

Inflam-
matio fe-
teri post
partum,
causa il-
lius dolor-
is post
partum
secundæ
speciei.

499

distentioni & irritationi, refrigerationi, & inflammationibus à sanguine vel bile factis. Alia vesicæ & vteri distentionibus & inflammationibus.

Celici & Iliaci doloris à distentione, irritatione, refrigeratione, vti & Conuulsioni curatio.

Distentio intestinorum, si per se, aut cum illorum irritatione à quibuscunque causis fiat, & dolores colicos iliacosve excitet: Vel si hi dolores à refrigeratione procedant, curationem simul, cum in multis conueniat, explicabimus. In quibus causis, si ob copiam excrementorum & flatuum, distentis intestinis atq; irritatis, tormina & murmura ventris oriantur, nisi excrementa & flatus alicubi impedita subsistant, cum vix diutius permaneant, sed per crepitum vel ructu, flatibus erumpentibus, si ab illis fiat dolor, cesset, aut in excrementorum copia, per alui excretionem, quæ sequi solet, soluatur, non alia cura, quam ea quæ in diarrhœa obseruari solet, illicque explicatur, hinc priuatim instituenda erit.

Quod si verò hæc in crassorum intestinorum anfractu, vel cellulis, vel tenuium intestinorum exitus meatu retenta, distendendo irritandoque dolorem colicum iliacumve gignant, facilius hæc obstructio in crassis intestinis soluitur, colicusque dolor sanatur: difficilius, si tenuium intestinorum meatus obstratus sit, excrementaq; quæ retinentur, praua sint, taliaque continuò gignantur cumulenturque, iliacumque illud dolorem nostro tempore adeò frequentem pariant, cum etiam referatâ nonnihil obstructione, tamen illic facile vel subitò, vel post tempus redeat, excrementaque de nouo coaceruentur, ægriq; qui hunc dolorem passi sunt, leui ex causa recidiuam patiantur, perfeueranteq; morbo conuulsiones, paralyses, quas membrorum dolor præcedere & præfigire solet, aliique graues morbi, vt dictum, sequantur, quibus superuenientibus, licet dolores tunc quandoque remittant, tamen grauiora hæc accidetia hominem vel iugulant, vel noxas graues post se relinquunt. Quod si quoque adeò pertinax sit hæc meatus occlusio, à tenacibus & duris excrementis aliisve corporib. facta, vt aperiri nequeat, excrementisque adeò tenuia & ieiuna alioquin intestina impleantur, vt illa per duo-

denum in ventriculū irrumpentia, vomant, lethalis tunc ferè iliacus sequetur dolor. Qualis & ille esse solet, cui præter oppilationes, intestinorum accedit conuolutio: vel propter prolapsum in hernia, illorum contortio, similem vomitionem mortemque plerumque accersens.

In quibus omnibus casibus, nisi quando ob herniam iliacus sit dolor, in quo casu curatio potius herniæ, vt prolapsum intestinum reponatur, quam iliaco dolori debetur, sicuti in herniis hæc explicabuntur: curandi scopus erit, excrementa emollire, abstergere, educere, vias laxare, aluum stimulare, flatusque, si qui adsunt, discutere; doloremque, si is adsit, lenire. Et si biliosi, acres, prauiq; qui retinentur cumulanturque, sint humores illis expurgandis, contemperandis, non tamen per summè frigida, acida, sed temperata medicamenta simul accommodare, doloriq; compescendo, qui tunc acrius vrget, etiam per narcotica magis quam in aliis causis intentos esse, & conuulsiones aliaque mala, sicuti suis in locis ostenditur, præcauere vel emendare oportebit. A pituita vitrea refrigerante intestina, si dolor torquens fiat, eam abstergere, incidere, refrigeratasque partes calefacere studebimus. Quæ calefactio etiam in simplici illorum intemperie, eam, nisi sponte cesset, corriget. Hæc autem omnia per iniecta, exhibita, adhibitaq; remedia diuersimodè sequentibus modis præstantur.

Per aluum infusa enemata, cum recta ad intestina perueniant, in curatione horum affectuum primas tenent: nam si in crassioribus intestinis causa contineatur, ad ea usque penetrant: sin in tenuibus, tamen propter intestinorum continuationem & vicinitatem, eousque quoque ipsorum vis extenditur. Paranturq; ex emollientibus, humiditate suâ & temperie, sæces duras, quæ per se constipado, vel quia flatu excrementaque retinent, dolorem procreant: quæ & simul aluum leniendo fluidam reddunt: ob quas causas, tum ex solis emollientibus clysmata fiunt, tum etiam emollientia reliquis quoque ferè semper permiscuntur. Item & ex stimulantibus, vi deterforiâ & acm,

aluum ad excretionem, fiunt: additis interdum & catharticis; cum summa adest constipatio, & pituita vitrea vel tenax intestinis adhæret: quæ naturam sollicitantia, clysteribus plerisque adduntur: Vti & calefacientia statusque pellentia, tum in causa frigida, tum ob flatum: tum quia intestina hisce gaudent, cæteris adduntur, vel ex illis quoque, præcipue cum causa vrget, clysmata fiunt. Adhæc anodyna, dolore vehementer urgente, vsurpantur, cæterisve permiscetur: transcundum tandem etiam ad narcotica. Quantitas autem horum clysmatum à tñ.j. ad tñ.j. s. se extendit: ab initio dum plena adhuc sunt intestina, eam minuendo, inanitis verò nonnihil augendo. Quorum exempla sic proponuntur.

Emolliens clyster paratu facilis, ex Oleo oliuarum solo, ad tñ.j. iniecto fit: in quo tertia pars Butyri dissolui potest: atque Axungia interdum, aliave addi possunt.

Alter emolliens & leuiter stimulans, additis parum calidis & flatum discutientibus, sic paratur: R. Iuris pinguis & glutinosi, quale fit ex decoctione intestinorum cum adnexo mesenterio, vel omenti, & capitis vituli, veruecis, maximè castrati, aliorumve iuniorum animalium partium pinguium & membranarum q. s. in eoque decoque seminis Carui vel baccarum Lauri vel Iuniperi p. j. dissolue in col. Butyri rec. vel Olei communis 3. iij. Mellis 3. ij. Salis communis costi vel fossilis, quod gemmæ vocant, & purius & acrius existit, parum, misce pro enemate.

Vel sic: R. Maluæ, Altheæ cum toto, Spinachia, Attriplicis & Braneæ vrs. si habetur, an. M. j. rad. Liliorum rec. 3. ij. seminis Lini, fœnogr. an. 3. j. sem. Carui 3. s. fl. Chamomil. Meliloti an. p. j. fiat decoctio in iure pingui, & in col. f. q. dissolue Butyri vel Olei communis aut Amygd. dulc. 3. iij. Axungia porci 3. j. Mellis 3. ij. Salis parum.

Stimulans amplius & nonnihil emolliens, additis calefacientibus & flatum discutientibus, hoc modo paratur: R. Maluæ, Brassicæ rubr. Mercurialis vel Betæ, Parietariæ an. M. j. Pulegij alterutrius vel Origani M. j. s. rad. Betæ rec. 3. ij. rad. Liquirit. 3. j. fl. Chamomil. Sambucian. p. j. Furfuris macri vel

crassi p. j. sem. Lini, Fœnogr. an. 3. j. sem. Carui 3. s. sem. Cimini 3. ij. Ficum n. x. fiat decoctio in aqua & Vino: in col. dissolue Mellis, Sacchari impuri vel rubri an. 3. j. succi Mercurialis vel Betæ (præsertim si non recentia fuerint in decocto posita) 3. j. s. olei Nucum 3. iij. Laricæ dissolutæ in Vitello oui 3. s. vel plus. Salis parum, fiat Clyster.

Potentius operabitur & purgabit, si huius clysmatis decoctum in iure galli antiqui fiat, illique addantur, fol. Senæ & sem. Carthami an. 3. vj. vel 3. j. rad. Polypodij 3. ij. vel loco istorum purgantium, Mechoacæ vel Bryoniæ, vel radic. Cyclaminis 3. vj. cum seminis Cimini 3. ij. Et vnà cum cæteris quæ dissoluantur, Hiera picra, Catholicon ad 3. j. vel Benedicta, Diaphœnicon, Indum maius, Elelescod ad 3. s. misceantur. Aut succus Cyclaminis, qui efficax est, ad 3. j. addatur.

Efficacius purgabit, si quæ magis adhuc intestina irritant, huius clysmatis decocto addantur: quod non tamen, nisi in summa constipatione, & cum pituita vitrea & tenax intestinis adhæret, faciendum, cum in aliis causis intestina nimirum vellicado, dolorem potius augeant. Cum igitur necessitas requirit, Agarici vel Turpethi 3. iij. addi possunt, & nonnunquam, non tamen temere, cum intestina adurendo cruentas faciat deiectiones, Colocynthidis pulpæ in panno ligatæ 3. s. vel quod tutius est, Hieræ colocynthididem recipientis 3. iij. permisceri, vt Hieræ colocynthidis, Logodij, Ruffi, Hermetis.

Abstergentes præcipue pituitam adherentem intestinis, clysteres fiunt ex Laricæ 3. ij. cum Vnello oui, Melle & Vino: vel cum oleo solo aliquo dissolui.

Vel sic, flatum quoque discutiens: R. Vrinæ pueri 3. vj. succi Parietariæ 3. iij. Sapæ 3. iij. ol. Rutæ 3. ij. Vitellos ou. n. ij. Salis parum, fiat Clyster.

Aqua thermarum sulphurearum vel nitrosarum, in qua vtilia quoque decocta sint, similiter à quibusdam ad intestina à fordibus abstergenda vsurpantur.

Ad calefaciendum, flatum pellendos, & ad dolorem sedandum, Vinum forte, ex sua natura, vel ob vetustatē, aut aliàs generosum,

Malua

Maluaticum, aut aromaticū, quale est Hippocraticum vel Claretum dictum, hisque similia, sola etiam, ad t̄b. j. plus minūse infusa, calore & narcosi suā plurimū iuuant. Quorum si nimius calor metuatur, vino minus potenti temperari possunt. Sin plus calefacere velimus, narcosimq; augere, Spiritus vini ad 3. ij. pro vna vice addatur, vel parū cum vino coquatur.

Vel sic, si simul lenire & detergere velimus: R̄. Vini generosi quartar. iij. olei Communis vel Chamom. Anethini, vel Butyri quart. j. Mellis quartar. 8. Talis clyster iniectus, quando catharticum sumptum, antequam operatur, tormina & cardialgias excitat, vt in cardialgiis dictū, statim iuuat. Sed & alia stimulantia hisce permisceri possunt.

Hydromel verum, odore maluatici æquē ac vinum prodest, magisq; abstergit, præsertim si Sapa & Saccharum illi addantur. Cuius loco Aqua mulsā, quæ subito paratur, sumi potest, sed tunc minū calefaciet, magis verò abstergit. Huic vt & vino, cætera quoque permisceri possunt.

Brodium decoctionis Allij bulborum, vel stipitū illius, cū multo Oleo infusū, vtile est.

Calefaciens præcipue, & flatus pellens clyster sic fit: R̄. rad. Liliorum, Altheæ an. 3. ij. rad. Enulæ 3. 8. herb. Betonica, Abrotani, Absynthij, Calamenti, Marrubij, Rutæ, Origani, Pulegij vtriusque, Melissæ, Erysimi ad m. iij. fl. Chamomil. Melil. Sambuci, Rosmarini, Lauandulæ vel Stœchados an. p. ij. seminum Fœniculi, Carui, Cimini an. 3. ij. seminis Lini, Fœnog. an. 3. j. fiat decoctio in Aqua & Vino, dissolue in col. f. q. Mellis anth. 3. ij. ol. Cōmunis vel Nucū antiqui, Liliorū an. 3. j. 8. Hieræ picræ simpl. vel de 15. rebus, el. de bacis Lauri an. 3. iij. Salis q. f. fiat Clyster.

Plus calefaciet, in pituita vitrea conueniens, si huic decocto addas, rad. Pyrethri, Acori veri vel Ireos an. 3. vj. fl. Centaurij p. j. seminis. Nigellæ 3. ij. Et dissoluas cum cæteris Mellis anacard. vel scyllitici ad 3. j. Vini maluatici 3. ij. Castorei (quod acceptissimum est intestinis) 3. j. vel Euphorbij 3. 8. aut alia gūmi, vt Galbanum, Oppopanax. Sed Moschū, Ambram, & Ciuetam, vt aliqui faciunt, addere propter pretium, quia merdæ foetorem

hisce mutare non possumus, superfluum & nimis curiosum esse videtur.

Flatus discutiens præcipue enema: R̄. herb. Origani, Rutæ an. m. j. Rosmarini summit. cum florum Lauandulæ vel Stœchados, an. p. j. fl. Chamomil. p. ij. baccarum Lauri & Iuniperi an. 3. j. sem. Carui, Cimini an. 3. 8. semin. Fœniculi 3. ij. seminum Ameos, Petrof. Seseleos, vel Dauci, Rutæ an. 3. j. fiat decoctio in Aqua & Vino, & in col. q. f. dissolue el. de Baccis lauri 3. iij. Hieræ picræ 3. ij. Mellis anthos. 3. j. olei Anethini, Nucum ana 3. j. 8. fiat Clyster: Detur cum sale, vel sine eo.

Oleum rutaceum ad t̄b. j. solum infunditur, cui Vini maluatici 3. ij. appositæ, efficacius illud reddunt.

Anodynus clyster, qui & emollit: R̄. rad. Altheæ, Liliorum rec. an. 3. ij. herb. Maluæ, Betonica ana m. j. florum Chamom. Melilori ana p. j. femin. Lini, Fœnogr. an. 3. j. medullæ Panis 4. j. seminis Carui 3. 8. seminis Anethi 3. ij. femin. Anisi 3. j. fiat decoctio in Iure intestinorum vel Lacte, & in col. f. q. dissolue, Butyri rec. 3. ij. ol. Amygd. dulc. vel Nucum recentis, ol. Anethini ana 3. j. 8. axungia Anseris 3. j. Vitellos ouorum num. ij. fiat Clyster. Detur cū Sale, vel sine eo, si diutius eum retineri volumus. Stercus lupi ad 3. vj. clysteribus additum, valde iuuare aliqui docent.

Oleum oliuarum vel Nucum iugladium, Auellandarum, Amygdalarum, Lini, Sefaminum, recentia: vel Chamomelinum aut Anethinum, sola, inuicē mve permista, bonā quantitate iniecta, anodyna sunt. Si muçago seminis Lini & Fœnogr. addantur ad 3. ij. Vitelli & Albumina ouorum duo, & Croci 3. 8. magis dolorem leniet.

Cū lenire & abstergere simul volumus, Mel, Saccharum, Sapa ad 3. ij. vel iij. oleis adduntur.

Vel sic: R̄. olei Chamomel. vel Anethini, succi Pisanæ t̄b. 8. Sacchari vel Mellis, vel Sapæ 3. ij. misce.

Narcotica, vt succum amarus dolore afflicti, minori adhuc quā si per os exhibeantur periculo, clysteribus adduntur. Si pro ratione causæ parato enemati, vel anodyno præcipue, quod ob dolorem inijcitur, adhuc incoquantur fol. Hyosciami vel Mandrago-

re: vel si Philonij Rom. vel Requei Gal. 3. ij. vel alia antidota, vt Theriaca, Mithrid. an. 3. 8. permisceantur. Et quemadmodum per os dantur narcotica cathartica permista, sic & cum Benedicta alijsve electuariis purgantibus Philonium mistum infunditur.

Efficacissimè operabitur, si Opij gr. vj. in Vino maluatico vel Aqua vitæ dissoluta, clysteribus addantur.

Vel ad ʒ. j. Olei rutacei vel Anethini, Opij ʒ. 8. Castorei 3. 8. dissoluta injiciantur.

Suppositoria, tum ad stimulandum, tum alterandum, tum dolorē sedandum induntur potissimum. Licet & ad flatu pellen- dos, quod tamen vix efficere possunt, quo- que supponantur.

Ad aluum ciendam, cum illa constipata est, & clysmata fastidiunt, vel iniecta reji- ciunt, purgantiaque non ferunt, commu- nia ex Melle & Sale induntur: Vel illis etiam acriora, addito pulu. Hieræ, Sterco- re muris, Colocynthide: qualia pāsīm de- scribuntur.

Si Spolium serpentis in vase æneo frica- tum, vratur, puluisque in anum trudatur, plurimum in colico iuuare docent.

Dolorem sedat, sicum Opio in succo La- tucæ dissoluto, anus intrinsecus vngatur. Vel si Opij ʒ. j. Castorei 3. 8. cum olei Anethi- ni 3. j. mista, lanaque excepta in podicem in- trudentur. Vel si alio pacto Opium supposi- toriis permisceatur.

Purgantia adhibita ad causam amouendā aluumque aperiendam, præfertim quando clysmata respuunt, causāq; altius latet, locū habent: cauendo tamen a violentis, quæ ni- mirum irritando intestinorum dolorem in- geminant, imprimis antequam clyster sub- jiciatur, si prius per horas aliquot antea leue purgans sumpserint, clyster eò felicius ope- ratur, & ab alto materia rectius euocatur: sic- uti frequenter in nostris colicis facere soleo.

Vina præcipuè purgatiua in intestinorum morbis vtilissima sunt: quibus aluum laxa- mus, excrementa educimus, & quando de- nud constipatur, vt in colico dolore fieri so- let, eam rursum soluimus: quibus si clysmata respuant, nihil vtilius ad aluum apertam, quod summè hic requiritur, seruandam: &

cum excrementa rectius & ex magis abdi- tis locis hæc assumpta vina, quam iniecta clysmata educant, his quoque aliquando in colicis doloribus sanandis illa præferimus: atque hisce vinis purgantibus, quæ vini causā purgantium noxam admodum corri- gunt, & ne ventriculo & intestinis noceant cauent, potius quàm aliis purgantibus vti- mur. Horum autem exempla quædam in cordis dolore, ab hisce causis, proposuimus.

Imprimis verò hoc in intestinorum do- loribus conueniens est: ʒ. rad. Grami- nis, Fœniculi ana 3. vj. rad. Acori veri, Enu- læ, Imperatoriæ ana 3. 8. cortic. Citri sicci, & herb. siccarum Absynthij ana 3. iij. Maiora- næ, Calamentæ, Pulegij, Chamæpytheos: florum Rosmarini, Ros. rubr. Chamomil. a- na 3. ij. seminum Fœniculi 3. iij. seminum Carui, Apij veri ana 3. ij. baccar. Lauri 3. iij. fol. Senæ 3. ij. Agarici trochisc. 3. 8. Turpe- thi 3. ij. (quæ tria vino macerata, vim quā ventrem conturbant, amittunt) conuas- sentur & incidantur, addendo Vini ʒ. qua- tuor vel plus, & post macerationē aliquam vel leuem decoctionem in duplici vase: Bi- bat cum constipatio adest, haustum ynum.

Si à bilioso acrive succo proueniat, tale vinum competit: ʒ. rad. Cichoreæ 3. j. Ab- synthij 3. 8. flor. Viol. Bugloss. ana p. j. sem. Ani- si & Violarum ana 3. ij. rad. Polypod. 3. j. 8. fol. Senæ 3. j. Rhabarb. 3. ij. Spicæ 3. 8. infun- dantur in mensura Vini: Utatur vt dictum de priore.

Decoctum vel syrupus ex materia ex qua Vinum purgans fit, parari poterit: vel alia si- milia pāsīm descripta vsurpari.

Galli veteris decocti in aqua cum Bras- sica, ius bibitum, aluum mouet: cui propter flatu tantillum sem. Carui vel Fœniculi ad- di potest.

Vel sic: ʒ. Gallum antiquum, agitatam prius & cæsum, antequam iugulatur, dein euisceratum & infarctum sequentibus, prius incisis & confractis, Mentâ, Maioranâ, Thy- mo, Satureiâ, ad M. ij. fl. Chamomil. Rosma- rini ad p. j. feminibus Anisi, Fœniculi, Carui, ad 3. 8. rad. Galangæ, vel Acori veri 3. iij. Po- lypodij, Cnici, Senæ mundat. an. 3. j. Tartari vini albi 3. 8. Salis geminæ vel Cômunis q. s. deco-

coquantur in aqua, eâ arte, vt in asthma-
tismo, ad consumptionem medietatis: co-
leat. De iure bibatur poculum.

Laricea vel Terebinthina ad 3. s. & plus,
eo pacto vt in nephritico dolore dictum, ex-
hibita, additis quandoq; purgâtib; vt hie-
râ, benedictâ, cæterisve, hîc quoque iuuat.

Cassiae pulpa, in sæcum duritie datur, ad-
dendo ne inflet, semen Anisi vel Fœniculi
aut Carui, aliôve modo exhibita.

Electuaria purgantia interdum dantur, in
cardialgiis descripta: vt Catholicon, Diaphē-
nicon, Indû maius, Elefcof. Hiera picra, vel
de Octo, vel de Quindecim rebus, Benedicta
laxat. & similia, cum decocto aliquo conue-
nienti seminum calidorum & plantarum,
vel cum Vinò generoso aut aromatico, aliô-
ve modo.

Pilulæ propter aloën, quæ hîc conuenit,
probantur, leuiore: vt de Hiera picra, de o-
cto rebus, de Aromatibus, addendo 3. s. Ca-
storei. Vel fortiores, si summa adsit constipa-
tio: cauendo à colocynthideis & quæ agari-
cum recipiunt aut turpethum, cum hæc in
substantia data, intestina vellicent.

Tartari puluis à 3. ij. ad 3. j. cum liquore
exhibitus, egregiè abstergendo pituitam, o-
peratur.

Pulueres purgantes, qualis est ille qui in
nephritide descriptus est, alibi que, vti & in
aliis formis prædictis multa purgantia, aliis
in locis descripta, hîc quoque locum habere
possunt.

Emplastrum ex cocco gnidio ex cortica-
to, confuso cum Cera misto factum, ventri
impositum, aluum soluit.

Præparatio humorum, cum malum hoc
præcauere volumus, præcipuè locum habet,
vt post eam prægressam, purgêtur phlegma-
ta & cruditates: dein & cum malum vrget,
& purgatio requiritur, interdum quoq; præ-
paratio quædam præmittitur.

Danda ea quæ pituitam incidût, maximè
si tenax & frigida sit: qualis vitrea esse solet:
Vti in cardialgiis ab hisce causis excitatis,
feri diximus, per syrupos, aquas decocta.

Vomitum ad colici doloris præcautionem
interdum conducit, in consuetis, cum ex-
crementa congeri incipiunt, factus: Et in

principio huius doloris inuasionis promo-
tus, reuellendo ab intestinis prodest: vti &
in ileo. si bilem vomant, vomitus minimè
compendendus.

Qui actu potentiaq; eum prouocantibus,
mouetur. Oleum Risinum præsertim po-
tum id facit, doloremque simul compescit.

Inter ea quæ propinantur, Victus pri-
mum sit parcus seu tenuis & simplex, non
solum dum hoc malo affliguntur ægri: sed &
in præcautione præcipuè horum affectuum,
qui intestina obsident, cum ad ea cibibus per-
ueniat, diligens ratio obseruanda, ne in eo
peccetur, cum sic facile reciduum patian-
tur. Cauendum à cibis crudis, flatulentis,
duris, stipticis. Et quando laborant, cauenda
præsertim est frigida, condiendi cibi simpli-
cibus & aromatibus, calidis, incidentibus,
discutientibus. Bibendumque Vinum ge-
nerosum, & abstinendum ab aqua: vel si vi-
num aliis de causis non concedatur, aqua
cocta aromatizata Cinamomo. Pipere, aliis-
ve vsurpanda: sicuti hæc prolixè in cardial-
gia à causa frigida & flatibus, ac ventriculi
imbecillitate ostensum fuit. Quæ tamen ca-
lida, si biliosa sint excrementa prauaque, mi-
nus conueniunt, cum ea quæ bilem gignût,
prauosq; humores, vitanda tunc sint: & cum
vinum immoderatè sumptum neruis no-
ceat, illud imprimis, cum conuulsionis est
metus, moderandum, vel etiam vitandum,
illiusque loco alius potus conueniens vsur-
pandus. Nec dum etiam acida, etsi bilis acri-
moniam contemperent, cum tormina exci-
tent, hîc conceduntur. Vtuntur quoque si
dura adsint excrementa, cibis liquidis, mol-
libus, & nonnihil pinguibus, Butyro insu-
per & Oleo, recentibus, similibusque.

Panis furfuraceus, leuiter & sensim do-
nec emolliatur coctus, reiectâ aquâ sum-
ptus, & cum Lardo porcino & Butyro in
pulverem redactus, comestus, cum conuulsi-
us timetur, eum præcauere dicitur.

Alauda cristata, tosta vel elixa, cum iure
galli comesta, utilis.

Probatur & Ius galli antiqui: & Ius co-
chlearum terrestrium, potum.

Decocta vel infusiones probantur: radi-
cum Acori veri, Graminis (Dioscorid.) her-
barum.

barum Sampfuci, Calamentæ, Rutæ, florum vel summitatum Anthemidis, Anethi, Meliloti & Ericæ: in aqua vel Brodio galli vel caponis, addito interdum Vino & Saccharo vel Melle ad gratiam. Abrotani decoctum aliqui extollunt. Parietariæ alij decoctum in Vino, addito Saccharo, magni faciunt. Absynthites vinum bibitum probatur, præsertim si semē Cumini vnā maceratum aut decoctum fuerit: Raphani item corticum in Vino infusio, addito saccharo: Seminum etiā flatus discutientium. Aromatum præterea, vt Acori veri, Galangæ, Nucis mosch. Gariophyll. in Vino infusio, vel levis ebullitio, addito interdum Croci exiguo & Saccharo: Vel si alia Vina medicata aromatica dentur: De quibus in Ventriculi imbecillitate egimus.

Peucedani succus vel liquor cum Ovo bibitus, probatur.

Sanguinem anguillæ sumptum in hoc casu, laudant.

Aqua in qua Virga cerui abluta fuerit, p-pinata, commendatur.

Aquæ stillatiuæ conueniunt, simplices vel cōmixtæ ad 3. quat. bibitæ, addito ad gratiam, si velint, Saccharo, Veluti herbæ Trinitatis, Linguae canis, flor. Sambuci & Genistæ, Chamomillæ, cort. Fabarum, Lappularum viridium inuentarum in frumentis. Aqua item elicitæ ex stercore vaccæ, valde probatur: vt & Cinamomeæ aquæ cochlearum vnum aut alterum, prout efficax fuerit, sumpta.

Ex diuersis compositæ quoq; fiunt: hæcque imprimis utilis: R. Zingib. ʒ. ʒ. Cinamom. Gariophyll. Nucis mosch. Zedoariæ, Galangæ ana ʒ. ij. Mastichæ ʒ. ʒ. conuassata, infundantur in Vino generoso, destillantur: Dentur cochlearia ij. vel iij. In flatuū copia addatur Menta ad ʒ. ij. semen Fœniculi, Anisi ana ʒ. ʒ.

Aquæ vitæ compositæ, in cardialgiis explicatæ, in frigida causa, hic quoque locum habent.

Olea leniendo, lubricando & fæces emolliendo, plurimum iuuant: vt Oliuarum oleum recens, vel si assennatum aliquādiu fuerit, bene lotum nec rancidum: bibitum affa-

tim ad ʒ. vj. & ampliùs, valde dolorem com-pescit: vti & oleum Amygdalarum dulcium vel Nucum aut seminis Lini, recentia, bonâ quantitate sumpta, per se, vel cum iusculo: quibus oleis, Saccharum, & Vini Maluatici tertia pars misceri poterit: nonnunquam & Aquæ vitæ ʒ. ij. aliæve aquæ stillatiuæ.

Excellens remedium: R. ol. Amygdalar. dulc. vel alterius, in pauperibus, ʒ. iij. Vini generosi vel maluatici ʒ. j. ʒ. syr. de Papaue-re, si efficax sit, ʒ. ʒ. misce: Bibat.

Amygdalarum amararum & Persicorum nucleorum olea, non solum in nephritico, sed & colico iliacoq; dolore bibita, probantur: Laurinum oleum bibitum, similiter commendatur. Quibus omnibus interdum olea ab aromatibus elicitæ, guttatim permisceri possunt.

Laricæ vel Terebinthinæ olea: vti & Vitreoli, aliqui cæteris permista, extollunt.

Pulueres varij in cardialgiis à causa frigida, flatibus & imbecillitate ventriculi expositi, in similibus hisce intestinorū affectibus quoque locum habere possunt.

Imprimis verò ad intestinorum dolores & inflationes, Dioscorides cæteri q; sequentium simplicium pulueres ad ʒ. j. per se vel dissolutos in vino, iure, aquis, aut aliis formis permistos exhibent: veluti rad. Acori veri, Iridis, Imperatoriæ, Vincetoxici, Scyllæ, Distamni albi, Aristolochiæ, Eryngij, Pæoniæ, Asclepiadis, Mei, Libanotidis & Panacis: herbarum Mentastri, Mentiæ, Serpilli, Chamepytheos, Trinitatis, Chamædaphnes, Halimi, Phalagij, Centumculi, Pseudobunii, Conizæ, Rosmarini, Pulegij, Lauri tenellorum foliorum, item florum Verbasci: seminum Ammi, Petroselinii, Carui, Cimini, Dauci, Anisi, Fœniculi, Seseleos Mafsil. Ligustici, Ferulæ, Ocimi, Symbrij, Brasicæ Momordicæ: nucleorum Amygd. Persicorum: granorum Lauri, Iuniperi: aromatum item ferè omnium, & Croci.

Præter quæ etiam alia vsu comprobata sunt, Arantiorum cortex, Hederæ nigræ semen: & Rosarum semina ex fructu maturo sumpta: Sagapenum item bibitum: Cera in forbitionibus exhibita, secundum Dioscorid. & postea quoque expertum. Succinum

num item, & lapis Gagates, propinata.

Et ab animantibus petita, siccataq; & pulverizata: Ventriculi erinacei vel etiam Gallinæ, aut Galli in viris, vt speciem addant, tunica interioris: Intestinum lupi: virga Cerui: Testiculus equi castrati: Cornua ceruorum tenera adhuc, cum primum erumpunt, in talleolos secta & siccata: Talus suillus crematus: Stercoris item gallinæ pars albidior: Item Stercus canis, quod album Græcum vocant, vel Lupinum: quibus odoris gratiâ Cinamomum, radices Angelicæ, similiaque addi possunt.

Compositi pulueres, præter illos, qui, vti dictum, in cardialgiis explicati sunt, priuatim hisce doloribus accommodantur, ex præcedentibus inuicem permixtis fiunt, vel additis aliis, & præsertim tâtillo Piperis & Cumino: quibus interdum & Myrrham addunt.

Radicum prædictarum herbarumq; conferuæ & condituræ, cum Melle vel Saccharo factæ, quoque dantur.

Raphani cortex seu exterior pars crassa absecta, valde probatur, condita cum melle, additis aromatibus quibusdam, vel siccata, pulverisata, & cum fol. Mor. Celsi & ossibus Mespilorum exhibita.

Electuarium de baccis Lauri, ad flatulentos præsertim eiusmodi dolores vsitatum, ad 3.ij. propinatur: Paraturque ex ruta, mentastro, origano, baccis lauri: seminibus ammi, cimini, ligustici, carui, dauci, amygdalis amar. pipere nigro & longo, castoreo, sagapeno, oppopanax & melle.

Cuius loco, cum admodum ingratum & foetidum propter rutæ & castorei nimiam copiam sit, tale fieri poterit: R. bacc. Lauri 3. j. fol. Mentæ, Maioranæ, sum. n. Rosmarini an. 3. ij. Rutæ, Origani an. 3. j. 3. semin. Fœniculi, Carui, Ammi, Ligustici an. 3. j. seminis Cimini 3. 3. Piperis, Zingib. an. 3. j. Sagapeni dissoluti in Maluatico 3. j. Castorei 3. 3. Mellis vel Sacchari dissoluti in Vino maluatico, & cocti in formam syrupi lb. j. fiat electuarium.

Diaciminum, Dianisum, Diagalanga, Diacalamentum, Diatrion piper. cæteraque in cardialgia explicata, in forma electuarij tabularum, hic quoque proderunt.

Narcotica in eiusmodi grauib; intestinorum doloribus, cum subito leuamen adferant, præcipue locum habent, ob eamque causam, cum hi vehementer ægrum excruciant, aliaque non iuuant, nullo pacto sunt negligenda: nec semel tantum exhibenda, sed & cum dolor redit, repetenda. Cum si dextrè illis vtamur, minimè lædant, sed dolores compescendo, somnumque inducendo, viresque sic conseruando, magnum ægro solatium vtilitatemque, medico verò ob id existimationem summam adferant: ad hæc sudores mouendo (sicuti hoc illa facere alibi ostendimus) de causa morbifica multum sæpe detrahunt.

Antidota venenis alioquin destinata, quia opium recipiunt, vnde opiata dicuntur, id præstant, dupliciq; nomine iuuant, si prauus venenatusq; humor subsit: vt Theriaca, Mithridatum, Tryphera magna, similiaque: in quibus vis opij se magis exerit, meliusque dolorem sedant, si bona quantitate ad 3. ij. vel amplius exhibeantur: vel si recenter parata dentur: vel addito grano j. vel 3. opij ad dosim vnam, efficaciora fiant.

Imprimis verò antidotus Philonis Medici Tarsensis, à Galeno descripta, ad eiusmodi dolores sedandos composita est, ex opio, semine hyosciami, adiectis calidis multis, atque correctiuis, vt putant, opij, vt castoreo (cuius loco euphorbium Gal. ponit) moscho, pipere, pyrethro, spica, croco, melle inuicem exceptis. Cui compositioni, omisso moscho, multa alia calefacientia flatusq; discutientia aliqui addunt: veluti cassiam, cinamomum, zedoariam, costum, doronicum, semina apij, fœniculi, dauci, olusatris, Philoniumq; maius seu Romanum vocant. Arabes, veluti Hamech & Rhazis, alia calefacientia flatusque discutientia, vt rutam, mentastrum, baccas lauri, semin. ameos, nigellæ, cumini adjiciunt, & mandragoram narcoticam insuper addunt: Vt murq; Philonis antidoto, cum dolor potissimum est sedandus, Philonio verò Romano vel Rhazis, quando maiori calore, flatuumque dissipatione opus est: à 3. ij. ad 3. j. hæc propinando, prout efficacia ipsorum prius explorata nobis cognita erit. Requies dicta anti-

dorus, dolori sedando propriè quoque dicata est. Citiusque operantur hæc aliæ antidota, si cum Vino, quod narcosin in se quoque habere, alibi demonstrauimus, propinentur, aut illis prius sumptis, vinum superbibatur. Quibus etiam quandoque alia electuaria cordialia, stomachica pulueresve, aut conseruas permiscemus.

Ad horum similitudinem multa alia ex opio-narcotica electuaria, vel trochisci vel pilulæ, si ingrata, vt castoreum, recipiant, parari possunt: sicuti multa eiusmodi passim describuntur, & chymici sua Laudana dicta componunt, ac præ cæteris extollunt. In quibus de nouo parandis, cum opium, si noxam adfert, non frigiditate summâ, quæ illi sine ratione attribuitur, sed proprietate aliâ abdita, si quantitate maiori detur, cerebrum nervosque nimium stupefaciendo lædat, potius studendum, vel ex opij diligenti & exquisitâ cum cæteris, quæ adjiunguntur, permutatione, compositio talis fiat, per quam opiû æqualiter diffusum, omnes illius portiones viribus æquales efficiantur, ne vna dosis alterâ magis sit efficax, sicque error committatur: & vt massa inde parata, antequam certum illi pondus assignetur, prius minori quantitate exhibita, quid & quantum possit, exploretur. In quo magis laborandum, quam vt adiectis multis calidis, nisi hoc aliis de causis, vt ventriculi corroboracionis aut frigiditatis vel flatuum gratiâ fiat, frigiditatem illius retundere (quæ si stuporis causa esset, vis narcotica hoc pacto impediretur) velimus. Vnde & si illis omisissis, opio tantum ea quæ odorem tetrum, & saporem amarum illius emendant, addantur, ex illisque compositiones formentur, decentique quantitate dentur, innoxie cum magno successu, vt toties expertus sum, usurpantur. Quæ, quomodo variis modis fieri possint, exemplis quibusdam demonstrabo.

Pilulæ narcoticæ loco Philonij: R. Opij ʒ. j. seminis Hyosciami albi ʒ. ij. Piperis ʒ. ij. Castorei ʒ. ʒ. Croci ʒ. j. dissoluatur opium in vino maluatico, & fiat massa: excicetur, rursusque puluerisata, syrupo Papauerino redigatur in massam. De qua in forma pilularum detur ʒ. ʒ. experiundo primum quid o-

peretur, & secundum illud augenda minuendaue dosis.

Electuarium opiatum, additis stomachicis & cordialibus: R. spec. Diambrae vel Diamoschi, vel Aromatici moschati ʒ. ij. Cinamom. ʒ. j. ʒ. Santali rub. ʒ. ʒ. Sacchari ʒ. quatuor, Opij dissoluti in vino maluatico ʒ. ij. olei Gariophylli. vel Cinamomi guttas aliquot, misceantur diligentissime, additoque syrupo Cydoniorum vel conseruat. Citri q. s. fiat electuarium. Incipiat experiri exhibitione ʒ. ʒ.

Trochisci vel tabulæ ex eadem electuarij materia parari possunt, si addito gummi Tragachanti in vino maluatico, cum illa mucilagine Saccharum cæteraque excepta in formam illam redigantur, eaque in eadem dosi dentur.

Vel sic gratæ admodum tabulæ: R. Opij ʒ. ij. infundantur in vini maluatici vel aquæ aut liquore Vini ʒ. ij. & postquam dissolutum saepeque agitatum fuerit, rursusque subsederit, liquor clarus à scæcibus effundatur: & philtretur. Cui adde Sacchari ʒ. ij. Cinamom. ʒ. ij. Moschi ʒ. ʒ. infus. gûmi Tragach. factæ in aqua Ros. q. s. misceantur instar pastæ, siccetur eousque, donec in tabulas formari queat. Datur experiundi gratiâ ʒ. ʒ. Cui compositioni & alia tum ad gratiam, tum odoris & coloris quoque causâ addi possunt.

Multa alia narcotica in aliis doloribus explicata, hic quoque locum habere possunt. Vt & syrupus de Papauere. Hic tamen quæ doloribus intestinorum magis accommodata sunt, proponuntur: ad quorum formam multa alia fingi possunt.

Purgantibus electuariis vel etiam potionibus, vt & pilulis ex Hiera aliisque, narcotica electuaria, opiûmve permista, vt in nephritico & cordis quoque dolore dictum, sæpe exhibentur, vt aliud laxetur, & dolor interim compefcat: cum vnum alterius operationem, sicuti experientia ostendit, minime impediatur: sicuti nec theriaca, etsi Gal. hoc asserat, catarticonum vim retundat. Ob quâ & causam, & Rhazis Philonio suo diacridium, cum simul illud purgare & dolorem lenire vult, permiscet.

Inter ea quæ extrinsecus adhibentur, Aqua marinâ ventrem fouere iubet Dioscor. Cuius loco & alia falsa putealis & artificialis fumi potest.

Aqua Vitæ in panno excepta, aut aliter, ventris loco dolenti applicata, prædest.

Oleum item Chamomelinum, Anethinum, Nardinum, vel similia eodem modo cum philtro, in illis madefacto, admota.

Vel infessio facta ex solo Oleo: vel Oleo & Lacte.

Vel sic: R. Olei cõmunis vel alterius calidi, & Butyri ad lb. s. Lariceæ vel Terebinthinæ dissolutæ in duobus Vitellis ouorum 3. ij. Croci 3. j. misce: & cum stuppis aut panno, ventri appone.

Decocta pro fotu, infessione, & balneo, ex anodynis, calidis flatus discutiētibus fiunt: qualia etiam in nephritico dolore aliqua explicata sunt. Præcipuè verò hîc fiunt ex decocto Maluæ, Althææ, Pulegij, Origani, Calamenti, Mentæ, Absynthij, Abrotani, Rutæ, Saluæ, Lauri fol. summitatum & florum Chamom. Meliloti, Anethi, Sâbuci, Rosmarini, Stœchados vtriusque, Lauandulæ: feminum Lini, Fœnogr. Carui, Cimini, Fœniculi, baccarum Lauri, Iuniperi: sumendo plura pauciorave. Quibus & rad. Ireos, cort. Citri, Artemisia: seminaq; alia calida, vt Rutæ, Nigellæ, Seseleos, Apij veri, adduntur. Et cum decoctum pro fotu paramus, Gariophylos, Schoenanthum, Spicâ nardi vel Celticam: atque interdum Sulphur viuum, Salnitrum permiscemus. Decoquendo omnia in Aqua, aliquando & Vino, vel vtrisque: nonnunquam & ad penetrationem addito Aceto: vel doloris causâ Oleo; vel in Hydæleo aut aqua Thermarum, si ad manum sit.

Inunctiones ex oleis anodynis calidis quoque fiunt, vt Oliuarum, Nucum, antiquis: Amygdalino, Laurino, Chamomel. Anethino, Rutaceo, Nardino, Liliorum, Cheirino, Enulato. Item oleo Lilij cõuallij, quod peculiariter ad puerorum tormina paratur. Quibus interdum calidiora permiscunt olea, de Castoreo, Euphorbio, Piperibus, Petroleum, Spicæ.

Axungia Muris mōtani inuncta, in hisce doloribus singularis habetur.

Vnguenta ex hisce oleis aliisque additis, sequenti modo parantur: R. olei Chamomel. Rutacei an. 3. j. ol. Spicæ 3. s. Galbani dissoluti in Aqua vitæ 3. vj. fiat Vnguentum.

Vel sic: R. ol. Chamomel. Anethini an. 3. j. s. ol. Nardini, Rutacei an. 3. j. ol. Spicæ 3. s. Vini maluat. vel succi Mentæ 3. ij. coquantur ad consumpt. vini, addendo Galbani, Serapini, dissoluti in Aqua vitæ an. 3. ij. axungie Gallinæ, Butyri an. 3. j. permisce pul. Galangæ 3. ij. Gariophyll. Nucis mosc. an. 3. j. Spicæ, feminis Nigellæ an. 3. s. Cera q. l. fiat vnguentum. Possunt & alia aromata, semina carminatiua, herbæ efficaces vel flores, & resinæ, vt Laricea, Mastiche addi: Vel horum loco species ventriculo accommodatæ, vt Diagalangæ similēsve permisceri.

Pretiosæ inunctiones ex oleo Nucis moschat. vel Maceris per expressionem factis, fiunt: addendo etiam guttas aliorum oleorum ex aromatibus conuenientibus, vt Gariophyllis similibusque exstillatorum. Quæ & olea aliis oleis supradictis dissoluta, vsurpari possunt.

Vel in magnatibus Ciuetæ, Moschum, Ambra, Algalea Holl. in oleo de Been vel Amygdalino dissoluta, inungi.

Vsitata vnguenta Dialecthæ, Agrippæ, cæteraque in cardialgia descripta, hic quoque locum habebunt.

Omentum Hœdi vel Agni, vel Vituli vel Castrati, calefactum, vel supra craticulâ, donec pinguedo dissolui incipiat, parum tostum, & ventri appositum, valde prodest, in infantibus quoque conueniens remedium: efficaciusque operatur, si oleo conuenienti, vt Rutaceo vel alio parum frigatur: vel puluere Gumini, Gariophyll. alioue prius conspergatur.

Fomentum ventri applicatum, a quibusdam commendatur.

Stercus Capræ vel Bubulum, affuso Vino generoso, parum coctum, addito puui. Cimini, bacc. Lauri & paucis Melle, & applicatum.

Sapo cum aqua Butyri vel Olei alicuius portione dissolutus, addendo parum Salis, emplastrique modo admotus.

Emplastrum vsitatum est de baccis Lauri.

ex thure, mastiche, myrrha, lauri baccis, cypero, costo, melle paratum.

Farina Tritici, Hordei, Orobi, Lini & Foenogræci subacta cum Axungis, Butyro & Oleo conuenienti, addito nonnunquam & Melle, emplastrata.

Parietaria, Chelidonium maius, Menta, Ruta, contusa, addito Melle & Vino generoso, admota: Vel cocta & Oleis & Farinis in formam cataplasmatidis redacta: cui & Cuminum cæteraque addi possunt.

Hyosciami vel Nicotianæ succus, farina supradicta aliqua exceptus: vel herba ipsa contusa, vel frixa parum, admota.

Nuces cum putamine perustæ, puluerizatae, & supradictis exceptæ, adhibita.

Sacculi calidi appositi iuuant, sicci, vel irrorati parum Vino aut Aqua vitæ. Paranturque communiter ex Milio parum tosto, Furfure, Salisque tertiâ parte: cui sem. Carui, flor. Chamomil. fol. Lauri vel baccæ, aliaque addi possunt: sicuti in cardialgiis exposti sunt.

Venæ sectio, si ex intenso dolore meruit inflammatio, locum habet, in plethoricis maximè: alioquin in hac causa, præsertim cum è venis meseraicis vix aliquid per hanc reuellatur, minimè proderit.

Cucurbita magna cum flammâ luculentâ, ventris medio affixa, vmbilicum totum includens, si à flatibus dolor exciteretur, eos discutiendò, valde conuenit: maximè si in vino decoctõe aliquo conuenienti calido posita, prius calefacta, vel Allij succo intrinsecus peruncta fuerit.

Sed & in aliis causis, paulò sub loco dolente adhibita, iuuat.

Syringæ, per quam clysmata injiciuntur, canalis, si podici indatur, attractoque pistillo aër hauriatur, hoc pacto flatu quoque attrahitur eliciturque. Quò medio & clysmata reuocata diutius, denuò retracta, ad excretionem promouentur.

Amuleta, quibus proprietates aliquas attribuunt, sunt, Cingulum nudo ventri circumdatum, factum ex Intestino lupi, vel ex Pelle lupi, sic cinctum, vt pili ventrem tangerant; Vel ex chordâ Vmbilicali, ad hosce usus siccatâ & asseruatâ.

Pellis item lupi catuli adhibita.

Fimus lupinus vètri adalligat⁹, magni fit.

Collo item appensa Auellana, ita vt ventrem attingat, Argento viuo plena: cui amuleto & ad præcautionem magnas attribuunt vires.

Vel Stercus lupi sic auellanae inclusum & appensum; quod efficacius operari putant, si chorda, cui appensa est auellana, ex Corio ceruino fiat, vel ex Filo ex lana ouis factò, texta sit, quam ouem à lupo prius raptam aut interfectam esse debuissè, nimis superstitionis credunt: Vt alia multa talia quæ scribunt, nosque studio omittimus.

Si ab inflammatione vel feruore aut erysipelate intestinorum ileus aut colicus dolor fiant: Sitque in tenuibus intestinis à sanguine facta inflammatio, tanta præsertim vt stercora euomant, lethalis plerumque in senibus est ileus ille miserandus dolor. Nec in crassis facta caret periculo, præsertim si tanta sit, vt vrinam supprimat.

A bile verò in substantiam intestinorum infusa, si ferueant, aut erysipelate tenuia intestina afficiantur, ileus qui inde prodit dolor, periculosus quoque existit, & conuulsiones, nisi maturè caueatur, plerumque inducens, magis adhuc & citius, quàm cum bilis in intestinorum obstructorum ductu solum retenta coercetur; sicuti ab hac causa hoc idem reuenire iam ostendimus, illiusq; curationem cum reliquis causis simul exposuimus. In hisce verò causis cum sanguis vel bilis in intestinorum substantiam fertur, sic procedendum.

Venæ sectio in inflammatione non inutiliter administratur, præsertim si febris ad sit, in brachio: vel si inflammatio circa inferiora sit, & vrina supprimatur, in pede facta. Et in erysipelate exigua sanguinis detractio, si dolor admodum vrgeat, vel aliud accidens eam requirat, non oberit.

Clyster refrigerans & leniens, in magna inflammatione injiciendus, sic fit: R. Altheæ ʒ. ij. Violar. Maluæ an. m. j. florum Nenuph. p. j. flor. Chamom. p. ʒ. Rosarumq; in principio p. j. seminis Lini, Psyllij ana ʒ. ij. semin. Cucurb. vel etiam aliorum frigidorum ʒ. ʒ. seminis Anisi ʒ. ij. fiat decoctio: dissolue Cre-

moris lactis vel Butyri rec. ʒ. j. ʒ. axung. Hœdi ʒ. j. ol. Rosæci in principio, in progressu Violacei ʒ. ij. & ratione doloris Amygdal. dulc. ʒ. j. Mellis ros. vel viol. vel Sacchari ʒ. j. ʒ. Mannæ vel Cassiæ ʒ. j. fiat Clyster. Ponia acida incoquant aliqui. In declinatione ol. Chamomel. Anethinum, Liliorum additur.

In biliosa causa talis conuenit: R. plantarum Emollitiuarum trium vel quatuor ana M. j. Hordei, Fui furis an. P. j. Ficuum, Prunorum dulc. ana n. xij. flor. Chamomil. Meliloti an. P. j. sem. Lini, Fœnogr. ana ʒ. ʒ. sem. Psyllij, Cydon. ana ʒ. ij. sem. Maluæ vel Altheæ, ʒ. j. fiat decoctio, dissolue in colatura adipis Anseris vel Gallinæ ʒ. j. Butyri vel Olei ʒ. j. ʒ. ol. Nenuph. Viol. an. ʒ. j. Liliorum ʒ. ʒ. Mellis Viol. vel Sacchari Viol. ʒ. j. ʒ. Injiciatur.

Si purgare simul velimus, in decocto, Polypodij ʒ. j. ʒ. vel Senæ ʒ. ʒ. incoquitur: & electuar. de succo Rosar. ad ʒ. ʒ. vel Catholicon ad ʒ. j. in eo dissoluitur.

In vtraq; causa astringentia clysmati adduntur: vt Plantago, Sumach, Rosæ, quando exulceratio timetur: quæ & inflammationi & erysipelati nonnunquam succedere solet, sed sine cruore ferè tantum pus proferens. Cuius vlcis curatio in dysenteria quoque explicatur.

Ex Brodio galli veteris clyσμα, in quo plantæ emollientes costæ sint, cum aluum lenire volumus, prodest.

Lac recentem mulsam cum pauco saccharo, in vtraque causa ad dolorem leniendum injicitur: cui Album. oui aut Mucago psyllij ad ʒ. j. interdum additur.

Idem præstat clyster ex solo Lacte seu emulsione Amygdalarum, aut Cremore Hordei, ex illius mundati decocto expressi, factus: addendo Butyri recetis aliquantum, & Saccharum ac Mel.

Vel etiâ alia Anodyna & Narcotica, cum dolor vrget, clysmata superius enarrata, è minus calidioribus vsurpari possunt.

Purgantia non nisi leuia seu laxantia solùm, si necessitas requirit, & clyster non operatur, vel non admittitur, dantur. Vt syrup. Viol. Rosar. solut. Decoctum fructuum, passul. prunorum, sebesten, viol. addito quan-

doque & Rhabarbaro, vel Cassiâ, aliisve laxantibus non nimium calefacientibus.

Inter ea quæ sumuntur, Victus ratio qualis in inflammationibus internis & biliosis affectibus conuenit, instituitur. Vinumque proin, tunc quia conuulsiones metuuntur, minimè conceditur.

Propinatur ex illis quæ proprietate quadam in intestinorum doloribus iuuant, superius explicatis, illa, quæ minus sunt calida. Vti & illa quæ leniendo dolorem mulcent, & anodyna sunt. Postremo & narcotica, semper eligendo ex supradictis quæ minus calefaciunt, quæ & laxantibus, vti illud dictum, permisceri possunt.

Extrinsècus in vtraq; causa inunctiones sũt, ex oleo Viol. Amygd. dulc. Chamomel. Anethino, addito Butyro rec. & mucilag. sem. Lini, Fœnogr. Cydon. & Axungijs.

Balneum aquæ dulcis item competit: Fometa ex decocto, vnde & clyσμα parabatur.

Cataplasmata item ex clysmatũ residentia. Vti & ex farina Hordei, Lini, Fœnogræci, cum Butyro, Axungijs, & Oleo parata: in conuulsuulo vtilia.

Cucurbita inguini imposita, cum Scarificatione aliquando præmissa, in ileo dolore ab inflammatione genito, confert.

Amuleta in aliis causis proposita, & in hisce, cum nocere suis qualitatibus apposita nequeant, locum habebunt.

Distentiones vesicæ & vteri, si dolores illorum procreent; Cum hoc in vesica tantum ab vrina retenta vesicam implente fiat, quo pacto huic molestiæ subueniendum, in mictionis defectu explicatũ fuit. Vti & si à calculo molesteretur, quod in ceruice ipsius potissimum fit, in mictione dolorifica, quæ tunc potissimum vrget, describitur.

Vteri verò distentio seu inflatio aut refrigeratio, ab aëre externo facta, si Post partum dolores appellatos gignat, tunc si mulier quæ huic malo obnoxia est, dum parit, ab aëre agitato, & vento frigido præsertim arceatur, & circa inferiora, mox à partu bene muniat, fasciæq; ventre illius sensim leuiterque, vt vterus citius rursus subsideat stringatur, dolor hic præcauebitur, vel citius delinet. Quod si perseveret, medicamentis vterinis

Distentionis circa vesicam regionis doloris curatio.

Præteritis doloris quæ dantur mulier vocant, illius qui post partum apertum apertum pellatur doloris curatio.

Si verò vterini dolores alij, à prauis humoribus circa vasa ipsius & membranosa ligamenta, collectis, geniti infestent, illi, qui menses præire aut illos suppressos, vel aliquin non decenter fluentes, comitari; vel etiam, postquam per ætatem iam cessarunt, & nihilominus impuritas hæc circa vteri vasa colligitur, quoque accidere solent: Tunc si menstruum causâ hoc accidat, illuuiies illa, quæ menses sistit vel impedit, imprimis repurganda, & vt menses rectè procedant, sicuti in menstruis retentis aliisque affectibus, qui inde proueniunt, abundè explicatum fuit, procurandum. Quæ præcipua ratio curandi vterinos, hosce dolores inde perfectos, existit: Remediaque vteri doloribus accommodata, eadem ferè sunt cum illis, quæ in intestinorum doloribus, cum calefacere flatusque discutere, dolores sedare volumus, conuenire diximus: quod inde evenit, quia (vti declaratum fuit) dolores illos intestinorum, vterinos, idque in vtroque sexu esse putant, sicque nominant: & quia in intestinorum doloribus hæc profuisse obseruarunt, quos vterinos esse censuerunt, vteri doloribus etiam hæc remedia adscripserunt. Quæ tamen remedia calida, flatu pellentia & anodyna, in intestinorum doloribus descripta, vteri doloribus tunc præcipuè etiam competunt, si post partum ab aère frigido subortu, hi diutius perseuerent, aut aliquin frigidis vteri morbis copulentur. Et cum illa calore suo, quo vterus imprimis, vii & de intestinis diximus, delectatur, eum foueant, doloresque sic mulceant, si menstruum causâ dolores quoque accendant, hac ratione, eoq; magis, quod & menses simul moueant, predesse tunc poterunt. Vnde & factum, cum calida remedia non solum vtero adscriptis doloribus, qui tamen intestinorum erant, sed & vtero valis que illius propriis conuenire obseruarent, plerisque vteri dolores à frigore proficisci, vulgus crederet: cum tamen illa ob causas dictas in eiusmodi enarratis vteri doloribus competant. Eoque magis, si remediis illis quæ in intestinorum doloribus calefaciendo, flatu discutiendo, dolores compescendo, iuuare diximus, ea quæ vterum

potissimum respiciunt, adjiciamus. Cum alioquin ab illis hæc remedia matricalia nihil vel parum differant, nec alia ferè quàm in intestinorum dictis doloribus enarrata, à Practicis describuntur. Quæ tamen sequenti modo vsurpata, rectius in vteri enarratis doloribus conuenient.

Phlebotomia, nisi menstruum prouocandorum causâ in pede, aut euacuationis alterius occasione requisita, alibi fiat, hic parum proderit.

Purgantia eadem quæ in intestinorum doloribus dictis præscripta sunt, hic quoque exhiberi possunt. Imprimis cum turpethum intestinorum dolores, quia turbando termina excitat, exaggeret, in vterinis vtilius censetur à 3.j. ad ʒ. quatuor in puluere illud exhibendo, addito correctionis loco, Zingib. ʒ.j. & Cinamomo Saccharæque ad gratiam, cum aqua Artemisiæ.

Clysmata emollientia, stimulantia, calefacientia flatusque pellentia, prout necessitas exigit, in intestinorum doloribus descripta, non solum aluum soluendo flatusque pellendo, vnde dolores etiam vteri mitigantur, sed & quia vtero vicino recto intestino vires suas communicant, hic quoque competunt, additis præsertim herbis matricilibus.

Quale illud vtero accommodatum sit: R. Artemisiæ, Calamenti, Pulegij an. M.j. flor. Chamom. Meliloti, summit. Anerhij an. p.j. sem. Anisi ʒ.vj. seminis Lini vel Fœnogr. ʒ.ʒ. Furfuris p.j. fiat decoctio, dissol. in f. q. colaturæ Mellis Anthos. ʒ.j. ol. Cheirini ʒ.ij. Bened. lax. Hieræ simpl. an. ʒ.ʒ. Sacchari rub. ʒ.j. Salis parum, fiat Clyster.

Alius vtilis: R. ol. Amygd. am. ʒ.vj. Pingued. anseris ʒ.ij. Laricæ dissolutæ in vitellis duobus Ouorum ʒ. ʒ. dissolue cum lure pulli, & detur.

Exhibita multa in intestinorum doloribus proposita, hic quoque profunt. Laudaturque imprimis Aqua artemisiæ, Oleum item amygdal. amararum, assaüm bibita. Aliqui oleum Scorpionum quoque exhibent. Vt & Succu stercoris equini, per se vel cum Vino expressum & propinatum.

Decocta vtilia in vterinis doloribus, vt & illis qui post partum fiunt, calida bibenda

523

per se, vel Saccharo & Melle dulcorata, & Cinamomo aromatizata, sunt talia.

Primum: R. Schoenanthi 3. ij. bulliat in Aqua arthemisiæ q. s. colatura detur calens, duabus vicibus. Similiter ex Spica factum decoctum prodest: Vel ex vtriusque 3. ij. pro quatuor vicibus exhibendum: dulcorentur & aromatizentur si velint, vti & sequentia.

Aliud: R. rad. Matricariæ 3. β. Nucis moschat. 3. ij. coquantur in Vino albo: Et colaturam bis bibat.

Tertium: R. granorum Iuniperi 3. ij. feminis anisi, Carui an. 3. j. fiat decoctio in Vino: Colaturam vno haustu bibat.

Quartum: R. rad. Matricariæ 3. vj. radic. Succisæ 3. β. gran. Iuniperi 3. ij. feminum Anisi 3. β. feminis Carui, Dauci an. 3. j. Nucis mosch. 3. β. Schoenanthi, Spicæ an. 3. j. fiat decoctio in Vino. Colatura dulcoretur & aromatizetur, vt dictum, pro tribus vel quatuor dosibus.

Infusiones prædictorum ex quibus decoctio fit, in Vino Maluatico, vel cum Aqua vitæ factæ, profunt: Vti & aliæ similes in ventriculi imbecillitate propositæ.

In substantia multa in intestinorum doloribus, & imprimis in imbecillitate ventriculi explicata, hæc quoque vtilia sunt. Vti & sequentia.

Menta, Balsamita maior, quam mentam Græcam vocant, in placentis aut alio modo in cibis probantur. Vti & grana Iuniperi, pro ipsorum condimento.

Pulvis radicum Imperatoris, Zedoariæ, & imprimis Gentianæ a 3. j. ad 3. j. β. cum Vino generoso, aromatibus aliquando additis propinatur.

Vel materia ex qua decoctum parari diximus, puluerisata, hac formâ exhibeatur.

Alter compositus pulvis: R. rad. Matricariæ 3. β. Imper. Succisæ ana 3. ij. rad. Dictamni albi, Zedoariæ, Gentianæ ana 3. j. gran. Iuniperi 3. j. β. semin. Anisi 3. ij. semin. Dauci, Ameos, Cimini an. 3. j. Schoenanthi 3. ij. Maceris, Spicæ an. 3. j. Zingib. Piperis an. 3. β. Croci 3. β. fiat pulvis: qui per se cum Vino ad 3. j. exhiberi potest: vel Sacchari addito duplo pondere propinari: aut in tabulas prius redactus, sic dari. Posset & hic pulvis,

addito Melle, in electuarij formam redigi, sicque exhiberi.

Diaciminum inter alia ex vſitatis, in matricis doloribus præsertim, commendatur. Vti & cum simul adest imbecillitas, Diamargaritum calidum.

Ingratus, sed efficax pulvis: R. Cimini infusi in Aqua vitæ, rursusque siccati 3. j. sem. Ameos, Zingib. an. 3. β. Castorei 3. j. Datur 3. j. cum Vino.

Maxillæ cum dentibus Trutæ piscis pulueris 3. j. cum aqua Chamom. exhibita, singulare est præsidium, cum dolor ante menstruum aduentum vrget.

Secundinæ exiccatae puluerem bibitum, dolores post partum mox compescere, dicebat Rondel. Et quia animalia bruta eam deuorare solent, idcirco ab eiusmodi doloribus immunes esse, experiētiâ se cognouisse in canicula sua, cui cum secundinam subtraxisset, dolores hosce quoque superuenisse obseruat, dicebat.

Pilulæ ex ingratissimis potius formantur, sicq; dantur: R. gummi Oppopanac. Serapini an. 3. j. Castorei, rad. Gentianæ an. 3. β. Spicæ 3. j. Croci 3. β. cum syr. Artemis. fiant pil. Da a 3. ad 3. j.

Opiatæ in summo cruciatu, vt in colicis dictum, locum habent. Præcipueque Tryphera magna cum Opio, vtero accommodata est. Daturque 3. j. β. cum Vino, aut aqua Artemisiæ: addito interdum pulu. Maceris 3. j. Croci 3. β.

Quorum adiectione etiam Theriaca dari posset: addito insuper quando magis calefacere volumus, tantillo Castorei.

Fotus, infusions, lotiones pedum, quæ vtero quoque valde conueniunt, ex decoctis herbarum, feminum, additis in fotu etiâ aromatibus, vt in intestinorum doloribus competunt: Imprimis addendo hæc propter vterum, Artemisiam, Matricariam, fol. Lauri, Melissam, Nepetam, Balsamitam, Botrym, Sabinam, Chelidonium maius, rad. Vincetoxici, fl. Cheiri, Viscum quercinum: semē Dauci, similiaque.

Ex iisdem alijsve, prius in doloribus intestinorum explicatis, sunt sacculi.

Inunctiones ex oleis eodem etiam modo,

vti illic dictum, sunt: imprimisq; hic Laurinum, Cheirinum, Irinum, Liliorum, Nardinum, Sambucinum commendantur.

Vnguenta consimilia varia, addendo oleis succos prædictarum herbarum, aromata, vti illic describuntur, aliquando & gummi quædam. Quo pacto & emplastra fiunt, vtileq; hic quoq; emplastrum de Lauri baccis.

Cataplasmata item ex prædictis plantis: & bulbis Liliorum, Cæparum, coctis, contusis, additis oleis parata. Et quod ex Stercore vaccæ cum semine Cimini, cum Melle & Vino coctum fit. Cumque dolor vrget, ex Hyosciamo, vt supra dictum, paratum.

Iniectiones ex decoctis vel succis plantarum enarratarum quoque injici possent, sed quia in ceruicem illius tantum perueniunt, nec circa vterum subsistunt, hic non adeo necesse est doloris causâ illis vti: sicuti neque pessariis, nisi quatenus hæc, si menstrua subsistant, locum habent.

Suffitus tamē, cum altius subeant, & maxime ex decoctis fuscitati, vtero excepti, proderunt.

Vti & odorata ex Moscho, Ambra, vtero adhibita, eum recreant.

Frictiones pedum à femore deorsum factæ, Cucurbitulæ item coxis appositæ, diuertendo profunt.

*Inflam-
tioni Ve-
sicæ &
Vteri a-
ratio.* Inflammationes vesicæ & vteri, si dolores in ventris ima sede pariant, cum horum viscerum corpora connexa sint, curandi rationem non multum differentem requirunt, quam proin hic simul explicabimus.

Periculosæ autem sunt eiusmodi inflammationes, in partibus hisce exquisitè sentientibus. Imprimis in vtero, si ob partus difficultatem inflammetur, cuius causâ puerperæ frequenter extinguuntur. In vesica, si vlceri illius, vel calculo copulata, & ab aliis irritata inflammatio, in periculum ægrum deducit. In vtriusque quoque, si in scirrhum vel in abscessum, eoq; rupto in vlcus vesicæ vel vteri conuertantur hæc inflammationes, affectum dubiū post se relinquunt: si in gangrænam desinant, mortem adferunt.

Curationem autem tam vesicæ quam vteri inflammationis, vt in reliquis inflammationibus, instituemus: ab initio materia dū

fluit, reuellendo, repellendo, caloremque restringendo: mox postquā fluxio desit, eam absumendo, discutiendoq;. Quod si in alios affectus desinant, quia hoc in ceruice vteri & vesicæ maximè fit, in illorum locorum affectibus hæc explicabuntur. Quæ verò inflammationum harum causâ fieri debent, hæc sunt.

Vena brachij reuulsionis causâ primum aperitur: mox ad deriuationem in pede, in vtroque casu, nisi quid obstat, vti fluxus in puerperis, in vel post abortum factus.

Scarificatio in femore facta, adhibitis cucurbitulis: Vel cucurbitulæ sine scarificatione illic affixæ, reuellant, vti si in natibus hoc fiat. Quod si verò menses nimium fluant in inflammatione vteri, in superioribus hæc potius facienda.

Clysmata non solum ad aluum leniendâ, sed & refrigerandâ, doloremq; sedandum, cum in rectum intestinum injecta, vesicæ & vtero acumbentibus, vires suas communicent, à principio maximè competunt.

Qualia in renum inflammatione descripta sunt: Item in intestinorum inflammatione refrigerans clyster: doloremq; lenientia ex Lacte hic quoque proderunt: quibus & cum penitus refrigerare volumus, succi Solani, Violarum, Maluæ similesque permiscuntur.

Extrinsècus remedia in ima ventris regione anteriore. & posteriore circa lumbos applicant: in principio refrigerantia & repellentia, non tamen adeo validè astringentia, vt in cæteris inflammationibus, ne durities sequatur: postea in augmento illis addimus resoluentia: quibus circa finem solis vitimur: & si ad suppurationem tendat, ad maturantia transimus.

Refrigerans & parū repellens cataplasma: R. rad. Altheæ ʒ. ij. herb. Plantag. Bursæ pastor. Diplaci, Vitis fol. Violaris, vnam vel plures ad M. ij. decoquantur & contundantur: addendo farinæ Hordei, Lentium ad ʒ. iij. seminis Psylli ʒ. ʒ. ol. Ros. omphacini ʒ. ij. fiat cataplasma.

Epithema ex decocto vel aquis aut succis (quod & efficacius) prædictarum plantarū, vel inuicem permixtis, ad ʒ. viij. cum Aceti ros. ʒ. j. ʒ. idem præstat: validiusque, si Boli, sanguinis Draconis ad ʒ. ʒ. addas.

Inunctio: R. ol. Violacei ʒ. j. ʒ. ol. Ros. cum magis astringendum, Omphacini & Myrtini an. ʒ. j. misce: Efficacius operabitur si succi addantur Solani vel prædictarum plantarū ad ʒ. ij. & Aceti ʒ. j. & cum oleis ad consistentiam coquantur: vel additā Laricē in formam nutriti redigantur. Potest & Bolus maioris astrictionis causā addi.

In augmento cataplasma: radic. Altheæ ʒ. ij. Liliorum ʒ. j. Semperuiui, Plantag. Solani, Endiuia ad m. ij. fl. Chamom. Meliloti an. p. j. Ficum, Dactylorum an. paria vj. decoquantur & contundantur, addendo farinæ Fabarum, sem. Lini, Fœnogr. (vel in declinatione Orobi) an. ʒ. ij. ol. Ros. ʒ. ij. ol. Liliorum ʒ. j. (augendo in declinatione) Croci ʒ. j. misceantur.

Ceratum Galeni ex Semperuiuo ad idem conuenit. Multaque alia in inflammationibus, hinc inde descripta.

Inunctio hæc in progressu morbi conuenit: R. olei Chamom. ʒ. j. ʒ. ol. Liliorum, Rosacei sem. Lini an. ʒ. ʒ. succi Semperuiui, Sonchi an. ʒ. j. mucilag. semin. Fœnogræc. ʒ. j. ʒ. axungia Cuniculi ʒ. j. Croci q. f. fiat vnguentum.

Fotus & infesiones ex decocto prædictarum plantarum in augmento quoque fieri possunt, quibus tamen potissimum vtimur cum dolor vrget, additis simul sol. Hyosciami communis vel Indici, quæ valde tunc iuuant.

Anodynum cataplasma sic fit: R. Panis detractâ crustâ lb. ʒ. coquantur in Lacte: addantur Oua duo vel tria conquassata, Mucilaginis semin. Lini, Psyllij an. ʒ. j. Butyri vel ol. Amygd. dulc. ʒ. ij. Croci ʒ. ʒ. misce.

In declinatione emplastra digerentia apponuntur: vt de Meliloto, Dialtheæ, Diachylon ireatū: aliæve ex lachrymis & gummi parata.

Vel hoc: R. gummi Bdellij, Galbani, Oppopan. an. ʒ. ʒ. Stryacis cal. ʒ. ij. Dissoluantur in succo Matricariæ & Chamom. additâ paucâ Aquâ vitæ, & fiat emplastrum.

Infesio seu balneum declinante morbo ad residuum tollendum conuenit: Factum ex decoctione rad. Altheæ, Liliorum, herb. Maluæ, floribus Chamom. Meliloti, Sambu-

ci, Anthos, seminibus Lini, Fœnogr. addendo si vterus affectus sit ex sequentibus aliquas plantas, Maioranam, Matricariam, Artemisiā, Pulegium, Leucoium, Viticem, Spicam, vel Schœnanthum.

Si digeri nequeat, maturetur hoc cataplasmate: R. farinæ Triticæ quart. j. far. Hordei, sem. Lini an. ʒ. ij. Ficum p. vj. coquantur in Lacte, contundantur: addendo Vitellos ouorum tres, axungia Gallinæ ʒ. ij. misce.

Vel aliis maturantibus in aliis abscessibus expositis vtatur.

Iniectiones cum ad vesicam in viris ægre perueniant, & non sine labore propter immittendum catheterem in vtroque sexu, fiant, vnde malum exacerbari posset, non facile eā inflammata fieri debent, nisi aliis de causis, veluti ob retentam vrinam aut aliam illuuiem in ductu vesicæ, illud tentare necesse sit, & vias hoc pacto dilatare, & abstergere. De quibus alibi egimus.

In vteri sinum iniectiones factæ, cum vteri corpus propter angustum ipsius orificium minimè subintrent, fundo vteri solo inflammato non aded, nisi quatenus extrinsecus eum alluunt, vt si ceruix inflammata sit, vel simul vel separatim, competere possunt.

Tunc decoctum cataplasmatum supradicti herbarum, vel aquæ aut succi illarum herbarum, ad repellendum ab initio, & in progressu decoctum illius cataplasmatum, quo in augmento vtimur, injici poterunt.

Vel herbæ ipsæ contusæ, farinis in cataplasmatibus illic quoque expositis subactæ, in forma pessii mulieribus indi.

Imprimis dolor, vt iniectionibus vtamur, interdum exigit. Tuncque Lac cum albumine Oui bene agitato, infunditur, vel cum lana imponitur: addito, cum necessitas requirit oleo de Momardica, vel Hyosciami: vel tantillo Opii. Vel decoctum sol. & sem. Papaueris aut Hyosciami sol. & sem. & Altheæ vsurpatur. Succus item Altheæ: aliæve anodyna narcoticæ in ventris dolore descripta.

Tryphera Sarracenica immissa iuuat.

In declinatione iniectiones fiunt ex illis quæ residuum absument, & simul emolliunt,

ne in scirrhum abeat, vt: R. Galbani 3. j. β. dissoluti in ol. Liliorum vel Cheirini 3. j. Styracis calam. 3. j. Aquæ maioranæ 3. iij. misce pro iniectione.

Vel hic pessus: R. Galbani, Styracis cal. an. 3. j. Ladani 3. β. axungia Cuniculi, Anseris vel Anatis q. s. subigantur, eaq; pasta sacculus sericeus infarctus supponatur.

Suffitus ex gummi Serapino. Storace, Benzoino, cum Cera & Terebinthina subactis, similiter reliquias absumit.

Propinquantur interim per os in vtriusque partis inflammatione, quæ alium leniunt: vt Pruna, Cassia, syr. Viol. Rosaceus, Serum lactis: supra quæ ad fortiora vix transcendere licet, nisi in declinatione.

Dantur & refrigerantia varia, in cibis Olera: & in potu locovini Aqua: & in medicamentis, syrupi, Aquæ, Conseruæ, similiaq; quæ refrigerent & humectent: in febribus exposita.

Dein & quæ vrinas humiditate aut vi deterfori suâ mouent: vt Emulsio quat. sem. frig. mai. Decoctum Cicerum, Serum Lactis.

~~~~~

## DE GENITALIUM DOLORE.

### CAP. V. T. XIV.

#### Genera.



ENITALIUM seu pudendorum, i.e. membrorum quæ ad actum Venereum vsurpantur, dolores interni (nam externi in externis doloribus cum cæteris explicabuntur) diuersi admodum propter instrumentorum diuersitatem in vtroque sexu accidunt,

Maribus in penis ductu intrinsecus accidentes dolores, cum in communi ductu in quem vesicæ ceruix desinit, mictioni imprimis, feminisque excretioni destinato, fiant, dolorque maximè, cum vrina redditur, vergeat, eamque vt sæpè mingatur impellat, vel pus quoque ex pene tunc effluit, conatusq; hic mingendi cum dolore, & puris excretio magis spectantur, in excretis hos in pene affectus tractabimus. Quod si in seroto dolor quoque aliquis suboritur, siq; inflamma-

tio in eo loco, quia extrinsecus se profert, in externis vnà cum reliquis explicabitur: si dolor & tumor ex ruptura in herniis; cum cæteris illarum speciebus exponetur.

Fœminis genitalium dolores, vel intra *Fœmina* pudendum, seu diuisionem ipsius, vbi duo *nam ge-* foramina vesicæ & vteri ceruicis se patefa- *nit alium* ciunt, accidunt, vel profundius paulò in sinu *dolor.* seu ductu amplo inde ad vtrum vsque porrecto, quem ceruicem vteri vocant, se offerunt. Qui diuersimodè, præsertim verò cum ardoris vel vlceris sensu repræsentant.

Cum ardore vel tantum dolor fit: vel *Vteri in-* etiam cum tumore, & tunc à morbo vnde *flammâs* oritur, Inflammatio vteri ceruicis dicitur: *dolor.* frequentiorque est illa, quæ in vteri fundo fit, de qua in ventris dolore egimus. Quæ tamen non solum collum semper occupat, sed & quandoque ad vteri fundum, aliàs ad pudendum vsque quoque pertingit. Hæcque inflammatio iisdem accidentibus, vti si in vteri corpore fiat, se prodit, eoq; magis cum contactu deprehendatur, & exacerbetur. Dein & in abscessum, vel scirrhum, aut gangrænam aliquando conuertitur.

Alius cum ardore aliquo quoque & tu- *Cancer* more dolor, in affectu qui Cancer vteri cer- *veteri cer-* uicis dicitur, se offert, longè quoque fre- *uicis.* quentior apparentiorque, quam is qui in vteri corpore nascitur. In quo sicuti in cancro externo (vbi ille in genere magis exactè describitur) tumor ab initio collectus oboritur, punctionibus leuibus saltem tunc molestus, tandem verò non subito sed successiue auctus, in magnum tumorem excrescit, pondere & impedimento quandoque molestum, & ardore quoque, longè minus tamen vehementi quam in inflammatione punctionibusque grauem. Qui tandem ex- *Carcinoma.* ulceratur, & in Carcinoma dictum, conuertitur: viroso humore & cruore tunc ex vtero exstillante, grauioribusque accidentibus superuenientibus.

Terrius, cum ardore & tumore seu potius *Condyloma* veluti excrescentia dolor, in pudendi clau- *ma in pu-* stris potius quam sinu eueniens, affectus est, *dedis mu-* quem Condyloma vocant: grauius affli- *lieri.* gens, si inflammatio, vti sæpè fit, illi copulatur. Hic & in pudendo mulieris & in podice

sæpè

sæpè eodem tempore nascitur: aliàs in solo podice, tam in mulieribus quàm viris, vbi proin exactius describetur.

*Vteri vlcerosus dolor.*

Cum vlcere sensu lancinans dolor & pungens à morbo vnde prodit, Vlcus vteri, & prout illud se habet, diuersimodè appellatur. Et vel in pudendi interioribus, aut in sinu cervicis vteri euenit, atque contactu vel immixtis medicamentis, maximeque ex concubitu exacerbatur. In hoc affectu sanguis vel sanies per pudendum emanat: Aliquando pus, idque nunc album coctum, inodorum: nunc crudum & aqueum: aliàs virosum, luteum, viride vel atrum. Cuius puris portiones, aliquando vrinæ in transitu permixtæ, simul eminguntur. Sed & per podicem illud idem redditum fuisse, & tunc stercorea per vterum quoque prodiisse aliquoties vidimus: & in vesicam, & abdomen quoque peruenisse, à quibusdam obseruatum fuit. Verùm & vlcus quale sit, an exco-riatio tantum vel vlcus profundum, serpens, aut labiis prætumidis, callosis vel inuersis, vt in carcinomate esse solet, & contactu & inspectione si in pudendo sit, vel si profundius existat, per dioptrismum exploratur. Quibus alia multa symptomata functionum vteri nonnunquam copulantur. Et si vlcus in pudendo ad vesicæ orificium vsque serpat, mistio ardens ac frequens quoque accedit. Si malignum sit, vitales functiones debilitantur: vti & si morbi alij huic malo copulantur, vel occasionem præbeant, sicut inter cætera lues venerea, plura tunc symptomata concurrunt.

### *Causæ.*

**Q**ui in foeminarum genitalibus accidunt dolores (nam qui maribus illis in locis sunt, aliò vti dictum, referuntur) à morbis, qui illa ipsa loca vbi dolores sentiuntur, nimirum vel cervicem vteri, vel pudendi anteriora occupant, proficiuntur. Suntque hi vel inflammatio, vel cancer, aut condyloma, vel exulceratio.

*Inflammatio vteri, causa ardens.*

Inflammatio cervicem vteri potissimum occupans, vel vterius ad vterum quoque protensa, vel in pudendi claustris nata (vbi & tuberculum quandoque inflammatum na-

scitur) dolores, cum calore, ardore, tumore aliisque, prius, vti & in vteri inflammatione explicatis accidentibus, plus minusve se exercentes, prout inflammatio vel magna vel parua, aut pura vel impura, vel potius erysipelas tantum est, vbi & maius est incendiū tumorque nullus vel planus, procreat. Cuius inflammationis causa interna eadem quæ & vteri inflammationis, sanguinis influxus, vti illic dictum, interdum existit: qui quando redundat, in sinus vteri substantiam, cum plures venæ menstruæ dictæ per eam disseminantur, facilius quàm in corpus illius infusus, eo potius in loco inflammationem parit. Vti & si à partus difficultate fiat, cum ceruix vteri summè sensilis illiusque orificium in pudendum desinens angustum, hinc præcæteris patiantur, facilius quoque inflammantur. Cuius & orificij causâ, occlusi adhuc ex parte in virginibus, propter hymen, quando cum labore & dolore de virginantur, vel aliàs quia ærctum est, aut vir nimium potens, mulieres ex congressu quoque multum patiuntur, hæc loca illis nonnunquam inflammantur. Quod & quandoque ob pelfaria indita, vel iniecta medicamenta adurentia vel erodentia potest accidere.

Cancer in sinu vteri natus dolorem cum ardore aliquo & punctionibus ac tumore contingentem, qui tandem in vlcus virulentum abit, vti prius dictum efficit. Cuius causa, humor malignus & perniciosus, quemadmodum etiam in aliis locis, ita hinc, si huc ad cervicem vteri feratur, existit. Quem qualis sit, atque vnde prodeat, in cancro externo quem frequentius procreat, enarrabimus.

*Humor malignus causa Canceri in vtero.*

Condyloma in pudendo natum, dolorem eum qualem superius exposuimus, parit: quod propter pudendi cum podice aliquam similitudinem, hinc æquè atque in podice tam mulieris quàm viri nasci potest, ob causas in podice, cum in vtroque sexu illic fieri possit, explicandas.

Exulceratio in sinu vteri, vel pudendi interioribus facta, dolores vlcere sensum præbentes, efficit, aliaque accidentia, vti superius dictum, profert, eò plura, quò vlcera- tio est maior deteriorque. Nam si sit exco-riatio simplex, abrasâ tantum pelliculâ

*Vlcus vteri, causa vlcerosi illius doloris.*

in pudendo intrinsecus, vel sinu vteri, dolor sanè ob partis exquisitum sensum, non paruus: Si læsio grauior, aded vt vulneretur, dolor magis acerbus erit, tuncq; sanguis quoque effluet. Si vlcus simplex, dolor mitior, sed cum puris effluxu, copiosioris, si illud sordidum admodum sit. Si vlcera sint exedentia & depascentia, quæ nomas vocant, quæ si profundiora sint, Phagedenica dicuntur, dolor diuturnior cum effluxu puris vitiosi futurus est. Quod si aded inualescat vlcus, in pudendo præsertim natum, vt vesicæ cervicem quoque afficiat, tunc mistio cum dolore hisce malis copulatur. Quod si in sinu vteri factum, aded exedat, vt rectum intestinum illi adnexum perforet, per anum pus tunc emanat, & quæ per anum transire debebant, huc interdum feruntur: vti & si illic natum vlcus ad vesicæ collum, vel in abdomen penetrat, eò quoque pus interdum peruenit: si cervicem vteri amplius diuque depopuletur, tunc ipsius sequitur omnimoda, vel ex parte corruptio: quemadmodum hoc in quibusdam mulieribus factum, atque in vna totum vterum computruisse & exemptum fuisse, cognouimus. Quod si verò vlcus cancriforme fuerit, Carcinoma dictum vel cancer vlceratus, tunc cum dolore maiore adhuc quam in cancro non vlcerato, & labiis cancri prætumidis & inuersis, pus admodum vitiosum emanat, & interpolatis etiam vicibus sanguis, quem cum mensium instat tempus, aded sæpè copiose effluere vidimus, vt in extremum vitæ periculum pariens mulier in iusta fuerit.

Hæ verò exulcerationes à læsionibus iisdem, à quibus inflammationes fieri diximus, quoque prodire possunt. Vt in partu difficili, & in congressu primo, vel alioquin violento, si per eum vena aliqua rumpatur, aded vt sanguis profluat, eo modo sicuti cum deuirginantur, aliquibus quoq; sanguis ob menstruum fluxum, attritione hac venarum cervicis vteri commotum, emanat (quod à rupto hymene fieri creditur, & pro virginittatis signo vulgò habent, cum tamen hoc non semper incorruptis, in primo coitu accidat, sed illis tantum, quarum venæ facile aperiuntur, teneriorib; scilicet, & quibus iam men-

struorum tempus, quando nubunt, propinquum est, vnde etiam nullum inde vlcus sequitur) nisi reuera ob venam aliquam impetu hoc insolito læsam, vel orificium fissum aut lacerum sanguinem profundant, posteaque exulceratio remaneat. Quod & à læsione alia extrinsecus illatâ vulneratis hisce claustris potest accidere: Vti & vsu medicamentorum acrium, in sinum vteri aliis de causis, inditorum, vteri cervix erodi vel exulcerari: sicuti sinistro horum vsu cervicem vteri vlceratam, tandem computruisse penitus, superuiuentem nihilominus diu postea adhuc muliere, obseruauimus. Præter quas causas inflammationes & vlcus excitantes, inflammationes quoque in abscessum conuersæ, eo rupto in vlcus abeunt. Et post abscessus alios vlcera valde sordida nonnunquam remanent. Fluor vterinus acris diu perseverans, sinum vteri ac pudendum interdum erodit, vlceraque gignit. Alij quoque peruersi & maligni humores, cum sanguine menstruo per has vias expurgati, in corporibus cacochymicis, & in variis morbis, vti & in lue Venerea, imprimisque ex impura gonorrhea ichor, hoc idem possunt efficere. Quod & ex virili semine illuc effuso vitiatò, diu retento in sinu vteri, aliquando fit. Sed in grauidis fœtus mortuus putrescens retentus, vterum inficit corrumpitq; sicuti hoc in duabus mulieribus factum spectauimus, fœtum cum inuolucris & vtero vicinoque peritonæo corruptis penitus, sectione in abdomine factâ, exemptum fuisse, quod in vna viuâ adhuc & diu postea superstitè manente, fieri vidimus, & ex alia mortua, nos ipsi hoc modo exemimus.

#### Curatio.

**M**Orborum, qui dolores hosce in vteri sinu, vel pudendis procreant causâ, curatio variat. Qui sunt, inflammatio, cancer, vlcus, Condylomatum enim cura, vti & tota tractatio in podicis dolore, sicuti dictum, instituetur.

Inflammatio si in pudendi interioribus fiat, cum quoque pateat, & exteriora illius plerumque simul inflammet, eandem, quam & reliquæ inflammationes externæ curandi ratio.

*Inflam-  
mationis  
vteri cu-  
ratio.*

ratio-



535

rationem requirit : habitâ interim ratione partis, cum exquisitè sentiat, vt dolorem quoad fieri potest, mox compescamus.

In ceruice verò seu sinu vteri facta inflammatio, eodem penitus modo, vti ea quæ in corpore fit, & in inflammatione vteri exposita est, curabitur, diligenter cauendo, ne in abscessum & vlcus postea vergat, vel duri- tiem aut scirrhum vti sæpè fit, post se relin- quat, vel in gangrænâ non bene tractata, conuersa, corruptionem illius partis adfe- rat. Imprimis verò, vti in vteri fundi inflam- matione, externa potius competunt præsi- dia, quæ tamen & hic, atque inter ea in se- siones maximè conuenire possunt, sic inie- ctiones aliaque indita, cum ad locum affectû rectâ perueniant, magis quàm in vteri in- flammatione hoc loco operabuntur. In reli- quis, quod reuulsiones, deriuationesque at- tinet, & quæ per os sumuntur remediis, pe- nitus in cura conueniunt. Vti & si in absces- sum vergat aut scirrhum, eadè quæ illic di- cta sunt, ad hæc præcauenda instituentur : & si iam scirrhus factus sit, cura sicuti in tu- moribus indolentibus scirrhis suo loco di- cetur, perficienda. Quod si in gangrænâ abeat, malum erit incurabile, vel eo modo vti in gangrænâ in genere dicetur, tracta- bitur.

*Cæteri in  
vtero cu-  
ratio.*

Cancer vteri ceruicis, quia ab initio dolo- rem aut impedimentum non magnum ad- fert, aut quia non cognoscitur, cum negligat- ur, plerumque adauctus & confirmatus cura- ri amplius nequit : Neque in eo loco abdi- to, commodè aut sine periculo amputari po- test. Idcirco exulceratus tandem, lethalis plerumque fit. Ne tamen augeatur, vel ad- auctus vlceretur, sed integer diu permanere possit, ægerque diutius superuiuere, cura talis, quæ hoc aliquo pacto præstare possit, & quia illum non curat, palliativa dicta, adhi- betur, eadem qualis in cancro externi cura quoque exposita fuit. Veluti faciendo re- uulsiones, deriuationes per venę sectionem, hicque imprimis in poplite, aliisve modis. Purgatione item conuenienti, Vires res- taurantibus exhibitis, admotisque, & topicis siccantibus, digerentibus, illis quæ in externo cancro adhibentur, hic

vteri sinui impositis : vbi & hæc copiosè de- scribuntur.

Carcinoma seu cancer exulceratus in cer- uice vteri propriam quoque curationem exi- git palliativâ, quia vix succedit dictam, nec- dum aliam, quàm eam quæ externo cancro debetur, sicuti illic expositum fuit. Habenda interim ratio partis huius quoque, & sic remedia topica formanda, vt in eam sedem vel imponi cum digito, vel per pessaria, vel infundi per iniectiones, possint, aut fumi ad- mitti. Sicuti externæ formæ in externis ex- plicatæ, faciliè in has, vt sic administrantur, reduci possunt.

*Carcino-  
matis in  
vtero cu-  
ratio.*

Vlcera in vteri sinu & pudendo, omnia *Vlcus in vtero curatio.* peruersa, ob loci temeritatem & humidita- tem sunt : adeò vt & levis excoariatio, dili- gentiam vt sanetur, requirat. Deteriora ad- huc sunt depascentia & phagedænica, quæ si diu perseuerauerint, & profundas radices egerint, spaciūque amplum occuparint, incurabilia ferè sunt, vti & carcinomata, quæ mortem plerumque veluti & alia corruptio- nem adferunt, quæ aliquando totum vte- rum, vti in causis dictum, depopulantur : ve- nerea quoque vlcera, non nisi tota lues au- feratur integrè sanantur. In his tamen om- nibus tractandis curatio potissimū variat : quod alia priuatim vlceribus cancris & venereis, alia in genere cæteris exulcera- tionibus debetur.

In exulcerationibus omnibus, excepto carcinomate & venereo vlcere, curandi sco- pus est, si impurum corpus sit aut plethori- cum, ab eiusmodi superfluitatibus euacuare, cum, si hæc redundant, & ad vterum tandem quoque ferantur, continuò hæc loca hume- ctando, vlcera sordida, curatuque difficiliora reddant. Maximeque si hæc impuritas vlce- ribus occasionem præbuerit, illaque simul foueat, prius adimenda corrigendaque. Quod & victus ratione parca & decenti, & venę sectione, purgationibusque pro humorum re- dundantiâ institutis, sudoribusque, qui non solum ab vniuerso corpore, sed & à loco af- fecto humiditates exhauriunt, perficitur ; Eodem modo, sicuti in aliis vlceribus exter- nis, in plethoricis & cacochymicis corpori- bus fieri debere, illis in locis vberius expli-

cauimus. Quod si sanguinis nimius fluor vulneri vel vlceri quoque copuletur, is quoque, vti in mensium fluore dictum, reuellendus erit. Et si in profundo vlcere in vesicam aut rectum intestinum pus illabatur, illud inde, sicuti in vesica & pedice vlceratis dicitur, expurgandum.

Quibus ante omnia obseruatis, quod vlceris propriè curationem attinet, si illud erosio tantum sit, vel simplex vulnus aut vlcus, siccantibus tantum consolidatur glutinaturque: sanguinem simul, si ille immoderate profluat, astringentibus sistendo, & dolorem, si intensus sit, lenientibus hanc sedem & stupefacientibus quandoque mitigando. Si verò vlcus existat fordidum & profundum, primum abstergentibus illud repurgabimus, postea siccantibus carne implemus sanamusque. Si depascens & exedens sit, fortioribus adhuc valideque detergentibus & siccantibus curare studemus. Quæ & si putredo aut corruptio partis accedunt, similiter, illisque adhuc fortiora vsurpantur. Idque remediis diuersimodè, vti sequitur, administratis.

Exhibita per os quædam, quæ & in cæteris vlceratis internis procul disitis locis, vt renibus, vesica, aliquo pacto opitulari possunt, in vtero læso hæc quoque non nihil proderunt. Vti & illa quæ in externis vulneribus bibita, ea sanare creduntur, in vulnerato vtero aliquid præstabunt. Obseruando semper interim locum affectum, & pro illius conditione, remedia eligendo, dirigendoque. Qualia in illis locis explicabuntur.

Præter quæ, decoctum hoc conuenientissimum ad vlcera sananda etiam diuturna, existit, quod Recipit rad. Consolidæ 3.j. fol. Plantag. Millefolij, Lauri an. m. j. seminis Viticis 3.j. Vini albi mens. j. Mellis tb. j. coquantur sensim, despumando, ad consumptionem mediæ partis: Detur bibendum aliquot vicibus, Et loco affecto quoque, vti dicitur, applicetur.

Rhapontici & Centaurij min. radices bibitas, dolores & erosiones matricis sanare, docet Dioscorid.

Laricea vel Terebinthina lota in aqua

vtero conuenienti, vt Artemisiæ, Matricariæ: vel vlceri, vt Plantag. Rosarum, quandoque deglutita cum Melle vel Saccharo, rosaceis, mista, hæc vlcera sanat. Cui Hyfopi puluis additus à quibusdam probatur.

Lac ouillum recens cum Saccharo vel Melle dulceratum, sapè bibitum, leuiora vlcera curat & dolorem lenit.

Pilulæ de Bdellio mai. Mesuæi ad 3.j. vel paulò plus pro vna vice exhibitæ: vel de illis indies aut alternis diebus 3.j. datus, ad vlcera vteri curanda, valde conferunt, & si sanguis fluat, eum compefcunt.

Vel sic paratæ eodemque modo vsurpatæ: R. Bdellij 3.ij. Myrrhæ, Thuris an. 3.j. Sarcocollæ, Styracis, Succini, Myrobolan. chebular. an. 3.ß. Coralli rubrar. 3.ij. cum syrupo de Papauer. fiat massa, Cui in dolore vehementi tantillum Opii permisceri potest.

Vel istis vtetur vti prioribus: R. pilul. de Bdellio 3.j.ß. troch. de Camphora & de Halicacabo sine vel cum opio, si dolor vrget, ana 3.ß. cum syrupo de Plantag. fiant pilulæ: Capiat 3.j. vel plus, indies vel alternis diebus.

Trochisci de Halicacabo cum opio: dolore vrgente, etiam soli puluerisati propinquantur.

Puluis hæc præcipuè sanguinem ex læsione vteri fluentem sistit, & vulnus quoque sanat, vel si ex vlcere hoc fiat, illud simul siccatur: R. Acaciæ Hypocistidis ana 3.j. Sanguinis draconis, Amyli, radic. Plantag. Aristolochiæ rotund. an. 3.ß. Terræ pinguis Armenæ vel Lemniæ 3.j. Mastichæ, Sarcocollæ an. 3.ß. fiat puluis: Detur 3.j. vel plus cum Lacte vel syrupo de Plantag. aut cum aquis Plantag. Bursæ pastoris: Rosarum, vel aqua Chalybeata.

Iniectiones in sinum vteri, ad vlcera illic sananda, tepidæ omnes sunt: quæ prout vel abstergere sordes, pus, aut putridam carnem volumus: dein siccare plus minúsve, quod ad vlcera conglutinanda, carne replenda, cicatrice obducenda requiritur, variant.

Abstergens leuiter iniectio ex decocto Hor-

539

Hordei integri fit, sumendo 3.ij. Hordei ad 1b.ij. Aquæ. Vel ex Sero lactis: Quibus Saccharum, vel Mel, maioris deterfionis gratiâ, & quia simul à putredine præferuât, adduntur. Vel ex solo Hydromelite inijicitur. Vel quod efficacius est Oinomelite.

Validius operatur decoctum ex Hordeo, Lentibus, Fabis non excortizatis, & fol. Apij, Parietariæ, Plantaginis, paratum, addito Melle.

Cum putredo adest: R. Hydromel. 1b.β. succi Apij 3.ij. Myrrhæ pulu. 3.j. misce.

Vel decoctum ex rad. Ireos, Aristolochiæ & Cyclaminis, seminibus Lupinorum, Orbi, fol. Marrubij, Absynthij, sum. Centaurij minoris, factum.

Lixiuum, Vrina, Vinum, maximè acidiusculum, Sapa, si prædictis addantur, admodum mundificant. Vel sitantillum Aluminis addatur.

Fella bouis, capræ, carptionis, aliæve, cum æquali Mellis quantitate, cum Lacte caprino, iniecta, egregiè vlcera sordida ab abscessu relicta mundificant.

Vnguentum Apostolorum, omniumque potentissimum Egyptiacum, dissoluta in prioribus, ita tamen vt ferre possint, in magna corruptione inijciuntur.

Vel alia similia vsurpari possunt detergentia, in vlcerebus externis explicanda: eligendo ea, cum validioribus est vtendum, quæ habita ratione partis, cum minimè lædere possunt. Et ex siccantibus & consolidantibus, seu sanantibus vlcus, similiter, quæ in externis exposita sunt remedia conuenientia petenda.

Siccans seu sanans vlcus Decoctum fit, ex radic. & fol. Consolidæ vtriusque, Bistortæ, herb. Plantagin. Agrimonie, Bursæ past. Caudæ equinæ, Saniculæ, Pilosellæ, Pyrolæ, Millefolij, Centumnodiæ, Potentillæ, Rubi, Myrti, Oleæ, Oleastri, Cereach, Arbuti, Sumach, Asphalati, Sideritidis, Asclepiadis, Symphyti petræi, flor. Rosarum: sumendo de quibusdam vel vulgaribus vel exoticis ad m.ij. vel quatuor, seminibus Vuarum, Plantagin. Myrtill. ad 3.j. & decoquendo in mensur. j. vel paulò plus

Aquæ cisternæ vel chalybeatæ, vel ferratæ pro iniectione.

Efficacius erit decoctum, si Nüces cupressi, Gallæ, capr. Glandium, Malicorium, Balauft. ad 3.j. vel plus addantur: vel sine prædictis decoquantur: quæ & si sanguinis addit flur conuenient: Potentiùs siccabit, si Vinum rubrum stipricum decocto misceatur, & absterfionis causâ, si sordes adhuc adsint, aliquid Mellis ros. vel syr. de Rosis rub. siccis.

Decoctum quod bibitum superius tantopere prodesse diximus, etiam iniectum, vti ostensum, valde prodest.

Succi prædictarum plantarum aliqui quoque ex illis inijci possunt, vel per se, addito Melle: vel cum decocto permisti, suntque efficaciores quàm decoctum.

Pulueres quandoque cum decoctis, succis, vel vtriusque, plantarum enarratarum, subtilissimè triti ad 3.β. pro vna iniectione miscentur: Additis interdum & cineribus cort. Arundinis, Cucurbitæ & Spongiæ mar. & Testarum ouorum.

Vel cum siccare admodum volumus, Lithargyrij, Tuthiæ, Cerusæ, lap. Hæmatitis, Calaminaris, Boli, pulueres ad 3.ij. vel plus: Et sanguinis Draconis, Acaciæ, Hypocist. ad 3.j. pro vna vice iniectionis.

Vel fiat hic sarcoticus puluis, cum in vlcere cauo carnem potissimum generare volumus: R. rad. Ireos, Aristolochiæ, Consolidæ an. 3.j. Myrrhæ 3.ij. Aloës 3.j. fiat puluis, pro vna iniectione. Poteft & Thus, Sarcocolla ad 3.j. addi, vel etiam Mumia.

Laricea vel Abiegnæ vel Terebinthinalota cum aqua Plant. ad 3.ij. dissoluta in Melle & Vitello oui, cum vna iniectione mista, idem facit, eoque magis, si puluis sarcoticus quoque addatur.

Vnguenta, Pompholygos, de Cerusæ, de Plumbo, similiter cum iniectionibus quandoque ad 3.vj. pro vna dosi mista inijciuntur.

Ad dolorem sedandum, quando ille admodum affligit, sequentia, etiam vlcus simul respicientia, vsurpantur.

Lac omne iniectum dolorem sedat, abstergit.

stergit & glutinat : præfertur mulieris, caprinum & ouinum : Siccabitque amplius si filices igniti in eo extinguantur. Anodynumque magis fiet, si mucago Psyllij, Lini, Cydoniorum, & infusio gummi Tragach. & Arab. Albumen oui, nonnunquam & Vitellum, bene conuassata illi addantur, sæuienteque dolore parum Opii. Et si simul abstergere velimus, Mel vel Saccharum.

Decoctum dolorem lancinantem & ardentem compefcens, fit ex hordei mundi p. j. feminis Lini vel Fœnogræc. ʒ. j. Psyllij, Papauer. an. ʒ. ʒ. Quatuor seminum frig. mai. ʒ. vj. rad. Altheæ, Maluæ an. m. j. Anethi p. j. decoctis in Aqua vel Lacte: addito quoque, vti dictum, Melle vel Saccharo.

Huic si Portulacæ rec. m. j. flor. Nymphaeæ p. j. addantur, magis ardorem extinguet: sensumque parum retundet, si rad. Mandragoræ ʒ. ʒ. feminis Hyosciami ʒ. ij. quoque incoquantur.

Succus Portulacæ, Lactucæ, Solani, Plantag. cū Lacte vel Decocto, eo nomine quandoque permiscantur. Vel Aquæ horum destillatæ.

Trochisci albi Rhazis cum opio, dissoluti in Lacte vel Decocto iam dicto, dolorem compefcunt, & simul sanant.

Olea necessitate urgente quandoque adduntur, vt Rosarum, Momordicæ, Papauerinum, imprimis seminis Hyosciami: Ligustrinum astrictiois quoque causâ aliqui commendant.

Fotus & infusions, si in pudendo sint vlcera, vel eò vergant, præcipuè proderunt, nam & vires illorum quoque ad interiora sinus pertingunt, vlceribusque si illic sint, communicant. Paranturque ex decoctis quoque illorum simplicium, ex quibus iniectiones fiunt: eligendo, prout detergere, vel siccare, vel etiam dolorem lenire intentio, de illis quæ hoc præstant iniectionibus. Vbi & quâdo vlcus siccare admodum volumus, Metallica quædam supradicta vti & Ferri scoriam, addimus.

Thermæ quoque siccantes, Aluminosæ, Sulphureæ, in vlcerib. diuturnis vsurpantur, eoque mulieres, in hoc casu desperatas, tanquam ad vltimum remedium, ablegamus.

Pessariis ex materia spissa formatis, vel in sacculo, in sinum vteri erosum vel exulceratum, inditis, si ferre ea possint, quorum materiam & digito in sinum indere possumus, idem præstamus.

Anodynum ex adipe Anserino, vel Gallinaceo, vel Porci, & Ceruino sēuo, & Oesypo, additâ & Cerâ albâ, si spissius esse oporteat, fit, addito Vitello oui, interdum & Mucilaginis, aliquando & Croco: cuius oleum alij potius miscent: nonnunquam & Opio.

Verbenacæ rectæ folia, cremorem seminis Hyosciami, & liquorem Mandragoræ, pessariis addit Diofc.

Ad abstergendum hoc inditur: R. Lariacæ lotæ cum succo Apij ʒ. ʒ. Myrrhæ ʒ. j. rad. Aristoloch. ʒ. ij. Sacchari ʒ. ʒ. misce, fiat pessus. Si Fellis parum addatur, vel Alumen, vlcera putrida absterget.

Possunt & Vnguenta deterfua in iniectionibus dicta, indi, vel illis interna inungi.

Ad siccandum illic quoque explicata Vnguenta competunt, vel Pulueres & Succi ibi etiam expositi, commisti: quæ additis mucilaginis, Cerâ, aliisve inspissata, vsurpētur.

Fumi admissi, cum nō solum ad pudendi interiora, sed & in sinum vsq; penetrare possint, ad vlcerum siccationem vsurpantur, sicuti in nariū profundis vlceribus hos quoque competere diximus: vbi & descripti fumi tam odorati leuiore, quàm fœtidi, longèque potentiores, qui & hîc minùs quàm si nariibus excipiantur, molestiam pariunt, vel nocere possunt, habitâ ratione causæ, vti illic quoque ostensum, illis locis excepti, plurimum proderunt.

Si à Lue venerea vlcera in pudendo vel sinu vteri fiât, citra vniuersam huius luis curationē & ablationem è corpore, sanari minimè possunt. In qua perficiēda, per varios modos, si hæc per fumos Cinnabaris fiat, non solum generatim hanc infectionē extirpâdo, sed & si etiam sinu vteri excipiantur, priuatim hæc vlcera, vt citius sanentur, efficiunt. Quod eodem modo per curam, quæ per Hydrargyri inunctionem fit, non solum exterius illa vnguenta adhibendo, sed & in loca hæc penitiora indendo. Sicuti hæc omnia in cura luis venereæ demonstrabuntur.



# DE PODICIS D O L O R E.

## CAPVT XV.

### Genera.



PODICIS seu ani dolores interni hi intelliguntur, qui exceptis illis, qui in labris illius & cute rugosa finitima, ob fissuras vel aliam læsionem oriuntur (qui in externis, uti & labiorum oris eiusmodi affectus explicabuntur) in reliqua illius sede, occluso podice, latente, ex fine recti intestini, & musculis illum ambientibus, constituta, occurrunt. Quorum genera quoque ex sensu doloris & tumoris statuuntur.

*Ardens  
& infla-  
mans  
Podicis  
dolor.* Cum ardore dolor quandoque ea in sede oboritur: vel solo, vel accedente etiam tumore, & tunc à causa Inflammatio ani dicitur. In qua calent tumentque & rubent admodum interiora podicis, nonnunquam & exteriora simul. Dolorque contactu, sensione, & ab excrementis exituris, valde irritatur: eoque magis, cum aluum per conatum protrudi, ut excrementa exeant, necesse sit, quod hic, non nisi magno cruciatu fieri potest. Ob tumorem tamen & calorem, plerumque aluus, uti & vrina, suppressa sunt. Abscessum post se inflammatio nonnunquam relinquit; Vel alium aliquem in venis illius loci, uti dicitur, affectum, qui aliis de causis etiam oborti, inflammationem aliquando quoque comitem habent. Quæ & interdum anum procidentem inuadit, huicque affectui iungitur. Sicuti hæc omnia & contactu & visu quoque, inuerso podice, dijudicari possunt.

*Hæmorrhoidis  
cæca.* Cum tumore collecto, citra inflammationem, nisi ratione doloris accedat, dolor in podice exortus, quia à vena illius loci fit, Hæmorrhoidis, eaque Cæca, quia nullus tunc sanguis effluit, quæ Clausa vel Dolens rectius diceretur, appellatur. In qua tumor in podice, per conatum expresso, apparet: vel profundè magis latens difficilius percipitur, & tantum ab ægro per sentitur. Dolorque alioquin vehemens, ex compressione, vel impulsu excre-

mentorum, vehementer exacerbatur: Inflammatioque nonnunquam illic copulatur, quem sanguinis interdum effluxus seu hæmorrhoidis aperta sequitur.

Cum tuberositate inæquali & veluti ex-  
*Condyloma in  
podice.  
Seig-  
wargen.* crescentia quadam, sensim non ita subito, ut in hæmorrhoidi nata, dolor in podice exortus, quia in modum digitorum articuli prominet, Condyloma dicitur, quale & in pudendo mulieris frequenter nasci diximus, & in utroque sexu in podice quoque oriri solet. Quod aliàs molestiam quandam & tædium tantum hisce locis adfert, aliàs dolore quoque, præsertim si accedat inflammatio, affligit. Qui tumor in margine interiore, & ani & pudendi, si illic fiat, extrorsum prominet conspicuusque est, nunc ficum, unde Ficus quoque dicitur, referens: nunc verrucam, quæ si pendeat, Thymus dicitur: quæ duo, vno nomine Germ. in huius tumoris appellatione, cum Seigwargen vocent, comprehendunt: aliàs baccae vix vel mori figuram exprimit: ego cuti rugosæ & callosæ, ac cristæ galli eundem per similem sæpè spectavi. Qui affectus vel solitarius, vel cum Lue venerea aliisque affectibus interdum iunctus, existit.

Cum vlcis sensu dolor in ano obor-  
*Vicerossus  
podicis  
dolor.* tus, interdum à morbo, à quo fit, Vlcus podicis appellatur, in ani interioribus, non labiis illius aut cute existens, & ab eo, quod tenesimum inducit, quod non tantus egrediendi conatus sit, differt. In hoc, quando fordium est, pus è podice vel seorsim, vel in sæcum initio emanat. Quandoque & fit, ut sinuosum factum, & in fistulam conuersum, prout ea vergit, nunc in vesicam, nunc in vteri ceruicem in mulieribus; pus effundat, quod & postea ex illis quoque locis effluit, & cum vrina quandoque redditur: & tunc quando æger crepitum edit, illud per sinum vteri, si eo vlcus vergat, quoque erumpit. Sed & vlcera sinus vteri & ceruicis vesicæ, uti illic dictum, interdum hæc præcesserunt, & in ani vlcus desinunt. Huc & vulnera referuntur in podice facta, in quibus sanguis ab initio, postea quando in vlcus conuertuntur, pus redditur.

## Causa.

**M**orbi eiusmodi dolores in podice procreantes, in illa ipsa sede existunt: qui sūt vel inflammatio, vel hæmorrhoids, vel condyloma, vel exulceratio.

*Inflam-  
matio  
podicis,  
vel phlo-  
gosis, cau-  
sa Ar-  
dentis il-  
lim do-  
loris.*

Inflammatio vera, seu saltem phlogosis in podice facta, dolores illos arduos in eo, cum tumore vel sine eo, procreat, admodū cruciantes, cum pars sit exquisitissimo sensu prædita. Cuius causā ab iisdem, à quibus in tenesmo rectū intestinū exulcerari posse diximus, si dolorem adferant, proficisci possunt, qui si magnus sit, inflammationem potest accersere. Quæ & cum podex injuriis pateat, ab aliis externis causis illum lædentes, fieri potest: vt à vulnere, vel conrusione, & in equitatione quibusdam accidit, vel ab alia offensa: sicuti cuidam cum chartā, in quā piper prius inclusum seruabatur, podicem abstergeret, atque alteri cum manu, quā capsi filiquam fregerat, & tractarat, anum attigisset, ardor intolerabilis, instar gehennæ, vti vocabatur, in sede subortus est.

*Sanguis  
in vena  
hæmor-  
rhoidali  
retentus,  
causa  
Hæmor-  
rhoidis  
cæcæ.*

Hæmorrhoids cæca seu dolens, hoc est, vena aliqua è hæmorrhoidalibus dictis, per quas in quibusdam naturis è podice, vti mulieribus è venis in sinu vteri, sanguis certo tempore emanare solet, in tumorem eleuata, doloris secundum genus, vti illic dictum procreat: non tam, quod ipsa vena adeo doleat, cum venæ non adeo sentiant, quam quæ partes quæ ob eximium sensum vix contactum ferre possunt, quibus intexta est, distendendo, dolorem in illis exciret: eoque magis, si ob dolorem accedat etiam inflammatio, vti ferè fit, latius tunc tumore se extendente. Cuius causa, sanguis in extremum venæ, vt per hæmorroidum fluxum expurgaretur, delatus existit, si illis, quia osculum illius venæ non patet, vnde cæca hæmorrhoids dicitur, aut ægrè aperitur, retentus, atque in vena cumalatus, exitum quærens, adeo extremitatem huius venæ, magis minusve, prout copia est sanguinis, protrudat dilatetq;. Quod illis, quibus nunquam adhuc hæmorroides fluxerunt, si natura eas mouere conetur, in principio, quia oscula nunquam illis prius aperta fuerunt,

nonnunquam euenit. Vel tunc quoque, si per venam aliquam externam, & ferè in ano conspicuam, hoc natura tentet, cum harum venarum oscula, ob attritionem frequentem, à duris excrementis factam, duriora callosioraque magis facta, tunc ægrè aperiantur: quod verò facilius & sine labore fiet, si per profundiores hoc ani venas, in latiore recti intestini sede positas, quorum oscula molliora & patentiora sunt, natura, vti ferè solet, moliat. Sed & à duris excrementis hæc oscula lædi, inflarique possunt: aut alio conatu, quo nomine & in partu dolor hic hæmorrhoidalis plures mulieres infestat. Qui dolor ob causas iam dictas excipit, maior quoque erit, si sanguis qui illic retinetur acrimoniam aliquam, aut aliam malignitatem habuerit. Sed & pro osculorum, carnisque illa ambientis, sanguinisque diuersitate, hæmorrhoids illa tumens, diuersas formas adipiscitur.

*Hæmor-  
peruer-  
sus causæ.  
Condy-  
lomata  
in ano  
& pu-  
dendo  
mulieris.*

Condyloma non solum in podice, sed & in pudendo mulieris, doloribus inde natis, occasionem præbet. Cum enim harum partium interiora, quæ substantiā nerueā ac proin summe sensili, sunt, naturā non admodum diserepent, à causa simili, eundem quoque affectum patiuntur. Quam causam humorem aliquem peruerfum & malignum esse, hoc satis demonstrat, quod eiusmodi condylomata, tum in lue venerea, & licet ea non adsint, tamen ex impura alioquin commistione & concubitu, vti vlcera non solum in pudendis, in hoc actu, contactu inquinatis, sed & in vicino inguine bubo, sic & tunc quandoque etiam condylomata, vel in pudendo vel vicino ano, nascantur. Qui humor perniciem aliquam in se habens, per contagium plerumque, vti dictum, corpus subit, & vti aliis in locis alia vitia, sic in hisce locis eiusmodi vel ficus, vel verrucas, vel alio modo se habentes excrescentias, protrudit: sicuti quomodo hoc fiat, in lue venerea, & bubone, cancro, vberius ostendimus.

*Vlcus &  
vulnus  
in podice  
causa vti  
cero si il-  
lim doleat  
quan-  
tū.*

Vlcus ani, interdum doloris & puris ex eo loco excretionis, vti dictum, causa existit. Quod ab inflammatione prægressa, in abscessum, eoque rupto in vlcus conuersa,

357

quandoque fit, & quia profundum est, sordidum existit. Vel etiam ab exulceratione, quæ in teneſmo fit, ſordeſcente, & in hoc vlcus mutatâ, originem ſumit. Et proin à cauſis, à quibus inflammatio & vlcus in teneſmo, vti illic oſtenſum, per horum intermedium quoque, hoc vlcus naſcitur. Aliquando & ab vlcere ceruicis vteri & veſicæ, hucusque penetrante, vti dictum, fit. A vulnere dolor quoque naſcitur, ab externis internisve, vti in teneſmo oſtenſum, leſo punctum ſectumve podice.

## Curaatio.

**P**RO ratione morbi inſtituitur cura, eo ordine, quo frequentius hi occurrunt. Sicq; alia debetur hæmorrhoidi, alia condylomati, alia inflammationi, alia vlceri.

Plamore  
rhoidis  
cauſa  
ratio.

Hæmorrhoides cæca, quo nomine, vti dictû, venam in podice tumentem, obturatam, dolorem inferentem, intelligimus, ſi non bene tractetur, in inflammationem, indeq; in ea, quæ eam ſequi ſolent, peruerſa vlcera, aliq; vitia commutari poteſt.

Præcauetur autem hæc etiam, quando facile hoc quibuſdam contingit: quod fiet, ſi in illis qui conſuetas habent hæmorrhoides, fluxus harum decenti tempore, promoueat, nec impediatur: quod quomodo fieri debeat, in ſuppreſſis hæmorrhoidibus dictum fuit.

Curabitur verò iam facta, ſi cauſam quæ eam excitauit vel fouet, ſanguinem ſcilicet auertamus, & dolorem ſubito ob metum inflammationis compeſcamus, indeq; tumorem illum, diſcutiendo ſiccandoq; abſumamus: quòd ſi in vlcus deſinat, vti aliquando fit, vt vlcus curatur. Quod remediis ſequentibus præſtatur.

Sanguis reuellendus ne ad partem affectam fluat, eamque diſtendat vel etiam inflammet, eoq; magis ſi iam adſit inflammatio. Quòd fit venâ ſectâ in brachio: dein & deriuandus, venæ in pede poplitis vel maleoli apertione.

Cucurbitulis idem præſtamus, eas cum reuellendum hypochondriis & lumbis, cum deriuandum, coxis affigendo.

Sanguifugis admotis podici, ſanguinem

retentum prolicimus, ſi dolor vel inflammatio non impediatur.

Alius lenienda & excrementa mollienda, vt facile tranſeant, ne ſi cum labore hoſiat, aut dura ſint, locum affectum irritando amplius lædant. Idque fit exhibitis in cibis iuſculis, fruſtibus, oleribus, emollientibus: item Caſſiâ, Mannâ ſimilibusque: Clyſmatis item, ſi canalem podici intruſum ferro poſſint.

Exhibentur ad eas abſumendas etiam quædam per os: Veluti Anonidis decoctû, quod potum probat Dioſc.

Verbaſci, quem tapſum barbatus vocât, puluis exhibitus cum Lacte vel alio modo, valde probatur ad hæmorrhoides tumentes abſumendas. Aliqui cum æquali quantitate farinæ Tritici permiſtum, atque Vitello oui, Butyro & Oleo frixum, aliquot diebus portionem illius paſtæ exhibendo, id pro ſecreto habent.

Idem, ſuccus Tapſi barbati per ſe vel cum Saccharo penidiato exhibitus, præſtat: Vel priùs cum Saccharo in formam ſyrupi coctus: Vel addito puluere Liquiritiæ aliſve, in formam electuarij redactus.

Bdellium, Galbanum, emollita ſyrupo de Plantag. vel ſucco Tapſi barbati, & in forma pilularum exhibitâ, ad 3. j. vel plus, moleſtas hæmorrhoides ſanant.

Narcotica dolore ſummè vrgente, exhibere quandoque neceſſe eſt.

Topica quæ loco dolenti, podici ſcilicet adhibetur, vel ad anum proximè apponuntur, vel etiam cum tenta aut bombace, vel ſolâ in eum intruduntur, vel ſi liquidiora ſunt, etiam aliquouſq; ſi ferre canalem poſſint, inſunduntur: nonnunquam & loco dolenti ſuper aſperguntur, vel in podicem inſuſtantur.

Ad dolorem ſedandum ante omnia adhibentur anodyna, quorum aliqua etiam calorem, ſi adſit, contemperant: additis ſi dolor magnus, ſtupéſcientibus, quorum multa eaſdem quoque abſumunt.

Oleum commune, vel aliud expreſſione factum ex Amygdalis, Perſicis, Nucibus, id præſtabit inunctum, ſi in illo coxerint fruſtus maturi Chryſomelorum, vel Mo-

mordicæ, vel herbæ Paridis. Aut quod expressum sit ex semine Cucurbitarum, Papaueris, aut Hyosciami. Vel oleum de Vitellis ouorum, Item oleum Nucis indicæ, de Been, & Sesaminum.

Vel hoc linimentum, quod Recipit oleum Violaceum aut Rosaceum, vel Nymphææ aut Salicis; quæ prius aquâ Viol. ablui possunt: vel oleum seminis Lini, aut Amygd. dulc. additis nonnunquam & ex aliis anodynis quædam: item Butyrum recens, Vitellum oui vnum vel duo, cruda vel elixa: subigantur inuicem in formam linimenti.

Huic linimento, pinguedo Anatis vel Gallinæ, aut Porci, vel Sæuum de renibus, potissimum Capræ, Hirco, Cerui, medulla cruris vituli, Pomada, Oesypus, addi possunt. Item Cera alba (quæ quoque lauari prius potest) vt inspissetur in formam vnguenti.

Cui & mucagines seminis Lini, Fœnogræci, Psyllij, vel Albumen oui commisceri possunt.

Nonnunquam & pulueres cort. Mandragoræ, seminis Hyosciami, Papaueris. Vel si admodum dolorem mitigare velimus, ad ʒ. iij. harum illinitionū, Opii ʒ. j. & Croci ʒ. ʒ. additur.

Quorum loco vnguentū Populeon præfertim si ardor adfit & calor, sumi potest: vel illud suprædictis misceri: addito simili modo quando amplius anodynum esse volumus, Opio & Croco.

Inseffus & fatus, qui & injici possunt, anodynii sunt ex Lacte, vel ex Malua, Bismalua cum toto, Verbasci candidi foliis & floribus; floribus item Chamomil. Meliloti, Anethi, Sambuci, Nymphææ, Violarum, semine Lini & Fœnogr. decoctis in Aqua vel Iure pingui, additis nonnunquam in fortu etiam oleis.

Ex cuius decocti facti in Lacte residentiâ contusâ, additis oleis & farinis, cataplasma quoque fieri potest. Qualia multa anodyna eiusmodi cataplasmata passim describuntur.

Cuiusmodi & hoc est: R. Panis ablatus crustus, ex tritico, speltâ vel siligine: vel farinæ horum q. ʒ. coquatur in Lactis & olei Ros. vel Viol. vel Butyr. aquis partibus, & cum

duobus Vitellis ouorum, post coctionem subigatur in formam cataplasmati. Cui & pulpa Pomorum prius afforum, Mucilagines Lini, Psyllij, Altheæ, addi possunt: Crocus item donec bene stauescat.

Portulacæ recentis folia, vel Solani, Papaueris item & Hyosciami recentia. contusa, vel parum sub cineribus cocta, vel in parella cum oleo frixa, in emplastrum redacta, admodum dolorem compefcunt.

Caro vitulina recens, aut alia adhibita, vel humor ab ea expressus, inunctus, anodynū est medicamentum.

Ad absumentas potissimum tumentes hæmorrhoides, admittis tamen semper illis, quæ dolorem simul, si ille adhuc perseueret, mitigant, ea quæ digerendo, vt subsideant faciunt, vsurpantur: vel cum illis non cedunt, quæ validius adhuc siccando, citra tamen morsum, si dolor adfit, vel si ille absit, etiam cum aliquâ acrimoniâ id præstans.

Cataplasmata in hanc rem sunt, ex Verbasci candidi seu tapsi barbati foliis & floribus, item Scrophularia, Plantagine, Hieracio nigro, Scabiosa, Corona regia, Millefolio, Virga past. Cynoglossio, Marrubio, Porri foliis, Brasica. Si ex illis aliqua vel plura recentia contusa, vel prius parum tosta sub cineribus, vel alio modo applicata, vel cum Butyro aut Oleis subacta, apponantur. Quo modo ex Scrophularia vnguentum paratum laudat Matth.

Vel tale, quod & dolorem simul compefcit: R. rad. Liliorum ʒ. ij. radic. Ireos rec. ʒ. j. fol. Tapsi barbati, Scrophulariæ; additis quandoq; & ex aliis suprædictis an. ad m. iij. flor. Chamomel. Meliloti, Anethi, Hyperici ana p. j. Palmularum seu dactylorum num. x. Limacum rubrorum nudorum sine testis, si haberi possunt, aliquot, fiat decoctio in aqua chalybeata, contundantur, addendo farinæ semin. Lini, Fœnogr. an. ʒ. j. Butyri ʒ. ij. Myrrhæ, Thuris an. ʒ. ij. Croci ʒ. j. Vitellos ouorum. iij. fiat cataplasma.

Ex bulbis Porri, Caparum, sub cineribus coctis, vt acrimoniam amittat, & cum Oleo Rosar. vel alio subactis, factum cataplasma, eas digerit. Quod potentiùs adhuc operabitur, si bulbi Dracunculi & Ari cocti quoq; 82



561

& Oleo, ne vrant, misti, vel foli si ferri possint, adhibeantur, vel reliquis bulbis additi. Qui omnes bulbi & prioribus cataplasmatibus miseri possunt.

Inseffus, fatus cum spongia vel sacculo quoque fiunt, ex earundem plantarum & feminum decocto, additis etiam cum saltem anum hisce fouere volumus, Dactylis & Limacibus: addendo quoque alias aliquas ex supradictis hæmorrhoides absumentibus plantis: & si admodum eas exiccare volumus, etiam fol. Sumach, Rubi, Malicorium, Balauftia, Gallas, Rosas, baccas Myrti, similiaque in exulceratione ceruicis vteri proposita, decoctioniq; aqua Ferrata & Vinum rubrum addatur.

Inunctiones eo nomine quoque fiunt, oleorum Chamomil, Meliloti, Anethini, Hyperici, Liliorum: imprimisque oleum Oliuarum, vel aliud expressum, in quibus coxerint semina Raphani, Cataputig, vel Lumbrici, Aselli, Millepedes, Sanguifugæ, Limaces rubri nudi sine testis, vel Lateres, ol. de Lateribus dictum.

Linimentum ex illis quoque fit, addendo aliquibus, plantarum in cataplasmate primo expositarum, tum etiam bulborum dictorum, atque insuper Apij seu Petroselinij, nec non Milij solis succos: Vel si agitati prius interdum in mortario plumbeo cum Terebinthinâ in formam nutriti redigantur: illis quædam ex sequentibus in vnguento descripta, addi possunt, vti & Cera si spissioria esse debeant.

Capam excavatam aliqui Oleo conuenienti adimplent, imponendo simul Æruginem æris, & sub cineribus coquunt, succum exprimunt, eumque inungunt.

Vnguentum conueniens sic fit: R. Thuris vel Mastiche, Myrrhæ ana ʒ.ij. Bdellij, Lycij veri, aut ex succo Sumach parati, vel illius loco Hypocist. ʒ. j. Croci ʒ. j. mucilag. feminis Psyllij & gummi Tragach. an. ʒ. ʒ. Vitellum oui num. j. ol. Rosacei parum, fiat linimentum: cui si dolor adhuc adsit, Opij ʒ. j. additur: vel olei feminis Hyofciam tantundem, quæ præter narcosin, etiam vim eas absumendi, habent.

Magis siccat easque consumet, si huic

linimento Cerusæ, Plumbi loti, Lithargyris, Tuthiæ ad ʒ. iij. addantur: item aliquid de lapide Arabico, teste Dioscorid. augeturq; ol. Ros. prius ductum in mortario plumbeo aliquandiu, & Mucagines, cumque Cera alba fiat vnguentum.

Quod adhuc efficax erit, si dolores non obstante, Vitreæ, Aluminis vsi, & non vsi ad ʒ. j. vel Æruginis æris vel Ferri rubiginis ʒ. j. addatur: & Camphoræ ʒ. ʒ.

Suppositorium in si ferre possint, ex Sæuo, Vitello oui: Cera albâ si non adeo solidum sit, vt intrudi possit, paratum: cui Opium, aliæve, addi possunt.

Suffitus ex decocto supradicto dum feruet, exceptus, vel ex paucioribus, aut solo Tapso barbato, dolorem quoque compefcit.

Fumus podice exceptus à puluerisato Lolio, vel Tapso barbato, aut Scrophularia, supra carbones, aut laterem vel ferrum candidentia, proiectis excitatus, absumit & siccat hæmorrhoides: Efficacior erit, si Sulphur simul vratur.

Ex Melle anacardino fumum hac ratione excitatum exiccare scribunt.

Supra asserem, ex ligno Pini plano facto, inunctum pinguedine aliqua vel oleo, si asger sedeat, iuuare aliqui scribunt.

Condylomata, si ab impuro congressu aut contagio alio citra luem veneream nascantur: tunc euacuato corpore, per venam sectam, purgationes, sudores, eodem modo, vt in alijs vitiis à malignis humoribus progressis, topica loco affecto, quæ ea absumant, adhibentur. Quod si verò à lue venerea infectis erumpant, tunc eadem curâ, quæ huic lue accommodata, per purgationes sudoresque institutâ, sicuti in illius cura dicitur, simul plerumque tolluntur, quod si remaneant, integrè nondum morbum curatum esse denunciant, ob id cura repetitur, atque interim topica loco affecto, vt supra dictum, quæ ea absumant, additis etiam illis, quæ hanc luem respiciunt, admouentur, donec penitus euanescent.

Topica verò quæ adhibentur, vt condylomata absumant, cum digerendo, siccat.

doque, vt in tumefcentibus hæmorrhoidibus, id quoque præsent, eadem ferè quæ illic exposita sunt, hîc quoq; competunt. Imprimisque fortiora illic descripta hîc præcipue vsurpari possunt, cum contumax admodum hæc sit extruberantia, quæ leuioribus non ita facile cedit, dolorque hic non adeò vehemens, vt in hæmorrhoidide, in qua interdum maior dolor illa ferè non potest, illorum vsu non impediatur, atque etiam illis adhuc potiora cathæretica, medicamenta, nonnihil quæ addantur.

Cataplasmata proin illic exposita, & infusus, fotus ex iisdem simplicibus, bulbis, parata, hîc quoque proderunt. Confertque ad hæc præ cæteris hîc quoque Scrophularia, Taplus barbarus, Plantago, Rubi folia, & præter hæc Parietaria, Mercurialis, Barbaea, Sabina, Ballote, Capillus ven. Libanotis, Thymus, Thymbra, Ruta, recentia tusa vel cocta vel subacta, vti illic dictum, administrata: maximè vt efficaciora sint, in Vino rubro cum Aqua ferrata, vel Aceto & aqua, aut Lixiuio cocta, & in fotu cum spongia vel sacculo applicata. Confert & radic. Quinquæ folij & Aristot. rot. decoctum, cui baccæ Lauri addi possunt, aliæve potenter siccantia & astringentia, illic quoque descripta. Quibus Sal & Nitrum quoque addi possunt. Cotonæa cruda eiusmodi cataplasmatibus addere iubet Diosc.

Stercus ouillum vel gallinæ cum Saponē vel Aceto subactum & appositum prodest: cui & Fel capræ addi potest.

Vel Pix liquida & Ammoniacum in Aceto forti dissoluantur & applicentur.

Vnctiones variæ in hæmorrhoidide dolente traditæ, hîc quoque conuenient, si efficaciora præsertim ex illis eligantur, hîcque imprimis vnguentis illis, cathæretica illic exposita, addi possunt.

Quibus & sequentia admiscere licet: R. succi Barbareæ, Apij veri seu Petroseliniana 3j. β. ol. de Lateribus 3ij. Boli 3j. Terebinth. q. s. fiat instar nutriti.

Vel: R. olei de Tartaro 3. β. lap. Calaminaris vel Hæmatidis, vel Minij 3. ij. misce: Vngatur.

Item: R. cineres Sarmentorum vrium

Vinaceorum, & cineres Anethi cremati, & Piscium salitorum cineres, puluerem item Sabinæ: cum Aceto, subigantur: Et inungantur.

Aliud: R. Aloës, Thuris, Sandaracæ, an. 3j. β. gummi Ammon. dissoluti in Aceto 3j. Aluminis 3. ij. lap. Hæmatidis vel Minij 3. j. Gallarum 3. β. Croci 3. j. Oui vitellum assum vel vstum num. j. Terebinth. 3. j. olei Rosacei & Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Efficacissimum hoc erit: R. Mercurij 3. ij. dissoluatur, cum Terebinthinæ 3. j. olei Nucum 3. ij. Minij 3. ij. Aluminis, Vitreoli an. 3. j. Aeruginis æris 3. β. Ceræ parum, fiat linimentum. Cui tantillum Sublimati additum illud efficacius reddit.

Puluis hic subtilissimè tritus, si huic carni laxæ inspergatur, eam admodum exiccat & absumit: R. rad. Aristoloch. rot. 3. j. Sabing fol. exicc. 3. ij. cinerum ossium Myrobalan. & Hermodactyl. vstorum ana 3. j. β. Aluminis 3. j. Chalcitidis 3. β. Auripigm. rubr. 3. j. fiat puluis, cui opium addi potest, vel radic. Mandragoræ.

Sublimatum in aqua coctum, aliòve modo appositum, vti in antrace dictum, eas auferit. Oleum Vitreoli: & de Antimonio idem facit.

Fumi siccantes ad podicem admissi, condylomata admodum siccant & auferunt: quales in narium vlceribus expositi sunt. Imprimis si ex Cinnabari fiant. Cuiusmodi in lue Venerea, si præsertim inde fiant, expositi sunt.

Abscinduntur interdum condylomata, si dura sint verrucarum instar, vel si propendeant, seta ligantur aut filo, vt sic marcescant.

Inflammatio ani siue sola sit, siue hæmorrhoidibus dolentibus aut condylomatibus copuletur, eodem ferè modo, vti cæteræ inflammationes externæ, sicuti etiam de pudendi mulieris inflammatione dictum, tractabitur, & si in vlcus definit, vlcus curabitur.

Itaque per venæ sectionem, quæ in poplite facta admodum deriuat, cucurbitulas aliaque reuellentia & deriuantia, si influxus timeatur, cum auertimus.

Laxantibus exhibitis, facies alui, ne in transitu

Inflam-  
mationis  
anæ co-  
rativæ.

567

transitu per podicis angustias malum irriterent, emollimus: Quod clysteribus ægrè, cum canalem difficulter admittant, perficitur.

Alterantia propinquantur frigida & humida, in visu, potu, & medicamentis. Inter quæ aquam Lentis palustris quoque commendat Dioscor.

Topica quod attinet, Anodynis ab initio statim, dolorem, cum in parte exquisitissimi sensus magnus sit, compescere: & simul ardorem refrigerantibus, sed citra astrictiorem magnam, unde pars exasperata magis doleret, restinguere studebim<sup>9</sup>. Qualia multa in inflammationibus externis traduntur, hæcque imprimis ea, quæ in hæmorrhoidæ dolente proponuntur, dolores sedantia & stupefacientia, uti & refrigerantia, inflammationi huic quoque competent, tam inunctiones quàm infusus, fofus & cataplasmata.

Præter quæ hoc linimentum utile quoque quando potius refrigerandum erit: R. succorum Portulacæ, Plantag. Senecionis ad 3. iij. mucilag. feminis Psyllij 3. j. Vitellum oui elixum n. j. misce: vel addatur ol. Rosac. Viol. & cum illis succi coquantur ad consumptionem, sicque vsurpentur.

Vel hoc cataplasma: R. rad. Consolidæ, Altheæ an. 3. j. herb. Plantag. Tapfi barbari, Senecionis, Sonchi, recentium an. m. j. fl. Meliloti, Rosarum an. p. j. sem. Lini, Fœnogr. an. 3. ss. coquantur & contundantur, adde farinæ Lentium p. j. ol. de Salicibus, Rosm. Viol. an. 3. j. Croci 3. j. fiat cataplasma.

In fine discutientibus, & si dūrities appareat, emollientibus, reliquias absuimus, iisdem remediis, uti in cæteris inflammationibus fieri solet.

Ulcus  
ex vul-  
nerum  
podicis  
curatio.

Exulceratio seu alia solutio continui in podice facta, in parte hac sensili, negotium admodum facessit, nec dum curam, in loco hoc angusto & humido tam facile admittit: Quod in fistulam definit, deterius adhuc: Pessimum quod cacoëthes & cancrum. Si vulnus sit, ut vulnus sanabitur. Si vlcus, siue à vulnere aut inflammatione sola, vel cum hæmorrhoidæ iuncta proficiatur: præmissis quæ corpus purum & mundum red-

dunt, unde facilius postea vlcera sanantur, ex iis quæ in vlceribus externis descripta fuerunt, hæc potissimum in cura vlcerum ani obseruanda.

Per os sumuntur, quæ copiosè sumpta vel frequenter etiam, ad exitum intestinorum vires suas possunt extendere: ut Lac affatim & sæpè bibitum. Vel illa præsertim, si vulnus sit, quæ in aliis quoque vlceribus externis ea sanare creduntur: uti sunt herbae illæ traumaticæ, inter quas, præter Solidagines & similia, Betonicæ decoctum in hoc casu præsertim laudatur: item Verbascum quoquo modo sumptum, in omnibus ferè podicis affectibus commendatur. Item alia in exulceratione vteri sinus exposita. Inter quæ & pilulæ de Bdello, sicuti illic, ita & hæc profunt. Et si sanguis ob vulnus fluat, pulvis ibidem descriptus.

Topica quod attinet, eadem remedia quæ in pudendi mulieris & sinus vteri vlceribus præscripta sunt, hæc quoque competunt, cum podex sensu eximio præditus, & tener, æquè atque mulieris hæc loca, proin illi similia remedia requirit, atque ea quæ vterus ferè nequit, minimè fert. Abstergentia itaque & siccantia illic explicata, hæc quoque vsurpantur. Vti & siccantia, quæ in hæmorrhoidibus tumentibus, has absumere diximus: & si dolor quoque in vlcere vrgeat, vel inflammatio metuatur, eadem quæ in vlcere vteri sinus & hæmorrhoidibus copiosè explicata sunt, hæc quoque dolorem auferent. Quæ proin remedia, uti & ibi, in podicem vel infunduntur, vel induntur, aliòve modo, uti illic dictum, ei apponuntur, vel etiam per suffitum, sumumve intromittuntur.

Præter quæ & radix Cardui benedicti in Vino cocta, ani vlcera sanare dicitur: & Passulæ cum Rutâ, contusâ inuicem, si cacoëthes sint vlcera & cancrum, conuenienter applicantur.

Imprimis vnguentum de Minio, plurimum in vlceribus ani curandis, prodest: ut & vnguentum Lithargyri, & Chalcitidis, palmeum dictum.

Et si sanguis ex vulnerato loco immoderate ob vulnus in principio fluat, eum com-

pefcere.

pescentia, ex eum sistentibus fortibus parata, aliisve adhibitis, in vulnere aliorum hæmorrhagiis, exposita, hic quoque admoventur vel induntur.

DE HABITVS COR-

## PORIS DOLORE.

### CAPVT XVI.

#### Genera.



**H**ABITVS corporis dolorem illum vocamus, qui in partibus inter cutem & corporis interiores sedes, habitum corporis præcipue constituentibus, tam mollioribus seu carnosioribus, quam duris seu ossibus, nupis dictis occurrit. Cuius diuersa admodum sunt genera: variantia primum, quod aliqui dolores in habitu corporis exorti, alia accidentia grauiora, quæ & potius obseruantur, coniuncta habent: aliqui verò præ cæteris accidentibus sese exerunt, illis prævalent.

Qui aliis accidentibus apparentioribus & grauioribus iunguntur dolores, in habitu corporis contingentes, cum vnà cum illis suis in locis describantur, hic tantum obiter illorum, ordinis causâ, facienda est mentio. Functionum læsionibus quibusdam, dolores sic copulantur. Vt motus debilitati dolor in lassitudine dicta, tam eâ quæ post labores fit, quam spontanea nominata: qui in membris nunc vlcerosus, nunc inflammatorius, nunc tensius, nunc contundens sentitur, in motus debilitate descriptus. Dein & immobilitatis quibusdam generibus dolores quandoque iunguntur: veluti in paralysis ea specie, in qua remanente sensu tactus, molestia quædam, formicatio dicta, vel dolor manifestus, illeque nonnunquam vehemens, membra exercet. In spasmi quoque diuersis generibus dolor variis modis se repræsentat: imprimisque in eo, qui flatulentus dicitur. Dein & in spasmi quadam specie insolita, dolorem vagum per habitum corporis in extimas illius sedes discurre, subitoque iterum locum mutare, eiusmodique, multos annos aliquem apud nos ex-

cruciasse, in spasmo ostendimus. Vti & in immobilitate partium, quæ in fracturis luxationibusque ossium accidit, dolor adest. Qui omnes in motus impotentia explicari fuerunt. Et in sensu tactus deprauato, sensum quandam falsum frigoris vel caloris, molestiam & dolorem in diuersis locis in aliquibus peperisse, demonstrauimus. Febribus, eiusmodi dolores etiam copulari, in quibus membra contusa, fracta, aliòve modo affecta esse videntur, in febribus ostendimus. Dolores quoque, qui interiores corporis sedes occupant, ante hos expositi, in corporis habitum vsque interdum extenduntur, illicque dolorem adferunt: veluti in capite cephalalgias aliquas ad oculorum vsque radices protendi: & cephalæas aliquando non solum intrinsecus, sed & extrinsecus molestare, in capitis dolore expositum fuit. Vti & in collo, pectore, ventre, dolores internos, ad carnem quæ has partes complectitur, quandoque pertinere, in singulis harum partium doloribus declarauimus. Dein & superficialios externos dolores plerosque ad habitum vsque corporis extendi, mox indicabimus. Conformationum vitiis quibusdam, aliorumque affectuum, qui reiectis se potissimum exerunt, in commodis, dolores nonnunquam coniungi, qui variis modis se proferunt, in singulis hisce affectibus ostendimus.

Dolores verò habitum corporis occupantes, & præ cæteris accidentibus, si quæ alia illis iunguntur, molestiam adferentes & torquentes, ac proin hoc capite præcipue explicandi, potissimum eo distinguuntur, quatenus in habitu corporis residentes, maiori ex parte, vel circa carnosas partes, vel circa articulos, vel circa ossa sese exerunt. Hincque tria sequentia ipsorum statuuntur genera.

Carnosas præcipue corporis partes, in habitu corporis, occupantes dolores, Defluxiones, Destillationes, Catharros, dicuntur Germani. à causa quæ hos præsertim excitat, vocant. Quorum diuersæ species hinc inde in diuersis corporis partibus extra articulos positæ, qui plerumque excarnes sunt, de quibus priuatim agemus, occurrunt.

Dolores in habitu corporis, cæteris accidentibus comitis prævalentes.

Carnosa loca occupantes dolores. Defluxiones seu destillationes in habitu corporis. Germani.

In Germ.



In facie circa buccas, maxillam, iuxta aures, eiusmodi dolores seu Defluxiones, accedente interdum tumore, aliàs nullo se offerunt. Quibus dentium dolor sæpe accedit; sicuti illic explicatum est.

In colli lateribus, vel posteriori sede, tales dolores seu defluxiones quoque occurrunt, tuncque caput ægre plerumque inuertitur, dolorque inde exacerbatur. Tumentibus nonnunquam illius loci quoque glandulis. Quibus si difficultas deglutienti iungatur, Angina notha existit, in anginis iam explicata.

In pectoris lateribus carnosus, defluxionum dictus dolor quoque; suboriri solet, grauius & lancinans, qui contactu & motu, præsertim brachij, irritatur, respirationi incommodans, eamque difficiliorem reddens. Quod si pectoris accedat dolor, Pleuritis notha existit, ubi & describitur. Si respiratio admodum impedita sit, ad Dyspnœam, ubi explicatus est hic casus, refertur.

In dorsi carnosus vtrinque sedibus, dolores hi à defluxione procedentes frequenter virgent, superiore ad ceruicem, vel inferiore circa lumbos, sede: qui semper motu spinæ exacerbantur, interdum & decubitu vel compressione: aliàs verò si profundiores sint, contactum perferunt. Quibus si interni dolores accedant, illic expositi sunt.

In artuum carnosus sedibus, in brachiis & pedibus, dolores à defluxione quoque eueniunt, aliquando & in nervosas sedes protensi. Qui, si circa fulcra horum, in homoplata, & coxendicis carnis locis eueniant, qui circa illorum sunt articulos, ad articulorum dolores pertinent.

*Articulorum sedibus posidentes dolores.*  
*Articulorum dolores.*  
*Arthritis.*  
 Articuli regionem obsidens, & circa eam præcipue versans dolor, Arthritis seu Articulorum dolor, in genere dicitur. Qui cum in diuersis articulorum locis per habitum corporis positus occurrat, in eo primum differt; Quod alius generalis est, pluribus articulis, vnde & generale Arthritidis nomen seruat, quam vulgò Podagram, si etiam pedes attigerit, vti ferè fit, vocant, in artubus, brachiis, manibus, ipsorumque fulcris, coxâ, summo humero se exerens, & in dorsum ceruicemque vsque interdum quo-

que se extendens: aliquando & circa maxillæ articulum se manifestans. Alius verò dolor articulorum, particularis est duntaxat quibusdam articulis, artuum præcipue: nonnunquam articulos magnos, quibus artus innituntur, occupans, vt articulum coxæ cum femore, qui proin Coxendicus vel Ischiadicus dolor dicitur. Aliàs articulum humeri cum scapula in summo humero seu homoplata, possidens, vnde Homoplatae dolor appellatur. Nonnunquam verò in artuum articulis se offert: in pedibus circa digitorum internodia, maximè pollicis articulum, vel in pedio, vel iuxta malleolum, & Podagra tunc verius nominatur: vel circa genu, & Gonagra vocatur. Aliàs in brachiis circa digitorum articulos, pollicis quoque præcipue: vel circa carpum & metacarpium, tuncque Chiragra, German. Zipperlin dicitur. Rariùs in cubiti articulo solo hic affectus, vti verò in genu permanet, sed si illic fiat, communis ferè cum aliis quoque articulorum locis, est dolor, & sub arthritide dictâ comprehenditur. In quibusdam autem accidentibus, diuersæ hæ species arthritidis conueniunt, in aliis discrepant, hoc pacto.

Dolor vehemens plerumque in articuli vnus, vel plurium affectorum regione, & circa eam fixus, se offert: Qui in coxendico & homoplatae dolore, ab initio fixus, mox vagus, illeque per crus ad podicem, indeque ad pedem, hic per brachium, se extendit. In omnibus speciebus, motu articuli irritatur malum vti & contactu, præterquam in coxendico & homoplatae dolore, nisi dolor ad exteriora quoque vergat. Subitoque & ex improviso, hi dolores aliquem corripiunt.

Tumor plerumque cum rubedine aliqua, calore & pulsu interdum, in podagra & chiragra, aliàs citius, aliàs tardius superuenit, quæ & in gonagra, & in arthritide, in articulis præsertim excarnibus quibusdam, se aliquando proferunt. Aliàs verò citra manifestam rubedinem, œdema potius, ille tumor refert. In coxendico verò dolore & homoplatae, carnosus illis in locis, vix quicquam tale apparet, aut tumor aliquis deprehenditur.

*Coxendicus vel Ischiadicus dolor.*

*Homoplatae dolor.*

*Podagra.*

*Gonagra.*

*Chiragra Zipperlin German.*

Nodi spacio temporis, in podagra & chiragra, iuxta internodia digitorum pedis & manus, excrescunt. E quibus apertis, aliàs fluida, alba, tenax materia prodit: aliàs gyphi vel calcis instar concreta, alba, & friabilis materia: sæpe etiam in tophos & calculos plures paucioresve, inæquales plus minusve indurata, exit. Quæ cum retinentur, excrescuntque, articulum figunt adeò, vt moueri postea ægrè, tandem etiam minimè possit. Sed & eiusmodi nodos, à cubito ad carpum vsque deductos, & veluti cohærentes, in podagrico natos, atque ex illis ruptis, pulsem veluti albam emanasse, aliquoties vidi: aliosque similes in alio podagrico in auricula creuisse, illicque permanisse.

Febris synochus, vti in febribus dictum, in arthritide generali, ferè semper, in podagra, chiragra, gonagra frequenter, in coxendico & homoplathæ dolore nonnunquam cum dolor incipit, mox inuadit. Et horrore primum, mox superueniente calore ægrum molestat. Cuius etiam causâ ægri sitiunt, & inquieti sunt, pulsusque concitior fit, urinæque rubent.

Alia quoque accidentia interdum arthriticis eueniunt. Veluti spasnum quandam doloribus hisce accessisse, plusque ferè, quàm illos affecisse, aliquando obseruauimus.

*Ossium  
sedes oc-  
cupantes  
dolores.*

Ossium, maiorum præsertim, sedem occupans, & circa eam residens dolor (præter eum qui in excarnibus articulorum locis se exserit, de quo in articulorum dolore dictum est: dein & illum qui in cephalalgia & cephalaæ ad externam caluariæ sedem quoque se extendit, de quibus in aliis grauioribus symptomatibus iam actum est) duobus modis adhuc se offert, duoque constituit genera: quorum vnum, præcipue circa ossa capitis, alterum circa plures osseas sedes, se offert.

*Cepha-  
laæ ex-  
terna.*

Circa capitis osseam sedem capillosam, vel frontis, dolor quidam se offert, diuturnus & perseverans, vnde etiam vti cephalæa interna, hæc Cephalæa externa dicitur: ab altera in capitis dolore explicata differens, quòd hæc externas sedes occupet, & circa ossa versari videatur, contraque exacerbetur. Ab interna cephalæa exoritur quan-

doque fumens, & vel cum ea se offerens, doloremque capitis intus forisque se exerentem, efficiens. Vel etiam per se tantum in exterioribus affligens: Nunc in vtroque, nunc dextro, nunc sinistro, vti hemicrania, latere: nunc clauis infixi instar vnum locum veluti perterebrans Clauusque dicitur: aliquando nodos in fronte protrudens. Cum capitis dolore in lue venerea explicado, magnam habens similitudinem. Et nonnunquam etiam in aliis ossium sedibus, vti illa lues, dolore & nodis se patefaciens.

*Clauus.*

Est & alia species doloris huius exterioris in capite occurrentis, qui alios dolores à defluxione in articulorum & carneas sedes factos, præire, eosque præfagire solet. In quo capiti graue aliquid & molestum incumbere videtur, dolorque extrinsecus, ac si cutis à subiecta sede auulsa esset, sentitur, tactuque & præsertim capillorum commotione, augetur. Extuberantiaque quædam nonnunquam mollis ac oedematosa, lata & dispersa, externam hanc sedem, præsertim circa occiput & ceruicis posteriorem sedem, occupat. Aliaque interdum accidentia, quæ in capitis grauedine, intra caluariam oborta, eueniunt, præsertim si & illa, vt sæpe fit, externam hanc grauedinem comitetur, hæc quoque se representant.

*Graue-  
do capi-  
tis exte-  
rna.*

Plurimum ossium regionem possidentis, doloris, alterum genus, à morbo nouo & veteribus incognito, profectum, & ab Indis ad nos cōragione propagatum, à populis, quos primum inuasit, ab initio morbus Neapolitanus, mox cum ad Gallos quoque perueniret, morbus Gallicus vocatus est: quæ, quia per veneris vsum, maximè per contagium, corpora inficit, luem veneream alij appellant. Cuius luis, cum plura occurrant genera (sicuti suo loco explicabimus) hic dolor circa ossa residens, vnus ex illis existit: quod Germani, quia cum lassitudine, in qua ossa contundi videntur, se offert, Lemmy vocant, nos Dolorem venereum vel contagiosum appellare possemus.

*Veneræ  
lues.*

*Morbus  
Gallicus  
vel Nea-  
politano.*

*Dolor co-  
tagiosus  
venereus,  
Lemmy  
Germani.*

Circa regionem ossibus proximam, hic dolor versans, in media ferè ipsorum latitudinis vel longitudinis potissimum sede excarni vrget. Vt in tibiæ maxime inter-

*riora.*

riore nudæ fedis longitudine, & iuxta scapulas, homoplatam & cubitum, in sterni item anteriore ossea sede: quæ in hoc solo affectu, cum aliter vix ab internis causis dolere possit, dolet, & proin hæc lues etiam solo hoc signo quandoque cognoscitur. In capitulis quoque externa sede dolor hic se exerit, maximè in anteriore sede, in fronte ad palpebras se vsque extendens, & circa tempora, cephalæ externæ instar fixus hæret.

Implacabilis autem hic dolor est & atrox, cutem à subiectis ossibus veluti diuellens & dilanans, contactumque ægrè ferens. Qui sub noctem augetur, & calore non, vt alij dolores, mitescit, sed exacerbatur: quâ de causâ fortè noctu in lecto recubentes, quia tunc magis calent, grauius habent. Sensimq; hic dolor, non subitò, vt arthritidis genera, hominem inuadit.

Tumores duri seu nodi, quos Boersen Germani, illorumque causâ totum sic affectum vocant, quandoq; erumpunt: in fronte, in tibiis, in manuum externâ sede: qui se inæqualiter habent, augenturque.

Alia quoq; externa vitia, vt pilorum defluuium, maculæ, pustulæ, vlcera huic dolori copulantur, quando hæc luis venereæ species non solitaria est, sed aliis accidentibus, vt in luis hac generali tractatione suo loco ostendemus, comitata existit.

### *Causæ.*

**I**N doloribus omnibus enarratis, habitum corporis possidentibus, partes è quibus habitus corporis constituitur, sensiles saltem affici, cum hæc dolorem tantum sentiant, necesse est: quales sunt muscoli, membranæq; sensiles & nervi. In quibus dolores nunc à distentione, nunc compressione, nunc solutâ continuitate, nunc in temperie simplici, vel cum humorum congestione, aut influxu, vel qualitate malignâ prodeunt.

*Distentio.* Distentio vehemens harum partium, vt *causæ dolorum in membris, in quibus alia symptomatica prævalent.* doleant efficit. Quod fit per motum immodicum, in exercitiis & laboribus, vnde dolor tensiuus in membris, cum lassitudine tensiua nominatâ iunctus, vt in lassitudine dictum, oritur. Et à motu violento, musculus nimium retractis, cum spasmo, dolor admo-

dum exercet membra: vt in spasmo ostensum fuit. Dein & musculis maiori nisu validius aut diutius extensis, affluxumque sanguinis concitantibus, dolor non solum, qualis in lassitudine inflammatoria aut vlcerosa, se offerre solet; sed & maior, qui contactu motuque increfcit, fit: sicuti & in musculo lato mamillari primo, brachium mouente, talis dolor sentitur, quando equi, qui difficulter retinetur, freno validius attracto & retento, inter equitandum caput sustentando musculus hic diutius laborat & patitur: aliquando & pedes ac genua, cum illis stapede breuiori præsertim innitentes, lassâ & dolentia reddimus.

Viscerum internorum causa dorso accumbentium, maiorum præsertim, & per ligamenta dorso appensorum, si ea distendantur, aut in tumorem eleuentur, aut alioquin ponderosiora fiant, trahendo & distendendo membranas dorfi, quibus adnectuntur, eius dolorem, horum morborum comitem, procreant. Qualis dorfi dolor admodum frequens, qui ponderis aut veluti diuulsionis sensum exprimit, in diuersis hepatis, lienis, intestinorum, mesenterij, vteri morbis, & in grauidis, vtero foeto turgido, occurrit, in illisque affectibus expositus fuit.

Flatus in habitu corporis, ab humiditate caloreque debili membrorum natus, vel ex aliis cavitatibus in eum irrumpens, si in musculorum spatiis collectus sit, musculos attollendo & distendendo, dolorem, qui in spasmo flatulento excruciat, parit. Si in membranarum spatiis coercetur, dolores, quales in carnosissimis præsertim locis, in corpore sæpe euenire videmus, illis qui à defluxione prouenerunt, non ab similes, non tamè adeo fixos, sed vagos & diuellentes, nec ira diu perseverantes, gignit. Quod si ad cutem vsque erumpat, dolorem apparentem illic, ac discurrentem, cum palpitatione dicta, parit. Sicuti in eiusmodi affectibus, quibus dolores hi associantur, fuit expositum.

Compressio partium in habitu corporis, illas à cute, (nam cum hoc fit, ad cutaneos affectus, vbi explicabitur, pertinet) dolorem illic efficit. Veluti ex decubitu diuturno in morbis longis, membris diu pressis,

*Cōpressio, causa dolorum in membris, in quibus alia sym-*

*p'omat  
p'ana-  
lent.*

& veluti, vt aiunt, conquassatis, dolor in illis, vti & in dorso cum lassitudine, ægrum dum decumbit, & postea vbi conualuit, diu sæpè exercet. Certæ quoque partes sensiles, si validius premantur, aliquandiu dolent: quod vt variis in locis, à violentia externa, accidit: sic à neruo in cubiti sinu latète presso, dolor gravis cum stupore & fornicatione duorum digitorum, sæpè contingit.

Imprimis verò, si ossa, quæ corporis habitum firmant, nimium impulsæ, aut è sede sua declinantiæ, vicinis musculos, membranas, maximeque neruos, qui neque contactum ossium quidem ferre possunt, premunt, dolor illic euenit: qui eò maior diuturniorque existit, si partes hæc ex dolore intumescant, incalescant, & nonnihil inflammentur. Sicuti in inæquali & violento dorso motu, cervicis præsertim, magnus & punctorius quidam dolor, quando pars læsa mouetur, diu sæpè affligit. Frequentius hoc luxatis ossibus, in articulis mobilibus, accidit, offe dislocato in sedes hæc sensiles erumpente, dolore tamdiu, quamdiu os illis incumbit, eas exercente: accedente simul partis illius, cuius articulus luxatus est immobilitate: quem admodum in motus impotentia, à luxatione profecta, ostensum fuit.

Idem factis abruptisque ossibus euenit, dolorque non solum tunc, si loco simul mota, quia partes, in quas feruntur, premunt, euenit, sed potissimum, quia easdem asperitate suâ ex fractura inductâ, pungunt & lædunt, dolor vehementior adhuc oboritur. Cui dolori immobilitas membri, si ossa quæ per articulum mobilem mouentur, per fracturam à se inuicem abscedant, quoque iungitur, sicuti in motus impotentia, à fractura proueniente, dictum fuit. Vel si alia ossa frangantur, vt costæ, aut alioquin aliquid ab ossibus abruptatur, alia accidentia cum dolore concurrunt: inter quæ, ob spinas aliquor à vertebra dorsi ex casu abruptas, diuque retentas nec cognititas, dolore graui diu ægrum in dorso affligente, tumore amplum eoque tandem suppurato, vlcera successisse, postmodumque spinas illas produisse, aliquando obseruauimus.

Soluta continuitas intrinsecus in habitu

corporis, in partè sensili facta, doloribus illic se offerentibus, occasionem præbet. Vti qui in frequenter fit, cum membrana circa ventris seu abdominis regionem rumpitur: idque maximè cum erumpentibus è peritonæo, intestinis dilatato, vulnere seu scissurâ dolor crescit, tumorque tunc se offert herniosus, vbi & hic affectus explicabitur. Quod reliquas partes attinet sensiles, habitum corporis constituentes, vt musculum & neruum, cum vix, nisi externum accedat vulnus, cutem prius aperiens, ipsa vel rumpan- tur, vel illorum continuitas manifestè soluat- ur: de hisce ipsorum læsionibus, atque inde euenientibus doloribus, in cutaneis æg- mus affectibus.

Intemperies harum partium dolorè etiam parit, quamdiu hæc durat illisque impressa manet, perseverantem. Eaque & frigida & calida: quæ si extrinsecus accidat, cum cutem tunc potius afficiat, ad cutaneos dolores pertinet, vbi & explicabitur; Si intrinsecus fiat, ab influxu vel congestione humoris hoc fit, vti mox dicetur. In febrium etiam paroxysmorum initiis, frigus, & postea in progressu subsequenter calorem, dolori huic, de quo tunc in dorso & in membris cõqueruntur ægri, occasionem præbere, caloremque, tum quia partes similes omnes, in omnibus febribus eo alterantur, tum quia in continuis febribus, causa in vasis maioribus dorso vicinis contenta, neruosas partes inde magis accendit, in hisce sedibus molestiam hanc efficere, cognoscimus.

Congestus humor in habitu corporis excrementitius, accedente interdum & prauitate quadam, à nutrimenti quo partes aluntur cruditate, vel etiam vitioso portione vel ob assimilationis imbecillitatem, aut prauitatem sensim coaceruatus, dolores qui circa exangues sedes iuxta ossa, periostia & membranas præcipue versantur, vbi excrementa hæc, in locis hisce minus calidis, & vt vocant, frigidioribus facilius accumulatur, tardiusque dissipantur, quandoque gignit. Idque frequentius in capitis sede, intra caluariam & cutem illi obductam, occurrente, ob venarum illic copiam, quarum causâ excrementa faciliè ibi colliguntur, & quia

*doloru  
qui in  
tertia  
se esse  
iunt.*

*Intempe-  
ries cau-  
sa dolo-  
ri, cum  
aliis sym-  
ptomatis  
copula-  
torum.*

*Congestio  
humor-  
um, causa  
Cephale-  
æ externa.*

*Ruptu-  
ra, causa*



577

quia ob cutem crassam difficulter expirant, accumuluntur, quæ postea Cephalæam eam producunt, quæ circa exteriorem saltē hanc illius sedem occurrit. Quod & in aliis quoq; locis circa dictas sedes ossaque nuda, tali ibi materiā sensim congestā fieri potest, doloresque eiusmodi paulatim nasci, illis aliquo pacto, vti dictum, qui in lue venerea sunt, ob causæ locique aliquam similitudinem, non absimiles: vnde & hi, sicuti illi, extuberantias alias nodosque, periostio ab eiusmodi excrementis exeso, luxuriante tunc partis nutrimento, atque in callos concreto, profuerunt: sicuti in externis tumoribus hæc amplius exponuntur.

*Congestio  
humoris,  
causa  
Grav-  
dinis ex-  
ternæ.*

Verum & à congestis eiusmodi excrementis extra caluariam, dolor ille externus, quem defluxiones & arthritides præcedere & denunciare diximus, oritur: iisdem, vti in cephalæa externa, de causis, qui tamen in cephalæa, hærente illic materiā diutius, in hoc verò defluente, definit, & in deteriorem commutatur.

*Congestio  
humoris,  
causa ar-  
thritidis  
alicuius.*

Sed & eadem excrementa, circa articu-  
lorum regionem exanguem iisdem de cau-  
sis congesta, nec aliunde eò defluxa, arthri-  
tidem quandam gignere possunt: quæ sen-  
sim non subitò, vti illa quæ à defluxione fit,  
prodit, nec adeò dolorem gravem infert, &  
tumorem œdematosum potius, quàm alium  
profert. Quæ arthritidis rariùs primò incipit,  
sed aliam quæ à defluxione oritur, præcipuè  
sequi solet: idque loco affecto, ex multis de-  
fluxionibus debilitato, noua excrementa il-  
lic congerente, vnde qui sic affecti sunt, à po-  
dagra raro immunes, nunc ob defluentem,  
nunc congestum humorem, semper illius  
quædam indicia secum circumferunt, ali-  
quidque patiuntur: vel si species aliqua ar-  
thritidis alia sic fiat, quæ tandem cessare so-  
let, vti ischiadicus dolor, diu admodum pro-  
trahitur, magnasque parit mutationes.

*Deflu-  
tio hu-  
moris  
causa de-  
loris De-  
fluxionis  
in habi-  
tum cor-  
poris f.*

Influxus humorum quorundam in habi-  
tū corporis, dolores in eo, qui subitò, si con-  
festim defluant, suboriuntur, & vel Deflu-  
xiones simpliciter appellantur, vel Arthriti-  
ci dolores dicuntur, generant. Qui humores  
vel extra venas, vel intra venas priùs colle-  
cti, eò defluunt.

Extra venas congesti humores, è quorum  
defluxu dolorum duo enarrata genera pro-  
deunt, à plerisque pituitosi, à nonnullis sero-  
si esse censentur. Verum cum pituita aquea,  
quæ species illius sola in distentiora loca pos-  
test defluere, vel serum purum & merum,  
vel etiam aquea pituita mistum, si ad partes  
defluant, functionum ipsarum læsiones, vt  
resolutiones & tumores, dolore carentes,  
sicuti in illis locis descriptum fuit, potius  
quàm dolores vehementiores gignant, ve-  
risimile est, quando hi in defluxionibus &  
arthritide adsunt, & præsertim cum admo-  
dum affligunt, ab humore alio grauius affi-  
ciente eos proficisci: & proin cum fluxilis  
sit, serosum quidem esse, minimè tamen sim-  
plicem aut aqueum tantum, sed qualitate a-  
lienā imbutum, & ichoribus humorum &  
excrementis, quæ illum vehementiorem  
reddant, permixtum: quæ prout vel biliosa  
vel acra aut salsa, aut alioquin praua sunt,  
partem in quam feruntur, distendendo, vel-  
licando, variis modis plus minùsve mole-  
stant, doloreve afficiunt.

Origo verò huius serosi excrementitij hu-  
moris, à capite plerumque proficiscitur, vbi  
defluxionum scaturigo existit, & ab eo in  
partes subiectas defluit. Congeriturque ille  
nonnunquam in illius interiore sede, intra  
caluariam, præbente ei materiam sanguine,  
cuius tanta copia in capite continetur, si crudus  
aut impurus aliter inquinatus existat. Tunc enim,  
cum portio illius aliqua, vel maior, ad nutritionem inutilis relinquatur,  
concoctionemque effugiat, talia excrementa  
sensim in cerebro deponit, quæ cum de-  
labuntur, dolores, vti dictum, pariunt. Quos  
grauedò capitis, coaceruatā priùs illic mate-  
riā, & eiusdem dolor nonnunquam, aliaque  
accidentia anteire & minari solent. Sanguis  
autem excrementitius ad cerebrum delat-  
us, talis à primæ vel etiam secundæ conco-  
ctionis debilitate, vel ob ipsius cruditatem,  
vel vitium aliud, à variis causis contractā,  
gignitur: eoque magis si cerebrum insuper  
imbecillius accedat: vnde et si sanguis lau-  
datus in prima concoctione sit genitus, ta-  
men cum eum in tertia concoctione assimi-  
lare nequeat, multa excrementa deponit,

*fla, &  
Arthriti-  
dis.*

vel si iam prius non bene coctus, vel excrementis mistus sit, plura tunc excrementa accumulat. Cuius imbecillitatis cerebri causa, nunc à parentibus contracta, hæreditarium facit malum; aliàs ex senio vel morbis capitis aliisve de causis prodit; inter quas vinum narcosi suâ, & venus spiritus exhauriendo, cerebrum & nervos debilitantia, ac vires, uti vocant, eneruantia, non minimæ causæ podagræ, hæcque illorum poena, statuuntur. Quam illuviem, ab enarratis causis, in capite congestam, vel copia nimia, ut tandem defluat, mouet; vel frigus externum ab aëre, vento, madoreve contractum, ad cerebrum penetrans, ex eoque stringendo humiditates illas exprimens; vel calor à sole, balneis, caput afficiens, meatus referando potius, atque irritando facultatem excrementitiam, quam, ut volunt, pituitam fundendo, defluxiones concitat; uti & motus magni caput concutientes per sternutationem, tussim, aliòve modo facti, ut ab eo decidat humor redundans, efficiunt.

Sed & extra caluariam, inter ipsam & cutem capitis, serosum eiusmodi excrementitium humorem congeri posse, à quo defluente, eiusmodi dolores fiunt interdum, prius ostendimus, cum ex illorum congestione cephalæas externas, uti & grauedines cum cutis intumescencia, quæ alios dolores antecedere solent, nasci diximus: causamque, quare materia illic facile congeratur, simul exposuimus. Quem humorem eadem causa, quæ defluxionibus ab interioribus capitis mouent, illic explicatæ, etiam ut ex sede hac externa fluat, commouere possunt. Inter quas, causæ externæ, frigus & calor, cum mox in exterioribus. hisce locis operentur, citius ex illis quam interioribus, defluxiones, sicuti protinus horum occursum eas superuenire videmus, concitant.

Defluxus autem huius excrementitij serosi humoris, intra & extra caluariam congesti, diuersimodè fit. Is enim qui intra caluariam collectus est, si defluat, nunc aliis affectibus & doloribus, sicuti alibi dictum fuit, nunc illis qui in habitu corporis sunt, causam præbet, prout in cerebri basin descen-

dens, ex tribus cauitatibus, caluariæ fundo impressis, in aliquam illabitur, cursumque suum dirigit. Nam si in cameram superiorem fronti proximam incidat, tunc per foramina ossis cribrosi, veluti per cribrum transcolatus, è naribus instar aquæ limpidissimæ stillans, coryzam facit. Si in mediâ, quæ multis foraminibus palatum spectat, feratur, tunc, si in narium amplitudinem descendat, vel mox tenuis adhuc, vel retentus aliquamdiu crassescens & mucosus factus, per nares emungitur, aut screatu è faucibus expuitur, vel si in oculorum sedem descendat, per lacrymas exstillat: sicuti hæc in excretis copiosius explicabuntur. Si verò in mediâ hac sede, nervorum ductum, quorum aliqui quoque hæc foramina peruadunt, sequatur, vel si in posteriorem caluariæ cauitatem, quæ humilior & amplior, delatus, per magnum occipitij foramen spinalis medullæ, ipsiusque parium nervorum propagationem, descendat, in habitus corporis locum aliquem, uti & faciem delapsus, nunc vel indifferenter in partibus carnosis alicubi, aut circa articulorum regionem subsistens, defluxionum dolores dictos, vel arthriticos parit. Uti &, si extra caluariam collectus humor defluit, tunc sub cute deorsum vergens, prout se vel articulorum, vel carnosæ sedibus insinuat, dolorum genera profert. Sicuti quoque pacto in defluxu humoris intra vel extra caluariam existentis, hoc fiat, nunc explicabitur.

In carnosas itaque corporis partes si procumbat defluxio, siue è capitis interioribus nervorum ductum secuta, vel exterioribus, nam & inde sub cute ad carnosas sedes aliquousque perferri potest, feratur, tunc musculorum nervosarumque membranarum, & partium inter se mutuo connexarum interstitiis se ingerens, vel etiam inter carnem & cutem glandulasque se inferens, Defluxionum dictum dolorem, nunc grauitatis sensum exprimentem, si copia suâ grauet, vel distendentem, si distendat; vel acerbior, si qualitate aduersâ simul molester, excipit: Tumoremque interdum, nunc occultum, nunc conspicuum ad oedematis naturam accedentem; vel etiam, si dolor vehemens sit, affluxumque sanguinis proriter, aliquam

liquam in hisce partibus veluti inflammationem, eamque vel abstrusam, quæ tamen calore & pulsante dolore se prodit, vel etiam si in exterioribus hoc magis fiat locis, illic tumore & rubore non nihil se in cōspicuum dantem. Quales defluxionum dolores in dorso & ceruice, facie item, nonnunquam & in pectoris & artuum sedibus, vti in generibus ostendimus, illis in locis frequentius & facilius oriuntur, quæ loca iam aliquoties defluxiones passa, imbecilliora, laxiora, ad suscipiendum proin magis apta, & hisce defluxionibus obnoxia sunt.

In articularum verò regionem, si humor ille è caluaria elapsus, per neruorum vias feratur, aut extra eam cumularus, sub cute eò descendat, sicuti Fern. eum tantum huc peruenire posse existimat, tunc prout vel circa coxæ, humeri, genu, cubiti, manus, pedis, digitorumve articulis, aliquando & dorfi & maxillæ; vno in loco, duobus vel pluribus subsistit, diuersæ species supra enarratæ arthritidis exurgunt. In quibus locum affectum articulum esse censent, illiusque interiorē sedem affici plerique credunt, idque dolor iuxta articulos eosque mobiles potissimum sentiatur, vel potius quod per motum articuli dolor augeatur. Verum cum articulus mobilis, intrinsecus ex duorum ossum extremorum mutuo nexu componatur, nulloque perioestio toto hoc spacio, quo inuicem iuncta sunt, inuestiatur; sed cartilagine solum incrustetur, nullusque nervus hæc loca subeat, & proin hæc omnia sensu tactus destituta penitus sint, dolor in interiore hac sede articularum fieri nullo modo potest: vti neque in articuli femoris interioribus, vbi licet teres ligamentum sit, cum tamen illud cartilagineum & insensibile existat, illius causâ, dolor aliquis in eo loco suboriri potest. Dein & cum ossa in articulis adeo exactè iungantur, vt nullum spatium inane relinquatur, atque in ambitu articuli extrinsecus, membrana ligamenta illis connata, ambientiaque ea penitus occludant, vt nihil ad interiora illorum perferri possit; quo pacto humor arthritidem gignens, eò perueniet? cum nulla ad hæc loca pateat via, neque vena a qua hæc loca subeat. Præterea cum ligamenta foris

articulum stringentia, insensibilia quoque sint, vel si aliquem sensum à perioestiis quibus adnascuntur, sicuti aliqui putarunt, sumunt; illeque obtusus admodum sit, quomodo si illic articulus afficeretur, tantus dolor vti in arthritide sit, nasceretur? vti neque tendinum illic insertorum causâ fieri potest, cum & illis vel nullum, aut obscurum sensum inesse, tactus facile dijudicet. Ad hæc tumor extrinsecus prominens, & ab articularum regione aliquouersus; interdum expansus, & dolor aliquando ab articulo procul distans, aliàs ab eo late se extendens, in articuli structura dolorem hunc minime euenire, ostendunt. Sicuti & hæc, quod gypsea illa materia, nodi topiique, quæ arthriticis quandoque prodeunt, non semper iuxta articulos, sed & aliis vicinis in locis se offerant: & licet in ipsis articulis plerumque nascantur, illique spatio temporis, ob indurata potissimum ligamenta, nodosi fiant, non tamen dolorem idcirco in articulum constituentibus partibus insensibilibus fieri comprobant, cum illic tandem ob causas alias accedentes, vti dicitur, nata, nisi vicinas partes sensiles afficiant & pugnant, dolorem alioquin nullum adferant, sed articuli motum potius figant, illiusque formam vitient, dolorque non possit nisi partis sensilis affectus causâ, quæ in articuli structura, vti dictum, non inuenitur, euenire. Ob quam causam dolores arthriticos, non articularum, sed illis vicinarum partium sensibilibus causâ accidere certum est: quales sunt nervi, simulque partes ob dispersos per eas nervos nervosæ dictæ, musculi scilicet ipsique connatæ membranæ. Cæterum, quod hæc circa articularum regionē potius quam alibi patiantur & afficiantur, doloresque illic frequentius occurrant, causa est, neruorum circa hæc sedes cōcursus, & quod eo peruenientes, in angustioribus hisce locis coerciti, certis membranis & ligamentis vincti retineantur, & ad articularum motum plicentur, cum alibi liberi citra connexum, & recti per corpus incedant, unde & sit, vt cum materia aliqua in hæc loca angustiora & curua defluit, illic facile subsistat, nervosque afficiendo, dolores eiusmodi excitet. Qui dolor tamē, si humor defluxus extra articularum sedem, in aliis

angustiis vel indirectis ductibus, per quos nervi feruntur, quoque figatur, & eo in loco tunc concurrant; vti in coxendico dolore, quæ supra illius articulum plerumque in lumbis, illic ubi quartus nervus ad crus descendens, è cavitare coxendicis extrorsum reflexus curuatur, hærente humore, euenire solet, posteaque vterius defluente eo, sedem mutare, & nunc circa coxæ, nunc circa genu articulum in poplite, ad quem hic nervus peruat, nunc in pede magis afficere. Quod & si in homoplata sit dolor, hac ratione sæpe contingere consuevit. Vti & si copiosa sit materia, non vno loco, sed diuersis in locis hæreere atque affligere, & illis quoque in angustiis, ubi nervi per ossium foramina transeunt, vt in spina dorsi, maximeque ubi reticularis nervorum plexus iuxta ceruicem in brachia, & iuxta lumbos in crura nervos promit, facile subsistit, doloresque mouet.

Morbus autem, dolorem in sedibus iam explicatis efficiens, vel est distentio quædam, à copioso humore excrementitio affluxo, eadem ratione, vt, cum in carnosas sedes influit, prodiens, & ab eo tantum differens, quod hic defluxio vterius ad musculorum insertiones articulis proximas delata, illic dolores, sed non ita acerbos, vt cum nervi afficiuntur, parit, partemque in tumorem oedematofum quandoque eleuat. Qui humor excrementitius, si qualitate potius vehementi, vel prauâ, nervos insuper in locis articulorum, vti dictum, afficiat, dolores acerbiores parit, vnde concitato etiam affluxu sanguinis, in loco affecto quandoque calor, rubedo, tandemque tumor, vti in arthriticis doloribus, ab influxu sanguinis præcipue, hæc adesse mox dicemus, suboriuntur: quæ omnia tandem absumptis discussisque hisce excrementis, cessant, nouaque defluxione suborta, redeunt. Atque remanent tandem in diu iteratis defluxionibus materiæ influxæ, nec penitus discussæ, reliquæ: quæ, si glutinosæ sint, sensim in gypseam materiam concrefcunt, si terreitatem, qualem in serosis excrementis inesse, in calculi causis ostendimus, in se contineant, successiue in cretaceam, tophaceam aut arenosam & lapideam materiam conuertuntur.

Fitque hoc maximè in extremis corporis, manuum & pedum articulis, cum humor delapsus quandoquidem vterius ferri nequit, potius infimis hisce in locis, quàm superioribus diu retentus, eo vt dictum modo, crassescat sicceturque.

Partis autem recipientis & deducentis dispositio plurimum facit, vt in hanc vel illam partem defluxio potius cadat, sæpeque redeat. Talis autem est viarum, nervis alioquin & reliquis vas, quæ cum nervis corpus peruadunt, destinatarum, sediumque quæ circa articulos sunt, nimia laxitas; tum ab ortu insitis de causis à parentibus eueniens, causaque vna, quod hæreditarius sit affectus, cum ea quæ à cerebri imbecillitate inde quoque deducta est, vti supra dictum, existit; tum etiam aliis de causis, & à morbis, tum maximè ob continuum defluxum, sæpeque redeuntem, viasque peruadentem & dilatantem contracta: vnde fit vt per eiusmodi ampliatas vias & laxas, humor licet non tantâ copiâ, quæ alioquin requiritur, congestus, vel leuiter commotus, facile defluat & consuetas hæc vias repetat. Et cum ad extrema usque articulorum perferri potius, quàm in viis intermediis subsistere, defluxio tenuis præsertim, viis sic laxis existentibus, soleat, illicque retenta, loca hæc non solum relaxare, sed & sensim separando ab inuicem veluti excava- re: idè euenit, vt podagra & chiragra frequentiores cæteris sint speciebus, & quod, si semel ægrum inuadant, per intervalla vel mensium, vel anni, prout causa præstò erit, redeant, nec dum penitus amplius abigi possint: coxendicus verò aliique superiorum articulorum dolores, etsi aliquando illic subsistente materiâ eueniant, tamen cum hoc rariùs sit, humorque potius descendat, non adeo illis quos hi semel corripuerunt, nisi eò defluxiones sæpe delatæ, locum quoque (vti dictum) laxum reddant, consueti sint. Vti & quod arthritis generalis, non adeo frequens, vt cæteræ illius species existat, & licet aliquando fiat, non tamè facile, vel etiam nunquam amplius redeat, non solum huius causâ est, quod non nisi magnam illius causam esse oporteat, humorum scilicet copiosum prouentum, qui in omnes ferè articulos se exonerare



nerare possit, sed & quòd, cùm rarius eueniat, partes nondum debilitatæ, minùs humorem suscipiant, & quòd, vti mox dicetur, ab alia causâ, quàm defluxione à capite, frequentius prodeat.

Intra venas còclusus sanguineus humor, si in articularum sedem influat, arthritidem quam aliqui Calidam, quòd feбри comitata sit, characteresque calor in articularum sede proferat, vocarunt, interdum progignere potest. Sicuti enim ille quaquauerfum per venas in habitum corporis dispersas, in carneas membranas partes, & cutem ipsam se insinuare potest, illicque inflammationes, vel etiam sine inflammatione verâ, distentionem caloremq; excitare (sicuti ex dolore, sanguine attracto, parte nondum inflâmata, & tamen rubente ac calente hoc fieri posse, apparet) sic &, si in articularum regiones nervosas feratur, illisq; se insinuet, distendêdo, caloremq; suo inflammante, dolorem arthriticum efficiet.

Idque quando suâ copiâ in venis redundat, aut calidior existens & inflammatus, febrem accendens synochum, quæ plerunque huic arthritidi calidæ statim ab initio superuenit, & aliquandiu comes est, per eam portionem illis in articularum hæc sedes propellit. Nam sicuti ab iisdem causis, in febribus synochis, in superficiem cutis effuso sanguine, erysipelata febre hac comitata gignuntur, sic et si in hæc sedes articularum, hoc in hisce febribus molitur natura, quòd etiam frequenter se exonerare solet, arthritidis potius febre synocho comitatâ nascetur. Vnde & plerunque accidit ob hanc causæ similitudinem, vt qui arthritidi obnoxij sunt, aliquando in sanguine in cutem effuso, febre quæ erysipelata profert, nostriq; Caruncel vocant, facili, sicuti in febribus hoc expositum fuit, corripiantur: ægrique qui vtrisque obnoxij sunt, podagræ timore, quando illa inuadit, erysipelatis opinione se consolentur. Sed & sanguis, sero excrementitio ichoribusq; humorum perfuso, impurius fluidiorq; factus, à natura, interueniente plerunq; etiâ febre aliquâ, sed mitiore (vix enim sine febricula, calida vocata arthritidis incipit) vti in alia loca aliquando, sic in articularum regio-

nem expurgatus, arthritidem inducit. Quæ &, quando generalis est sæpiusque repetit, plerunque à sanguine, cùm copiosus sit humor, totumq; corpus peruadens, in pluresq; sedes simul effundi possit, provenire solet; quòd si à defluxione à capite fiat, cùm non nisi magna sit causâ, rarius fieri diximus. Licet & particularis arthritidis, & podagræ: nonnunquam & coxendicus dolor, ab eodê sanguine, in vnâ aut pauciores sedes tunc se exonerante, non infrequenter febre quoque comite, gignatur. In quibus à sanguine genitis articularum doloribus, si sanguis qui influxit feruidior fuerit, nervosumq; genus grauius afficiat & inflammet, dolor & ardor maior erit, rubedoque & tumor, nisi in profundo hæc omnia, vt in ischiadico dolore lateant, citius apparebunt, atque erysipelatos den aliquam phlegmonem referent: si verò serosior, ad œdematis naturam, tumor latè dispersus potius accedet, dolorq; non adeò magnus erit, nisi quatenus, si in multis locis hoc fiat, ea ratione magis molestus est.

Cuius sanguinis in venis feruoris & impuritatis causæ, vt variæ sunt, in febribus synochis comitatis expositæ: ita imprimis vini potentioris præsertim immoderatus & continuus vsus, non solû, quòd cerebro toties stuporem inducens, illud debilitando, sed & quòd sanguis inde copiosior calidiorq; & tenuior còtinuò gignatur, qui facili postea inflâmatur, febremq;, per quâ portio illius in articulos excutitur, accendat, podagræ causâ, hæcque illius poena statuenda erit. Vnde & ditiores præsertim, qui vino generoso sæpe inebriantur, cibisq; aromatibus variis conditis, vnde quoq; sanguis tandem accenditur, perpetuò vtuntur, podagram sibi familiarem, quæ apud sybariticos illos & delicatos libenter (vt vulgo dicitur) diuertit, reddunt: quæ tamen & pauperes aliquos non præterire solet, eosq; interdum aliis de causis, vti & febris erysipelatodes exercere. In omnibus hisce multum adiuvante dispositione partis, ob imbecillitatem illius, aut viarum (vt dictum) laxitatem, ad suscipiendû pronâ, quæ illi, iisdem de causis, vt in arthritide, à defluxione nata, diximus, si sæpius, præsertim sanguinis influxu debilitetur, euenit.

Sed & sanguis indifferenter in alias præter iam dictas, carneas corporis habitus fedes effusus, in febribus synochis, veluti in emunctoria illicque positas glandulas, dolorem, qui eo in loco se cum tumore & febre offert, ut in febribus illis declaratum fuit; vel si ob plethoram aut tenuitatem illius, vel sponte, vel ob labores aut dolores, in membra se ingerat, in illis molestiam eam, quæ in lassitudine descripta fuit, excitat.

*Qualitas maligna, causata a Lue venerea,* Qualitas occulta, seu cuius vires quibus agit, explicari nequeunt, maligna & contagiosa, quod ex effectu patet, extrinsecus corpus subiens, dolorem quem in habitu corporis, ossium sedem præcipuè occupare diximus, parit; qui luis venereæ dictæ quarta est species. Quæ qualitas à corpore alterius hominis, qui hac lue infectus est, prodit: siue hæc ita illum, ut ex ea æger decumbat, occupat; siue nondum adeo impressa, ut ex ea penitus ægrotet, existat, sed in obscænis præsertim hæreat: quâ ratione scorta illic infecta, etsi aliquando minimè decumbant; aut alia accidentia grauiora huius luis sentiant, alios nihilominus, ut postea ex ea lue vehementer affligantur, inficiunt. Hæc autem qualitas ab vno corpore exurgens, contactu in alterius corpus per contagium fertur, eamque potissimum corporum coniunctionem, in qua iunctis mutuo per coitum genitalibus, locisque illis nudis & tenerioribus, virus hoc ab obscænis vnus in alterius transiens, vel illa solû (quod in fœminis priuatim interdû, ut dictum, euenit) vel totum corpus postea, quod frequentius accidit, inficit: qua ratione etiam per eiusmodi coitiones, hæc lues ab Indis ad nostros translata & propagata fuit. Licet & cum excrementis, ab insectorum corpore in corpus aliud sæpius aut vehementer traductis, nec infectio transmitti possit: ut ab illorum sudoribus euenire potest, si in linteis adhuc impuris cubent, vel indusia insectorum induant. Quod fortè & ex sputo fieri, ex eo colligimus, quod sicut bestiarum virus per sputum in morsu corpora subit, ita & luem hanc, per pocula vel cochlearia, aliâve ori indita, sputo conspurcata, vel etiam per oscula, quâ ratione ab obstetricibus sæpe infantes inficiuntur, in alios transferri, sit

verisimile: uti & à fœtidis ichoribus ex viceribus in hac lue fluentibus, aliâque corpora tangentibus. A quibus tamen omnibus, vix dum corpora, nisi summè tenera, & rara, ut infantium; & si admodum vel sæpe hisce impetantur, contaminantur: uti neque facillè per halitum, cum tunc multi simul, quod tamen non fit, eam contraherent: licet plerumque has causas prætexentes, ut erratum illiciti congressus celent, illis culpam attribuant.

Hæc autem qualitas, in vapore vel humore, à corpore in corpus translata, partem, quam primum attigerit, inficit, rariusque illic, ut dictum, permanet, sed vltèrius per corpus dispersa, sicuti venena solent, partibus membraneis potissimum insidiatur, atque illis luem imprimès, si hoc in superficie corporis sit, uti elephantiasis quædam, quam quoque has præcipuè partes obsidere, in ea ostendimus, pilorum destitutum, pustulas, vlcera, parit: uti hæc species luis venereæ in cutaneis affectibus explicabitur. Si verò corporis solidioribus partibus profundioribus se insinuet, tunc circa perioestia membranasque, maximè vigens, dolores circa ossium regionem nudam præcipuè, vbi plures membraneæ nervosæque partes còcurrunt, molescentes, in capite, sterno, tibiis, similibusque, ut dictum, locis gignit: qui dolores calore, cum luem hanc veluti sopitam in actum deducat, irritantur, atque interdum nodos, perioestiis abrais, uti in cephalæa à congestione humorum expositum, in tibiis vel fronte præcipuè proferunt. Præter quæ, aliis vix dum corporis partibus, grauiora adfert incommoda, neque in spiritibus aut humoribus magna parit mutationes, neque quicquid eiusmodi, in vrinis, excrementis, aliisve functionum læsionibus, apparet, nisi ob dolorum vehementiam, morbi diuturnitatem, aut medicamenta violenta, quibus cura instituitur, potius, quàm ob hanc luem, tandem superueniant accidentia.

Intrinsecus quoque, perniciofa quædam vis abdita, sed noxia fuscitari potest, quæ certis partibus inimica, dolores in habitu corporis gignit, interdum similes illis, quales iam in lue extrinsecus illatâ, circa ossium se-

*Qualitas maligna, causata a Cephalæa exteriori maligna.*

des.

des, in morbo venereo nasci diximus, atque circa capitis exteriora, in Cephalea externa, quæ citra hanc luem nascitur, potissimum se offerunt, & ex congestione humorum circa has sedes, vt illic dictum fuit, nascuntur: si præter illam intemperiem, quâ alioquin dolorem inferunt, etiam malignitatem acquirant: vnde & grauius tunc lædunt, pertinaciusque hærent & perseverant. Sed & fieri potest, vt articulorum dolorum aliqui, à defluxione nati, si humor ille serofus excrementitius, præter eas qualitates, quibus dolores infert etiam prauam vim adipiscatur, vt sæpe in excrementis, aliquid maligni & incogniti, in variis morbis generari potest, perniciores & crebriores dolores fiant, & qui aliquid ab aliis insoliti proferant, suæque peculiariora habeant accidentia, minusque corrigi aut curari possint. Præter quæ aliū quoque

*Qualitas maligna, causa Arthritidis cuiusdam malignæ.*

*Qualitas maligna, causa doloris in spasmo differtur.*

*Qualitas maligna, causa doloris in sensu tactu de prauato accidet.*

*Dolorum in habitu corporis quibus alia accidentia prævalent, curatio.*

dolorem, per habitum corporis discurrentem, in spasmo quodam, cuius species esse videtur, & cuius prius in generibus meminimus, à qualitate peruersa & incognita, nervisque præcipue inimicâ & aduersâ oriri, ex eo, quod tam raris & admirandis accidentibus quàm longissimo tempore affligat, & per nervos per vniuersum corpus propagatos, ad illorum extimas vsque sedes feratur, illicque potissimum dolores moueat, satis licet conijcere. Vti & illos affectus, qui falso sensu frigoris aut caloris, tamdiu dolores graues pariunt, nec cessant, à malignâ vi, non cognitâ, vnde neque ferè curantur, prodire, hæc in ipsis prodigiosa symptomata, satis declarant.

### *Curatio.*

Illorum dolorum generum, in habitu corporis occurrentium, quibus alia symptomata copulata prævalent, curationem in accidentibus illis, quæ tunc potissimum videntur, curamque ad se trahunt, exposuimus. Veluti si à distentione, dolor in habitu corporis, seu membris oriatur; fiatque à motu immodico tensius cum lassitudine, vel à violento, cum spasmo dolor, cura illius in lassitudine, huius in spasmo explicata fuit. Quod si ex motu nimio, sanguinis quoque accedente affluxu, maior fiat dolor: nec alia

quoque quàm quæ lassitudini, & si nec sic remittat dolor, quæ spontanea à plethora genitæ conuenit, vt illic quoque ostensum, adhibetur. Et si viscerum interiorum morborum causâ, dolor in dorso potissimum se exerat, cura in horum affectuum symptomatibus, quæ magis spectantur, tractatur. Si verò status eiusmodi distendentes seu diuellentes dolores procreent, in spasmo vel palpitatione, de cura quoque illius actum. Dein & si à cōpressionem ex decubitu longo, membra lassa & facta sint, eodem modo, vt in lassitudine dictum, reficiuntur: si validius pressa pars aliqua doleat, causâ cessante, dolor etiam remittit, nisi inflammatio aut læsio aliqua sequatur, quæ priuatam, vt illic explicatur, tunc curationem requirit. Quod si à luxatis fractisve ossibus, ad motum paratis, membra prementibus, dolor fiat, in immobilitate, quæ tunc comes est, cura descripta fuit. Sin verò in aliorum ossium fracturis immobilitatem minimè causantibus, hoc fiat, quia alia accidentia interna externave, tumoresque tunc sequuntur, in illis quoque horum cura ostenderetur. Si à ruptura dolor in hernia fiat, in tumoribus qui tunc simul prodeunt, tractatur. Et si intemperies externa calida seu frigida partibus impresse, sensum tristem causet, de ea in cutis affectibus, quæ tunc potius afficitur, agatur. Si in febribus frigus aut calor hoc in membris faciat, cura in febrium rigore & calore proposita fuit. Et si à congesto humore Cephalea externa nascatur, illius quoque cura in capitis doloribus, qui eousque pertingunt, exposita fuit. Vel si à defluente humore vitioso & maligno dolor in paralyfi nascitur, in ea quoque de illo actum.

*Cephalea à congesto humore curatio.*

Dolorum verò in habitu corporis occurrentium, qui cæteris symptomatibus, si quæ præterea adsunt, prævalent; trium scilicet horum generum quæ vel circa articulorum aut carneas vel osseas sedes versantur, curationem ratione causarum distinguentes, si ab influxu sanguinis vel è defluxione serosi excrementitij humoris, Defluxionum in genere, vel priuatim Articulorum dicti dolores fiant, hisce duobus generibus, omnibusque causis, siue à sanguine, siue alio humore procedant, cum in vtrisque multa horum re-

*Dolorum in habitu corporis, qui cæteris accidentibus prævalent, curatio.*

media simul cōueniant, ne in singulis ea repetere oporteat, curationem simul accōmodabimus: Vti &, si à congestione humorum Arthritis fiat, cūm tunc quoq; à defluxione prægressa plerumque oriatur. Et si grauedo capitis à congestione quoque facta, arthritidem aliàsve defluxiones præcedat, quo pacto his præueniendum occurrendumq; eadem curatio explicabit. Sicuti &, si à flatibus dolores in habitu corporis similes illis qui à defluxione sunt, oboriantur, cūm eadē, quæ humorem defluētē resoluerē possunt medicamenta, flatu quoq; discutiant; atque vti humorum illorum prouentum, sic flatuum quoque generationem, cūm ab excrementis eiusmodi originem trahant, impediunt. Priuatam verò curationem exigunt dolores à maligna qualitate procedentes, contagiosi luis veneræ, illisq; similes; de quibus, postquam defluxionum & articularum curam absoluerimus, agemus.

*Prognostica in Defluxionibus in genere & Arthritis.* Præmissis interim prognostico. Defluxiones in habitum corporis generatim labentes, licet frequentissimæ sint, & in diuersa loca fiant, vbi plus minúsve molestant, frequenterque & leuem aliquando ob causam accidunt, redeantque, nisi ad interiora quoq; septum præsertim, aliòve vbi periculum adferunt, procumbant, non adeò esse periculosas: minori que negotio quàm articularum dolores sanari. Vti &, si à flatibus similis dolor qualis à defluxione prouenit, eueniat, facilius adhuc illis dissipatis, cessare. Articularum verò dolores quod attinet, omnes illius species pertinaces admodum sunt; & quando inuadunt, diu perseverant, facileq; reciduiam faciunt. Inter eos tamen, Arthritis generalis, etsi grauius affligat, atque interdum non sine periculo, accedentibus aliis quoq; ex dolore diuersis in locis se exerente, accidentibus, tamen cūm, vt fiat, magnam causam esse oporteat, quæ in tot loca feratur, illa non adeò est frequens, rariusque vel tardius, quàm particulares illius species, vel etiam nunquam amplius reuertitur. Frequentiores sunt Podagra & Chiragra, pluresque inuadunt, & quæ vbi semel inceperint, certo tempore, nunc per menses, nunc annuatim redeunt, atque vbi semel pedem

fixerint, ægrè amplius eradicari possunt, per se alioquin minimè exitium adferentes, nisi tandem generaliores factæ, aut ob alios affectus accedentes, hominem conficiant, cūm multi multis annis podagrâ afflicti, senium tamen attigerint, atque in eo diu adhuc vixerint, alij quoque à grauioribus malis, quæ defluxio in nobiliora loca cadere solita illis pepererat, per hanc illius deriuationem, superueniente podagra liberati fuerint. Medio modo se coxendicus & homoplata dolores habent, minùs quidem quàm podagra, magis tamen quàm arthritis familiares, & qui rariùs quàm podagra, citiùs tamen quàm arthritis, etsi ad annos aliquot sæpe inducias dent, rursum remeare solent, atque vti arthritis, quàm diutissimè, aliquando ad menses aliquot, sed minori vitæ periculo, perseverare. Quibus obseruatis, prædictiones nostras ad ea dirigere debemus, & præsertim in podagra, quæ iam habitum contraxit, aut hæreditaria est, non temerè nos eam abigere posse, polliceri. Sed saltem id nos, vt vel mitiùs vel tardius redeat, tentaturos, & si fieri possit, procuraturos: eoq; quòd hæc ætate mitescere soleat, consolari.

Methodus verò medendi, tam in Defluxionibus dictis, quàm Articularum doloribus, tum in præseruatione, in illis qui hisce obnoxij sunt, tum in curatione, quando iam laborant, consistit: & pro ratione causæ hæc perficiuntur. Præcauebimus autem, vt vel ægrè redeant, aut mitiùs ægrum tractent, si humoris sanguinei, vel excrementitij serosi, pituitosi congestione & prouentum in capite, vel in vniuerso corpore, bonâ viuendi ratione, euacuantibus variis, corrigentibus intemperiem & imbecillitatem, impediamus: defluxiones & influxus illorum in articularum aliàsve sedes, illis quæ hæc sistunt, vel aliò deducunt, auertamus; loca hisce molestari, & tandem laxa imbecillioraque reddi solita, ne faciliè humores admittant, recipiantque, firmemus: intemperiemque contractam immutemus.

Curabimus verò, postquam defluxionibus aut articularum doloribus iam infestatur corpus. Si humorum dum fluit, sistamus, si fixerint, eradicemus: vel vias per quas fluit, arctan-

*Defluxionum in habitu corporis, & Arthritis illiusq; specierum omnium præcautio & curatio.*



593

arstando: eumq; à parte affecta reuellamus, deriuemus, & ab ea propulsemus: dolorémque, præsertim si ille vrgeat, vt ægro consularur, nouaque defluxio vitetur, mitigemus. Procedendo sensim, idq; maximè postquam iam fluxit humor ad illa, quæ, quod influxum est, si sanguis sit, simul digerant, tandemque vt in cæteris inflammationibus penitus dissipent; si alius humor excrementitius sit, potentiùs adhuc illud præstent; & si in profundo sit, validiùs attrahant, & absumant, vel etiam apertè eliciant. Atque in declinatione, ea quæ partem multa passam confirment; & si quid residui sit, penitus consumant, adhibenda. Quæ omnia variis modis, tam in præcautione, quàm curatione cum defluxionum in genere, siue in artus & membra, siue dorsum, pectus, collū faciémve procumbant (vbi etiam remedia quædam in dentium dolore exposuimus) tum in specie arthritidis generalis, vel particularis podagræ, chiragræ, gonagræ, coxendicis, homoplatae ve dolorū, perficiuntur, vel in diætâ per viuendi rationem: vel in pharmacia, per euacuantia, per alui deiectiones, vomitus, expuitiones, sudores, mictiones, sectiones, vstiones; item per alterantia intrò sumpta, forisq; admota, sicuti in singulis hoc ordine exponetur.

*Viuendi ratio ad præcautionem & curationem Defluxionis & Arthritidis.*

Viuendi rationem quod attinet, quæ ad præcautionem, & Defluxionem in genere, & priuatim Arthritidis instituitur, in eo potissimum, ne excrementa & humores superuacanei accumulentur, aut ad fluxionē concitentur, consistit. Ob quam causam, aër in quo ordinariè versantur, temperatus sit & siccus, cum frigidus nimium, ventosus, nebulosus, vdu, vt & calidus admodū ac feruens, in sole, æstuariis, defluxiones proritet; & tunc maximè, cum subito ab vno aëre, frigore aut calore excedente, in contrarium fit mutatio. Sed nec arthritici, manus debilitatas, vt consuetum est aliàs hoc frequenter facere, nec pedes aquâ abluant, cum siue frigida aut calida sit, obesse soleat. Ob quam causam vino, aliisve, vt in iis quæ articulos roborant, ostendemus, utiliùs abluuntur. Viæ quoque, quantitate, qualitateq; conuenienti, exercitiis insuper, somno cæterisque

corporis animique motibus decentibus vtendum. Sicuti prolixè in ventriculi imbecillitatibus; quo pacto hæc ad excrementorum prouentum impediendum administrari debeant, declarauimus; & si à sanguine fiant, quo pacto tunc cibus potusq; offerendus, in multis ab eo natis affectibus, vt & in febribus, demonstrauius. Imprimis verò in iis, qui arthridis speciebus aliquibus, quæ faciliè redeunt, & præcipuè podagræ obnoxij sunt, licet & in aliis omnibus defluxionibus hæc quoque conueniunt, tria præcipua in viuendi modo, in Viæ scilicet, Vino & Venere comprehensa, si decenter obseruentur, vt vel podagra non amplius, vel rariùs saltem inuadat, aut mitiùs ægrum tractet, præ cæteris possunt efficere. Si nimirum viæ quàm exquisitissimo & simplicissimo vtatur, semelq; in die tantum, vel omni tempore, vel aliquoties saltem cibum sumant. Et à vino vel penitus, vel saltem per annos aliquot abstineant, aut illud quàm parcissimè debiliùsve aut dilutum bibant. Cuius loco vel aqua, variis modis præparata, vel potiones aliæ medicatæ, vt hydromel, aliæve, pro naturarum diuersitate, vsurpari possunt. Quod venerem attinet, cautio erit, vt eam vel omnino intermittant, vel quàm rarissimè, nec erecti exerceant. Quæ & causa fortè existit, quòd ante venereum vsum podagrâ vix dum laborare soleant, vt de mulieribus hoc pro certo asserit Hippoc. atque illi qui ob castrationem ad eam obundam fiunt impotentes, ab ea quoque ferè liberi existant.

In curatione verò, cum iam defluxionum articuloꝝve doloribus infestantur, viæ exquisitus & tenuis adhibendus; & inedia, si eam ferè possint, aliquando imperanda. Atque cibus medicamentosis, prout varia se offerunt accidentia, vt in medicamentis dicetur, hæc quoque corrigenda. Nec non arthriticis vinum interdicensum. Cuius loco si caleant, aut febricitent, Aquam chalybeatam bibant, cui Iulepos, Syruposve acidos vel austeros, si defluxio adhuc in aëu sit, permiscere possumus: Vel si non caleant, decoctum Coriandri, additis sæpe & aliis, miscendoque syr. aliquos, vel Hydromel, exhibere.

Dein & loco exercitij, quod obire nequeat, frictio in parte sana, & ad deriuandum quoque in opposita, adhibenda.

*Per ena-*  
*euatio-*  
*nes ois*  
*geris,*  
*per*  
*cautio*  
*curatio*  
*Deflu-*  
*xionu*  
*Arthri-*  
*tidis,*

Per aluum deiectiones, Præcautionis loco, in Defluxionibus cōmunibus, & Articulorum doloribus, in iis qui istis subiecti sunt, locum habent, vt corpora ab excrementis munda reddantur, vnde non solum veris & autumnis, sed & intermediis temporibus, si corpora impura sint, expurgari debent. Euacuationes prout vel serofus excrementitius humor, vbi maiore euacuatione opus est, vel sanguineus, vbi mitius procedendum, causam præbent, instituendæ. Præparatione, si necesse sit, præmissa, & pro ratione humoris redundantis instituta. Sicuti passim eiusmodi ratio præparandi purgandi; explicata fuit. Imprimis; si à sanguine podagra fiat, in febre synocho erysipelata vti & podagram inducente, quomodo vtrunq; per sanguinē mundificantia præcaueri debeat, ostendimus. Et si à seroso humore defluxiones & arthritides fiant, in diuersis affectibus, cerebri præcipue & neruorum, purgationes descriptæ fuerunt. Quod si verò iam defluxio imminet, illiusq; indicia apparent, cautè, ne hisce illa amplius concitetur, affectusq; hi accelerentur, vti sepe incuriâ fit, illis vtendum, idq; imprimis in articulorum doloribus, non solum à sanguine profectis, in quibus aluum laxâ seruare, obuiosque humores saltem euacuare sufficit, sed & si à defluxionibus ab humore excrementitio hi fiant, quia tenuis cum sit, facile concitatur, leuioribus saltè, & quibus adstrictio quædam inest, vel additis adstrictionem quandam habentibus, materia potius diuertenda, quàm validioribus purgantibus vehementer commouenda erit. Quod & in principio, cum hi affectus iam inuaserunt, dum defluxio adhuc in fieri est, in arthritidis speciebus præcipue obseruandum erit, cum in aliis defluxionibus factis ad ea loca, quæ minus consueuerunt affici, minori periculo hoc fiat. In articulorum verò dolorum accessionibus satius est à purgantibus abstinere, non solum ob dictas causas, sed & cum ob dolorem commotionem magnam, quæ in deiectionibus magnis requiritur, ægrè ferant, vnde tunc leuioribus laxantibus

aluum subducenda, & in morbo inclinante, primùm ad purgationes validiores progrediendum. Perficiuntur autem eiusmodi per aluum euacuationes, sequentibus modis.

Clysmata iniecta, cæteris purgantibus, etiam præcautionis loco factis, præmittuntur; & in curatione horum affectuum nō solum aluum eluunt, sed etiam à iuncturis, aliisque sedibus, in quas defluxio decumbit, causam aliquo pacto diuertunt. Inprimisq; in coxendico, vti & lumborum dorisque doloribus, ex defluxione natis infusa clysmata, quia loco affecto propinqua sunt, fons instar, dolorem admodum mitigant, & si plurimum stimulent, potenter ab eo humorem auerunt. Qualia multa in aliis affectibus descripta, hisce affectibus quoque accommodari possunt.

Inprimis si à sanguine hæc fiant, Clyster refrigerans & stimulans fieri poterit ex decocto Polypodij, Altheæ, Maluæ, Violariæ, Betæ, Bliti, Mercurialis, Furfure, Sem. frig. mai. dissoluendo Saccharum, Mel, Oleū, Butyrum, Cassiam, Ouiq; vitellum, & similia.

In aliis causis Defluxionum & Arthritidis specierum, præcipueq; in dolore Coxendico, vicinarumq; partium, sequentia competunt. Cōmune aluum laxans, stimulans, emolliens excrementa, anodynum sic fit: R. rad. Altheæ 3. ij. Ireos 3. j. herb. Maluæ, Bliti, Betæ, Caulium, Mercurialis, Betonicæ, Calamenthæ, Pulegij an. m. j. fl. Chamom. Melilot. Aneth. Stœchados vel Lauandulæ an. p. j. sem. Lini, Fœnogr. an. 3. β. semin. Carui, Rutæ ana 3. j. Furfuris p. j. fiat decoctio, & in col. q. f. dissol. Mellis 3. ij. Sacchari rub. 3. j. resinæ Laricæ dissol. cum Vitello oui 3. j. β. Hieræ simpl. vel Catholici, aut El. Indi 3. β. ol. Liliorum, Chamom. an. 3. j. β. salis Gemmæ 3. β. fiat Clyster.

Aliud calefaciens præcipue & discutiens: R. rad. Ireos 3. j. Acori veri, Enulæ an. 3. β. herb. Erysimi, Chamæp. Calament. vel Meliss. Thymi, Maioranæ, Betonicæ & Leontopetali ( si haberi potest ) ad m. iij. flor. Hyperici, Stœchados vel Lauandulæ, Rosmarini an. p. j. bacc. Lauri 3. β. semin. Cimini, Seseleos ana 3. ij. fiat decoctio in Aqua & Vino, dissol. in colat. f. q. Mellis anthos. 3. j. β. succi Rutæ

597

Rutæ 3.j. Vini Maluatici 3.ij. Bened. lax. 3.β. Castorei 3.j. ol. Rutæ. vel Cheirin. vel de Abrotano aut alt. ad 3.ij. Salis parū, fiat Clyfma. Si olea destill. addas, vt Spicæ ad 3.β. vel parū de oleo Thymi, Rosin. Calam. efficacius fiet.

Olea sola, vt Rutæ, vel aliud quoque, injiciuntur, in dolore circa lumbos.

Acre diuertens & purgans sic fit: R. rad. Bryoniæ, vel radic. Cucum. asin. Hermodactyl. ana 3.vj. Agarici, Azari ana 3.ij. herb. Iberidis vel Eryfimi, Pulegij vtriusq; Absynthij an. M.j. fum. Centaur. P.j. sem. Rutæ, Eryfimi an. 3.ij. fiat decoct. & in col. f. q. dissolue Mellis 3.j.β. Vrinæ pueri 3.ij. Hieræ Logodij vel Rufi aut Colocynth. 3.ij. succi Nasturt. aquat. 3.j. olei Amygd. am. 3.ij. Salis parū, fiat Clyster. Si Colocynth. pulpæ ad 3.j. in clyfmate incoq. potenter operabitur.

Ex Muria vel Garo pisciū, dilutis decocto aliquo, clysmata iniecta, sunt vtilia, vti & ex sola Vrina. Quibus olea quædā destillata addita illorū vires augment, dissolutis nonnunq; & aliis in clysteribus supradictis enarratis.

Sory quoque, quod vim erodēdi aliquin habet, dilutum vino injicit Dioscor. & Siluripiscis Salsamentum.

Suppositoria acia naturā sollicitādo, & co affecto quoq; deriuant, qualia multa hinc inde describuntur, inter quæ & hoc refertur: R. Mellis costi pro duob; suppositoriis, adde spec. Hieræ 3.j. rad. Esulæ 3.β. salis Gēme 3.j. Stercora murium aliquot, fiat Suppositoriū.

Purgantia per os propinata, tam leuiora quàm fortiora in multis morbis à defluxionibus quoque genitis, descripta sunt: quorū multa hic quoque conuenire possunt: præcipueque sequentia ad arthritidis genera, vti & cæteras defluxiones determinata sunt.

Si à sanguine hæc fiant, dantur mitiora, vt Syr. Ros. fol. Cassia, Māna, Catholicon, Diaprun. Tryphe. Persic. Ius Galli senesc. Diosc.

Vel hoc: R. Rhabarb. 3.iiij. Spicæ 3.β. infundantur in aquæ lue, vel aliā, fiat expresso, dissolue aliquid è supradictis. Vel si validius esse velimus, el. de Succo rosar. 3.ij.

Vel ad sanguinem mundificandū hic potius datur: R. Lupulorum, Fumariæ ad M.j. f. Cord. P.j. Sebesten P.vj. Tamarind. 3.β. Liquir. 3.iiij. Polypod. 3.β. Thymi, Epithymi a-

na 3.j. fol. Senæ 3.ij. fiat decoct. in col. infunde Rhabarb. el. 3.j. Spicæ 3.j. Myrob. citrin. 3.j.β. fiat express. adde syr. Ros. fol. 3.j. vel Catholici aut Trypheræ 3.β. fiat Potio.

Vel hoc decoctum per vices datur, simul serositates aliò deducens: R. ius decocti Galli vel Caponis senis, vel carnis Vitulinæ q. f. & in eo decoque Gaiaei cort. vel ligni-rasi 3.ij. & in col. feruente adhuc, infunde fol. Senæ 3.ij. stent cooperta, vt sensim refrigerentur, ad horas 24. dissoluendo postea syr. Ros. fol. 3.iiij. pro iiij. vicib; bibendis manē, addendo pro singulis parū aquæ Cinam. sunt qui aquam Auriculæ vrsi ad 3.j. pro vna dosi addunt, illiq; plurimū attribuunt.

Vel vsurpari potest Syr. hic: R. cort. Myrobal. cheb. citrin. ind. an. 3.j. rad. Polyp. 3.j. Passul. enucl. par. xx. fl. Cord. 3.ij. Spicæ 3.β. infundantur in aqua Absynthij, macerentur aliquandiu & fricentur, bulliant parū, & in col. adde succi Ros. incarn. 3.vj. Mannæ 3.iiij. Sacchar. 3.ij. fiat syr. Capiat per vices 3.ij.

Si à seroso humo. illa pificatur, tunc purgātia huic accōmodantur, vt ex leuiorib; pil. de Hiera, Alephāg. Affaier. de Rhab. de Agar.

Vel vtatur sequentibus, quibus in primis in arthritidis speciebus, & podagricis, coxendicisq; doloribus præcauendis vrimur.

Electuarium: R. Catholici 3.j.β. fol. Senæ 3.vj. Tartari 3.β. sem. Anisi 3.ij. sem. Rutæ 3.β. rad. Pentaphyli 3.j. Zingib. 3.β. Cinamom. 3.j. cum syr. Ros. lax. fiat electuarium: Capiat hebdomadatim bolum, per se vel diluendo.

Potio: R. ligni Guaiaci rasi 3.β. rad. Ebuli, Enulæ, Hermodact. an. 3.β. fol. Senæ 3.iiij. Agarici 3.β. Zingib. 3.β. Mellis quart. Vini poc. j. Aquæ q. f. Coquātur & despumētur, donec remaneant quinq; vel sex doses: quas capiat altern. vel ternis dieb; vel bis in septimana.

Pilulæ: R. Agar. 3.ij. Rhabarb. 3.j.β. Myrobal. Chebul. Citrin. an. 3.β. Aloës 3.j. rad. Pentaphyli 3.β. rad. Aristol. rot. Spicæ, Mastichæ, Myrrhæ, Succini, Cubeb. Zingib. an. 3.j. cum Tereb. q. f. fiat Massa: Vtatur sæpe bis vel ter in septimana 3.β. vel firariū, paulò plus. Si purgare vis paulò validi; Diacrydio acuātur.

Pilulæ de Hermodactylis dictæ & paratæ, in primis in articularum doloribus cōmendantur, quarum variæ sunt descriptiones.

Mitio-

Mitiores quibus tunc frequenter ad præcautionem uti possunt, parant Arabes ex hermodactylis, cimino & zingibere, cum melle; Græci s. Carthami, euphorbium, myrrham, mastichem, anisum, piper addūt. Fortiores sunt Minores dictæ, quæ ex hermodactylis, scammonæa, myrobal. aloë & rosifunt, in causa calida etiam conuenientes. Validissimè operantur, & in causa frigida potissimùm vtilis, Maiores appellatæ, quæ ex hermodact. colocynthide, turpetho, myrobal. aloë, bdellio, sagapeno, oppopanace, sarcocolla, euphorbio, castoreo, s. rutæ, agrimon. & apij; croco, cum succo brassicæ formantur. Arthetica dictæ ex hermodact. turbith, agaric. scammon. aloë, sale gemmæ, additis multis aromatibus & gummi, seminibus lithontripticis parantur.

Vel fiant aliæ pilulæ ex Hermodactylis: eligendo semper bulbos veros, qui resiccati ad nos feruntur albidi, non rugosi, modicè duri, tundi que faciles tusi que, candidum puluerem efficientes, cauendo à colchico strangulatorio, cuius bulbi siccati rugosi sunt, & foris intus que nigricant, vel obscure rubescunt, hoc pacto: R. Hermodactyl. verorum excort. 3.ß. Aloës 3.ß. Turbith, Agarici an. 3.j.ß. Rhabarb. Myrob. citrin. chebul. ana 3.j. Mastichæ 3.j. Euphorbij 3.j. Zingiberis, s. Cimini an. 3.ß. Croci 3.ß. excipiantur Melle vel syr. Ros. fiat massa: Capiat ad 3.j. Efficaciores erunt, si Diacrydij 3.j. addatur, vel trochisc. Alhandal 3.j. Quibus fortioribus cum vtimur, ad 3.j. illorum, Rhabar. 3.j. commodè addimus, & cum succo Iuæ vel Brassicæ, vel Ros. formantur.

Vel sic: R. Aloës 3.vj. Myrob. Citrin. 3.j.ß. Turbith, Hermodact. an. 3.ß. Rhab. 3.j. Salis gemmæ, Zingiber. an. 3.ß. Diacrydij & Trochisc. Alhandal, ad 3.ij.ß. cum syrup. Ros. fiat massula.

Inter fortiora purgantia vtitata præcipuè in defluxionibus hisce conferunt el. de Citro, de succo rosarum, Elecroph. Amoron Regis Gal. in dolore coxend. commend. atque ex pilulis, sine quibus, quinque myrobal. Aggreg. Vtimur & aliis phlegmagogis capiti & neruis præcipuè accommodatis, ut Diaphænic. Diacartham. Indo mai. Pilulis

coccüs, Aureis, Fœtidis, de Serapeno.

Electuarium à Gal. aliisq; multis summè commendatum, statim dolores articulorum & iuncturarum auferens: R. Hermodact. verorum à cort. repurg. Diacrydij ana 3.ij. Zingib. Garyoph. sem. Cimini, Costi amari ana 3.j. cum Mellis costi cum Vino albo ad consistentiam 3.ij. fiat elect. Capiat à 3.ij. ad quatuor, in nebula madefacta in vino, vel dissolutum in vino bibat.

Vel hoc: R. Hermodact. Turbith. an. 3.ij.ß. Agarici 3.j. Aloës, Scam. 3.ij. rad. Lilij cœlest. Scyllæ assæ an. 3.j.ß. sum. Centaur. min. 3.vj. Olibani, Galbani, Ammon. an. 3.j. Mastichæ 3.j. sem. Anisi, Fœnic. Petros. ana 3.ij. Garioph. 3.vj. Cinam. 3.ß. Cubeb. Spicæ ana 3.ij. Carpob. Xylobals. an. 3.j. Piperum trium an. 3.ß. Croci 3.j. Castorei 3.ß. fiat puluis, excipiat Melle despumato, fiat elect. Capiat vt superius.

Huius loco Zenonis electuario tantope-re commendato, uti possumus.

Tabulæ ad eosdem vsus: R. Hermodact. 3.ij. Turbith 3.j.ß. Diacryd. 3.j. Rhabarb. 3.ij. Spicæ 3.j. Acori veri, Cubeb. Piperis longi an. 3.ß. Sacchar. 3.ij. dissol. in aq. Ros. fiant Tab. Cap. ad 3.j.

Vel sic: R. Turbith, Rhabarbari an. 3.ij. med. s. Carthami 3.ij. Diacryd. 3.j. Cinamo. Sant. citr. Ros. rubr. an. 3.j. Sacchari 3.ij. dissol. in aqua Ros. fiant Tabulæ.

Per vomitum in præseruatione horum affectuum, cum euacuet & deriuat, multum præstare possumus. Si qui huic maximè assueti sunt, semel vel bis in mense, aut amplius vomant, vno vel duobus continuis diebus, idque præsertim à cibo statim sumpto, qui si pinguis, rancidus & copiosus prius assumptus fuerit, ventriculusque fricetur, facilius vomitus procedet. In curatione quoque in omnibus defluxionibus dictis, similiter conuenit, & in arthritidis speciebus, Vomitus & Clysmata ad diuertendum, plus quàm purgationes aliæ præstant. In Ischiadico quoque dolore, vomitus, cum per superiora reuclat, plus quàm per inferiora facta purgatio efficit, idcirco diebus duobus vel tribus, & deinceps quoque si malum perseueret, poterit repeti.



Ad quem proritandum inter alia multa, Azarum & Genista præcipuè probantur, cum in arthritide curanda, aliàs quoque sint idonea. Daturq; proin decoctum feminis vel radic. Azari in Aqua vel Sero lactis factum. Aut florum Genistæ decoctum, quod & præstat Ricini feminis in iure, aliòve liquore factum decoctum.

Conciliatur etiam decocto Raph. semin. Attriplicis, Anethi, Nasturtii, Erucæ, Ebuli, decoctis in iura veteris Galli, addito oleo communi, cham. Oxymel. simp. squyll. Aquâ mellis, aliisq; multis passim expositis.

Per expuitionem multam, pituitosas ferrosasq; superfluitates à capite defluxionum fonte educimus, sicq; defluxiones præcauemus: quod præcipuè tunc fit, quando ex capitis grauitate, congestum illic humorem conjicimus. Et cum natura per hæcemunctoria, præsertim si prius consuetum hoc erat, illum non expurgat, tunc eam masticatoriis & errhinis diuersis sollicitare, vt id tenter solemus.

Per sudores euacuatio ad præcautionem defluxionum & arthritidis, à serosis humoribus excrementitiis prouentum, plurimum confert, cum alio modo in vniuersi corporis habitu collecti, rectius euacuari nequeant. Dein cum per eos sanguis à serosis quoq; tenuioribusq; excrementis repurgetur, vnde minus postea fit fluidus, etiamsi à sanguine hæc fiant, proderit.

Promouentur autem in illis, quibus hi affectus consueti sunt, multis vicibus, longoq; interdum ad septimanas quatuor vel quinque, prorogato tempore. Idque potione sudatoria, mane nonnunquam & ante cœnam exhibita, ex decocto ligni & cort. Gaiaci, vel rad Zarsæ parill. aut Chinæ parata, addendo interdum aquas convenientes: vt Iuæ, aliàsve dum coquitur. Adhibita interim tenui & simplici diætâ, in qua & potus loco, decoctum secundum ab enarratis factum, vice vini propinatur, idque cum debita custodia. Quorum loco multa alia decocta idem efficere vsu comprobatum est. Vinaque eiusdem parata, tantundem in quibusdam possunt præstare. Sicuti in Iuis venereæ cura hæc vberius describentur. Idem, Ther-

marum vsu ad mensis spatium & vltra continuato, in quibus & dum illis insident, & postea, dum egressi, recumbunt, aliquandiu sudant, efficitur; quarum certarum vsu & robur articulis, vt mox dicetur, in arthriticis interdum conciliatur.

Verum per & vices, semel in septimana, vnâ, duabus vel tribus, corpore semper prius purgato, sudores mouere vtile, ad defluxionum materiam sensim auferendam. Quod Balnei sicci vsu manè vel ante cœnam, præstatur: Vel etiam in lecto, in illis qui facile sudant. Propinatis prius, siue in stupha, siue in lecto hoc fiat, illis quæ sudores mouent, vt Theriacâ, Mithridato, rob Sambuci, ad 3. j. syrupo S. Ambrosij ad 3. vj. vsque, aliisve. Inter quæ decoctum Herniariæ, sæpè bibitum, multos iuuat. Vti & Ebuli rad. 3. β. vel semin. 3. iij. puluer. in vino albo per noctem infusio colata, sæpè bibita, quod etiam, iam instante arthritide si fiat, eam retardat.

Suffitu conuenienti vel solo, vel cum aliis adhibito, sudores quoque prolificere possumus.

Sed & cum defluxiones iam infestant, corpore purgato, si naturâ potissimum illud sponte tenter, sudores promouere, sæpè valde conuenit, quod tamen in arthritidis principio non per vim, ne humoris tenuis conciteretur magis influxus, moliendum, sed si eò natura vergere videatur, per exhibitum aliquod è prioribus decoctis aliisve hinc inde expositis iuuanda.

Per mictionem copiosam, serosi excrementitij humores quoque è venis, & per eas è corpore exturbantur, per quam si copiosa vrina reddatur, vel per se, vel ratione victus, ad præcautionem aliquid potest efficere. In primis verò defluxionibus iam infestantibus & in articularum morbis, vrinam quandoque expressè deriuationis causâ promouemus; decoctis Cicerum, rad. Aperitiuarum, Asparagor. & Melonum, aliisve, aliquot matutinis exhibitis.

Per sectiones, Venam aperiendo, sanguinemque detrahendo, defluxiones & articularum dolores aliquo modo præcauemus, in corporibus plethoricis & cacochymicis, cum horum causâ generalem euacuatio-

Per sectiones, vitiones, præcautio & curatio Des.

*ationum* nem. Veris & Autumni tempore, vel etiam  
*& Ar-* alio, institutum. Tuncque inprimis, si à  
*deritide* sanguinis influxu hæc fiant, hæc locum ha-  
 bent. Vnde & Galenus arthritidem san-  
 guinis detractione & purgatione, in illis  
 qui temperanter vixerunt, præcauisse se, te-  
 statur. Aperitur autem vel ad generalem  
 faciendam euacuationem, vena brachij; vel  
 particularem, vena in pede, iuxta poplitem  
 vel malleolum. Quod vt sceminis, si men-  
 strua simul suppressa sint, prodest: Sic etiam  
 si bis in anno in pede, podagræ obnoxio hoc  
 fiat, singulare ad præcauendam illam, multi  
 remedium se expertos esse, affirmarunt. Li-  
 cet & in sano pede si fiat, deriuando, hosce  
 affectus præcauere potest. Sed & venam  
 iuxta nates in lumbis patentem, aliqui ad  
 coxendicum dolorem præueniendum, cer-  
 to tempore aperiunt.

In curatione quoque defluxionum & ar-  
 ticulorum dolorum, si à sanguinis influxu  
 hæc fiant, phlebotomia reuulsionis causa, à  
 statim in principio in parte distante, vt pedi-  
 bus laborantibus in brachio, in manibus,  
 in pede, vel deriuationis gratiâ, propinquâ,  
 sana tamen, facta, plurimum proderit. In  
 primis verò in coxendico dolore à sangui-  
 ne, vena in brachia secta, reuellendo iuuat;  
 quam Hippocrates etiam post aures appe-  
 riebat; Arabes illam, quæ est iuxta paruum  
 digitum. Quæ præmissa vel etiam omisâ,  
 deriuando admodum proderit, si in poplite,  
 aut iuxta malleolum interiore, vt moris  
 est, vel etiam exteriore, in vena illic appa-  
 rente, vt aliqui docent, eamq; ob insignem  
 quam adfert, si tunc secetur, vilitatem,  
 Ischiadicam vocant, tundatur, quæ & sæpe  
 sola hunc affectum sanat. Quod & in crure  
 dolente plerumque fieri solet, licet & in sa-  
 no hoc tentatum admodum profuisse, subi-  
 toque omnem dolorem sustulisse, experien-  
 tiâ comperimus. Adeoque hisce in locis  
 pedis venæ apertio conuenit, vt etsi non à  
 sanguine hic dolor ortum traxerit, tamen  
 vilitatem aliquam adferat, omisâ tunc  
 eâ, quæ in brachio aliâ illi præmitti solet.  
 Cum alioquin si à serosi humoris defluxio-  
 ne, aliæ arthritides particulares hominem  
 infestent, vena non temere, ne humores cõ-

moueantur, sit tundenda. Nisi ob dolorem  
 sumum, ob metum noui affluxus à san-  
 guine, hæc reuulsionis alicuius gratiâ, quo-  
 que requiratur.

Scarificatione, adhibitis simul cucurbitu-  
 lis, non solum si à sanguine hæc fiant, san-  
 guinem alliciendo, sed & si ab aliis humori-  
 bus serosis prodeant, quia eosdem simul al-  
 liciunt, in affectuum horum præcautione  
 quoque vtimur. Quibus & in cruris carno-  
 sis sedibus internis, vel pedum furis per vi-  
 ces factis, priuatim podagricis, ischiadi-  
 cisque admodum competere, experientiâ  
 quoque comprobatum est. Sed & in deflu-  
 xionibus & articulorum doloribus inci-  
 pientibus, hæc quia humorem aliò dedu-  
 cunt, cõuenient, si in parte sana oppositâ vel  
 distante fiant, & in ischiadicis in natibus &  
 furis, atque in homoplata dolore in scapu-  
 lis, scarificatio cum cucurbitulis, vel etiam  
 cucurbitulæ adhibeatur. Ad quæ & Hirudi-  
 nes referri possunt, quæ venis hæmorrhoi-  
 dalibus in podice admotæ, sanguinem ex-  
 hauriendo, in consuetis præsertim, emolu-  
 mentum quoque adferre possunt.

Incisione factâ supra locum affectum, ve-  
 namque illic vinciendo, fluxionem aliqui se  
 intercipere posse hac ratione, docent. Dein  
 & sectione, in podagra vel chiragra, partis  
 tumentis, aliqui vsi, humorem serosum in-  
 scar aquæ citrinæ extraxerunt; quam inci-  
 sionem etiam Hippocrat. probare videtur.  
 Sed nullâ materiâ certâ apparente illud ten-  
 tare, remedium est anceps & periculosum.  
 Vti verò ad gypseam materiam, vel tophos,  
 si qui adsint, & iam cutem attenuarint exi-  
 tiumque quærant, eximenda, tutius sectio-  
 leuius instituitur.

Per vitiones, vesicas excitando, cutem  
 que vlcerando, serosi excrementitij humo-  
 ris fluxus, à parte quam petere solebat, aliò  
 diuertitur, sicque ne in eam procumbat, præ-  
 cauetur; quod ad præcautionem tam de-  
 fluxionum in genere, quam articulorum,  
 tanquam vltimum remedium adhibetur.  
 Ad curationem quoque, vt materiam de-  
 fluxam apertè euocemus, hoc idem, postre-  
 mum ferè, quod iuuare potest, est reme-  
 dium: tunc potissimum vsurpandum; quan-  
 do

do in profundo admodum latens humor, ægrè medicamentis discutitur, vt in ischia-dico, homoplata dolore, vel alioquin in ar-thritidis aliis speciebus, & cæteris in mem-bra defluxionibus, si causa morbi pertinaci-ter hæreat, hoc ratione tandem elicitur.

Mitius hoc præstant cutem solùm rubifi-cantia, in coxendico & homoplata dolore, vti & in aliis defluxionibus, carnesis sedi-bus, sub quibus dolor latet, apposita. Quod multa remedia calida attrahentia, quæ in to-picis explicabuntur, præstant. Et expressè Sinapismi, qui ex sinapis pulueris solius, vel prius cum aceto subacti, parte vna, cum pul-pæ Ficum vel Fermenti part. ij. aut iij. eo nomine parantur: vel aliis additis interdum, vt Stercore columbino.

Validius hoc efficiunt in cute vesicam aut vlcus vrentia, vesicatoria, & cauteria, quæ ad præcautionem in ceruicis poste-riore sede, quam nucham vocant, vel in brachiis adhibentur, diuque aperta seruan-tur. In curatione verò, vt materiæ fluxus intercipiatur dum fluit, paulò supra locum affectum, vel quando iam fluxit, infra eum, vt in articulis doloribus infra iunctu-ras, & in coxendico dolore, in pedis sura, vel etiam in clunibus inuruntur: In gonagra in poplite, vel vesicatorium supra partem apponitur.

Cæterum quæ hoc præstant, sunt Flam-mula, Ranunculus, Daphnoides, Capficum, Dracontium, contusa admota, vesicas exci-tantia. Vel ipsa Vrtica vrens cuti admota. Quod & Lac Ficulneum cum farinis & ace-to subactum facit.

Vel Cauterium potentiale ex Canthari-dibus factum cum fermento, aliisve indolen-ribus, alibi & in abscessu præsertim aperiendo expositis, admouetur.

Citius rectiusq; ferè hoc actuali cauterio, ferro candente impresso, perficitur. In cuius adhibitione, dolorem non adeò acerbū sen-tient, si locus vrendus, refrigerato ferro lato rotundo, prius prematur: quod in medio foramine eousque amplo peruium sit, vt ferri alterius, quo vitio fieri debet, caput seu globulū candentem, possit admittere: tunc enim ob frigiditatem ferri, & pressionem il-

lam nonnihil stupente cure, ardorem hunc pars dum vritur, mitius fert.

Per introsumpta alterantia, nos præcau-tionis loco in arthritidis speciebus potissi-mum, quæ tam frequenter redeunt, si à san-guine fiant, illa quæ cum refrigerant, vel cō-temperant, crassioresq; reddunt, propina-mus. Qualia multa in febribus synochis, & præsertim illis quæ erysipelata præferunt, & podagræ quoq; causam præbere illic osten-dimus, exposita sunt. Inter quæ & Acida-rum aquarum potum recensuimus, quarum vsu nostro sæculo podagrici quoque aliqui se diutius ab ea immunes mansisse, asseuera-rūt. Præter quas Loram ex Berberi, Prunis, Pomis & Pyris sylvestribus, aliisq; austeris & acidis paratam, additis etiam interdum baccis Iuniperi, pro cōmuni potu multis an-nis senem podagricū, sine noxa bibisse, mi-nusq; tunc à podagra infestatum fuisse, & æ-tatem longæuam attigisse, cognouimus. Sed & Lactis asinini solius potu, quidā se arthri-tides auertisse testantur. Alij Aceti & plures dies vsu, se idem præstitisse docent. Acerum mulsum commendat Diosc. alij scylliticum probant.

Quòd si verò à serosis defluxionib. articu-lorum affectus fiant, tunc ea quæ serositates hæc absumant, & quæ cerebro neruosq; generi accommodata, illorum imbecillitatem corrigunt, exhibentur, quorū continuo vsu, sæpè podagra, illiusque genera, mirabiliter præcauentur. Inter quæ & multa, præsertim non nimium calefacientia, in podagra à san-guine genita, cum ipsius ichores serosita-temq; absumendo, eum puriorem minusq; fluxilem reddant, competentia, eam quoq; præcauent. Qualia multa etiam inter hæc re-media, in cæteris defluxionibus ab iisdem humoribus in alia corporis membra laben-tibus ad præcautionem sumpta aliquando proderunt. Quorum remediorum assumen-dorum, varia, in forma electuaria, con-ditorum, puluerum, aquarum, aliave, in paralysi pituitosa & ventriculi imbecillita-te, aliisque ex defluxione natis affectibus, exposita sunt.

Inter quæ Chamæpythys seu Iua dicta, ad-eò est in arthritide præcipuè conueniens, vt

Arthetica proin dicatur; sanatque ischiadicos decoctum ipsius in hydromelite, oinomelite, vel oxymelite factum, si diu bibant; vel syrupus ex succo illius paratus: confert & Conserua ipsius sæpe exhibita, vel Puluis, Primula item veris, herba paralyseos dicta, non solum in ea, sed & hic conuenit, simili modo administrata. Item Bethonica, Saluia, Acorus, & Stoechas, similiaque.

Præter quæ sequentia arthritidis diuersis speciebus, vti & podagræ, & ischiadico dolori præseruandis dicata, licet & cæteras defluxiones siccant, præcipua remedia sunt sequentia, quæ manè ieiunè multis diebus cōtinuis, vel saltem alternis; ad multas septimanas assumpta, tandem insignes effectus proferunt.

Decoctum radicum Altheæ, rad. Graminis, Asparagi, Penthaphyli, Leucacanthæ, Echij, Papaueris corniculati, & fol. Æthiopis, in coxendico dolore præcipuè approbat Dioscor. quod ex quibusdam vel pluribus in Vino, vel Aqua & Vino decoctis parari potest, Melle aut Saccharo gratum reddi.

Electuarium ex conseruis præsertim tale fiat: R. conseru. Iuæ arthet. 3. ij. conseru. florum Primulæ veris, Liliij conuallij, florum Genistæ, Betonicæ ad 3. j. β. condit. radic. Acori & Pyrethri (in frigidioribus) an. 3. β. & in calidioribus conseru. Rosac. 3. j. Cinamomi 3. j. Gariophyll. Galangæ, Nucis moschatæ an. 3. β. Zingiber. 3. j. Spicæ 3. β. Coralli 3. j. rasuræ Cornu Cerui & Eboris an. 3. β. Cum syrupo de Betonica vel Iua fiat Electuarium: Capiat bolum instar nucis mosch. superbibendo aquam Bethonicæ vel Iuæ.

Aliud Antipodagricum Electuarium: R. sem. Hypericonis fol. Chamædr. an. 3. ij. fol. Chamepyth. 3. j. β. fol. Bethonicæ 3. β. rad. Arist. rot. 3. j. β. rad. Zarsæ parill. 3. j. rad. Angel. 3. vj. Ligni Sassafras 3. β. rad. Asphodeli, si haberi potest 3. ij. rasur. Cornu Cerui, Eboris, Succini puri an. 3. j. Corall. rubr. 3. j. β. Cinam. 3. ij. Gariophyl. 3. j. Croci 3. β. pulueris entur omnia subtilissimè, addendo ad 3. j. puluerum Mellis optimi despumati 3. ij. Capiat 3. iij. vel 3. j. Quod si in forma pilularum malit, excipiantur syrupo conuenienti additâ paucâ Terebinthinâ pulueres, & in pastam redi-

gantur, sed tunc 3. β. sumere pro vnâ vice vel 3. j. sufficit.

Vel fiant tales pilulæ: R. rad. Aristol. rot. & Angel. quæ ob amaritudinem rectius pilulis additur an. 3. ij. fol. Chamæp. 3. iij. Herniar. 3. j. spicæ 3. β. Croci 3. j. cineris Cranij hominis 3. j. β. excipiatur Resinâ laricæ vel Terebint. cum paucō syr. de Beton. fiat massa: Capiat à 3. β. ad 3. j.

Pilulæ in coxendico dolore præcipuè probatæ, licet in reliquis quoq; profint: R. pulu. Chamæpyth. 3. vj. gummi Ammon. Oppopanax. an. 3. j. Myrrhæ 3. β. Castorij 3. j. Euphorb. 3. β. cum resina Abiegna vel Laricea fiat massa: Capiat 3. j. indies.

Electuarium Ischiadicis præ cæteris conueniens: R. fol. Chamædr. Chamæp. Hedera an. 3. β. fol. Rutæ, Saluiæ, Arthemisiæ, Sabine, Betonic. Thymi an. 3. j. sem. Hyperici vel Ascyri vel Androsæmi 3. iij. sem. Rutæ sylu. Abrotani an. 3. j. rad. Rubiæ, Rhapontici ana 3. j. β. Piperis, Cardamomi ana 3. β. fiat puluis, excipiatur Mellis despum. 3. j. fiat electuarium: Capiat 3. j.

Vel: R. pulu. præscripti 3. j. β. adde rad. Xyridis, Polemon. j. cortic. Populi albæ an. 3. j. β. Heliocrysi, Arctij, Chamæcisi, fl. Bellidis & Con. reg. an. 3. j. sem. Capparor. & Ocymastri an. 3. β. Mellis quartarios tres, fiat Electuariū: Vtendum vt superius.

Syrup. vsualis excellens in omnibus arthritidis speciebus. R. Zarsæ parill. 3. ij. rad. Acori vulg. Pentaph. Aristol. rot. an. 3. j. Ang. 3. β. rad. Azari 3. ij. herb. Iuæ arthet. Herniaræ, Betonic. Chamædr. an. m. j. Saluiæ, Thymi, Mentast. Maior. an. m. β. fl. Primulæ, Consolid. regalis an. p. j. fl. Rorism. Stoech. vel Lauand. an. m. β. sem. Anis. 3. β. sem. Hyperici 3. ij. sem. Ocymi, Seseleos, Rutæ an. 3. j. fiat decoctio in aqua & tertia parte vini, colaturæ adde Mellis optimi 3. j. decoquatur ad consistentiam syrupi, & arom. Cinam. 3. ij. Garyoph. 3. j. Vtatur eo ad præcautionē, sumendo 3. j. aut amplius, per se, vel dissoluēdo aquis conuenientibus, vt aquâ Iuæ vel Betonicæ, aliisve.

Puluis ex cineribus admodum exsiccans corporis illas ferositates: R. cinerum Cranij hominis 3. j. cinerum Priapi tauri vel Castoris, si haberi potest 3. β. cinerū Hirundinum vel



vel Cuculi vel Milui 3.ij. Cornu cerui & Eboris vsti an. 3. j. Succini optimi 3. β. Margarit. 3. β. Cinam. 3. ij. pulu. Diagalang. Diamoschi an. 3. β. Sacchari ros. tab. & sacchari candi ad pondus omniū, fiat puluis subtilissimus; Capiat 3. j. β. vel plus, superbibendo parū vini diluti aquis supradictis. Possit & portio illius, Saccharo dissoluto in aquis Iuæ vel Betonicæ in tabulas formari, sicque sumi.

In curatione, cum iam humor in articulo- rum sedem illabitur, quæ eum sistunt, exhibentur. Vt si sanguineus sit, quæ id refrigendo incrassandoq; faciunt. Veluti sunt syr. Viol. Nymphaeæ, de Endiuiā, de Ros. rub. sicc. Myrtinus, Iulep. Ros. Viol. dissoluendo cum aquis idem præstantibus, Acetosæ, Plantag. Laetuc. Rosarum, similiaque. Decoctum itidem Prunorum, Iuiub. Sebest. aliorumq; passim in febribus synochis præsertim expositorum. Quod si verò humor defluens serofus excrementitiis, in articulo- rum regio- nem aliæve loca feratur, quæ & illum sistunt, varia propinantur; in defluxionibus ad interiora corpora factis & catharris hinc inde abundè descripta.

Nonnunquam & necessitate urgente, in vtraque causâ, ad dolorē atrocem mitigandum, narcotica opiata medicamenta propinant, nec in illis, vti creditur, tantum est periculi, quin potius utilitas, in eo quod dolorē compescunt & ne nouus influxus fiat, cauent, maior sequitur. Et proin Theriaca, Mithridatū, doloris nomine in vtraq; causa exhibentur, sæpeque repetuntur. Quæ &, si è defluxione serofi humoris fiat, si cum pauco Bolo addito dentur, eam cohibent & sistunt. Vnde & præcautionis gratiâ hæc nonnunquam dantur. Quorum loco & aliæ opiata, vt Philonium, Asyncritum, aliæque compositiones in colicis doloribus præscriptæ, plus minúsve calefacientes, si dolor admodum infestet, & vigilie obsint, cum magis hæ, quàm illa antidota operentur, vsurpari possunt.

Addenda nonnunquam & ea, quæ defluxiones, si hæ sensibiliter à capite descendere deprehendantur, sistunt, hoc pacto: R. Mastiche, Thuris an. 3. j. Stryacis 3. β. Boli seu terre pinguis & puræ 3. j. β. rasuræ Dentis apri, Be-

deguar an. 3. β. Spicæ celticæ 3. β. Croci 3. β. Opii gr. v. cum syr. de Papau. fiat pilularum massa: Capiat duas vel plures, versus vesperam & diluculum.

Per foris admota hos affectus præcaue-  
mus, si ante aduentum illorum, & capiti, quando inde defluxio procedit, & partibus, in quas illa defluere solet, ad eam impediendam, remedia admoveamus, quorum aliqua etiam inuasionem horum, aliâ in declinatione locum habent.

Per foris  
admota  
præcau-  
tio &  
curatio  
Defluxio-  
nium  
& Ar-  
thritidis.

Capiti in defluxione & arthritide, à serosa illuue, à capitis interioribus exterioribusve dimanante, postquâ decenter purgatū fuerit, quæ illud siccât, roborant, extra paroxysmū interdum in defluxione iam factam, & cum non est metus recidiuæ, in ipso paroxysmo adhibentur. Qualia remedia multa externa in capitis aliis affectibus à pituita profectis, exposuimus. Vt sunt,

Lotiones capitis, ex Saluia, Maiorana, Betonica, Iua, floribus Stœchados, Lauandulæ, Rosarum, Agarico, ceterisque decoctis in lixiuio, facto ex cineribus sarmentorum Vitis, aliisve, additis & aliis multis siccantibus, cerebroque conuenientibus.

Post quam ablutione, ne defluxiones inde concitentur, statim caput iterum siccari debet, panno calido illud fricando, quod Mastiche, Sandaracâ, Succino, aliisve suffumigatum sit: dein diligenter pectinari.

Pulueres quoq; eo nomine in cucuphis, capiti admoventur, aut pilis insperguntur, ex herbis capitalibus, aliisve siccantibus, vt S. Nigellæ, Mastiche, cæterisque parati.

Partibus autem, quæ à defluxionibus excrementitiis, vel etiam sanguinis influxu, affici solēt, idq; imprimis in arthritide, illiusq; speciebus præcautionis gratiâ, ne facile humorem admittant, ea apponimus, quæ, cum debiles & laxæ multo influxu reddantur, eas firment, robustioresq; reddant, & si quid in illis residui remansit, simul absumant, ex quorum numero, & aliquibus in declinatione horum affectuum, vt partes debilitatas rursus confirmemus, reliquiasque discutiamus, vti possumus. Id autem per varia hoc modo perficitur.

Immergenda frequenter, aut fouenda, vel

perfundenda aut abluenda, manus & pedes. Lixiuio parato ex Aqua cōmuni vel pluuiāli, aut cisternæ, vel prius ferratā aut chalybeatā, transfusā per cineres combustorū lignorū Fagi, Quercus, Iuniperi, sarmentorū Vitis & inprimis ossium Equi, Cerui, aliorūque, cum quibus dum vruntur, plantæ aliquæ vtilēs, vt Rorismarinus, Laurus, Hermodactyl, similesque vsurpari possunt.

Huic lixiuio vel simplici, vel vti dictum, composito, vt efficacius operetur. Vinum vel Vrina, aliquando dum percolatur, aut postea permiscetur, vel Sal aut Alumen additur, eā quantitate vt salsum benè fiat, aliquando & Tartari, vel Sulphuris viui aut cocti portio.

Aqua falsa naturalis vel artificialis idem præstat, per se, vel per cineres quoque fusa: cui Myrrhā additā bona quantitate, ad fortum valde commendatur.

Decoctum summitatum & ligni Iuniperi, vel per se, aut cum Lixiuio vsurpatum, vel Sale, cæterisve. Decoctum Raparum aliqui quoque probant. Alij in quo Vulpes exenterata diu coxerit.

Vel sic, cum præsertim laxis tumor in declinatione remansit: R. rad. Ebuli lb. j. Chamæpyth. M. j. Ros. rubr. flor. Chamemel. Meliloti an. P. j. Balauft. f. Myrtill. an. 3. j. Lumbricorum terrestr. plures, coquantur in Lixiuij part. quatuor, Vini part. ij. Aceti part. j. Vtatur.

Vel fiat tale decoctum, ex pluribus paucioribusve paratum: R. radic. Ebuli, Cannabis ad 3. ij. herb. Saluæ, Absynth. fol. Lauri, Origani, Pulegij, Calamentæ, Mentastrj, Thymi, Chamæpyth. Beron. Hyssopi, Plantagin. ad M. iij. f. Verbasci, Rorismar. Rosar. rubr. ad P. iij. Baccarum Iuniperi, Lauri ad P. j. Myrtillorum 3. 6. Nucum cupress. 3. j. cortic. Mali granat. vel Balauft. 3. 6. fiat decoctio in aquæ mens. v. vel vj. addendo quartam partem vini rubri, Salis 3. j. Alum. 3. 6. In hoc immergat membra. Vt efficacius astringat laxas partes, Gallæ, Acaciæ, Hypocistis ad 3. j. quoque adduntur. Pruna syluest. sicca, Pyra, Sorbo, Mespila, pauperes addere possunt.

Inunctiones partes debiles & laxas confirmantes sunt, Oleum ex acinis vua-

rum expressum cum oleo Salis inunctum. Item olei de nucleis Auellan. Cerasorum, de Been, Citreum & Arantiorum.

Vnguentum roborans: R. olei Myrtillorum vel Ros. completi 3. ij. Salis 3. ij. misce: Inungantur partes debiles. Interdum & Myrrha additur ad 3. j.

Caput Milui deplume crematum, vel ossa subtiliter puluerisata, cum oleis inuncta, vel aliis vnguentis admixta, proprietate iuuare dicuntur.

Aliud vnguentum: R. ol. Lumbricorum, Ranarū ana 3. j. 6. ol. Ros. omphacini, axung. Anferis, quæ in acetum, dum torretur, instillat an. 3. j. Acaciæ, Balauftiorum an. 3. j. Stercoris bubuli exsiccat. 3. ij. Salis 3. j. Aluminis vsti 3. 6. Ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vel hoc: R. summitat. Rubi, Sumachi, fol. semperuiui recentium q. s. Coquantur in vino stiptico rubro, passentur, adde far. Alphiti. Hordei immaturi æq. partes, pulueris cort. Granat. sextam partem: Applicetur instar Cataplasmat.

Admodum pedes vel manus imbecilles roborat, si in acereum vinaceorum, ab vuis nigris expressis congestum, dum effervescente calet, manè aliquoties pedes vel manus immergant.

Quod in acervuo Tritici quoque factum, Sexti Pompei remedium fuisse asserunt.

Thermæ aliquæ ad tempus vsurpatæ, præsertim sulphuræ, falsæ, nitrosæ, præterquam quod per sudores superfluitates in corpore, vti dictum, absumunt, robur articulis addendo, in defluxionum & arthritidis præcautione aliquid præstare possunt. Vti & si per modum embrochæ vel dutiæ capiti etiam admoventur, scaturiginem mali auertunt. Quorum & residentia, seu lutum partibus infirmis applicatum, eas confirmat.

Possunt & Balnea artificialia, loco thermarum aliquandiu vsurpari, ex decoctis supradictis dictorum simplicium, partes roborantium parata. Corium canis applicatum, proprietate valere creditur.

Quorum omnium vsu diutius adhibito, ne humores calore & madore horum, ad partem quæ prona est ad suscipiendum, conciten-

613  
conciterur, illa interdum defensiuus supradictis emplastris, muniri potest.

In curatione verò herum affectuum, in principio statim cum inuadunt, vel etiam antequam inuadant, si iam praeludia illorum adsint, extrinsecus quæ influxum prohibent, applicantur. Quæ in arthritidis præsertim speciebus, supra articuli regionem, quæ iam affecta est, vel affici solet, versus emunctoria, parte internâ magis quam externâ applicari debent. Et si membrum permittat ut commodè fieri possit, fasciâ ligari: addito insuper si magis operari volumus, etiam Asplenio.

Sic convenit defensiuum cômune, quod ex Bolo, Album. oui, addito interdum & Aceto, paratur, & cum cottone vel panno lintheo applicatur.

Vel: R. Boli, vel alterius terræ pinguis, quam sigillatam vocant ʒ. ij. Sanguinis draconis. vel Acaciæ aut Hypocistid. ʒ. ʒ. Gallarum ʒ. iij. rad. Bistortæ, capular. Glandiû, vel nucis Cupress. an. ʒ. j. ʒ. fiat puluis, excipiatur Aceto ros. & album, oui ad vsûm. Hisce & Balauſtia, Spongia ros. fl. Ros. sem. Vuarum, aliaque adstringentia addi possunt.

Ex Lichargyrio & Bolo, Aceto & Album. oui vel murchilagin. sem. Psyllij subactis, nutrimentum appositum, idem præstat.

Hisce ne subito areſcant, ol. Ros. completum vel Omphacinum, aut Myrtillorum quandoque, sed paucâ quantitate, ne imbecillius fiat medicamentum, additur.

Vel fiat tale Cataplasma: R. Pulpæ fructuum non plene maturorum, ut Pyrorum, Cydoniorum, Sorborum, Cornorum, Mespilorum, aliorumve, (vti inter exotica, Dactylorum, Oliuarum) costorum in Aceto rubro vel rosac. cum Panis mica, vel Lentium farina, paulò minore quantitate q. l. Applicetur vt dictum.

Emplastra alia adstringentia, quæ foris adhibita, fluxiones in oculos intercipiunt, hic quoque conuenire possunt: vti & alia id præstantia remedia, in ophthalmia exposita.

Ligaturæ quoque supra locum affectum factæ, vbi commodè fieri possunt, materiæ descensum intercipiunt. Et si femora li-

gentur, ne humor in pedes facile descendat, impediunt.

Supra partem verò affectam, prout morbus vel in principio, aut progressu est, causæque vel adhuc in fluxu, vel iam influxit, vel repellentia, vel dolorem sedantia anodyna, vel etiam narcotica, vel resoluentia sunt ad mouenda. Qualia nunc explicabuntur. Ea quæ nodos podagricorum emolliunt, & discutunt, in tumoribus aliis explicanda.

Repellentia mox in principio, dum causa fluit, in arthritidis præsertim speciebus adhibentur, quæ vel adstrictione, vel frigiditate, si à sanguine illæ proficiſcantur, aut summo pere locus caleat, illud præsent. Quæ tamè in ischiadico dolore, qui in profundo existit, vti & in cæteris defluxionibus, in carnosâ loca factis, si humor in alto lateat, parum prodesse possunt. Quibus repellentibus vel solis, vel admixtis simul anodynis, aut non nihil resoluentibus hoc pacto vtimur.

Aquâ frigidissimâ dolentem locum perfundere docet Hippocr. quod, cum admodum repellendum & refrigerandum, fieri potest; Niuem etiam adhibitam aliquibus profuisse, constat. Acetum quoque frigidum infusum, vel cum panno in eo madefacto applicatum, sæpeque repetitum, aliqui valde laudarunt.

Ex Aquæ tribus partibus, & Aceti vnâ, idem fieri potest. Aliquando ex Aquæ tribus & vini rubri astringentis partibus, duabus, in quibus & Furfur, farina seminis Lini, vel Lupinorum decoquuntur, emplastri vice, commodè versus augmentum applicatio fit.

Vel Aquæ sumunt partes tres & Aceti quartam partem, bullire faciunt, addendo farinam Frumenti vel Hordei & seminis Lini q. l. vt fiat Cataplasma.

Plantago, Lyſimachia, Semperuiuum, Violaria, Portulaca, Intybus, Polygonum, Psyllium, Solanum, Parietaria, Populi fol. & Cucurb. Nymphaea, Lenticula palustris, similesque plantæ contritæ apponuntur, quibus olei Ros. vel aliud, & Axungia addi possunt. Vel prius cum farinis & Aceto incorporantur.

Brassicę fol. cum farina s. Psyllij vel Fœnogræci & Aceto contusâ, appositâ, Cotonea mala, tosta cum farina Hordei vel Polenta pista, competunt.

Plantaginis folia cōtusa, cum farina Lentium vel Hordei, & mica Panis, addito olei Ros. in formam cataplasmatidis rediguntur.

Furfur cum farina Hordei in Aqua Chalybeata coquitur, add. Ros. vel ol. Ros. emphacino, atque in principio etiam Aceto: in augmento verò fl. Chamom. vel illius Oleo.

Succi prædictarum herbarum farinâ Hordei, aliisve incorporantur, vel olei Rosac. vel Viol. miscentur, & cum Vitello oui, & Terebinthinâ, agitatâ simul applicantur, quibus Acetum interdum additur.

Vel sic: R. ol. Ros. ʒ. iij. succi Lactucę vel alt. frigid. ʒ. ij. Aceti ros. ʒ. j. Vitell. ou. num. ij. inspissentur farinâ Hordei, fiat pasta.

Vel: R. ol. Ros. Omphac. Aceti Ros. an. ʒ. ij. Boli armen. ʒ. ij. Santali rub. ʒ. j. Misce.

Cerusa cum aquis vel succis modicoque Aceti permista, vtilis.

Oleum ros. vel Viol. cum aquis prædictarum herbarum, vel decocto, miscetur, addito Aceto aliquando, pro epithemate.

Vnguento infrigidante Galeni, Comitissę, Populeo vti quoque possumus. Quibus etiam lumbi calida defluxione petiti inunguntur.

Anodyna quando dolor vrget, miti calore rarefaciendo, & mulcendo, admota, proderunt; illisque vel statim in principio, repellentibus tunc simul ferè, si in fluxu adhuc humor est, permittis, vtimur; vel postea, cum iam fluxit, additis interdum quę amplius adhuc quàm ipsa rarefaciendo resoluant, adnouemus, illudq; sequentibus formis efficimus.

Lac vaccinum, aut aliud, irrotatum, vel ex alto diu tepidum infusum, aut panno lineo in eo madefacto, applicatum. Quod ab initio chalybeari potest, & vt dolor magis sedetur, flini, Fœnogræc. in eo decoqui, & cum parti appropriatum reddere volumus, Hermodactylos, aliave addere possumus.

Ad lactis t. j. Si Sulphuris vel Lithargyri ʒ. j. addatur, appliceturq; id quod collectum est, discutit.

Ouorum sumitur Luteum & Albumen, vel Albumen solum, agitando fortiter, cum tertia parte olei Rosacci vel Chamemeli, & cum pannis applicatur. Cui crocum quoq; addi potest.

Vel oua decoctione indurata, cum Myrrhę quartâ parte contundantur, additis flor. Chamemeli & paucis Croco, in pastam redigantur.

Olea Rosaceo perfunditur pars dolens, vel cum Lanâ succida adhibito fouetur; interdum & Violac. in quibus Lumbrici possunt decoqui, vel ol. Lumbricorum additur, & in progressu admixto simul ol. Chamomelino & Vulpino. Oleum è luteis ouorum dolorem sedat.

Vel hoc vnguentum fit: R. ol. semin. Lini rec. Sambucini, Lumbricorum an. ʒ. ʒ. Croci gran. iij. Camphorę gr. ij. misce, Inungantur partes, & inuoluantur linteo madefacto in vrina pueri.

Vel Cataplasma ex Pomorum dulcium coctorum pulpa, cum ol. Ros. vel Ranarum, vel Chamomel. mista, paratum.

Vel ex Cassię fistularis pulpa extracta, solâ, vel prius farinâ hordei aut s. Psyllij, aliorumve inspissata: Cui olea aliqui, vt Rosac. Chamom. & similia miscentes, sic eam dilutam parum inungunt, quod rectius aq. Rosarum Solani, aut Plantag. aliisve fieri potest, atque interdum adeò dilui, vt cum panis intinctis in ea applicari possint.

Panis syncomistos, hoc est ex Farina, non secreto Furfure factus, ablata crustâ, maceratus vel decoctus in lacte Vaccino, Caprino, Ouillo, vel Mulieris, vsitatum est in dolore sedando remedium, ad cuius t. j. postquam coxerit, Vitelli ouorū duo vel tres aliquando permiscuntur. Interdum & ol. Rosac. vel Chamom. ad ʒ. vj. vnâ incoquitur. Alias cum refrigerare simul & repellere volumus, omissis oleis, vel simul additis, succorum Nicot. Solani, Plantag. ad ʒ. iij. Aceti ʒ. ij. simul coquantur. Vel herbę ipsę, alięue, Lacti prius incoquantur.

Psyllij semen vel Lini contusum, & coctum parum in aqua, ad visciditatem & consistentiam aliquam, vel illius mucilagō extracta, cum aqua Ros. Solani aut Semperuiui,



617

uiui, aliāve, applicatum dolorem compescit, cui Albumen & vitellus oui quandoque additur. Huic pastæ dum calet, mucilago Lini, Cera & olei Rosæ aut Chamom. quandoque additur, sicque vsurpatur, addito interdum & Aceto.

Fœnogræci semen contusum in Oxymelite vel Aceto & Melle coctum admouetur. Vel farina illius succo Caulium rubr. subigitur, addito Aceti fortis quartâ parte, sicque vsurpatur. Vel cocto, puluer. seminis Fœnogræci, in Vino, pulu. Chamom. Meliloti, nonnunquam & Hermodactyl. permiscetur: Additâ interdum & Terebinthin. Oleis & Mucilaginis.

Fabarum farina vel Lentium & Hordei, prædictis quandoq; seminum pastis additur. Aliàs olei Rosæ subacta, additis interdum & succis herbarum supradictarum apponitur.

Vel sic: R. farinæ Fabarum & Fœnogr. an. 3. ij. far. Hordei & seminis Lini an. 3. j. puluerum rad. Altheæ, fl. Cham. & Melilan. 3. 8. f. Cimini 3. iij. decoquatur in Vini, Aceti, Mellis æq. part. addendo Axung. Gallinæ 3. ij. ol. Anethi 3. j. fiat Cataplasma.

Vel: R. rad. Altheæ quart. 8. Raparum quart. j. fol. Maluæ, Caulium, Hyosciami an. M. j. carnis Cucurb. 3. ij. flor. Viol. Chamom. Melilot. Verbascian. P. j. fiat decoctio in Aquâ & Vino, adde far. f. Lini vel Psyllij & Fœnogræci ad 3. iij. Vitellos ouorum num. iij. axung. Porci 3. iij. olei Anethini, Ranarum an. 3. ij. fiat Cataplasma.

Narcotica ratione doloris admota, cum stupidiorem partem reddant, non solum præcæteris dolorem compescunt, sed & quia calore suo, quo constare, alibi iam sæpè ostendimus, humorem simul resoluunt, prodeunt, tutoque nec ita cum periculo, vti creditur, vsurpantur. Vel per se, aut cæteris anodynis aut resoluentibus permista, hoc modo.

Hyosciami vti & Mandragoræ ac Papaueris folia recentia, contusa vel prius decocta admota, valde iuuant in dolore. Oleum quoque illorum: Succus item ab illis expressi, illita, aut aquis Rosarum, Nenupharum aliisve permista, per forum aut embrocham vsurpata, aliōve mo-

do cum prædictis anodynis mista & administrata.

Radix Mandragoræ, semenq; Hyosciami cum Polentâ permista, cataplasmatibus instar applicata, vel cum oleo cōuenienti, aut cum axung. in formam vnguenti redacta.

Vel sic: R. fol. Hyosciami M. ij. Solani, Semperuiui an. M. j. capitum Papau. hortensis P. j. rad. Mandragor. 3. j. flor. Chamom. Viol. an. P. j. femin. Psyllij 3. 8. femin. Hyosciam. 3. ij. fiat decoctio in Aqua vel Lacte: quâ foueatur locus: Residentia pisteretur, addendo farinæ seminis Lini 3. j. 8. farin. Tritici 3. ij. axung. Anatis vel Gallinæ, ol. Chamom. an. 3. j. fiat Cataplasma.

Opium præcipue diuersis formis anodynis additum, ea efficacia facit, semper ferè tunc additâ simul Croci portiunculâ; sicque vsurpatur cum Lacte, si 3. ij. illius, Opii 3. 8. addatur: cum Panis emplastro, addendo Opij ad 3. ij. vel cum aliis cataplasmatibus. Inunctionibus quoque diuersis permiscetur, sed pinguibus additū, minus est efficax. Inprimis in Spiritu Vini simplici, vel admixtione aliorum compositi 3. iij. per Croci infusionem flavescentem, si Camphoræ 3. j. decoctione addatur, & Opij 3. j. dissoluatur, eoq; liquore pars dolens vngatur, tutum & efficacissimum erit remedium.

Antidota opiata, vt Theriaca, Mithridatum, Philonium, applicata recentia propter opium aliquid præstant, præcipueque si opij augeatur quantitas.

Torpedinis corium admotum; vel oleum in quo coxerit illitum, stuporem inducendo multum prodesse possit.

Resoluentia quæ humorem absorbunt, in progressu morbi, quando defluxio substitit, vsurpanda: Calidis moderate & rarefacientibus, si præsertim à sanguine facta sit, materiam discutiendo: calidioribusque adhuc, si à seroso excrementitio humore proficiscatur, eum dissipando, & ne in nodos conuertatur, penitus consumendo: Et si in profundo lateat, vt in coxendico dolore, vel aliis in habitum corporis delatis defluxionibus, validioribus adhuc metasyncriticis extorsum eum euocando, attractumque absorbendo; Vsurpando simul & permiscendo

illis, in articuloꝝ doloribus, quæ mem-  
braneis neruosisque locis articuloꝝ ap-  
propriata sunt, Arthetica dicta, & quæ pro-  
prietate quadam vsu explorata, operantur.  
Quæ remedia per formas distributa, propo-  
nemus, articuloꝝ doloribus præsertim ac-  
commodata, licet & in aliis defluxionibus  
pleraque conueniant.

Olea præcipuè competunt sequentia. Ver-  
basci florum oleum, quod ex floribus recen-  
tib⁹ in vitro bene clauso soli expositis spon-  
te effluit; vel maceratione in oleo, vel in vi-  
no, etiam in calore solis, vel alio, in vase clau-  
so fit.

Oleum quoque in quo Sambuci vel Ebu-  
li radices & folia, vel succus inde extractus  
coxerint, in primis oleū sem. Ebuli hic sum-  
me laudatur. Quod fit, si illud bene matu-  
rum, repurgatumque in pastam contusum  
in aqua coquatur, spumaque colligatur,  
eaque in vitro oblongo posita, in loco te-  
pido per triduum aut quatrimum collo-  
cetur, donec oleum, quod subuiride est, fun-  
dum petat. Idem quoque ex feminibus il-  
lus expressum efficacissimum est. Vti & ex  
semine Raphani, & de Nucibus Indicis, &  
Glande vnguentaria.

Oleum item ligustrinum Cyprium, vel  
de Alchanna dictum, & cucumeris asini, Sy-  
cionium vocatum, & in quo coxerint Flam-  
mula, Cortusa herba.

Ranarum oleum & Lumbricorum, Vul-  
pinum, & in quo coxerit Mustela, vel Cico-  
niæ aut Cygni pulli. Item Galearum pisciū  
hepar, vel Afelli aut Millepedes.

Item oleum ex ossibus Humanis factum,  
vel maxillis Equorum; quod fit, si illa con-  
fracta, ignita, oleum antiquum imbibant, &  
postea ex illis contusis per retortam oleum  
eliciatur; vel alia arte. Oleum ex sanguine  
Cervi eliciunt chymici, illudque probant.

Præter quæ alia olea calida quoque vsur-  
pantur, vel istis miscentur, vt Laurinum, Co-  
stinum, Sambucinum, Nardinum, Rutaceū,  
Irinum, Cheirinum, Liliorum, Hyperici, de  
Euphorbio, de Castoreo, de Lateribus, de  
Terebinthina, Petroleum. Quibus & ex-  
stillata quandoque alia miscentur; Veluti  
oleum Spicæ, de baccis Iuniperi, vt si 3.j. ad

3.j. olei Laurini alteriusve addatur. Oleum  
Gaiaicinum & Sulphuris, admodum quo-  
que commendatur, & oleum Tartari alij a-  
liis permiscunt. Salis oleo, cum lateribus i-  
gnitis factum, cum ol. granorū Ebuli, vtun-  
tur chymici. Alij sal in oleo coquunt, illudque  
inungunt.

Fiunt & alia olea composita, vt ex Oleo  
antiquissimo cum aqua parte Medullæ crā-  
ris vituli, addendo Lumbricos, Iuam & pa-  
rum Croci; leuiter coquendo in duplici va-  
se & colando ad vsum.

Aliud: R. Olei communis, Laurini & Te-  
rebinth. an. æq. partes, adde Mastichæ, Myr-  
rhæ, Thuris partem vnam, eliciatur oleum.

Vel sic: R. olei Tereb. lb. j. adde Saluiæ te-  
nuiter incisæ M. j. Bulliant bene cooperta in  
balneo Mariæ, & postquam refrixerint, exi-  
matur saluia, à qua reliquum olei benè co-  
letur, nouaque reponatur, denuoque bul-  
liant, iterumque eximatur, aliaque addatur,  
ter aut quater illud faciendo, & postremo lo-  
co saluiæ gummi Ammon. & oppopanacis  
puluerisata an. 3. iij. iterumque coquantur,  
& ad vsum referuentur. Quo cum illinis par-  
tem, superponatur Gummi Tacamacha em-  
plastrum instar.

Admodum efficax in Coxendico dolore  
est sequens: R. ol. Nucum, cui & alia misce-  
ri possunt, 3. vi. fol. recentium Cucum. asini vel  
Flammulæ, vel Iberidis, vel rad. Cyclaminis  
rec. contusorum, vel succorum illorum ad  
3. iij. Lumbricorū dissectorū in partes n. xx.  
gummi Sagapeni, Ammoniacy, dissoluti 3. j.  
Vini Maluatici 3. ij. aquæ Vitæ 3. j. Coquan-  
tur simul ad consumpt. succorum, Coletur,  
& seruetur oleum.

Vel: R. radic. Pyrethri, Hellebori albi  
an. 3. β. Hermodactyl. Turbith. fol. Rutæ, Ab-  
synth. an. 3. ij. Colocynth. Euphorbij an. 3. j.  
Salis 3. j. β. Infundantur in oleo antiquo, ad-  
dendo Vini generosi & aquæ Vitæ 3. j. Ma-  
cerentur in sole, vel coquantur, colentur ad  
vsum.

Huc & Balsamum factitium Matthioli re-  
fertur inunctum.

Vnguenta & emplastra vinctuosa diuersi-  
mode parantur. Ex axungiiis variis, vt Hu-  
mana, Hirci, Capræ, Veruecis, Porci, Vituli,  
Anse-

621

Anseris, Gallinæ, Anatis, Vulpis, Vrsi, Cati fylu. & Ibicis, Serpentis, Item Oesipo & medullis, Equina, Ceruina, Vitulina; quibus solis vel mistis partes dolētes inunguntur, vel liquefactis prius in vino, additā etiam Aquā vitæ, tempore inunctionis.

Anseris inprimis pinguedo, sic præparata & collecta, magni fit: Anser si exenteratus impleatur portione carnis Vulpis vel Felis, addendo folia Iuæ, Saluæ, Rosmarini, Maiorana, Betonica, aliæve, confususque iterum, in veru affetur, pinguedoque exsudans & destillans vase aquā & aceto pleno, excipiat.

Alia utilis, Cerui pinguedo, vel Bouis medulla, cum Aquæ portione, Aqua vitæ miscetur, & in vino bene obturato per dies 15. in fimo equino sepulta maceratur, ad vsum feruatur.

Ex aliis composita, variis modis fiunt. Sagapenum, Galbanum, in oleo dissoluta, inunguntur vel applicantur.

Vel sic: R. succi Ebuli, olei Rutæ vel alterius ana 3.ij. adde gummi Ammon. dissol. in Aqua vitæ 3.6. Mastichæ, Thuris ana 3.j. Castorei 3.6. Terebinthin. q. l. fiat instar nutriti.

Alio modo sic fit: R. succi Ebuli, & Olei antiqui vel alterius ana 3.j. coquatur ad consumpt. adde Mumie 3.6. Camphoræ 3.j. fiat Linimentum.

Vel sic: R. ol. Ros. Lini Liliorum vel Irini, Chamomil. an. 3.j. succi Apij 3.j. mucilag. sem. Lini & rad. Althææ, vel f. Fœnogr. & Sani hircini ana 3.j. Bulliant ad consumpt. & cum Cera fiat Linimentum, addendo parum Croci.

Conueniūt ex vñtatis. Quatuor vnguentæ calida dicta. Inter quæ mitius est, Dialthææ vnguentum, compositum præcipue, efficaciora & opērosa magis sunt Marciarū, magnum & minus, Agrippæ & Arogon. Et præsertim articulorum doloribus accommodatum, Ebulinum, Diuinum, Neruinū, Vigonis vnguenta.

Horum loco, hisce vti possumus: R. rad. Ireos, Aristol. Acori an. 3.ij. Pyrethri, Turbith. Hermodactyl. ana 3.ij. baccarum Lauri 3.j.6. Colocynth. 3.j. Piperis, Nucis mosch.

ana 3.6. Croci 3.j. Storacis 3.6. Thuris 3.ij. Bdellij 3.j. Euphorbij, Castorei ana 3.6. puluerisuntur, adde olei Laurini vel alterius, Oesypi, axungie Anseris, Vituli vel alterius q. l. addendo Terebinth. 3.j. vt in pastam redigatur, adde olei Spicæ 3.6. Applicetur: potest & Stercus vaccinum addi.

Aliud in Ischiadico dolore, & similibus potissimum conueniens vnguentum: R. ol. Liliorū 3.ij.6. Cheirini vel alterius & Lumbicorum, axungie Vulpis vel Anseris an. 3.j.6. succi Iberidis, vel Enulæ camp. aut Thymbræ seu Satureiæ 3.ij. gummi Ammoniaci dissoluti in Aquæ vitæ 3.j. rad. Cyclaminis 3.j.6. rad. Pyrethri, Ireos, sem. Sinapis ana 3.j. Hermodact. Castorei, Euphorbij an. 3.6. Terebinth. q. l. fiat instar Nutriti.

Vel hæc Emplastra: R. rad. Enulæ, Costi vulg. Ireos ana 3.6. rad. Cyclamin. Ari an. 3.ij. Hermodactyl. Pæoniæ, Visci querc. ana 3.j. seminum Sinapis, Erucæ, Rutæ agrest. an. 3.j.6. feminis Cimini, baccarū Lauri ana 3.j. Piperis, Maceris, Garyophyllana 3.6. Croci 3.j. Myrrhæ, Thuris, Storacis cal. an. 3.j. Nitri, Vitreoli vel Adarces an. 3.j.6. Euphorbij, Castorij an. 3.6. fiat Puluis, adde gummi Ammoniaci 3.j. Bdellij, Galbani, Oppopanacis, Sagapeni ad 3.j. dissoluta omnia in Aceto & Aqua vitæ addendo Storacis liquidæ 3.j. Ladani, Læserpitij an. 3.j.6. excipiantur oleo Liliorum & Rutaceo, additaque Terebinth. Pice, Resinā, inter quas Pini præfertur, & Cerā, fiat magdaleon, inuolutus pelle Arietinā.

Aliud: R. Picis puræ nigre splendide, quam Naualem vocant, Resinæ an. ʒ. ʒ. axungie Veruecis, additā Anserinæ vel Anatis quartarium j. dissoluantur, permiscendo sensim Olibani ʒ. ʒ. postquam feruere desierit, adde pulueris Cimini 3.ij. Piperis 3.6. ol. Spicæ 3.6. fiat emplastrum.

Fiunt & alia ex aliis in articulorum doloribus vnguenta, vt: R. Medullæ cruris Vituli: vel alterius axungie conuenientis, ol. Rosacei vel alterius articulos firmantis an. 3.ij. Salis vñi 3.j.6. misce: Inungantur pedes; quod efficacius erit, si stercoreis Bubuli exic. 3.ij. addas.

Vel sic: R. olei Nucum vel antiq. ʒ. ʒ.

axungiae Anseris, Vulpis, Medullae cruris vituli ana ʒ.ij. Ranarum excoriatarum n.x. Lumbricorum terrest. ablutorum vino ʒ.ij. Asellos sub vasis latentes n.xxx. Salis ʒ.β. Vini albi generosi ʒ.ij. succi Ebuli, vel Sambuci vel Hederæ, vel Iuæ ʒ.ij. coquantur ad consumptionem humiditatu, exprimantur, addendo Terebinth. & Ceræ q. s. pro inunctione.

Diachylon emplastrum vtile quoque est, illud quod lithargyrium recipit, quod si validius vt operetur, velimus, ad ʒ.β. Sulphuris ʒ.β. Chalcitidis ʒ.β. miscebimus. Vel Diachalcitide cerato, quod præter lithargyrium etiam chalcitidem continet, vtimur, cui sulphur quoque addi potest.

Vel illorum loco tale paretur: R. Olei antiqui ʒ.β. puluer. Lithargyrii ʒ.ij. Sulphuris ʒ.β. Chalcitidis ʒ.β. coquantur ad consistentiam, addendo mucilag. sem. Lini vel Fœnogræc. & Axung. porci vel alterius an. ʒ.ij. fiat Emplastrum vel Vnguentum.

Apostolorum vnguentum hic quoq; conuenit, quod multa gummi recipit, & lithargyrium simul, & æruginem aeris.

Vel hoc vsurpari potest: R. ol. Laurini ʒ.ij. ol. Lumbricorum & de Lateribus an. ʒ.β. dissolue Saponis ʒ.β. medullæ cruris Cerui, Vituli vel Bovis ʒ.β. Terebinth. ʒ.β. gummi Ammon. Oppopan. Galbani dissol. in Aceto an. ʒ.β. Myrihæ, Thuris, Mastich. an. ʒ.β. rad. Aristoloch. rot. ʒ.β. Lithargyr. Sulphuris viui an. ʒ.β. Æruginis aeris, Salis vsti an. ʒ.β. Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Probatum & hoc: R. olei Ligustrini, vel Sambucini vel Ebulini ʒ.ij. ol. de Terebinth. Adipis bouis an. ʒ.β. Visci seu Collæ dissolut. in Vino ʒ.β. Thuris ʒ.β. Nitri, Calcis an. ʒ.β. misce, Applicetur; Huic lapidem Asium aliqui miscant.

Ranarum emplastrum Vigonis dictum, in pertinacibus defluxionibus, & doloribus, ischiadicis, aliisque valde iuuat; atque aucta dosi Mercurij & Euphorbij, fit efficacissimum. Cuius descriptionem in lue venerea exponemus.

Infusiones alię non vnctuosę sunt ex Aqua vitæ, in ischiadicis, quæ inuncta prodest; cui aqua Sabule, Lanandulæ, Melissæ, similesq;

nonnunquam æquā, aut maiori portione permiscuntur.

Ex Sapone (eligendo optimum) dissoluto cum Aqua vitæ, inunctio fit, vulgatumq; est in omnibus defluxionibus, frigidis præsertim remedium.

Ex Vrinâ impuberis, aut vt aliqui volunt, ipsius ægri, coctâ, despumando, donec ad mellis consistentiam redigatur, in arthritide vnctio fit. Et ex Sanguine menstruo, vt docet Diosc.

Cineres itidem Mustelę crematæ cum Aceto inuncti, vel Cineres Fabarum, Caulium & Siliquarum, & Sesami, cum semine Brassicæ, similiter vel cum Axungia vncti.

Succi itidem Vrticæ vel Thapsiæ, Colocynthidæ, Rutæ, Saluiæ illiti, vel medulla Nucis Ind.

Pulueres item testarum Fornacum vstarum, vel ex Ferri rubigine, lapid. Gagatę, vel Asio, cum succo vel alio liquore inuncti.

Applicationes alię in formâ Cataplasmatiss, aliæve hoc modo sunt. Ex plantis, veluti Verbasci foliis. & floribus, Vrticâ, Rutâ, Artemisiâ, Apio, Heliotropio, Scordio, Leucoio, Pilosellâ, Consolidâ minore, Musco terrestri, Sesamo cum semine, & radicib. Cannabis, Aristoloch. Dictamni, Cucum. asini, Narcissi, Bulbi, contusis, & per se appositis, vel addito Melle aut Acetô: vel prius decoctis in Aqua vel Vino, vel etiam Aceto. Vel succi quarundam, Farina filiginis, aliisve incorporati, apponuntur.

Iberis recens contusa, vel sub cineribus parum tosta, applicata, admodum in ischiadicis conuenit; cuius loco Cardamine, Nasturtium hortense estatis, & aquaticum hyemis tempore sumi potest.

Helenium contusum cum radice, ad idem valet, vel in Vino prius coctum.

Imperatoria sylu. quæ ebulum imitatur, ab insigni vsu in ischiadicis & podagra, Podagraria dicitur.

Melissophyllon cum Sale contusum applicat Dioscor.

Saluiæ, Rutæ folia, Iuniperi baccae, recentia inuicem contusa, affuso Vini spiritu, & Vrinâ pueri, applicant in ischiadicis.

Lini semen coctum in Vino, appositum



615

vel per se, vel in sacculo, mirè prodest, cui flor. Chamom. permisceri possunt.

Panis ex Secali, cum semine Carui pistus & coctus, calidus ad motus.

Furfur cum Sapa coctus, addito Sale, egregiè in gonagra, aliisque doloribus iuuat.

Fabarum, Lentium, Hordei farinæ decoctæ cum Oxyelite, applicatæ profunt.

Vel Fabarum farina in Vino cocta, addendo parum Aquæ vitæ & Butyri, in gonagra & homoplata cæterisque doloribus iuuat.

Passulæ enucleatæ contusæ, addito Popanace.

Musculus marinus vel Pulmo, aut Fucus marinus, recentia imposita; vti & Androsace, iuuant arthriticos.

Agaricus itidem cum Lacte caprino contusus, & Farinâ triticâ subactus.

Ebuli fol. tenera vel Sambuci contusa appositæ. Vel priùs frixa in Butyro, aut cum axungia Porci aliâve permixta. Quibus & rad. Plantag. quandoque adduntur.

Ruta recens & Betonica simul cum axungia Porci antiquâ mista, addendo Sal. in gonagra profunt.

Matricaria cum suâ radic. trita, cum Axungia & Aceto, si defluxio labatur in partem, conuenit.

Bryoniæ radix contusa cum Aqua vitæ, addito etiam lardo, admodum in defluxionibus iuuat. Vel Bryoniæ & Ari vel Dracunculi radices aut folia, Ficus folia contusa, & cum Stercore vaccino aut caprino subacta, addito nonnunquam & Melle.

Item: R. Vrticæ contusas ad lb. j. additis olei Laurini lb. j. Petrolei lb. j.

Brassicæ folia contusa, cum paucâ Maiorana ad lb. j. additis Bdellij, dissolut. in aquâ Vitæ vel Aceto lb. j. & pulueris Colocynthis lb. j.

Vel: R. Raparum parum tostari & postea coctarum lb. j. far. Foenogr. lb. j. adde succi Ebuli, vel herbam contusam ad lb. j. Mellis parum, misce.

Vel: R. pulueris Hermodactyl. farin. Hordei an. æq. par. Vitellos oui n. ij. addendo Mel.

Vel: R. Farin. Foenogr. Lupinorum, ad lb. j. adde farinæ Lolij, pulu. rad. Altheæ, fl. Chamom. Meliloti ad lb. j. seminis Cimini lb. j.

coquantur in Melicrato, addendo in fine plus Mellis, fiat cataplasma.

Vel: R. rad. Altheæ, Liliorum, Bryoniæ, Ebuli an. lb. j. fol. Saluiæ, Iuæ, Absynthij, Maioranæ an. M. j. flor. Chamomil. Meliloti, Furfuris an. p. j. fiat decoctio in Aqua vel Ceruissia, contundantur & passentur, addendo farin. Hordei vel Tritici, Lini, Foenogr. an. lb. j. Mastichæ lb. j. olei de Lateribus, vel alterius ex supradictis ad lb. j. Croci lb. j. fiat Cataplasma.

Vel sic: herb. succ. Pulegij, Saluiæ, Sabinæ, baccar. Lauri, Hermodactyl. an. lb. j. Mastichæ lb. j. Styracis lb. j. Terebinth. lb. j. Mellis vel Sapæ q. s. fiat emplastrum.

In ischiadicis præsertim hæc apponuntur: R. fol. Iberidis, vel Nasturtij, Helenij an. M. j. Calaminthæ M. j. contusa applicentur vel coquantur parum in Vino, contundantur, & applicentur, vel addantur farinæ Lupinorum lb. j. Mellis lb. j. fiat Cataplasma. Interdum & Axungia & Olea adduntur; interdum & penetrationis causâ Acetum, vel Aqua vitæ.

Vel hoc: R. rad. Cucum. asinin. & Bryoniæ, Iridis & Helenij recentium ad lb. j. coquantur in Vino & Melle, contundantur, adde farinæ Lupinorum lb. j. seminis Cimini lb. j. Stercoris capræ lb. j. misce, fiat cataplasma. Cui & alia permisceri possunt.

Aliud ex omnibus hisce vel paucioribus compositum pro coxendico dolore: R. rad. Altheæ, Bryoniæ vel Cucum. asinin. an. lb. j. radic. Ireos, Enulæ an. lb. j. radic. Pyrethri, Hermodactyl. vel Bulbi ana lb. j. & exoticarum si haberi possunt aliquam, vt Costi, Mei, Panacis heraclei tantundem, herb. Iberidis, Lepidij vel Flammulæ, Calaminthæ, Pulegij, Thymi; Rutæ, Melissæ an. M. j. florum Saluiæ, Rosmar. Stoechados vel Lauandulæ Chamomil. an. p. j. fiat decoctio in Vino, addendo Mellis portionem, contundantur & passentur, adde farinæ Foenogr. & Lupinorum ana quartarium j. baccarum Lauri lb. j. sem. Rutæ, præfertur agrestis lb. j. axungia Anseris vel alterius enumeratæ, inprimis Serpentis si habetur, ad lb. j. olei Lumbicorum vel alterius ad lb. j. Sulphuris lb. j. misce, fiat cataplasma.

Vel sic: R. rad. Ireos, Pyrethri an. 3. ij. rad. Ebuli, Dracontij ana 3. j. baccharum Lauri 3. j. semin. Cimini 3. j. Sulphuris 3. vj. Nitri 3. ij. fiat pulvis, adde Polentæ seu farinæ Hordei 3. ij. subigatur Aceto forti, Melle & Terebinthinâ, fiat emplastrum.

Scammoneam costam in Aceto, & cum farinâ Hordei mixtam, appositamque, in ischiadicis probat Dioscorides.

Picatio hæc in ischiadicis probatur: R. Picis partes duas, Sulphuris partē vnā, pulverisentur, & super chartam aquâ Vitæ madefactam, sparsa, applicentur, præsertim post balneum, sinendo donec sponte cadat.

Ex illis quæ ab animantibus petuntur, in articulorum doloribus conueniunt: Ectura ranarū aquis innatans, contusa, applicata, mirè pbatur. Vel si in olla bene cooperata diu coquatur, adepsq; innatās colligatur, eoque lintea madefacta applicentur.

Cochleæ terrestres rufæ adhibitæ, & si testæ simul conterantur, quod ægrè fit, efficacius operari censentur.

Idem Cochleæ viuæ integræ in saccum filtri seu colatorij ad M. j. injiciantur & super eas Salis M. j. spargatur, & super sal, seminis Ebuli M. j. dein iterū cochleæ, inde sal, postea semen, quatuor aut quinque strata vt vocant faciendo: suspendatur manica in cella, è qua liquor per dies aliquot exstillans, glutinosus colligatur, & in vitro inclusus, soli per quadriduum exponatur. Quo locus dolens illinatur.

Cancrōrū fluuiatiliū coctorū caro contusa cum radice Bryoniæ & Aqua vitæ apposita.

Cornu cerui tritum cum Vino albo coquatur, donec inspissetur, illudque dolenti loco applica.

Arengus ex sua muria, sumptus & applicatus, sæpè iuuat.

Caro Lupi recens vel salita apposita pbatur, Caro itē vitulina semitosta valde pbat.

Corium canis vel Torpedinis, admotum loco commendatur.

Stercus Vaccinum seu Bubalum, calens admodum, statim dolorem sedat. Cui ol. Rosarum in principio, ol. Chamomelinū in declinatione, vel Mel, vel Sapa addi possunt.

Vel sic, si locus intumuerit: R. Stercoris

vaccini tb. j. Sapæ 3. j. farin. Fabarum & Fœnogr. an. 3. ij. Cumini 3. j. misceantur cum O. xymelite: Applicetur.

Vel sic: R. Stercoris capræ & farinæ Fabarum an. æq. partes, decoquantur in Vino & Oleo, pro Cataplasmate: cui, cum dolor remittit, Salis portio additur.

Stercus caninū, Album græcū dictum, cum radice Pyrethri coquatur in Aceto forti, atq; admoueatur. Vel panni intincti in liquidâ adhuc materiâ, laboranti sedi applicentur. Probatum & imprimis Stercus Ibicis.

Forus cum spongiâ, vel stuppis, aliôve modo sunt vel embrocæ, aut pars affecta illis per infersionē aliterve immergitur, in ischiadico, gonagrâ, ceterisq; defluxionibus potissimum. Paranturq; ex rad. Acori, Enulæ, Centaurij vtriusq; & ad corrob. Nuce cupressi, herbis Calamenthâ, Helenio, Chamæpyth. Chamædri, Absynthio, Abrotano, Betonicâ, Primulâ, Saluiâ, Maioranâ, Rosmarino, Pulegio, Méthâ, fl. Chamom. Meliloti, Anethi, Stœchados vtriusq; Lauandulæ, decoctis in Aquâ, addito Vino, Lixiuio, Vrina. Cum validius siccandum, additur ad Mens. j. Sulphuris viui ad 3. j. Salis nitri & gemmæ an. 3. 8.

Ex Raparum decocto & Cyclamine forus quoque fiunt.

Vel ex aquâ stillatitia, è Verbasco cādido, vel per se, vel prius cōtrito, & in vino rubro infuso, diuque macerato, vel vt aiunt patefacto, elicita. Item aquâ è Felle bouis, vel ex Sapone optimo, vi ignis exstillatâ.

Vel hæc: R. herb. Saluiæ, Rutæ, Chamæp. Absynth. aliarumve in foru coxendic. expositarū ad M. iij. Sulph. Salis an. 3. ij. Vini generosi mensur. ij. elicatur aqua: Pro foru.

Aliud mirè commendatum: R. Vitrioli albi & viridis an. 3. j. Camphoræ 3. ij. Aquæ vitæ & Vini albi ana tb. j. misceantur, atque cum intinctis pannis applicetur.

Sal cum Aceto, Sulphur cum Aceto, vel Aqua & Nitro, in foru.

In Vrina Calx viua extinguatur, & cum eâ per residentiam aut colaturam depuratâ, locus dolens foueatur. Idem ex Calce & Aceto factum probatur.

Quidam lixiuio, in quo Filicannabei bona quantitas cocta fuit, immergendo pedes, dolo-

639

dolorem admodum & mirè compescuit.

Sacculi ex herbis sæpè iam descriptis aridis quoque adhibiti iuuant.

Vel ex seminis Milij & Furfuris part. iiii. Salis part. j. parantur, additis flor. Chamom. alijsve interdum.

Scarlato inaspero Sale, inuoluatur genu in gonagra.

Suffumigationes partiū ex defluxione, vel articuloꝝ dolore laborantū, tum ad corroboracionē extra paroxysmū, & ad humorē simul deficcandum, in ipso quoque maximè iam declinante morbo, locum habent.

Hoc præstat suffitus ex decocto plantarum cōuenientiū, vti & Dictamni albi & Pulegij, additis interdū Absynthio, fl. Rosm. Stœch. Cham. coctis in Aqua & Vino vel Lixiu. cōuenit. Inprimisq; in ischiadico, si Saluia, recens in tegulā cauiam ignitā posita, sæpèq; ne aduratur, agitata, sic semicocta, Aceto perfundatur, tegulaq; linteis inuoluta, sub ægri coxā ponatur, vaporq; inde suscitatus excipiat.

Fumi vehemēter siccatēs, Bombace, Lanā aut Panno excepti, sicq; cum illis admoti, ex Mastiche, Thure, Myrrhā, Succino, similibusq; parati, additis adoratis, vt Ladano, Benzoino, Storace, Gallia, herbisq; interdū aridis vtilibus, vt Rosm. similibusq; , cui efficacissimi erunt, si adz. ij. Cinnabaris & Auri pigmenti z. 8. addatur, & Terebinthinā pro trochiscis formandis excipiantur, in coxendico dolore potissimū adhibendi.

A qualitate malignā, si Luis venereę quata hæc species, dolor sc. circa offeas sedes, quę Venereum aut Contagiosum vocauimus, oriatur, cū curatio per euacuationes magnas & varias, alteratiq; diuersa, eodem ferè modo perficiatur, sicuti illa in alijs huius luis speciebus, quę cum vlcerebus, alijsq; defœdationibus fiunt, administrari debet, ideoq; curationē eò relegabimus, & in deformationibus curationem in genere omnibus generibus competentem, simul proponemus.

Quod si verò à peruersā aliā qualitate, Cephalea externā, cui sæpè & alij circa offa versantes dolores, vt in Lue venereā iunguntur, fiat: curatio quoque partim vti in capitis antiquis doloribus, cum externā cephalē

copulatis dictum, instituenda, & nisi sic cesset, fortiora illa euacuantia, topicaq; remedia, quibus Lues venerea tollitur, quoque vsurpanda. Inter quæ & illa quæ Hydrargyrum admittunt, sicuti in illā infectione, ita in hoc non adeò ab simili illi affectu, in quo maligna illa qualitas quoque, non nisi vehementioribus hisce remedijs extirpatur, sæpè hunc affectum, qui nullā ratione prius sanari potuit, curant.

Si quoque defluens humor arthritidem inducens, peruersitatem aliquam in se habeat, ea quoque non nisi validioribus vsurparis, topicisq; efficacioribus adhibitis, qualia multa, inter quæ & quædam Hydrargyrum recipiunt, vt Emplastrum de Vigo, enumerata, curabitur.

Quod verò malignam eam vim attinet, quæ sensum tactus deprauat, cum eam in humore quoque defluxo, qualis stuporem, & paralytim excitare solet, infideat, illa quoq; per eam curationem quæ illic exposita fuit, præsertim si validioribus etiam vtamur, tractari debet. Vt non sit opus hic nos nouam curandi rationem proponere.

~~~~~

DE SVPERFICIEI CORPORIS DOLORE.

CAPVT XVII.

Genera.



SUPERFICIEI corporis dolorem illū appellamus, qui in corporis cute seu corio, illiq; proximè adnexis quibusdam partibus extimis. & intimis, cuti substratis, (quo nomine hic potius quàm in habitus corporis dolore proponuntur) occurrit. Cuius generis plurima sunt, variantia primum, quod alias nullo apparente alio affectu, sed solitarij; alias verò alio aliquo comitati, molestiam doloremve pariunt.

Inter solitarios superficiei corporis dolores, nullo alio affectu se manifestare, primum se offert Titillatio dicta, quæ quidem, est voluptatem aliquam adferre videatur, tamen immodica molestiam adfert, eamque sæpè adeò magnam, vt illam etiam diutius

sta, en-
ratio.

Arthre-
tidis cu-
iusdam
magli-
gne cu-
ratio.

Doloris
insensu
tactus
depraua-
to à ma-
lignā vi
occurrenti
cū cura-
tio.

Venereę
luis cu-
ratio.

Cephalea
externa
a maligna
qualitate
profecta

Solitarij
nullo alio
affectu
apparentes
dolores
in superficiei
corporis
Titillatio

tius citra detrimentum perferre nequeant. Veluti in plantis pedum, sub axillis, aut in lateribus facta: quæ etiam aliis in locis incommodat.

Pruritus.

Huc & Pruritus in cute, citra notam manifestam eueniens, pertinet; Qualis in cute nuda hinc inde, scabiem aliosque illius affectus præcedit; Et in partibus pilosis, ut in capite, locis obfcænis, variis de causis, uti dicitur, accidere solet, tantamque molestiam parere, ut & ad fricandam dilacerandamque cutem, vnguibus alioue impellat: unde ad eò leuantur, tantaque voluptate afficiuntur, ut dolorem, qui à læsione illa alioquin procederet, minimè sentiant.

Dolor ex calore.

Sunt & alij dolores in superficie corporis, sine affectu alio se patefaciente, à causis externis plerumque nati; Qualis ille est, cum ab externis calore violento, vel exercitio, citra inflammationis aut vstionis sensum, cutis aliquandiu calet, nonnunquam & prurit, punctionesque sentit, quem Calidum dolorem vocare possumus. Quod & calor in vola manuum & plantis pedum, quibusdam consuetus, referri potest.

Dolor ex frigore.

Dein & ille, cum à frigore vehementi, partes huic expositæ, mordicantem & lancinantem in superficie dolorem sentiunt, quem Frigidum dolorem nominare licet. Inprimisque ille, qui à frigore obortus, in digitorum extremitatibus sub vnguibus tantopere sæuit, & priuato nomine. Ruene glen / quasi fül vnder den Neglen, hoc est, Frigus sub vnguibus dicitur.

Dolor ex contactu rei asperæ.

Quod & refertur molestia, ex contactu rei inæqualis & asperæ in cute, percepta: Dolorque inprimis Lancinans, qui, quando citra læsionem manifestam, cutis nostra præmitur distenditurque, aliquandiu sentitur.

Dolor ex compressione vel distensione.

Maximè verò hic dolor qui ex casu vel ictu, ob vim violentam, aut conrusionem alicuius partis, citra læsionem apparentem in corporis exterioribus alicubi, punctioibus aut lancinatione grauiter sæpe molestat, Qui tamen, cum plerumque læsionem aliquam externam iunctam habeat; Nos in tumore & vulnere, quæ tunc cum dolore hoc concurrunt, quo pacto hisce mederi oporteat, simul explicabimus.

Qui alium affectum aliquem & charactere comitem habent dolores, vel ob rubores aut tumores, vel pustulas aut exulcerationes (quo nomine omnem solutionem continui comprehendimus) vel corruptiones præcipuè notantur & distinguuntur.

Cum rubore & dolore affectus citra extuberantiam manifestam, aut tumorem, si se offerat, Erysipelas, Germanis à colore, Rôte / Norlauff / Rarsuncel dicitur, & pluribus naturis sæpe per paroxysmos accidit. In quo cutis superficies, frequenter in imo tibiae, nonnunquam in facie, aliàs in collo, interdum & in aliis locis, rubore plus minusve expanso, perfusa apparet. Quæ rubedo ex compressione refugit, eaque remissa, mox redit: Atque perseverans aliquandiu, tandem flauescere incipit, mox pellere, donec penitus euanescat. Cum ardore insuper, ac si cutis leuiter vreretur, euenit, ob quam causam Phlogosin, quasi flammam, alij Ignem sacrum vocarunt: & quia punctiones simul adsunt, Spinam Auicenn. nominauit. Quibus tandem pruritus superuenire solet. Atque interdum cuticula vel sponte, vel ob frictionem finditur, vel fissa furfurum instar abscedit aut abraditur. Adhæc in vicinis huic affectui locis, glandulæ plerumque, accedente interdum dolore aliquo, intumescunt, ut si in inferioribus sit, in inguine adenes, si in superioribus, in collo glandulæ. Febris præterea synochus cum horrore incipiens, & mox in calorem desinens, ut plurimum erysipelas præcedere, & die vno pluribusve comitari solet, sicuti in febribus hoc declaratum fuit. Sed & sine febre erypelata, uti illic quoque dictum, vel cum leui saltē, aliquando fiunt.

Præter erysipelas hoc simplex, compositæ duæ occurrunt species. Quarum vna per cætera simplici similis, sed cui extumescencia quædam, sed dispersa, nec dum collecta in tumorem verum, copulatur, Erysipelasque Phlegmonodes tunc dicitur. Quod aliquando eodem modo uti prius, sed tardius finitur: Aliàs verò in eo pustulæ erumpunt, interdum & vesicæ maiores, aliquando in ambitu liuidæ, vel etiam nigricantes, quibus ruptis sanies promanat, parsque exul-

Erysipelas. Rôte / Norlauff / Rarsuncel dicitur.

Phlogosin. Ignis sacer.

Erysipelas phlegmonodes.

Erysipelas exulceratum.

cera-

ceratur, fitq; tunc Erysipelas exulceratum, quod in peruerſa ſæpe deſinit vlcera depaſcentia, qualia in vlceribus deſcribẽtur, quæ in gangrænâ non bene gubernata, conuerti poſſunt.

*Eryſi-
pelas
oede-
mato-
ſus.*

Altera verò ſpecies minori ardore & rubore ſe offerens, extuberantiâ tamen maiore magisq; expaſâ, Erysipelas Oedematodes dicitur, in quo veſicæ quoq; interdum prodeunt ſubalbida, è quibus apertis ſeroſus humor, vel ſanioſus, tandemq; pus eſſuit. In hac ſpecie, licet eryſipelas ceſſet, extumeſcentia illa œdematoſa ſæpe diu adhuc permanet, nonnunquam & vix penitus poteſt abigi, & in crura verè œdematoſa, in illis qui ſæpe hoc affectu conſtillantur, deſinit.

*Eryſi-
pelas
in cru-
ribꝫ aſci-
ticorum.*

Sed & ſi eryſipelas in cruribus iam priùs œdematoſis humore prauo imbutis, præſertim in aſciticis naſcatur, vti hoc facile fit, tunc in veram inflammationem, quæ in gangrænâ, niſi ſummo ſtudio caueatur, mutatur, ſæpiſſimè deſinit.

*Eryſi-
pelata
par-
ua.*

Parua quoq; eryſipelata, macularum rubrarum latarum inſtar, cum ardore & rubore, citra eleuationem aliquam, in certis cutis ſedibus, nata vidimus.

*Tumores
ſuperfi-
cies cor-
poris.*

Cum tumore & dolore affectus in corporis ſuperficie ſe offerentes, in eo præcipuè differunt, diuerſaq; inde prodeunt genera: Quod ex illis alij frequentiores exiſtant, & vel plurimum & per ſe incipiant: ac nunc indifferenſim hinc inde in diuerſis corporis ſedibus: alias verò in certis quibuſdam duntaxat partibus externis prodeant, qui Tumores in genere appellantur: Veſt quod iam dictos tumores ſequantur, ex illisq; naſcantur, Abſceſſus appellati: Alij verò inſoliti, rariùs eueniant, & ab his longè diſtent, vti Cancer vocatus. De quibus omnibus hoc ordine agemus.

*Phlogo-
ſis.*

Frequentius qui ſe offerunt, & per ſe nullo alio prægreſſo tumore, indifferenter hinc inde in cute erumpere ſolent, Tumores dolorifici, plerunq; collecti ſunt & prominentes, in profundum plùs minùsve vergentes, rubentes, calore, ardore, tenſione, pulſatione, dolorem adferentes, vnde ad Phlogofes quoque referuntur, ſicq; in genere appellantur.

Horum autem vnum genus expaſum etiam nonnihil eſt, vt eryſipelas, in tumorem tamen ampliùs, quàm illud quod etiam nonnihil eleuatum eſſe diximus, collectum, prominens, & radicibus altè deſixum, quod Phlegmone, Inflammatio in genere appellatur, Germani Geſchwiſt vocant; in qua tandem remiſſo rubore doloreq; cutis flaueſcit, liuet, & ſugillationes profert, donec penitus tumor ſubſideat & euaneſcat: nonnunquam verò dolore tunc aucto, in tumorem alium magis collectum, abſceſſum, eoq; rupto in vlcus conuertitur: vel ſcirrhum poſt ſe relinquit, aut in gangrænâ, vti ſingulis hiſce dicitur, deſinit.

*Phlegmo-
ne Inſtā-
matio.*

Sed & præter hanc plegmonem, quæ ſimplex eſt & dicitur, aliæ quoque duæ compoſitæ illius ſpecies ſe offerunt, quarum vna, eryſipelas extuberans conditione ſua & formâ referens, niſi quod maior hinc eſt tumor, Phlegmone eryſipelatodes dicitur: altera, in qua tumor maior, latè ſe extendens & amplius eſt, minùs cæteris calens, rubens & vrens, Phlegmone œdematodes dicitur.

*Phlegmo-
ne eryſi-
pelato-
des.*

Cæterum eiufmodi phlegmone, ſiue ſimplex aut eryſipelatodes aut œdematodes ſit, vndique in corporis trunci, artuumq; ſedibus gigni poteſt. Et ſi in facie prodiſt, illic aſpectum præbet deformem; ſi ad ſenſuum organa pertingat, illis quoque incommodat: Si in collo naſcatur, & ad fauces aliquo pacto vergat, reſpirationi officiens, anginae quandam externam ſpeciem conſtituit: Vti & ſi in pectore proueniat, & profundior ſit, ad falſam aliquam pleuritidem referri poteſt: Et ſi in abdominis aliqua ſede ſe offerat, & in aluum deſcendat, deiectione moleſta eſt: In manibus & pedibus occurrens, illis dolorem & incommodum parit.

*Phlegmo-
ne œde-
matodes.*

Aliud genus horum tumorum ſeu phlegmonum, magis adhuc collectum, acutum, per reliqua inflammationi ſimile, inuenitur, dictasq; corporis omnes ſedes occupare poteſt, quod quia minùs cæteris inflammationibus eſt, Tuberculum potiùs quàm tumorem appellant. Cuius vna ſpecies frequentiffima eſt, nucis iuglandis, plùs minùsve magnitudine prædictâ, quod Germani Eyſſen vlcus, quia in illud plerunq; R R r

*Tuber-
culum.*

*Eyſſen
Ger.*

desinit, vocant. Talia diuersis in corporis locis vel solitaria, vel plura simul nascuntur, plus minusve protuberantia, & rubore amplius vel parcius perfusa, dolore lancinante & ardente molesta: quo adaucto, in abscessum plerunque desinunt, qui postea se aperiens, in vlcus abit, & prout vel pus album aut cruentum profundit, illa simpliciter *Cyssen* / hanc *Winteressen* appellant. Et si loco puris, lobus carneus inhaerens se manifestet, priuatim tuberculum, è quo vlcus hoc prodit, quodd & maius ferè cæteris, & rubore & ardore plus quam priora excruciat, Furunculum, Dothien vocant, quem alij Clauum ab infixa carne appellat, nostri chirurgi, quia tardius sanatur, ob pertinaciã illius, *Krebs* / in, quasi Cancrum paruum nominant.

Ad tumores qui frequentius hinc inde in corpore prodire possunt, hi quoque referuntur, qui à causa à qua prodèunt, Cõrusiones, vel Ictus aut Casus. appellantur, in quibus tumor nunc collectus, nunc diffusus, plus minusve in altũ eleuatus occurrit, aliquando sine inflammatione, aliàs verò cum illa eueniens, nunc concolor, interdum verò mox tardiusve liuens, flauescens, vibices & sugillationes profert, tandemque euanesceat, aliàs verò in abscessum, indeq; in vlcus vergit. Quæ contusio si vulnus apertum parit, ad vulnera (vbi tractabitur) pertinet: Quodd si ex contusione vel casu dolor, nullo apparente tumore aut externo indicio, suboritur, ad dolores in superficie corporis occurrentes, vbi explicabitur, relegabimus.

In certis quibusdam partibus in superficie corporis positis, tumores cū dolore prodèntes, in Glandulis frequentius occurrunt, illis præsertim, quæ in emunctoriis corporis positæ, cuti mox substernuntur: quæ in tumorem aliquando vnà cum cute attolluntur, cum dolore, accedente interdũ & calore, aliàs etiam inflammatione. Quæ si accedat, nisi resoluatur, in abscessum, vti reliquæ, indeq; in vlcus desinit. Quem tumorem, vbicunque sit, si adsit inflammatio, Phygerylon & Panum vocant. Et si minor aliquando sit, & planior minusque rubens & dolens, Phyma appellatur, quia & citius augetur & in abscessum vergit. Eiusmodi tu-

mor post aures quandoque erumpit, tuncq; priuatim Parotis dicitur, in magnum tumorem sæpe excrefcens: Aliàs in ambitu maxillæ inferioris prodit, & Pani cõmune nomen retinet, in febribus synochis frequenter eueniens, vnde eum quoque, etsi non semper rubeat, Germ. *Karsunkel* vocat. Sub alis quandoque nascitur, nunc magis, nunc minus prominens, & qui in abscessum non tam facile vertitur, qui Pani quoq; nomine significatur, plerunque tamen etiam Bubo nominatur. In inguinibus frequentissimè ille prodit, & tunc Bubo appellatur, qui interdum vnicus est, aliàs plures adsunt. Horum alij simpliciter dicuntur: alij ob causam, luem comitem, Venerei, Germ. *Schlier*: alij à febre maligna illis copulatã, Maligni, vel si febris pestilens sit, Pestilentes, qui exigui ab initio sunt, mox admodum increscunt, comitemque sæpe anthracem habent.

In glandulosis quoque maioribus partibus, è superficie corporis prominentibus, veluti mamillis & testibus, tumores eiusmodi extrinsecus apparentes, prodire, vt in iam dictis glandulis, solent, quando horum corpora inflammantur, tument, calent, rubent, dolent (nam si cutis saltem phlegmonem pariat, ad generalem pertinet) dicunturq; tunc Mamillarũ vel Testium inflammatio, quæ sepe in durities vel scirrhus abit, vel quando citra manifestam inflammationem hæ partes tument, distenduntur & dolent, vti & aliæ glandulæ; sicuti mamillis in affectu, quem lactis extruberantiam vel concretionem vocant, & testibus, aliis quoque (vbi dicetur) de causis, vt in colico dolore, aliquando euenit.

In fungosis partibus corporis superficie eiusmodi inflammationes, similiter sunt; vt in papillis mamillarum, quæ tunc tument, rigent, calent, posteaque vlcèrantur, sæpe penitus deperduntur: In Penis glande, cuius inflammatio eam in tumorem maximum quandoq; eleuat, adeò vt præputium retractedum arctè circa radicem, eandem stringat. In Præputio item: In Pudendo mulieris, colliculi atq; alæ; In Podice labra illius, cutisq; rugosa eum ambiens: In Ore, labia (de Palpebrarum inflammationibus in ophthalmia di-

Winteressen
sen. Germ.
man.

Paruncu
lus. Do-
thien.
Clauum.
Krebs
in.

Cõrusion.
Tumor
ex con-
tusione.

Tumores
Glandu-
larum.

Phyge-
rylon.

Panum.
Phyma.

Bubo.
Bubo ve-
neris.
Schlier.
Germ.
Bubo
mali-
gnus, &
pestilens.

Tumores
Mamil-
larũ &
Testium.

Tumores
cum in-
flamma-
tione de-
perfarũ
partium.

Etum est) inflammationes recipiunt; cū dolore ob sensum eximium, vehementi; quæ in vlcera peruerfa & gangrænas quādoq; abeūt.

In cartilaginosis partibus superficiei corporis; vt Narium alis, Aurium vanno, idem accidit; interdumq; hæ partes inflammantur, & si afficiantur grauitur, cartilagine ipsarum vitiatur, vnde nasus præsertim concidens, turpem præbet aspectum.

In articularum sedibus, inflammatio oborta, grauiore dolore & impedimento afficit. Qualis aliquando in iuncturis brachij vel cruris euenit, vnde articuli hi nōnunquam labem patiuntur. Sæpe etiam hoc in digitorum, manus frequentius, interdum & pedis, accidit internodiis, extremo præsertim, dolore intensissimo & tumore circa radicem vnguium obortis: vnde & inflammationem hanc ob id Paronychiam, Latin. Reduuiam, Barbari Panaritium vocant, quā inualecente, sphacelus sæpe sequitur, atque ossis extremi, nōnunquam & alterius digiti hoc malo affecti corruptio, perquam osse corroso, denudato vel ablato, cū nervorum & tendinum portiones læsæ conspicuæ fiant, vulgus vermes esse putans, hunc affectum Vermem, Germani Wurm nominant, eoque magis, quia in dolore aliquid quasi repere, in parte, dum inflammata erat, & in abscessum conuertebatur, videbatur. Præter hanc inflammationis iuxta digitorum internodia, alia quoque priuatum nomē, quia sæpe accidit & noxam aliquando adfert, obtinuit, quæ in manu inter pollicem & indicem nasci solita, eo in loco excruciat, tumoremque magnum profert, quem, quia in interstitio hoc digitorum latet, Germani Grippelen, ac si Furcas, nominant.

Abcessus tumor est, qui alios tumores in superficie corporis natos, modò expositos, sequitur, sic dictus, quod cutis à subiecta carne abscedat, vnde & Græcis *Ἀπὸ σφύμα* nominatur, vulgus chirurgorum Apostema vocat; alij Vomicam appellant; Germani idem illi nomen, quod inflammationi, quæ abscessum hunc protulit, tribuunt, & *Geschwür* / *Eysen* / similiter indignant. Eiusmodi autem apostema, ex inflammationum omniū ferè generibus, vt in illis ostensum est, nisi

resoluitur insensibiliter; nasci potest: Veluti ex Phlegmone in genere dicta: ex Tuberculis mediocribus, quorū abscessus *Eysen* / *Bluteysen* / *Furunculus*, vti & inflammatio vocantur: & minimis *Gulen* / tunc quando in abscessum conuertuntur, dictis. Dein & ex Phygethlo, siue bubo aut parotis sit, citiusque si Phyma sit, abscessus gignitur. Item ex Mamillarum, Testium phlegmone, & cæterarum partium fungosarum, cartilaginosa, inflammationibus, abscessus prodeunt: Et ex illis quæ in iuncturis fiunt, quorum abscessus hisce partibus plurimum sæpe obsunt. E quorum genere, qui in Panaritio digitorum nascitur, est quoque abscessus peruersus, absconditus, eas sedes nervosas ossaque corrumpens. Qui omnes abscessus, à tam diuersis inflammationibus prodeuntes, pro ipsarum ratione quoque diuersimodè se habent. Alias enim, si inflammatio sit superficialis, prout illa se habet, tumor maior minorve existit, circumscriptus, collectus & prominens, ab initio retinens & durus adhuc, sed qui sensum maturescendo mollescit, & apicem seu mucronē liuescentem, quem proin Oculum vocant, illic vbi pus sibi exitum parat, promit, qui si comprimatur, pus illi subesse, ex fluxu refluxuq; deprehenditur. Alias verò si ab inflammatione, magis in profundo latente, abscessus fiat, tunc non adedè exactè se offert aut eminet: aliàs quoque aliquandiu penitus ferè occultatur, donec tuberculo erumpente, quod chirurgi Exituram vocant, se manifestet, Exitura quod cū cuti concolor existat, cū dubiū an abscessus sit; faciat, hoc indicio pus sub eo contineri colligitur, quod dolor illic adhuc sentiat, & quod roris instar madere soleat, eoq; pressio pus retrocedere deprehendatur; foueaq; quædam imprimatur. Dolor autem, cū inflammatio in abscessum abit, non remittit, sed increfcit potius, nec dū, donec aperiatur, desinit, pruriente plerūq; quoq; tunc abscessu, quando pus ex eo erumpere nititur. Nec febris quoq; si inflammatio comes sit, tunc cessat, sed dum abscessus, seu (vt inquit Hippoc.) pus generatur, vnà cū dolore augetur. Materia in super quam abscessus coërcet, non eadem, sed postquam aperitur,

vel pus aut saniem profundit, vel carnis lobum infixum, vt furunculus continet, sicuti in vlcere, quod tunc adest, ostendetur.

*Cancer Carci-
nos.*

Cancer tumor est, qui per se quoq; in corporis superficie exoritur, malignitate potius quam intenso dolore molestus. Ob quam causam multos alios peruersos tumores, & pustulas, sicuti & furunculum & carbunculum, chirurgi nostri cancos quoque nominant: Vti & tumorem sub oculo in illius orbita natum, polypum in naribus, & gangrænam gingivarum, vlcerâ præputij cancos vocant. Atque elephantiasin, plures partes tumoribus obsidentem cancerum generalem esse dicunt, sicuti in singulis hisce affectibus dictum fuit. A quibus tamen verus cancer longè differt, Carcinom dictus, à

*Lupus.
Noli me
tangere.*

Germ. Krepß. Qui & Lupus, quod carnem absumat, & Noli me tangere, quod acria nõ ferat medicamenta, dicitur. Hic extrinsecus in omnibus ferè corporis locis nasci potest, eumque tum. in femore, tibiis, circa genu, in brachiis, collo, ceruice, in facie, in mamillis, frequentissimè, & in pudendis, atque ore vti intrinsecus, sic & in labiis prodire, sæpe obseruauim. Tuberculo exiguo vix dum conspicuo, ab initio emergit, mox ad pisi, inde auellanae, postea nucis, tandem ad pomi minoris maiorisque magnitudinem sensim excrescit, cancrum verum dictum, vnde nomen obtinuit, appositè sua circumscriptione & formâ referens, non altacum, quem cancrum nostri quoque vocant, & venas in eo cancro, pedibus illius afsimilantes, inde cancrum appellari falsò putant; sed verum cancrum, eumq; potissimum marinum, què Gallum marinum aliàs vocant, cum vti ille, sic & hic tumor rotundus sit, inæqualis, tuberculis quibusdam extuberans, & venis in ambitu turgidus, calore liuidus & obscurus, durus insuper, duraq; veluti crustâ, vti cancer, obductus, firmiterque parti subiectæ hærens; vnde quoque, quod quicquid apprehenderit, pertinaciter retineat, eum cæcrum appellatum Archig. putauit. Dolorem alioquin cancer ab initio ferè nullum, aut contemnendum saltem adfert, vnde & tunc nihil quasi æstimatur, negligiturque, punctio- nibus tantum quibusdam cutis, ac si acufie-

rent, se patefaciens, quæ tandè vnâ cum tumore augentur atque increscunt.

Tandem verò tumor hic cute aperta re- *Cancer exulce-
ratus. Carcino-
ma.* tracta que denudatur, tuncq; Carcinoma dicitur seu Cancer exulceratus. E quo sensim sanies putris, foetida, subflaua vel subuiridis, mox nigricans continuo emanat; caroque inæqualis & corrupta nonnihil apparet, quæ excrescit, & strias vel styrias procul exertas, & prominentes vel pendentes profert. Quâ, labia tumescencia, dura atque inuersa ambiunt, quæ interdum aded augentur, vt reflexa magnam faciei partem occultasse, aliàs in collo totam auriculam illi veluti innatam continuasse, obseruauerim. Sanguis, quoties nudum carcinoma relinquitur, ex eo defluit. Vnde tandem viribus ad longum tempus sensim perfractis, accedente sæpe febre lentâ, consumuntur & succumbunt.

Cum pustulis, quæ minores adhuc sunt *Pustula superfi-
ciei cor-
poris.* quam tubercula enarrata, se in superficie corporis offerentium affectuum, pruritu vel ardore cum inflammatione, vel sine eâ, dolorem adferentium, atq; cutem rodentium, vel etiam vlcerantium, præcipua genera sunt Scabies, Papula & Carbunculus, quæ diuersas sub se continent species, sicuti iam explicabitur.

Scabies seu scabrities sic dicta, quia cutem scabram & crustâ obductam, diuersis certisq; in locis reddit, in eo primùm differt, quod alia humida, alia sicca existat, sicq; appellari possit.

Humida scabies ea dicitur, quæ pustulas, *Scabies vulga-
ris, hu-
mida.* saniem & pus reddentes, profert. Cuius vna species, quia popularis est, Vulgaris scabies nominatur, Germani Naudt / & scabiosos à *Naudt Germ.* fricando Kregß / vocant. In hac pustulæ Epithelides appellatæ, plures oriuntur, è quibus ruptis, sanies emanat; vel si leuiter inflammatae, rubentesque, in abscessus quos Giten vocant, conuertantur, pus vlcusculaq; inde relictâ, crustulis ex humore illo resiccato naris, obducuntur, quæ nunc liuent, nunc nigricant, aliòve modo coloratæ existunt. Hac scabiem pruritus præcedere, illiq; quoque cum ad frictionem impellendo pustulas euocet, demumq; rumpat, occasionem præbere solet. Quem postea cute læsâ, dolor lanci-

641

lancinans, quem *Schnürken* vocant, excipit; & si pustulæ simul inflammantur, ardens simul accedit dolor. Estq; hæc scabies adeo frequens, ut vix aliquis inueniatur, qui ab ea immunis per totum vitæ curriculum extiterit: in vniuerso corpore vel certis partibus obuia.

Scabies
Fera,
agria,
Herbro-
ten Ger-
man.

Est & alia humidæ scabiei species minùs frequens priore, sed quæ pertinacior est, in qua pustulæ paruæ plures cutem alicubi adimplent, è quibus per se, vel ob frictionem ruptis, humor tenax, mellis instar, continuò exudans, crustis multis continuis spissis, nunc albis, nunc subflauis, nonnunquam & subviridibus, tandemque nigrescentibus, totam sedem quam occupant, obducit, vltèriusque serpit, pruritu admodum molesta, nonnunquam & ardore. Quam scabiem *Feram* seu *Agriam* aliqui vocarunt; nostri Germani eam, cum pars affecta, ac si crusta panis tosti, cui pili inhærent, obducta esset, appareat, den *Herbrofen* rectius *Horbrofen* appellant, vel ac si assando aut frixado coaluissent, *zusammen backen* dicunt. Qualis in sanibus plerunque, in adultis rariùs, capitis pilosam sedem, sæpe vniuersam, pilis crustis immerfis impactisque, occupat: aliquando supercilia, malas faciei, totamq; ferè faciem obsidet, eamque turpiter defœdat: aliàs in aliis quoque sedibus occurrit.

Vlcera
capitis
manantia. *Tinea,*
Achores.
Græcorum,
Grindt
Germ.

Est & præter hanc, peculiaris quædam capitis cuti capillis confitæ, scabiei species, hanc solum infestans, & multis foraminibus angustis ad caluariam vsque perforans, è quibus sanies glutinosa, cuius portio siccata, crustam quæ singulis obducitur, parit, continuò emanat; ob quam & causam, hæc foramina cum vlcera fordida referant, *Vlcera* capitis manantia, *Achores* Græci nominant, & cum exesum pannum à tineis, cutis hæc referat, *Tineam* hoc malum vulgò appellant, German. quòd capiti insidietur, den *Grindt* quem affectum nos *Scabiem* capitis manantem vocare possemus. Et si foramina ampliora sint, & mellis instar saniem profundant, ad fauorum apum similitudinem, tunc *Fauum* nuncupant. Hic affectus peruersus & frequens in iunioribus, capillorum radices, quæ euulsis pilis albæ, crassæ & len-

tæ visuntur, vitians, defluuium capillorum certis in locis parit, vnde & postquam sanati sunt, areas in capitis certis, vel pluribus locis nudas relinquit, turpemque capitis huius sedis intuitum præbet.

Ad scabiem humidam aliæ pustulæ referri possunt, crustam in cute quoque producentes, humoremque exudantes. Quarum aliquæ cum maiore inflammatione & exulceratione, quàm in priore scabie proueniunt. Quales sunt pustulæ, quos *Terminthos*, qui lupini aut ciceris magnitudinem habent, vocant, Germani *Sundsblatern*. Suntq; nigrae, rotundæ, in ambitu rubrae admodum & inflammatae, ardore molestæ, in crustam mox desinentes: quâ detractâ aut eleuatâ, pus emanat. In pedibus frequentius, eæque plures numero erumpunt, quod & Galenus notauit, qui eas, sicuti nostro fœmineo sexui præsertim peculiare & vulgare sunt, apprimè describit; quas aliqui *Phymatis* etiâ speciem esse voluerunt. Hisce pustulis non admodum ab similes sunt, quas *Epinyctidas* vocat, pustulæ eiusdem cum *termintho* magnitudinis, liuescentes & in circuitu vehementer rubentes, summeque noctu præsertim viuentes, tandemque in vlcus conuersæ, saniem & mucosum pus reddentes.

Termin-
thos,
Sunds-
blatern
Germ.

Epiny-
ctidas.

Sed & pustulæ aquosæ *Phlyctenæ* appellatae, sub scabië humidâ comprehendi possunt, cum illis ruptis, crustæ quoque nascentur, dolorque suboritur. Sunt autem pustulæ paruæ instar bullarum, vel maiores etiâ, ut vesiculæ, è quibus disruptis aqua limpida effluit, dolorque tunc primùm lancinans, præsertim ex contactu cutis denudatæ, crustaque tandem inductæ, accedit. Quæ vndique in cuticula nasci possunt. Sed & aliud illarum est genus, bullis citrinis conspicuum, pruritu & seruore etiam, dum integræ sunt, aliquo modo molestæ, è quibus apertis, aqua citrina promanat, magnusque tunc ardor, accedente sæpe inflammatione suboritur, pars exulceratur, vlcusq; interdum serpit. Quem affectum aliqui *Herpetem* *phlyctenodem* vocant.

Phlyctenæ.

Herpes
phlycten-
odes.

Scabies
sicca.
Scabies sicca seu scabrities, ad differentiam tumidæ, illa appellatur, quæ pustulis siccis, è quibus nec sanies nec pus emanat,

*Prurigo,
Chris-
mos Gra-
corum.*

se prodit, eutemque asperam reddit & erosam, cum pruritu plus minusve molesto. Quæ duas sub se species comprehendit; vnam, in qua summa cutis, pustulis minimis, aridis exasperata, rubra admodum & erosâ apparet, aliâs Leuiter tantum, aliâs vero amplius, adeo vt maiori spatio cuticula abrafa esse videatur, serofusque humor exudet, madoremque reddat, cum pruritu intolerabili, vnde & Pruritus seu Prurigo, Chrismos Græcis nominatur. Erâ quibusdâ Impetigo, ab aliis Pfora Græcorum, quam scabiem vertunt, esse putatur. Egoque existimo hanc esse illam, quam Rubricam nonnulli appellant. Qualis circa emunctoria, in inguinibus, & sub axillis, in brachij & genu flexuris, in collo frequentius, solet accidere.

*Scabies
fætida,
Mager
Germ.*

Altera species Scabiei siccæ, deterior est, eutemque magis afficit, quam Fœdam & siccam Auicenna vocat, Germani Mager, forte quia in ea plus corpus sensim macrum & aridum fit. Quæ species per se primum oritur, vel ex herpete seu papula exedente non curatâ, originem sumit. Et primum amplius adhuc, quam prurigo pustulis maioribus, & erosionibus eutem exasperat, & siccam reddit, latiusque serpit; quâ Impetigo propriè,

*Impeti-
go, Li-
che Græ-
corum.*

*Pfora
Græco-
rum.*

Lichen Græcis appellatur, per crura & brachia se potissimum latè dispergens, aliquando & vterius procedit. Interdum peior facta, pustulis serpentibus, eutem adhuc magis exasperat, duriorē & tumidiorem efficit, eamque exedit finditque, à qua per frictionem furfures excidunt, & tunc Pfora à Græcis appellata fuit, vtr & nunc rectè sic vocatur: Non solum pedes & brachia, sed & alias corporis trunci sedes, collumque præsertim & faciem nonnunquam infestans, & capillosam capitis eutem spissam, duram ac veluti luto vel calce obdusam, à qua crustæ siccæ, dum fricatur, decidunt, aspectu horrendam reddens, vngues quoque duras, & scabras gignens. Quæ si vterius procedat, pessima sit, eutem adhuc altius scindens atque rodens, ita vt squamæ crassiores tunc ab ea, nunc subflauæ, nunc liuidæ decidunt, hæcque Lepra Græcorum existit, sicque ab illis appellata fuit, non tamen elephantiasis, quam Arabes lepram quoque vocarunt,

*Lep-
ra
Græco-
rum.*

cum hæc inter se admodum differant, licet eos qui hoc vitio infecti sunt, elephantiacos esse, sæpe, qui hæc distinguere non norunt, eum examinibus subjiiciuntur, pronunciant, eo fortè moti, aut si curetur, iterum redeat, nec minus aspectum horrendum, quam elephantiasis, si modò nasum depopulata sit, præbeat; nos ne, si lepram vocaremus, cum elephantiasi, quæ, vt dictum, communiter sic vocatur, cōfundamus, eam Pforam deteriorem vocabimus.

Papula Latinis, Herpes Græcis, pustulis minimis alicubi in cute erumpentibus, cum pruritu primum, mox ardore vrente, citra tamen inflammationem, aut febrem comitem, se profert. In quo, licet pustulæ arefcant & sanentur, nouæ tamen in illorum ambitu emergunt, ac si priores in orbem se diffunderent serperentque, vnde & herpetis nomen hic affectus obtinuit. Qui variat in eo, quod aliâs in summa duntaxat cute pustulis milij seminis magnitudine referentibus, se representat, Herpesque miliaris tunc ob id, à Germanis Zittermahl appellatur: qui licet, vt dictum, quoque serpat, citius tamen desinit.

*Papula,
Herpes
Græco-
rum.*

*Herpes
miliaris
Zitter-
mahl
Germ.*

Alias verò aliæ pustulæ paruæ siccæ, al-
triusque in cute immerse prodeunt, illisque ruptis, cutis exulceratur, nec saniam tamen aut pus reddit, & licet illic rursus sanetur, tamen aliis denud pustulis erumpentibus disruptisque, noua vlcera arida quoque emergunt, herpesque eo modo serpit, & in latum altumque se dispergens, repit eutemque exedit. Quem herpetè, qui aliquando non vno solum, sed & pluribus in locis erumpit, Esthiomenum, Exedètem & Papulam feram, Germani den Würm, à rependo & rodendo nominat: Qui si negligatur, & diutius perseueret, in impetiginè, & ab ea in pforam, indeque in lepram dictam Græcorum, non elephantiasin conuerti potest. Hic herpes, quamprimū exulceratur, erysipelati exulcerato, in quibusdam non absimilis, pro eo quandoque sumitur, atque vt erysipelas illud, Ignis sacer seu syluestris nominatur, à quo tamen in eo differt, quod erysipelas subito cum inflammatione, rubore & febre oriatur, & cum exulcerari vult, pustulas maiores, aliâs etiâ magnas

*Papula
fera Her-
pes esthi-
omenos
Græcorum
Würm
Germ.*

*Ignis sa-
cer seu
sylue-
stris.*

645

& vesicas exciter, vlcusque in illis disruptis sequatur humidum: quæ in herpete, vti dictum, minimè fiunt, vlceraq; in eo sicca, nec saniem nec pus effundunt.

Carbunculus, *Carbo*, *Anthrax*, *Gracorum*, *Ignis Perficus*. Carbunculus vulgò, Anthrax Græcis, pustulas profert plures, paruas, illis quæ in ambusta cute emergunt, similes, summè videntes, vnde Ignem vocant, eumque Perficum, cum illic consuetus sit: quibus mox succedit crusta nigra, carbonis instar, ob quâ causam, & quia vrit, Carbo rectius quam carbunculus, ob ruborem qui in ambitu amplo circuitu apparet, dicitur; sub qua crusta, supuratione factâ, non pus, sed lobus carneus niger, subiectæ carni radicibus infixus, pertinaciterque hærens, consistit. Febris hunc affectum, vti dictum in febribus, quoque comitatur, viresque admodum ab hoc peruerso affectu concidunt.

Anthrax, *pe*, *stiferas*, *der.* Est & alter Anthrax pestilentialis, quia in febre pestilentiali, vti illic expositum fuit, oritur, dictus. Qui cum pustula vna vel saltem non pluribus, phlyctenas aliquomodo vel clauos referente, primum erumpit, accedente quoque aliquando in circuitu illius rubore, mox verò liuescit, virescit, vel nigrescit, tandem in crustam nigram, lobumque carni similem, vti prior Anthrax simplex, definit. Dolorque in hoc non adeò vt in simplici grauis existit, sed ab initio pruritus saltem aliquis, cum ardore leui sentitur; mox verò corruptione factâ, cute carneque illic emortuâ, sensum omnem, sicuti sæpe obseruauimus, amittit, & tandem à sana parte, relicto cauo vlcere, abscedit. Bubo quoque anthraci pestilentiali interdum comes, illique vel vicinus, vel paulò ab eo remotus, adest, sicuti in febribus pestilentialibus hæc prolixè sunt exposita. Vbi quoq; ostendimus, pustulam, qualis in principio anthracis esse solet, etiam non securâ febre pestiferâ, ex contagio pestis aliquando prodiiisse, moxque iterum euanuisse.

Exulcerationes, *in superfi*, *cie corporis.* Cum exulceratione (sic in genere omnè solutionem continui cum Hippocr. intelligentes; qui quamlibet Vlcus vocauit) affectus qui se offerunt; alij in superficie seu cute magis apparent, eamque diuidunt vel lædunt, quales sunt Fulsura, Excoriatio, Vstio;

alij profundius plerunque carnem simul attingunt, & ad ima corporis sæpe penetrant, vt sunt Vulnus & Vlcus; de quibus hoc ordine agemus.

Fissura, *Rima*, *Rhagades*. Fissura seu Scissura, vel Rima cutis dicitur, quando secundum ferè cutis lineas & plicas, prout illæ feruntur, vel in longum, latum aut transuersum, cutis finditur, & pro ratione profunditatis plus minúsve fiat: dolorque lancinans inde oritur. Quales fissuræ, in manuum volis & digitis frequenter eueniunt, illicque impressa lineamenta sequuntur & diuidunt: Et in plantis pedû aliquando simili ratione occurrunt, ac si circa cutem illius loci spissam eueniant, labia prætumida & dura habent. In orificiis tridem carnosissimis, labiorum oris & podicis, & pudendi in mulieribus, in papillis aliquando & in cutaneis integumentis, præputio & palpebris, plicaturæ illorum fibrosæ sæpe finduntur, & Fissuræ seu Rhagades harum partium dicuntur, sicut intrinsecus linguam quoque findi, in oris internis vitis exposuimus.

Pernio, *Chimælon*. Est aliud genus rimarum seu fissurarum, quando altius se immergētes, ob cutis crassitiem, labiis duris & prætumidis hiant, vlcerumque instar saniem reddunt, atq; in vlcerumque interdum desinunt; illudque genus Pernio, Chimælon priuatim appellatur, à frigore summo in Pedum plantarum crassa cute, maxime in calcaneo frequenter eueniens; nonnunquam & in Manuum volis: aliàs & in Narium alis, & Aurium vanno & pinnis, à frigore vehemēti, vt in causis dicitur, accidens.

Excoriatio, *Interrigo*. Excoriatio seu Abrasio aut Attritio, vel Interrigo dicitur, quādo cuticula seu illius portio aliqua superficialis, à viua cute separatur & abscedit: vnde dolor lancinans, ex contactu præsertim oritur: à vulnere, quod hinc cutis vera tantum denudetur, in illo profundius lædatur, differens. Quales sunt variae eiusmodi cutis interrigrines, à causis externis internisque productæ: Inter quas etiâ illæ frequenter occurrunt, quæ equitanti-bus circa inferiora, & quæ ægrotantibus lecto diu affixis, ex decubitu sunt cutis attritiones: atque infantibus ab vrina circa coxas, cutis abrationes.

Alio

Alio modo si cuticula tantū abscedat, nec dum adhuc veram cutem attingat aut denudet, cum dolore minimè, sed turpitudinem potius adferat, alibi affectus hi explicabuntur. Qualis ille est, quem Furfures nominant, quod fursurum instar cuticulā contritā decidat: Atque ille, in quo cutis crassa squamarum instar in vola manuum abscedit & detrahitur.

Vltio.

Vltio dicitur, quando cuticula vel cutis, nonnunquam & subiecta caro, ab actu potentiæ vrentibus læditur, interdum & auferitur. Differtque potissimum in eo, quod aliàs superficiem tantum inflamat, illique empyreuma imprimens, dolorem ardentem aliquandiu molestantem in ea parit. Aliàs verò grauius afficiens, cuticulamq; adurens, eam vt à vera cute eleuata in vesicam, ab ea abscedat, illamque nudam relinquat, efficit: tuncque dolor qui abrasā cute oriri solet, ardori copulatur. Aliàs etiam vlcerius progressa, in vera cute escharam & crustam vrit; quibus ablatis, vlcus relinquitur: vel statim cutem vrendo, nonnunquam & subiectam carnem simul, aliquouſque absumit: tuncque ardor, punctiones doloresque longè grauiores accidunt, superueniente interdum & inflammatione, & suppuracione factā, vlcus sæpe amplum sequitur.

Vulnera
in superficiei
corp.

Vulnus solutio continui est in cute, vel partibus simul subiectis, à causa externa inducta. Cuius variæ occurrunt species: differentes primum in eo, quatenus simplex est vulnus, vel compositum.

Plaga.

Simplex vulnus, nec dum aliis comitatum, aut commutatum, illud est, quod cæsim fit, & Plaga dicitur, estque sectio in longum facta, magis minusve extensa & profunda, nunc æqualis, nunc inæqualis. Dein & vulnus punctum factum, quod Punctura appellatur: quæ nunc amplum, nunc angustum foramen efficit, & facilius in altum penetrat. Tertio & hoc vulnus, quod Ictum scelopeti vocamus, qui in momento corpus perforat, foramenque maius minusque efficit, & in altum penetrat, partesque inæqualiter diuidit contrunditque, frangit nonnunquam & aufert.

Punctura.

Ictus à
scelopeto
vel tor-
mento.

Quæ omnia vulnera vndique in diuersis

corporis partibus possunt accidere, & cutem subiectamque carnem, membranas, nervos, vasa, ossa, vulnerare, membraque nonnunquam mutilare, aliquando & internas partes, vt cerebrum, pulmones, cor, ventriculū, intestina, vesicam, hepar, lienem, cæteraque viscera simul lædere: & ob id pro horum diuersitate, diuersa quoque accidentia, inprimisque sequentia gignere.

Hæmorrhagia in omnibus tribus hisce vulnerum speciebus primum se offert, eaq; larga, si amplum sit vulnus, aut illic inflatum, vbi maiores sunt venæ, maiorque adhuc, si ad arterias quoque pertingat: exigua verò, si leue sit, aut venas saltem minores fecet, vel punctura sit angusta, per quam sæpe nullus sanguis, vel nullius momenti prodit. Sed & feri potest, vt licet insignis & profunda sit punctura, in pectus, abdomen, aliàsve cauitates internas adacta, cum in ventres enarratos tunc sanguis illabatur, nulla insignis sanguinis quantitas profundatur.

Sanies seu sanguis sero dilutus, cessante hæmorrhagiā, aliquādiu adhuc exodat, madetq; plus minusve postea vulnus: aliquando & sordescere incipit & purulentum fieri, tuncque vlceris naturam induit, atque in illud conuertitur, variatque, sicuti in vlceribus explicabitur.

Materia alia aliqua nonnunquam per vulnus egreditur: Vt cibus & potus, læso ventriculo: excrementa alui, si intestina vulnerentur; Vrina, si vesica; vel Pars aliqua corporis interdum per vulnus prolabitur, vt cerebrum in capitis, pulmo in pectoris, lien, hepar, intestina, in abdominis vulneribus, aliæve in aliis.

Dolor ex quouis vulnere suboritur, nunc leuis, nunc vehementior, pro ratione vulneris, geminaturque si pars summè sensibilis simul lædatur, cum multæ partes sine sensu læsæ, dolorem minimè sentiant.

Intumescit quandoq; etiam citra inflammationem pars vulnerata, aliàs verò marcescit, aliòve modo deformatur, vel etiam mutilatur.

Functionum aliquarum læsiones vulneribus sæpenumerò iunguntur, vt in vulneribus membrorum Conuulsiones, Resolutiones,

tionem, Spasmi, Contractiones, &c. & si interna viscera lædantur, alia grauiora & enormia plerumque symptōmata: sicuti in functionum læsionibus hæc descripta fuerunt.

Vulnus contusum, Contusio. Ab hisce vulneribus, cæsim, punctum vel per ictum factis, diuersum est, quod per contusionem ab ictu vel casu factum, Contusio dicitur, ea scilicet, quæ non tumore solo, vel etiam sine hoc, tantum cum dolore se offert, sicuti in tumoribus prius eam descripsimus, sed quæ vulnere manifestum effecit, & proin hoc ad vulnera refertur. In qua, cutis, subiectæque interdum partes inæqualiter plus minusve contusæ, scissæ vulneratæque apparent: sanguisque vel nullus, vel saltem paucus emanat; pars in circuitu vulneris intumescit, & uti in contusione, tumorem saltem proferente dictum, eodem modo coloratur, faciliusque suppuratur, & in vlcus conuertitur.

Morsus. Ad contusionem, vulnera quoque reduci possunt, quæ partim contusa, partim secta vel puncta sunt; qualia ab obtusa acie, proueniunt; & morfu hominis vel animalium accidunt. In quibus plura sæpe propter dentes infliguntur vulnera; eaque si dentes longi canini sint, ut canis, lupi, apri, profunda, inæqualia, carne simul à latioribus dentibus contusâ; quibus vulneribus inflammatio facile accedit, peruersaque inde sequuntur vlcera.

Vulnus Phlegmonodes. Præter hæc vulnera, alia aliis vitiis accidentibus comitata, composita sunt, ut si vulnere iungatur inflammatio, tuncq; vulnus Phlegmonodes nominatur, quæ rarius huic quod cæsim, frequentius illi, quod punctum, aut ab ictu sclopeti, maxime contusum fit, accedit: unde & tumor vlceri copulatur, dolorque nouus suboritur, quæ si augeantur, in gangrænâ conuertere possunt.

Vulnus in vlcus degens, Gangra. Vel si vulnus accedente pure, aliisve sordibus aut humoribus, sordidum fiat, aliōve modo vitietur, aut alioquin corrumpi vel putrescere incipiat, tunc iam naturam suam permutans, in vlcus conuertitur, quod vlcus diuersimodè, prout illa variant, se habet, atque appellatur, sicuti in vlceribus ostendimus.

Dein & si ex vulnere os subiectum frangatur, findatur, contundatur, vel aliquid ab eo abscindatur, vlcus compositum tū eiusdem modi ossium læsionibus fit.

Admodum quoque à simplicioribus vulneribus variant, quæ virulentam vel venenatam qualitatem, ab externo lædente contractam sumpserunt, & Venenata vel Virulenta vulnera vocantur: Ut si à gladio, telo, globulo aliōve succo prauo vel venenato infecto, vulnus inflatum fuerit. Vel si ex morfu bestię venenatæ prodierit, veluti apud nos à cane rabido hoc frequentius fit, quàm à serpente aliisque noxiis, quæ morfu, lædunt animantibus: unde præter vulneris accidentia grauiora (ut dictum) alia insuper, si venenum accesserit, ut in cane rabido dictum fuit, nascuntur symptōmata, vitæ quodque insidiantia. Sed & ieiuni hominis morsum, virulenti & noxii aliquid in se continere prædicant.

Ad quæ vulnera sic infecta, etiam Ictus virulentos insectorum nostrorū, ut Apis, Vesperanti spæ, Araneorum aliorumque referre possumus. In quibus etsi vulnus vix pateat, dolor tamen interdum summus, rubedo & tumor, læsionem illam satis patefaciunt. Et imprimis venenatorū ictus, ut Phalangij, Scorpj, Pastinacæ marinæ, aliorumque noxiarum, quorum Dofcor. & Nicander meminerunt, animalium, grauiora adhuc adferunt accidentia.

Vlcera in superflua carne. Vlcus solutio est cōtinuitatis sordida, cutem penitus plerumque, & subiectam carnem simul diuidens; hoc autem non uti vulnus à causa primū externa proficiscitur, sed vel ex tumore vel pustulis, uti & à vulnere nascitur, vel per se nullo horum præcedente oritur. E quibus vlceribus, quæ tumoribus vel pustulis adhuc coniuncta sunt, ut cancro, anthraci, herpeti, scabiei, vnâ cum illis iam descripta sunt. Hic verò de illis vlceribus agimus, quæ post inflammationes in abscessus conuersas, illis ruptis pure emanante vel exempto lobo carneo, in furunculo & anthrace relinquuntur: vel erysipelata, cum vesicis in iis disruptis exulcerantur, sequuntur; vel in quæ, vulnera sordida facta transierunt: aut per se, ex vitioso suc-

eo primū originem traxerūt. Quæ omnia vlcera variant. primū, quod vel simplicia sunt, vel quia alia accesserunt, vel composita sunt.

Vlcera simplicia Sordida. Simplex vlcus, quod suam naturam seruat, dicitur, cum tantum sordidum sit, illiq; nihil præterea accesserit: quod proin Sordidum vlcus appellare possemus; Hoc autem si non adeo excavatum sit, sicuti illud. fere

Planum vlcus. est, quod vulnere succedit, Planum vlcus vocatur: si verò cavitatem illud insignem, ob

Cavum vlcus. deperditam carnem adeptū sit, vti hoc quod abscessum sequitur, cavitāsque hæc rotunda sit, Cavum vlcus appellatur: si verò oblongum sit, canalem seu sinum referens, qui

Sinuosum vlcus. nunc rectā, nunc indirectē cuniculos agens, deorsum vel in latera longo breviorē ductu fertur, sæpeque sine suo ad exteriora corporis delatus, illic foramine se rursū aperit, Sinuosum; & priuatim si ductus hic rectā

incedat, Fistulosum vlcus appellatur. Quæ omnia vlcera, pus sordida reddit, quod illis adnascitur, atque ex illis continuò emanat: copiosius in cauis & sinuosis quàm planis vlcibus: quod nunc album est, mediæ consistentiæ, quod coctum vocant, æquale & inodorum: aliàs aliter coloratum, aquosum seu crudum dictum, inæquale, odore alieno præditum. Sordes etiam aliæ crassæ, glutinosæ & veluti concretæ vlcibus hisce plerunque adhærent. Madorque serofus vlcera hæc simul humida reddit. Dolor in illis non adeo vt in inflammatione aut abscessu dum generatur, magnus, sed solum lancinans, & qui contactu potius, vel læsione aliā factā, aut turundæ immisione exacerbatur. Quod si vlcera partes ad motum paratas impetant, aut ad interna viscera ferantur, functionibus quoque (vt de vulneribus dictum) incommodant.

Vlcera composita. Composita vlcera, nec dum amplius simplicia, quibus alia vitia iunguntur, varia existunt, & primū illa in quibus Caro nimia

cum sanantur, excrescit, & supra decentem corporis superficiem luxuriat, impedimentum & turpitudinem, si cicatrice obducetur, vlcusque sic non ablātā prius hac carne, sanaretur, adferens: quod Excrescens vlcus nominatur.

Dein & vlcera illa sinuosa, quæ Tunicā *Fistulosum vlcus, Fistula.* intrinsecus inuestiuntur atq; succinguntur, adeo vt cum nec pus, nec humorem è carne, quæ non amplius nuda est, vltcrius profundant, sanata essent, nisi cavitās hæc in corpore relicta, cum præternaturalis & turpis sit, atq; etiam incommodet, vt ea denuò cureretur per vlcis refrigerationem, & cavitatis huius repletionem, perfectam illius hanc sanationem requireret. Quæ vlcera Fistulosa, vel Fistulas nominant, idque potissimū si ampliora sint, rectoque (vti dictum) ductu progrediantur: sicut à ceruice incipientem eiusmodi fistulam, secundum spinæ longitudinem ad coxam vsque descendentem, illicq; se aperientem, & pus copiose profundentem, vidimus. Et exigua eiusmodi vlcera fistulosa in perinæo, foraminibus plus minusve amplis pluribus patentia, & ad vesicæ ceruicem vsque tendentia, per quæ vrina continuò exstillabat, sæpius deprehendimus.

Huc & referuntur vlcera, quorum labia *Callosa vlcera.* dura & callosa fiunt, quæ Callosa proin vlcera appellantur, & cum cicatrice obduci nequeant, ad Dysepulotica & vlcera Cacoethe referuntur. Quæ verò malignitatem aliquam simul adiunctam habent, in malignis mox explicabuntur.

Sunt & alia vlcera, quia difficulter sanantur, *Cacoethe vlcera.* Cacoethe dicta, non per se, sed quia subiecto inualido innixa, illi adnasci nequeunt, vt ossibus corruptis vel exesis, sicuti in ossiū corruptione dicitur.

Deteriora hisce accedunt incommoda, si *Phlegmonosa vlcera.* inflammatio, è qua suppurata hæc vlcera prodeunt, adhuc comes, illiusve reliquæ aliquæ remanserint, vel illa de nouo vlcibus accedat, aut erysipelas; tunc enim tumor, rubedo, dolor, illis admodum incommodant. Vbi & si cedematosus tumor, sicuti sæpe fit, pars vlcerata intumescat, minori doloris, sed maiori sanationis impedimento.

Inprimis peruersa sunt vlcera, quorum *Corrupta vlcera, aqua exundantia.* Caro corrupta, lardi instar alba, mollis tumidaque apparet, & ab ea serofus ichor aquam limpidam referens, exsudat. Quæ vlcera, ex vulneribus in articulorum regione excarni membranea & neruosa inflicta, prodire so-

lent.

553

Germ.
Bacter
Germ.Parony-
chia vl-
cerata.Putrida
vlcera.Vermico-
sa vlcera.Vlcera
peruersa.Exe-
dia vlce-
ra.Nome.
Depa-
scencia
vlcera.
Phage-
dena.Crurum
vlcera
peruersa.

lent: suntq; ea quorum aquam chirurgi nostri peculiari nomine *Glidwasser* quasi aquâ articularum vocant, eaq; ob dolorem sum- mum quem adferunt, & contractionē mem- bri, quæ facili, vel corruptionem in gangræ- nam, quæ aliquâdo sequitur, tantopere me- tuunt. Cuius generis & vlcus est, quod in- flammationem digitorum extremitatum, quam Paronychiam vocant, sequitur, arti- culumq; illum corrumpit, sicuti in inflama- tionibus illud ostendimus.

Ad eiusmodi vlcera carne prauâ referta, etiam ea, in quibus caro putrescit, sunt refe- renda, quæ Putrida seu Putrescentia tunc appellantur, quod & in fordidis & aliis depa- scentibus vlceribus euenire potest, in qui- bus caro putris, glutinosa, & quæ facili dis- soluitur, flaua, viridis, nigræ apparet, ex eaque ichor fœdus, discolor emanat, fœtorq; sentitur. Et vermes nonnunquâ nascuntur, tuncq; Vlcus Vermicosum dicitur. Quæ vl- cera, si putredo inualescat, in gangrænam a- liquâdo abeunt, sequiturq; partis corruptio.

Præter hæc vlcera, quæ caro, tunica, cal- lus, ossæ subiecta, aliena & simplici reddi- derunt, sunt vlcera, quæ à vitioso vel mali- gno humore, vel primò oriuntur, vel ex aliis vlceribus, & in primis illis quæ erysipelas exulceratum peperit, ob occasionem illius peruersi humoris, in hæc degenerantibus, nascuntur; & cavitatem quam obtinent, continuò exedunt, amplioremq; reddunt, Exedentia dicta, quæ Nomas etiam vocant. Et quæ cum vicinam quoque partem depa- scantur, Depascétia, vel si solùm cutem exe- dant, Phagedænica, & in genere quia ser- punt & vterius expatiantur, Serpentina ap- pellantur; vel etiam cum ægrè sanentur, ad vlcera Cacoethe referuntur.

Suntque hæc vlcera admodum frequen- tia, quæ vt in variis corporis sedibus, sic ma- ximè in crurum infimâ sede, ob situm hu- moribus suscipiendis aptâ; & quia erysipe- lati sunt obnoxia, supra malleolum, latum spaciū plerunque occupare solent, cutem- que in ambitu aliquousque, vel etiam toto circuitu exedere, penitusq; ad viam vsque carnem depascere, eamq; sæpe simul depop- ulari. Consuetum & diuturnum ad multos

annos, nonnunquam & toto reliquo vitæ tempore, in senibus vitium, largum humo- rem continuò profundens, pannosque ma- defaciens, sanguinemque vel minimâ læ- sione exudans, doloreque lancinante excru- cians, ardore quoque molestum, & cum ru- bore in ambitu & tumore nonnunquâ cru- ris affecti œdematoso. Interdum etiam venâ illic supra vlcus apparente, dilatatâ & turgi- dâ, liuidâ, quæ multis inuolutionibus per- crus ad vlcus vsque descendit, illudque vti dicitur, fouet: ob quam & venam dilata- tam, quæ Varix dicitur, vlcus ab ea Varico- sum tunc appellatur.

Malignitatem quandam, quæ simul obti- nent vlcera exedentia, serpétia & depasca- tia, sunt quæ in Lue venerea, præter ea quæ in faucibus, naribus & genitalibus mulie- rum, vt in illorum locorum doloribus di- ctum est, erumpunt, in præputio & glande penis, in masculis hac lue infectis, vel etiam citra hanc, ex impuro congressu oriuntur, illicque serpunt, sæpeq; glandis portionem, vel vniuersam, vel etiam totam virgam de- pascuntur, quæ ob peruersitatē, Canceri no- men obtinuerunt. Dein & illa vlcera, quæ in Elephantiasi, præter quoq; alia faucium & narium amplitudinis, in illis se offerentia vl- cera, in plantis pedum & volis manuum, & cubito, alibiq; in pedibus & brachiis præci- pue occurrunt; phagedænica cutem depa- scentia longo ambitu ad viam vsq; carnem vlcera, labiis prætumidis & callosis, indo- lentia, sicuti illa in elephâtiasi describemus.

Cum corruptione partis alicuius in su- perficie corporis, se offerens affectus, variat primùm, quod vel in carnis locis, vel in os- sibus oboritur seque manifestat.

In carnis partibus ex cute, carne, mem- branis, neruis vasisq; compositis corruptio quæ se offert, incipiens, Gangræna appella- tur; plerumque inflammatione secuta, a- liàs quoq; ab aliis causis (vt in illis dicitur) eueniens. In qua pars colorem naturalem a- mittere incipit, sensimq; vel subito etiam li- uescere, mox etiâ nigrescere, vnde Germ. ob nigredinem hanc, a calore natiuo extincto profectam, hunc affectû den *Kalten brand* vo- cant, intumescente tunc simul parte, atque

Varicose
vlcera.Vlcera
mal. gna.Luis ve-
nerea vlc-
cera.Cancer in
vulva.Eleph
narium
vlcera.Corru-
ptio par-
tis in
superfi-
cie cor-
poris.Gangre-
na, Kalt-
brand
Germ.

dolente adhuc, nonnunquam & graui dolore antequam penitus corrumpatur, afflicta: è qua virus quoddam continuò emanat, quod cutem & carnem vndiq; imbuat mollioremque reddit, quæ tandem corrupta, vel sponte finditur exulceraturque, vel scarificatione facta, per quam huic malo succurrere volumus, plagæ admodum latescunt, labiisque tument, demumque nisi illicò malum auertamus, pars omni calore naturali, vti & pulsu sensuq; destituta, emoritur, summeq; foetida & cadauerosa fit, tuncque Sphacelus, Syderatio nominatur.

Sphacelus.
Syderatio.

Ossium corruptio.
Caries ossium.

In ossibus si corruptio fiat, est vel ipsorum erosio aut exesio, certo in loco, vnde aspera & inæqualia sunt: Vel iam manifesta corruptio, vnde pars ipsorum aliqua sic affecta nigricat, & à sana viuæque ossis sede tandem abscedit, vel vniuersum os, vt in paronychia digitorum internodia corrumpit, & mortificat, diciturq; tunc Ossis Caries. Quæ ossium corruptio, cum vlcere plerumq; in carne cuteq; illi instrata, ex quo vt plurimum nascitur, & cum eo iungitur, per vlcus illud se patefacit, quod profundum ad ossa vsque pertingit; & proin, etsi per se in ossium corruptione dolor non adsit, tamen propter vlcus illi copulatum, quod quamdiu os subiectum corruptum manet, curari nequit, hæc quoq; hæc corruptio inter dolores explicatur: quam &, quatenus figuram vitiat, in deformationibus tractabimus.

Causa.

CAUSÆ omnium istorum dolorum in superficie corporis occurrentiū, qui sunt, vt dictum, titillatio, pruritus, & dolores à calore frigoris compressione, asperitate, contusione, omnes citra characterem apparentem facti: item rubores seu erysipelata, tumores, inflammationes, abscessus, cancri, pustulæ, scabies, fissuræ, abrasiones, vulnera, vlcera, in quibus characteres ipsi morbi sunt, qui se patefaciunt, sunt vel intemperies frigida, calida, sicca, sanguinis aut alterius humoris, in illis locis collectio, vel continui solutio.

Dissectio.
de causa
titillationis.

Dissectio molestiam illam, quam Titillationem vocant, parit, si partes non consue-

tæ tangi, vt plantæ pedum, latera, axillæ, obscena, ab alio præsertim, maximè si inusitato modo illud fiat, tangantur: Vel si hoc etiā aliis in locis, vt in facie, ex contactu alicuius rei, quæ veluti rependo, aut leuiter vellicando, sensum mouet, aut ab insecto aliquo fiat, molestum quoque aliquo modo existit.

Frigida intemperies, dolorem quem Frigidum appellauimus, in superficie corporis inducit. Si ab aëre frigidò, à vento præsertim impulsò, vel aquâ frigidâ, maximè in niuem aut glaciem congelatâ, corporis superficies affecta, intemperiem hanc illi aduersam sentiens, doleat potius, quàm quòd ex frigoris cōstrictione, tenues humiditates exprimantur, sicq; soluendo continuum dolor inde inducatur. Qui eò maior erit, si loca excarnia, neruosa, aut minus consueta frigus pati, vt pote. aëri minùs exposita, frigus feriat; ob quam & causam facies, cum contegi non soleat, etsi egregiè sentiat, non tam facillè ac alia pars quæ recta esse consueuit, ex frigore molestiam patitur. Dein &, si cute denudatas, vel vulneratas sedes afficiat, eas quoque magis molestabit, vnde frigidum vlceribus mordax esse dicitur. Dolorq; vehementior etiam erit, si subita fiat ex frigore valido in calorem summum transmutatio, ob contrarium illum subito & violenter inductū sensum; qui si in manibus, vti ferè illæ maximè cum nudæ sunt, à frigore patiuntur, fiat; dolor ille sæuus, qui in extremitatibus digitorum sub vnguibus circa neruorū fines, tantopere affligit, quem Rūncglen vocari diximus, oboritur.

Frigus, causa doloris à frigore, & prima titillationis qui Rūncglen vocatur.

Calor seu calida intemperies, dolorem quem Calidum nominauimus, gignit. Qui dolor ab externis, vt aëre, à sole vel arte calefacto, vel aquâ contactiue alterius rei calidæ, aut corpus accendentibus, nondum tamen inflammantibus, nascitur: dein & ab integumentis nimis corpus admodum incalescit, molestiamq; sentit, ac sudor coactus erumpit. Exercitio etiam nimio corpus supra modum accenditur. Ab internis quoq; causis, corporisq; calida constitutione, calor præternaturalis, in volis manuum & plantis pedum incommodum aliquod adfert, cuius causam calori hepatis pleriq; attribuunt.

Calor, causa doloris à calore.

Et in

Et in morbis calidis, febribus præsertim, calor non solum internus, sed & exteriores sedes occupans, molestus est.

Siccitas causa doloris ex contactu rei asperæ.
Siccitas cutis asperitatem in illa, tactum nonnihil in delicatioribus præsertim offendentem parit, quæ scabrities & ab aëre externo sicco, vel contactu rerum exiccantiū, vel adstringentium contrahitur. Ex labore callosa facta cutis, & dura, sensum tactus potius minuit quàm deprauat. Nonnunquam verò cutis, ultra modum exiccata, finditur, fissuræque inde in manibus, pedibus, labiis, oris, podicis, aliisque locis fiunt. Quæ nimia exiccatio, ut à dictis causis quoque euenire potest, sic frequentius à calore & frigore, ad eò siccantibus accidit; uti in febribus ardentissimis cutem hinc inde scindi, & ab aëre expirato calido, labia findi videmus: Et ab aëre, aqua frigidis, in manibus & pedibus fissuras; & si frigus intensissimum fuerit, & diuturnum vel frequens, eaque præsertim loca ubi cutis crassa est, feriat, fissuras maiores & in vlcera desinentes, quas Perniones vocant, prodire: sicuti hoc in plantis pedum & manuum, item narium & aurium externis sedibus, utpote nudis & frigori expositis partibus excarnibus, frequenter euenire, in generibus ostendimus. Quod frigus, quia cutem constringendo siccatur corrugatq; potissimum molitur; & si calorem illic nonnihil simul reprimat: vel extinguat, grauius, ut in pernionib; aliquando fit, efficit.

Siccitas causa Fissuræ & Pernionum.
Sanguinis collectio in superficialiis, cutaneis, carnosiss, glandulosissq; partibus variorum illorum affectuum, illic prodeuntium; præcipuè tumorum atq; inflammationum causa existit, qui cum per influxum eò delabatur, subito enarratos affectus parit. Quando nimirum non solum moderate partes hæce irrigat, sicuti naturaliter has ad nutritionem semper sanguine, non solum in capillaribus venis contero, sed & in propriam ipsarum substantiam infuso, imbutas esse oportuit, sed suâ copiam nimium adimplet, plerumq; & inflammât. Tuncque si in cutem, cuticulâ demptâ, quæ sanguinē intra suam substantiam minime admittit, alicubi diffusus, dispergatur, Erysipelas dictum producit: in quo rubedo, ratione sanguinis, per

epidermidem cuti instratam, translucens, apparet, & cum non adeò adhuc sit impactus aut in tumorem collectus, quando premitur pars, rursus eo refugiente, rubedo desinit; sed mox iterum, ubi non amplius impellitur, reuersus, ruborem denuò adfert: sicuti in aliis quoque locis, sanguine etiam naturaliter, ut rubeant perfundi solis, ut labiis, malis, idem simili ratione videmus accidere. Sed & ardore potius, si feruidior sit, quàm dolore, cum non adeò distendat, afficit. Quæ omnia prout sanguis existit, variant. Si enim ille tenuis & feruidus sit, uti ferè est, erysipelas fit Simplex, in quo fluxus illius, refluxusq; citius perficitur; si crassior, erysipelas Phlegmonodes, grauius tunc afficiens; si serosus, erysipelas oedematodes, quod mitius est, sed tardius remittit, licet cesset, post se relinquit. Quod si bile perfusus sanguis eò feratur, tunc ex rubro flauescens fit erysipelas, magis vrēs, cuticulamq; exedens, cessantēq; rubore, flauitie cutē adhuc tingēs: si deterior fuerit, bilis viridis vel atra huius calorē quoq; ex parte exprimit, citiusque in vlcera peruersa desinit, eoque magis, si maligna simul in eo sit vis.

Quod si verò sanguis in cutem carnemq; vicinam, extimæ corporis superficiei sedem influens, illic subsistēs colligatur, tumorem illius loci plerumque & inflammationem simul parit, tuncque rubori partis tumor quoque copulatur, dolorq; tum ob id distentionem, tum ob sanguinis effervescentiam calor, suboriuntur: & si sanguis discutatur, tumor rursus euanesceat, si maturetur seu suppuretur, in Abscessum abit; quo rupto, vlcus sequitur, pus illud profundens, eo maiori copia, si non solum sanguis affluxus, sed & partis substantiæ portio simul in pus conuertuntur: Cuius loco si inflammatione accedente etiam interdum alio aliunde affluente peruerso humore; corruptio aliqua sequatur, in vulnere præsertim circa nervosas & membranosas partes facta, vlcus illud perniciosum nascitur, ex quo aqua exudans Ulidivasser vocatur, in quo ob corruptionem nervosarum partium, immobilitas membri facile sequitur. Quod si quoque inflammatione effescens in his vel aliis

Sanguis influxus in cutem carnē, causatur morus & inflammatio, illiusq; diuersarū specierū. Suppuratio causa Abscessus.

Corruptio in vulnere causa vlcus quod Ulidivasser vocant. Corruptio partium, causa Gangræ.

Sanguis in cutem influxus causa Erysipelæ, illiusque specierum.

Caloris nativi extinguitur, causa Sphaceli. sedibus, non suppuratione, sed partis sequatur corruptio, Gangræna; & si in ea calor natiuus penitus extinguitur, Sphacelus sequuntur.

Sed & fit, vt si sanguis in carnem potius substratâ cuti, quàm cutem influens, in musculos videlicet externos abdominis, vel thoracis, colli aut dorfi decumbat, inflammationes illic excitet, quæ non aded extrinsecus rubere vel tumore se, vt cæteræ proferrunt, & cum internis inflammationibus, vt pleuritide, angina, aliisve ad externa quoq; pertinentibus, quædam symptomata communicant. Fit etiam, vt si in plura loca sanguis inflammationem gignens, effundatur, plures etiam simul sese offerant, quæ tamen tunc non aded latè se extendunt, sicuti in tuberculis dictis euenit, vbi plura simul sepe prodeunt. Et in minimis illis, in quibus sanguis veluti in poris collectus, parua multa eiusmodi, in scabie dicta solet producere.

Verùm & hîc pro ratione sanguinis, eiusmodi inflammationes variant. Nam si sanguis syncerus & mediocris existat, simplex sequitur inflammatio: si tenuior, tunc non solum collectus, sed & partim per cutem dispersus, phlegmonem erysipelatodem profert; si crassior, magis renitens liuensq; erit inflammatio, quam scirrhomem vocât, cum tamen scirrhus inflammationem potius sequatur, quàm comitetur; si serofus, phlegmone fit œdematodes, in qua serum vterius in cutem diffusum, sicuti cum sanguis in lineum pannum funditur, accidere videmus, in ambitu partem in tumorem œdematosum eleuat. Quod si alij humores acres, vt bilis flaua, viridis vel atra, vel aliquin prauis & maligni sanguini pmisti sint, eo deterior erit inflammatio, in qua ob sanguinis ardorem, vel quia in profundum admodum vergit inflammatio, caro à sana carne liberata, locum facit; qui aperto tumore, illi infixus, donec penitus exeat, manet, sicuti in furunculo fieri diximus.

Sanguinis influxus in glandulas, causa Bubonum, Paroti- In alias partes, à cute & carne non nihil diuersas, si sanguis illabatur, tunc collectus, tumorem etiam calidum, plerunque & inflammationem simul profert. Vt cum in glandulas in emunctoriis corporis sitas se insun-

ad, Phlegma. dit: quod frequens est, tum quia natura in ignobiles partes se citius exonerat, tū quia, cum laxæ sint partes, & iuxta venarum magnarum diuisiones positæ, facillè sanguinem suscipientes, tument & dolent, in Bubonibus & Parotidibus, & vel saltem calent, vel etiam inflāmantur, & suppurantur, in Phlegthlo seu Pano, vt in generibus dictum: quæ &, prout sanguis vel purus aut impurus, tenuis vel crassus, crudus, simplex, aliisve humoribus serosis prauisque permixtus est, differunt, inter quæ à crudiore aut serosiore sanguine, fit Phyma dictum, à pernicioso & contagioso, Bubones pestilentes & venerei.

Sanguinis influxus in alias partes, causa Tumoris & inflammationis illius. Eadem ratione, si in alias partes feratur superficiei corporis, vt glandosas mamillarum, testium, in quas propter venarum copiam facillè labitur, & ab illis suscipitur; vel fungosas, pudendorum, podicis, oris: aut cartilagine suffultas, nares & aures: vel iuncturarum sedes, tumores calidos & inflammationes in illis parit; variantes quoque, prout sanguis affluens, calidior, impurius aut deterior existit, vel partes ex illis teneriores, magisve neruossæ & sensiles, quæ & grauius patiuntur, existunt.

Huius autem sanguinis, in superficiarias hæc corporis sedes influxus, causa efficiens est, facultas expultrix, quæ eum in hæc loca propellit, quando illius quantitate qualitate, vel etiam alijs de causis, grauatur aut irritatur; adiuuans verò, sanguinis dispositio ad fluxionem apta, partiumq; ad suscipiendum promptitudo. Quæ causæ, siue vna sit, siue plures concurrant, à sequentibus proficiuntur.

Sanguinis plethora seu redundantia nimia, quia naturæ grauis est, ab ea, sicuti alias in interiores sedes, sic & in exteriores quandoque expurgata, tumores & inflammationes in illis parit. Quod nunc sponte, nunc etiam leui aliâ causâ accedente, in illis solet accidere: Quam ob causam etiam in iunioribus, dum crescunt, sanguineq; abundant, tam facillè glandulæ intumescunt, & si frequenter eas, aut durius attrectent, in bubones erumpūt. Calidior quoq; sanguis & feruidior, vel etiā tenuior seu dilutus, tum quia

ad fluendum aptus est, tum quia excretricæ facultatem, præsertim si copiâ quoque redundet, ad eum expellendum excitat, in hæc loca excussus, erysipelata atque inflammationes, pro sanguinis diuersitate, ut dictum, variantia gignit. Quod ut aliàs sæpe, sic & in febribus synochis illis accidere, in quibus sanguinis inflammati seu accensi, & efferuescētis portio, è venis in cutē diffusa, Erysipelata illic, quæ febres hæc sequuntur, procreat; in eiusmodi febriū descriptione ostensum fuit.

Humor alius, vel qualitas nature infensa, eam offendendo excitans, adeo ut dum ea in exteriora corporis expellere nititur, cum illis sanguinem simul illuc effundat, tumores diuersos illic quoque procreat: sic cum causa morbifica è venis vnâ cum sanguine, in febrium crisis foras expellitur, tumores aliquando hi in morbi declinatione sequuntur. Et cum qualitas illa pestifera, vnâ cum sanguine in febre pestilentiali, in emunctoria corporis propellitur, Bubones erumpunt pestilenciales: Et cum virus venereum ad inguinum adenes protrahitur, Bubones venerei nascuntur: sicuti hæc in eiusmodi morbis vberius sunt descripta.

Dolor, non attrahendo, ut communiter dicitur, sed naturam excitando (cum tunc quia causam illius depellere nititur, sanguinem simul eò propellat) inflammationibus externarum harum sedium, quæ ob iniurias externas, quibus magis expositæ sunt, citius etiam afficiuntur & dolent, occasionem præbet: ut si illæ premantur, verberentur, contendantur, aliòve modo grauiter impetantur & doleant, accidit: vel si dolor à morbo aliquo procedat, & sic inflammatio illa de nouo ob dolorem augeatur: si abscessus, pustula, vulnus, vltio, vlcus, inflammatio tunc ipsis copuletur, vel alteri alicui morbo dolorem hunc inferenti, sicuti in illis explicabitur, iungatur. Sed & tubercula inflammata, quæ ex frictione cutis, in scabiosis enascuntur, etsi frictio ob pruritus ab initio voluptatem adferre videatur, tamen quia mox dolor lancinans sequitur, huius causâ præcipue erumpunt. Dein & sæpe euenit, ut non solum ipsa pars dolens in tumorem assurgat, sed & vicinæ, si ad defluxionem susci-

piendam dispositæ sint, ut glandule, quia defluens sanguis eas quoque tunc irrigat, simul intumescant: ut in inguine, si in cruribus: sub axillis, si in brachiis, vel iuxta aures: si circa has sedes dolor à causis vel morbis prædictis fiat: inter quas causas, scabies hæc loca molestant, in vicinis emunctoriis bubones comites plerunque habet, buboque pestilentialis, non tam ob pestiferam vim, ut dictum, quam ob anthracis vicini ardorem & dolorem, aliquando enascitur: sicuti id in febre pestilentiali ostendimus.

Qui dolores omnes in externis hæc partibus eò diuturniores & pertinaciores inflammationes efficient, si sanguis facile continuoque eò feratur, & pars ipsa dolore indefinenter laceffatur. Veluti in asciticorum cruribus tumentibus accidit, si vel sponte, vel arte apertâ cute, serum exstillans, continuo illa loca alluens, suâ perniciem, quam diutinâ morâ corruptam acquisiuit, rodât atque irriter, unde sanguinis affluxu cōcitato, qui eò facilius, cum serosus quoque sit, huc fluit, erysipelata illa exulcerata adeo peruersa, & quæ tam facile in gangrænâ abeunt, nascuntur.

Calor externus, si cutem alicubi diutius, aut admodum afficiat, non solum eam rarefaciendo, sed & illam, & vnâ cum illa sanguinem vicinum simul accendendo, eumque ad fluxionem cōcitando, erysipelata vel inflammationes, in corporibus potissimum tenuioribus, sanguineis, atque illis qui hæc affectibus alioquin obnoxij sunt, gignere potest. Veluti illis accidere solet, quibus ad focum diutius sedentibus, sequæ calefacientibus, crura nimium incalescentia, erysipelata interdum eo nomine facile contrahunt; vel quorum in sole diutius moram trahentium, partes ardori diutius expositæ & vehementius calefactæ, idē patiuntur. Sicuti mihi iuueni adhuc, frequenter, magnam diei partem maximo æstu equitanti, euenit, ut solis calore, ocreis supra modum incalescentibus, cruribusque simul, illa postea rubore vehementi cum ardore aliquo perfuso, diem vnum aut alterum permanerent. Quæ erysipelata & inflammationes, uti & ab enarratis, sic & ab aqua calida feruida que, si corporis extremæ partes eâ sæpe vel vehemēter calefiant,

euenire potest. Quemadmodum post balnea, tubercula Eryssin dicta, aliquando erumpere videmus, cuius causam præcipuam vulgus statuit inde prouenire; si, dum corpus adhuc calore balnei æstuat, frigidâ conspergatur; tunc, eo in loco ubi tactum est, vlcera hæc prodire, fortè ob subitam illam repercussionem; sanguine cum impetu fugiente, rursusq; redeunte, accedente insuper molestiâ illâ, quam ex subita mutatione & inæqualitate pars patitur, vnde sanguis quoque commouetur. Sed & calor alius, licet moderatus, vt lesti, pruritus excitando, illeq; frictionem, tuberculis hisce, vt prorumpant, illis qui ad scabiem proni sunt, per accidens ansam præbet. Dein & in certarum partium inflammationibus priuatis, vt aliqua ex his causis, eas inducere quoque potest, sic non minimam inflammationis illius, circa vnguium radices, Paronychiæ dictæ, suboriri solitæ, causam esse obseruaui, quod ancillæ, quia vasa immunda aquâ feruente, indies abluere solent, digitos frequenter perurendo, aded vt vngues illarum, cum hoc sæpe fiat, incuruentur, hoc malum sæpiusculè sibi accersunt.

*Humo-
rum af-
fluxus,
causa Tu-
berculo-
rum &
Pustu-
larum.*

Humores alij, illiq; excrementitij & præternaturales, in superficiem corporis effusi, illicve cōgesti, cum tantâ copiâ, vt sanguis, in vnum locum minimè perueniant, pustulas potiùs, & tubercula, quam tumores insignes, primo impetu progignere solent: E quibus tamen aliquæ pustulæ, ob affluxum etiam sanguinis, inflammationem in horum ambitu, rubore potiùs erysipelatum instar, quam tumore conspicuam, comitum nanciscuntur: tuberculum verò in tumorem magnum sensim attollitur: omniaque illa, in vlcera nunc leuiora, nunc deteriora, serpentina, exedentia, nunc aliàs perniciofa abeunt: idq; pro horum differentiis, quæ inde primum desumuntur, quod vel occultâ vi, vel manifestâ qualitate hoc operantur.

Occultâ vi illud agentes humores, perniciem suâ hoc faciunt absconditâ, qui si alicubi superficiem corporis impetant, pro illorum conditione diuersâ, qualis venenorum esse solet, non eodem modo afficiunt, sed vel tuberculum aut pustulas producant.

Tuberculum autem profert illud venenum, quod eam vim peruersam in se habet, quâ partis alicuius substantiæ portionem ita inficit, eamque deprauat, vt sic infecta, tuberculo ex carne eadem pullulante enato primum se manifestet, quod perniciem suâ ex eo quod non cedit potissimum, cum alioquin non grauiora incommoda quam punctiones aliquas adferat, ostendit; & quod dum vt reliqua corporis substantia nutritur, nutrimentum sibi afsimilando simile reddens, & in eandem prauam substantiam conuertens; sensim in altum, latum & profundum augetur, atq; incrementum capiens, in tumorem maximum, Cancrum (vti dictum) nominatû, increseat: ex carne quoque substantia, venisq; intertextâ, constantem, nullâ inflammatione alioquin, vti putarunt, accensum, nec humore alio, quam sanguine in venis refertum, sed pruritu & puncti-
*Perni-
ciosa &
venena-
ta qualis
tas, cau-
sa Can-
cri.*
bus saltem molestum, & malignitatis notas, hoc potissimum, quod augeri non desinat, exprimentem, idque donec apertâ cute exulceratus, vlterius progredi nequeat: quo tempore tamen, tunc quoque adhuc enutritus, stiriis carnis, ex eo nascentibus productis, luxuriat: quem totum perniciosum esse, ex eo facile licet conijcere, quod nisi radicatus euellatur, aboleri minimè possit, sed vel exiguâ illius portione, etiam post ablationem alterius remanente, de nouo recreascit.

Cæterum à qua materia, & vnde hoc venenum primum prodierit, indagare difficile est, aut ipsius naturam aliter quam ex effectu describere. Per contagium tamen corpus alicubi tactum, hoc hausisse, vel prius corpus subiens huc propulsum fuisse, ex eo nonnihil colligere liceret, quod elephantiæ, cuius causam cum cancri causâ consimilem faciunt, & proin eam generalem cancrum vocant, ex contagione quoque prodeat, ita vt quemadmodum in illa plures corporis partes, sic in cancro vnâ tantum, eoque grauius, quod hæc impetuosius peratur, afficiatur. Nec obstat quod rarius paucioresq; cancro afficiantur, cum & hoc in elephantiæ eueniat; ad quod facere videtur, quod aliam noxam corpus intrinsecus non patiatur,
cum

665

cum tamē illis in locis hoc fieri deberet, vbi veneni huius origo lateret. Nisi forte in venis delitescens, inde suam originem trahat, nec dum nocere possit, donec vnā cum sanguine similiter infecto, aliōve modo ad exteriora vis hæc propulsa, eam corporis partem, quam possidet, inficiat, & tunc quoque primum crescente cancro, sensim corpus debilitet, viresque deiciat. Ab atra bile verò, illum proficisci, vti voluerunt, concedere hisce de causis minimè possumus: Quod si à naturali atra bile, quam seculentum sanguinem esse dicunt, prodiret, illius indicia quædam apparerent, sanguisque talis illic collectus extra vasa, quod necesse est, si tumor fieri debet, atque inflammatio quædam, quæ tamen minimè adsunt, deprehenderetur: & si ab atra præternaturali bile gigneretur, ardor, erosio, nigredo, vt in anthrace mox in prima inuasionē se repræsentarent, cum hic nihil tale accedat, sed instar carnosæ substantiæ, vti dictum, cancer se offerat, nec adeo dolore, vti ostensum, incommodet.

*Pestilens
veneni,
causa
Anthraxis
& Bubonis
pestiferi.*

Ab alterius naturæ veneno pustula gignitur pestilentialis, quam Anthracem pestiferum vocant: quæ nunc virulentā vi potissimum, sine magno ardore, vel etiam nullo, sed pruritu & punctionibus solis, vt de cancro dictum, molesta: nunc adurente simul qualitate accedente, atque inflammatione aliqua in ambitu, & bubone in vicinia, partem quousque affectā est, contaminando, mox corrumpit, & mortificat, & proin nigra, atque inutilis à parte sana separata abscedit.

Quod venenum, à pestilenti veneno eo, quod extrinsecus corpus inuasit, suæque perniciæ & feruore, quæ in se continet, febrem pestilentem accendit, proficisci, si portio illius in exteriora hæc loca propellatur, in febribus demonstrauimus: in quo, si vis illa vrens cum perniciofa permanferit, eam simul vrendo, vti dictum, exerit. Sed & venenum pestiferum corpus extrinsecus feriendo, nondum tamen penetrando vltius, pustulas pestiferas in me & aliis excitasse, in febribus pestilentialibus quoque docuimus.

*Humores
biliosi
sæpius*

Manifesta qualitate operando, humores aliqui, Scabiei, Herpetis & Carbunculi di-

uerfa genera, & in illis vi suā erodente, vel etiam adurente, aliōve modo peruersā, pustulas cum cutis rofionibus interdum, & exulcerationibus procreant. Qui humores vel biliosi, illique vel excrementitij aut præternaturales, e quibus bilis summè flaua, viridis & atra sunt: aut falsi vel alioquin acres vel prauī existunt: & ad superficiem corporis, vel cum sanguine, aut sero, quo plus minusve diluuntur, defluunt, pustulasque tunc citius, & simul aliquam interdum inflammationem, si sanguis fluxione hac concitatus, aut dolore motus, se quoque insinuet, excitant: vel citra hanc fluxionem e venis exudantes, sensim in cute & subiectā carne congeruntur, aut illic originem vel incrementū sumunt. Pro quorum omnium varietate, diuersæ ille species scabiei, herpetis & carbunculi nascuntur, sicuti hoc quo pacto fiat, & à quo humore procedat, in singulis demonstrabitur.

*crer, praui, causa
Scabiei,
Herpetis
Carbunculi, diuersa
rumq; illorum
specierū,
vbi &
Phlyctenarum.*

In scabie humida vulgari, pruritus & rofio, si citra magnum ardorem fiat, humorem non adeo ardentem esse, sed falsum tantum, aut bilem mitiorem, vel sero contemptatam, in cutem e venis excidisse, si nulla rubedo aut inflammatio adsint, demonstrant: nam si hæc quoque accedant, cum sanguine hunc influxum fieri, vel alioquin ex frictione, vel dolore commotum, accessisse, ostendunt, vti & suppuratio quæ inde sequitur. Quæ omnia cum in fera scabie dicta amplius adhuc eueniant, & simul copiosus ichor nunc flauus nunc viridis exsudet, à crassiore pertinaciorēque bile, quam qualis sit, color arguit, hoc euenire, satis comprobant, sicuti & in termintho & epinyctide, pustulas illas summè vrentes, cum inflammatione & subsequente suppuratione, à deteriore quoque humore, eodem modo, vt de cæteris dictum, sed in vnam tantum sedem, siue vno seu pluribus in locis hoc fiat, influxo, prodiiisse arguunt. Maximè verò in Carbunculo pustulæ summè vrentes, bilem feruentissimam, causam illius fuisse, & inflammatio iuncta, sanguinē, quem & febris comes impellere potuit, quoq; accessisse, & quod subito oritur, ab influxu prodiiisse, declarant. Quam bilem atram extitisse, ex illa-

rum nigredine, non adeo colligere licet, cum & in aliis pustulæ liuidæ aut crustæ nigrae, quando arescunt, sic colorari solitæ, sæpe nascantur, sicuti verò ex summo illarum feruore, qui cutem carnemque adurendo, corrumpit & denigrat, nec suppurari finit, vel hanc bilem, vel aliam æruginosam, illarum causam fuisse apparet.

Quod diuersa ratione in Herpete accideret, illiusque pustulas non ab influxu humoris, sed collectione illic factâ fieri, quod sensim & citra inflammationem nascantur, conuincit; atque ardor immensus, & quod hæc pustulæ siccae sint, prouenisse ostendit, flauamque hanc, & ob id mitiorem tenuioremque fuisse, & ad extimam cutem usque transcendisse, si Miliaris dictus herpes sit: deteriore verò, qualis viridis & æruginosa est, esse, altiusque in cute & carne impactâ, si Esthiomenus sit herpes: cuius malitiam, & quod continuò exedendo vicinâ carnem, ulterius semper serpat, comprobatur; & quod nonnunquam, etsi serpere cesset, portione tamen illius relicta, Impetiginem gignat, eamque post se relinquat.

In scabiei siccae etiam eâ specie, quæ Prurigo dicitur, cum nullus maior deprehendatur, sinceram quoque bilem, sed tenuiorem quam in miliari, vel falsum alium humorem admodum siccantem cutem summam, quæ ob continuam frictionem rubet, arrodere & vellicare, patet: Et in Impetiginæ similis humorem illic congestum, vel post herpetem, ut dictum, relictum, altius se inferentem, latiusque dispersum, pustulas in ea gignere, ampliusque cutem rodere. Qualem & humorem deteriore adhuc magis, ob morâ, non curatâ impetigine, factum, & Pforam gignere, in qua adhuc hæc amplius afficiunt, tum ex eo, tum quod ex impetigine, ut dictum, prodeat, licet colligere. Quam pforam tamen etiam à sero non solum falso, sed & perniciem aliquam aliam habente, cutemque continuò rodente proficisci, indeque originem suam sumere posse, continui sudores, qui eos infestant, demonstrant, qui tamen in halitus conuersi, & euanescentes, cutem non madidam, sed aridam potius reddunt. Quæ pernicies etiam huic humori qui pforâ

gignit, ex cutis temperamento vitiatum, ob pforam diu perseverantem, sæpeque repetentem, potest accidere aliaque simul accedere, si deprauatâ tunc ipsius assimilatione, nutrimentum proprium, in prauos hosc humores vnâ conuertat, tuncque pfora deterrima, quæ Lepra Græcorum est, succedit, quæ curari amplius, ut nec lepra Arabum, seu elephantiasis, ob deprauatam in ea quoque assimilationem, alias noxas producentem, minime potest, & ob id pro eâ, ut dictum, sæpe sumitur.

Cæterum quod Phlyctenas attinet, à sero sub cuticulam delato, retentoque, atque eam à vera cute diuellente & implente, & in vesiculam eleuante, proficisci, cum integre sunt, & ruptæ serum effundunt, conspicuum euadit. Quod serum si purum sit, dum integre sunt, dolorem nullum infert, sed tunc primum dolor in illis lancinans oritur, cum illis disruptis, cute denudatâ, quæ tunc contactum non nisi moleste fert, tangitur, aut cuticula scissa, illi incumbens, eam sic offendit. Quod si verò serum in illis falsum esse, ex pruritu cognoscitur, aut alioquin bile perfusum, ex flauitie apparet, tunc etiam antequam aperiantur, ob humoris acrimoniam prurius, maioremque ardorem apertæ procreabunt, & si humorem hunc acrem diu exudent, serpunt: Ut & herpes Phlyctenodes, ut dictum, agit.

Eiusmodi autem humores biliosi, falsi & acres; qui scabiem herpes & carbunculus excitant, ex cibo & potu suum habent principium: si talibus frequenter vel admodum vrantur, quæ materiam huiusmodi succo gignendo idoneam in se contineant, vel in eum corruptione degenerent, qualia in febribus & in aliis biliosis morbis descripta sunt. Ex illis enim congestâ hæc excrementa, si in prima vel secunda concoctione, à puriore sanguine minimè segreantur, sed vel diu prius in venis meseraicis latentia, deterioraque facta, vel statim venam cauam subeuntia, cum sanguine vel cum sero ad exteriora corporis delata, in superficiem illius subito influant, vel illie subsistentia sensim congerantur, eam quæ diximus in cute vitia excitat. Ob quam & causam, qui intemperanter viuunt, & qui cibo

669

cibo prauo vtuntur, & cacoethymici sunt, hisce sunt obnoxij malis. Licet & ob viscerum interiorum intemperiem, aut aliam malam dispositionem, talia excrementa coaceruari in corpore possint; vel à parentibus quoq; in liberos deriuari: quod & à sanguine menstruo materno euenire in multis, existimât. Cæterum quod ad cutem expurgentur, naturæ, quæ excrementa ad exteriora propellere solet, sit beneficio, tunc cum vel nimium redundant & turgent, adiuuantibus etiam aliis causis, quæ calore, motu aliòve modo eiusmodi humores commouent, vel eliciunt. Sicuti in tumoribus à sanguine profectis exposuimus.

Solutio continui, diuersa in superficie corporis dolorum genera parit, cum exulceratione sic in genere appellata, in excoriatione, fissuris, vulneribus, vlcerebus variarum specierum. Aliàs verò cum exulceratione vix dum manifesta, vel etiam non apparente foris: idq; pro causarum solutionem continui inducentium diuersitate; quæ nunc externæ, nunc internæ sunt.

Compressio, Distentio, Contusio causa Doloris inde procedentium.
Inter externas causas harum solutionum continui, primum occurrit compressio, distentio, aut contusio partis, quæ citra lésionem extrinsecus occurrentem, occultè continuū soluendo, fibris ab invicem intrinsecus aliquousque deductis, dolorem inferunt, quem Lancinantem aut Distendentem in generibus vocauimus. Qualis ab ictu, incumbente pòdere, vel pressione aliâ, aut torturâ, aliâve vi, vt tractu capillorum, sæpè accidit. Quo & refertur distentio illa à duris scissalis, in podicis angustis podicem indidentibus, vnde fissuræ illius Rhagades dictæ sunt.

Frictio, causa Cutis abrasionis & Scabiei.
Frictio aliâve attritio, cuticulam auferens, vel etiam de vera cute aliquid abradens, Intertriginem dictam parit. Quod à vi aliqua externa, partem aliquam admodum vel diutius fricante, frequenter euenit. Sæpè etiam equitantibus, in ephippio, lumbi aut clunes eo modo atteruntur, ex quo postea molestantiam inter equitandum & impedimentum sentiunt. Et in longis morbis ex decubitu, dorsum, lumbi, aliæve partes attritæ, ægrum mirabiliter fatigant. Imprimis pruritus impellens facit, vt propriis vel alie-

nis vnguibus, aliòve modo, cum hoc pacto sedetur, cutem illic vbi prurit dilanient. Quod quando maiori sit laniena, & per quam cutis magis læditur, exundet tunc sero, si humores præsertim, vt dictum, salii vel biliosi permixti sint, Scabies sequitur humida, eaque maior, si tubercula simul, vt ostensum, ob frictionem prodeant, illisque suppuratis, scabies augeatur.

Læsiões externæ, scitum, punctum, contusio, facta, causa eiusmodi Vulneris.
Sectio, Punctura, Ictus, Vulnera gignit scitum punctum contusum facta: Amputatio membri alicuius, illud aufert vel mutilat. Quæ omnia vulnera, cum suppurantur, in vlcera facessunt. Talia autem vulnera re acuta obrusave perficiuntur, vel casu, vel studio pœnæ nomine, vel instrumento, vel telo, vel sclopeto aut tormento, in conflictu quocunque, aut aliis sectionibus & puncturis, necessitatis causâ factis, in ablatione membri syderati, vel tumoris alicuius, vel sectione in hernia, in lapide vesicæ, punctura cataractæ, venæ sectione & similibus, vnde diuersa relinquuntur vulnera. Quæ aliquando malitiam aliquam simul nanciscuntur, si instrumentum, quo læsio facta est, infectum sit, aut per se noxium, vt ferrum propter rubiginem, vel si alio acutius, vt ferunt, inuncta sit, spherula sclopeti cum lardo eiaculetur, peiora inducit vulnera. Vel aliis artibus & venenis, gladius, spicula infecta sint, virulenta inde prodeunt vlcera, toti corpori noxia.

Erosio, causa cutis abrasionis.
Erosio ab externis, vt medicamentis aliisve facta, cutem quoque erodendo aufert & abradit, sicq; vlcera, interdum & inflammata. Quod ab vrina acri, coxarum interiorum regionem sæpè madefaciente atque irritante, in infantibus sæpè accidit, illicq; cutis abrasiones cum rubore facit.

Combustio, causa vlcis.
Vlcio cuticulam à vera cute separans, vesicam excitat, eaq; ruptâ, lésionem eam, quam cute abrasâ fieri diximus: vltèrius inusta, vlcus vltum vocatū parit, vel esccharam. Fit hæc similiter, nonnunquam calore solis, nudam corporis partem, eousque vrentis, vt vesicæ nascantur: vel olei aut aquæ feruentissimæ perfusione, vnde cutis penitus abscedit, inflammatur & in vlcera peruersa

definit. Vel ab igne, vñta cute casu, vel in cauterij actualis applicatione: vnde vesicæ, illisque ruptis vlcuscula, vel eschara, gignuntur. Quod & à medicamentis potentia vrentibus, vesicatoriis & cauteriis variis accidere potest: Inter quæ quædam septicâ simul vi, partem mortificando, citra dolorem escharam faciunt. Præter quæ, vrtica, vim suam adurentem, aculeis suis pungendo intromittens, mox primo contactu, ardorem, & postea vesicas excitat.

Morsus animalium vulnera inæqualia vel etiam profunda reddunt, quæ mox suppurata in vlcera abeunt: eaq; simul, ob saluam si inter mordendum vulnera subeat, cum semper aduersi aliquid alterius naturæ in se habeat, deteriora efficiuntur, vel etiam venenata, si ab eiusmodi animalibus morsus procedat. Veluti ex morsu hominis, ob illius quoque saluam noxia vulnera induci, cognitum est, ieiuni præsertim, fortè quia tunc salua minus aliis permixta, efficacius operatur. A morsu canis, vel aliorum animalium rabidorum, non solum vulnus infectum, sed & corpus reliquum, quàm horrida sequantur symptomata, in hydrophobia descriptum fuit. Sed & morsus, licet exigui sint, vix quæ conspicui, per quos tamen virus saluæ subintret, veluti mustelæ, muris aranei, vulnera peruersa gignunt, & si à vipera vel serpente, aliisque venenatis fiant, corpus veneno suo imbuunt læduntque.

Ictus animalium, quos aculeis suis aliòve modo infligunt, etsi vix dum apparentem continui solutionem faciant, tamen quia qualitatem adurentem, vel aliàs infestam partiectæ infundunt, dolorem maximum illic cum inflammatione & tumore pariunt. Veluti iectum ab apis & vespe aculeo corneo, in vulnere relicto, illud moliri videmus. Quæ si à noxiis adhuc magis procedent animalibus, vt scorpionis aculeo, vñco, & corneo quoque vñ apis, tunc & venenum illud per corpus dispersum, illud inficit. Sicuti & ab aliis muleis venenatis bestiis hoc similiter fieri, corporeque puncto, illud grauitè vel in vniuersum, aut certis in partibus lædi. Nicander & Dioscoridi docuerunt: quæ nos tanquam nostris regionibus minime infe-

sta, omittimus: Vt & innocuos illos promiscuum culicum & pulicum ictus, non aliter quàm tuberculo aut maculâ rubrâ & pruritu conspicuos aut nocuos.

Internæ causæ harum solutionum continui specierum, frequentius ab humoribus illis procedunt, qui dum tumores, tubercula & pustulas gignunt, simul etiam rodunt & exulcerant: vel intermedio saltem horum affectuum, quos pepererunt, cum in exulcerationes desinant, illis occasionem præbent. Sicuti hoc in horum affectuum causis ostensum fuit. Nimirum quo pacto pus ex suppuratione inflammationum genitum, abscessus producat, indeque vlcera purulenta sequantur, quæ & nonnunquam affluentibus aliis sordibus, sordidiora, vel humoribus vt sanguine, inflammata, vel aliis prauis, maligna, cacoëthe, vel accedente putredine, putrida fiunt: Deim & quomodo à perniciofa illâ & venenata materia, cancrum gignente, cancer quoque exulceratus, & ab ea quæ anthracem pestilentialem gignit, vñta illa & corrupta caro, illaque excussa, vlcus caurum sequantur: Et à biliosis, serosis, acribus humoribus, vnde carbunculus, herpes, scabiesque omnis generis producuntur, vlcera in carbunculo praua, in herpete exedentia, in scabie humida, vlcuscula purulenta, in sicca cutis erosiones, & fissuræ interdum nascantur: Et à fero, phlyctenas gignente, cutis abrasiones prodeant.

Sed & nullis prius tumoribus aut pustulis prægressis, cutis ab humore acrisalfo, siccanteque finditur, quando ille se in loca teneriora fungosâque, vt labia oris, podicis, pudendorum, aliàsve sedes ingerit, vnde scissuræ & Rhagades dictæ oriuntur, quæ propter locorum istorum exquisitum sensum, dolore vehementiori & ardore afficiunt.

A falso & prauo humore, inter crassam capitis cutem & caluariam congesto, diutiusque retento, putrescente, & illis circa radices capillorum impaeto, certisque in locis cutem perforante rodenteque scabiei illa species peruersa, quam Manantem, vulgò Tineam & Fauum nominant, generatur. In quo humore, pernitiem quandam malignam contineri, ex eo quod

quoddam contagiosum infantibus sit malum, licet conijcere.

*Humores, cau-
sam pre-
bentes
Pecorib.
excedens
tib. O. e
pasce
bus e
rice
116.*
Ab aliis quoque humoribus serosis, acribus & prauis, vlcera Exedentia, Depascetia, Phagedanica, nascuntur, fouenturque: quicū in inferiora cum sero continuo labantur, in cruribus frequentius proferunt. Qui etiam humores cum sanguine in venam aliquam vlceri vicinam delati, illic subsistentes, venamq; dilatantes, vlcus subinde alluendo, humectandoque & deprauando, non sinunt sanari; sicuti in vlcere Varicoso dicto accidit. Horum autem humorum origo eadem ferè, quæ illorum, vnde herpetes & scabies prodeunt, existit.

A malignis & contagiosis humoribus ex impuro congressu genitalium in infectionibus, vlcera in illis locis, vti & in virili glande & apertis prodeunt: & ab illis qui luem veneream & elephantiasin pepererunt, eandem quæ hostesius comitantur, exsurgunt vlcer: quorum humorum naturam, non ex effectu licet conijcere, & quod ex contagio corpora, vti cætera multa venena, subeant.

Curatio.

Solitariorum, in superficie corporis accidentium dolorum, molestiarumve, qui nullo alio charactere externo se manifestant, quales sunt, titillatio, pruritus, atque hi qui à frigore, calore procedunt, frigidi & calidi nominati dolores: item asperitas cutis, vel alia illius occulta læsio, curatio, cum grauius minimè afficiant, nec diu perseuerent, sed causâ sublata plerunque cessant, non est ardua. In iisque hac ratione procedendum.

*Titillatio
doloris
curatio.*
Titillatio si molesta sit, mox si illa omittatur, molestia quoq; definit. Si per vim & non nunquam torture nomine, cuius quoq; genus est, adhibeatur, intolerabilis cum sit, admodum offendit, debilitat, & conuulsiones quandoq; excitat: quibus tunc curatio debetur.

*Pruritus
curatio.*
Pruritus levis, in iis qui patienter eum ferre aliquandiu possunt, vel ad hoc, ne cutem fricando lanient, adiguntur, sponte cessat: si magis urgeat, frictione, quæ voluptatē tunc adfert, sedatur. Si perseueret, aut sepe repe-

tat, causaque sit externa, vt pediculi aliæve, his curatio, vt illic dicitur, debetur. Si interna ab humore aliquo procedens, quia comitem habet plerunque scabiem, vel pustulas, vel aliud vitium, quæ illum humorem sequuntur & comitantur, in illorum curatione etiam quo modo molestia hæc illis iuncta emendetur, explicabitur. Quodd si vero pruritus citra manifestum affectum alium, in certis locis molestus sit, & perseueret, euacuationes & balnea & affrictiones eadem, quæ in scabie pruritui etiam accommodatæ sunt, hic quoque inuabunt, indeque petenda; quæ & si obscena mulieris pruritus diuexet, intrinsecus in interiora horum immitti vel intrudî, aut illic inungi debent.

*Doloris
à frigore,
curatio.*
Frigus ab aëre, vento, aquâ, niuib. aliisve, si in exterioribus dolorem frigidum vocatum inducat, causaque summa non cesset, sensim per gradus caloris ascendendo, illud corrigere, membraque ad naturalem calorem reducere oportet, ne ex subitanea illa à summo frigore in calorem summum mutatione, periculum aliquod sequatur, vel si in manibus hoc fiat, nouus dolor, isque acerbissimus, quem Rûnegen vocat, suboritur. Fiet autem hoc si in locum calore temperato præditum, primum patiens se transferat: Vel alioquin egregie se exerceat, atque eundo, currendo, si pedes præsertim frigus passisint, vti quibus inter equitandum hoc contingit, facere solent, eos, vel brachia conquatiendo, piscatorum instar, manus refrigeratas calefaciant. Idem adhibitis perficitur pellibus, plumis, leuiter calefactis, partes fouendo, vel manus in capillos intrudendo, aut abluendo eas aquâ tepidâ, aliòve modo frigus mitigado. Quibus ita præmissis, dein primum calore foci, fornacis, vltèrius ad frigus penitus arcendum, transeundum erit. Quodd si quoque hisce factis, noxa aliqua, calore nativo debilitato relinquatur, foribus, balneis, inunctionibus, actu potentiaque calidis, aliisve, in stupore, paralyfi, expositis remediis, hic quoque calorem reuocabimus. Inter quæ oleum de Euphorbio, de Piperibus vtilia sunt, vel quod R. Pyrethri Piperis ana 3.ij. Euphorbij 3.j. olei Cheirini & Cerae q. s. cui olea stillantia Spica, Aromatum,

addipossunt, vel etiam Moschum, Ambra, Zibeta.

Oleum sem. Vrticæ, vel in quo vrtica cocta sit, peculiare refrigeratis membris censetur esse remedium. Idem quoque à frigore manus pedesq; præmunire, si eo inungantur, dicitur, vti & axungia Anferis.

*Doloris
à calore,
curatio.*

Calor à sole, balneo, motuque corporis, si dolorem, quem calidum vocauimus, inducat, & remotâ causâ nihilominus permaneat, blandè quoque emendari, nec subito corpus frigori exponi debet, cum hoc sine periculo non fiat, sicuti aliquos, qui in balneo, vel hypocausto, aut post choreas vehementius incaluerunt, statim se denudarunt, aut aërem frigidum admiserunt, vel in æstu summo caueas subterraneas sunt ingressi, ibi diutius herentes febribus correptos, defluxionibus periculosis molestatos, val apoplecticos factos, aliâve mala passos, sæpe obseruauimus. Itaque in vmbra, locumque temperatiorem potius, qui calore æstuant, antequam se frigori penitus committant, primum se conferant, vnde calor facillè restinguitur. Quod si perseverans calor inflammationem alicubi excitet, vel febrem synochum incendant, tunc hinc cura; vt illic expositum, accommodatur: Si in volis manuum & pedum calor quibusdam sæpe negotium facessat, cum ab interna causa hoc procedat, morbosque vel præfagiat, vel committetur, illis potius cura adhibetur.

*Doloris
à conta-
ctu rei
asperæ,
curatio.*

Asperitas aut durities callôsa cutis, si molestiam aliquam tactui, in contactu rerum adferat, illique qui teneriores manus habentes, delicatesiores sunt, leuè hoc incommodum quoq; cupiunt declinare: tunc molliantibus & humectantibus adhibitis, hoc quoque emendatur, quæ cum ad cosmetica pertineant, in deformationibus describentur. Vti & si fissuras excitet, quo pacto illæ sanandæ in exulcerationibus aliis simul explicabitur.

*Doloris
à com-
pressione
& disten-
sione, cu-
ratio.*

Læsio alia cutis, quæ premendo, distendendo, citra apertam continui solutionem perficitur, si dolorem gignat, ille, vi illâ cessante, quoq; desinit, si tumor aut inflammatio metuantur, quo pacto præcauendum sit, in phlegmone dictum fuit.

Comitatorum affectu alio no patente, dolorum in superficie e ratio, alia Erysipelati, alia Phlegmonis. Tumoribus ex contusione: Vnde in glandosis, ve partibus; sine & inflammatione natis: alia Abscessibus omnium dictarum inflammationum: alia peculiari ab his omnibus, Cancro: alia pustulis, vt Anthraci, Herpeti, Scabiei: alia Exulcerationibus: alia partis corruptionibus: vt Gangrænæ & Cariei ossium, accommodatur.

Erysipelas si sine febre à causa externa oriatur, vel si saltem leuis accedat, tunc solius erysipelati habetur ratio. Quod si verò febrem synochum sequatur, febris primum prospicienda, quod quâ ratione tractari debeat, in febribus expositum. Primum, quo pacto in illis quos hic affectus Caruncel dictus sæpe inuadit, & præsertim si multoties repetitus, tandem exitiosus iam illis euadat in senibus, præcaueri debeat. Dein & quomodo ratione febris, cum ægrum torripit, tractari debeat, in sudorum prouocando, & sanguinis detractione, alui lenitione, a tione febrilis caloris, reliquisque accidentibus, explicatum fuit.

*Erysip-
latis
latissimæ
curatio*

Cæterum quod erysipelas solum attinet, quando illud efflorescit, nec ardore vehementi molestum est, non opus erit admodum refrigerantibus illud alterare, sed aliquin, vt mox dissipetur, diligenter muniendo illud à frigore arcere, & leuioribus tantum, ad illud resoluendum, vtendum est. Quod fit si panno lineo, vel cannabino, quod vtilius censent, pars rubens inuoluatur: eligendo eum, qui vsu mollior sit redditus, ne primum lotus, rigiditate sua partem irriter: existimantque si vinctuosus sit, tanto magis prodesse.

Vel si panno Croci colore bene tincto, & croceo facto, rursumq; siccato pars affecta obvoluatur. Aut alius succo Chermes rubeus factus, sericeus Chermesinus, vel laneus, Scarlatus vocatus: Quod ad resoluendum & simul partem roborandam vtile esse censent.

Idem perfumando membrum præstatur, Mastiche, Thure, Succino, &c. vstis: vel lignis Iuniperi, Santali accensis, fumum exci-

crus remanferit, illis quæ in œdemate explicantur, absumpto humore emendatur: si in vlcus conuertatur, aut gangrænæ adfit principium, vti illis in casibus ostendetur, tractari debet.

Phlegmonum seu Inflammationum specierum curatio. Phlegmone seu Inflammatio cum tot diuersa sub se comprehendat genera, nos curationem illis, quæ in curatione non tanto pere discrepant, simul accommodabimus: Veluti ex illis quæ passim in cute prodeunt, vt Phlegmoni simpliciter dictæ, vel erysipelatodi, vel œdematodi, quas vt vt sint, Germani Geschwulst vocant, Tuberculis item quæ Germani Eysen / & Bluteysen nominant, & Furunculis dictis: Atque paruis illis Tuberculis seu pustulis, quæ in vlcuscula parua & scabiem desinunt: Dein & aliis inflammationibus certarum partium; vt fungosarum, Penis glandis & præputij, Mammillarum papillarum, Pudendi mulieris colliculorum & alarum, Podicis & Oris labiorum, & cartilaginotarum, Narium alarum, Aurium vanni: Item illis quæ in iuncturis residunt, & priuatim huic quæ in extremo digitorum sit, & Paronychiam nominant, & alterius quæ Grippelen dicitur: Singulis interim sua quoque remedia, si quæ peculiari-ter, debentur, in horum enarratione attribuendo. De tumoribus & inflammationibus glandularum & glandosarum partium, post hæc acturi: Vti de abscessu qui ex tumoribus omnibus iam dictis nasci potest.

Cæterum ex enarratis phlegmonum speciebus, deteriores sunt magnæ, & quæ dolorem maximum inferunt, & quæ partes nobiliores occupant, vel illis vicinæ sunt, vt in facie, sensuum organis, vel partibus admodum sensibilibus, vt podicis, penis, pudendi mulieris, inflammationes, vel iuncturarum regionem obsident, vti & illæ quæ in digitorum oriuntur internodijs. Ex quibus multæ, veluti in generibus horum singulis ostensum fuit, in abscessum abeuntes, indeque in vlcus, hoc pacto curam protrahunt, & partibus nobilioribus officiant: aliæ si non recte gubernentur, quia in gangrænâ interdum abeunt, eam noxam inferunt, vnde partis sequitur corruptio & amissio sæpè & mors. Aliæ in scirrhum conuersæ, sic molestæ post-

ea sunt, vnde articulorum flexura aliquando sistitur vel impeditur.

In horum omnium curatione, inter generalia præsidia locum habet præcipuè sanguinis detractio per venam sectam, si plethora adfit, ad illius imminutionem, in omnibus illius speciebus, si nihil impediat, tum ad præcautionem in dispositis, tum ad curationem, quæ melius tunc succedit. Dein & si ob influxum vehementem sanguinis magna metuatur inflammatio, statim ab initio venâ distentiore apertâ, eum reuellendo, vel etiam è vicina sanguinem eliciendo, simulque deriuando, sistimus. Et si febris phlegmoni iungatur, eo nomine quoque prodesse potest.

Scarificatione, Cucurbitulis, Ligaturis, Frictionibus similiter influentem sanguinem reuellendo deriuandoq; compescimus. Et si menses vel hæmorrhoides decenter fluant, ad plethoram tollendam, & aliquo modo diuertendum, vtile erit.

Deiectiones molimur per aluum, si cacochymicum sit corpus, præcautionis potissimum gratiam, si hisce inflammationibus quæ in impuris hisce corporibus à sanguine impuro dependent, obnoxij sint: tum etiam in cura illorum rectius proceditur, si corpora prius pura & munda reddantur. Sed & quævis alui lenitio per assumpta aut iniecta, vel supposita, reuellendo nonnihil impetum fluentis sanguinis sistit. Quæ tamen omnia non fortia sed leuiora potius esse debent, ne nimium corpus exagitent aut accendant; qualia passim describuntur.

Alteramus corpus, ratione phlegmonis, febrisque interdum comitis supercalescenti, actu potentiaque id præstantibus, in cibis & medicamentis, quibus & sanguinis feruor impetusque refrænatur. Quorum formæ in febribus hinc inde descriptæ sunt.

Topica verò remedia in omnibus eiusmodi inflammationibus, hoc pacto ad singula diriguntur: Primum vt sanguinem fluentem à parte affecta repellamus, caloremque restinguamus, dolorem si admodum vrgeat, sedemus: dein materiam affluxam resoluamus. Quod si verò ad suppurationem tendat, tunc vt abscessum, eoque

rupto, vt. vlcus; quemadmodum in illis explicabitur, curabimus: Materiam eligendo horum medicamentorum applicandorum, & formas, quæ hisce inflammationibus diuersis, prout vel magnæ vel parvæ sunt, vel hanc illamve partem occupant, sicuti in illis ostenderetur, conueniant.

Repellimus humorem influentem stipticis nonnihil, & frigidis, quæ calorem simul contemperant; eligendo quæ validius id præstant, si magnus adsit feruor, in phlegmone quacunque, inprimisque in furunculo, cum præ cæteris æstuet; & si magnus influxus, indeque nata inflammatio insignis, quæ parti nobiliori obesse possit, vt in facie vel circa iuncturas metuatur. In reliquis moderatius repercutientibus utimur, minusque adhuc id agentibus, si circa fauces aut pectus oborta inflammatio, horum validiore vsu periculum sit, ne ad interiora propulsa materia, anginam vel pleuritidem inducat. Quibus repellentibus, cum defluxio remittere incipit, sensim resolutentia iungimus, atque anodyna quoque, si dolor exigat, intermiscemus. Quæ omnia sequentibus perficiuntur.

Actu refrigerantia vulgus adhibere solet, si obiectum, aut talem partem meruatur inflammatio, præcautionis gratiâ, ne intumescat: eoque nomine frigida, vt Lapidem, Ferrum, Plumbum, vel etiam Glaciem, subito parti læsæ apprimunt; vel Aquâ frigidissimâ locum affectum perfundunt aut fouent. Quod in aliis causis, vti & in iam facta inflammatione, non temerè summè frigidis est moliendum, cum sanguinem congelando, illius discussionem impediunt.

In paronychia etiam immersionem digiti, in principio statim in aquam frigidam aliqui laudant: alij in Acetum calefactum potius quam frigidum hoc fieri volunt.

Aliæ quæ potentiâ repellunt applicationes, eoque magis si actu quoque frigida sint, ex herbis recentibus fiunt: vt Plantagine, Semperuino, Solano, Polygono, aliisque in erysipellate enarratis, & vt illic ostensum, præparatis. Quibus & addi potest Aceti portio, vel oleum Rosaceum, Myrtillorum, Cydoniorum, interdum & Farina hordei subigi.

Glandes recentes tulsæ appositæ, & Tribuli fructus commendantur.

Furures Aceto irrorati, vel in eo frixi apponuntur communiter. Item Oryzæ farin. cum Aqua frigida apposita & sæpe iterata.

Rosarum rubrarum placenta, post exstillatam aquam in fundo cucurbitæ remanens, in Vino rubro, addito simul Aceto cocta, chirurgorum in hoc casu est remedium: cuius placentæ loco, Rosæ sumi possunt, sicque præparari.

Alia applicatio repellens: R. succorum prædictarum herbarum ad ʒ. vj. Aceti rosac. Vini acidi vel rubri austeri ad ʒ. iij. olei rosac. vel Myrtillorum aut Ligustri ʒ. j. ʒ. agitentur in mortario plumbeo, adde pulueris cortic. Granatorum rad. Bistortæ an. ʒ. j. semin. Myrtillorum vel Berberis vel florum Labruscæ ʒ. j. Boli ʒ. iij. fiat Inunctio: Bolo subacto cum Aceto & Albumine oui, vel additâ farin. Hordei inspissetur, pro Cataplasmate.

Defensiuum dictum, quod ab inflammatione defendat, vsitatum, fit ex Bolo puluerisato subacto, si applicari, vel diluto si inungi debet, cum Aceto rubro vel Rosaceo, & Albumine oui conuassato addito plerumque etiam oleo Rosaceo. Compositum magis fit Sanguine draconis, Lapide hæmatit. Fortius si Scoriâ etiam ferri admisceatur. Aliquando & Terra alia, ob puritatem sigillata additur: Coralli item & Camphora.

Vel sic repellendum cum dolor infestat: Lacti vaccino, Aceti rubri pars quarta additur, & Vitelli ouorum Bolus item, albam sumendo, si partem minus rubere velimus, & vti prius vsurpatur.

Irrigationes vel fatus, frigida actu, vel vntiones ex Aqua & Aceto, vel Oxyrhodino, vt in erysipellate dictum, actu & potentiâ agentia, hæc quoque competunt.

Quod & succis prædictarum herbarum, illarumque decoctis & aquis stillatitiis fieri potest. Quibus & pulueres prædicti addi possent.

Fit & embrochia ex ol. Rosaceo maxime omphacino, vel Viol. supra partem nudam, vel fasciâ prius inuolutam, si ex casu ab alto dolor sentiatur.

Balneum digiti in decocto Pentaphyli, Absynthij, Agrimonie, Fragarie, Myrti granorum, facto in Vino, in Paronychia priuatim conuenit.

Illicio repellens: R. succi Plantaginis, Semperuiui vel alterius plantæ repellentis ad ʒ.ij. Aceti ʒ.ij. olei Rosacei omphacini ʒ.ij. ʒ. ʒ. Soli albæ vel rubræ ʒ. ʒ. Albumin. oui numero j. Terebinthinæ parum, agitentur vt fiat instar Nutriti: cui in progressu vt partim digeratur, Cerusa, Cadmia fossilis, Lithargyrium addi possunt.

Vel: R. succ. Granatorum acetosorum ʒ.ij. Solani, Aquæ Rosaceæ ana ʒ.ij. ʒ. Camphoræ ʒ. j. misce Vngatur locus; cui & farina Hordei, vt melius hæreat, addi potest. Hoc in narium inflammationibus peculiariter etiam probatur.

Vnguentum vsitatum Rosaceum, Populeon, & de Cerusa, aliaque in erysipellate descripta, hic quoque competunt, vti & Plumbelamina tenuissima apposita.

Dolorem quæ præcipuè sedare possunt, cum ille vrget, vt in vehementibus inflammationibus, & partium præcipuè exquisitè sentientiu adhibentur: veluti anodyna, calore temperato mulcètia, vel narcotica, sensum nonnihil obtundentia: è quibus cum illa simul maturent, si suppurationem metuamus, non nisi necessitate urgente, solay surpari debent, sed ab initio repellentibus, in progressu resoluentibus permista adhiberi: narcotica verò, cum insuper digerant, sicuti alibi ostendimus, quod maximè cupimus, cum duplici nomine profint, non tantopere ipsorum vsus, vti alias fit, extimescere oportet.

Hæc autem tam narcotica quam anodyna, in erysipellate exposita, hic quoque locum habent apposita. Quibus & sequentia addi possunt, Cochleæ crudæ ex testis extractæ potius quam cum testis vt docent, ne contrita ob asperitatem cum ægrè comminuantur, lædant.

Hyo-sciami folia vel Mandragoræ cruda, vel sub cineribus calidis parum excocta, cū adipe Porci contrusa, addito interdum & Croco.

Vel vtimur hoc cataplasmate: R. Panis

puri, vel Farinæ alicuius lb. j. coquatur vel maceretur in aqua, cui & alia aqua stillataria addi potest; vel in Lacte addendo mucilag. feminis Psyllij vel alterius ʒ.ij. Albuminis & Vitellorum ouorum numero iij. oleum Rosaceum vel aliud ad ʒ. iij. axungie Porci vel Pomadæ ʒ. j. Croci ʒ. j. misce Applicetur.

In paronychia hoc est peculiare: Panis mica cocta in Lacte, cum Oui albumine, & Terebinthinæ paucò miscetur: quod dolorem compescit, maximè si Psyllij mucago addatur. Quæ mucago in eodem affectu & cū aliis farinis, vt Hordei apponi potest. Quibus urgente dolore, Opium permiscetur & Camphora, postea ad sanationem, puluis Gallarum.

Vel ex herbis fit Cataplasma pro phlegmone quauis: R. herbarum Emolliciuarum M. ij. rad. Althææ ʒ.ij. flor. Chamomil. Melilot. Rosarum Furfuris an. p. j. coquantur, contundantur, addæ Olea, Butyrum, Axung. Crocum fiat Cataplasma.

Aut Psyllium vel semen ipsius contusum cum oleo Rosac. & paucò Aceto mistum apponitur, vel coquitur in Lacte semini. Psyllij cum radic. Althææ, addendo vnctuosâ.

Vel mucago Psyllij aut alia sumitur cum Albumine Oui, addendo succos, olea axun. vel Pomadam: Vt fiat illitio: vel alia applicatio cum lana succida.

Emplastrum diachylon paruum Mesuæi ex mucilagine seminum, vti psyllij & hyosciami, dolorem admodum lenit, atque interim maturat vel digerit.

Oleum ex maceratione pomorum maturorum Strichnodendri, & fructus Balsaminæ, Momordicam vocant, illitum, expertum remedium, sicuti & oleum à semine Hyosciami expressum.

Inunctio vel applicatio simplex, ex Ouo crudo conuassato cum olei Rosac. à chirurgis fit, addito interdum Bolo ad repellendum.

Vel cum digerere simul volumus, ex Vitel. oui & ros. addita cerusa vel Pompholige.

Vnguentum Anodynum appellatum ex oleo liliorum, anethino, chamomelino pingued. anacis & gallinæ vsitatum est.

Vel hoc: ꝛ. succi Hyosciami vulgar. vel Cicutæ, vel fol. Papauer. Maluæ vel Altheæ, an. ʒ. ij. olei Amygdal. dulc. Rosacei an. ʒ. ij. coquantur, addendo mucilag. Altheæ vel alias ad ʒ. ij. inter quas & ex semine Hyosciami factas probant, Butyri ʒ. j. fiat Vnguentum.

Aquam spermatis seu fœturæ ranarum valde cōmendant ad motam: Vti & succum Cicutæ in panno applicatum; item Cancros crudos.

Resoluimus seu absumimus aut discutimus, vt vocant, humorem illum qui iam influxit, ne diutius retentus in pus conuertatur, vel putrescat. Quod etsi natura per se efficiat, sanguinisque influxi portio nondum alterata aliqua in nutrimentum absumi possit, aliqua etiam, tenuior præsertim, sponte digeri sicque euanescere, tamen si segius illud natura agat, adhibitis remediis resoluentibus eam iuuamus, quæ in augmenti principio repellentibus permixta, siccando potius, quàm calore suo id præstant; mox verò sola vsurpata, eoque citius si phlegmone sit cedematodes, maximeque versus declinationem, cùm ardor remittit, calidioribus nonnihil, illius reliquias discutiendo, addendo emollientia quædam si scirrhus metuatur.

Hæc autem perficiuntur herbis etiam illis, quibus in erysipellate vtimur: Et imprimis Parietariâ, Maluâ, Altheâ, Attriplice, Brassicâ, Morfu gallinæ, Tussilagine, Verbenacâ, Verbasco, Scarleâ, Cōuoluulo, Sambuco, Ebulo, Pulegio, Parthenio, Achilleâ, Absynthio, Sesamo, Vrticâ; radicibus Liliorum, Iridis, Bryoniæ, Cucumeris, sylvestris, Asphodeli, Xyridis, Lapatij, Rhapontici, Cannabis sylvestris; floribus Chamomillæ, Meliloti, Liliorum, Anethi, Sambuci; seminibus Lini, Fœnogræci, Tritici, Hordei, Lupinorum, Orobi, Milij, Panici.

E quibus, ex herbis recentibus vnâ, vt Parietariam, vel duas vt hanc & Scabiosam, pluresve alias fumendo, crudas coctasque contusas applicamus: vel etiam folia harum sola, absæctis venis protuberantibus, parum conquassata, parti imponimus.

Paronychia herba, quia inflammationi-

bus circa radices vnguium genitis, quas paronychias vocant, medetur, nomen inde accepit. Cui malo etiam Pentaphylum adhibitur & Dentis leonis herbæ caulis lacteus, inuersus digitoque obuolutus: vti & membrana Ovi testam succingens, singularia sunt remedia.

Succis expressis ex plantis recentibus, phlegmone interdum quæcunque fouetur vel illinitur; vti & decoctis harum aut aquis: inter quas aqua Tapsi barbari imprimis cōmendatur, & cæterarum quarundam plantarum aquæ vsurpari possunt, additâ interdum aquâ quoque Rosæ.

Aqua vini seu vitæ, ad eò resoluit, vt si membrum læsum eâ subito perungatur, tumorem & inflammationem sæpè cohibeat, accedente insuper vi illius narcoticâ, quæ dolorem simul compescit: quo remedio operarij si quando se lædunt, vti consueuerunt.

Vini faciem illitam in omnibus inflammationibus commendat Dioscorides, quam ego non tam resoluendo, quàm & narcosi sua simul dolorem sedando, vt de aqua vini dictum, prodesse existimo.

Olea prædictarum quarundam plantarum, idem inuncta præstant, præsertimque in vsu sunt Chamomill. Liliorum, Irinum, Amygdalarum dulcium; addito etiam oleo Rosaceo: Item Axungia aliquæ, & Oesypum, & Propolis.

Composita ex his diuersimodè vsurpantur: Applicationes ex plantis supradictis, contusis, decoctis, addendo Acetum ab initio, mox Vinum, Mel, Oleum, Adipes, Terebinthin. & ex farinis supradictis aliquas, vel Polentam.

Vua passa admota prodest, vti & in furunculis additis cæteris, vel etiam Sale.

Triticum mansum impositum, vel illius farina cum Hydræleo subacta, aut fermentum ipsius, in furunculis iuuat.

Rosarum placenta post destillationem relicta, cùm resoluendum simul est, in Lixiuio coquitur, addito ol. Chamomel. vel Anethino, & sic applicatur.

Apij folia trita, & Morfus gallinæ, sola, vel cum Tartaro & oleo Chamomelino, competunt.

Cataplasmata ex plantis vſitatis, quibus & alia plantæ addi poſſunt paratur: R. rad. Altheæ, Lapatij, ad ʒ. iij. Liliorum ʒ. ij. Parietariæ, Verbenæ, Tuſſilaginis an. M. j. Parthenij, Abſynthij ad M. ʒ. fl. Chamom. Roſarum an. P. j. farinæ Hordei, Fœnogr. ad quartarium j. Ficum paria quinque, coquantur in Aqua, contundantur, addendo olei Roſacei, Chamomill. an. ʒ. ij. Axungia gallinæ ʒ. j. ʒ. fiat Cataplaſma.

Vel ex farinis: R. Furfuris vel Farinæ, vel panis Triticej tʒ. j. farinæ Cicerum vel Lupinorum ʒ. ij. macerentur in Aqua muſſa, vel alia, addendo Mel vel Sapam, coquantur parum, adde radic. Ireos pulueriſatæ, Roſarum rubr. ana ʒ. ij. ſeminum Myrtillorum ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. olei Roſacei, Chamomel. an. ʒ. j. ʒ. fiat Cataplaſma.

Magis digerens in declinatione: R. radic. Liliorum ʒ. iij. radic. Ireos vel Bryoniae ʒ. ij. herbarum Maluæ, Verbaſci, Conuoluuli, Ebuli, ana M. j. florum Chamom. Sambuci, vel Meliloti, Anthos ana M. ʒ. farin. Lupinorum vel Orobi, Fœnogræci ana ʒ. ij. Palmularum numero vj. coquantur in Aqua muſſa, contundantur, addendo olei Liliorum vel Irini ana ʒ. j. ʒ. Roſarum ʒ. j. axungia Porci ʒ. j. ʒ. Oeſypi ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. fiat Cataplaſma.

Ex ſuccis tale componi poteſt: R. ſuccorum Parietariæ, Tuſſilaginis, Plantaginis an. ʒ. ij. Mucilaginis ſeminis Altheæ vel Maluæ, Fœnogræci vel Lini, vel Albumin. oui ad ʒ. iij. Mellis ʒ. j. olei Roſacei ʒ. ij. miſce: Illinantur, vel farinis inſpiſſata applicentur, aut cum lana ſuccida, quibus & alia addi poſſunt, vt Lythargyriū, Ceruſa, Crocum, &c. Item cineres Buccinarum, quæ & ſolæ cum Melle inunctæ probantur.

Aliud: R. ſtercoris Vaccini tʒ. ʒ. ſucci Semperuiui, vel Solani ʒ. ij. olei Chamomel. & Roſacei an. ʒ. j. Boli armen. ʒ. ʒ. Inungant, vel additâ farinâ aliqua ex ſupradictis incorporetur, vt applicari poſſit.

Vel Olibanum pulueriſatum cum farina Fœnogræci, Reſina & Melle, excipiat: Et applicetur.

Inunctiones hæ in ſurunculis præſertim commendantur, factæ ex Scammonea, cum

Melle & Oleo ſubactâ, vel ex ſucco Thapſiæ, aut liquore radicis Mori, eodem modo permixtis.

Vel ex Sandaraca cum Adipe: vel terra Cimolia cum Aceto, aut lap. Aſio cum Pice & Reſina vñctioes aut emplaſtra, vt hæc docet Dioſcorides.

Terram Cimoliam, Samiam: lapides, Pyritem, Oſtracitem, Alabaſtitem, Geodem, probat Dioſcor. vt & Cotis fricaturam, quæ dum ferrum acuitur, abſcedit, vtilem cenſent, cum aliis permiſta, vel ſola etiam cum melle aliisve inuncta.

Eboris ſcobem inſperſam in paronychia probat Dioſc.

Vrina, Lixiuum, per ſe vel addito Album. oui aliisve ſuccis competunt.

Infuſio vel decoctum Lithargyrii in Aceto, addito Albumine oui, interdū & Ceruſâ, probatur.

Vnguenta ſupraſcripta in eryſipelate ex Ceruſa, Lithargyrio, hic quoq; locū habent.

Emplaſtrum Diachylon magnū vel ireatum. Item Diapalma ſeu Diachalcytheos dictum. Vel Colcotar ſeu ex Chalcitide Aui-cennæ, cum digerere oportet, in vſu ſunt. Vti & Triapharmacum Meſuæi, vnguentum, de Lithargyrio dictum.

Inter amuleta Leontopodij radicem ſuſpenſam, ſurunculos curare, docet Dioſcor.

Tumor ex contuſione, ſine vulnere manifeſto aut magno (nam de vulnere contuſo in vulneribus agemus, vt & ſi per contuſionem aliquid frangatur intrinſecus) ſi leuiſit, vel ſponte, vel diſcutientibus adhibitis iterum reſidet, liuiditasque tandem euaneſcit. Quod ſi verò maior ſit, inflammatioque metuat, vel illa ſuperueniat, primū repellentibus, mox diſcutientibus remediis, non eodem penitus, vt in phlegmone, ſed propter contuſam carnem & ſanguinem qui coagulatur, nonnihil variante modo, in curatione procedimus: Et ſi diſcuti nequeat, ſed ſuppuratio ſequatur, tunc maturantibus, vt in abſceſſu dicitur, eam promouemus, & quando in vlcus conuertitur, vt vlcus curamus.

Ad influxū autem ſanguinis mox à principio arcendum, præmiſſâ, ſi opus ſit, venæ

sectione, aliisque quæ illum reuellant, vt in phlegmone dictum, Repellentia quæ adhibentur, si caro subiecta admodum confusa, sanguinem copiosum contineat, non adeo in alia phlegmone refrigerare tantopereque adstringere, vel illa in ambitu potius loci contusi, quàm supra illum collocari debent, ne sanguis horum causâ coagulatus retentusque putrescat. Et proin quæ loco affecto adhibentur, & vim repellendi discutiendiq; nonnihil simul habere debent: qualia in progressu inflammationum vsurpari solent, illicque describuntur. Vsitatumque admodum est ad hoc præstandum, oleo Rosaceo, Myrtillorum cum Albumine oui, vel mucilage Pſyllij, aliôve agitato, locum contusum illinere, pulueresque adstringentes & siccantes, vt Myrtillorum, florum Rosarum, flor. Granatorum, rad. Bistortæ, Tormentillæ, Sanguinis draconis, Mastichæ, Boli, &c. inspergere.

Vel sic, si pars admodum vti & caput percussum fuerit. R. Lentium ʒ.ij. feminis Myrtill. Balauft. an. ʒ.ij. flor. Ros. fol. Sumach. & Tamaricis, an. ʒ. j. Acaciæ, Mastichæ an. ʒ.ij. Thuris, Aloës, Sanguinis draconis an. ʒ. j. o. lei Rosac. Terebinthin. & Cerae q. s. pro Emplastro vel Linimento.

Quibus in inflammatione præmissis, vel etiam omisis, si nulla timeatur inflammatio, ad discutiencia sanguinem affluxum, vel illic coagulatum mox accedemus; illisq; etiam nullo tumore vel inditio ex contusione apparente, sed dolore tantum punctorio vel lancinante ex contusione in parte aliqua urgente, cum in profundo magis materiam latere tunc cognoscamus, vtimur: Propinatis simul potionibus quibusdam, si de ruptura aliqua intrinsecus, & præsertim de sanguine affatim fluente in cavitates corporis, vel etiam ad locum contusum, & de illius coagulatione suspicio sit. Quæ & solæ potiones citra externorum remediorum vsum, si dolor ex contusione vel casu natus, nullo apparente foris inditio, vel leui, vti dictum, oriatur, ad curationem, tunc, si bibantur frequenter, sufficiunt. Quarum descriptiones, cum & si contusione vulnus infligatur, ad vulnus quoq; hoc sanandum, vti cæteræ vulnerariæ

potiones opitulentur, vnâ cum reliquis eiusmodi potionibus proponemus. Cæterum quod externa discutiencia remedia attinet, sequentia in primis vsurpantur.

Cataplasmata seu emplastra, fiunt ex Absynthio, floribus Chamomill. vel Meliloti, Rosi, in Oleo & Vino coctis, addendo bene contusis farinam Fabaceam, interdum & Mumia, Sanguinis draconis an. ʒ. j. ad tb. j. emplastri.

Si caput contusum sit, Betonica aliæve capiti appropriata addi possunt, non tamen nimis calida, si dolor inflammationem præfagiat.

Absynthij puluis cum Albumine oui subactus, profuit in multis.

Furfur cum puluere Absynthij & Aceto coctum, appositum: addito interdum oleo Rosaceo, & Chamomelino.

Liliorum radix & Dracunculi, cum Melle confusa, addito Stercore caprino.

Farina fabarum cocta cum Oxymelite, cui si nerui simul confusi sint, Pix liquida additur: Poteſt & farina Orobi addi.

Cochlearum caro cum farina sem. Fœnogræc. vel Fabarum, confusa.

Stercus bubulum applicatur, addito interdum Oleo Rosaceo.

Excellens in contusionibus, liuiditates quoque tollens; cataplasma, fit ex rad. Symplicis maior, puluerisata, decocta in Hydromellite, addendo ad tb. j. succi Rutæ & Absynthij ana ʒ. j. ʒ. sem. Cimini ʒ. ij. misce.

Vel: R. radic. Consolid. puluerisat. tb. j. puluerum flor. Chamomill. Meliloti, Absynthij an. ʒ. j. farinæ Fabarum & Fœnogræci an. ʒ. ij. Buryri, vel Oleorum prædictorum ʒ. ij. Croci ʒ. ʒ. fiat Cataplasma: cui & succi, & Cimini etiam addi possunt; admodum resoluit carnem ex contusione contritam seu mortificatam, vt vocant.

Inunctiones ex oleis calidis discutienciis, vt Chamomelino, Anethino, Liliorum, Sambucino, Ebulino, vel simul repellentibus vt Myrtillorum, fiunt.

Vel: R. axungia Caponis vel Gallinæ, Terebinth. dissol. in Melle & Aqua vitæ: Et inungatur.

Vnguento Anseris in podagra descritto,

695

pto, si Cimini & Absynthij pulueris portunculæ addatur, in contusionibus etiam conuenit.

Vnguentum dialtheæ per se inunctum vel addito oleo Violaceo, Lumbricorum, Rutaceo, Chamomelino, pinguedine, Anseris, Butyro, additâ aliquando Mumia; efficacissimum erit, si inunctioni sem. Cimini inspergatur.

Vnguentum de Alabastro, Agrippæ, de Cerussa, Oxycroceam in usu sunt.

Lixiuum ex cinere sarmentitio Vitium vel Vinaciorum cum Aceto, Sale & Melle prodest.

Probatur & cinis Vinaciorum cum Aceto, emplastri modo impositus.

Vrinâ abluatur locus contusus, vel foueatur. Lineus pannus Aquâ vitæ irroratus, parti contusæ, tepidè, subitò, admotus, tumorem impedit, sanguinem dissipat & discurit.

Fomentari vel immergi circa finem, vt resoluatur materia membrum contusum potest, ex decocto radicum Ebuli, Osmundæ, Sanamundæ, Absynthio, Pulegio, Arthemisia, fl. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci vel Ebuli, Rosarum, &c.

Inuoluantur in corio Arietis modò magis dum calet, quibus totum corpus ex casu conuassatum est: Alij bubulo vtuntur vel alio: Alij in fimo eos sepeliunt.

In aurium contusione; Dioscorides Sulphur cum Melle & Vinò illinit. Et Bulbos cum Polenta imponit.

Si glandulæ ex contusione intumescant, vel inflamentur, vti & testes, quid faciendû, in ipsorum tumoribus fuit expositum.

Tumores glandularum qui dum dolore in corporis superficie prodeunt, cum hi sint præcipuè, qui circa inguina, vel sub axillis nati Bubones Schlier German. vel iuxta aures Parotides, German. Ohrenmügelé appellantur: nos horum curationem simul quoque, cum non adeò dissimilis sit, proponemus. In qua primùm, si hi tumores circa inflammationem; cum dolore nihilominus fiant, vt in iunioribus dum crescunt, vel quando propter scabiem, ob dolorem vicinæ partis intumescunt, non adeò laborandum. Sed

tunc solum ne influxus increascat, malumque augeatur; & proinde ne nimium attrectent locum affectum, vti alioquin iuniores facere solent, aliòve modo irritent prohibemus: & si opus, reuellentibus & deriuantibus fluxionem impedimus.

Quòd si verò maior tumor & dolor adsint, aut incipiat, vel iam facta sit inflammatio; quam si maior sit, & à sanguine puro dependeat, Phygethlon seu Panum, si minor, & à sanguine impuriore, Phyma vocant, siue Bubones aut Parotides sint, & vel per se nascantur, vel in morbis diuturnis aut acutis vel malignis, vt in lue venerea vel peste prodeant, & vel cum inflammatione, aut citra eam existant: Tunc ante omnia, euacuationes, reuulsiones, deriuationes, per venæ sectionem, purgationes, facimus: eaq; ratione morbi comitis, vt in singulis dictum fuit, hisce tumoribus accommodamus. Quibus solis interdum factis, corporeque decenter purgato, bubones aliqui, vt venerei sæpè recedunt.

Topica verò remedia quod concernit; In principio si inflammatio in illis adsit magna, propter dolorem, ægro non nihil ante omnia subueniendum, anodynus & narcoticis admotis. Repellentia tamen, vt in cæteris inflammationibus, nisi fortè à causa externa magna in adenibus nata esset inflammatio, minimè erunt adhibenda, cum causa morbifica, vel vitiosus humor plerumque à natura in hæc corporis emundatoria expurgetur. Cuius naturæ hic motus; præsertim si non satis aut tardè agat, potius est iuuandus: eoque nomine amplius huc alliciendus, iis quæ relaxando hæc sedes, faciliorem in illas influxum concitent, idque calore moderato, vnde etiam dolorem simul compescunt: vel vtendo quoque fortioribus, calore validiore attrahentibus, si bubo aut parotis sint pestifera. Quibus à principio mox factis, statim ea quæ quod affluxit resoluunt, vel etiam simul maturent, hisce permiscemus; vel iis solis vtimur: admiscendo in pestiferis præsertim eiusmodi tumoribus, quæ venenum simul alliciant, illiusque vim, vti creditur, infringant, vel in aliis, quæ certa quadam proprietate operentur. In

pesti-

Bubones
& Parotides
indam in
inflammatione,
que tunc
Pannus
& Phyma
dicuntur, vel
sine ea,
moratio.

pestilentibus quoque, aliquando, vt virus è corpore educatur, sectionibus vñtionibusq; viam aperimus. Quibus factis, postea cum in abcessum desinunt, indeque in vlcus, cura hisce debetur.

Remedia autè quæ hæc omnia præstent, quod attinet: Si dolor ante omnia curam ad se trahat, anodyna eadem quæ in phlegmone exposita sunt, hic quoque adhiberi possunt, eoque rectius, cum relaxando simul, quod requirimus, profint: Vti & narcotica illic etiam proposita, admoueri, cum simul, vt illic ostensum, resoluant. Quo nomine & inter reliqua, herba Narcoticæ, aqua Vitæ, Vini fex, in his tumoribus quoque à plerisque commendantur.

Reliqua verò quod concernit, quæ relaxando, attrahendo, resoluendo vel etiam simul maturando, vel viam manifestam patefaciendo, vim veneni infringendo, aut alijs proprietatibus potentiâ actuque operari debent remedia, sequentibus formis modisq; administrantur.

Lana succida ouium, cui sordes adhuc adhærescunt, quas Oesypum vocant, quæ & solæ inungi possunt, communiter parotidibus bubonibus cuiuscunque generis apponitur. Quæ etsi vim quandam etiam repellendi propter sordes habere dicatur, & ob id in inflammationibus non solum dolorem lenit, sed & non nihil repellit, tamen relaxando plus hic operatur, quam repellendo; præsertim si in oleo relaxante, vt ferè fit, intincta prius admoueat.

Inunctio relaxans communis, dolorem simul sedans sic fit: R. Olei communis recentis velloti, vel Amygdalarum dulcium, Butyri recentis ad 3. j. anxungie Gallinæ vel Porci, ad 3. j. mucilag. seminis Psyllij vel Lini vel Altheæ 3. β. Vitellū vnius oui, misce.

Alia quæ & simul non nihil digerit vnctio, fit ex ol. florum Chamomil. Meliloti, Anethi, Sambuci, Cheiri, Liliorum, Irino, Sesamino, Amygdalar. amararum. Quibus addi possunt pinguedo Gallinæ: Anatis, Anseris. Item mucago Fœnogræc. interdum & Crocus.

Fotus relaxans, & calore actuali quo adhibetur, alliciens, & simul digerens nonni-

hil, paratur ex decocto Maluæ, Liliorum, florum Chamomillæ, Meliloti, vt in mamillarum & testium inflammatione dictum. Idem facit Spongia decocta in Vino, & Aquâ calidâ sæpe admota.

Applicationes aliæ ex plantis factæ, præter communes, quæ relaxant & resoluunt, vt sunt Althea, Malua, Parietaria, Lilium, Chamomilla, Melilotus, &c. bubonibus & parotidibus, sequentia etiam quæ diuersas operationes præstant, conueniunt simplicia: radices Asphodeli, Gladioli, Bulbi veri, Personatæ: ex herbis, Asteraticus, qui bubonium & inguinalis, quia bubonibus illis accommodatus est, dicitur. Scabiosa, quæ Apstem fraut German. quod eiusmodi tumoribus competat, vocatur, in pestiferis bubonibus etiam singularis. Verbasco folia & radix, Adianthum, Plantago, Attriplex, Anagallis, Sambucus, Millefolium, Pes leporinus, Sclarea, Abrotanum, Galeopsis, Acinos, Isatis, Coriandrum, Onobrychis, Conyza, Pycnocomum, Oleæ sylvestris folia, & Panacis asclepiadis flores. Et quando validius attrahendum & resoluendum, Ranunculus flammeus & Eruca, Consiliginis folia, cortex Nucis arboris, Viti nigra. Equibus omnibus, aliqua contusa, cruda, vel cocta prius in Aqua vel Vino, vel Hydroleo, addito etiam interdum Aceto & Melle, vel oleo Rosacco, Camomel. vel Adipibus, bubonibus apponuntur. Quæ & cum Sale contusa plerumque applicat Dioscorides: Theriaca, Mithridatum, aliaque antidota his quoque si pestiferi sint, permiscuntur.

Eiusmodi plantis sic diuersimodè præparatis, farinæ quandoq; adduntur, vt Hordei, seu Polenta, Fabarum, Cicerum, Lini, Fœnogræci, Lupinorum, Oleacea, sitq; ex illis Cataplasma.

Vel farinæ hæc solæ coquuntur, cum jam dictis liquoribus in formam pulvis, additis Oleis, vel cum Melle: calidæq; sic, sæpe repetita adhibentur, vti & cætera omnia quæ apponuntur, calida actu esse debent.

Alia cataplasmata ex bulbis fiunt Cæparum, Liliorum, aliisve. Item rad. Altheæ, Bryoniæ, Iridis excorticatis, cum Butyro, Axungijs, Oleo decenti subactis: additis quan-

quandoq; pulpâ Ficum & farinis feminis Lini & Fœnogræci.

Velin bubonē pestifero, prius illis vt dictū excoctis, Theriaca, Mithridatum, aliāve antidota permiscuntur: vel Cæpa absc̃to o-perculo excavata, hisce impletur, rursūq; recta, stuppisq; inuoluta, sub cineribus calidis parū cocta, confusa apponitur. Quibus & Acetum vel succus Citri, Granatorum, vel oleum Scopionum, vel Hypericonis, Crocus, addi possunt.

Raphanus in pestifero præsertim confert, si ab eo talleoli lati absc̃ti, illi imponantur, sæpeq; mutantur, quos in medio foramine patefaciunt, vt virus attractum illic expirare possit.

Poma immatura syluestria probantur in pestiferis.

Malum granatum minutim concisum, & in Aceto coctum, in pestiferis conuenit: cui & succus Scabiosæ, vel Acetosæ, aut aquæ illorum dum coquitur, addi possunt.

Vitellus oui salitus allicit & resoluit, cui succus Scabiosæ, aliāve antidota, si pestilens sit bubo, admiscuntur. In quo & Lardum salitum appositum probatur.

Sapo niger dissolutus cum Lixiuio, addito Gummi ammoniaco, dissoluto in Aceto, Phyma discutit.

Aqua Chelidonis & bibita & inuncta, valde commendatur in Bubone venereo.

Compositum cataplasma, alliciens, resoluens vel etiam maturans tale sit: R. bulbos Liliorum, Cæparum, rad. Altheæ, Raphani, detractis membranis ꝑ. iij. Maluæ, Scabiosæ, in bubone pestifero, an. M. j. ꝑ. florum Chamomil. Sambuci an. ꝑ. j. Ficum paria quinq; decoquantur, pistentur, adde farina Fœnogræci vel alterius ꝑ. ij. gummi Ammoniacy, Galbani an. ꝑ. j. Dissolue in Vino, olei Liliorum vel alterius & Axungie q. s. fiat Cataplasma.

Huic si feminis Sinapis ꝑ. ij. addantur, validius allicit, vel etiam Fimi columbini tantundem.

Emplastra quibus attrahimus & attractum resolvimus, quo nomine vt vapor exeat, in medio ea perforare solent, sunt Diachylon magnum & Ireatum, vel etiam Ce-

rotheum, Diapalma, Basilicon magnum, de Meliloto, Dialtheæ: quæ validius attrahent, si Resina & Pix vel gummi Galbanum aut Ammoniacum addantur.

Galbanum etiam solum emollitum, in-
guinibus imponitur, quando in lue venereæ bubones apparuerunt, & rursū euanes-
cunt, vt eò virus trahatur.

Vel sumitur de gummis, Galbano, Ammoniaco, Bdellio, Oppopanace, vnum vel plura; dissoluta in Aceto forti vel scyllitico, vel Aqua vitæ, malaxando oleo Liliorum, addendo ad quartarium vnum emplastri, pulueris radic. Ireos ꝑ. 3. folior. Scabiosæ, in pestifero bubone ꝑ. ij. & si validius trahendum sit, Euphorbij ꝑ. j. pro emplastro: cui & Cantharides, cum fortiter attrahendum, asperguntur.

Aliud phymati peculiare: R. Ladani, Bdellij, Ammoniacy, dissoluta in oleo anti-
quo, addita Propoli, vel alio resolvente an. ꝑ. j. Terebinthinæ ꝑ. 3. Mellis ꝑ. j. Axungie Porci ꝑ. j. Picis & Cerae q. s. Pro emplastro.

Præter hæc, in bubonibus aut parotidibus, pestiferis præsertim, sequentia etiam ad virus eliciendum & euacuandum è corpore, ysurpantur, idq; mox in principio.

Gallus vel Gallina, aut Pullus horum, vel Catellus, vel Rana dissecta, vel Bubo, quem efficaciorē censent, aut Pulmo recenter mactati arietis, cruenta & calida adhuc imposita, frequenterq; iterata.

Podex Galli, Gallinæ vel Columbi, viu-
entium adhuc, deplumatus, buboni adhi-
bitus, Sale quandoq; conspersus, rostrum
interim illorum premendo, vt sic, vt vulgus
putat, per inferiora spiritum hauriendo, vi-
rus melius eliciat.

Cucurbita validius allicit, cum flamma
admota, buboni cuius, cum allicere volu-
mus, imposita vel circumposita.

Sanguisugæ admotæ sugendo sanguinē
illum, si virulentus sit, profunt.

Scarificatur interdum, vel alioquin seca-
tur bubo pestilēs, vt via huic veneno ad exi-
tum patefiat. Alias etiam eo nomine cau-
terio actuali vel potenciali vritur.

Alij penitus amputant: Quæ periculosa
admodum sunt remedia, nec temerè ten-

tanda, cum non ita multum educant e corpore, & interim in periculum inducant sæpe ægrum, eoq; magis si inflammatio adsit.

Mamillarum & Testium inflammacionis, causa.

Tumores cum dolore glandosarum partium in corporis superficie, nimium Mamillarum & Testium, si citra veram inflammationem eueniant, fiatque in mamillis, ob lactis exuperantiam, turgentibus & distentis potius quam ex tumore collecto tunc dolentibus, curationem illius affectus ad eos qui in magnitudine adaucta corpus deformant, relegabimus. Vti &, si testes citra inflammationem aliis de causis, vt in colico dolore, intumescant, cum hoc sponte dolore colico sedato, mox cesset, non noua hic cura erit instituenda.

Quod si verò vel ob iam dictos mamillarum aut testium affectus, aliasq; ob causas explicatas, tumor in illis oborto, metuatur inflammatio, vel iam nata sit, vnde in mamillis peruersa sæpe sequuntur vlcera, & in testibus durities & scirrhi relinquuntur, tunc cura inflammationum istarum in vtrisque, cum non adeò differat, simul explicabitur.

Primum itaque subito sanguinem, si copiose eò feratur, Venæ sectione factâ, si mamillæ inflammatae sint, in brachio, postea etiam in pedibus, præsertim si menses subfiterint, aut minus fluant: & si testes affecti sint, in pedibus primum, mox etiâ brachio, si magnus sit affluxus, reuellemus & deriuabimus: Cucurbitulis item brachiis, coxis affixis, adhibita simul si opus sit, Scarificatione: Et repellentibus applicatis, affluxum illius impediemus, doloremq; si admodum vrgeat, mitigabimus; moxq; illud quod influxit, omni studio resolvere studebimus, ne in pus conuertatur materia, & vlcus sequatur, quod in illis sedibus ægre sanatur.

Repellentia eadem quæ in phlegmone explicata sunt, hic possunt competere, eaque præsertim quæ mox simul digerant, illic descripta. Qualia præcipue sunt quæ farinas simul recipiunt.

Vel sic: R. Plantaginis, Senecionis, Maluæ recentium an. M. j. bulliant, in fine addendo aquas Solani, Rosarum: Contundantur, misce farin. Hordei, Oryzæ, Cicerum, Fabarum an. ʒ. iij. olei Rosacei ʒ. ij. ol. Chamomel.

ʒ. j. fiat Cataplasma, cui Bdelli in Acetodis soluti ʒ. ʒ. permisceri potest.

Dolorem quæ sedant, ea quoque in phlegmone exposita seligenda, quæ potius narcotica vi, quæ digerere simul diximus, id præstent, quàm anodyna, cum illa suppurationem, quam hic impedire cupimus, promoueant.

Resoluentia inprimis hic mox ad mouenda, qualia in phlegmone quoque proposita sunt. Quibus & sequentia addi possunt; Asphodeli & Hemerocallidis radices, & folia Coriandri & Bellidis, per se vel cum cæteris admota.

Item Coriandrum cum Vua passa, & Melle inuicem contusâ.

Cicerum farina & Fabarum, præ cæteris hic prodest, decocta in Vino, vel Oleis resoluentibus, in phlegmone descriptis, addendo interdum parum Aceti & Mellis, aliavæ; vt Ciminum.

Mucilagines seminum, vt Fœnogreci, Lini, Altheæ, subiguntur farinis, additis oleis, sicque admouentur; aliis quoque additis.

Nuces iuglandes cū Ruta & exiguo Mellis probat Diosc.

Passulæ enucleatæ sumuntur, vel etiam Caricæ & Dactyli, coquuntur vel emolliuntur in Vino; contunduntur atque applicantur: Vel huius pulpæ ʒ. j. adduntur farinæ Cicerum & Fabarum an. ʒ. ij. farin. Fœnogreci ʒ. ʒ. admiscendo Olea digerentia, sicque applicantur. Validius discutient, si puluerum radicis Ireos ʒ. ʒ. sem. Irionis ʒ. j. Mellis ʒ. ij. admisceantur, & sic vsurpentur.

Vuarum vinaceos cū Sale apponit Diosc.

Et Fermentum cum Origano & Sale.

Stercus vaccinum exiccatum cum Melle & Vino costum, vtile.

Theriaca admisto Croco, dissol. cum Melle vel Oleo inungitur vel applicatur.

Fotus ex decocto herbarum & radicū in phlegmone explicatarū, similiter resolunt: Vt Altheæ, Maluæ, Absynthij, rad. Iridis, Cucum. agrest. & florum Meliloti, Chamomillæ, Sambuci, Rosmarini, Stœchad. Rosar. feminis Fœnogreci, Lini, Cimini, Ficubus, cœtis omnibus in Vino, addito Melle, interdum & Aceto.

Vel Lana intincta in oleis digerentibus apponitur.

Vel hoc Unguentum: R. ol. Chamomil. Liliolum an. 3. j. β. Galbani, Ladani dissol. in Aceto an. 3. β. semin. Cimini 3. j. stercor. Vaccini exicc. 3. ij. Croci 3. β. Ceræ q. s.

Cancris crudi contriti appositi, valde probantur.

Si ad suppurationem tendat mammarum vel testium inflammatio, tunc eadem cura quæ abscessibus debetur, illicque explicabitur, instituenda.

Ab-
cessum
curatio. Abscessus, Apostema vulgò dictum, eandem penè curandi rationem in singulis illius speciebus, siue post inflammationes communes, aut priuatas glandularum, aut aliarum partium cuti adnatarum & substratarum, gignatur, requirit: Vt nimirum maturetur, & maturus aperiatur; quo facto, cum vlcus succedat, huic cura deinde accommodatur.

Maturari seu suppurari debet, statim cum incipit abscessus: quod fit, cum resolui in phlegmone influxa materia nequit, vt tunc in pus conuersa, per abscessum, quando in vlcus aperiatur, per illud expurgari possit. Quod inde natum vlcus, cum in externis hisce inflammationibus curatu non tam difficile sit, aut noxium, si rectè gubernetur, idcirco non adeò hic vt in illis maturandis, laborabimus; sed vbi in abscessum vergere inflammationem cognoscimus, naturæ operationem iuuamus, eoque citius, si citò suppurari soleat, vt pleraq; tubercula, quæ prout Eysen nostri, quasi vlcera dicas, vocant, in abscessum mox abire videmus: diligentius quoque illud efficere studentes, si suppuratio difficulter fiat & protrahatur, vt in furunculo, in quo, loco puris, lobus carnis diu infixus manet; & præsertim in maioris momenti partibus, quibus diutius pus retentum noxam inferre solet, vt circa iuncturas fit, & in paronychia, nisi pus mox concoquatur, illique pateat exitus, ossa illius loci & nervosæ partes, vt dictum, tandem vitiuntur. Hæc autem suppuratio seu maturatio, naturæ solius beneficio plerumq; præstatur, quæ humorem illum excoquit, & vnà cum eo, partis affectæ, cui sanguis inhæret, substantiæ aliquam portionem, nulla ad-

huc illic facta putredine, sed tantum in materiam albam pultis instar, quæ pus dicitur, transmutatione: vnde nec foetet pus, nisi fortè hic quoque putredo inducatur, quæ tamen à suppuratione multum distat, & tunc primum sequitur, quando natura illius maturationem derelinquit, vel tardius efficit, aut non perfectè, vt in furunculo, vnde & facilius perficiatur, medicus opem ferens, suppurantia adhibet: quæ temperata vel leuiter calida & emplastica sunt, quibus dum calor natiuus, vt rectius melius procedit. Quod & anodyna cum ferè eodem modo faciant, maturationem, vt dictum, promouent, vt & pleraque suppurantia anodyna quoque essent, nisi puris generatio novos dolores excitaret.

Multa quoque ex resoluentium numero, calore vel siccitate, non ita validis, prædita, sed calore moderatiore, si materiam minus vt resolui possit habilem, resolvere nequeant, suppurationem illius, si eò vergat natura, quoq; adiuuant, vel saltem non impediunt. Quæ omnia remedia maturantia actu tepida vel leuiter calida admora, hoc quoq; nomine suppurationem accelerant.

Remedia verò Peptica, maturantia seu suppurantia, in forma emplastica (vnde efficacius operantur) cataplasmatum applicari solita, sunt primum, Tripharmacum Galeni, quod ex farina Frumenti, Oleo & Aqua simul coctis, in formam pultis paratur, quæ puls Croco colorata, magis concoquit.

Cuius loco hoc fieri potest: R. farinā Tritici vel Zeæ, vel Maizi (quæ priuatim à quibusdam commendatur) vel Panis micam, coquantur in Aqua, aut Iure pingui non salito, vel Lacte, si dolor expetit, & in t. j. adde Olei vel Butyri, Adipis porcivi vel vituli an. 3. j. β. Vitellos ouorum num. ij. misce. Possunt & mucilagines addi.

Fit & aliud cataplasma ex Panis mica vel Farinis, cum bulbis Liliolum vel Cæparum & Lacte coctis, vt modò dictum, addito interdum Butyro, Oleo vel Axungia. Cū quibus & rad. Altheæ, Malua, Senecio & Ficis simul coquuntur & permiscuntur.

Vel ex pluribus tale fit cataplasma: R. ra-

dic. Altheæ, Liliorum ana ʒ.ij. rad. Bryoniæ ʒ.ij. trium vel quatuor herb. Emollitiuarum, Senecionis, Brassicæ vel Eryngij ad m. iij. florum Violarum p. j. Ficum paria vj. Passul. mundat. par. x. farinæ Tritici vel alterius, vel Panis ʒ. iij. farinæ seminis Lini, vel Fœnogræci ʒ. ij. coquantur, pistentur, adde ex adipibus supradictis ʒ. ij. Olei Liliorum, Violarum, Amygdalarum dulcium ad ʒ. j. Croci ʒ. β. fiat Cataplasma.

Vel sumitur Cæpa alba (cùm quia minùs acris est, magis maturet quàm digerat) item Ficus, inciduntur, coquantur, & cum Butyro vel Oleo miscentur, additis quandoque farinis, & adhibentur. Adduntur & quandoque ex supradictis radicibus & herbis quædam, Vitelli ouorum, Terebinthina, &c.

Aliud: R. Caricarum ʒ. ij. Ladani, Thuris an. ʒ. j. Stryacis liquidæ, Terebinthinæ an. ʒ. β. cum Farina cõmuni vel alia incorporentur, additis Oleis & Axungia porci.

Folia hyosciami cocta sub prunis, cum Adipe apposita, vti & multa ex digerentibus, si cum vinctuosis temperatis calor ipsorum temperetur.

Cynoglossi radix rufa, apposita, admodum suppurat, & in bubonibus pestiferis conuenit.

Viscum tenacissimum quo aues capiuntur, alij applicant: alij Vernicem liquidum quo ligna incrustantur.

Viscum, Ceram, Resinam, æqua portione mista applicat Diofco.

Vel viscum cum Malua, Absynthio, sem. Lini, Melle & Oleo coquitur & apponitur.

Vel Butyrum, Sæuum, Ceram mista, apponuntur.

Pix vel Cera, vel ambo, eũ Oleo dissoluta, vel additâ Terebinthinâ, aliàs & Thure.

Aliàs Ovi vitellum solum vel cum albumine, cum Oleo vel Butyro, vel Sæuo potius, aut Medullâ, additâ interdum & Terebinthinâ. Estque tunc Chirurgorum Entericiblin dictum: cui & alia permisceri possunt, vt Thus, Crocus.

Mucilagine rad. Altheæ, seminis Lini & Fœnogræci, cum Oleis, Butyro vel Axungis subactæ, & Vitello oui.

Emplastra vsitata maturantia sunt Tetra-

pharmacum Galeni, ex pice, resina, cera, adipe vaccino compositum, cuius adipis loco, oleũ, maximè si dolor adhuc adsit, aliquando sumitur, tuncq; Basilicon minus Mesuæi dicitur. Item Diachylon commune seu album: vel etiam Paruum, dolore præsertim simul vrgente: Sed & Magnum, etsi potius digerat, tamen si materia digeri nequeat, ad maturationem quoq; opitulatur: maximè si oleo copiosiore diluta vsurpentur, veluti & alia malactica, vt vnguentum Dialtheæ, Resumptiuum, Aureum. Quibus Macedonicum addit Aërius, furunculisq; maturandis, qui tam ægrè suppurantur, accommodat.

Perfusio vel forus, ex Hydrelæo, vel Oleo communi aut alio temperato, maturat, vel applicatio cum lana, præsertim ante reliquorum applicationem.

Caulium succus, illiusque seminis Muçago laudatur, per se illita, vel cum aliis apposita.

Caro quadrupedum, vti & Piscium & Cancriorum fluuiatilium adhibita, etiam suppurationem promouet. Sicuti & Manus hominis sæpe admota; præsertim si tubercula illis tractentur, quod proin prohibere, cùm suppurare non capimus, solent.

Aperiendus abscessus, quando maturus est, pure scilicet iam genito, quod ex mollitie, acutie, vt in illius descriptione ostendimus, cognoscitur, vt sic puri exitum moliamur.

Sed & ante perfectam maturationem aliquando aperiendus erit, si circa iuncturas aut partes nobiliores existat, ne pus retentũ illis noceat; quod quoq; faciendum, si pestilens aut malignus in bubonibus sit humor.

Hoc autem natura sponte, vel maturantia simul adhibita, dum suppurant, faciunt, cùm cutem simul cum sanguine & carne excoquendo, teneriorem mollioremque & veluti excoctam reddendo, vt faciliè tunc aperiat, simul efficiant.

Vel hoc validius id potentiâ actusq; agentibus, cutemque pertudentibus simul præstabitur.

Inter ea quæ potentiâ agunt, mitiora alia sunt, quæ maturant & exitum simul parant, quibus cùm sensim apertione molimur, vnumur:

705

uritur: alia sunt fortiora, quæ subito illud erodendo, vrendo, cutem perforant.

Fermentum supradictis maturatibus additum, vel cum Vitello oui, coctione indurati, & Farinâ administratum, vel cum Axungia: quibus & Capa addi potest, & maturat, & apertionem promouet.

Idem facit Scabiosa, Caules, rad. Narcissi, Buglossi, Capparum.

Nux rancida, & ex magis acribus Nasturtium, Apium, confusa, per se applicata, additis interdum aliis maturantibus Farinis, Ficubus aut Oleis.

Ebuli folia confusa cum Axungia porcina, applicata in mamillarum abscessibus, sepeque mutata, eos aperiunt.

Poma putrida, Mora rubi matura, Paradisi herbæ fructus maturus, abscessus aperire, experientia ostendit: vti & Capa quæ admodum acris sit; Vel Allium, cruda vel parum tosta.

Cinis Caulium radicum aut Ficulneus, subactus Aceto, potenter aperit, mirum si Axungia temperetur.

Stercora in primis, ad maturandum & aperiendum simul apostema, probantur, vt Bubulum ex pascuis sumptum, in pano præsertim, vt docet Dioscor. qui Rupicaprae in parotidibus ceteris præfert. Anserinum sterminus magni fit apud chirurgos in Paronychia, recens & calens adhuc ab anseris excrementum, appositum, vt quod in eo affectu maxime requiritur, puri mox viam faciat. Probatum & in aliis abscessibus Vaccinum, Porcinum, Caprinum, Caninum. Et cum validius citiusque aperiendum, calidiora ex illis, veluti Columbinum, Gallinaceum. Quæ omnia per se apponi possunt, vel contemperari decoctione in Vino facta, addito nonnunquam & Aceto: vel dissoluta in Oleo, permiscendo etiam Farinas, si amplius maturandum.

Cataplasmata ex enarratis efficacia sunt, si prædictis plantis confusis aut parum coctis, vt dictum, mistis, Fermentum equâ portione, Stercoris Columbini quarta pars addatur, Acetoque forti, quod cutem excoquendo, vt citius aperiatur, efficit, subigatur, eritque adhuc efficacius, si Sinapis 3. 6. vel Nitri aut Sulphuris viui an. 3. ij. addantur.

Mel Anacardinum, cum Pice dissoluta ad ignem, mistum, idem facit.

Et Euphorbium, quod quia vrit, parum prius in Oleo bulliat, addendo etiam sterco- ra, & parum Gummi Ammoniaci.

Sal Ammoniacum cum Fermento & Vitello oui subactum appositum, addito Croco & Opio.

Calx viua cum Sapone miscetur, addendo Mel vel Saliuam ieiuni hominis.

Cauteria potentialia citius adhuc erodendo vel vrendo, cutem aperiunt, tuncque dolorem adferunt; vti verò nullum vel exiguum, si septica vi cutem corrumpendo, eam denigrent & mortificent. In quibus etsi eschara facta diu adhuc infixamaneat, tamen in ambitu illius, cum ea à cute sana mox secedat, illic transitum humori patefacit, donec eschara sensim recedens, foramen patens post se relinquat. Hæc autem, in eo abscessus loco, vbi mollior vel acutior est, apponuntur, in foramine emplastri alicuius prius agglutinati, ne latius vis illius extendi possit, totumque abscessum inuadere & inflammare; & si dolor sequatur, ille postea leniri debet, parsque in ambitu defensiuo vnguento in phlegmone descripto, muniri.

Talia verò plurima à veteribus inuenta, Galenus proponit: pastillos nimirum causticos, Polydæ, Andronis, Musæ, Pytini, ex chalcantho & alumine, cæterisque paratos. Item vnguenta duo caustica Andromachi.

Multaque eiusmodi Arabes habent, è quibus præcipua, vti & neotericonum aliqua, Fallopius & Paræus descripserunt, quæ citò & interdum sine dolore, etiam sine opio parata operantur, quod ad doloris mitigationem nonnunquam, sed exiguo, quantum obseruauimus, cum fructu addunt.

Inter quæ illud indolens omnino est, quod ex Lixiuio, Capitello vocato, sensim donec in tophum concreseat, coquitur; quod Lixiuum ex Calcis viuæ partibus tribus, & Vini facis vstæ partibus duabus, affusâ aquæ iustâ mensurâ, per macerationem atque sæpe iteratam transcolationem, vel etiam coctionem, conficitur; efficaciusque erit, si loco aquæ, Lixiuum ex cineribus stipitum Fabarum, Quercus transfusum sumatur.

Longeque citius adhuc altiusque cutem aduret, si Salis Ammoniaci vel Aluminis aut Chalcathi quartam partem, ad Calcis & Vini facis quantitatem addas, sicque lixiuium pares & decoquas; sed tunc magis dolorem inferet, quocirca vti dictum, opium interdum addunt.

Ex aqua seu Lixiuio saporis, addito Chalcantho vel Sale ammoniaco aut Alumine, donec lapidescat, cauteriū quoque coquitur.

Sublimatum cum vnguento Populeonis, ad dolorem, & lapid. Hæmatite, ad inflammationem arcendam, in pastam subactum si apponatur, idem præstat.

Cantharides itidem, si Fermento, addito etiam Aceto, in pastam redigantur. Quibus & Æruginem æris vel Chalcathum addere possumus, vel tantillum Auripigmenti, vti cum tunc citius operentur, dolor minus diu duret.

Sunt qui Aquâ forti, cum sextuplâ portione Aquæ, præsertim Siliginis locum madesaciendo vrunt.

Aqua idem præstans: 3. Vitrioli, Arsenici, an. 3. ij. Sublimati 3. 6. succi Bryoniæ 3. vj. Cantharidum puluerisat. 3. ij. Destillantur ad vsum, & guttâ vnâ locus disrumpendus aperiatur.

Oleum vitrioli, si gutta vna aut altera apponatur, idem operatur: Nicolai Massæ remedium.

Adū quæ agunt, subito puri fenestram aperiunt; Fitque tutius hoc sectione factâ cum nouacula aut phlebotomo, eo in abscessus loco, vbi mollior & acutior est, pusque certo subesseprehenditur; eousque adacto instrumento, donec pus emanet, foramenque satis patens fiat: rugas interim si circa flexuras sit, vt secundum illarum lineas sectio fiat, obseruando.

In abscessibus abstrusis pure intrinsecus latente, præsertim circa iuncturas aut alias partes, quibus diutius illic retentum obesse posset, sectione illi maturè exitum, antequâ pars corrumpatur, facere oportet, etiam pure non absolute cocto, aut abscessu nondum admodum se manifestante. Quapropter & in paronychia, si dolor admodum inualescat, etsi nondum appareat suppuratio, quia

tamen suspicio est, sectio statim faciendâ; incidendo digitum, à summitate illius, in latere vnguis, profundè ad os vsque ferrum adigendo, & ad iuncturam vsque descendendo, sic enim osis à pure corruptionem, quæ alioquin mox sequeretur, vitabis.

Ferro candenti impresso nonnunquam aperitur maturus abscessus: vel perforando penitus cutem, vel saltem eam vrendo, donec eschara fiat: sicuti cauterio potenti eo modo, sed tardius puri exitum patefieri ostendemus. Vrimus quoque cauterio actuali, in paronychia os corruptum, vt in vlceribus dicetur.

Cancer cum sit tumor à phlegmone plurimum differens, tum quod sensim nascatur, sine inflammatione, molesque cum excreuit quædam sit carnea, altis defixa radicibus, & quando exulceratus est, ab aliis vlceribus ob lobum carnis infixum, stirias quas producit, & labiorum inflexionem, & cum pernicie sua noceat potius quàm manifesta qualitate dolorem aut calorem adferat, diuersam quoque curandi rationem ab aliis tumoribus & vlceribus exigit.

Præmissio ante omnia prognostico, si primum inceperit, & adhuc exiguus sit, nec negligatur (vbi ferè sit, cum non nisi à peritis medicis tunc cognoscatur) ipsius incrementum difficulter impediri, si adactus sit, ægerrimè, & si ad summum peruenerit, nunquam curari posse, & si vlceratus sit, eum nisi possit integer funditus extirpari, etsi longo tempore sepe perdurare possit, lethalem.

Curatio seu medici operatio, in incipiente, cum spe aliqua, in cōfirmato minori vel nulla, præsertim si exulceratus sit palliatia cura, hoc pacto instituenda.

Vt cum nobis huius perniciosæ materiei illiusque qualitatē, è quâ cancer constitutus est, & fouetur, antidotus certa aliqua cognita non sit, & proin eam infringere nequeamus; quod si fieret, curari posset, nec cancer aliam curâ, qualis alioquin tumoribus debetur admittat, cum discutientibus non cedit, & si illum emollire vel suppurare studeamus, vti chirurgi indocti hoc pacto cancrum curare volentes, plerunq; peccare solent, deteriore & qui in vlcus citius abit, redda-

reddamus: vt saltem omni studio ipsius incrementum dum crescit, vel si iam creuit, exulcerationem impediamus, eumq; sic retardemus; & si exulceratur, ab omni moda corruptione quamdiu fieri potest, sustentemus, vel statim in principio, dum vires adhuc constant, vel postmodum cum desperatus est, penitus extirpemus: Interim toto tempore quo ille viget, corpus purum mundumque quantum fieri potest seruandum, viresq; quæ labuntur conseruandæ, fouendæ; & si quæ alia occurrunt symptomata, illis est prospiciendum.

Sanguinis detractio, Scarificatio, Cucurbitularum applicatio, in distentiore vel viciniore loco, reuellendo & deriuando, in plethoricis præcipuè, viris constantibus, dum adhuc crescit, augmentum illius aliquo pacto remorari possunt. Ad quod & Hæmorrhoidum & Mensium fluxus, si deceter procedant, nonnihil adiuuenti adferunt.

Purgatio ab initio, si fortè per hanc etiam incrementum illius retardari posset, pro ratione redundantiarum in corpore potius instituenda, quàm vt eam tantum melancholicis humoribus educendis, sicuti communiter ab iis qui atram bilem illius causam esse censent, fit, accomodemus: quæ quidem cum corpus durum rectius tractetur, hoc nomine potissimum nonnihil iuuabit, cum alioquin venenatam cancri causam auferre nequeat, sicuti verò venenum aliud, vt illud quod luem veneream efficit, purgationes sæpe continuatæ & magnæ e corpore propellunt, quod in cancro affectis summè debilitatis corporibus, facere minimè tutum est, nec si fieret, prodesset. Purgantium autem formas, cum passim in aliis affectibus, in quibus magis profunt, describantur, non necesse est de nouo hic repetere.

Resciciendus æger, cum vires labascunt, idque Alimentis optimis, inter quæ & illa, quæ heticos restaurare, in huius febris curâ diximus, hic quoque probantur: Inprimis ex Cancrorum carne illic descripta edulia: quos cancos etiam comestos, vel ius ipsorum bibitum, proprietate quadam in hoc affectu, fortè ob nominis affinitatē, cum alioquin cum cancris fluuiatilibus nihil habeat,

etiam quod formam attinet, simile; admodum probant. Præcipuè tamen ne acribus & salis frequenter vrendo, vt citius cancer exulceretur hoc pacto procurent, cauendū. Vinum præcipuè eos præ cæteris reficit, nec quid, quò minus eo vtantur, huius morbi causâ impedire potest. Cordialia medicamenta varia intus forisque administrata, in febribus heticis alibique exposita, in hisce imbecillitatibus similiter conueniunt. Inprimisque ea, quæ venenis resistunt, in febribus pestiferis proposita, & quæ in venenatis vlceribus mox proponuntur, meo videre, plus in huius quoque veneni viribus retundendis, quàm aliis humoribus accomodata, proderunt. Suntque hæc potissima inter ea quæ in hoc casu propinantur, potiusq; quàm potiones vulnerariæ, vsurpanda; quas tamen quoque in exulcerato cancro aliqui, vt omnia in morbo desperato tentent, exhibere iubent. Eamq; quæ ex Pyrola & Hedera terrestri cum Vino decoquitur, plurimi in cancro mamillarū aliisque faciunt.

Topica verò quod attinet, dum cæcer adhuc integer est, eum ne augeatur vel vlceretur, reprimimus: adhibitis siccantibus & adstringentibus, proprietatemque talem aliquam habentibus, quibus eum firmemus & veluti induremus.

Hoc autem multa ex repercussiuis seu repellentibus in erysipellate, phlegmonè, expositis, à plantis præsertim earumque succis petita remedia, præter anodyna & vnctuosa, ex solis repellentibus parata, apposita, præstare possunt.

Inprimis verò in hoc casu ex herbis probantur Polytricum, quod diuinum in cancro sanando vocant, & Geranium Robertianum, cancro sanum ob id dictum, Ceterach, Coriandrum, Agrimonia, Polygonum: & præter has Tapsus barbatus, Plantago, Intybus, Solanum, Bursa pastoris, Consolida minor, Sanguisorba, Lapatium, Galeopsis, Sedum, Lunaria.

Quæ herbæ pauciores pluresve, recentes, confusæ applicantur, addito interdum Aceto vel Agresta.

Vel hoc pacto: R. radic. Tapsi barbati & Lapatij, an. ʒ. ij. Polytrici vel alterius plantæ

M.ij. contundantur cum paucis Aceto; adde puluerem Cancrorum vstorum ʒ. ʒ. misce, fiat Cataplasma.

Aliud: R. farinæ Lentium vel Cicerum p.j. nucleorum Nucis rancidæ vel prius parum vstæ, contusæ numer. vj. coquantur in Aceto, fiat Cataplasma.

Caro Cancrorum marinorum, cum magis canceri formam referant, vel etiam fluuatilium; item Cochlearum, Ranarum, cocta, apposita inuare creditur.

Succi prædictarum herbarum, similiter per folum aut illitionem admouentur, addito etiam Aceto. Nonnunquam & Aquæ harum.

Vel sic: R. succorum Plantaginis, Solani, Intybi, Sedi, aliarumve plantarum ad ʒ. ij. Aceti rosæ ʒ. j. olei Rosæ. omphacini vel Myrtyllorum ʒ. ij. Terebinthinæ ʒ. ʒ. agitentur in mortario plumbeo, addendo cortic. Granatorum, Citri an. ʒ. j. Boli rubri ʒ. ij. Plumbi vsti & loti ʒ. j. Camphoræ ʒ. ʒ. agitentur, fiat instar nutriti: Quo vngatur sæpe.

Plumbi bractea cancro alligata, eum non nihil reprimat.

Cancri
exulce-
rati seu
Carcino-
matu, cu
ratio.

In exulcerato cancro validius adhuc siccantia & adstringentia adhibebimus, ut putredinem illius & fetorem, unde quoque debilitantur, & in primis sanguinis illam continuam exudationem, quæ mortem illis tandem accelerat, quoad fieri potest, arceamus. Et si corrupta & putris iam sit illis portio, illam auferre medicamentis, totumque, si fieri potest, cancrum radicitus manuali operâ tollere, nitentur.

Primum itaque exiccationis, ut dictum, gratiâ, plantæ quæ ante illius exulcerationem conueniebant, nunc quoque siccando in ulcerato proderunt. Præter quas cum exulceratus est, etiam Vrtica, Ruta, Hypericon, fol. Ebuli, Scabiosa, Centinodia, conueniunt, similiter tusa & admota.

Succi prædictarum plantarum, per se, vel addito ol. Rosæ aut inspissati pulueribus, diuersimodè applicantur.

Pulueres vel cineres qui idem præstant, proprietatemque quandam habere creduntur, sunt Cancrorum marinorum vel fluuatilium & Testudinum, Ranarum, Mustelæ,

Gruis, Stercoris humani, prius in furno exiccatorum vel vstorum: Aliique pulueres admodum siccando agentes, eodem modo siccati, vel in cineres redacti, ossium Myrobalarum & Oliuarum, & solearum calceamentorum: vel pulueres herbarum prædictarum siccati, dein & ligni Salicis vetustissimi, Psidiarum, Balaustiorum, sem. Irionis, Galeopsis, Cornu cerui; metallici ite, Plumbi crudi vel vsti & loti, Cerusæ, Antimonij crudi, Thutiae, Pompholygos præpar. Lithargyrij: terrestres, Boli, Lapid. molaris, Gypsi vsti, Cotis fricaturæ: E quibus aliqua succis excepta vel herbis contusis permixta, aliòve modo parata applicantur.

Applicatio ex Passulis cum Ruta pistis probatur. Et Brassicæ folia in Lacte cocta, aspersa multo Saccharo, fetorem putrem emendant. Lauri item folia superposita.

Inunctio conueniens: R. succi fol. Tapi barbat, succi herbe Roberti vel Polytrici ʒ. j. Mellis ʒ. iij. adde pulueris ossium Myrobalarum vstorum ʒ. ij. cineris Cancrorum vstorum ʒ. j. fiat vnguentum.

Vnguentum efficacius: R. succorū Plantaginis, Burse pastoris, Agrimonie, vel etiam de aliis succis, Aceti ad ʒ. v. olei Rosæ. omphacini vel Myrtillorum ʒ. iij. Terebinth. ʒ. j. ducantur in mortario plumbeo; pro applicatione, vel inunctione. Vel adde Lithargyrij ʒ. ʒ. Plumbi vsti & loti, lapidis Hæmatit. an. ʒ. ij. Antimonij crudi ʒ. j. Coralli vsti & loti ʒ. ij. Perla um, in magnatibus ʒ. j. Camphoræ ʒ. j. cinerum Cancrorum vel aliorum ʒ. j. fiat vnguentum: cui plura ex prædictis pulueribus addi possunt, præsertim ex Stercore humano, adeò commendato.

Oleum ouorum in mortario plumbeo diu agitatam, inunctum; eximium dicitur. Item oleum Antimonij & Sulphuris.

Vnguentum Diapompholygos, Emplastræ quæ plumbum recipiunt, in cancro exulcerato, cōmuniter, ut siccetur, adhibentur.

Ablutio illius ex Aceto, additis quandoque succis, à putredine eū vindicant. Vti & si hoc fiat Lixiuio forti: quale & illud est quod ex cinerib. Ficus ramorū paratur, vel herbis prædictis, aut ligno Salicis, Iuniperi. Idē Vrina præstat, Efficacius agent, Vitriolo addito.

Aqua

713

Aqua Stercoris humani si applicetur, vtilissima cēsetur. Probatur & Aqua coriandri.

Puluis sequens cācro vlcēato totam ceruicem & malam cum aure possidente, in se ne quodam inspersus, eum, ne putredine, foetore & hæmorrhagia penitus conficeret, aliquot annis cōseruauit: R. Gallarum, cortic. Granatorum an. ʒ. j. Gypsi vsti ʒ. ij. Boli Armeni ʒ. j. Lithargyrij, Cadmiæ fossilis an. ʒ. ʒ. Aristoloch. rotund. ʒ. iij. Plumbi vsti ʒ. ij. cineris Testarum cancrorum ʒ. j. fiat puluis subtilissimus. Ex eodem, Melle & Terebinthinā excepto, Emplastrum fuit appositum.

Ad corruptam & putrem carnē auferendam, Sal gemmæ, vel Alumen, puluerisata inspergimus: quibus cum successu pulueris Lumbricorum æqualis mensura additur.

Vel succum Bryoniæ & Dracontij hisce permiscemus, & inungimus.

Aut vnguento Ægyptiaco putredinem hanc tollimus.

Fortius exedunt carnem putrem sequentia. Auripigmenti & Tartari æquæ sumuntur partes, macerata prius in Aceto forti, in vase fictili, vruntur, puluisque inspergitur.

Vel hic puluis, qui R. Arsenici crySTALLIN. ʒ. ij. radic. Aronis ʒ. j. fiat puluis.

Aquæ quibus putridam carnem madefaciendo auferimus, sunt hoc pacto: R. Auripigmenti ʒ. j. Æruginis æris ʒ. ij. puluerisata, diluantur Vini albi tʒ. j. agitentur diu in mortario, vel maneant in infusione aliquandiu, postea quod clarum est effundatur, & coquatur, donec tertia tantum pars supersit, eamque aquâ Rosarum vel aliâ, quousque moderatē nec nimis violentē agere possit, contempera; & vtēre.

Alia ex puluere Mercurij sublimati ad ʒ. j. cum aquis Rosar. Plantag. Solani ad ʒ. iij. parum costi fit, & commodē adhibetur.

Eradicatio totius cancri per sectionem, extremum est remedium, si radicitus hoc fieri possit, viresque illud ferant, nec quid aliud impediāt. Nam frustra fit, si illis in locis tentetur, vbi profundus admodum, subiectarum partium carni membranisque suis radicibus venisque adhæret, adeo vt ab illis penitus amputari nequeat, cum tunc illius remanente portione, iterum crescat,

sicuti in plerisque locis, altē cancer infixus hæreere solet, vt & cū in orificiis immersus latet, ægrē eradicatur. Dein & si magna, quia venis magis vicinus est, hæmorrhagia metuatur, hoc nomine quoque adest periculum, nisi illa remediis mox admotis illicō compesci possit. In vniuersum tamen interdum excindi, parte corporis simul sublatā, potest: vt si in crure aut brachio sit, si vnā cum cancro hæc amputentur. In quo faciendo, nisi sectio insigni spatio supra cancrum fiat, illicq; pars auferatur, iterum illum repullulasse, cū in genu cancer esset, sectioq; paulō supra illud fieret, in puella obseruauit. Mamillarum cancer, cum mamilla radicitus excisa, interdum quoque auferatur: aliās in costis remanente radice redit.

Anthrax seu Carbunculus, etsi pestilentialis non sit, admodum tamen debilitat, & curatu contāmax est: periculoq; non vacat, si in cordi vicinis locis existat, si succus sit, ^{Anthraxis simplicis, & pestilentialis, curatio.} aut virulentum quid loco puris ex eo emanet, magnaq; adsit inflammatio. Pestilentialis verō carbunculus, febris pestiferæ causā, cui copulatur, exitium potius adfert: aliquando tamen per se, in partibus nobilioribus aut iuncturis accidens, nocuus.

In curatione vtriusq; antracis, quod generalia præsidia attinet, vniuerso corpori euacuationis & alterationis gratiā accommodanda. In pestilenti ea ad febrem pestiferam potius quā antracem diriguntur: pro antracis tamen situ, venæ sectionem hoc illōve in loco facientes: sicuti in febribus pestilentialib. hæc copiosē exposita sunt. In carbunculo verō alio, pro ratione plethoræ vel cacochymie, venæ sectio vel purgatio instituitur, & propter comitem inflammationem, reuulsionēs & deriuationes fiunt. Exhibenturque ratione febris synochi malignæ, caloris & imbecillitatis, refrigerantia, putredinem arcentia, restaurantiaque cordialia, atque eadem foris applicantur. Reficiendique sunt victus ratione restaurante, cæterisque id efficientibus, quod & somnus referendus esset, nisi in carbunculo tantopere prohiberetur, quod per eum ad interiora virus rapi credatur, cum tamen ad exteriora in somno, calorem vergere, ex calore &

fudore, quo dormientes citius afficiuntur, conijcere liceat, vt non necesse sit adeò ægros à somno multis diebus sæpe, vti facere vidi, impediendo, tantopere affligere & debilitare.

Topicis verò anthraci adhibitis, reprimimus inflammationem, in non pestilenti: attrahimus venenum in pestilenti, aperimus & maturamus vtrumque anthracem: postea vt vlcus curamus.

Reprimimus inflammationem, in anthrace non pestilentiali saltem, adhibitis repellentibus in circuitu illius, vbi inflammatio existit, si præsertim magna sit, idque in principio, qualia in phlegmone descripta sunt: veluti defensuum illud, ex Bolo paratum: & illitio repellens ex succis parata; aut vnguenta vsitata, è quibus chirurgi communiter illud de Cerussa inungunt.

Vel vt & ardorem compescamus, & simul concoquamus, emplastrum de Arnoglossa dictum, anthraci vel statim, vel præmissis repellentibus dictis, toto ferè curationis tempore, circumponitur: quod ex Plantag. foliis recentibus & Farina Lentium & Comuni, ex qua panis coquitur, surfuribus nō ablati, seu ipso Pane inde cocto, quem syncomitum vocant; inuicem decoctis contusisque paratur: cui, si validius repellendum, Gallarum pulvis in principio addi potest: si concoquendum, farina Fabarum & Orobi, Melleque subigi.

Attrahimus venenum in anthrace pestilenti, statim ab initio: vti & in bubone pestifero fieri debere, & quo pacto, ostendimus; per ea quæ venenum alliciunt. Vt si festus per mediū Gallus, Columb. Rana, Bufo imponantur, & Podex galli vel columbi admoveatur, quæ melius, si locus leuiter prius scarificetur, operantur: vel quæ sugendo illud agunt, vt sunt Cucurbitulæ, Sanguisugæ, affixa: Aut si hoc hominis desperati factu ore facto, vel per instrumentum quo lac è mamillis sugi solet, aliòve modo fiat.

Aperimus anthracem vtrumque, vt exitum veneno pestifero vel maligno humori faciamus, scarificando mox in principio illud, & in progressu, si præsertim nigrescere incipiat: profundis (vt sanguis egregiè ef-

fluat) plagis, ne gangræna secuta, mortis causa, etiam in anthrace non pestifero fiat, vel in pestifero periculum illius conduplicet: Quo facto, Aquâ falsâ, gangræne metus causâ, interdum lauatur.

Idem Causticis perficitur, virusque in vtroque anthrace allicitur & educitur: & quando corrumpi incipit, vrendus Cauterio actuali: quod si ex auro chalybève factum sit, tanquam à purioribus metallis, conuenientius esse putant: vel potenciali adhibito aliquo hoc fit, qualia in abscessu aperiendo varia præscripta fuere, vt pastilli illic exposti veterum: vel ex Cantharidibus factum causticum, aliàve. Vsitatum est in carbunculo, Sublimatum vel Arsenicum illi imponere, exigua portionem, emplastri prius appositi foramini in medio illius indendo: Vel illius quatuor grana, cum Album. oui bene conquassati, cochlear. j. miscere, illaq; aquâ anthraces tangere.

Maturamus seu cōcoquimus anthracem vtrumque, mox cum caro illa quam possidet, corrūpi incipit, vt parte illius aliquâ in pus conuersâ, maxime illic vbi carni sanæ adhuc iungitur, reliqua portio vel integra vel frustatim exeat. Quod fit adhibitis quæ illud agant, eligendo ea præcipuè, quæ & virus pestilens in pestilenti, vel malignitatem in alio reprimunt.

Applicationes in hanc rem sunt ex Scabiosa & Consolida maiori & minori, quæ præ cæteris commendatur: postea etiam Tapsus barbarus, Cynoglossa, Pilosella, Millefolium, Cauda equina, Bursa pastoris, Galega, Brassica, Altheæ radix & Liliorum. Item Dioscor. testimonio Matricaria, Sabina, Cupressus, Ligustrum, Panax herculeū, recentia contusa, apposita, per se, vel cum Sale mista, aliisve, vt dicitur. Quorum & succi vsurpantur.

Allij, Porri, Cæparum, Liliorum bulbi, & Raphani radices, Eruca, Nasturtium, vrtica, similiter vsurpantur, addito Sale, aliquando: & Piperi.

Mala granata secta in partes & cocta in Aceto, contusa, admodum putredinem & vim malignam anthracis emendant.

Bacca matura herbæ Paradis, secta con-

717

tufave, in pestilenti bono successu adhibetur, Oliua item matura siccata, in vitroque probatur.

Ficus vel vuae passae siccatae, Nucum iuglandium, Auellandarum nuclei rancidi, simul separatimve, cum Sale, addito interdum Fermento admouentur, vel aliis permiscentur.

Vuam passam cum Ruta probat Dioscor. Eadem cum Melle & Pice anthracem emarginare dicitur.

Vitellus oui cum Salis 3. j. idem praestat. Quibus & Mel, Ficus, Farina, succus Scabiosae addi possunt. Vel dissoluitur Vitellus bene salitus cum Aceto, sicque apponitur, additis etiam aliquando aliis succis.

Emplastrum conueniens: R. Spicas bulborum Allij duas, Rutae p. j. Ficus num. quatuor, Fermenti 3. β. Salis 3. j. β. Piperis 3. β. contundantur.

Vel sic: R. rad. Cucum. asin. vel Bryoniae 3. ij. Salis nitri 3. j. fellis Porri parum exiccati 3. β. farin. Lupinorum 3. j. Terebinth. parum, subige.

Aliud: R. sem. Sinapis 3. β. farinae Lupinorum vel Orobi 3. ij. Ficum 3. j. gummi Ammoniac. dissol. in Aceto 3. iij. Terebinth. parum, misce.

Stercora Gallinarum, Columbarum, Passerum, Ouium, Bouum, vel sola admota, egregie maturant, vel parum cōtemperata, Melle aut Aceto, vel Farina aut Vitello oui, aut Fermento. Interdum Sapo stercorei additur, Acetoq; subigitur. Humano si vti velimus, quod adeo commendant, exiccatum illud potius ceteris miscebitur.

Fuligo camini, Fermento, vel Vitello oui excepta, addito Sale, utilis. Quā ratione & Carbo quercus usurpari potest. Vti & hoc vnguentum: R. Aluminis 3. ij. Salis gemmae 3. β. Mellis q. s. misce.

Nitrum cum Terebinthina mistum, similiter conuenit.

Succi enarratarum plantarum, vt Scabiosae, Consolidae, vel Tapfi barbati, illinuntur; vel farinis inspissati, vel additis Vitellis ouorum, applicantur.

Oleum nucum, vel Rosae cum Sale, Melle, addito interdum & Aceto, inungitur.

Gummi ammoniac. in Aceto dissol. cum ol. Liliorum & Cera mistum, anthracem dissoluit, illiusque virus elicit.

Theriaca, Mithridatum, quod non tantum venenum alliciant, vt in bubone pestilenti dictum, sed & maturent, vtrique anthraci, vel sola, vel in Cæpa excauata, aliisve herbis fructibusve permista, apponuntur.

Sapphirum gemmam carboni circumductum, & postea supra carbonem ligatum aliquandiu, valde prodesse, aliqui asseuerant.

Traduci carbunculum in alium locum, vbi minus nocere possit, putatur, si Scabiosa contusa in loco sano ligetur, atque Athanasia interim carboni imponatur.

Vlcus quod anthrax maturatus est sua sede vel omnino vel ex parte, recedens post se relinquit, ceterorum vlcum modo, sicuti in illis dicitur, curabitur.

Herpes miliaris, *Stech/ Zittermol/* sponte nonnunquam siccatur, & abscedit, vel facili negotio, vt si saepe saluā ieiuni hominis illinatur, sanatur, vti & Phlyctenodes: Esthiomenus der Wurm difficiliter curatur, & sine gligatur, in impetiginem pforam, vt illic dictum, abit.

Curatio horum, cum a bilioso, falso & acri humore procedant, in multis conuenit. Nam quod euacuationes attinet, hæc omnibus eiusmodi humoribus, qui causam præbent, repurgandis accommodantur; sic procedendo, vt leuioribus primum faeces & communia excrementa educamus, postea fortioribus sanguinem ab illuue dicta seu ichoribus mundum reddamus: Quæ ad præcautionem in illis, qui hisce vitiis obnoxij sunt, & in illis qui his iam affecti sunt, vt cura felicius procedat, administrantur. Quorum remediorum formas, in aliis morbis biliosis & febribus proposuimus, & in scabie vltcrius describemus. Sanguinis de tractionem quod attinet, hic nisi aliud quid moneat, non adeo erit necessaria.

Alterantibus, calore & acrimoniam horum humorum contemperamus & emendamus, in febribus quoq; expositis medicamentis, & diæta cōuenienti: topicis verò in vitroq; herpete vtimur; ab initio admodum siccantibus, & quæ acrium illorum humorum

*Herpes miliaris
& Esthiomenus,
curatio.*

vim refrigerando retundunt: qua ratione miliaris facile sanabitur, aliquādo & esthiomenus, qui & si serpat, adhuc amplius siccantibus vtemur, illisque quæ putridam illius carnem, validè abstergendo, vel exedendo aut absumenda à sana, ne eam vltius inficiat aut corrumpat, repurgent.

Inter ea quæ siccando & acrimoniam reprimendo hinc profunt, sunt Plantago, Polygonum, Agrimonia, Bursa pastoris, Rubus, Ligustrum, Vitis folia aut Capreoli, Solanum, Lens palustris: quæ contusa adhibentur.

Vel sic: R. Agrimonie, Plantaginis vel etiam alterius, vt & Myrti vel Oleæ sylu. recentium ad M. ij. cōtundantur, addendo Sumach, corticum Granatorum ana ʒ. j. β. farin. Hordei vel Lentium ʒ. ij. vel coquantur in Vino austero, vel Vino & Aceto, & contundantur, pro Cataplasmate.

Emplastrum de Arnoglossa in Anthrace expositum, hinc quoque, additis Gallis, corticibus Granatorum, Aristolochiæ rot. in miliari proderit. Est & emplastrum de tribus Granatis paratum, ad miliarem vtile.

Succi enarratarum plantarum, vt & Granatorum illinuntur, idque per se vel additâ quarta parte Aceti aut amplius. Aquæ prædictarum plantarum vnâ cum Rosacea similiter cum Aceto nonnunquam vsurpantur, si præsertim in tβ. β. Caphoræ ʒ. ij. dissoluatur.

Acacia, Hypocistis, dissoluta in aliis succis vel Aceto egregiè siccando & constringendo profunt; & ne serpent, prohibent: additis quandoque & aliis id agentibus.

Liquor seu succus exudans ex Ligno viridi dum crematur, vt Vitium sarmentorum vel Quercus, inunctus, prodest; cui & alia siccantia misceri possunt.

Validius siccant sequentia composita: R. succorum Plantag. Polygoni, vel etiam aliorum ad ʒ. iij. Aceti ʒ. j. farinæ Hordei tantum vt in vnguenti formam redigatur.

Magis siccant si loco farinæ addantur pulueres Balauft. Gallarum an. ʒ. ij. Boli ʒ. β. misceantur.

Vel sic: R. succorum Plantarum prædictarum cum Aceto vt dictū, ol. Rosacei omphacini, Myrtini an. ʒ. iij. bulliant ad consumpt. succorum addendo pulueres prædi-

ctos vel cort. aut putaminum Granatorum, capularum Glandium an. ʒ. ij. rad. Aristolochiæ ʒ. j. Cerae modicum, pro vnguento.

Magis exiccat, & ne serpat vltius in esthiomeno, cauetur sequenti: R. succorum prædictorum cum oleis, inuicem coctorum vt dictum, vel non coctorum, vt efficaciores sint succi, adde Lithargyrii ʒ. β. Tuthiæ, Plumbi vsti & loti, Antimonij, Lap. hæmatit. vel Cadmiæ, ana ʒ. ij. Aeris vsti vel Rubiginis ferri, Aloës ana ʒ. j. Corallum & Spodium addi quoque potest, agitentur in mortario plumbeo cum succis & oleis diu, cum pauca Terebinthina, vt fiat nutritum: vel si cocta sint cum pauca cera, fiat vnguentum.

Abstergens egregium: R. succorum Absynthij vel Chelidonij maioris, vel Parietariæ vel Enulæ, vel Rutæ ad ʒ. iij. Myrrhæ ʒ. ij. Thuris ʒ. β. Salis ʒ. j. farinæ Lentium q. s. fiat illitio: vel adde farinæ Lupinorum, Fabarum, Hordei, q. s. vt fiat emplastrum. Si Omphacij ʒ. j. addas, potentiùs putredinem auferet.

Vel sic: R. Lithargyrii ʒ. iij. Sulphuris ʒ. ij. Nitri vel Salis gemmæ ʒ. j. Aeruginis aeris ʒ. β. cum Melle vel Omphacio fiat vnguentum.

Alumen cum sæce Vini inunctum, illud quoque admodum præstat.

Atramentum scriptorium, ob Alumen, Vitriolum & Gallas mirè siccatur, inunctum.

Vnguentum Pompholygos, album Rhazis, additis siccantibus, vt Alumine, Nitro, in vsu sunt.

Fimum Caprarum syluestrium, Dioscor. laudat, alij etiam Vaccinum, cum Vino vel Aceto decocta.

Pulueres ex capitibus Piscium salitorum veluti Halecum; item Lana & Corio, cort. Pini, vstis eousque vt puluerisari possint, admodum siccant, inspersi herpeti: vel Succo aliquo, vel Omphacio, si admodum serpat, excepti, inuncti.

Vel: R. ex vstis illis pulueribus ad ʒ. ij. rad. Aristol. rot. Balauft. Myrrhæ an. ʒ. j. Olibani ʒ. j. β. fiat puluis subtilissimus, inspergatur herpeti priùs fricato parum, & inuncto oleo Fraxini. Probatum & puluis Testarum fornacum Diosc.

Ablutio vel fons aut illitio in vtroq; herpete

721

pete conueniens, ex aqua fit, quæ ex rad. Lapatij in talleolos dissecta, & in Aceto per diē vnum aut alterum macerata, donec id ferè imbiberit, exstillatur. Vel ex corticibus Cicti, eodem modo infusis & destillatis elicitur. Quibus aquis si Alumen aliudve amplius siccans addatur, ante destillationem vel post, efficacior erit.

Vel sic: R. herbarum prædictarum ad M. iij. quibus & folia Myrti, Oleæ addi possunt, rad. Lapatij, Aristoloch. an. 3. j. cortic. Gran. Gallarum an. 3. vj. Lupinorum 3. j. sem. Myrti 3. β. Acacig, Hypocistidis an. 3. vj. decoquatur in Aqua extinctionis ferri, additâ etiam Vini austeri parte: Pro lotionē herpētis, esthiomeni, cui & Thus & Myrrha ad maiorem deterfionem ad 3. β. addi possunt, vel in ea decoqui.

Vel Lixiuio aut vrina inueterata abluitur, in quibus ex præcedentibus quædam decoqui possunt.

Idem fieri potest Aqua vel Aceto in qua Vitriolum dissolutum sit.

Vel fortioribus, inter quæ hoc admodum profuit sæpe: R. sublimati 3. j. β. Lythagyr. 3. ij. Boracis 3. β. Camphoræ 3. j. coquatur in 3. iij. aquarū conuenientium, & madesiat herpes. Aliis erodentibus herpetem serpentem, ne vltius feratur, sistimus, qualia etiam alibi in vlcerebus depascētibus explicabuntur.

Vapor ex decocto sequenti similiter proderit: R. radic. Lapatij 3. iij. Chelidon. maior. M. j. Aluminis, Sulphuris an. 3. j. Salis P. j. Vini optimi & Aceti vt superemineat; coquantur, & vapor excipiat, ita vt herpetem tangat.

Plumbi lamina tenuis supra vinctos herpetes apposita, vtilis, siccabitque potentius, si prius in Aceto vel Aqua salsa aut aluminosa madesiat.

Fricare corruptam in herpete esthiomeno carnem, quousque sanguis effluat, vtile; tuncque abstergentia & auferentia adhibita melius operabuntur.

Cauterio sæpe aufertur illud quod corruptum est, vrendo: idque actuali potentialive, vt in anthrace dictum.

Scabies cum plura sub se comprehendat genera, & species: veluti inter humidus sca-

biem vulgarem, feram, & manantem, seu tineam & terminthum, epinyctidem: inter ficas, pruriginem, impetiginem, pforam, & lepram Græcorum seu pforam deteriorem; nos de omnium curatione, vti & de pruritibus, quia eas comitatur, cum eadem operâ sanetur, cura, simul agemus: Phlyctenarum verò curationem, cum in illis cuticula vera cute abscedat, & non alia ratione cum rumpuntur, quam aliæ cutis abrasiones curêtur, eò relegabimus.

Est autem inter humidus scabies Vulgaris mitior, quæ & facilius sanatur; in aliquibus tamen, eo nomine pertinax, quod sæpe redeat; quæ & si cura illi nulla adhibeatur, in deteriores commutari potest. Post hanc ea quæ Fera dicitur, contumacior est, quæ tamen si rectè tractetur, curatur; si malè, in peiores quoque abit; pertinacior adhuc est ea quam Manantem vocamus, quæ agrè sanatur, contagiosaq; est in iunioribus, atque capillos depascendo deformat admodum: facilius istis sanantur Terminthi & Epinyctides. Inter ficas, Prurigo facilius, Impetigo maiori labore, Pfora longè adhuc difficilias sanatur: & de vna specie in aliam, si negligantur, transmutantur, peioresque semper fiunt, recidiuamq; licet semel abigantur, facile veris & autumnii tempore faciunt: & tandem in pforam deteriorem, quam Lepram Græcorum vocant, abeunt; quæ incurabilis est, cum etsi alicubi, medicamentorum vsu, cesset, vel penitus ferè deleatur, tamen mox iterum repullulat, ægrumque turpiter, ac si crusta obrectus esset, deformat, ipsumq; consumit, prurituq; continuo molestat, adeo vt (vti dictum) pro elephantiacis, cum curari hoc malum nequeat, & quia lepra quoque vocatur, qui hac lue infecti sunt, ab illis qui hæc distinguere non norunt, habeantur & iudicentur.

In curatione autem horū, non adeo multum est discriminis, vt eam singulis priuatim accommodare necesse sit. Nam quod generalia præsidia, quæ euacuationis & alterationis causâ vsurpantur, concernit, cum à biliosis, acribus, falsis, malignisq; humoribus, vt in causis dictum, hæc procedant, hisce euacuandis, sanguinis detractiones purgatio-

Tinea,
Termin-
thi, Epi-
nyctidu,
Prurigi-
nis, Impe-
tiginis,
Pfora,
Lepra
Græcorū
curatio.

nesq; generales & particulares, alterantiaq; diuersa accommodabimus, plura pauciorave, eaq; leuiora fortiorave vsurpando, prout vitia hæc magna leuiorave sunt: habitâ interrim & totius corporis constitutionis ratione, & quibus præsertim excrementis abudet. Vti in singulis agédi modis nunc ostēdetur.

Sanguinis è corpore euacuatio aliqua, in scabie humida, illiusq; speciebus, nisi ætas aut aliud impediât, fieri debet, cum illius causa antecedens, serum scilicet falsum, biliosum & acre, in sanguine lateat, & cū sanguis educitur, portio quoq; illius exhauriatur: eoq; magis faciendâ, si simul adsit plethora, cum tunc ob illius copiam, pustulæ frequentiores erumpant & inflāment. Fitq; hoc vena secta aliqua generali, vel etiam particulari illius membri, quod priuatim eâ laborat. In sicca quoque scabie, etsi tales non sint pustulæ humidae, tamē quia magna sanguinis impuritas, eo nomine quoque sanguis detrahendus, idque rectius, si rubedo cutis, vt in prurigne sit, illius affluxum, & calorem demonstrant. Talis autem euacuatio, venæ sectione ante purgationem facta, & certo tempore iteratâ perficitur. Scarificatione item singulis mensibus vel temporibus facta, adhibitis cucurbitulis, vel suctione sanguisugarum. Naturalis itidem sanguinis euacuatio, per menses fieri solitæ, vel per hæmorrhoides quibusdam naturis consueta, si suppressa sit vel non decenter fiat, cum hæc sit naturalis, & proin necessaria, omnino promouenda; sicuti (quo pacto fieri debeat) in horum defectibus expositū fuit.

Purgationes per inferiora, in scabiei humidae & siccae speciebus omnibus, ad humores illos repurgandos instituuntur, sæpeq; si impurum admodum sit corpus, erunt iterandæ, & diu aliquando in p̄fora, deteriore præsertim, indies semel, bis, vel alternis saltem diebus ad dies multos, vel etiam per mensis spatium, si ferre possint, continuandæ, iterumque veris & autumnii temporibus repetendæ. Hoc autem perficitur medicamentis, quæ leuiter aut validius, prout affectus exigit, & vires ferunt, naturam sollicitando, biliosos, falsos & acres illos humores, ex intestinis & è venis meferaicis primū,

mox etiam à reliqua sanguinis massa, illius beneficio expurgare, & sanguinem proin repurgare dicuntur, addendo semper quæ humorum illorum acrimoniam retundunt: & præcipuè ex cathartidis ea eligendo, quæ non nimium corpus inflamment.

Qualia passim in multis aliis affectibus, ab eiusmodi quoque humoribus tam biliosis quàm melancholicis excitatis, hinc inde variis formis descripta sunt, purgantia mitiora fortioraque: in primisq; in febrium intermittentium, & cōtinuarum putridarum, purgationibus; tam illæ, quæ venæ sectioni, aut ad aluum facibus primū repurgandâ, cæteris præmittuntur, quàm cathartica validiora, & quæ in ea præcedunt præparantia, & quæ successiuè repetuntur: & in synochi erysipelatodis curatione, apozema illud, quo morbus hic præcauetur. Atque in melancholiæ vtriusque curatione, multa purgantia proposita hic quoq; vsurpari possunt. Quibus & sequentia addere possumus.

Serum lactis & præsertim caprini, vel serum, quod dum caseus sit, ab eo segregatur, & Aquam casei vocant, quæ amplius laxat, diu bibant ieiuni, mane & vespere, eâ quantitate, quæ aluum fluidum reddat: iunioribus etiam gratum remedium.

Vel diluantur in eo, vt melius operetur, aliqua, quæ cum infantibus exhibere volumus, dulcia & grata sint, veluti Manna, aut ex Syrupis sequentibus aliqui grati; vt Rosarum, Violarum, de Floribus persicorum: quorum vires, ne opus sit ingrata addere, intendere possumus, adiectis granis aliquot Diacrydij rectè præparati, vel diluti ipsius: vel illis dare illud ipsum cum Cydoniato aliquo, aliòve syrupo grato, aut saccharo: sicuti multa eiusmodi purgantia remedia grata inuenta sunt. In adultis etiam alios syrnpos medicamentosos sic permiscere possumus purgantes.

Possunt & succi Rosarum, Fumariæ, Lupulorum, Sero lactis, loco aliorum permisceri; additis etiam aliis, licet non purgent, nihilominus cōuenientibus, vt Buglossi, vtriusque Lapatij acuti, Pomorum & similibus.

Vel ebulliant in Seri lactis, vel lactis Caprini, aut iuris Pulli vel Galli decrepiti lb. ij. (nam

(nam cum citò corrumpatur, non oportet nimium vna vice coquere) Fumaria, Mercurialis, Beta, Lupuli folia, folliculi aut flores, Sambuci vel Ebuli teneritates, vel summitates; & vt melius operetur, Sena, Polypodium, Epithymum, Rosæ moschata; vnum vel plura, eaque quantitate prout operabitur, addito Saccharo vel Sapâ aut Melle, ad gratiam.

Syrupi vsuales eiusmodi impuritatibus in sanguine expurgandis etiam accommodati sunt: è leuioribus Syrupus Rosarum & Violarum, de Persicorum floribus, ex infusionibus vel succis, cum Saccharo & Melle cocti. Fumariæ, ex succo illius: Lupulorum ex succo illorum & fumariæ: Mercurialis, ex succo illius: Rhamni solutiu, ex succo baccarum illius, parati. Et his paulò efficaciores, syrupus Rosarum solutiuus cum rhabbaro, de Eupatorio cum rhabbaro, de Pomis regis Sabor, ex succo & sena: de Rhabbaro, ex illo & sena: Fumariæ composit. ex succo illius, epithymo, polypodio, myrobalanis, tamarindis, cassia: Epithymi composit. ex eo, fumaria, myrobalanis, tamarindis, agarico; Cichoreæ cum rhabbaro, fumaria & lupulis: Diareos, ex rhabarb. sena, agarico, carthamo, fumaria: Syrupus ros. solutiu. compos. cum sena, rhabarb. & agarico: de Polypodio, ex illo & aliis pluribus paucioribusve compositus.

Ex helleboratis syrupis, de Pomis compositus in vsu est: qui rectius sic paratur: R. Bugloss. Borrâg. cû radicibus an. M. ij, Fumariæ, Eupatorii vulg. Chamæpyth. Chamædr. Capillat. vnam aut alteram an. M. j. florum Bugloss. Borrâg. Stechados an. P. j. Passul. enucleat. 3. j. summitat. Thymi, Epithymi ana 3. 6. fol. Senæ 3. j. 6. vel plus, radic. Polypod. 3. ij. Hellebori nigri prius in vino albo macerati 3. ij. Schœnar. h. 3. ij. fiat decoctio, & in colaturæ s. q. adde succi Pomorum redolentium 3. xij. Sacchari lb. ij. vel minus, si minori mensura exhibere eum velimus; coctione reducatur in formam syrupi.

Est & alter à Montano descriptus, ex syrupo, ad lb. quinque, ex sena, rhabbaro, myrobalanis, epithymo, polypodio cocto,

cortic. hellebori nigri veri 3. vj. cum gario-phyl. 3. & 3. iij. liquiritiæ cocto paratur.

Inter decocta purgantia, quæ alibi passim (vt superius dictum) descripta sunt, sequens instar multorum erit, ex pluribus paucioribusve, præcipuè in hisce casibus conuenientibus, paratum, pro quinque, sex aut pluribus vicibus sumendum, quod R. radic. Lapathij 3. iij. Graminis, Asparagi, Rusci, Enulæ, Liquiritiæ an. 3. j. 6. Fumariæ, Mercurialis 3. ij. Polypodij 3. iij. herb. Cichorij, Dentis leonis, Sonchi, Buglossi vtriusque cum radicibus, Scabiosæ, Fumariæ, Lupulorum, Mercurialis, Capillarium, quæ haberi possunt, Eupatorii vulgaris, Endiuæ, Hepaticæ, Acetosæ, Violaræ, Lactucæ, Melissæ, ad M. v. vel vj. florum Cordialium, Nenuph. Tapsi barbati, ad P. iij. florum & follicul. Lupuli, summitat. Thymi & Epithymi an. P. j. seminum Anisi 3. ij. semin. Cuscutæ, Melonum, Acetosæ an. 3. j. semin. Carthami conuassati 3. iij. Passul. enucleat. 3. ij. Prunorum paria vj. Sebesten vel Iuiub. par. viij. Tamarind. 3. j. 6. Infundantur radices & semina in Vini albi lb. j. & macerentur aliquandiu, postea omnibus affundatur Aquæ q. s. addendo interdum decoctum Guaiaci, vel Aquas prædictarum quoque plantarum, vel etiam Absynthij, decoquantur, colentur, colatura Saccharo addito vel aliis dulcoretur, & Cinamom. aliisve aromatizata, tot vicibus, prout operabitur, vt dictum, si mitius purgare volumus, bibatur.

Vel si amplius operari debet, in colatura dicta, calente adhuc, infunde fol. Senæ 3. iij. vel iij. denuoque effervescent, colentur, & dulcorata, toties quoque, vel prout deiectiones mouebit, exhibebitur: Vel si decoctum ad vsum diutius operari velimus, geminatis omnibus, Saccharoque ad lb. 6. addito, in formam Syrupi mediæ vel perfectæ decoctionis redigemus, illiusque quantitatem decentem, quam semel exhibendo, & quantum purget obseruando, cognoscemus, exhibebimus; vel dilutâ syrupi portionem cum aquis Buglossi, Fumariæ, Capillorum veneris, aliisve propinabimus: vel cum pulpa Cassiæ & Tamarindorum in formam

electuarij, per vices exhibendi, redigere possumus, Diacrydiumque simul, vt melius operetur, addere.

Præcedenti decocto cum Sena facto, Soldanellæ folia quoque incoquere possumus; vel in robustioribus, deterioreq; scabie, Hellebore nigri 3. iij. vel iij. & circa finē ex Myrobalanorum quinq; generibus ad 3. j. conficatas in oleo, infundere, vti & Rhabarbarum, Agaricumque, vel Mechoacam cum suis correctiuis, & post expressionem, Saccharum addendo, in formam Apozematis vel Syrupi redigere, meliusque tunc operabitur.

Huic decocto succi etiam vel syrupi Fumariæ, Lapatij, Lupulorum, Pomorum redolentium, Buglossi vtriusque, Rosarum possunt incoqui: vel hi succi bonâ quantitate sumi, & in illis Sena, Rhabarbarum, Agaricus aliæque infundi, vel etiam parum decoqui, & cocta exhiberi, vel in syrupū prius coctione redigi.

Ex succis syrupus talis fieri potest: R. succi Pomorum redolentium 3. iij. succi Rosarum incarn. 3. iij. succi Fumariæ, Lupulorū an. 3. ij. succi radic. Lapatij & rad. Betæ an. 3. j. succi Mercurialis, Borrag. Buglossi. Acetos. an. 3. j. decoquantur cum Sacchari æquali portione ad consistentiam, aromat. Cinamom. Si Sena, Rhabarbarum aliæve infundantur, efficacior erit.

Vinum purgans ex aridis paratum, pro quinque vicibus, quod postea repeti potest: R. rad. Lapatij acuti vel Hypolapathi, quod rhabarbarum monachorum vocant, 3. ij. radic. Cichorii 3. j. rad. Enulæ 3. vj. cort. Tamaricis vel Fraxini & Ebuli an. 3. j. herb. Fumariæ, summit. Lupul. Mercurialis, Eupatorii vulgat. cannabinae dictæ, Capill. veneris vel Polytrici, Absynthij an. 3. ij. flor. & follic. Lupuli vel Persicorum & florum Cordialium an. 3. j. sem. Anisi 3. ij. fol. Senæ 3. ij. Thymi, & Epithymi 3. j. rad. Mechoacæ vel Bryoniæ 3. β. Zingiberis 3. j. conuassentur pro Vini tē. v. vel vj. macerentur ad vsum, vt dictum. Posset & Soldanellæ folia addi, & parum Hellebore nigri, quod tutius in Vino vsurpatur.

Vel sumantur Musti receter expressi, aut Vini quod iam deserbuit, mensur. viij. ad-

dendo fol. Senæ 3. x. ij. Mechoacæ, radic. Zarsæ parill. Salsafra an. 3. iij. Absynt. Maj. stent in dolio ad vsum; non ingratum est.

Aliud decoctum vt in multis morbis curandis, sic & in scabie, quæ sæpe recidiam facit, triginta vel amplius dierum spatio bibitum, eam præcauet & sanat: R. ligni Guaiaci rasi 3. j. Zarsæ parillæ 3. vj. radic. Cichor. Liquirit. an. 3. β. coquantur, & colentur, & pro vna dosi infunde Senæ 3. β. Mechoacæ 3. j. Zingib. 3. β. & in expressione dissolue, syrup. Ros. solut. vel succi Rosar. 3. β. aquæ Melissæ 3. j. misce pro vna vice.

Infusum Hellebore, vel decoctum, vt in aliis pertinacibus & melancholicis morbis, sic & in deterioribus scabiei speciebus multum efficit. Fitque ex radicibus fibrosis Hellebore nigri, illius, quod verum Dioscoridis Dodonæus esse statuit, & Astrantiam nigrā vulgus appellat: vel alterius Helleborastri dicti, flore vel viridi, vel purpurascēte, quæ & mitiores sunt quàm Hellebore albi, quibus tamen etiam in robustioribus vti possumus: detrahiturque cortex de fibris, reiecto medullio, (qui si ægrè abscedat, prius in Vino fibræ emolliri possunt) cuius corticis R. 3. ij. vel 3. iij. fol. Senæ, vt operationē illius promoueat, 3. ij. infundantur in Passio seu vino dulci generoso, vel Oxymelite, si helleborus albus sit, aut aqua exstillata vel decocto Anisi, addendo pulueres Gariophyllorum, Cinamomi, Zingib. macerentur in loco calido, leuiter ebulliant, colentur; adde decoctum fructuum, Passularum, Prunorum aliorūve laxantium, vel syrupum de Poly-podio, de Rosis, alijsve: & bibat. Fit & extractum ex Hellebore nigro per infusionem illius talem, sæpe iteratam, sensim postea inspissando ad ignem, vel in balneo Mariæ; Cuius portiuncula adhibetur.

Quidam empiricus decocto Stibij calcinati cum Zarsæ parilla, additis etiam alijs, perniciosas sanabat scabies, aliosque morbos diuturnos & pertinaces.

Potiones aliæ, electuaria & pilulæ variæ alibi, vt dictum, exposita, in hanc rem quoque exhibentur; vtendo præsertim ex vilitatis mitioribus, pulpâ Tamarindorum & Cassiæ, Mannâ, elect. Lenitiuo, Diacalsiâ, Diaprunis

729
prunis, Diacatholico: & fortioribus diagri-
diatis, vt electuario Diaprunis solutio Dia-
sebesten, de succo Rosarum, Diaphoenico,
trochiscis de Violis solutiuis, & electuarijs
lapidem lazuli recipientibus, vt confect. Ha-
mech & Diasena, de Pilulis de Fumaria, de
Eupatorio, de Rhabbaro, & ex fortioribus
de lapide Lazuli, de quin; generibus My-
robalanorum.

Per sudores factæ euacuationes, corpore
prius decenter purgato, cum & ex superfi-
cie corporis humores falsos biliosos prauos
euacuent, quod alijs exhibitis purgantibus
non adeò fieri potest, plurimum proderunt:
tum in omnibus humidæ scabiei speciebus,
tum & in siccæ; etsi enim corpus amplius
siccent, tamen auferendo causam, plus pro-
derunt quàm oberunt; sicuti & naturam in
imperigine & psoa sponte videmus per su-
dore & halitus vehementes eiusmodi eua-
cuationes moliri.

Quam ob causam non solum aëre calido
in balneis siccis (de quibus in topicis agem⁹)
& exhibitis insuper sudatorijs, hi semel at-
que iterum promouentur; sed & in pertina-
cis scabiei speciebus, vel perseverantibus,
vel sæpe remeantibus, hi per multos dies, se-
pe & ad mensis spatium per vsum decocti
Gaiaei, Zarsæ pillæ, aliorumve, eadem ra-
tione, sicut in lue venerea, indies concitan-
tur & continuantur: non tamen eâ adhibita
cibi parsimonia, vt in illis fieri solet, idque ne
corpus nimium intrinsecus exiccando, hu-
mores acuamus potius quàm reprimamus.
Semper interim purgationes hebdomada-
tim, vel etiam per interualla, triū quatuor-
ve dierum intermiscendo. Qua ratione eos
egregiè & perfectè adhibitis simul topicis
sæpe sanauimus.

Quæ alterationis causâ, vt corporis humo-
rumque mala constitutio emenderetur, vsur-
pantur, vt & illa quibus necessariò ad cor-
poris conseruationem vtimur, sic in victus
ratione primùm institui debent, vt parciùs
cibentur, ita tamen ne per inedia humo-
res acuantur aut concitentur; ciboq; vtan-
tur euchymo, minusque excrementitio, tem-
perato, humidoque potius quàm sicco, & ad
frigidum magis quàm calidum inclinante:

cauendo proin à falsis, acribus, aromaticis,
vinoque nimium corpus inflammante; aëre
vtantur libero, somno temperato, corpusq;
sæpe exerceant, eousq; vt & per insensilem
& apertam transpirationem, excrementa
exspirent.

Medicamentosa alterationis gratiâ exhi-
bitâ, humorum acrimoniam temperie suâ,
vel etiam frigiditate & humiditate, vt & vi-
scerum caliditatem, hepatis inprimis corri-
gere debent, & si quæ vitia, veluti obstru-
ctiones aliæve simul adsint, emendare: idq;
per conseruas, condituras, syropos, aquas,
Buglossi vtriusque, Violarum, Rosarum, Ci-
chorij, Nenuph. Capill. vener. Citri: pulueres
Triasantali, Diarrhodon: aliæque innumera
in febribus, alijsq; calidis & melancholicis
morbis abundè descripta. Inter quæ & Aci-
darum aquarum potus, aliquandiu conti-
nuatus, corpus plurimum alterat. Dein &
trochiscos de Viperis exhibitos cum cōser-
uis æquè in psoa puerua atq; elephantia-
si prodesse docent aliqui. Et Laccæ ablutæ
3.j. cum decoctionis Myrti 3. iij. præserua-
tionis causâ in impetigine propinant.

Localia remedia, quæ scabiem tam hu-
midam quàm siccam, pruritusq; comitem
curare & præseruare debent, talia esse oportet,
quæ in cute impactos & sub ea latentes,
vellicantes humores educant, illorumque
acrimoniam infringant, eosque postea re-
soluant, cutemque immundam à sanie, pu-
re, crustis, squamis, furfuribus repurgent, ra-
samq; reparent, & si calor aut leuis inflam-
matio accesserit, eam alterent. Quod reme-
diis illis perficitur, quæ vi siccante & deter-
gente humores absumant, cutem abstergât
& sanent, admistis simul frigidis, & impri-
mis acidis, in scabie tam sicca quam humi-
da, ad bilioforum & salforum humorum a-
crem vim retundendam, pruritusque se-
dandum, quæ & in scabie vulgari, fera, vt &
termintho & epinyetide, inflammationem,
quoque, quæ adest simul compescunt. Dein
& emollientia addendo, quæ in humida, sca-
bie crustas, in sicca squamas & furfures e-
molliendo, abscedere faciant. Quæ omnia
sequentibus modis præstantur.

Fricitio quæ vnguibus aliòve modo fit,

eousque donec tubercula exigua eleuentur, aut cutis laceretur, humori prurienti, exitumque querenti viam aperiens, voluptatem parit maximam, quæ tamen ob læsionem mox in dolorem lancinantem conuertitur, quo nomine licet aliquo pacto noceat, scabiesque erumpentis causa prima fere sit, tamen quia humorem educit, & pruritus tantopere molestum compescit, non erit, nisi ratione loci grauiora incommoda adferre possit, semper impedienda, præsertim cum ad eam faciendam, tantopere impellantur, ut ab ea abstinere nequeant; sed ita dirigenda, ut pro ratione humoris redundantis, & loci, dura vel mollis aut mediocris, uti frictionum differentiæ describunt, concedatur.

Balnea per infersiones facta, cum corporis maiorem partem attingant, in scabie, quæ illud passim infestare solet, præcipue usurpari consueuerunt, tam naturalia quam artificialia, sicca vel humida. Et si in certa corporis parte illa resideat, priuatim hæc illi tantum adhibenda, eaq; vel in balneo immergenda, vel balneo illa ablunda fouendaque erit.

Inter naturalia balnea, natationes in Aqua communi, dulci dicta, proderunt, cum pruritus frigiditate sua sedent, crustas madore suo molliant, & terrestreitate quam plerisque, inesse aquis, in calculi causis demonstrauimus, simul exiccent: eoque magis si aqua lutosa sit, aut alioquin veluti calcem aliquam in se habuisse, cum coquitur, deprehendatur. Quales eiusmodi aquæ, diuersis in locis, licet dulces & puræ appareant, inueniuntur, & non solum ad scabiem, sed & alios morbos sanandos frequentantur. Quæ omnia, calefacta adhuc melius præstat, si in ea diutius moram trahant, balneumque ex ea sæpe repetat, cum tunc humores rectius educantur atque expurgentur, unde etiam illius solo usu scabies mitior adhuc, vel etiam pertinacior, si magis siccet, sæpe sanatur.

Quod longe efficacius hæc aquæ, si illis pro balneo vrantur, molitur, in quibus sulphureus odor, bitumen innatans, salus, acidus fapor, sulphur, asphaltum, sal, atramentum, inesse manifestè ostendunt, & proin thermis eiusmodi vrantur. Inter quas Sulphureæ naturæ plerumque calidæ, quibus & bitumen

veluti pinguedo innatat, ad omnem scabiem sanandam, ceteris omnibus, cum non solum siccant, abstergant, digerant, sed & pinguedine sua emolliat, unde & in sicca scabie adeo profunt, præferuntur, ad easque tanquam extremum remedium se conferunt. Sed & Salsæ à natura aquæ, maris puteorumve, vel acidæ fontium, pro scabie sananda, humida præsertim, cum validius siccant, loco balnei usurpantur, tam calefactæ quam frigidæ, si in iis sæpe se lauent: aliæque thermæ, in quibus, etsi nihil tale appareat, tamen mineras inesse dicunt, naturæ artēve calefactæ, pro balneo, ut in aliis morbis, sic & in scabie usurpantur & frequentantur.

Artificialia balnea ad scabiem sanandam plerumque in usu sunt; eaq; sicca dicta, aëri calefacto incluso, corpus nudum ad sudores mouendos exponendo, per quos, humores scabiem gignentes, cum sero exudantes, exhauriuntur, madorque subortus crustas emolliendo aufert, calorque siccans, cutis abrasiones sanat. Quæ sicca balnea, etsi sola quandoque id efficere possint, tamen melius illud præstabant, si humida balnea, aut aliæ remediorum applicationes his simul iungantur, & vel in ipso balneo, vel mox post illud, quæ & tunc efficacius ob poros apertos operantur, adhibeantur.

Humida balnea in quibus sedeant, seque lauent, ad abstergendum, siccandum, emolliendum, & sudores quoque eliciendos, ex variis decoqui possunt, veluti ex herbis cum radicibus, ut Lapatio, Scabiosa, Enulâ, Quinquifolio, Bistorta, Tormentillâ, Plantagine, Fumariâ, Tapso barbato, Filice, Ebulo, Arthemisiâ, Anetho, foliis Quercus, Hederæ & Salicum, Lupulorum: & radicibus valde efficacibus, Bryoniæ, Serpentariæ, vel Ari, Cucumer. sylvestris, addendo, eoque magis si sicca sit scabies, herbas cum radicibus Acetose, Saponariæ, Parietariæ, Betæ, Maluæ, Borraginis, Altheæ, rad. Liliorū: atque odoratas, ut Origanum, Saluiam, fl. Chamom. Anthos, similiaque. Item ex Lentib. Fabis, Pisib. Cicerib. Lupinis, Roggâ, Hordeo, Furfure: seminibus Lini, Fœnogr. Cucurbit. seminūve aliorum Frigidorum dictorum. Ex his quædam in Aqua dulci, communi vel aliis prius expositis, deco-

733

decoquenda, addito interdum Lixiuio, vel aqua Fabrorum extinctionis ferri, aliisve: vel admiscenda ea quæ validè siccant, vt Sulphur, Sal, Alumen, Vitreolum, Tartarum, Gypsum vstum, Bolus similiaque.

E. G. paratu facilè sed efficax sic fit: R. rad. Lapathij & Bryoniæ ad tb. j. Enulæ quart. j. Serpentariæ vel Ari quart. ß. Scabiosæ, Plant. Fum. Pariet. Maluæ ad M. vj. Fabarū & Lentium conquass. p. iij. Gypsi vsti tb. j. Sulphur. tb. ß. Salis quartar. j. Aquæ quantum labrum balnei capere potest, decoquantur, cui & Lixiuium addi potest.

Vel sic in scabie sicca, si præsertim ab vfu vnguentorū cutis tensa & sicca fiat: R. Maluæ, vel Altheæ, Violariæ, Lapathij, Betæ, omnia cum radicibus, Parietariæ, Scabiosæ ad M. vj. sem. Lini, Fœnogr. Furfuris, f. Cucurb. 3. j. vel plus florum Chamomil. p. iij. Sulphuris tb. j. coquantur.

Aliud vtile in sicca p̄sertim scabie: R. Sulphur. tb. ij. Salis tb. j. tereantur subtilissimè & cum Olei cōmunis tb. ij. optimè misceantur, macerādo aliquandiu in calore, vel potius leuiter coquēdo: postea funde in aquam calidā balnei, bene miscendo, in quo balneo æger per horam sedeat, & sudet, vti & post balneū in lecto, idque per triduum, & sanabitur.

Illitiones & affrictiones in scabiosis semel in die aut bis fiunt, abluēdo postea in balneo rursus, vbi etiā aliquando hæc administratur, vel statim post illa, poris apertis, vt in balneo dictum, fiuntque hæc diuersimodè.

E plantis, radix Lapathij syluestris acuti dicti, præ cæteris in vfu est, si eā coctā in Aceto cōmuni vel Scyllitico, corpus perfricetur: in scabie vtraque conueniēs. Quā etiam radice cōtusā cum Sale & Aceto, in balneo, vt mox se iterum abluere possint, scabiosi se fricare solent. Commune apud vulgus remedium.

Eodem modo radix Bryoniæ & Gentianæ vsurpata, in impetigine laudantur. Quibus omnibus si radix Ari vel Serpentariæ misceatur, sed minori quantitate, quia vrit, efficacius operabitur.

Hoc pacto & aliæ plantæ recentes crudæ vel parum coctæ, contusæ, cum Aceto simplicivel scyllitico, vel Sale communi vel Nitro vel vtriusque, addito interdum & Sulphure, a-

liisq; permistæ, affricari aut inungi possunt. Vt radices Enulæ, Pentaphyli, Bistortæ, Tormentillæ, Anchusæ, Cucumeris asini, Asphodeli, Brasicæ, Buglossi, Chamæleontis nigri, Ranunculi cum rad. Hellebori nigri, & folia Plantaginis, Scabiosæ, Fumariæ, Argemones, Vlmi, Chelidon. min. & cum pruritus vrget Potamogeti, & Boni Heinrichi.

Quibus & farinæ Lupinorum, Lolij, Ciceris, Hordei, Baccæ Iuniperi, Lauri addi possunt, aliæve. Lotum syluestrem & Nasturtiū cum Melle, inungit Diosc. Coriandrum, Absinthium, Rutam, Cucumeris folia & Porri, Rhus obsoniorum, Brasicam & Plantaginem, cum Polenta, vel Vua passa aut Melle, ad epinyctidas adinouet Dioscor.

Pomum Adami per medium dissectum, & vtrinque Sulphuris puluere conspersum, denuoq; iunctū, stuppisq; inuolutū, parū sub cineribus coctū, scabiosis membris affricatū prodest. Cuius loco Arantium sumi potest.

Semina Sinapis, Rapi sylu. Erucae, Nigellæ, Staphisagriæ, Bryoniæ, Tamaricis, cum Aceto illita, vel cum Oleo. Glandem vnguentariam cum Lotio illinit Diosc. & semen Heliotropij ad epinyctidas.

Ex enarratis plantis, quædam etiam pinguibus additis affricantur; veluti radix Lapathij cruda vel cocta, per se, vel additā radicis Gentianæ tertiā parte, cōtusa excipitur oleo vel Butyro, aut Axungiis, pro vnguento: ol. Laurino, admisto Zingibere excipit Diosc.

Vel: R. rad. Lapathij, Enulæ, aliarūve plantarum dictarum 3. ij. rad. Ari vel Serpentariæ 3. vj. incisa minutim decoquantur parū in Aceto, contundantur addēdo axung. Porci, vel Butyri 3. iij. pro vnguento: cui Sal & Sulphur quoq; addi possunt, aliæve. Si Argentū viuum addatur, vel tantillum sublimati, efficacissimum erit, in impetigine & psora.

Item: R. rad. Chamæleontis nigri 3. ij. ß. incidantur, contundantur cum axung. Porci, vel olei Laurini 3. iij. adde Sulphuris 3. ß. Aluminis 3. ij. Vitrioli 3. j. misce.

Iuniperi baccarum p. j. cum Salis cochl. j. optimè conteratur, & cum axung. Porci purgata, & liquata, vel oleis, parū ebulliant, dein axungia per pannum exprimatur: Atque inungatur,

Succi enarratarum plantarum commodius inunguntur, & præter hos etiam succi Mercurialis, Xyridis, Eupatorii, Abrotani, item Oleandri: addito quoque Sale, vel Sulphure & Aceto: aliisve succis acidis Arantiorum, Limonum, Citri, nonnunquam & Omphacio, & Acaciâ. Probatum & succus acris Cyclaminis, & Tapsiæ: Lac ficulneum pro scabie & pruritu inungit Diosc. In pruritu vero succus Hyosciami conuenit.

Acetum infusionis foliorum Oleandri admodum utile in scabie.

Aloë dissoluta in Aceto communi vel scyllitico, in impetigine confert.

Storax liquida cum duplo Aceti vel olei Rosacei aut alterius, scabiem sanat.

Resinæ & gummi Terebinthin. Laricis, Abietis, Pini, Oleæ Ætiop. Dioscor. Gummi arabic. Prunorum Amygdal. Vitis cum Aceto vel Oleo dissoluta, inunguntur.

Viscum cum splenio seu linteolo, epinyctidi imponit Diosc.

Sudor seu succus emanans ex Oleæ vel Corni arborum viridum stipitibus, illic ubi abscissi sunt, dum cremantur, inunctus prodest: uti & lachryma Vitis dum putatur.

Stercus Ouium Caprarumve cum Aceto, ad epinyctidas Diosc.

Fel Tauri inunctum, per se in impetigine, vel dissolutum. Sanguis Anserum pruritus tollit.

Salua ieiuni hominis, ut in herpete, sic & in impetigine prodest.

Oleum vitellorum Ouum & de Frumento: & pomorum Solani pomiferi, quæ aurea vocant, per macerationem factum, illudque in quo Carbores ardentes sæpè extincti sunt, inuncta profunt. Cedrinum commendat Diosc. & quod ex Oliuis syluestribus fit. Commendatur & in impetigine oleum de Erica, de Tamarice, de Fraxino, & Iuniperinum: & ad pruritus sedandum oleum feminis Ericæ uti & feminis Hyosciami, cum vnguento Populeonis inunctum, Petroleo in termintho quidam utebatur. Oleum Tartari dissolutum aliis oleis illa efficaciora reddit, uti & si olei Vitreoli guttæ addantur.

Linimentum ad scabiem communiter sic

fit: R. Butyri recentis vel olei Communis vel Rosac. ʒ. iij. Resinæ communis Abietis, vel Pini, vel Laricis (quas omnes Terebinthinæ nomine comprehendunt) dissolutæ in Vitello ouorum, ʒ. ij. vel iij. agitentur, probe, addendo Salis ʒ. vj. vel plus: Pro inunctione. Possunt & addi Sulphuris vel illius loco ut minus foeteat, Cerusæ ʒ. vj. & succus Arantiorum vel Limonum simul ad ʒ. j. permisceri.

Nutritum vel vnguentum, ex succis & oleis hoc pacto fieri potest: R. ol. Rosac. Viol. Nucum, Lini, Liliorum, Laurini, de vno vel pluribus ʒ. iij. succorum Lapatij, Scabios. Plantag. Fumariæ, aliorumve, additis interdum etiam acidis ut Arantiorum, Limonum succis, vel Aceti tantundem, scilicet ʒ. iij. Terebinth. vel Resinæ alterius dissolut. cum oleis ʒ. iij. Salis communis, Gemmæ, vel Aluminis aut Nitri ʒ. vj. agitentur probe donec in formam nutriti redigatur: Vel succi cum oleis ad succorum consumptionem usque decoquantur, omissaque vel parcius addita Terebinthinâ, cum Cera ex illis fiat vnguentum: sed cum, si succi remanserint, melius operetur, forma nutriti erit utilior.

Vel fiat vnguentum paratu facile ex duobus hisce, quæ ad scabiem sanandam ceteris præferuntur, nimirum Sulphure, viuo vel cocto (quod ubique cum describitur intelligendum) & Lithargyrio, vnum vel ambo, oleis solis, vel oleis & succis simul, ut dictum, in formam nutriti vel vnguenti redigendo, eâ quantitate ut commodè inungi possit. Quæ & solo Aceto succisque excepta, sine oleis adhibentur.

Cuius loco vnguento visitato de Lithargyrio, ex illo & cerusa, Oleo & Aceto parato, uti possumus: Vel de Cerusa simili fere modo, sed sine Aceto parato. Vel vnguento Rosaceo, vel albo Camphorato, addito Lithargyrio vel Sulphure aliisve.

Cito quoque vnguentum ex puluere Sclopetario, qui ex Sulphure, Nitro & Carbonibus fit, si oleis vel axungis excipiat, fit: quo scabiem sædam & diuturnam milites curare solent.

Efficaciora fient additis etiam aliis siccantibus, hoc pacto: R. Lithargyrii, Sulphuris an.

737

an. 3. vj. rad. *Serpentariæ* vel *Ari* 3. ij. puluerifata, nutriti prioris, eâ mensurâ, quâ describitur, subigantur, vel vnguenti (cûm media illius quantitas succis absumptis auferatur) duplicato pondere, addendo & *Syracis* liquida 3. 8.

Aliud simili modo miscendum: R. *Ceruse*, *Tuthiæ* vel *Pompholygos*, vel *Cadmia* fossilis, *Lithargyrij*, *Boli rubræ* vel *albæ* vel *Cretæ* an. 3. ij. *Sulphuris* 3. iij. *Tartari* 3. j. 8. gummi *Sandaracæ* vel *Sarcocollæ*, *Mastic hæ* an. 3. j. fiat puluis, misceatur nutrito vel vnguento vt dictum, cui & *Plumbum* vsum & *Antimonium* misceri potest.

Adhuc magis operabuntur, quod in peruersa scabie requiritur, si *Chalcitidis*, vel *fæcis Vini* vstæ 3. 8. illis simul permisceatur, vel olei de *Tartaro* 3. j. aut olei *Vitrioli* 3. j. aut *Argentum viuum* (quod præterquam, quod pruritus admodum aufert, etiam pertinacissimam scabiem sanat) *Terebinthinâ* exactissimè dissolutum, hisce illitionibus, ad summum 3. 8. quantitate, ne fauces exulceret, addatur: cuius loco tantillum *Sublimati* aliquando substituunt.

Præter hæc alia vnguenta pro delicatis & magnatibus præsertim sunt. Veluti ex vnguento *Citrino* nominato, quod etiam scabiem sanat, & cûm cutem simul venustam reddat, in faciei scabie præcipuè commodum erit illo vti: addito interdum etiam lacte *Virginali*.

Vel illius loco: R. *Ceruse* 3. 8. *Boracis* 3. ij. *Tartari* 3. j. 8. *Ierfæ* *Serpentariæ* 3. j. *Thuris*, *Nitri* an. 3. 8. succi *Limonum* q. f. fiat *Linimentum*.

In pessima scabie, etiam hæc vnguenta locum habebunt: R. *Chalcanti*, vel de efficacior. illius generibus *Myfi*, *Chalcitidis* 3. 8. *Squamæ* æris 3. ij. vel *Æruginis* 3. 8. *Aluminis* 3. iij. *Sulphuris* 3. j. *Aloës*, *Thuris*, *Myrrhæ* an. 3. j. 8. *Acaciæ* 3. j. infus. gummi *Arab. factæ* in *Aceto* q. f. pro *Linimento*. *Galenus* *Amarcam* vel *Passum* addit, resinam item *Oleæ* *Æthiop.* cuius loco nos alias resinas addere possumus.

In scabie manante seu tinea hoc conuenit: R. *Tartari*, *Nitri*, *Aluminis* an. 3. 8. *Lithargyrij* 3. j. *Sulphuris* viui 3. vj. *Hellebor.*

vtriusq; 3. iij. *Auripigmenti* 3. ij. puluerisentur & cum *Sapone molli* & *succo Lapatij* vel *Cyclaminis* fiat vnguentum.

Vel sic: R. *Lithargyrij* 3. j. *Aluminis*, *Nitri* vel *Salis gemmæ*, *Tartari*, *Sulphuris* viui an. 3. 8. cineris *Nucum combustarum* cum testis, & cineris *bulborum Allij* an. 3. iij. *Fuliginis* *furni seu camini* (cuius nigredo in hac pilosa sede nihil deformat) 3. ij. *Hellebori albi* & *nigri*, *feminis Staphisagr.* an. 3. j. fiat puluis, qui *Melle* & *Aceto* fortissimo & *bulbis Allij* tribus, ac *feminis Iuniperi* vel *Hederæ* 3. ij. contusis subactus, in formam vnguenti redigatur.

Vel cum oleo *Nucum* & *Ligni Iuniperi*, *Laurino*, & *Lucernarum*, additâ paucâ *Terebinthinâ*, excipiantur pro vnguento. Cum quibus oleis, si succi *Allij*, *Centaurij*, *Lapatij*, *Chelidonij*, *Betæ*, *Parietariæ*, *Scabiosæ*, *Fumariæ*, *Arantiorum*, & *Acetû*, æquâ cum oleis mensurâ addantur, & ad consumptionem ipsorum coquantur, ea nouis viribus instruent.

Efficacius etiam fit, hoc vnguentum, ad tinea curandam, si *Argentiviui* 3. 8. dissolutam in *Terebinth.* illi permisceas, vel *Cinabarim* aut *Minium*: Aut validius erodentia, addas; veluti *chalcanthi rubri*, hoc est, *Chalcitidis*, vel *lutei*, id est, *Myfi*, aut *Æruginis* æris ad 3. j. plus minusve, dosim hanc, prout ferre potest, augendo minuendove. Quæ quoque, si vnguento cum *Melle* & *Aceto* sine oleis parato addantur, adhuc longè validius agent, cûm vnâ uosa illis addita, vires horum aliquo pacto retundant.

Aliud vnguentum, quo multi tinea laborantes sanati sunt, citius sic fit: R. Vnguenti quo rotas aurigæ inungunt, *Rarensalbe* lb. j. adde *Sabinæ* fol. exiccat. 3. j. 8. *baccarû Lauri* 3. 8. *radic. Hellebor. albi* 3. ij. *Sulphuris* 3. j. *Argentiviui* 3. 8. vel plus, extincti cum *Laricea*, fiat vnguentum.

Alia siccantia varia his illitionibus, vt & aliis formis interdum miscent: *Cineres Erinacei* & *Hypocampi*, *marinorum*, laudat *Dioscorid.* alij cineres *Iuniperi* & *Fraxini*: Et pulueres terræ *Cimoliæ*, *Adarces* & *Cardamomi*. *Camphora* vnguentis permista pruritum tollit.

Vt minus quoque forteant, propter Sulphur & alia, hæc vnguenta, odorata, quæ tamen simul siccando etiam profunt, miscentur: veluti Stryrax liquida, quæ quia in scabie admodum utilis, maiori quantitate, & plerisque illitionibus addi potest. Vel olei Spicæ aut Iuniperi, alteriusve odorati guttæ aliquot, vel pulvis rad. Ireos.

In tinea, cataplasma conueniens paratu facile sed efficax sic fit: R. bulborum Allij ʒ. iij. fol. Rutæ, Sabinæ, Hederæ, Vrticæ an. M. j. nucleorum Nucum rancidarum num. v. f. Iuniperi ʒ. j. s. Fimi columbini ʒ. j. coquantur in Aceto forti: Et applicetur.

Fœnogræci farina cum æqua portione Pumicis, succo Allij excipitur pro cataplasmate, cui succus lacteus addi potest, Ficus vel Caprificus.

Argillâ pingui, qualis circa aquas thermarum reperitur, capiti impositâ, ita vt totum caput exiccata incrustaret, tineam pauperes sanasse obseruau.

Similiter in tinea pulueres aliquando insperguntur, capite prius vincto cum Melle & Oleo aliquo ex supradictis, vt hæreant.

Nitrum cum Thure aspergit Diosc.

Vel sic in eodem affectu: R. Pumicis ʒ. iij. Boracis ʒ. ij. Salis, Aluminis & Chalcitidis, vstorum an. ʒ. j. Thuris, Myrobalan. an. ʒ. s. Gallarum, Nucum cõmunium vel Cupressi, vstarum ʒ. j. s. fiat pulvis subtilissimus: cui & fortiora in vnguentorum pulueribus propolita, addi possunt.

Ablutiones priuatæ præter generalia illa balnea vsurpantur, quibus & crustas & vnguenta, si illis illiti fuerunt, abstergimus, vt noua adhibita rectius operentur: fiuntq; ex decoctis illarum quoque herbarum, & in primis ex decocto Pentaphyli, Lapatij cum radicibus, Scabiosa, & farina Lupinorum.

Aliud decoctum ex stercore Gallinæ, Ouium vel Caprarum cum Aqua factum, addito Lapatio, Plantagine, Agrimonîâ, Maluâ, Betonicâ, prauos humores elicit, si eo pars abluatur.

In Aqua cõmuni, vel alia ficiore, vt Ferrata, si Gypsum vstum dissoluatur, eaq; manus frequenter abluantur, aut aliæ partes scabiosæ, scabies facili omnis sanatur: habet

enim præter exiccationem, vim quandam leniendi, vnde & manus minimè asperas, vt calx, sed molles & nitidas, sicuti in operariis, qui gypsum manibus cum aqua miscunt, & tractant ad incrustandos parietes, videmus, reddit.

Sed commune coctû, vel fossile, Gemmæ dictum, vel Ammoniacum, vel Nitrum, si dissoluatur in Aceto, & eo liquore scabies tangatur vel abluatur, pruritus admodum sedat: eoq; magis, si Alumen crustû vstum, ve addatur, aliquando & Tartarum, & tunc in impetigine admodum conuenit; si nimis exasperet, potest aquis dilui, Myrrillorum, calicum Rosarum, Lapatij, vel Albumen oui addi vel Olea.

Vel sic: R. Gypsi vsti scutellam plenam, Boli puluerisati ʒ. iij. Salis ʒ. ij. Aluminis ʒ. j. Vitrioli ʒ. j. affunde Aquæ Mens. ij. Aceti vel Vini quartam partem mensuræ, agitentur, colentur aliquoties vt lixiuium, vel parum coquantur, aquaque separetur: Quæ partes scabie obsessæ madefiant, vel abluantur.

Idem Lacte virginali appellato, ex Lithargyrio, Aceto & Aqua falsa, vel Aluminosa, parato, factum, vtile erit: cui si succum Limonum addas, vel parum olei Tartari, efficacius erit, pro facie præsertim scabie tentata, vsurpandum.

In tinea, decocto caput sæpe abluatur, Altheæ, Maluæ, Betæ cum radicibus, Parietar. Abrotani, Absynthij, Marrubij, Centaurij, Betonicæ (propter caput) Adianthi, Sabine, Rubi folior. Cicerum, Pisorum, Fabarum, Lentium, Lupinorum, Fœnogræc. sem. Iuniperi, Hederæ, Sinapis, Nucis cupressi, Hel-lebori vtriusque: quæ probantur maximè, si in Lixiuio vel Aqua Fabrorû coquantur, addito Aceto.

In perueria admodum scabie & impetigine hoc erit conueniens decoctum, quod R. Lithargyr. auri lb. s. Aluminis ʒ. j. succi Plantag. Lapatij & Limonum an. ʒ. j. Aceti lb. j. s. decoquantur & philtrentur ad vsum: si Argëti viui ʒ. iij. addas, & simul decoquas, erit efficacissimum, vel Myfi aut Chalcitidis ad ʒ. s.

Vel Lithargyrium, Cerusa, Vitriolû, Sublimatum æquis portionibus coquantur, in aqua

741

aqua communi, aut Plantaginis vel Lapatij, aliave: madefiant certa loca.

Admodum efficax hæc erit, si Sublimatū in Aqua forti dissoluas, & illius postea cochlij. cum aliis aquis, vt Rosarum, vel Plantag. aliisve diluas, eamque adhibeas: experiendo primum vires illius in loco aliquo, & prout operabitur, plus minusve diluendo.

Aqua stillaritia ex Lapatio & Aceto in herpete descripta, scabiē quoq; sanat, vt & hæc: R. succi Lapatij acuti ʒ. iij. succi Plātag. ʒ. ij. succi Limonum ʒ. j. aque Rosarum ʒ. j. ʒ. puluerum Sulphuris & Salis an. ʒ. j. Lithargyrii ʒ. ʒ. Cerusæ ʒ. ij. Sublimati ʒ. j.

Vel hoc modo paretur: R. rad Lapatij acuti ʒ. iij. rad. Bryoniæ, Enulæ, Gentianæ an. ʒ. j. Sulphuris ʒ. j. ʒ. Argenti viui ʒ. ʒ. Aceti ʒ. viij. eliciatur aqua.

Lixiuum plerunq; scabiem egregiē abstergendo & siccando sanat, sive præsertim corpus dum in balneo sicco fudat, vel circa finem, abluatur, vel partes scabiosæ etiam extra illud, vt manus, pedes, lauentur: adhibito interdum, vt fieri solet, Sapone: maximeq; caput, scabiē & tineā affectum, vnde & crustæ & sordes, & vnguenta, quæ in pilis pertinacius hærent, hoc pacto rectius absterguntur. Quod efficacius fiet, si ex colatura sæpè iterata paretur, Cinerum sarmentorum vitis, caulium vel radicum Ebuli, stipitum Fabarum, ligni Iuniperi, Fraxini, additâ interdum vt fortius sit, Calce viuâ, vt Lixiuum dictum tonsorum paratur; adjicitur interdum Aqua extinctionis ferri, vel Vrina, aut Acetū, vel Muria. Quibus Sal, Alumen, Sulphur, Chalcanthum, addita, efficaciora ea reddunt.

Vrina in scabiē etiâ abstergendo prodest, magisque siccabit, si diu prius steterit, maximeque in vase æreo, vel à bilioso homine rubicundior defumatur.

Aquam in Quercuum stipitum per cariam absumptorum cavitatibus repertam, sunt qui probant.

Multa quoque alia remedia in elephantia describenda, in scabiē pessima conueniunt, quæ inde peti possunt.

Dropæ seu picatione appositâ & agglutinatâ super capitis pilosam sedem, atq; vbi

adheserit, iterum per vim detractâ, pilos crustasque, quæ altis infixæ sunt radicibus, curamque tineæ impediunt, radicitus euellendo, sanationem tineæ admodum promouemus, extremumque ferè in illis est remediū, quod Germani *Hauben suchen* vocant, infantesque aded metuunt, illiusq; timore ne fricent, cohibentur. Fitque dropax ex Pice, Resina, in Oleo dissolutis, ita vt dum calent, emplastrum ex illis supra telam extensum formari & applicari possit, & refrigeratum firmiter pilis & crustis adhærescat, maioriq; vi ea auellet, si vno emplastro, totum caput cōtegatur, minori si pluribus, cum facilius tunc cedant.

Exulcerationum omnium in superficie corporis occurrentium, seu solutionum cōtinui, quarum summa genera sunt, Excoriatio, Fissura, Vulnus, Vlcus, curatio in eo conuenit, vt cutis, caro, cæteræve partes disinctæ rursum concreuant seu consolidentur: quod naturæ solius est opus, medicusque duntaxat in hac operatione ministrum eatenus agit, vt impedimenta quæ illam remorantur, amoueant: quod & actu potentiaq; agentibus, vt in singulis hisce generibus ostendetur, perficitur: inter quæ, cum ea quæ siccant medicamenta, plerunque vsurpentur, vlcera omnia siccantibus sanari communiter dicitur, quæ tamen pro diuersitate generum exulcerationum, siccando plus minusve, variant; sicuti in singulorum cura, qualia esse debeant, demonstrabimus. Quam nos primum illis quæ superficiē tenus magis accidunt solutionibus, accommodabimus, vt cutis abrasionibus & fissuris quibusvis, dein & vltionibus, postea illis quæ altius plerunq; corpus subeunt, scilicet vulneribus & vlceribus diuersisque illorum speciebus.

Abrasiones, Intertrigines dictæ, à cutis attritione, per frictionem, equitationem, decubitus: per erosiones ab externis internisve causis (inter quas & vrina id in infantib; & coryza in naribus sæpè molitur) profectæ: Item per phlyctenas aut vesicas ab vrētib; factas, disruptas, excitatæ: Dein & Fissuræ, Scissuræ, Rime, Rhagades, in manibus, pedibus, labiis, podice, papillis, pedēdo mulieris, præputio in masculis, palpebris, naribus, auri-

Exulcerationū in genere curatio.

Abrasionum cutis seu Intertriginum, Fissurarū, Perionium, curatio.

auribus, alibive productæ: à frigore, calore, siccitate, humoribusve falsis & acribus: vti & Perniones à summo frigore in calce pedis plerunque nasci soliti: Eiusmodi affectus omnes cum eandem curandi rationem in plerisque ferè requirant, illam simul explicabimus: & si perniones in vlcera peiora desinant, ad illa tunc illorum curationem relinquantur.

Perficitur autem ante omnia causæ ablatione, quæ hæc produxit, vel illorum curam impedit: vt externas arcendo, internas vero, scilicet humores falsos illos & acres euacuando, illorumque prouentum impediendo, eodem modo vt in scabie hæc explicata sunt. Vel si causa commodè penitus auferri nequeat, vt saltem emendetur: vt si per equitationem originem habuerit, sella rectè accommodetur: si ex decubitu, quæ substernuntur talia sint, ne asperitate sua lædant; qualia corium tenue, panni molles, similiaque quæ ægris supponuntur, esse debent, sicque arte, vti dicitur, vt simul sanent, parari. Et si ab vrina in infantibus prodierit, sic illis in locis, ne vterius lædantur, muniantur.

Quod reliquam curam attinet, etsi natura sola cuticulam cutimque abrasam ex nutrimento, quo hæc nutriuntur, regeneret, & fissuras eodem interueniente glutinet, tamè cum cutis lacera in ambitu, quia mox siccatur, aspera fiat, illicque vbi crassior præsertim est callosa, madorque in nuda carne continuo exsudat, hæcque naturæ actionem impediunt, topica remedia loco fisso attritove adhibenda, vt hæc corrigant, sicque illarum sanationem procurent, circumferentiam cutis siccam & duram emollire debent, & leuiter sine morfu siccando humorem simul exhaurire, ac plus minusve vel emollire vel siccare, prout vel asperitas aut mador præualeat. Ad quod præstandum sequentia adhibentur remedia.

Sæuum omne inunctum lenit, & cum adipe sit siccior, sanat. Probatur inprimis Ceruinum, Hircinum, Hædinum; quibus panni linei vincti, loco attrito imponuntur, vel si ex decubitu facta attritio metuatur, aut iam adsit, substernuntur.

De Candela sebacea accensa sæuum de-

stillans, si digito excipiat, eoque post equitationem circa sedem facta attritio inungatur, remedium est, peregrinantibus vbique in promptu.

Adipes, Anseris, Anatis, Callinæ, Oesipū, cum leniendum maximè est: & adeps Vrsi in pernionibus, foli adhibentur, cum vero sanare simul debent, aliis siccantibus permisti vsurpantur.

Oleum Rosaceum, Myrtillorum, Cydoniorum, Amygdalarum amararum, vt de adipibus dictum, adhibentur. Oleum imprimis vitellorum. Ouorum, in labiorum & papillarum scissuris, vti & aliis, etiam solum ad motum, vtile. Dein & illud quod ex Nucis nucleo vsto exsudat: & quod ex Tritico fit, oleum quod in Rapa excauata, rursumque cooperta proprio operculo, stuppis inuoluta, & cineribus supposita, coxerit, valde profuisse vidimus, quod & perniones sanat.

Quibus & oleum eodem modo in excauatis Cyclaminis & Asphodeli radicibus, coctum conuenit: vti & oleum ex semine Vrticæ expressum, vel ex herba in oleo decocta paratum, cum Sale inunctum.

Mucago gummi Tragach facta ex infusione illius in aqua Rosacea vel Maluæ, vti & seminis Cydoniorum, confert. Item Albumen oui.

Gluten seu Colla, quæ ex coctione corij frustratim incisi fit, sanat papillarum fissuras: sicuti & pinguedo inde collecta.

Resinam gummosam corticibus Laricis accrescentem, Valesiani, calefactam, fissuris in manibus & pedibus instillare cum successu solent, eamque Dranbeck vocant. Cuius loco etiam Abiegna sumi potest, vel resina liquida Larigna aut Terebinthina.

Pomata ex sæuo hœdi parata, in labiorum, cum odorata sit, vti & papillarum quas infans sugere debet, fissuris, aliisque omnibus, & abrasionibus cutis, inuncta, conuenit.

Vnguentum ex Sæuo aliquo exenarratis fit, si Oleis dictis, additæ Ceræ albæ portione, dissoluatur: miscendo interdum & Mucilagine, vel tantillum Terebinthinæ.

Aliud ex Ouorum vitellis coctione induratis, cum Sæuo hircino aliòve vel Pomata, addito oleo Rosaceo vel Adipibus, in

745

in formam vnguenti supra ignem redactis, paratur.

Fit & inunctio grata ex dulcibus, in labiorum potissimum fissuris, vsurpanda, ex melle vel syrupo, Rosaceis: vel Saccharo penidiato, rosaceo, tabulato, vel tabulis Diatragachanti frigidi: illis in linimenti formam redactis.

Vbi magis siccandum, sequentibus vtimur. Succus Plantaginis cum oleis supradictis & Terebinthina, in formam nutriti, agitando diu, permistus, inunctus id præstat.

Vel si Amylo subigatur, additaq; infusione gummi Tragachanti fiat vnguentum; cui & in alia siccantia, vti dicetur, addi possunt.

Succus Granatorum dulcium cum Amylo & Butyro, in naribus à coryza excoriatis, conuenit. Vti & emulsio quatuor seminum frigidorum maiorum.

Succis Consolidæ, Cotyledonis & Sambuci, Rutæ, eadem ratione in formam vnguenti redactis, idem præstat. Aparines succus in papillarum fissuris priuatim confert; Acacia in pernionibus.

Bryoniæ item succus cum Sale, in fissuris commendatur.

Fagi & Bryoniæ folia labiis fissis admota probantur.

Vti & Porri vel Cæpæ bulbis tostis, cum Melle mistus, vel Oleo. Scylla cum oleo & Resina seruata, in pernionibus.

Lapatij radix trita cum Axungia porci, manuum fissuris adhibetur.

Amydum mucilaginis prædictis additum: Vel vnguento ex sæuo, vel altero ex vitellis Quorum, alijsve, vsurpatur.

Gallarum pulvis parua quantitate additus vnguento de Vitellis vel de Sæuo, vel cū Vitello oui, Terebinthina & Melle exceptus, conuenit.

Cineres Furfurum, Scyllæ, Ficuum, Vngulæ asini, Pilorum Caudæ equi, Cancrorum fluuiatil. vstorum, cum Melle Ros. vel Axungis, Oleis, alijsve misti, inunguntur in scissuris & pernionibus.

Corium Solearum, vel Charta combusta, si Sæuo quod à candela sumitur, vt supra dictum, misceantur, remedium illud, quod at-

tritioni ex equitatione factæ adhibetur, efficacius reddet, & vti candela, sic & hæc vbiq; statim ad manum esse possunt.

Mastiche vel Thus vel Pix sola puluerisata, vel subacta oleo Rosaceo vel Axungis, & Cerâ; Pro vnguento.

Vel sic: R. Sarcocollæ, Mastiches an. 3. j. Gummi torrefact. 3. ʒ. pulueriscentur subtilis. & cum vnguenti ex vitello Oui supra descripti 3. ij. vel cum alio ex Mucilaginis parato, in labiorum scissuris, vti & alijs, conueniens.

Sulphur Oleo permistum, manuum scissuras citò curat.

Sal impositum paruis læsuris, eas sanat, Tartarum item.

Lithargyrii cum album. Oui, aut mucilaginis & Oleis vel Axungis, diu in mortario plumbeo agitatum, ex coriaciones ab vrina factas, sanat: Vti & alias, & scissuras.

Vel cum vnguentis prioribus ex succo Plantaginis paratis miscetur: vti & Cerusa, Tuthia, addito interdum Amydo, oleo de Vitellis ouorum.

Vel hoc pacto: R. Lithargyrij Myrrhæ vel Thuris an. 3. j. Gallarum aut Aristolochie rotundæ 3. ʒ. Camphoræ ʒ. j. vnguenti ex Sæuo 3. ij. misce.

Vnguentum vsitatum de Lithargyrio, de Cerusa, Pompholygos, horum loco illinuntur: efficaciora sunt in scissuris addito Alumine: Item vnguentum Citrinum.

In pertinacibus scissuris, ad fortia siccantia transimus hoc pacto: R. Lithargyrij, Cerusæ an. 3. j. Aluminis, Minij an. 3. ʒ. Sublimati gr. iij. Abluminis oui q. s. fiat linimentum.

Aqua idem præstat: R. Tartari 3. iij. Aluminis 3. ʒ. Sublimati gr. iij. Cerusæ, Lithargyrij an. 3. j. Thuris, Mastichæ, an. 3. ʒ. Balustiorum vel aliorum siccantium ʒ. ij. coquantur in 3. xij. aquæ Rosarum, Plantaginis, Limonum, Pilosellæ, &c. ad consumpt. tertiæ partis, Madefiant figuræ.

Ablutiones ante inunctiones, ex decocto fieri possunt, rad. Liliorum, Altheæ, foliorum Hyosciami, Papauer. Violariæ, Portulacæ, Senecionis, Semperiui, Maluæ, florum Chamomill. Meliloti, farinæ seminum Fœnogræci, Lini, addendo sæuum Arietis

bonâ quantitate, & decoquendo in Lacte vel Aqua.

Vrinâ propriâ sæpè manus abluisse sciissas, in multis profuit.

In perniciosis, fatus ex decocto facto in Aqua cum Vino fit: acrium, vt fol. Serpentariae, Cyclaminis, Ranunculi: vel abstergentium vt Raparum, Betæ, & seminis Orobi: vel adstringentium, vt Myrti, Verbasci minoris, Arctij, Malicorij, iuuant. Aqua Aluminosa perniciosis quoque accommoda.

Vel hoc cataplasma in eodem affectu: R. Meliloti M. j. Rosarum rubr. P. j. pulpæ Cydoniorum ꝑ. ij. coquantur & contundantur, addendo farinæ Lentium ꝑ. j. Malicorij ꝑ. ꝑ. cum oleo Rosaceo misceantur. Possunt addi etiam Thus & Cineres.

Labia admodum disita & crassa in calcaeo, ne hiarent aut pulueres illaberentur, & vt melius sanari possent, filo per callosam cutem adacto, confui mutuoque sic iungi, vidi.

In ambustis multa quæ vesicas, indeq; natus excoiationes sanant, explicata in illis, hic quoque iuuare possunt.

Vstio siue à re candente vel flamma (ad quam & ea quæ à puluere fit tormentario accenso refertur, non globo quem puluis inflamatus excutit, cum ille tam subito incallescere vt vrar, vel empyreuma aliquod validum vti crediderunt, imprimere nequeat) aut liquore aliquo feruido alijsq; actu vrentibus procedat; vel etiam potentiâ adurentibus, vesicatoriis (inter quæ & vrticam referimus) psilotris vel cauteriis: quod minus amplam sedem vsserit, minusque profundè læserit, eò citius faciliusque sanatur, quæ secus se habet, difficilius, & postquam curata est, sedam sæpè post se cicatricem relinquit. Sed & vidimus maculas in facie à puluere tormentario, quia granula illius in cutem, quam perusserant delata, illic hæserant, relictas fuisse. Periculosa admodum est illa vstio, quæ circa sedes nobiliores, vt circa faciem accidit, & quæ magnam corporis sedem, ex casu in ignem aut aquam feruentem, vti sæpè fit, adussit, quæ mortem sæpè infert.

Curationem quod attinet, si studio, ad appeturam molendam, cutis vesicatorio vel

cauterio vsta sit, quia tunc in eo potius laboramus, vt vulnus illud apertum seruemus, quam claudamus, vesicamque aperiemus, & escharam, vt in fine dicetur, detrahamus, non alia ratione vstioni huic medebimur, quam vt, si inflammatio accedat, dolorque summus vrgeat, illis quæ in phlegmone dicta sunt, occurramus. Quæ &, si casu locus adustus sit, illaque adsint, similiter vsurpantur: reuulsionibus tunc per venæ sectionem aliisque simul adhibitis.

Cæterum quod ipsum locum ambustum propriè concernit, dolentem & læsum, primum empyreuma illi impressum euocare studebimus: quod calidis adhibitis fieri creditur, & proin locum vstum, igni parumper admovent vulgus; Cum tamen ea potius competant, quæ moderato calore id faciunt, anodynaque ob id quoque sunt, sed interea tamen vim aliquam siccandi, sed sine morfu, digerendique sine magno calore habent, quæ &, ne vesicæ faciliè erumpant, aliquomodo prohibere possunt. Quibus ab initio adhibitis, sensim ad ea, quæ amplius siccando, excoiationem vel etiam exulcerationem, si hæc superueniant, sanare possint, transeundum, qualia multa in abrasione, cutis sananda, vt & quædam in scabie, exposita, hic quoque conuenire possunt. Quod si verò in vlcus profundum, per suppurationem conuertatur, postea vt vlcus sanabitur: & si instrumentum quod vsit, vulnus simul inflixerit, præmissis illis quæ vstioni ab initio conueniunt, mox vt vlcus curabitur. Quæ verò vstionis causæ vt dictum adhibentur, remedia sunt sequentia.

Plantæ contusæ appositæ crudæ, vel decoctæ prius in Aqua, Vino, Aceto vel Oleo communi, vel Rosarum, Adipe suillo: vt bulbi Porri, Cépæ, Narcissi, Hemerocallidis, Lilij, radices Ebuli, Cannabis, Anchusæ, Acanthi: folia Hyperici, Androsæmi, Parietariæ, Altheæ, Maluæ, Hederae, Verbasci sylu, Mori, Myrti, Papaueris corniculati, Cynoglossi, Rutæ syluestris, Sesami, flores Gallij, Hederae, Cisti, Typhæ: Beta etiam integra apposita, probantur.

Succi aliqui ex prædictis plantis inungi possunt.

749

possunt; Inprimis succi foliorum & baccarū Hederae, Ceparum, Raparum, Solani, Lactuca sylvestris succus lacteus Diosc. per se inuncti vel addito Albumine aut vitello Oui, vel aliis mucilagibus, infus. gummi Tragach. vel cremore Lactis.

Vel: R. ex prædictis succis ʒ. iij. olei Rosacei, Butyri recentis, axungiae Porci an. ʒ. j. calcis Lotæ ʒ. ʒ. mucilaginis Cydoniorum ʒ. j. Terebinthinæ q. s. fiat nutritum: Vel succis coctione prius absumptis, additâ Cera, fiat vnguentum.

Sambuci folia teneriora viridia vulgò applicant: vtilius si medius illius cortex viridis fumatur.

Vel ex illis fiat hoc vnguentum, ad ignis ambustionem vtilissimum: quod R. corticis medij Sambuci ʒ. j. ʒ. succi foliorum illius teneriorum ʒ. j. ol. Lini ʒ. ij. ol. Rosacei, axungiae Porci an. ʒ. j. Cerae ʒ. ʒ. ʒ. Thuris puluerisati ʒ. j. coquantur in aqua aliquâdiu, & cum refrigerata sunt, collige innatans vnguentum; Vernicem liquidū addit Matthiolus, cuius loco nos oleum Lini, cum ex eo coquatur, posuimus.

Filicis radix, abrasâ prius nigra tunicâ, contusa, cum cremore lactis.

Olea per macerationem facta, fructus Momordicae, pomorum Solani pomiferi, foliorum rubrorum Papaueris Rheadis, vel per decoctionem olei, in cauatis Asphodeli rad. vel Hederae decoctæ in Oleo & Vino ad illius consumptionem: item Sambucinum, Cydon. vel per expressionem sem. Cucurbitæ, Lini, Nucum recent. vel de vitellis Quorum.

Oleum in quo Catulus recenter è cane natus, decoxerit, additis etiam Lumbricis aliquando, admodum in adustione à puluere sclopetario, probatur.

Axungia seu Lardum recens porci, diligenter à carne & cute separatū, laminæ ferreae ignitæ imponitur, à qua destillans pinguedo ardens in subiectam aquam postquâ concreuit, colligitur. Alij Auenam lardo infigunt, accendūt, sicq; stillare sinunt. Rectius hoc fit, si chartâ duplicatâ vel triplicatâ inuoluatur lardum, & prominens extra lardū aliquousque charta, accendatur, sicque ab ea lardum in subiectam aquam destillet: quâ

ratione carnibus inter assandum lardum instillando, eius loco, quod alias infigere solent gratiores reddunt. Sic autem lardum preparatum, etiam solum inunctum, sanat ambusta, vel addolorem mitigandum, cum cremore Lactis vel vitello Oui vsurpatur.

Butyrum item vel Lardum, fufum sæpius in decoctum Fœturæ ranarum, vel Cancrorum aut Lumbricorum, in vitione à puluere bombardico conuenit.

Pulueres aliquando insperguntur, cum exulceratio præsertim adest, vel sine illa, prius vincto loco, vt hæreant, Oleo vel Mucilag. aut Lacte: veluti cineres vstorum Cucurbitæ, Brassicae, Hordei, Calceamentorū, Concharum, Buccinarum: Item Ranæ combustæ: & pulueres Cinnabaris & terræ Cimoliae Dioscorid.

Auenæ farinâ vel communi locum vsum ad empyreuma auferendum conspergere, prius madefacto loco, vulgò solent.

Inter vngueta, Albumen oui cum ol. Rosaceo bene conquassatum, cum liateo intincto admotum, dolorem lenit: Vel additâ Cera albâ inungitur, cui tunc & mucilago Cydoniorum & axungia Porci addi possunt, vel farina Auenæ aut Hordei tosti; vel cum exulceratio adest, parum Boli & Thuris.

Vel: R. Porros vel Cæpas coctas sub prunis, contundantur adde ol. Vitellorum ouorum vel Sambuci, Sæuum cerui vel Hirci & Terebinth. fiat emplastrum.

Vnguentum de calce præsertim ad ambustiones sanandas accommodatum, fit ex Calce viua: quæ hoc pacto lauatur: Cum Aqua copiosa extinguitur, hoc est maceratur, donec sponte dissoluatur, quæ aqua postea, vbi calx in fundo subsederit abijcitur, nouaq; affusa donec denuò fundum petat, quiescere finitur, rursusq; à residentia separatur, q. cum aliquoties, 7. 10. 12. factū fuerit, calx lota erit, sicq; dicitur, quæ ad vsum mox accommodatur, vel exiccata seruatur.

Calx sic lota cum oleo Rosaceo vel Butyro recenti in formam vnguenti reducitur, cui Cera alba etiam addi potest. Interdum & Albumen oui vel aliæ mucilagines, vt Cydoniorum, Psyllij; item Cerussa lota cum lacte, & parum Camphoræ: alias & vnguentum

Citrinum, vt in facie præsertim, vsta vel Pomata, vel Populeon.

Aliàs Calx lota Lardo præparato, vt dictum, excipitur, & cum oleo Lini & farina Auenæ & Triticum in formam linimenti formatur.

Oleum Hypericonis cum Calce lota, efficax est remedium in quavis vstione, etiam ex puluere sclopetario facta.

Aqua ablutionis seu loturæ Calcis, cum oleo Rosaceo agitata, parti quæ ambusta hoc epithema impositum vile.

Sapone ad combustionem aliqui vtuntur. Gluten, calidâ aquâ emollitur, appositum pustulas prohibet, Diofco.

Vnguenta etiam ex supradictis cineribus & pulueribus, oleis, axungia porci, album. oui, mucilaginibus exceptis parantur: additis interdum etiam Platani pilulis, semine Rutæ syluestris, Hyperici, gummi Acaciæ, Vitro tenuissimè puluerisato, lapide Phrygio, docente Diofco. Qui & Stimmi cum Adipe recenti applicat.

Myrti foliorum vstorum puluis cum oui Luteo, impedit vesicas nasci: vel sal Nitrum cum ol. Rosaceo.

Cerussa, oleum Rosaceum, lota aq. rosar. albumen Oui & Camphor. vel vnguentum album Rhazis, vel de Cerussa.

Fimus Ouillus, Gallinaceus, Columbinus, cum oleo Ros. & semine Lini vel oleo illius adhibentur. Vulgus etiam Bouinum applicare solet, vt empyreuma, sicuti aiunt, educat.

Sal cum Oleo illitum pustulas prohibet Diofco. Alij etiam Nitro sic vtuntur, addendo simul oleum Ouorum.

Atramentum scriptorium ex aqua illinit Diofco.

Fomentatio fit cum brodio acido Brassicæ capitata, vel Raparum, ex composito quod Gumpist vocant: Quod magni fit, vel aqua inde exstillata: vel Brassicæ illius folia apposita, inflammationem reprimunt & simul discutiunt.

Decoctum Hedera, Ligustri, Plantaginis, Hyosciami seminis, pruritus sanat.

Aquæ stillatiæ Verbasci, florum Plantag. Solani, Rosar. prohibent pustularum ex-

ortum, addito interdum Santalo rubro & Camphorâ.

Aqua vitæ, vt contusa, sic ambusta, apposita sanat.

Aquæ frigida perfusio vel applicatio, prohibet vesicas enasci.

Fœniculi succus & Vinum album, cum aqua frigida, fusa supra ambustum locum, ne vesicæ erumpant, cauet.

Eschara ab ambustis, casu, vti etiam à causticis aliquin admotis nata, non est viuellenda; cum tunc sanguinis fluxus & dolor augeantur, fiatque maior læsio; sed admotis lenientibus & maturantibus tractanda, tunc enim sponte abscedit: quibus & vtimur, si à cauteriis vsta sit eschara, vel portiuncula illa cutis mortificata, quam sæpe vix octidui spacio, hisce admotis maturare, vt abscedat, possumus, cogimurque tunc interdum quoque etiam forpice eam, non nihil sectione liberatam, euellere.

Maturatur illa, & casus eius procuratur, si vngatur Butyro, vel hoc cum fol. Caulium vel Malua applicetur.

Vel vitellus Quicum Butyro aut ol. Rosaceo vel communi, vel axungia Porci vel Gallinæ: Quibus addere possumus rad. Altheæ, vel fol. Caulium viridia pistata, aliasve herbas emollientes.

Vel folia Caulium recent. aut rad. Altheæ pista, bene cum supradictis mista, applicantur. Vel alia herbæ emollientes crudæ coctæve contusæ.

Emplastrum, Tripharmacum Gal. & Tetrapharmacum, escharæ casum procurant.

Vulnus cum nunc Amplum nunc verò ^{Vulnere} Angustum, alias verò vtrumque, ^{sectum,} Venenatum ^{contusum} insuper sit, & propter hæc curatio potissimè ^{ab i-} variet, nos tribus hisce generibus singulis ^{ctu bom-} suam curationem accommodabimus: De co- ^{barda,} posito vulnere cui phlegmone iungitur, cum ^{in vario} hæc etiâ vlceri accidere possit, post vtriusque ^{corperis} curationem acturi. Et primum de eo quod ^{sedibus} amplum & patens est tractantes, siue ^{infectio-} sectum, ^{rum, cu-} quod Plagam vocant, siue punctum, quod ^{ratio.} punctura appellatur factum, vel ictus sclopeti alteriusve tormenti fuerit: vel contusum inductum in contusione dicta, curationem horum simul explicabimus.

753

Inter quę vulnera, quod latius est, partem diffundens, perforans aut mutilans, quod magis superficialium est & æquale, minusque partes quę ægrè iterum coalescunt, læserit, eò citius sanatur; difficilius quę secus se habent, & in primis contusa, cum in illis caro læsa, sanguisque affluens mox suppurentur, eaque in vlcera conuertantur, periculoque non vacant: uti nec illa quę in membranosis & nervosis articulorum sedibus facta mox in vlcus madidum, quod furiosum illum ichorem, quem *Gliedwasser* vocant, exudat, conuertuntur. Et in quibus nerui, vasa item maiora, venę, arterię, amputata sunt, idque propter hæmorrhagias, resolutiones, contractiones aliaque quę superuenire solent accidentia. Imprimis verò illa plerumque lethalia, quę per caluariam penetrantia, cerebrum illiusve meninges, vel pectus ventremque subeuntia illic contenta viscera læserunt, ubi mors vlcerum sanationem plerumque præuenire solet, licet & vulnera pulmonibus illata, atque intestinis uti & vesicę, & vtero, curata fuisse obseruauerimus, relicta interdum in ventre inferiore, aperturā, per quam & stercorea & vrina postea semper se exonerabant. Sed & cerebri aliorumque nobiliorum viscerum vulnera, aliqui, curata fuisse, testantur.

In curatione verò horum vulnerum, viuendi ratio in victu cæterisque, quę necessario obeuntur, sic instituenda erunt, ut corpus purum & mundum vel conseruetur, vel tale fiat, vnde sanatio feliciter succedit. Inter reliqua quoque per aluum, si præsertim constipata sit, deiectiones, sed non violentæ instituendę, & vena, si necessitas requirat, aperienda, viresque variis vsurpatis conseruandę. Dein & accidentia quę superueniunt vel imminēt, auertenda, ut hæmorrhagię, in magnis læsionibus, & potissimum cum membra penitus amputantur; & inflammationes, quę, si à tormento vel contusione vulnera facta sint, aut dolor magnus adsit, facillè accedunt; quod & venę sectione, aliisque reuulsionibus in vtroque fit, ad mortisque illis, quę in vulneribus cum inflammatione compositis, explicabuntur, & emplastris consolidantibus & hæmorrhagias

simul compescantibus. Vulnerum verò potissimum causā, si quid de eo quod læsit adhuc ipsis inhæreat, aut aliud adsit obstaculum, ante omnia auferendum. Postea si vulnerum latera & labia procul ab inuicem dista sint, hæc coniungenda: postremo ut concrescant rursus, seu consolidentur, & vniantur, sicque sanentur, procurandum. Quę omnia eo modo sicuti nunc dicetur, erunt perficienda.

Auferimus, si quid adhuc de eo quod læsit, in vulnere remanserit, ut gladij vel teli alteriusve instrumenti fragmentum, vel globulus sclopetarius, in profundo sæpè immersus subsistens, vel fragmenta lignorum, vitrum, aliave: idque variis artibus & instrumentis, ut forcipe dentatā arripiendo, & eā quam collum gruis vocant, hæc eximendo, vel etiam, si prehendi nequeunt, uti ferè globuli dicti, sectione eousque vulnere, donec arripi possint, dilatato. Quod &, si ossium fragmenta aut portiones absectę illic hæreant, similiter faciendum. Dein &, si pars per vulnus à reliqua adeo separata sit, ut illi rursus connecti, & cum ea concrescere minimè amplius possit, hoc obstaculum quoque sectione auferendum. Postmodum etiam, si pili in locis pilosis vulneratis in vulnus incidunt, illique adhærescant, si pulueres eò deuolarint, aut alioquin illabantur, vel fordes alię accesserint, diligenter hæc prius colligenda, abluenda & extergenda: idque spongiā nouā vel mundā, Vino rubro stipitico madente: quod & simul adstringendo repellit & glutinat: Quod & Aquā calidā aliōve liquore conuenienti imbutā, fieri potest.

Coniungimus partes per vulnus adeo diiunctas, ut nisi coniungantur, denuò concrescere minimè possint. Quod in minoribus vulneribus, cum labia ipsorum tunc non adeo distent, non necesse erit, uti neque in illis locis, ubi cutis subiectis partibus pertinaciter hærens, etsi scissa sit, tamen hoc modo, ne vtrinque cedat, retinetur: Ob quam & causam, vulnera capitis pilosę sedi inflicta, hac labiorum coniunctione, præsertim quę per suitionem fit, non egent, uti neque in multis aliis locis, veluti in sectione longā,

quâ lapis è vesica eximitur, citra coniunctionem labiorum, lithotomos ea sanare videmus. In aliis verò sedibus, cutis dissecta labia distat, uti & muscoli, tendines, & quicquid per hanc divisione procul ab invicem recessit, mox à principio reduci, mutuoque iungi debent, iunctaque ad dies aliquot retineri: estque hic primus chirurgorum in vulneribus tractandis apparatus.

Ligaturis interdum solis, aliàs emplastris simul interpositis, labia vulnerum coniungimus, iunctaque retinemus; fitque hoc fasciâ lineâ, veteri & nonnihil attritâ, ut molli & suavis sit: vulnus ea ita constringendo, ne si stricta nimis sit ligatura, dolorem inferat, unde inflammatio, quæ in gangrænam interdum conuertitur, sequi posset, vel si laxa esset, labra non exacte iungerentur. Cuius fasciæ longitudo & latitudo parti quæ vinciri debet, accommodatur, & prout eam operari volumus, illi circumducitur: quorum causâ triplex Ligatura à chirurgis statuitur: quarum vna Retentiva seu Retinens dicitur, quæ in illis locis fit, ubi arctius partes non licet stringere, ut in collo & pectore, vel in eiusmodi vulneribus, in quibus dolor vim hanc ferre non potest. Fitque hoc fasciâ, quæ vnum caput habet, si principium illius per locum affectum injiciatur, & futura fasciæ in parte oppositâ vinculi fiat. Altera Glutinatoria seu Incarnativa appellatur, in qua faciendâ, vinculum duobus capitibus à vulnerati loci parte opposita incipiens, versus medium loci vulnerati, ubi strictius esse debet, circumducitur, & futura potius, quàm nodo in extremis copulatur. Tertia quæ expulsoia vocatur ligatura, cum ad caua pertineat ulcera, in illis describetur.

Fibulis vel hamulis labiis ambobus vulnerum affixis, illa cōiuncta quoque aliquandiu retineri possunt, sed quia faciliè labuntur, hæc ubi morâ opus est, donec vulnus glutinetur, non possunt sufficere.

Suenda vulnera, etsi hoc dolorem aliquem adferat, tamen quando longa, illorumque labia admodum disita sunt, iungere necesse est, cum aliter recte coalescere nequeant, nam si relinquantur, inter-

veniente amplâ aut inæquali cicatrice, parti deformitatem aut impedimentum etiam aliquod adferunt. Sed & tendines, si cōsui simul possint, motui minus illorum vulnera incommodabunt, & si venæ maiores sic, rursus iungantur, de hæmorrhagia, & membri atrophîâ minor erit metus. Hoc autem communi modo in cute, uti aliæ futuræ perficitur: acum per vulneris utrumque labrum transfigendo, filumque trahendo & ligando, futuris distantibus nonnihil, totidemque nodis. Ad quod, filum gracile sed forte & æquale requiritur, sine nodis, acusque acuta longa & tenuis, quæ latiuscula, vel triangularis, lateribus acutis scindat, adhibitâ simul cannulâ fenestratâ, uti moris est. Verum venæ & arteriæ quando cōsuuntur, vel intestina aliæve internæ membranæ partes, tunc filo per vulneris labra sæpè reducto, uti pelliones facere solent, sunitio perficitur.

Aciculis vel acubus vulnerum labia aliquando necimus, transfigendo illa, sicque retinendo, totidem nexibus, quod in sunitione futuræ aliàs fieri solent, quod expedit, etsi cum dolore fiat, à quibusdam administrari vidimus.

Conglutinando hoc itidem fieri potest, eoque nomine interdum, quod sine dolore hoc fiat, hic modus expetitur, certisque in locis ubi fieri potest, tentatur, & cum cicatrix non adeo lata, uti quando labia suuntur, cutato vulnere relinquatur, minusque appareat, in faciei vulneribus, eo nomine etiâ potius perficitur: quæ conglutinatio duobus modis peragitur: Vno si pittacia duo utrinque vulneris lateribus agglutinentur, & postquam glutine siccato, firmiter hæserint, simul eousque ut labia se mutò tangerent, cōsuantur: pro glutine, vel Collam fumendo fabrorum lignariorum, vel album. Ovi, aut infusionem gummi Tragrachanti, cum Calce: vel aliter per Picationem affigendo.

Aliter modus Emplastro perficitur, quod pittacio illitum, & vulneris labris, compressione levi prius iunctis, impositum, mox siccatum & validè adhærens, illa donec cōcrescant, retinetur. Quæ proin cum diutius
i) hic remanere debeant, ex illis paratur, quæ simul

757

simul & sanguinem sistunt, & vlcus conglutinando sanant, vnde etsi suitione aliâ factâ ad labia retinenda, tunc non ad eod ipsius opus esset, tamen quia futuras suitionis melius iunctas retinent, & simul vlcus curant, nihilominus applicantur. Idque mox in principio, dum adhuc hæmorrhagia vrget, vel illius metus adest. Paranturque hæc emplastra ex pulueribus subtilissimè tritis, & cum albumine Ovi vel infusione gummi Traga-chanti, vel Arabico, vel Ichthyocolla dissolutis, in Vino adstringente subactis, addendo pilos Leporis minutissimè concisos, aut lanuginem vel pappos florû Salicis vel Arundinis, vel Senecionis: vel fungum siccum, quem Crepitum lupi, chirurgi Plumacellum vocant, vel telas Aranearum: In quibus pannus lineus intinctus applicatur, imposito simul interdum, vt melius hæreat, plumacello.

Pulus autem ex quo emplastrum hoc modo fit, ex Boli partibus tribus, Thuris vel Sarcocollæ aut Vernicis, parte vna paratur: cui & Sanguinis draconis pars media addi potest, & sic subigi, admixtis vt dictum, pilis.

Idem ex Calce viuâ, Farina tenuissima, quam volatilem vocant, fieri potest, admiscendo illis cætera.

Vel ex Calce sola cum albumine Ovi mixta, vel Saliua, hæc conglutinatio efficacissimè fit, additâ Mastiche, ne vrat, vel ex Colla fabrorum lignariorum dissoluta: ex illis enim vt pittacia agglutinari debere ostendimus, sic hic pittacium hisce inunctum, vniuersum vulnus debet obtegere. Hoc & dropace ex Pice parato fieri poterit.

Reliqua emplastra idem quoque aliquo modo præstantia, magis tamen vlceri sanando accommodata, in reliquis illius remediis explicabuntur.

Consolidationem seu coalitum vulnerum, etsi natura molliatur, dum ex nutrimento partis huc delato, apppositoque latera & labia vulnerum dissecta, denuo veluti glutine conglutinat, & concrefcere facit, sicq; interdum sola, leniora vlcerâ consolidat: quia tamen in plerisque, etsi non suppurentur, tunc enim vt vlcerâ sanantur, maior interueniens, continuoque ea humectans, hanc congluti-

nationem non finit fieri, illa, quæ siccando madorem hunc absorbeant adhibenda, naturæque sic suppetiæ in obstaculis amouendis ferendæ (quod canis, lambendo solum vulnera, perficit) medicamentis Glutinantibus, Collyticis appellatis. Quæ tamen præter iam dictam vim siccandi, adstrictionem simul aliquam habere, emplasticaque non nihil esse debent; quorum vi labia vulnerum coalescere, & lentore melius retineri possint: eoq; nomine glutinandi vis illis attribuitur, cum tamè aliter, nisi proprietates quædam hoc in illis etiam molliatur, minimè id faciant. Et demonstratio hæc in consolidanda, quod carnis frustra, dum cum illis coquitur, glutinet, cum illud non fiat, id conuincere nequit.

Sed & hæc cum iisdem viribus sanguinis impetum sistant, ad hæmorrhagiam simul compescendam & impediendam, vt de emplastris labia coniungentibus dictum fuit, similiter iuuabunt, vt aliis quæ id faciant, nisi in maximis hæmorrhagiis, quæ vt dictum amputatis venis maioribus aut membris integris, eueniunt, minimè opus sit. Quorum medicamentorum collyticorum vsu, non solum in vulneribus caro, sed & cutis, concrescit, ita vt in illis, in quibus nec caro nec cutis deperdita sint, nisi sordida facta postea in vlcerâ conuertantur, nec carnem aut cicatricem gignentia medicamenta alia, qualia verò in vlceribus cauis maximè requiruntur, adhibere necesse sit. Dein &, si per vulnera vel contusiones ossium, aliquæ partes absceatæ abruptæ vel alioquin ossa fracta, fissa aliòve, modo læsa fuerint, eadem medicamenta illorum conglutinationem per calum, quem natura ex nutrimento ossium producit, eadem vi, vt in carnosissimis locis, procurant. Talia autem Glutinantia tam in paruis quàm magnis, & profundis vulneribus, per foras admota topica remedia & interdum ea quoque, quæ per os propinantur, sequentibus formis administrantur.

Emplastra plerumq; adhibentur vulneribus quibusvis siue secta, puncta, perforata aut contusa sint, quæ & præterquam quod diuisiones ipsorum arctius constringunt, sicuti in sanatione vulnerum ea facere diximus, eo-

dem modo, vt illa emplastra, quæ potissimum vt labia iuncta retineant, agglutinari ibidem ostendimus, sic & hæc in eo quoque aliquid possunt adiuuenti adferre. Quod vt melius faciant, ex pulueribus sequentibus, albumine Oui exceptis, vt iam dicta emplastra, ab initio præsertim formantur, addendo quoque pilos Leporis aliaque lanuginosa, illic declarata.

Pro quibus hoc modo pulueres sunt: R. Thuris, Myrrhæ, an. part. æqual. Aloës duplum vel triplum, fiat puluis, excipiat ut dictum. Potest & Sarcocolla addi.

Vel sic: R. Boli vel Gypsi vsti 3.j. Mastiches, Sarcocollæ, Thuris an. 3.β. Sanguinis draconis, Aloës an. 3.ij. Balauft. rad. Consolidæ vel aliarum quoque plantarum ad 3.β. pulueriscentur pro emplastro.

Aut: R. Ossa combusta communia vel Eboris aut Cornu cerui, lota aqua rosar. vel Plantag. pulueriscentur, addendo ad 3.ij. cort. Granatorum, fol. Equiseti an. 3.ij. Aluminis, vel Vitrioli vstorum an. 3.j. fiat puluis pro emplastro.

Vel: R. Gallarum, radic. Aristoloch. Consolidæ, cort. Pini, vel rad. Pentaphyli an. 3.β. Sideritidis, Aparines, Sumach. granorum Myrti vel Vuarum aut Passularum an. 3.ij. Spongiæ vstæ vel Lanæ 3.j. fiat puluis, qui per se, vel aliis pulueribus mistus, ad emplastra vsurpari poterit; cui & puluis. olsiū Myrobalan. Cocci infectorii rubri, lapid. Molochit. addi potest.

Vel: R. Colophoniam, Mumiam, Sanguinis draconis an. 3.β. Cerusæ, Lithargyrii vel Tuthiæ an. 3.iiij. Scoriam plumbi 3.ij. Blattæ bifantæ, lapid. Moloch. vel Galactit. an. 3.j. Farinæ volatilis 3.j. fiat puluis, excipiat ut album. Oui pro emplastro.

Alia quoque emplastra magis adhuc glutinantia & siccantia, in humidioribus vulneribus sunt, si Aloën, Mastichem, Mumiam, simul, vel alium ex pulueribus supradictis, Resinâ laricæ, Abiegnâ, Terebint. excipias.

Vel hoc chirurgis vsitatum emplastrum; R. rad. Aristoloch. puluerisat. 3.β. Sanguinis draconis 3.j. gummi Elemi 3.ij. resinæ Pini vel alterius siccæ 3.iiij. Terebint. q. f. fiat emplastrum.

Alius adhuc efficacior: R. Asphalti, id est, Bituminis vel Mumie, Colophoniam, Thuris an. 3.j. Minij, Sulphuris, Cerusæ an. 3.β. Aluminis vsti 3.ij. Coralli 3.j. Camphoræ 3.β. Farinæ volatilis vel Hordei 3.j. pulueriscentur, excipiantur infusione gummi Tragach. vel Ichtyocollæ, factâ in aqua Equiseti vel Plant. & paucis Aceto.

Vntuosa emplastra vel vnguenta sequentia conueniunt, cum emplastica admodum sint, & sufficienter nihilominus siccant: R. Mastiches, Sarcocollæ, Thuris, Aloës, ana 3.ij. Croci 3.j. Terebint. 3.vj. Resinæ spissæ 3.ij. Cera 3.iiij. misce.

Cuius loco, aureo vnguento dicto Mesuei vti possumus, quod ex thure, mastiche, colophonia, terebint. croco, oleo & cera paratur.

Aliud chirurgorum: R. Boli 3.j. Sanguinis draconis, radic. Consolid. an. 3.β. Mastiches, Thuris, gummi Arab. an. 3.ij. Mumie 3.iiij. ol. Rosac. & Resin. q. f. fiat emplastrum.

Vel sic: R. Aloës hepat. Sarcocollæ, Serapini, Ammoniac. Galbani, Bdellij, Mastiches Thuris, Picis naualis, Boli, Sanguinis draconis ana æquas partes, pulueriscentur, adde Terebint. & oleum antiquum vel aliud conueniens, & Sanguinem hominis rufi, coquantur parum in modum vnguenti.

Vel hoc admodum siccans: R. Terebint. & Cera an. 1.β. olei de Iunipero, Laurini an. 3.j. de Vitellis ouorum 3.j. Thuris 3.ij. Mastiches 3.j. Lapid. Magnetis, Calaminaris an. 3.β. Vitrioli, Aluminis an. 3.vj. Cerusæ, Lithargyri. an. 3.β. Resinæ communis q. f. fiat vnguentum vel emplastrum.

Emplastrum Oppodeldoch: R. Lithargyrii 1.β. Cadmiæ fossil. 3.iiij. Colophoniam 3.iiij. Cera 1.β. Olei communis 1.β. coquantur aliquandiu, dein adde gummi Ammoniaci, Galbani, Bdellij, Serapini, Oppopanax, dissolutorum in Aceto & purificatorum, an. 3.j.β. ol. Laurini vel Hyperici, vel Lumbicorum 3.j. Terebint. 1.β. coquantur iterum, semper interim agitando, ad consistentiam aliquam, & ab igne remotis misce Mastiches, Thuris, Myrrhæ, Mumie vel Asphalti an. 3.j. vel plus, agitentur, & postea malaxentur oleis prædictis in formam emplastri. Chymici Croci martis & florum Antimonij an. 3.β.

an. 3. β. addunt. Alij, si quid vulneribus infixum hæreat, facilius prodeat, Succinum & Magnetem ad 3. j. permiscunt.

A plantis emplastra cōsolidantia sic fiunt: R. Consolidæ vtriusq; cum radicibus, Pentaphyli, Plantag. Bursæ pastor. Pilosellæ, Pimpinellæ, Millefolij, Verbenæ, Cynoglossi, Betonicæ ad m. vj. Lumbricorum numero xxx. incidantur & contundantur, adde Olei antiqui vel Rosi 3. j. Sæui Arietini vel Hircini, vel Ceruini, 3. β. Vini adstringentis 3. j. Aquæ vitæ 3. j. decoquantur ad consumptionem Vini, exprimantur, colaturæ adde gummi Elemi, Thuris, Mastiches, Sarcocollæ an. 3. j. β. Ichtyocollæ, Sanguinis draconis an. 3. j. Myrrhæ 3. β. Terebinth. 3. ij. Picis naturalis & Cerae q. f. pro emplastro.

Vel sic: R. rad. Aristoloch. rot. Consolid. maior. Pentaphyli ad 3. iij. Equiseti, fol. Cupressi, Pyri vel Mespili vel Corni, Myrti, Quercus, Isatidis sativæ, ad 3. ij. Nucum cupressi, granorum Myrti, Gallarum, Balaust. flor. Rosar. rubr. Hypericonis ad 3. ij. gummi Eleni, Sarcocollæ, Pini, Galbani, Ammonian. Mumia, Oppopanac. ad 3. iij. Colophonæ, Sanguin. draconis, Sanguinis hirci sicci an. 3. j. Oleorum antiq. vel lucernarum, vel Rosac. omphacin. aut Myrtini vel Lentiscini, axungia Thymali ad 3. j. resina Abietis vel alterius, Picis, Cerae, q. f. fiat emplastrum.

Aliud, quod & in nervosis locis, si vulnera existant, conuenit: R. rad. Consolidæ maior. 3. ij. rad. Aristol. 3. j. radic. Peucedani 3. β. herb. Plantag. Bugulæ, Verbenæ, Sangui-sorbæ, Pilosellæ, Pimpinellæ, Millefolij, Cynoglossi, Anagallidis flore rubro, Agrimonæ, Equisetian. m. j. incisa & confusa, coquantur in Vini albi generosi Mensur. iij. vel iij. donec inspissari incipiat, contundantur diligenter, rursusque ad ignem positum, cum feruere incipit, adde Cerae, Resinæ puræ, Picis ad 3. j. agitentur diligenter, donec dissoluantur, coquendo, & postquam ab igne remota fuerint, permisce Mastiches puluerisat. 3. j. β. Galban. dissol. in Aceto 3. j. Terebinth. 3. j. denuoque agitentur, donec refrigerata in formam emplastri reducatur.

Aliud ex iisdem plâtis, vel etiam aliis de-

coctis in Vino, adiectis Olei 3. ij. vel quantum opus est; fieri potest, si postquam cocta fuerint, absumptis succis, pasta cum Oleo, adiectis Cerâ, Resinis aliisque, in formam emplastri redigatur.

Aliud idem præstans de Vermibus dictum emplastrum: R. radicum & herbarum prædictarum ad m. vj. Lumbricorum terrestriū 3. β. coquantur in Vino & Oleo, vt dictum, expressioni addendo gummi Ammoniæ, Galbani, Oppopanacis an. 3. β. Picis & Asphalti an. 3. ij. Terebinth. 3. β. sæui Arietini. 3. viij. iterum parum coquantur in formam emplastri, miscendo puluer. Mastich. Thuris ana 3. β.

Ad præcisos tendines: R. rad. Narciss. 3. j. rad. Acori veri seu Calam. arom. 3. β. Costi 3. ij. summitatum cum floribus Chamomil. Rosmar. Lauendul. vel Stœchad. Hyperici, Saluæ an. p. j. Lumbricorum num. xxx. coquantur in Vino & Oleo communi, additis etiam oleis conuenientibus, inter quæ & oleum Nucis Indicæ confert, ad consumptionem; coletur oleum, addendo Ladani 3. j. Storacis rub. & calamit. an. 3. β. Cerae q. f.

Lumbricorum puluis Melle exceptus, in vulneratis neruis competit.

Cochlearum caro confusa cum Thure & Myrrha, neruorum vulnera glutinat.

Ex vsitatis in capitis vulneribus præsertim accommodata sunt sequentia emplastra.

De Betonica emplastrum vel ceratum Nicolai: quod fit ex betonica, mastiche, thure, mumia, resina pini, tereb. cera.

Est & alia compositio quæ hæc eadem, exceptâ mumia, & præter hæc etiam pimpinellam, eupatorium, saluiam, pulegium, millefolium, consolidam maior. gallicricum (al. periclymenum) rad. ireos, aristoloch. gummi eleni (al. oleæ Æthiop.) ol. abietinum, vinum recipit.

Alij simpliciter hoc emplastrum ex succo betonicæ, cera, resina & terebinthina conficiunt.

De Ianua emplastrum Mesuæi idem præstat: quod fit ex succo betonicæ, plantagin. apij, resina, terebinth. pice, cera.

Gratiæ Dei, ceratum Nicolai, aliàs Diuinum dictum, capitis vti & alia vulnera sa-

nans, fit ex betonica, verbenā, pimpinella, mastiche, resinis & cera.

Aliud Petri de Argilata, præter hæc recipit consolidam vtramque, centaurium, hypericon, consol. sarracenicam (al. gratiolam,) olibanum, myrrham, ammoniacum, galbanum aristoloch.

Catagmaticū Andromachi à Galenō descriptū, vulneribus capitis si ossa fracta sint, adscribitur. Idem ab eodem annotatum, ex Scylla Critonis emplastrum.

An cranium alicubi ex contusione capitis perforatum sit, emplastro ex Thure, Ladano & Cera facto, capiti raso admoto, explorant hac ratione, vt si in parte aliqua illud exsicceatur, illic fracturam esse iudicent.

In neruofarum sedium vel neruorū vulneribus, vsitata emplastra sunt hæc.

Neruinum Vigonis, quod fit ex rad. rubiæ, betonica, rosmarino, cauda equina, centaurio, fol. & semine hypericonis, vermibus terrest. lithargyrio, minio, gummi mastiches, eleni, sagapeno, galbano, ammoniac. pice, resina, terebinthin. sæuo vituli, hirci, ol. chamom. rosarum, masticin. terebinth. lini, aceto, vino.

Alia quoq; in neruorum vulneribus conuenientia emplastra Galenus duo describit, Ægyptium Andromachi, atque aliud Philogoni.

Vti & alia ad quæuis vulnera vtilia ab eodem Gal. descripta, Viride vnum Dini, alterum Machærontis. Ad quæ & Auicennæ emplastrum de Lino seu tela-linea, vsurpari solet. Item emplastrum de Minio Vigonis & Massæ.

Si contusa aut fracta, alioue modo læsa per vulnus sint ossa, tunc Oxycroceum emplastrum maximè in vsu est, cuius varię sunt descriptiones, è quibus Nicolai oxycroceū, ex ammoniaco, galbano, myrrha, thure, mastiche, colophoniam, resina, pice, cera, aceto, croco paratur.

Lugdunensium Oxycroceum efficacius est, & præter iam dicta, lithargyrium, bolum Armen. alumen, styracem rubram & liquidam recipit.

Vigonis Oxycroceum fit ex lithargyrio, minio, bolo, terra sigillata, myrrha, thure,

mastiche, resina, sæuo, oleis adstringentibus & succis, foliis fraxini, myrti, consolidæ.

In iisdem vulneribus cum ossium læsione, Sparadrappum chirurgorum conuenit, quod ex linteo intincto in Oleo & Cera, dissolutis, miscendo cerusam & ladanum fit: Alij addendo etiā lithargyr. myrrham, parāt: Alij addunt etiam alumen, camphoram: Alij etiam sanguinem draconis, mumiam, minium, mastichem, alioue.

Lachryma balsami plantæ, quam Balsamum naturalem vocant, si haberi potest, vti illud vel tale quid apud magnates ostenditur, viresque veri explorare creditur, in vulneribus sanādis, præcipuas illi vires attribuunt.

Cuius loco Oleo vtimur, quod cum vires balsami veri habere, ex eo quod vulnera sanare experientia comprobet, Balsamum artificiale, seu Balsamelæum vocant, chirurgique illud statim vulneribus instillant, vel linteolis conceptis, hæc medicamēta, vti & alia, Emmota sic vsurpata dicta, excepta indunt vel applicant, vel cum turunda illis intincta (quæ in vulneribus, quorum orificia concidunt, vt ea aperta retineat, aliquousq; inditur, solent intrudi. Hæc autem variis modis fiunt sequentibus.

Olea quæ exprimuntur, vt cōmune, nuncum similiaq; cum pinguiā admodum sint, & vulnera ac vlcera sordida redderent, sola adhibita, illorum curam potius impedirent, quam iuuarent: vetustate tamen atq; ignis vi siccissima reddita, quale est oleum Antiquissimum & Lucernarum, si calida paruis vulneribus adhibeantur, etiam sola, magis tamen, addito Vino vel Sale, ea sanare possunt. Quod & ex vitellis Ouorum expressum, cum egregie abstergat, facit oleum. Itē aliqua ex illis quæ vires hæc possident, exstillata. Vt Oleum Myrrhæ & Resinarum variarum, quæ sola etiam efficacia sunt.

Quæ verò potissimum in vulneribus maioribus id præstant olea, talia sunt, in quibus varia quæ vim illis siccandi glutinandi que contribuunt, macerantur vel coquuntur, à quibus postea oleum separatur, vel destillatione elicitur. Veluti Olea ex plantis glutinantibus efficacioribus parata, vt Hyperico, Ophiogloss, Tapso barbato, Sanicula, Limonio,

monio, Veronica, Pyrola, Salvia sylvestri & fructu Momordicæ, in oleo Communi, Lini vel Rosæ. omphac. in Myrtillorum, Lenticino aliòve macerata, decoctæve, dissolutâ in hisce etiam Terebinthinâ vel Cera.

Vel sic ex pluribus herbis tale fit Balsamum: R. rad. Consolidæ, cortic. rad. Vlmi ana 3. iij. Hyperici & Centaurij min. summitat. cum floribus an. M. ij. Consolidæ minoris seu Prunellæ, Betonicæ, Millefolij an. M. j. Rosartum rub. P. j. Lumbricorum numero x. Vini præstantissimi 3. iij. Olei communis tb. j. resinæ Terebinth. vel alterius fluidæ 3. ij. Stent in infusione in loco calido, vel leuiter coquantur, exprimatur oleum. Vel in alembicum posita, ex illis liquor eliciatur: quæ postea ad vsum seruatur.

Possent & aliæ aliquæ ex plantis vulnera sanantibus prius descriptis addi; vt Equisetum, Chelidonium; & præter hæc folia Arbuti & Vlmi, illiusque folliculi cum liquore, flores Chamomil. & Verbasci, atq; in capitis vulneribus Salvia, Rosmarinus, &c. ad M. j. item Nucis mosch. 3. β. auctaque tunc Olei, Terebinth. & Vini quantitate, coqui vel destillari.

Efficaciora ex plantis hæc parata balsama fient, si plura resinosa illis addantur, hoc pacto: Hyperici flores in oleo, addendo parum Vini albi optimi, primum in calore solis, vel fornacis, mox in fimo equino, per dies xiiij. macerantur, addendo postea Terebinthinam, Resinam puluerisatam, Myrrham & Mastichem, bulliant, coletur oleum: quod Balsamum seu Oleum Hyperici vocant, magis in vulneribus sanandis vsum.

Vel fume balsami primi vel secundi, ex pluribus plantis concinnati materiam, eamque sequentis balsami materiei permisceto, simulque ex illis oleum coctione vel destillatione elice.

Balsamum sic fit efficax: R. Thuris, Mastiches, Galbani vel Bdellij, gummi Elemi vel Hederæ, Myrrhæ, Aloës puluerisatorum an. 3. β. Olei tb. j. Terebinth. 3. ij. Aquæ vitæ 3. j. β. coquantur sensim, & coletur à facibus oleum resinofum. Si in fine decoctionis, Æruginis æris 3. β. addas, efficacius erit, viridique colore tinctum.

Vel: R. prædictos pulueres, & cum æquali pondere resinæ Terebinth. misce, & per destillationem aquam primum, dein oleum ad vsum elice.

Vel: R. puluerum prædictorum 3. iij. addæ Mumia, gummi Arabici, Sagapeni vel Serap. Sarcocollæ, Sanguinis draconis, Oppopanacis an. 3. β. Ladani, Bonzoini, Storacis calamitæ an. 3. ij. Succini 3. vj. Spicæ nardi 3. iij. Croci 3. β. Camphoræ 3. j. Storacis liquid. 3. ij. resinæ Terebinth. ad pondus omnium: destilletur vt prius ostensum, balsamumque emanans Æruginis æris in eo maceratâ 3. β. colorare poteris, viresque illius augere.

Multa alia aromata eiusmodi compositionibus addunt, vt balsama, etiam aliis morbis frigidis apta redderent, fierentque medicamenta instar omnium, gratumque odorem inde conciperent: cum hæc in sanatione vulnerum & vlcera parum auxilij præstare possint; veluti Nucem mosch. Gariophyl. Cinamom. Galangam, Cubebas, Lignum aloës, Zedoariam, aliæque aromata. Quo nomine & Moschum & Ambram, & vt splendidius reddant medicamentum, cum tamé odorem horum permissione amittant, in ditionibus immiscunt. Quorum loco Castoreum, Euphorbium aliqui adiciunt, cum magis illud, frigidorum morborum causâ, calefacere volunt.

Ex Rhabbarbaro aliqui balsamum parant, Oleo rosaceo vel lumbricorum aut alio macerando, additisque thure, masticha, oppopanac. camphora, & parum postea decoquendo, colandoque ad vsum.

Alia balsama sic fiunt, additis etiam succis: R. Olei antiquissimi tb. j. Vini optimi tb. β. succorum Sideritidis vel Narcissi an. 3. iij. resina Laricis vel Abietis 3. ij. gummi Elemi, Thuris, Mastiches an. 3. j. β. Sanguinis draconis, Aloës an. 3. j. rad. Consolidæ, Aristolochiæ an. 3. vj. florum Hyperic. 3. β. coquantur lento igne & coletur oleum ad vsum.

Aliud additis diuersis oleis: R. olei communis & olei Lini an. 3. viij. olei Laurini 3. ij. olei Terebinth. 3. j. ol. baccarum Iuniperi destill. vel Spicæ, vel Petrolei 3. β. resinæ Terebinth. vel Pini 3. ij. Colophoniz, Mastichæ ana 3. j. Aloës 3. iij. Æris vsti 3. ij. Chal-

canthi albi 3. j. stent per dies aliquot in loco calido posita in lebetem æneum, indies agitando, donec vire scat, coletur ad vsum. Vel eum citius parari debet, ebulliat parum, addendo sub finem Æruginis æris 3. iij. Coletur: huic & oleum Gariophylorum per distillationem factum, addunt interdum.

Chymicorum balsamum: R. florum Sulphuris ter calcinatorum 3. iij. Camphoræ 3. j. β. pulueriscentur, misce ol. Terebinth. 3. iij. eliciatur oleum per alembicum.

Ad balsama hæc, Vernix liquidus, Germanicè Striſſi dictus, fabrorum lignariorum, quò ligna dolata vt splendeant, incrustare solent, referri poterit, cum suo lentore admodum glutinet, & ex illis quæ idè siccando præstant, paretur, additis præsertim iis, quæ hanc ipsorum actionem iuuant. Hic autem ex oleo Lini coquitur, adiectis variis, quæ vt ficcetur & splendeat, efficere possint: Qui sic paratus, balsamum ad vulnera sananda erit aptissimum: R. ol. Lini t̄b. j. gummi Vernicis, Mastiches an. 3. j. β. Thuris 3. β. Lithargyrj 3. j. Vitri crystallini puluerisat. vel Ossium combustorum 3. β. Chalcanti albi 3. iij. coquantur leuiter, minusq; quam vernix pro incrustatione alias coqui solet, addendo Terebinth. ol. Spicæ vel Petrolei ana 3. β. & in fine decoctionis coletur, & Æruginis æris 3. j. tingas; & balsamum habebis efficacissimum ex nostra inuentione.

Inunctiones alię ex sequentibus fieri possunt.

Resina laricea vel Abietis per se vel dissoluta cum vitello Oui, & Melle inuncta vel apposita, parua vulnera sanare potest.

Vel fiat ex succis herbarum, quæ vulnera sanare diximus, cum Melle, Resina & vitello Oui, in vngueta redactis: additis etiam aliis pulueribus siccantibus, in emplastris expositis, nonnunquam & oleis.

Vel sic: R. succi Rosarum, Plantagin. vel aliorum ana 3. ij. Aceti 3. j. olei Rosacei omphacini 3. iij. olei vitell. Ouor. Terebinth. ana 3. j. coquantur ad succorum consumpt. addendo Lythargyr. Cerusæ, Tuthiæ ana 3. ij. Alumin. 3. j. Omphacij 3. iij. Ceræ q. f.

Succus Nicotianæ cum Oleo & Resina abietis, Pice & Cera, in formam vnguenti

coctus, nostro tempore valdè in vfu est.

Ad capitis vulnera ipsiusque meningum: R. succi Betonicæ 3. vj. olei Rosac. Terebinth. Ceræ nouæ ana 3. ij. Lactis mulieris vel Butyri, Vini vel Aceti an. 3. j. β. coquantur ad liquorum consumptionem, donec fiat vnguentum, vel additâ Resinâ siccâ abietis, fiat emplastrum.

Aliud in vulneribus capitis: R. summatat. Centaurij minor. folior. Caprifolij & Betonicæ exsiccatorum & puluerisatorum an. 3. ij. Vini præstantissimi mensur. j. β. maceantur, & postea leuiter coquantur, addendo circa finem Mellis 3. ij. Lactis 3. j. Terebinth. Ceræ nouæ an. 3. vj. iterum coquantur, ad succorum consumptionem, tandemq; miscendo Thuris, Mastiches, gummi Arabici vel Elemi ana 3. j. & parum resinæ Pini vel Abietis, fiat emplastrum.

Vel si sint cum fractura cranij: R. succorum Verbenæ, Betonicæ, Sanguisorbæ, Clematit. peruinæ, Chelidonij, Apij an. 3. j. Terebinth. 3. iij. Ceræ 3. ij. coquantur ad succorum consumptionem, addendo rad. Consolid. maior. & Aristol. rot. an. 3. β. rad. Ireos 3. ij. Sarcocollæ, Myrrhæ, Mumia, Succini ana 3. j. β. pro emplastro.

Ad eadem: R. Mellis rosacei part. ij. Olei rosac. vel Ouorum part. j. Terebinth. partem mediam, agitentur, & in illis sericum Chermesinum rubrum intinctum, fractæ caluariæ imponatur. Chymici oleum Terebinth. loco illius & ol. Myrrhæ addunt.

Applicationes aliæ ex diuersis fiunt, veluti ex sequentibus.

Cortices interiores Tiliæ, sicuti tenuissimæ pro vinculis detrahi solent, vulneribus fasciæ instar obuolutæ, vti & Fraxini: Papyrus item Vino madefacta, profunt.

Spongiæ recentes maritimæ appositæ.

Telæ araneorum moistæ, sanguinem mox sistunt, & glutinant parua vulnera.

Item Fungus ille siccatus leuissimus, quæ Plumacellum vocant, vulneribus vt sanguinem sistat, communiter a chirurgis imponitur, qui quoque siccando agglutinationem iuuat.

Fascia si maceretur in aqua Aluminosa vel bulliat, & siccetur, vim siccandi adipiscetur. Con-

Contusæ multæ plantæ ex sequentibus, ex quibus decocta parari, iam ostendemus, additis farinis aliisve, quoque applicantur.

Vel sic: R. radic. Aristoloch. Anchusæ, fol. Chelidoniij maior. Cētaurij, Glandium, contundantur cum oleo Rosac. omphacino, & Axungia seu Sæuo.

Decocta è plantis sequentibus pro ablu-tione & foru sunt, vel iniectione in profun-dis vulneribus, veluti ex Consolidis, ab exi-mio vsu dictis maiori seu symphyto, ipsiusq; præsertim radice, media vel Bugula, minore seu Prunella. Item Consolid. sarracēnica, Symphyto petræo, Sideritidis speciebus Hyperico, Pyrola, Ophiogloss, Dracunculi foliis, Millefolio, Achilleia, Pilosella, Cyno-gloss, Sanguisorba, Agrimonia, Equiseto, Verbenaca, Fragaria, Veronica, Gratiola, Scordio, Isatide, Pentaphylo, maior. cum ra-dic. Centaurio minor. Eupatorio vulg. Lyfi-machia, Chamæpyth. Chelidonio maior. Ni-cotiana. Item ex Aristolochiæ, Tormentil-læ, Bistortæ, Smyrni, Lycopsis, Centaurij maior. Poterij, radicibus Narcissi bulbis; & Vlmi, Tiliæ, Pini corticibus. Dein & ex folio Cupressi, Myrti, Quercus, Vlmi, Mespili, Corni, Pyri syluestr. Sumach, Cysti, Helian-themi, Verbasci, Bursiæ pastar. Plâtag. Lon-chitidis, Lunaria, Viticis, Polycnemi, Bras-sicæ syluestris, Anagallidis, Polygoni, Po-lygonati, Aparin. Clymeni, Argemon. Cya-ni maior. Trinitatis, Balsamina, Conyna, E-rigero, Tragopogo, Betonica, Salvia, Polio, Rosmarino. Et Rosarum, Labruscæ floribus, seminibus Myrti, Iuniperi, Glandibus, Pal-mulisq; immaturis. Ex quib⁹ aliqua in Aqua vel Vino, aliisque decoquantur, addito inter-dum Aceto: eritq; decoctum efficacius, si ex pulueribus siccantibus quidam simul coquantur, vti & Alumen, &c.

Aquis stillaticis plantarum prædictarum quarundam, vulnera abluuntur.

Vel talis aqua stillatitia paretur: R. succi Plantag. Agrimonie, Hyperici, ad ʒ. xij. Vi-ni albi ʒ. iij. Aluminis ʒ. iij. Mastiches, Thu-ris ana ʒ. ʒ. Auripigmenti ʒ. j. albumin. Ouo-rum num. ij. eliciatur aqua.

Alia: Lateres cocti puluerisati, Cera pu-rissima, Vino aliquoties lota, subiguntur in

pastam, è qua in alembicum imposita, aqua igne valido elicitur.

Aquam in folliculis Vlmi inclusam, sunt qui probant.

Pulueres vulneribus inspergendi, ita ta-men ne conglutinationem impedian, ob id subtilissimi esse decent; quales sunt illi, ex quibus emplastra, addito albumine, fieri diximus.

In capitis vulneribus, præsertim si calua-ria fracta sit aut læsa, sarcotici insperguntur pulueres qui sunt ex rad. Ireos, Aristolo-chia, farina, Orobi & Thure: Additur inter-dum & Myrrisa, Sarcocolla. Alias etiam A-loë & Sanguis draconis: item cortic. Piceæ & cortic. radic. Panacis & Capparum, & radices Cyperi: & cum squamæ adfunt Of-fium, Squama æris, Pumex, Crocus mar-tis: & capitis læsi causâ, Grana tinctorum, Santalum, Nux cupressi & Myrtilli: cum potenter siccandum, Tuthia, Anthimoniu.

Aloë sola vulneribus capitis inspergitur, si cerebrum appareat.

Sanguis humanus vel Hirci aut alius, sic-catus, vulneribus quibusvis inspersus, ad-modum ea glutinat.

Lapidum, Hæmatitis, succus seu liquor sanguineus, aut Galactitis lacteus, per frica-tionem in cote ablatus, siccatusque, valde siccatur & glutinat.

Propinantur ad vulnera sananda, quæ-dam bibenda, assumendæve, inprimis Po-tiones vulnerariæ, Traumaticæ ob id appel-latæ, idq; non solum, si ad ventriculum & intestina vsque vulnera penetrent, quod eius-modi potiones peruenire possunt, sed &, si viscera alia in ventre inferiore aut in pecto-re læsa sint: quin imò in exterioribus vulne-ribus prodesse, & eousque non solum vires suas extendere, sed & quoq; progredi, hisce probare nititur, quod eas è vulneribus exu-dare obseruarint, imò adeò validè in exterioribus operari, vt si non vulneratis hæ potio-nes dentur, alicubi sub cute viam sibi facere nitentes, adeò molestant, vt illic sectione fa-ctâ illis exitum patefacere cogantur. Qui et-si fortè, vt hisce suis inuentis splendorem ad-derent, vel decepti aliis humoribus, qui in vulnere quandoq; se offerunt, hos à potione

illa prodire credentes, hæc sparserint, tamen experientiâ compertum, has in sanâdis vulneribus non leue adiumentum attulisse, licet quibus viribus illud faciant, dubium sit: credibile tamen, hoc vi siccante, quæ etsi ad interiora vulnera facilius peruenit, tamē ad exteriora se quoq; extendere potest, potius facere, atque vti externa remedia id efficere, quàm proprietate aliquâ: cum hæc ex tam diuersarum qualitatum simplicibus, quæ has poriones subeunt, componantur.

Hæc autem decocta, ex certis ad hæc experientiâ appropriatis plantis fiunt; quæ recentes vel siccæ, in vini albi mensura vna coquantur, pluribusq; vicibus, manē, aliquando & vesperi, propinantur: aliàs siccatae in puluerem redactæ, ad vsum conferuntur; & cum opus est, illius quantum tribus digitis capi potest, in Vini mensura vna ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem coquitur, illudq; vinum propinatur; aliàs Ceruissæ, vbi eam maximè bibere solent, incoquitur, rariùs in aqua, sed si vinum nocere posset, illud potius Aquâ, antequam decoquatur, diluunt. Mel frequenter etiam hisce decoctis permiscetur. Quæ & in formam syruporum, vt diutius asseruari queant, possunt redigi: fiuntque sequenti modo.

Pyrolæ folius decoctum hoc modo propinatum, primas tenet: Vel cum Sanicula coquatur: Aliàs & Solidagine sarracenicâ, & Alchimillâ.

Angelicæ syluestris folia in Vino decocta, si illud bibatur & admoueat, admodum probatur in vlcere Glidwasser reddente.

Vel: R. Saniculâ, Consolid. Sarracenicam, Artemisiam, Sanguisorbam, pro decocto.

Aut: R. Consolid. sarracenicam, Betæ & Angelicæ syluestris caules, Saniculam, Alchimillam, Pyrolam.

Vel: R. Consolid. mai. Tormētillæ & Rubiæ radices, Pyrolam, Alchimillam, Fragariam, Agrimoniam, Millesfolium, Equisetum, Cynoglossum, Cariophyllatam, Betonicâ, Vincam peruincam, Sanguisorbam, Pilosellam, Virgam auream, pro decocto.

Hisce decoctis, aliquæ etiam de sequentibus plantis addi possunt: Veluti sunt Consolida media & minor, Ophieglossum, Poly-

gonum, Polygonatum, Trinitas: Aristolochiæ, Bistortæ, Dictamni albi & Costi radices: Flos solis, Phu, Cyclamen, Balsamina, Pulmonaria, Potentilla, Solsequium, Auricula vrsi, Lunaria minor, Sion Crateuæ, Salvia agrestis, Nepeta, Hyssopus, Pulegium, Centaurium minus, nisi amaritudo obstat, præcæteris additur, vti & Gentiana. Astacos simul cum istis aliqui decoquunt.

Præcæteris magno successu exhibitum hoc est: R. Pyrolam, Consolidam sarracenicam, Betæ albæ & rubræ folia, è medittullo, Angelicæ syluestris caules, Cardui benedicti folia, Agrimoniam, Betonicam: & si spicula ac festuca lignorum elicienda, Sabinæ ramulum; è quibus puluerisatis, cochlearis mensura, decoctum in Vini mensura vna factum, indies ter, manē, post meridiem & cubitum ituro, ad 3.ij. propinatur. Hoc adeo potenter operari aiunt, vt & si quid vulnere inhæreat, illud expellat; & plurimum iuuare in vlceribus, Glidwasser proferentibus.

Est & hoc probatum Ital. R. Consolid. maioris, rad. Plantag. Pedis columbini, Cynoglossi ana M. j. Sanguisorbæ, Pilosellæ, Cariophyll. Cauliū rubr. Agrimonie ana M. ʒ. coquatur in Vino rubro ad tertias, dulcorando Melle: Colaturam bibant manē quotidie.

Hoc quoq; cōmendatum est: R. Caulium rubrorum, Rubiæ maior. fol. Geranij Robert. Plantag. Cannabis, fol. Abrotani, Tanaceti, sem. Erucae, Apij, Petrosel. Fœniculi, incidantur & conuassentur, decoquatur in Vino, addito Melle: Detur manē & vesperi.

Alia utilis potio: R. Artemisiam rubræ caules, Bellidis albæ folia, Saniculam, Pyrolam, Alchimillam, Betonicam, Saluiam, Lauandulæ cauliculos, addendo interdū Mumiæ ʒ. ʒ. Sunt qui tantundem Castorei addunt, magno vt inquit successu, & vti supra dictum, omnia decoquunt.

In vulnere à sclopeto facto profundo, hoc pro singulari aliqui habent experimento: R. baccarum Lauri, rad. Aristol. rot. ana ʒ. j. Cancrorum nostrorum in furno exiccatorum ʒ. j. ʒ. Prunellæ exiccatae ʒ. ʒ. fiat puluis, qui in lb. iij. Vini coquatur ad consumptionem tertiæ partis. Bibat æger ʒ. j. huius Vini ter in die, & eodem fomentetur locus, vel

vel illud in vulnere profundo injiciatur.

Alia in istu sclopeti etiam fracto esse convenientes: R. radic. Consolid. maior. ʒ. j. β. radic. Aristoloch. ʒ. j. radic. Cyclamin. Serpentariae an. ʒ. β. Prunellae, Geranij ana M. j. Sabinae M. β. Mumiae ʒ. ij. Oculorum cancri dict. ʒ. β. Galangae ʒ. ij. fiat pulvis, coquatur in mensura j. Vini: Et bibat.

In capitis præcipuè vulneribus, decoctum valet factum ex Betonica, flor. Lilij conuallij, Veronica, Chelidonia, Persicaria, Vinca peruinca, addito etiam paucio ob amaritudinem, Centaurij minoris, cum Nuce moschata, Macere, Galanga.

In pectoris vulneribus, decoctum in Vino & Melle factum ex radic. Pentaphylli, Cariophylorum, Consolid. maior. Rubia tinct. herbis Veronicae, Betonicae, Pimpinell. Arthemisiae, Parietariae, Canabis, Cressionum, Caulium rubrorum, floribus chamomill. Viol. Amarinthi purpurei, Passulis.

In vulneribus ventriculi, dantur quæ sanguinem sistunt & consolidant. Bolus, Consolidata cum Vino rubro, additâ Galangâ.

In intestinorum vulneribus Equiseti cum radice, nonnunquam & addendo Hederam terrestrem, in aqua decoctum, commendat Dioscorid.

Fimum leporis, & leporis pilos sub ventre, cum Melle decocta, & frequenter fabæ quantitate sumpta, Matth.

Succi prædictarum præcipuarum plantarum, à recentibus expressi, vel maceratione prius factâ, si aridi sint, in Vino & Aqua propinantur: Veluti ille qui ex Consolid. maior. radic. mundata contusa, & cum aqua permista, exprimitur: vel alij, addendo Mel, interdum vnciatimque dando.

Vel ex Caulibus rubris & fol. Cannabis cum Vino pistatis, expressi.

Aquæ stillatitiae, etsi minus validè, aliquid tamen possunt efficere. Inter quas ea quæ ex Hypericone & consolidata Sarracenica elicitur, valdè commendatur, si haustum illarum manè & serò bibant.

Equiseti & radicis Cyclaminis aquas ad ʒ. vj. Saccharo dulces redditas, bibitas, intestinorum vulneribus competere, docet Matthiolus.

Pulveres interdum aliqui, supradictis decoctis misti propinantur: veluti foliorum Gratiolæ ad ʒ. j. Oculorum cancri ad ʒ. β. Spermatidis Ceti ad ʒ. vj. Nucis vomicae ʒ. j. β. fumendo vnum vel plures, & addendo Zedoariae, Maceris, Galangae parum, & vti dictum, exhibendo.

Testarum ouorum, Oculorum cæcri pulvis, cum aqua florum Papaveris, datur in pectoris vulneribus.

Momordicæ pulvis cochlearis mensurâ, cum aquis vel decocto datur, si intestina vulnerata sint.

Conseruæ & condituræ prædictarum plantarum, cum Melle factæ, dando singulis matutinis ʒ. β. aliquid quoque præstabunt.

Oleum Iuniperi bibitum, vulnera ad interiora pertingentia sanare posse, aliqui asserunt.

Oleum Croci martis & essentiam Coraliorum an. ad ʒ. j. cum aqua spermatidis Ranarum, ad sanguinem in vulneribus erumpentem, exhibet Quercetanus.

Ad huiusmodi remedia per os exhibita, quæ in vulneribus sanandis cæteris adhibentur, referuntur & illæ potiones, quæ priuatim in vulneribus ex contusione, ex ictu, vel casu natis, exhibentur. Quæ cum maxime ad sanguinem coagulatum dissoluendum, mox ab initio propinentur, non solum si ex contusione vulnus adsit, sed etiam si tantum tumor se proferat, vel nihil etiam appareat, solusque dolor alicubi infestet, vsurpantur, sicuti in tumore ex contusione dictum fuit. Hic autem illa vt cæteris quoque eiusmodi potionibus iungantur, describuntur. Atque ex sequentibus præparantur.

Carbones Tiliæ vulgus mox exhibet, post casum aut contusionem, additâ Mumia, vel solam Mumiam dant.

Vel: R. Mumiae ʒ. ij. Rhabbari ʒ. j. β. vel illius loco Rhapontic. hoc est rad. Centaur. mai. vel cortic. Myrob. Citrin. radic. Rubiae tinct. ʒ. j. fiat pulvis: Dentur ʒ. ij. cum iure pulli gallinacei euiscerati cum plumis cocti.

Quâdo suspicio de sanguinis grumo, circa venas meseraicas aut ventriculorum vel intestina: Tunc ʒ. j. huius pulveris vel ʒ. iij. cū Cassia, Diaprunis sol. aliove laxante ad ʒ. j. exhibe; alij Agaricum quoque addunt.

Vel in hæmorrhagiæ aut fracturæ metu, ad 3.v. huius pulueris, Bolus aut Terra sigill. Sanguis draconis ad 3.j. spermatis Ceti 3.ß. addi potest. Vel alij pulueres, vt Bistortæ, Tormentillæ, flor. Hypericonis, Cyani maior. Lapillorum quos Oculos cancri vocant, ad 3.j. cum decocto aliquo vel Vino. Quibus & odorata, & aromata gratiæ causâ aliquando addunt, vt Nucem moschatam, semin. Fœniculi; vel Saccharum ad gratiam.

Decocta ex sequentibus fiunt, puluerisatis ferè prius, & in Aqua vel Vino decoctis, addito interdum Sale, vt vult Diosc. Veluti ex radic. Consolidæ maioris, Aristol. Rubiæ maior. Vincetoxici, Bistortæ, Tormentillæ, Baccharis.

Ex plantis, Millefolium, Consolida minor & media, Sanicula, Auricula vrsi, Cyanus maior, Pilosella, Virga pastoris, Potentilla, Alchimilla, Ophrys, Lunaria minor, Plantago.

Experientiâ probatus puluis Vincæ peruinæ, & Arthemisiæ: additâ si, vt inquit, costa fracta sit, rad. Angelicæ, & Caulium.

In Butyro recenti, addito interdum & Vino, decoquunt aliqui plantas vulnerarias, Butyrumque postea ab illis separant, de eoq; ad 3.j. pondus in Iusculo calido vel Ceruissia exhibent; illoque, si ex casu alicubi doleant, locum illum simul inungunt.

Aquæ Plantag. Cyclaminis, Consolidæ maioris, Betonicæ, aliarumve plantarum exhibentur.

Succus Gentianæ 3.j. pond. Diosc.

Puncturæ angustiarum diuersarum, vti & neruorum, curatio.

Vulnus angustum, cuius orificium arctum est, quia punctum sit, Punctura dicitur, ab ea quæ vulnus punctum quoque procreauit, in eo quod illud latius est, & proin eandem cum vulnere curam requirit, hoc verò quia angustius, priuatam exigit, differens. Quæ si cutem tantum & carnosas sedes tetigerit, minus est difficilis, si verò neruofas partes attigerit, quo nomine non solum neruum, sed & ex eo confitas partes nerueas membranas, summeq; sensiles intelligimus, grauis, tum quia spasmus facile procreat, vel alias læsiones partibus in motu adfert. Inprimis si neruus punctus sit, quod tamè rarius, cum paruus rotundus facile cedat, accidit, nisi pun-

ctura, in posterioribus corporis crurum & brachiorum sedibus, vbi maiores nerui immerfi latent, eousque vt neruus quoq; tangatur, adigatur: ob quam & causam magis quæ à tergo quàm à facie inflicta vulnera, chirurgi nostri esse censent: Vti & illas puncturas quæ ad musculos illic maiores pertingunt, atque in die Mauss gestochen vocant, ob eandem, quod vel neruus, vti dictum, læditur, causam, vel partes illius neruosæ, musculorum scilicet caput seu principium. Quæ puncturæ frequentius, quàm vt solus neruus tangatur, accidunt; licet & hanc & alias in neruoso genere factas, omnes, neruo læso, attribuant practici. Periculosæ & lethales interdum puncturæ quoque existunt, in ventrem inferiorem & thoracem penetrantes, illicq; viscera aliqua lædentes, vti & in punctis vulneribus latis dictum fuit. Nec solum ob harum partium læsiones, sed & quod sanguis tunc in corporum cavitates influxus, quod proin pro malo signo chirurgi habent, illic concrefcens & putrescens noceat.

In curatione, euacuationes & reuulsiones per venæ sectionem, aliaque si opus sit, vt in vulnere amplo ostensum, faciendæ: Corpusque vt purum & mundum sit, viuendi ratione decenti procurabimus.

Puncturæ verò ratione curandi methodus erit; si quid vulnere adhuc inheret, illud diligenter, vel mox vel successiue auferre, vel admotis elicere; quæ si altius immerfa sint, vix nisi suppuratione factâ, tunc cum pure prodeant, exeunt: Dein osculum vulneris, quod hic nõ vt in latis vulneribus dissitum est, sed potius iunctum, non vti in aliis amplius coniungere & coarctare, sed potius aperire, dilatare, apertumq; seruare, idque ne sanguis, qui eò deferretur, in angusto loco subsistens, inflammationem pariat; vel humiditates excrementaque retenta curationem impediunt, grauioraq; inducant mala: dein & si quid adhuc de eo quod pupugit, hæserit, per apertum osculum facilius exeat: Tertiò, vlcus consolidationem procurare, admotis siccantibus, quæ humiditates ichoresq; absorbendo, naturam, quæ vulnera, vti in vulneribus dictum, & si impedimenta hæc non obstant, paruas puncturas sola sanat, adiuent,

uent, quæ proin etiam Glutinantia vocantur. Quæ tamen hic non eam adstrictionem sicuti in latis vulneribus, quæ cum dissita sunt, eam vt coarctentur, requirunt, quod in angustis hisce vulneribus minimè opus est, vt habeant, necesse est. Sed potius emplastica simul esse debêt, atq; vnctiosa, vt sic oscula vulneris, donec illa penitus coalescant, aperta retineant: ne si nimium ea exsiccent & adstringerent, citius quàm par erat, occlusa, vt dictum, illius sanationem impedirent, quibus remediis etiam ea, quæ si quid infixum manserit, eliciant, permiscemus. Hæc autem omnia sequentibus perficiuntur remediis.

Manuali operatione, adhibitis interdum instrumentis, apprehendendo trahendoq; aculeos, spinas, aliaque infixa spicula euellimus, vel etiam fragmenta altius hærentia, acu, acutòve stilo, cutem fodiedo & aperiendo, ad viam sæpe vsque carnem auferimus, & postea sanguinem qui sequitur, ne subsistat, Suctione exhaurimus. Quâ ratione vulgus leuiore punctiones tractare, & sic etiâ citra alia præsidia, vel leuia saltem, vti dicitur, adhibita, sanare solet.

Verùm & sectione, si quæ altius impacta firmiter hæreant, doloremq; summum procreent, vnde metus inflammationis, grauiorisq; mali, cogimur aliquando obstacula hæc auferre, & nonnunquam osculum puncturæ, prius quàm vulnus intrinsecus coaluerit, occlusum, secando rursus patefacere.

Turundâ molli, si vulnus eam citra dolorem magnum intrudi patiatur, osculum apertum quoque seruamus, medicamentaq; illi affixa, vulnere intrudimus.

Emplastra potissimum puncto loco adhibentur, illisq; solis sæpe puncturæ sanantur, quæ non solum vi siccandi, vti dictum, concretionem iuuando, eas conglutinant, sed & interim officium vulneris in cute, cui affixa continuò hærent, emolliendo & margines illius tumidas & veluti excoctas reddendo, apertum, quod requiritur, ad perfectam vsq; sanationem, quæ factâ cicatricemq; natâ, cutis hæc portio quæ tamdiu emollita fuit, sponte abscedit, seruant. Quæ emplastra etiam, cum tam validè, vt in maioribus & sordidioribus

vulneribus siccare non necesse sit, diu vires suas applicata retinēt, adeò vt nō necesse sit frequenter ea pmutare, sed vnū ad dies plures vsurpatum, sæpe sufficiat: atq; vidi, postea quoq; idem illud in alio adhibitum, iuuisse. Quæ & si punctura membrum perforarit, in illius introitu & exitu adhiberi debent.

Eiusmodi autē emplastra, ex multis concinnata, quæ puncturis præcipuè accommodata sunt, vt eas siccando sanent, additis interdum quibusdam, quæ si quid adhuc hæret, extrahant, priuatim à chirurgis nostris Stichyspaster id est Puncturarum emplastra vocantur: quorum variæ sunt descriptiones; nos selectiora eligendo, sic primum paratu facile proponemus: R. Thuris, Mastiches, Myrrhæ, Colophoniz, Mumiz vel Asphalti ana ʒ. j. Camphoræ ʒ. ij. Croci ʒ. j. axungiz Thymali ʒ. j. Cerae ʒ. iiij. Picis ʒ. j. quibus tribus dissolutis, reliqua permista, in formam emplastri subigantur.

Aliud ex gummis factum emplastrum: R. Lithargyri ʒ. j. Cadmiæ fossil. ʒ. iiij. olei Oliuarum ʒ. j. olei Laurini ʒ. iiij. coquantur ad spissitudinē aliquam, dein adde gummi Galbani, Ammoniacy, Bdellij ana ʒ. ij. cocta in Aceto, donec dissoluantur & acetum absumatur; item Cerae, Terebinth. dissolutarū an. ʒ. ʒ. axung. Thymali piscis ʒ. j. agitentur simul dum calent, sensim permiscendo Thuris, Mastiches, Myrrhæ an. ʒ. j. fiat emplastrū, malaxando cum axungia dicta.

Compositum ex plerisque ad hæc conuenientibus, sic fit: R. Cerae, Picis, Resinæ siccae & fluidæ siue Terebinth. Olei antiqui vel alter. an. ʒ. iiij. ol. Laurini vel Lumbricorum vel Ouorum, axungiz Thymali an. ʒ. j. ʒ. dissoluantur; & dum seruent, permisce illis Galbani, Oppopanac. dissolut. in Aqua vitæ, puluerū Colophoniz, Bituminis seu Asphalti vel Mumiz, Mastiches, Thuris, Myrrhæ an. ʒ. j. Lithargyri, Cerusæ an. ʒ. vj. Sanguinis draconis, Lapid. Calaminaris, Magnetis, vel Hæmatitis, Coralli vel Matris perlarum, Boli vel Terræ sigillatæ, Chalcanti, Camphoræ an. ʒ. ʒ. rad. Aristoloch. Cōsolid. pulueris Lumbricorū an. ʒ. ij. Croci ʒ. j. malaxetur axungia Thymali vel Ardeæ pro emplastro.

Aliud infixa admodum attrahens; R. Li-

thargyr. Sulphuris an. 3. j. Minij sinopici, Æris squame an. 3. vj. Aluminis, Chalcitidis an. 3. 6. lap. Magnetis, Coralli rubri an. 3. ij. Terræ sigillatæ vel ampelicitidis 3. j. 6. rad. Aristolochiæ, Serpentariæ, Cyclaminis, femin. Iuniperi, Vrticæ an. 3. j. gummi Galbani dissol. in Aceto 3. j. Succini 3. vj. Thuris, Mastichæ, Myrrhæ, Mumia, vel Asphalti, Oppopanax an. 3. 6. Propoleos 3. j. 6. cum Terebinth. Pice & Resina & Oleo vetere fiat emplastrum: cui si ol. Tereb. Myrrhæ, Sulphuris, Succini addas, efficacius erit.

Idem facit, & infixa elicit emplastrum Andromachi apud Auicennam, quod præter multa similia etiam, caput lacertæ, lac arboris mori, grana in palma inuenta recipit.

Hæc emplastra efficaciora erunt, si Ærugo aris ad 3. 6. misceatur. Nonnunquam & olea destillata, vt è baccis Iuniperi, de Spica, ad 3. ij. vel è Gariophyllis aromaticis exstillatum, in magnatibus.

Emplastrum ex vsitatis est Nigrum dictum, quod fit ex olibano, mastiche, myrrha, mumia, sanguine draconis, corallis, lapide magnetis, cerusa, vitriolo Roman. & albo, lumbricis, camphora, oleis, rosac. ouorum, spicæ, Iuniperi, axungia ardeæ, thymali, colophonia, terebint. resina, pice, cera.

Neruofarum partium neruorumq; puncturis, sequentia emplastra accommodata ab initio apponi possunt: R. farinæ Fabarum, vel Lentium, pulueris rad. Althææ an. 3. ij. bulbos Narcissi recent. numer. ij. vel iij. Liliorum j. decoquantur in Vino & contundantur, addendo Terebinth. cum Vitello Oui dissolut. 3. 6. Mellis 3. ij. Croci 3. 6. olei Hypericonis q. s. Cera parum: applicetur.

Vel hoc emplastrum: R. Hyperici atque Centaur. minoris an. m. ij. Betonicæ, Rosmarini, Consolidæ mediæ, Plantag. Pilosellæ ana m. j. florum Anethi & Chamom. an. p. j. rad. Narcissi, Consolidæ, Rubiæ tinct. an. 3. j. incidantur, addendo Lumbricorum in Vino lotorum numero xx. adde Olei & Vini generosi ana lb. j. 6. coquantur ad consumpt. coletur oleum, cui addæ sœui Ceruini vel Hiraci, vel Arietis 3. ij. Terebinth. 3. ij. Mastiches 3. ij. gummi Ammoniaci, Galbani, Sagapeni dissol. in Aqua vitæ an. 3. j. Lithargyri 3. j. 6.

Cera q. s. fiat vnguentum: vel addendo Picem, emplastrum.

Cuius loco emplastro de Vermibus Guidonis vt possumus, Dialthææ quoq; pbatur.

Olea quandoq; etiam vsurpantur, in nerui præsertim punctura; quæ, & si alia neruosa loca tacta sint, quoq; locum habere possunt.

Perfunditur locus punctus Oleo calente affatim, si dolor magnus adsit, vel Chamomelino, vel Anethino, vel Rutaceo.

Vel instillantur vulneri Olea, aut Lana hisce intincta applicatur, vt Hyperici, Lumbricorum, Terebinth. vel aliarum resinarum, Mastiches, Sabinum; vel doloris cauâ de vitellis Ouorum, & olei fructus Momordicæ.

Ex oleo Leuistici cum Axungia (inter quas Leonis magnificiunt) & Cera, vtile fit vnguentum, quod apponitur.

Vel Oleum in quo dissoluta sit Terebinthina vel aliæ resinæ, Oppopanax, Sagapenum, aut etiam Euphorbium, vel Sulphur viuum, conuenit.

Præter hæc, multa balsamelæ vnguenta & emplastra, in vulneribus explicata, neruis accommodata, in puncturis quoq; conueniunt.

In neruorum etiam punctura, Terebinthina cum vitello Oui, ob dolorem & Croco commodè apponitur.

In puncturis in genere, Senecionis folia contusa cum Thuris manna probat Diosc. & Draculi minor. fol. Coccumq; insectorium.

In leui punctura à spina vel acu, Cataplasma ex folior. Cannabis contusis cum Oui album. & Aceti modico, probatur.

Ad elicienda simul puncturis infixa, hæc potissimum applicatur: Emplastrum ex Aliis Aërii, quod fit ex alio, nitro, pice, medulla cerui, cera, oleo.

Idem facit Fermentum, propolis, (quæ hic admodum conuenit) vel Melle & Cera subactum, apponitur.

Cochleæ terrestres è testis exemptæ, & Lumbrici, contusa vel decocta prius in Vino, & postea tusa, & Farinâ subacta, infixa extrahunt & sanant.

Cancer viuus, Lumbrici terrestres, si amputatâ extremâ illarum particulâ, cõiundantur, & addito sœuo Leporis. & Vulpis loco punctio

781

puncto cui adhuc aliquid infixum hæret, applicentur, quæuis ex eo eliciunt.

Musca vulgaris contrita, si imponatur, fistulam infixam Spreissen extrahit.

Lotio ex decocto Pisorum rubrorum facta, postquam spina extracta est, admodum iuuat.

In Neruo puncto, Vino albo optimo antiquo, si locus perfundatur, proderit.

Et si pulvis Oculorum cancri, Cornu cerui, & Lumbricorum inspergatur: qui & Melale excepti & Terebinti ad moti, proderunt.

Potiones vulnerariæ in vulneribus recentibus aliquæ, in puncturis quoque propinantur, quas adeo efficaciter operari aiunt, ut & si quid infixum, non solum in profundo corporis, quod melius vires harum potionum pertingunt, sed & in superficie in cute hæreat, illud propellant.

Si suppuratio accedat, quia tunc in vlcus commutatur punctura, & latefeit, ut vlcus sanabitur.

Si inflammatio adiungatur, ut in compositis cum inflammatione dicitur vulneribus, cura instituetur. Si conuulsio vel spasmus, aut paralyxis vel contractio sequantur, cura quæ in hisce læsionibus explicata fuit, instituitur.

Vulnera, Morsus, Ictuum, venenatorum, virulentorum, curatio. Venenata vel virulenta vulnera aut punctura, à gladio, telis, spiculis, spherulis scopulorum, veneno, vel noxio alioquin succo imbutis, vel à moribus bestiarum, ut serpentis, mustelæ (de canis rabidi morfu in hydrophobia egimus) aut ictibus scorpii, araneorum, aliorumve animalium morfu vel ictu, venenati aut virulenti quid corpori insidentium, prodeuntia, eo deteriora sunt, quod venenum illud est deterius, ut scorpii, eoq; magis, si vulnus quoq; graue inflixerit instrumenta infecta, vel morsus, quæ non solum grauiam inducunt symptomata, sed & vulnus peruersum sæpe gignunt. Leuiora sunt alia, quæ saltem noxium quid in se habent quod ardorem & dolorem efficit, nisi illorum ratione, accedente inflammatione, peruersa insuper sequantur vlcera: ut sunt ea quæ morsus aliqui non venenati, sed noxii tamen induxerunt, sicuti ferè serpentum & araneorum nostrorum morsus, non adeo ut vi-

perarum, vel phalangionum periculosi: quod & apud istum referimus: in quibus omnibus etsi læsio parua, tamen dolor valde excruciat.

In venenatis eiusmodi vulneribus vel puncturis, si venenum graue existat, illud è corpore & vulnere rursum elicere, illiusque vires infringere studebimus, vulnusque postea ab hoc hoste liberatum, prout illud aut amplum aut angustum, eo modo, ut in illis ostensum, sanare. Quæ verò veneni causa, hic priuatim fieri debent, per exhibita admodum sequenti modo perficiuntur.

Propinantur subito antidota, quæ venenorum vim retundant, & quæ contra morsus & ictus bestiarum efficacia esse, passim describuntur: qualia inter cætera sunt Theriaca, Mithridatum, Mithridatis Damocrati, Athanasia Mithridatis, Esdra Antidotus: Item de Stinco, de Sanguinibus, de terra Lemnia, à Galeno descripta. Electuarium de Asa Mesuæ, aliaque innumera, à Dioscoro & Nicandro proposita.

Item recentiorum varia, inter quæ & sunt Antidotus illa, ex plerisque quæ venenis resistunt, composita, Matthioli: & tantopere nostro tempore celebrata antidotus ex Laureola concinnata, quam Saxoniam vocant: aliaq; multa & antidota & cordialia, in peste, cum & illius venenum retundant, recentia fuerunt, aliisque in accidentibus, quæ à veneno extrinsecus adueniente, intrinsecus venato, proueniunt, ut & in mania, quæ si à canis rabidi morfu orta sit, exhiberi debeant, antipharmaca. Præter quæ in vulnere venenato, si bolus, terræ Lemnia & Mumia exhibeantur, tum quia veneno resistunt, & vulneribus quoque sanandis competunt, si præsertim ad viscera usque descendant, duplici nomine proderunt.

Ut & hoc decoctum vulnera sanans, & venenum reprimens, quod ex rad. Vincetoxici, Phu maioris, Tormentillæ, rad. Angel. sylvestris, prius maceratis in Aceto, & fol. Scabiosæ, Vrticæ, Valerianæ minor. florib. Lilij conuallij & Vincæ peruenit, in Vino decoquitur.

Item succus Dictani & Scorzonæræ, Gentianæ, extractumve inde paratum; aliaque varia vtrumque præstantia.

Stercoris Galli vel Gallinæ decoctum, ad

venenum pellendum, magni quidā faciunt.

Oleum de Scorpionibus illud operosum & polycrestum Matth. pulvis & arteriis illitum, venenum omne, ne noceat, retundere asserit.

Foris quæ vulneri aut moribus venenatis applicantur, vt vim veneni eliciant, varia in bubone & anthrace pestiferis, morfu canis rabidi, exposita fuerunt, quæ actu, suctione, aliæ attractione id faciunt. Quæ & in aranei & scorpij ictu, per vitiones, sectiones, cucurbitulas facta prodesse possunt, aliterve per ictus immissa venena elici.

Atque quæ potentiâ venenum attrahunt aut infringunt, illic quoque explicata, hinc iunguntur.

Vti & emplastrum hoc: R. stercoris Columbini vel Gallinæ ꝓ. j. pulueris Dictamini Cretici ꝓ. ij. Nitri ꝓ. j. axung. Leporis & olei Amygdal. amar. & Ceræ q. s. fiat emplastrum.

Vel hoc: R. succorum Scabiosæ, Rutæ, Capæ sub cineribus coctæ ana ꝓ. ij. succorum Anagallidis, flore purpur. Cyclamin. an. ꝓ. j. rad. Dictamni albi, Gentianæ an. ꝓ. ij. semin. Ricini ꝓ. j. Galbani dissoluti in Aceto ꝓ. vj. olei Succini, olei Myrrhæ, olei Sulphuris an. ꝓ. ß. olei Croci ꝓ. j. Terebinth. q. s. fiat emplastrum: cui & Theriaca vel Mithridatium addi potest.

Alia eiusmodi emplastra, quæ venenatis imponuntur vulneribus, aut punctionibus, à Galeno proponuntur; venatorum Giluum, Icosij, nominata, ex quorum ingredientibus tamen ea vulneribus sanandis magis accommodata esse, colligere licet.

Rectius hoc emplastrum ab eodem Galeno descriptum, Diadictamnium dictum, præterquam quod eiusmodi vulnera sanat, ad spicula & venena elicienda quoque conuenit. Probant & vnguentum Macedonicum vocatum.

Quæ proprietate singulari hoc vel illud venenum venenatarum bestiarum potius alliciunt, vel retundunt, vt Scorpium comminutus illiusve Oleum, in ictu scorpij, cum ab aliis non ita sit periculum, & de cane rabido iam dictum sit: à Dioscor. & Nicandro reliqua peti possunt.

In aliis moribus vel ictibus, qui vim adu-

rentem potius quam venenatam infundunt, doloris, tumoris & inflammationis si illa accedat, potius causâ, remedia hisce locis eadem, quæ in aliis eiusmodi affectibus proposita sunt, admovebimus. Inter quæ & in Apis ictu, qui præ cæteris frequens, Argillâ mox locum illinunt, qui apum curam habent coloni, aliasque herbas tumorem repellentes, in phlegmone descriptas affricant. Et si ab Urticæ aculeis pars vratur, eadem quæ in ambustis dicta, conueniunt.

Quod alios ictus attinet pulicum & cili-cum, cum pruritum leuem & maculam tantum, leuemque tumorem adferant, sponteq; hæc abeant, negligantur.

Vlcus siue ex vulnere suppurato prodierit, vel post abscessum relictum sit, quale est quod Sordidum vocauimus, siue planum, cauum, aut sinuosum, nondum tamen tunica inuestitum exiit: vel illud quod Putridum, Vermicosum, Corruptum aquam exudans, Glidwasser dictum; aut quod Paronychia succedit: siue ex vitioso succo genitum sit, aut eo foueatur, quale est Exedens, Depascens, Phagedæna, Varicosum: Siue ex maligna vi oriatur, vt Maligna in lue venerea & extra hanc occurrentia, & elephantiorum vlcera: hisce omnibus curationem, cum in multis conueniat, simul accommodabimus. Postea illorum vlcum quibus tunica, callus, caro accreuit, qualia sunt fistulosum, callosum, excrecens, vt & eorum quibus tumor præter naturam iungitur, vt phlegmonis curationem his subiungemus.

Aliorum vlcum quæ cancro, anthraci, herpeti, scabiei iunguntur, curam vnâ cum horum tumorum & pustularum curatione exposuimus.

Cæterum inter hæc vlcera ex vulnere vel abscessu nata, quæ sordida dicuntur, quod minus ea caua sunt, ea citius, tardius alia, præsertim si sinuosa sunt, sanantur. Quæ putrida & vermicosa, deteriora, illaque præsertim, quæ in neruosis sedibus existentia corrupta, Glidwasser dictum profundunt, cum articulos immobiles reddant, vel in gangrænam nonnunquam abeant, admodum metuenda: vt & illud quod è paronychia prodit, digitorum corruptens internodia-

*Vlcus,
Planum,
Cavum, Si-
nuosum, Putridum, Vermicosum, Corruptum, Exedens, Depascens, Phagedæna, Varicosum, Malignum, Elephantiorum, curatio.*

285

Peruerſa magis hæc ſunt, ſi ſucco vitioſo foueantur; vti & illa quæ primam ab eo ſumunt originem, exedentia, depaſcētia, phagedænica, quæ diu durant nonnunquam, & incurabilia ſunt: eaquæ præſertim, quæ in pedum imo ſunt, & humore eò continuò deſcendente, nonnunquam & varice vicino fouentur, & curari vel non debent, ne humor interceptus grauiora pariat accidentia, vel non poſſunt. Quæ & cutem in pedibus, pluribus ſæpe in locis, aliquando totam, in circuitu lato ſpatio (ſicuti cortices, qui arbores corrumpere volunt, detrahère ſolent) depopulantur: vel etiam in aliis locis, propter ſubiecta oſſa, cartilagineſ, ſi ea vitient, vt in auribus naſo facta, noxia ſunt, partesque ſæpe, ex parte, vel etiam integrè abſumunt. Maligna quoque ſunt ſicque dicuntur vlcera, quæ ob contagium in obſcœnis mulierum, frequentius in virgæ virilis ſummitate, in glande & præputio prodeunt, curamque diu ſæpe protrahunt, interdumque hæc membra, vti dictum, aliquouſque abſumunt. Quæ luis venereæ ſunt ſoboles, non, niſi lue hac ſublata ex corpore, ſanari poſſunt. Elephantorum vlcera vnà cum morbo manent, augenturque & deſperata ſunt.

In curatione autem horum omnium vlcerum, ſic procedendum: Primùm per generalia præſidia, quod euacuationes attinet, vt pro ratione corporis, ſi plethoricum aut cacochymicum ſit, cum difficiliùs tunc curam admittat, venæ ſectiones, purgationes aliaque inſtituantur. Cauſæ verò ratione, ſi à ſeroſis, ſaliſis, bilioſis aut aliis prauis vel malignis humoribus vlcera naſcantur, vel illis foueantur, iis repurgandis è corpore euacuationes generales & particulares accommodabimus: Purgationes diuerſas per aluum aliaque loca inſtituendo, & in peruerſis diuturnis vlceribus ſæpe repetendo, eodem ſerè modo, ſicuti in ſcabiè ſananda expoſitæ, remediaque; illic varia deſcripta fuerunt, vt & in aliis à cacochymia procedentibus diuerſis hinc inde propoſitis affectibus, vt non ſit neceſſe talia ruſum repetere. In primis quoque ſudorum prouocatio ad humores hoſce, qui vlcera pepererunt & alunt,

exhauriendos, in eiufmodi vlceribus, illorū ſanationem promouent: & in vlceribus, quæ in lue venerea erumpunt, morbum vnà cum vlceribus ſanant: quin & in aliis diuturnis, vt & in ſcabiè diximus, non minimam curationis partem efficiunt. Qui quâ ratione, præcedenti purgatione, adhibita interdum cibi parſimoniâ, inſtitui debeant, in ſcabiè & alibi quoque declaratum fuit, & in luis venereæ cura diffuſè explicabitur. Sed &, ſi vena dilatata, Varix vlcus foueat, cum quâ diu illa manet, vlcus vix ſanetur, ex ea ſanguis erit emittendus; vel quod magis neceſſarium, vena ipſa exſcindenda: quod quomodo fieri debeat, alibi in varicibus oſtendemus. In omni interim horum vlcerum cura, bonâ viuendi ratione, potiſſimùm in cibo, potu, exercitiis, cæterisque, corpus vt purum reddatur, ſerueturque ad feliciorẽ curationem, diſponendum erit.

Topica verò quæ vlceribus, vt curentur, adhibentur, eodem pacto, vt in cæteris excoiationibus & vulneribus dictum, impedimenta tantum auferendo, cum natura ea ſanet, vlcerum ſanationem adiuuant. Quæ impedimenta, cum vel madores aut ſordes exiſtant, vel humores vitioſi aut putredines, vel corruptio alia, à quibus vlcera humida, ſordida, vitioſa, putrida ſunt, ſi hæc ab illis auferatur, vlceraque ruſum ab hiſce liberata; pura ſiant, natura hæc ex nutrimento partis denuò implet, & cicatrice obducit. Cæterum quæ impedimenta hæc auferant medicamenta, alia abſtergendo, & auferendo illuuiem omnem, quæ vlceribus adhæret, & innæſcit, alia exſiccando potenter prauos humores, alia madorem qui reſtat moderatè exſiccâdo, carnis regenerationem procurant: alia validiùs adhuc ſiccando, vt cutis recreſcat, ſeu cicatrix gignatur, efficiunt. Quod quâ ratione fiat, & quibus remediis, primùm in iis quæ carnis regenerationem iuuant, oſtendemus: poſtea de illis quæ hoc in cute moliuntur, acturi.

Carnis generationi conferentia remedia, quæ cæteris ſerè præmittuntur, ſunt Abſtergentia, Mundificantia, Riptica & Catartica dicta, quæ vi detergente & ſiccante prædicta, pus aliâve ſordes, aut humores, vlceri-

bus adhærentia, eaque sordida reddentia, ab illis repurgant, eaq; absumunt, vel si putredo corruptione alia simul adsit, vi etiã nihil erodente, eam auferunt.

Hiscemox siccantia subiunguntur, quæ madorem qui adhuc in repurgatis alioquin vlceribus restat, humiditatemq; exiccando, vlcus ad carnis renascentiam aptum reddant, quæ proin Sarcotica, Carnem generantia, atq; si ipsa hanc efficerent, dicuntur; sicuti in epuloticis, in glutinandis vulneribus, etiam ostendimus. Vti enim illic ablatis impedimentis, per glutinantia dicta medicamenta, natura, interueniente nutrimento, vlcera concrefcere facit, sic hic in cauis vlceribus, quando nihil ampliùs obstat, natura carnem ex eodem nutrimento producat, & viuæ & puræ carnis circumferentiæ apponens, & adnasci faciens, vlcera carne implens, illud quod amissum erat, reparat.

Alia verò quæ id præstant, sunt Siccantia remedia, quæ vi exsiccante validâ, humores prauos, qui vlcera inquinant, & depascentia reddunt, exhauriant; quæ vix separatim, sed plerunque cum abstergentibus mista, cum hæc vlcera sordida simul sint, vsurpantur; quæ & quia putredinem arcent, in putridis quoque locum habent: & si in illis vermes nati sint, eosdem enecant, vt non sit necesse hic priuatim vermibus accommodare remedia: quæ alioquin suo loco in vermibus simul explicauimus.

Hiscem verò remediis abstergentibus, vel seorsim, vel vnâ cum siccantibus, si vlcus depascent sit, vsurparis, Siccantia subiiciuntur, quæ vi siccante moderatâ, eum madorem, qui adhuc in repurgatis alioquin ab alia immunditie vlceribus restat, continuoque vlcera humectat, absumendo, vlcus ad recentis carnis productionem aptum, ab omniq; humiditate liberum & purum reddunt: quæ proin Sarcotica, Carnem generantia, atque si ipsa hanc propriis viribus procreant, nominantur, cum natura tunc ab hoc obstaculo, ope horum medicamentorum, liberata, ex nutrimento partis illius, quæ læsa est, vt in vulneribus gluten gignens, ea conglutinat, sic hic in cauis vlceribus, ex eodem nutrimento, carnem producat, & iam puræ

ac viuæ carnis extremitati apponens, & affigens, illud quod amissum erat reparando, carne denuò implet, & quod diuisum erat, simul rursus vnit & conglutinat. Hæc autem sarcotica dicta medicameta, ne bonum nutrimentum simul cum madore auferant, non adeò violenter, vt quæ prauum humorem absumunt, vel cicatricem generare dicentur, siccare debent, multò minùs, veluti abstergentia, detergere; nec, vt quæ vulnera glutinant, adstringere, cum in cauis vlceribus, non ita labia coarctare, vt in diuisis vulneribus, sed vt dictum, carne implendo, ea connectere oporteat. Licet & ex illis quedâ, quæ ex sua natura non ita valide abstergunt, vel adstringunt, vel cõmissione aliorum ita temperantur, vt siccando præualeant, sarcotica quoque esse vel fieri possit. Vnde & hæc medicamenta vlceribus sanandis dicata, & abstergentia & siccantia, non semper separatim, sed sæpius inuicem cõmissa remedia hæc constituunt, vnoq; sæpe medicamento, non obseruatâ tam strictè hac medicamentorum permutatione, vlcera & repurgari & sanari obseruamus. Quæ tamé nos primùm ratione formæ diuidentes, in singulis, quibus maximè viribus, an abstergendo vel siccando plus minùsve præualeant, potiusque remedia operentur, explicabimus.

Vnguenta & emplastra quæ vlceribus applicantur, induntur, infunduntur, ad eâ abstergenda, vel siccando vehementer, aut moderate, vt dictum, sunt sequentia.

Ad abstergendum præcipuè, in vlceribus communiter vsurpatur, de Quinque farinis dictum vnguentum, quod ex farinis Lupinorum, Orobi, Fabarum, Hordei, Tritici, cū Melle coquitur, cuius loco & Saccharum sumi potest, addito si maiori absterfione opus sit, etiam Aceto.

De Apio vnguentum in omnibus vlceribus mundandis vltatissimum est, quod succi Apij partem j. Mellis cõmunis vel Rosari duplum vel triplum, Terebinthinæ dissolut. in melle vel vitello oui q. s. ad reducendum in formam vnguenti.

Vel cum Melle & farina Fabarum, Orobi vel Hordei coquatur succus in formam vnguenti, omiſſa vel simul addita Terebinthinâ.

Ex Intybaceis lacteis succis, vt Endiuia, Cichorij, Dentis leonis, Sonchi, additis succis Apij, Betæ, Plantag. Rosar. Parietariæ, Cariophyllaræ, fiunt vnguenta detergentia, eodem vt prius dictum modo.

Efficacius adhuc fiet, ex succis amaris Marrubij, Absynthij, Centaurij, vel acribus, Perficariæ, Chelidonij, Iridis, & Cæparum vel Scyllæ: eadē mensurā cum Melle, communi vel scyllitico, Terebinth. vel farinis, vel vtrisque permiscendo.

Hiscē omnibus tribus vnguentis ad maiorem detersionem, parum Myrrhæ & Thuris addere possumus, & in fine cum mundū fieri incipit, Sarcocollam: Vel cum amplius detergere volumus, parum Aluminis vel Chalcanti.

Ex succis enarratis etiam vnguenta fiunt, si illis oleum æquā portione permisceatur, vel commune vel nucum, additis etiam aliis abstergentibus in oleis expositis, nonnunquam & Aceto & Melle, coquendo simul ad consumptionem succorum; permiscendo puluerem rad. Gétianæ, Aristolochiæ, Myrrhæ, aliāve modō enarrata.

Vel fiat tale abstersiuum: R. succi Iridis ʒ.ij. succi Chelidonij, Vini rubr. an. ʒ.ij. Mellis ʒ.iiij. decoquantur parūm, addendo Aloës, Myrrhæ an. ʒ.ij. Lithargyri ʒ.β. Terebinth. parūm.

Aloë cum Felle & Melle mistum, abstersorium est potens, in vlceribus quæ ad corruptionem tendunt, & in quibus vermes nascuntur.

De plantis abstergentia vnguenta fiunt hoc pacto: R. radicū Raphani, Cæparum an. ʒ.ij.β. Gentianæ, cortic. viridis Ebuli an. ʒ.ij. cortic. Cappari. Hermodactyl. an. ʒ.β. herb. Absynthij, Marrubij, Chelidonij, Apij, an. M. j. incisa & contrita, coquantur in Vino albo & bene contusa iterum decoquantur in ʒ.ij. Buryri vel Olei & Mellis quartā parte ad consistentiam vnguenti.

Vel: R. rad. Ireos recent. folia Brassicæ, Rutæ, cōtundantur, adde farinam Fœnogr. vel aliam, Salis parūm, & Mellis: applicentur; Acerum additur in putridis vlceribus.

Erpeculiariter, Brassicæ folia cum farina Fabarum cocta, applicata, in vlceribus ma-

millarum conueniunt. Item rad. Asclepiadis & Aparine folia contusa, mota mamillis.

Geranij Robertiani cum radice, in furno exiccati puluis, decoctus in Vino & Oleo; pro cataplasmate, mirè confert in vlcere Glidwasser proferente. In quo etiam confert placenta Rosarum, in fundo alembici, post exstillationem relicta. Et Fimus Equinus.

Ex pulueribus abstergentibus mox enarrandis fiunt vnguenta, si Melle subigantur; addito interdum & Aceto vel Omphacio. Vel oleo Rosaliōve & Cera.

Vel cum admodum abstergendum: R. rad. Iridis, Bryoniæ, Cyclaminis, Dracunculi, & modo dicto excipe.

Vnguentum Agrippæ ex puluere radic. bryoniæ, cucum. asini, scyllæ, ireos, filicis, ebuli, &c. paratum, huius loco sumi potest.

Vel hoc pareretur: R. puluerum radicū Quatuor prædictarum ʒ.β. farin. Lupin. Thuris, Aloës, Myrrhæ an. ʒ.ij.β. Omphacij ʒ.ij. Mellis scyllit. ʒ.ij. ol. Mastichini ʒ.ij.β. ol. de Terebinthinā ʒ.β. Cere q. s. fiat vnguentum: si hisce vnguentis Tartari vel Æruginis eris ʒ.ij. addatur, efficaciora fient.

Vel sic: R. rad. Bryoniæ ʒ.iiij. rad. Ari vel Dracunculi ʒ.ij.β. Gallarum, fol. Sabinae vel cortic. Pini vstorum an. ʒ.ij. Æruginis æris ʒ.β. excipiantur Melle: Pro inunctione.

Vel sic, quod viride emplastrum dici potest: R. Æris æruginis ʒ.iiij. Myrrhæ, Thuris an. ʒ.β. Cerae, Resinæ, Terebinth. an. ʒ.iiij. fiat s.a. emplastrum. Vel si Oleo & Sæuo excipiantur, fiat vnguentum.

Tartarum solum puluerisatum, coctum parūm cum Melle.

Ærugo æris sola potentius id facit cum Melle cocta; nonnunquam & Aceto. Ex quibus tribus vnguentum illud vfitatissimum, Ægyptiacum coquitur, in omnibus vlceribus immundis, virulentis, putridis extergendis efficacissimum.

Sal tostum vel Ammoniacum, Tartaro vel Ærugini æris permiscetur interdū, Melle excipiuntur.

Ad siccandū præcipue vlcera iam absterfa, vt sanari possint nouæ carnis productione, fiunt vnguenta Sarcotica dicta. Inter quæ Sarcocollā cū Melle excepta, cōsuetum est sarcoticū.

Vel si expulueribus sarcoticorum quinque generibus, qui in pulueribus describuntur, quinque genera Vnguentorum parentur: vel etiam ex aliis pulueribus & cineribus ampliùs adhuc siccantibus, in pulueribus quoque expositis: Eiusmodi pulueres Melle communi, crudo vel parùm cocto, vel rosaceo, additâ Terebinth. vel aliâ resinâ, vt Pini, excipiendo: vel oleo Mastichino, Myrtillor. aut Rosaceo, & cum Cera & Resina, in vnguentum redigendo.

Quibus & Colophonia, Pix pura, Bitumen, Oppopanax æquo cum vnius ex illis simplicis pondere, misceri possunt.

Ex prædictis pulueribus, secundus & sextus, si carne Cochlearum terrestrium seu limacum excipiantur, aded carnem generare creduntur, vt ossa ex vlcere denudata, carne rursus inuestiat.

Ex vîtatîs sarcoticis vnguentis est, Nicodemi appellatum, à Mesuæo descriptum, quod vti puluis ferè primus & secundus ex aloë, myrrha, sarcocolla, melle & vino paratur. Item Basilicon maius Mesuæi ex thure, myrrha, pice, terebinth. resina, cera. Aureum Mesuæi eodem ferè modo, additâ colophoniâ & croco paratum. Fuscum Nicol. his quoque simile, sagapenum & galbanum simul recipiens. Item Triapharmacum Mesuæi & Tetrapharmacum Galeni, si illis Myrrha, Sarcocolla & radix Ireos addantur. Deicin & Ceroneum, ex plerisque iam dictorum vnguentorum ingredientibus, addito & lithargyrio & alumine præparatum.

Huc & referri possunt multa vnguenta & emplastra, quæ vulnera siccando glutinare diximus, eligendo ea, quæ citra magnam adstrictionem illud præstant, vel etiam alia, si ob influxum humoris alicuius hæc vlcera cacoëthe sint.

Veluti: R. Gallarum, Balauft. an. 3.ß. Thuris masculi, Aloës an. 3.ij. excipiantur Melle.

Ex Plantis etiam quædam componuntur, quæ hoc pacto, si vlcera bene extensa priùs fuerunt, sanare possunt.

Vel paretur hoc pacto: R. rad. Narcissi, Consolidæ an. 3.ij. herb. Verbenæ, Sanguisorbæ, Pilosellæ, Hyperici, Centaurij minor. an. m. j. vel aliarum plantarum in vulne-

ribus expositarum, fiat decoctio in Vino, postea de bene contusis, subtilior illius pars ad 3.vj. sumatur, addendo Mellis, Resinæ alciuius liquidæ an. 3.ij. Pulueris primi vel secundi, vel tertij 3.j.ß. misce, fiat instar vnguenti.

Vel sic: R. Pimpinellæ, Betonicæ, Verbenæ ana m. j. incisa coquantur in mensura semisse Vini, ad consumptionem duarum partium, coletur, exprimatur: adde Resinæ 3.ß. Sæui hirci 3.ij. Cera 3.v. coquantur ad spissitudinē, adde in fine, cum refixerint, puluerum Mastiches 3.ij.ß. Aloës 3.ß. fiat emplastr.

Vel ex succis hoc pacto: R. succorum Agrimonie, Verbenæ, Plantag. & radic. Narcissi ad 3.iiij. Vini 3.ij. Olei Mastichini 3.ij. ol. Rosac. 3.j. Mellis 3.j.ß. Resinæ fluidæ 3.j. coquantur parùm, addendo Pulueris secundi vel tertij sarcotici 3.ß. gummi Eleni 3.j. fiat vnguentum.

Præter hæc, multa vnguenta & emplastra parantur, quæ vtrumque & abstergendo & siccando moderatiùs vehementiùsve præstant, & sic sola etiam, quædam vlcera non solum leuia, sed & virulenta & putrida, si efficacia admodum sint, sanât, sicuti nunc ostendetur.

Siccando quàm abstergendo magis operantur sequentia. E quibus mitius, Lithargyrium & Cerusa, cum ol. Rosac. vel Myrtino in plumbeo mortario agitatum, appositum. Quibus parùm Camphoræ addi potest, & infusionis gummi Tragach. si dolor adsit.

Vel ex Lithargyrii 1b. j. cum Ol. & Aceti 1b. ij. costi ad consistentiam emplastri vel vnguenti sit Oxelæum dictum Galeni. Vel si loco aceti vinum sumatur, dicitur Oinelæum; si aqua, Hydrelæum, quod applicatur.

Validiùs operatur hoc & siccando præuallet: R. Lithargyrii, Olei an. 1b. j. Cadmiæ fossilis 3.j. coquantur, addendo postea gummi Ammon. Bdellij an. 3.j. Galbani, Oppopan. an. 3.ß. dissolu. in aceto, Cera 1b.ß. in fine adde rad. Consolid. Aristoloch. rot. Thuris, Mastiches, Myrrhæ an. 3.j. fiat emplastrum.

Vel: R. Lithargyrii 3.j.ß. Cadmiæ fossilis 3.j. Olei communis vel Laurini 3.iiij. Resinæ fluidæ 3.j.ß. coquantur inuicem donec nigrescat parùm, postea adde Galbani, Ammoniac.

niac. Bdellij, Oppopan. dissolut. in Aceto an. 3. ̄. Colophonie, Myrrhæ, Thuris, Mastiches an. 3. ij. Tartari 3. j. Ceræ q. ̄.

De lapide Calaminari emplastrum Griſeum dictum ad eadem conuenit, ex cadmiæ fossili, lithargyrio, tuthia, cerusa, thure, mastiche, myrrha, camphora, terebinth. sæuo.

Quod & ex iisdem ferè constans, etiam sic appellatur, & quia in tabulas plerunque extenditur, chirurgi nostri *Zeſſin pſaſter* vocant.

Ad eadem confert vnguentum, quod rubrum appellari potest: R. Minij 3. iij. Lithargyrij 3. ij. Cerusæ 3. j. ̄. Cadmiæ fossilis & fornacum an. 3. j. ol. rosacei 3. iij. Terebinth. 3. ̄. Ceræ parum, fiat vnguentum. Camphora interdum additur ad ̄. j.

Aliud de stercore canis dici potest: R. Stercoris canis 3. ij. Lithargyrij, Cerusæ an. 3. j. Boli 3. vj. Thuris, Myrrhæ an. 3. ij. farinæ Fabarum 3. j. Mellis & Sæui hirci & Aceti q. ̄. pro emplastro.

Vel: R. Tuthiæ præpar. 3. ij. Lithargyrij, Plumbi vſti, lapid. Hæmat. an. 3. j. Aloës 3. j. ̄. Sanguinis draconis, Sarcocollæ vel Thuris, Galbani an. 3. j. ol. Rosac. & Ceræ q. ̄. fiat vnguentum.

Vel: R. Lithargyrij, Cadmiæ fossil. vel Tuthiæ, Cerusæ, Plumbi vſti & loti, vel Antimon. an. 3. j. Pumicis 3. ij. Sarcocollæ, Myrrhæ, Colophonie an. 3. iij. excipiantur Melle, vel vinctuosis vt dictum, pro vnguento.

De Plumbo vnguentum dictam, quod plumbum vſtum, antimon. lithargyr. cerusam, ol. ros. recipit, vlceribus virulentis conuenit.

In paronychiæ peruerſo vlcere hoc probatur: R. Antimon. 3. j. Plumbi vſti, Cerusæ lotæ an. 3. ̄. Tuthiæ præpar. 3. ̄. ol. Mastichini, Omphacini an. 3. ij. Ceræ albæ & Resinæ an. 3. j. fiat instar emplastri mollis.

Efficaciora ad siccandum & detergendum hæc emplastra sient, si Æris vſti seu cinerum 3. ij. Æruginis 3. j. plus minusve addas, vel Chalcanthum.

Abstergendo plus quàm siccando agunt hæc: R. Lithargyrij cocti in Aceto 3. ij. Æris vſti 3. j. Boli 3. ij. Resinæ, Ceræ an. 3. ij. axung. Porci 3. iij. fiat vnguentum.

Aut: R. ol. Ros. 3. j. ̄. Omphacij 3. ̄. Cadmiæ fossil. & fornacum seu Tuthiæ an. 3. j. ̄. Æris æruginis & Vitrioli an. 3. j. Resinæ parum.

Aut: R. Cadmiæ fossilis & Lithargyrij, Cerusæ, Mastiches, Thuris, Matris perlarum vel Corallorū, Vitrioli an. æq. partes, ad quorum 3. iij. adde Ceræ 3. v. Colophon. vel Terebinth. 3. iij. fiat emplastrum.

Vnguentum laudatissimum exsiccans: R. Olei communis antiqui præstantis. vel alterius Butyri (Maiale laudatur) Axungie alicuius (quæ circa vngulas est, præfertur) Sæui cerui vel hirci aut alterius, medullæ cruris Bouis vel alterius, Resinæ alicuius fluidæ an. 3. ij. Lithargyrij, Cadmiæ fossil. an. 3. j. ̄. Antimonij, Plumbi vſti, Æris vſti an. 3. j. Magnetis, Mastiches, Thuris, Myrrhæ an. 3. iij. puluer. Lumbricorum 3. ij. vel de aliis quoque pulueribus siccantibus aliquid, inspissentur, addendo Ceram si opus sit.

Vel: R. de Cineribus supradictis 3. j. cort. Granatorum & Citri vel Pini, fl. Labruscæ, sem. Fœniculi, Aloës, Myrrhæ, Acacie an. 3. ̄. Boli Cadmiæ fossil. & fornacum, Æris vſti an. 3. j. Oesypi, infus. gummi Tragachant. vel Arab. in aqua Plantag. an. 3. ̄. ol. Rosac. omphacin. q. ̄. ad subigendum, Ceræ q. ̄. ad formam vnguenti inducendam. Croci ̄. j. addi potest.

Vel cum plantis sic: R. rad. Ireos, Aristoloch. Curcumæ an. 3. ij. Malicorij vel Balauft. Gallarum an. 3. j. ̄. fl. Labruscæ, sem. Rosarū an. 3. j. cortic. Cucurbit. Sabinæ, Lumbricorum vſtorum an. 3. j. Sanguinis draconis, Bituminis naturalis an. 3. ij. Scoriæ ferri 3. iij. Aluminis vſti, Chalcitidis vſtæ an. 3. j. ̄. Coralli vſti 3. ij. Olei communis, Sæui an. 3. vj. Resinæ 3. iij. Ceræ q. ̄. fiat emplastrum.

Vel: R. Plantarum aliquarum in vulnere vnguentis expositarum, vel in decoctis mox describendarum, radices, folia & flores, decoquantur in Vino & Oleo, & per cribrum transfundantur, colature 3. vj. addendo Mellis & Resinæ, vti in priore dictum: iterumq; parum coquendo: donec crassescere incipiat pulueresq; permiscendo, & simul Lithargyrij vel Cadmiæ 3. vj. Æris vſti & loti, vel Scoriæ ferri 3. ij. Ceræ q. ̄. fiat vnguentum.

Argentum viuum, si in peruersis vlceribus his vnguentis addatur, ea reddit efficacissima, præsertim illis quæ in lue venerea oriuntur, vel sic vsurpetur: R. Argenti viui ʒ.j. cum Terebinthin. ʒ.j.β. & Axungia porci, ʒ.iiij. continuè donec penitus dissoluatur, agitur, addendo Cadmiæ fossilis & fornacum, Aeris vsti an. ʒ.ij. Sulphuris viui ʒ.iiij, Croci martis vel Scorix ferri ʒ.β.

Aliud excellens emplastrum, quo crurum vlcera plura peruersa sæpè sanauit: R. Lithargyrii, Cadmiæ fossil. Cerusæ an. ʒ.ij. Thuris, Myrrhæ an. ʒ.j.β. radic. Aristoloch. ʒ.j. Æruginis æris, Sublimati an. ʒ.β. Argenti viui ʒ.iiij. extinct. cum Terebinth. ʒ.j.β. Mellis ʒ.β. ol. Rosæ. & succi Plantag. ana ʒ.ij. fiat instar emplastri.

Absterfo vlcere, vt sanetur, Argentum viuum extinctum Terebinthinâ, additâ Sarcocollâ & Melle, in forma vnguenti adhibebitur.

Ex vstitatis Apostolorum vnguentum Auiennæ, ad vlcera extergenda & siccanda, admodum chirurgis est in vsu: validiusque operatur, si cum Ægyptiaco vsurpetur; vel si parum Aluminis aut Chalcanthi illi permisceatur, in sordidis admodum vlceribus competet: fit autem ex æris ærugine, lithargyrio, aristolochia, gummi ammoniaco, bdellio, galbano, oppopanace, myrrha, thure, resinis oleo & cera.

Apostolicon vnguentum Mesuæi, Chraeos vel ceraseos offe eademque vnguentum apostolorum recipit, & præter hæc aloën & sarcocollam.

Aliud Apostolicon Nicolai, fit ex iisdem quæ apostolicon subeunt, & præter hæc ex ære vsto, æris squama, lapide calaminari, distamno cretico, sarcocolla, mastiche, mumia colophonia, propoli, visci quercini glutine. Quod &, si quid vlceribus inhæret, extrahit.

Diuinum emplastrum Nicol. aliter Gratia Dei, hisce simile, similiter infixæ elicit, quod fit ex lithargyro, ærugine æris, aristolochia, lap. hæmatit. olibano, myrrha, bdellio, mastiche, oleo.

Al: addunt galbanum, ammoniacum, oppopanacem al: magnetem etiam.

Diachalcitheos seu Diapalma ceratum, vlcera similiter repurgat; ex chalcitide, lithargyrio, oleo & axungia confectum.

Præter hæc multa detergentia, valideque siccantia vngueta & emplastra, quæ ex æris squama, cinere, ærugine, alumine, chalcathi generibus, aliisque pluribus paucioribusve componuntur, à Galeno describuntur; veluti rubeum Græcū, Fusca Ægyptia, Isis, Asclepiadis emplastrum, Melinum Serapionis, Diabotanon Critonis, Tarentini emplastrū, Andromachi viride, Panacea Heræ. Multa alia quoque ab Arabibus descripta, vti & Guidonis vnguentum ad vlcera depascencia, ex Antidotariis petenda.

Olea vehementer siccantia & abstergentia quædam vlceribus quoque adhibentur; vt oleum Oleæ syluestris, de Frumento, Balaninum, Ricinum, Raphaninum Dioscor. probat. Aliaque quæ vulnera sanant, Balsamelæa dicta, iam munda vlcera sanare possunt. Oleum quod ex stercore humano elicatur, à quibusdam commendatur: vti & oleum quod ex Linteo panno in Oleo intincto & accenso exstillat.

Efficaciora sunt oleum Myrrhæ, item Sulphuris, maxime si cum Myrrha, Colophonia & Cera emplastri instar vsurpetur.

Tartari oleum vlcera egregie abstergit: & in depascētibus, oleum Vitrioli, Antimonij, & oleum Talci efficacia sunt.

Vel tale fiat: R. Antimonij crudi ʒ.ij. Calcis viuæ p.j. Tartari ʒ.j. coquantur in Lixiuo aliquandiu, postea insperge Acetum, & supernabit oleum: in putridis vlceribus conueniens.

Ablutiones, iniectiones, fots, balnea, vlcerum, tum ad absterfionem, tum exiccationem & sanationem, varijs modis fiunt.

Vino generoso non austero interdum vlcera abluta vel fomentata repurgantur.

Hydromelite verò, quod vinosum est, vel cum Aqua mulsâ, addendo aliâs illi etiam Vinum, leuiter, vlcera absterguntur.

Serum lactis, Hordei decoctum, addito Melle & Saccharo, idem efficit.

Lac vaccinum tepidum cum Coagulo in-
crassatum, cum successu in vlcere Gudwasser proferente, apponitur.

Aqua destillata Mellis vel Lariceæ refinæ, abstergit. Quæ si ex vtrisque simul addito Chalcantho destilletur, validius illud præstabit.

Lixivium ex cineribus quibusvis, vel sarmentis Vitis factum, valide abstergit, magisque illud, quod ex cineribus ramorum Ficus & Sabinæ arbor. crematis fit. Efficacius fiet si Calx cineribus quoque addatur, antequam lixivium percoletur: vti lixivium tonforum dictum, aliæ in eo macerentur, aut decoquantur: vel si lixivium cum Vino & Melle coquatur.

Validius extergit Lixiviū Saponis, quod & aquam Saponis vocant, quod ex cineribus sarmentorum partibus tribus, & calcis viuæ parte j. per transcolationem, vti fieri solet, paratur, quod efficacius reddetur decoctum ad consistentiam aliquam, vt inungi possit: & tunc portiuncula parti affectæ applicatur, relinquendo donec mundum vlcus reddatur, vt postea aliis sanari possit.

Cum sale Ammoniaco etiam aqua Saponis mista, efficacior redditur.

Aqua in qua Calx-viuæ macerata sit, & à calce diligenter separata, vlcera sordida mirabiliter detergit.

Aceti mensuræ semis si Vitrioli lb. j. permisceatur, sors optimus in vlcere Glidwæ fer reddens.

Vrina egregie abstergit, ea præsertim, quæ diu steterit, odoreque graui sit prædita.

Vel aqua ex Urina destillata; in qua Tartarum & Aloë dissoluuntur aliquando.

Aqua salsa naturalis puteorum, maris & arte parata, permitione salis præsertim Ammoniacci: Garum, Muria, valide abstergunt.

Aqua Aluminosa, hoc est in qua alumen solutum sit, addito parum Camphoræ, etiam in pudendorum vlceribus conuenit.

Aqua in marcescentibus quercuum cauitatibus reperta, vlcera sanare creditur.

Decocta varia ex plantis pro ablutione, iniectione, sors vel etiam balneo, sunt ad vlcera siccanda & abstergenda. Ad quæ multæ plantæ in vulnere topicis remediis & decoctis, descriptæ, hæc quoque in vlceribus conueniunt, & decocta quoque ex illis quæ vnguenta subintran, facta, conferunt. Equi-

bus aliquæ plantæ etiam crudæ vel coctæ contusæ applicantur: Imprimisq; vlceribus siccandis accommodata sunt, decoctum foliorum Agrimonie, Millefolij, Hederæ, Cariophyllatæ, Alchimillæ, Equiseti, Fragariæ, Sanguisorbæ, Auriculæ vrsi, Pyrolæ, Veronicæ, Floris solis, Potentillæ, Verbenæ, Cardui ben. Spondlij, Polygoni, Isatidis, Personatæ, Anagallidis, Petasitidis, Sedi maior. Dauci, Colymbades, Cicutæ, Plantag. Burse pastoris, Scabiosæ, Gallitrichi, Cynoglossi, Chelidoni, Absynthij, Centauri, Marrubij, Apij, Polij, Arthemisæ, Vrticæ, Cupressi, Sabinæ, Quercus, Oleæ sylu. Lentisci, Rhamni, Berberi, Sumach, Ceterach vel Hemionitidis, Coriandri: flor. Ros. Eupatorii, Cisti, Panacis Asclep. Granatorum rad. Consolidæ, Aristolochiæ, Ireos, Chamæleontis nigri, Panacis, Peucedani, Pastinacæ agr. Astragali, Filicis, Anemones, Thalictri, Anchusæ, Asphodeli, Narcissi, cort. Granatorum, Fraxini & Betulæ; Item ligni Gaiaci, peculiariter etiam in vlceribus suis venereæ competens. Dein & cortic. Palmæ: Item Gallarum, Glandium capul. Nucum cupressi, Myrobal. Lentium, Hordei, sem. Myrtillorum, Rosarum, Berberis, Plantagin. Caulium, decoctis in Aqua & Vino, addito interdum & Aceto in putridis vlceribus vsurpatur, ad exiccandum, & detergendum. Quibus & Acacia, Hypocistis addi possunt, vbi amplius siccandum.

Hiscæ decoctis quandoq; alia permiscuntur; Vt cum abstergendum hoc pacto: R. fol. Apij, Plantag. Agrimonie an. m. j. Absynthij, Centaurij an. m. β. fiat decoctio, dissolue in lb. j. Mellis Rosæ col. 3. iij. misce pro iniectione. Vel cum abstergere volumus sordida admodum vlcera, vel sinuosa aut fistulosa, Iridis, Hellebori vel Ari radices, in Lixiuo vel Urina decoquantur, illudque decoctum vel apponitur vel inicitur.

Vel sit talis iniectio: R. rad. Gentianæ 3. j. Hermodactyl. 3. vj. Hellebori 3. iij. fol. Absynthij, Centaurij minoris an. m. j. decoquantur & in colaturæ lb. ij. dissolu. Mellis rosar. col. 3. iij. vnguenti Egyptiac. 3. j. adde pulu. rad. Iridis & Aristoloch. an. 3. β. Agarici, Myrrhæ an. 3. ij. misce.

Vel sic: R. herb. Apij, Saluiæ (quæ &

pruritum compescit in vlceribus) Betonicę, Marrubij an. M. j. radic. Raphan. recent. 3. j. 3. Caparum 3. j. fiat decoctio, & libris duabus adde Aluminis vel Salis 3. 3. Tartari 3. ij. Mell. ros. 3. ij. misce.

Ad siccanda & sananda vlcera sic fit : R. Consolidæ vtriusque, Plantag. Bursæ pastoris, Equiseti, Ceterach, Herbæ iudaicæ an. M. j. folior. Agrimonie & Pentaphyli an. M. 3. Gallarum, Nucum cupressi, Balaustrionū an. 3. j. rosar. rubr. Hordei integ. an. P. j. fiat decoctio, & in colaturæ 3. ij. misce Thuris, Mastiches, Sarcocollæ an. 3. ij. Mell. ros. 3. ij.

Ex terrestribus, ablutiones & inunctiones admodum sunt efficaces, ad vlcera virulenta sananda, vt crurum, aliæve in locis humidis, hoc pacto: R. Lithargyrii 3. j. decoquatur in Aceti mens. j. & panni intincti applicentur.

Vel: R. Cadmiæ fossil. vel Lithargyrii. 3. ij. Mastiches, Thuris an. 3. Camphoræ 3. 3. Croci 3. j. coquantur in Aceto.

Vel Alumen & Tartarum cum Mastiche hoc modo in Aceto, coquantur: vel Tartarū & Aloë cum Aceto dissoluantur.

R. Chalcanthum Album, Alumen, Bolium, addendo ad 3. j. Camphoræ 3. j. coquantur in vase testaceo, illiusq; aquæ tertia pars seruetur ad vsum, quod reliquum, decoctione absumatur, donec residua concresecat, de qua puluerisata dissolue 3. j. in aquæ 3. j. coletur aliquoties: eaque aquâ purâ vtere, vti & priore.

In vlceribus crurum: R. Chalcanthi, Virrioli, Aluminis, Cerusę, æquales Portiones, in Aceto decoquantur, donec concresecant in tophaceam materiam. De qua dissoluitur portio in Aqua vel Lixiuio & vino, & madefit vlcus.

R. Aluminis 3. 3. Tartari 3. ij. Camphoræ 3. j. Eruginis æris 3. 3. conterantur, dissoluen- do cum aquæ vitæ 3. viij. Vitellis ouorum iij. prius ad duritiem coctis, diu agitando, postea colentur & exprimantur, coque liquore panni madefacti applicentur: in vlceribus pudendorum excellens.

Alia: R. granorum Pisorum, vel Frumenti alicuius, Salis ana P. j. Vini mensur. ij. stent in vase aeneo aliquandiu, agitando indies, postea adde Eruginis æris 3. j, Chalcanthi

albi, Aloës an. 3. j. remaneant adhuc ad dies aliquot, sæpius agitando, dein coletur aqua ad vsum.

Vel: R. Lithargyr. lapid. Calaminaris an. 3. 3. Salis, Aluminis, Chalcanthi an. 3. j. decoquantur in Aquæ vel Lixiuij aut Vini mensur. ij. ad consumpt. tertię partis, coletur. Hisce & Cerusa & Sulphur addi possunt: vti & Sanguis draconis: si Eruginis æris 3. j. addas, erit efficacissima.

Aquæ stillatitiæ ad eosdem vsus, ex plantis in vnguentis & decoctis, vlcera siccantibus, descriptis, vel ipsarum succis elicitiæ, aliquo pacto id præstabunt; efficaciusque si Aluminis portio, antequam destillentur, vnâ cum Albuminibus ouorum, sicuti aqua Aluminosa dicta, fieri solet, illis addatur.

Imprimis verò ex Oxylapatho infuso in Aceto, sicuti in herpete hæc descripta est: quæ & priuatim peruersa illa vlcera, quæ erysipelas exulceratum sequuntur, sanat:

Quæ & vlceribus Luis venereæ magis competet, si Oxylapathum in decocto Gaia- ci prius infusum, destilletur.

Pulueres vlceribus insperguntur cauis, qui siccando carnis generationem promoueant, vnde sarcotici dicuntur: vel fordidis & depascentibus vlceribus, qui validius adhuc exsiccando, vitiosum humorem absumant & abstergant.

Ex sarcoticis dictis, Primus: R. Thus, Myrrham, Aloën, qui & glutinat, vt in emplastro primo vulnerum, idem habetur.

Secundus: R. Thus, Sarcocollam, Myrrham.

Tertius: R. vnum ex prædictis pulueribus, addendo æqualem portionem, pulueris Sanguinis draconis, radic. Iridis, & Aristolochiæ.

Quartus: R. pulueris primi vel secundi part. j. addendo farinæ Orobi vel Lupinorū, radic. Peucedani vel Panacis, Centaur. min. eandem quantitatem.

Quintus fit, si primo vel secundo pulueri, æquam portionem Lithargyrii, vel Cadmiæ fossil. Scorie ferri & Pumicis addas.

Sextus inuestiens ossa nuda rursum carne, si ea admodum denudata sint, fit ex radicibus Iridis, Gladioli, Alphonse-
li,

li, Peucedani, Pinacis, cortice Thuris & Myrrha.

Præter hæc multa alia ex collyticis & eupuloticis, sarcotica miscent Practici, ea præfertim, quæ vtrumque efficere possunt, vel quæ pro diuersitate corporum hoc illudve præstant.

Quando amplius siccandum in vlcere humidis, pulueres fiunt ex plantis aridis, Sabinæ, Cupressi, Marrubij, Verbenæ, Chamæpytheos, Chamædreos, granorum Iuniperi, cortic. Granatorum, nucis Cupressi, Bedegar, Aparine, Pastinacæ, Securigacæ, Coriandri, Rosmarini, Saluiæ, Myrti sol. aliisque variis in decoctis recensitis. Vel pulueres sumuntur Corallorum, Crystalli, Boli, Terræ sigillatæ, Erythreæ, Calx lota, Lapidis Asiflos, Lumbricorum & Xylocampi pulueres, Marcor lignorum, aliaque varia siccantia.

Vel ex cineribus Abrotani, Anethi, Cupressi; vel Sabinæ, Tamaricis sol. cort. Cannabum, & Cucurbitæ prius siccata, Oliuis recentibus vel salitis. Item Solearum, Chartæ, Serici, Purpurarum, Concharum, Ostreorum, Erinacei, Serpentis, Cochlearum, Corallorum, omnium vltorum.

Quibus omnibus pulueribus & Thus, Mastiche, Pix, gummi vt Nucum, Amygdalar. &c. addi possunt.

Trochisci albi Rhazis cum Camphora addita Aloë & Myrrha, vlcera virgæ sanant.

In vlcere virgæ hoc profuit. Pulvis Barbesylvaticæ addita Thuris, Mastiches, media, Ossis sepia quartâ parte, aspersus.

Quando admodum siccandum & abstergendum pulueres insperguntur rad. Cappar. Anonidis, Filicis, Aristoloch. Gentianæ, Hermodactyl. Iridis, Ari vel Dracontij, Bryoniæ, Chelidoniæ, Hellebori, Agarici, sterlusque Caninum, quæ fistulas quoque extergunt, si præsertim Chalcitis vel Ærugo æris addatur.

Cochlearum testarum pulvis in vlcere cum Glidwasser confert.

Siccant & abstergunt etiam sequentia: R. florum aut cort. Granatorum 3.ß. Coralli vlti vel Ossium combustor. 3.j. Aloës, Myrrhæ an. 3.ß. Alumin. vlti 3.j. Tartari 3.ß. fiat pulvis.

Vel sic: R. cort. Citri & Granat. Epithymi vel de Cineribus supradictis an. 3.ß. Aloës 3.j. Salis communis vel gemmæ vel floris salis vel Aluminis 3.j.ß. fiat pulvis.

Aut: R. Tuthiæ 3.j. Nucis cupress. vel sem. Myrti, Aloës, Sanguinis draconis vel Acaciæ an. 3.ß. Ærug. æris 3.ß. fiat pulvis.

Argillæ pingui subactæ cum aqua Aluminosa, antequam vratur, misce Ferri & Æris limaturam, & postquam vsta est, puluerisatam insperge.

Sal à piscibus salitis abrasum, inspersum humidis vlcerebus, valde illa exiccat. Confert & Salis flos.

Vti & Tartarum tritum, vel Borax cum lapillis seu oculis Cancræ.

Et Alumen vstum, Sal tostum, & imprimis Æs vstum valde competunt.

In paronychia vlcera, cum caro putris adest: R. Salis ammoniac. 3.ß. Æruginis æris 3.j. fiat pulvis, qui Aceto forti excipitur, & postea bombax in eo intinctus rursusque siccatus, radici vnguium apponitur.

Applicantur quandoque & imponuntur vlcerebus actu sicca, veluti Pannus linteus detritus vel abrasus, cauis vlcerebus inditus, sæpeque repetitus, humiditates exhauriendo, curationem illorum promouet.

Pannus linteus, Sparadrappus quoque dictus sequenti modo imbutus & preparatus, vlcerebus prauis, bono successu, vt aiunt, imponitur, idque præsertim in pudendi in vtroque sexu vlcerebus, illis maxime quæ à lue venerea prodeunt: R. ligni Gaiaci rasi quart. j. radic. Gentianæ, Aristolochiæ, Imperatoriæ, an. 3.j. Rhabarbari 3.ß. summ. Centaurij min. Scordij, Betonicæ an. m. j. flor. Anthos, Rosarum an. p. j. bacc. Lauri Iuniperi an. 3.ß. sem. Myrtillorum, Fœnic. an. 3.j. Aluminis 3.iiij. bulliant in Vino rubro stiptico, & in colaturæ 15.j.ß. adde Mithridati 3.j. dissolu. in aqua Vitæ 3.iiij. misce. In hoc liquore tela linteâ immersa madefiat, iterumque siccetur, sæpius hoc repetendo, donec hanc materiam bene imbiberit, de qua portio absecta applicatur.

Sectione interdum puri vt rectius effluat, viam facimus, inferius vlcus labrum scindendo, neque ligando. A posteriore vlcere ad

infimam sedem, vt illic puri nihilominus pateat exitus. Quod etiam ne ossa corrumpat vitiosus succus, in illis vulneribus, si ea infectura videantur, mox faciendum. Et in Pannaritis digitorum, statim vbi abscessus incipit, antequam os corrumpatur, sectio molienda.

Cauterio actuali in vlceribus putridis, carnem putrem vel vitiosam aliquando auferimus. Vel potenti id efficitur: Maxime in eo, è quo aqua illa perniciofa, *Ulcra* fer emanat: cui mox Corrosiuum dictum Chirurghi apponunt.

Ligatura Expulforia dicta, cauis vlceribus, ad retinenda ea quæ illis induntur, adhibetur: fitque sic vt pus nihilominus prodire possit.

Cutis seu cicatricis regenerationem procurantia remedia, in vlceribus, in quibus, vt caro sic & cutis deperditur, sanandis locum habent, postremoque quando vlcera sufficienter carne iterum oppleta sunt, superficiesque tantum nuda adhuc remansit, adhibita, vlcerum sanationem perfectam efficiunt & absoluunt.

Licet autem natura hanc cutem ex nutrimento, quo cutis vera nutritur & conseruatur, vti carnem in cauis vlceribus gignat: tamen cum mador quoque, humore seroso continuo ex aperta adhuc illa sede exsudan- te, hanc naturæ operationem, vt in carnis generatione quoque fieri diximus, impedi- at, nec sponte ficcari & coalescere sinat, medicamenta quæ siccando hunc madorem auferunt, vt natura agere possit, cutem hanc generare dicuntur. Quæ cum à vera cute, in eo quod non sensilis & porosa, vti vero vera, existit, differat, vtpote quæ non à semine, sicuti ab initio, nata sit, sed ex nutrimento tantum, quod à vera cute exsudat, atque illi vndique, carni quæ subiectæ connascitur & conrescit, non cutis vera sed callosa, Cicatrixque tunc nominatur, medicamenta quæ hanc illius generationem promouent, Cicatricem generantia vel Cicatrizantia, Epulotica appellantur.

Talia autem medicamenta, cum non solum vti sarcotica, madorem siccando absumere debeant, sed & simul superficiem, vt in cu-

tem melius indurari queat, validius exsiccare, & constringere. Ob eam causam hæc magis quam sarcotica siccare debent, & secus quam illa simul adstringere, & proin etiam formâ siccâ potius, quam humida minusque vntuosa administrari.

Quod proin cum sarcotica minime faciât, si ea sanatis vlceribus, non mutantur, præterquam quod cutis generationem minime promouent, vt caro luxuriat potius efficiunt. Vti nec collitica quæ vlcera glutinant, cum emplastica sint, id commodè præstabunt, nisi sicciora ex illis & quæ validius adstringunt, vsurpemus. E quibus etiam quæ talia sunt, postquam labia vulnerum conglutinarunt, facile exiguum quæ restat distantiam, cicatrice obducunt, vt propriis epuloticis non sit opus. Sicuti & epulotica medicamenta, leuiora vulnera etiam glutinare possunt.

Puluerum itaq; formâ, cum ad potenter siccandum aptissima sit, hæc potissimum administratur, & subtilissimè triti nudæ superficiei insperguntur, quam egregiè, cum sicci sint, siccant, idque magis si vrantur, vnde quæ mitiora sunt, maiorem siccandi vim assumunt, & proin lauari minime debent; quæ vim erodendi habent, eam vltione nonnihil deponunt, præsertim si lauentur. Qui pulueres sequenti modo parari possunt.

Primus: R. Gallas, Malicoriū aut Balau- stia vel Cytnos & rad. Aristoloch. quæ si v- rat, magis erit efficax.

Secundus: R. primi pulueris partem vnam, addendo tantundem pulueris Nucum cupressi, vel capul. Glandium, Rosa- rum, Equiseti, Centaur. min. Spongiæ com- bustæ.

Tertius: R. primi pulueris part. j. adden- do tantundem pulueris radic. Tormentillæ vel Bistortæ, cortic. Pini vel Ulmi aut Quer- cus, fol. Sumach vel seminis, Chartæ, vel Panni aut Corij vel Solearum, vel Ossium, aut testarum Ovorum combustarum.

Quartus: R. pulueris vnus ex prædictis partem vnam, addendo totidem cort. Thu- ris & Sanguinis draconis.

Quintus: R. puluerem vnum ex prædi- ctis, addendo æquam portionem pulueris Lithar-

Lithargyrij, Cadmiæ seu lap. Calami, vstæ & Boli vel Cretæ.

Sextus magis efficax: R. Lithargyrij vel Tuthiæ, Plumbi vsti vel Cerusæ an. 3.ß. Alumin. vsti 3.ij. addendo pulueris primi 3.ß. Pumicis vsti 3.j.

Septimus efficacissimus: R. Aeris vsti loti 3.ij. Chalcitidis vstæ & loræ 3.j. puluerem prædictorum aliquem ad 3.ß.

Præter hos pulueres etiam sequentes vsurpari possunt, invicem cæterisve iam dictis permisti. Veluti Rosmarini vsti, vel de Plantis siccatis sumpti, cort. Cucurbitæ, rad. Plantag. cort. Capparum, fol. Cupressi, Quercus, Pyrastrii, Myrti cum semine, Spinæ Ægyptiæ fructus: Item pulueres Concharum vstarum, Testarum fornacum vstarum, Coralli vsti, Spodium, Terræ Armenæ, Sigillatæ, Cimoliæ, lapidum Hæmatit. Iudaici, Magnetis, Asij lapidis floris.

Crocus Martis dictus, porenter siccando, idem facit.

Vini sæcem crematum cum pulvere radicis Plantaginis, laudat Matthiol. Alij Sulphur viuum extollunt.

Vnguenta ex pulueribus enarratis fieri possunt, si cum Sapa vini adstringentis, vel Melle eousque vt inungi possint, excipiantur: vel cum oleo Rosaceo aut Myrtino vel Sæuo potius, sed tunc minus siccabunt, nisi ex pulueribus validioribus, vti est sextus & septimus, parentur.

Vel sic: R. pulueris sexti mediâ partem, hoc est 3.vj. addendo Antimonij, Aeris squamæ & floris, omnium vstorum & lotorum an. 3.ij. Chalcitidis vel Borac. Vitrioli an. 3.j. cum Melle vel Sapa fiat vnguentum, vel cum Oleis, si mitiora esse velimus.

Æruginem aeris cum Oleo & Cera illinit Dioscorid.

Ex succis tale vnguentum fieri potest: R. succi Plantag. Verbenacæ, Eupatorij vulgaris, Pyrorum vel Cydoniorum ad 3.iiij. Aceti rubri 3.ij. Acaciæ 3.ß. Aloës 3.ij. Lithargyrij 3.j.ß. Sapæ vel Mellis 3.j. coquantur in formam nutriti.

Oleum Vitrioli dissolutum aquâ, validè siccando cicatricem inducit.

Vstata vnguenta & emplastra epulotica

sunt, Vnguentum nutritum seu Tripharmacum dictum vel nigrum Auicenn. ex lithargyrio, oleo & aceto: vel de Lithargyrio quod cerusam insuper recipit. Vnguentum de Calce viua, sæpius lota, vt in ambustis describitur. Vnguentum album cum cerusa & lithargyrio, vnguētum Citrinum, Vnguentum de Tuthia, de Minio ex iisdem, addito & minio, Vnguentum de plumbo. Emplastrum de lap. Calaminari duo, in collitiis descripta. Emplastrum Diacadmæ Gal.

Lauare prius vulnera & vlcera, si madida sint, competit, ante epuloticorum vsus, Vino astringente, Lixiuio, Vrinâ, Aquâ aluminosâ, aliisque siccantibus passim expositis. Inter quæ & decoctum foliorum Sumach seu Rhus coriariorum, sic, quodd coria condenset, dicti, hic quoque curem siccando & densando, epuloticum fit.

Potionibus vulnerariis appellatis exhibitis, vti vulnerum, sic & vlcerum curatio promoueri potest. Atque illæ quæ in vulneribus descriptæ sunt, licet vulnerum glutinationem siccando adiuuent, in vlceribus verò & absterfione fit opus, vel postquam vlcus deterfum est, exhibere, vel etiam prius, cum nonnihil quoque abstergere possint, proderunt, vt non opus sit hic nouas formas præscribere.

Præsertim verò in sinuosis vlceribus, potissimum sequentes conuenire censentur, vti & in fistulis, quas præ cæteris vim abstergendi obtinere oportet, vnde & in alijs sordidis vlceribus vsurpata iuuabunt, hoc pacto parata.

Vinum in quo Agrimonia decocta sit, bibitum, spatio aliquot dierum, illud præstat: cui si Polygonon, Abrotanum, Pimpinella, Spatula foetida addatur, efficacius erit.

Idem facit Vinum in quo Caules rubei cū semine & Rubia maiore decocti fuerint.

Aqua quæ dicitur mater Balsami, in vlceribus cauis, sinuosis vehementer commendata: R. Aquæ stillatitiæ, quæ facta sit ex Rosmarino & Saluia, in Vino albo maceratis & destillatis lb.j. Sacchari quart.j. misce: Bibat de ea.

Vel adde Terebinth. 3.ij. gummi Hederae, Thuris, Mastiches, Myrrhæ, Aloës an. 3.ß.

Garyophyl. Cinamom. Nucis mosch. Cubebarum, Galangæ an. 3. ij. Croci 3. j. & destillentur. Aquamque hanc per vices bibat.

At eadem aqua efficacissima fit, ex Pyrola cum radice, & foliis Hederæ terrestris incisis, maceratis in Ceruissæ antiquæ mensur. ij. aut circiter, per dies duos, addendo Stercoris canini quod Album græcum vocant, instar oui, eliciatur aqua, quæ rursus facibus infusa, denuo destillari potest. Ter in die propinata, manè, ante cenam & tempore somni, cochlearium trium mensurâ, admodum iuuat.

In sinuosis vlceribus, quæ in perinæo sub testibus in vesicam vsque penetrabant, hæc potio multum effecit: R. radic. Consolidæ maior. Fœniculi, Liquiritiæ an. 3. j. β. Aristol. 3. β. herbarum Saniculæ, Perfoliatæ, Consolidæ sarracenicæ, Hederæ terrestris Betonicæ an. M. j. Hyssopi M. β. semin. Alkekengi P. β. fiat decoctio in Aquæ & Vini an. ℥. j. dulcoretur Saccharo: Bibat ad dies aliquot.

*Fistulosi
vlceris,
scilicet Fi-
stule, cu-
ratio.*

Fistulosum vlcus, cuius circumferentia interna, ob tunicam quæ illi adnata est, coadluit, sinu cauo, quem Fistulam vocant, relicto, ita est curandum; vt ille denuo carne impleri, sicque occludi & sanari possit, tunica rursus erit auferenda, vlcusque sic, vt aiant, resfricandum: quo facto, vlcus eodem modo, vt in cæteris prius ostensum, per ea quæ carnis & cicatricis regenerationem procurant, erit curandum: eaque simul administranda, quæ vt corpus purum ad faciliorem curationem fiat, prius in vlcerum cura commemorata fuerunt.

Ad tunicæ itaque ablationem, medicamentis abstergentibus vtimur, quæ dum illa adhuc mucosa & mollis est, vt i fordes vlcerum crassiores, ita & illam possunt extergere: si verò hæc magis induruerit, non nisi fortiter abstergentibus, quæ cathæreticis proxima sunt, abradi potest. Talia abstergentia omnis generis, & mitius validiusve hoc agentia, in vlcerum sanatione descripta sunt. Quod si verò tunica hæc iam omnino callosa sit & confirmata, cathæreticis eam exedere oportet. Qualia carnem luxuriantem absumentia, in vlcere excrescente quoque describuntur, & sicuti illic carni asper-

guntur, aliòve modo adhibentur, sic hic fistulis cum turunda, quæ eas simul apertas feruat, induntur, vel infunduntur.

Imprimis tamen hæc in fistulis vsurpata remedia, tunicas extergunt.

Ex succis, Iridis succus acris & adurens, eoque adhuc magis succus Dracunculi, Ari & Chameleæ vel Thymelæ: eroduntque potenter Tithymali Myrsinitis præsertim & Ficum, lactei succi: qui aliis succis mitioribus, si vim illorum ferre nequeant, vel Aceto dilui possent, vel Melle nonnihil inspissari.

Omphacium admodum abstergit, idque efficacius adhuc, si succum Chameleæ vel Thymelæ addas, aliòve ex lacteis herbis acres.

Acetum forte, vt i testas ouorum absumit, si ouum in eo collocetur, sic & fistulas atterit, infusum vel impositum cum Omphacio, vt docet Dioscor. cui & Ladanum addi potest, quod cæteris vnguentis quoque admissum, putredinem arceat.

Vnguentum Ægyptiacum in Lixiuo dissolutum, aliòve liquore abstergente, infunditur, vel cum turunda, eo oblita, intruditur.

Vel hæc infusio: R. Æruginis aeris 3. ij. Aluminis 3. j. β. Sacchari ℥. β. Vini albi mensur. j. coquantur & imponantur.

Vel: R. Auripigmenti 3. j. Æruginis aeris 3. β. bulliant in Vini ℥. β. diluti 3. iij. aquæ Plantag. vel alia. Cuius loco aqua viridi dicta vt i possumus, in vlceribus oris descripta.

Efficacissimum erit, si Auripigmenti tantillum dissoluatur in aqua Plantag. vel calicum Rosar. vel Solani, aliòve, & cum cura diligenti applicetur.

Sublimati tantillum cum vnguento Populeonis vt vis illius infringatur, vel parum Auripigmenti, fistulis inditur, vel Melle aliòve subaëum.

Aquæ stillatitiæ quæ fistulas atterunt, & illud quod attritum est, simul sanant, sunt frequentes: quarum vna: R. Thuris, Mastiches an. 3. β. Æruginis aeris, Auripigmenti ana 3. ij. Aluminis 3. ij. Mellis & Terebinth. an. 3. j. β. Vini optimi ℥. j. β. eliciatur aqua.

Alia: R. Auripigmenti, Æruginis aeris an. 3. j. Alumin. 3. iij. Boli Armenæ vel Terræ sigillat.

figillat. 3. ij. Sanguinis draconis, Thuris, Mastiches an. 3. j. Vini albi mensur. j. librarum trium vel quatuor, destilletur.

Vel aqua ex Euphorbio dissoluta in succo Plantag. vel etiam aliis succis, additâ Myrrha & Thure, elicetur.

Stercoris humani aqua in fistulis commendatur.

Oleum fistulas abradens sic fit: R. Antimon. 3. ij. Sublimati 3. j. Mellis 3. iij. per retortam extrahatur oleum.

Hellebori radix fistulis indita, tunicam potenter aufert.

Spongiam aridâ, filo stricte modo penicilli ligatam, vel Cerâ obductam, fistulis intrudunt; vel Gentianam vel Aristolochiam radicem siccam in hanc formam scissam, idque dilatandi potius foraminis causâ, quàm extergendi, licet & hæc fistulæ per vim immissa, dum intumescunt, illam dilatent, sicque callis attenuatis vel scissis, citius postea hi exterguntur, atque labia coalescunt.

Cauterio actuali vel potentiali si intrinsicè fistula vratur, escharam facit, quâ detractâ, fistula à tunica liberata erit.

Quibus peractis si nuda & viua caro in fistula rursus appareat, illa postea, vt aliud vlcus, sarcoticis immisissis, vel cum adhuc sinuosum sit, infusis, demum epuloticis, vt dictum, curabitur.

Potionibus quibusdam exhibitis, in vlcere curationem sine descriptis, fistulas quoque sanari posse affirmant, forte per eas sinuosa vlcera, tunicâ nondum obducta intelligentes. Nam tunicâ inuestitâ si sint fistulæ, vix suam vim, vt tunicam abradere vel etiam consumere valeant, eousque exere posse videntur, nisi fortè molli adhuc tunica existente aliquid efficiant, vel ampliùs, tunicâ iam abrasâ operentur: quemadmodum illic ostensum fuit.

Callosum vlcus, cuius labia dura sunt, medicamentis emollientibus emollire studebimus, & simul abstergentibus callum extergere.

Inter quæ cataplasma hoc vtrunque præstat, quod ex radic. Consolid. mai. & Lapa-

thij coctis inuicem in Aqua & contusis, addito Butyro, paratur.

Efficaciùs id fiat emplastrum ex gummi Ammoniaco cum Aceto fortissimo dissolutum factum.

Vel hoc vnguentum: R. gummi Ammon. Bdellij vel Galbani dissolut. in Aceto potentissimo 3. ij. Terebinth. 3. β. ol. Ros. donec dissoluantur, adde Ærugin. æris 3. ij. Aluminis 3. iij. pro vnguento.

Alia quæ vehementer abstergunt, vel etiam si callus omnino sit induratus, exedentia, præsertim si hisce priùs emolliat fuerit, eum possunt absumere: qualia multa in vlcerebus & fistulis præsertim exposita sunt, & in vlcerebus excrecentibus iam proponuntur.

Spondylii ramenta callis circumstrata, eos absumere docent.

Quod & Spongiam recentem ex decocto Mellis, callis impositam facere docet Dioscorid.

Sectio scalpello facta in callosis vlcerebus labiis, vulnus renouando, vt faciliùs postea sanetur coalescatque, efficit.

Excrecens vlcus est, in quo caro quæ vlcus repleuit, vltèriùs extra corporis superficiem, ob non maturè cicatricem inductam excreuit, & instar hypofarctosis prominens, partem cui insidet deformat eique impedimento est: quæ iterum plana redditur reliquæque carni æqualis, si quæ superflua est, detrahatur, atque prominens absumatur.

Excre-
scens
vlcere,
curatio.

Quod vt fiat, causam illius, plethoram scilicet, si illa adsit, parçâ victus ratione, & venæ sectione impediemus: simulque si caro primùm excrecere inceperit, topica quæ cicatricem procurare diximus, mox erunt adhibenda, cum siccitate suâ non solum eam gignere, sed carnem simul exsiccando minuere, ipsiusque augmentum reprimere possint: quod tamen si caro iam admodum excreuerit, non erit faciendum, cum tunc eam ampliùs absumere nequeant, & si cicatricem inducerent, vlcus deformem vt dictum, carnositatem post se relinqueret. Sed tunc potius quando caro adeo luxuriat, fortioribus vtendum, siccantibus & abster-

gentibus, vel etiam cathæreticis carnem detrahentibus; Inter quæ multa quæ ad fistulas extergendas idonea diximus, hæc quoque carnem auferre possunt: Vt & hæc, quæ vlceri excrescenti apponuntur remedia, fistulis quoque competere: suntque sequentia.

Pulueres in hanc rem ferè vsurpantur, quos ex pixidulis, hisce accommodatis, per epistomium, chirurgi vlceribus excrescentibus inspergunt; probanturque imprimis pulueres Colchici bulborum, quos Hermodactylos vocant & Hellebori nigri: Dein & Aristolochiæ, Gallarum. Atque cineres ossium Dactylorum, Lanæ, Spongiæ, Piscium salforum, Smaridis piscis, Erinacei marini, Purpurarum, Concharum, Testarum, omnium vsutorum.

Stuppa cannabina minutim incisa, inspergitur.

Mellis sæcum post destillationem illius, in fundo remanentium, calcinatarum pulvis croceus inspersus.

Boracis puluerem nostri chirurgi plerunque carni huic inspergunt, propriaque ad hos vsus pixide, quam Borræ buchstein vocant, ad manus eum seruant.

Idem facit pulvis Pumicis, Ochreæ, Asij lapidis floris, Diphryges.

Vitimur & Alumine, Chalcitide, vltis, vel etiam non vltis, quæ tamen, quia validiora sunt, pulueribus aliis additis, contemperari possunt.

Vt: R. Aluminis vlti 3.ij. Balauft. Boli Armen. tantundem, misce.

Vel: R. Vitrioli 3.ß. Aluminis 3.ij. cortic. Granatorum, Gallarum an. 3.ij. Myrrhæ, Aristolochiæ vltæ an. 3.j. fiant trochisci ad vsum.

Vini sæx cremata, valde efficax, quæ aliis pulueribus contemperari potest.

Pulvis erodens chirurgorum nostrorum, Non heing: R. Vitrioli 3.iiij. Aluminis & Æruginis æris an. 3.ß. affunde Aceti ad 3.vj. calcinentur in vase lutato.

Alius fit ex Arsenici rubri & citrini, Aluminis & Gallarum æquali pondere, puluerisatorum & in Aceto fortissimo decoctorum colatura, fusa supra Calcis viuæ, &

quale pondus, cum residentia decocti abietis, exsicceetur calx, donec pulueri fieri possit.

Alius carnem superfluum tollens, fit ex Calce viua cum Melle in trochiscos formata, postea combusta.

Argentum viuum sublimatione aut præcipitatione, vt vocant, sic effectum, vt citra magnum dolorem carnem absumat; fit ex Argenti viui parte vna, & Aquæ fortis partibus duabus, in alembico magno cum recipiente magno, carbonibus ardentibus superpositis, relictisque donec omnis aqua effluerit, fractoque alembico, eoquæ quod album & croceum est, remoto, illo quod collo adhæret, rursus puluerisato, denud in vase supra ignem, donec omnis fumus abierit, agitetur.

Trochisci quibus veteres utebantur, carnem erodentes, inter cauteria in abscessu aperiendo descripti, hæc quoque locum habere possunt, aliaque multa illic descripta, cutem vrentia.

Quibus etiam trochiscos Vigonis adnumerare possumus, ex medulla panis, sublimato, & minio cum aqua rosarum formatos.

Ex vnguentis quæ carnem auferunt, præsertim vnguentum Ægyptiacum, vltatum est.

Vel potest tale fieri: R. radic. Hermodactyli vel Agarici, Hellebori nigri, Spongiæ combustæ, Pumicis an. 3.ij. Aluminis vlti, Æris vlti an. 3.j.ß. Æruginis æris, Chalcitidis an. 3.j. excipiantur Melle & olei Tartari 3.j. fiat vnguentum.

Vel sic: R. Antimonij, Ferri limaturæ an. 3.ij. Aluminis, Salis ammoniaci, Sulphuris viui, Chalcanthi an. 3.j.ß. Æruginis æris, Auripigm. Argenti viui an. 3.j. Aceti potentissimi, Lixiui tonforum cum calce an. 3.ij. in vase figulino calcinentur, pulvisque in vase vitreo bene clauso ad vsum seruetur.

Mel anacardinum idem efficit inunctum.

Oleum Sulphuris vel Tartari idem facit, vel per se iunctum, vel supra emplastrum aliquod conueniens, sicque applicatum. Ol. Vitrioli item dilutum.

Cauterio actuali, sectione, si nil aliud iuuare potest, caro aduritur vel amputatur.

Compositarum exulcerationum, quæ cum tumoribus, pustulis iunguntur & componuntur, curationem, cum illorum curatione coniunximus, illarum verò, quibus tumores primum superueniunt, curam nunc exponemus, tam vulnerum quam vlcera, quæ accedente rubro tumore fiunt & appellantur, Phlegmonosa, Erysipelatosa, Oedematosa.

Phlegmonosa & erysipelatosa tam vulnera quam vlcera, quæ ratione sanguinis influxus, ob dolorem aliasve causas talia fiunt, sic tractanda, vt primum reuellamus sanguinem, eadem ratione vt in phlegmone ostensum.

Dein vt Repellentia in ambitu horum vlcera circumponantur defensiuæ, vti & postmodum digerentia, in phlegmone exposita.

Quæ vulneribus aut vlcerebus imponuntur, siccantia remedia, ab initio refrigerare simul debent, qualia etiam inter repellentia in phlegmone, ea maximè quæ Lithargyrium, Cadmiam & Cerusam recipiunt, descripta sunt.

Vel hac ratione & inflammationi & exulcerationi accommodanda: R. succorum Cynoglossi, Plantag. Salicis, Solani, vel Semperiui an. 3. iij. succi Granatorum 3. j. Aceti 3. β. olei Rosacei vel Myrtilorum 3. iij. Cerusæ 3. β. Plumbi vsti & loti 3. ij. Camphoræ 3. β. Terebinth. q. s. pro vnguento.

Possumus & alia siccantia sensim addere, & repressâ inflammatione, ad sola siccantia vulnera & vlcera redire, cum & hæc residuum inflammationis absumant.

Al. Vigonis est ceratum Nigrum dictum, quod R. lithargyrium, minium, terras. resinam, camphoram, olea & pinguedines, cum vnguento populeonis, vino granatorum & decocto myrtilorum, hordei, fol. plantag. folani, matris fyluæ.

In istu sclopeti hoc emplastrum mox in principio conuenit: R. Boli 3. ij. Sanguinis draconis 3. j. Cerussæ vel Lithargyrij 3. β. farinæ Hordei 3. j. β. pulueris Lumbricorū 3. β.

(præsertim si nerui affecti) Cetaurij sicc. 3. ij. Sæui dissoluti in oleo rosac. 3. j. Terebinthin. q. s. fiat emplastrum, cui Diachylon album misceri potest.

Vel hoc: R. succi Plantagin. Solani, Semperiui an. 3. j. Aceti 3. β. olei Violac. Rosac. Nenuphar. Terebinth. an. 3. j. coquantur ad succorum consumpt. addendo pulueres prædicti emplastri, fiat emplastrum.

In punctura à spina: R. succorum Plantag. Burse pastor. Solani, ol. Rosac. an. 3. iij. coquantur ad succ. consumpt. addendo Lithargyrij, Cerussæ, Cadmiæ fossilis & fornacum an. 3. β. Plumbi vsti & loti, Squamæ æris an. 3. ij. Terebinth. 3. j. β. misceantur.

In Nerui punctura si inflammatio oboritur, vti facile sit, hoc emplastrum applicandum: R. farinæ Hordei, Lentium an. 3. ij. farin. Fabarum, Lupinorū vel Orobi an. 3. j. decoquantur in Vino Aceto & Melle, vel in Oxymelite, fiat emplastrum. Postea alia adhibeantur ad dolorem compescendum, & puncturæ conuenientia, illic exposita.

In vlcerebus crurum cum erysipelate vnguentum Ros. cum Terebinth. & vitellis ouorum conuenit, & vnguentum de Calce.

Doloris causâ, si intensus suboritur, in vulneribus aut vlcerebus ob inflammationem, aliasve, vel etiam propter remedia erodentia & caustica, quibus interdum vti dictum, vtimur, eum anodynus in ambitu circumpositis & impositis, donec mitigetur, sedamus, qualia in inflammationibus copiosè exposita sunt; Inter quæ & illud, quod sterus Vaccinum recipit, valde conuenit: transeundo etiam ad narcotica, si necessitas requirat. In neruo puncto, quid doloris causâ agendum, illic quoque declaratum fuit.

Oedematosa vlcera & vulnera si sint, sero-
sitatem illam quæ vicinam cutem & car-
nem humectat, & in tumore attollit, vt ab-
sumamus, nō aliis quam iisdem siccantibus,
quibus madorem vulnerū & vlcera exic-
camus, ea sanamus; hoc idem, si efficaciora
ex illis & validius siccantia eligamus, præ-
stabis, in ambitu postea ea quæ oedemata
tollunt, adhibenda.

Oedema
torum
vulcerum
curatio.

*Gangra
na cura
tio.*

Gangræna cùm incipiens partis sit corruptio, in ea ægerrimè membrum conseruatur. Sphacelus cùm perfecta sit Necrosis seu mortificatio, in ea pars mortua cadauerosa fit, & nisi à viua penitus refecetur, vicinam afficiendo, mortem accersit.

Vbi spes aliqua restat, membrumque adhuc dolet, vel sensum aliquousque retinet, subitò succurrendum: Scarificando locum affectum vndiq; profundis multisq; plagis.

Hirudines loco scarificationis appositæ, vel etiam si plagæ factæ sunt, supra illas, conueniunt.

Aceto calido perfundatur vel foueatur locus scarificatus, ter in die.

Vel Lixiuio forti, vel tonsorum, decocto Lupinorum; vel Lixiuio cinerum ficulneo-
rum.

Aut Aquâ marinâ vel aliâs falsâ.

Footibus subitò chirurgi vtuntur, fouentes locum scarificatum prius vel non, sequentibus: R. radic. Bryoniæ, Raphani an. ʒ. ij. fol. Galeopsis, Hederæ terrestris an. M. j. sum. Iuniperi p. j. decoquantur in Vino, addito Aceto: Pro foru cum stuppis intinctis.

In gangræna pudendi forus cum decocto Arthemisiæ, Absynthij, Violariæ, Fragariæ, fol. Althææ in Vino, statim iunuit, ynde mox corrupta à sana parte, caro abscessit.

Applicationes aliæ sic fiunt: Hederæ terrestris & sum. Iuniperi confusa, decocta in Lacte, applicata, pro singulari habentur experimento.

Brassica elixa cum Melle, Dioscorid. Vel Lactuca recens cōtusa cum farina Loleacea.

Nuces iuglandes vetustissimæ tritæ, vel cortices ipsarum cùm habentur virides adhuc.

Galeopsis & Bryonia cum rad. foliis & seminibus.

Item Agrimoniz & Rosarum folia, confusa cum Aceto, Raphanus cum sale.

Farina Orobi, Lolij, Cicerum, Hordei cum Melle & Sale.

Vel hoc cataplasma: R. farinæ Lupinorum, Lentium aut Fabarum, aut prædictarum ad ʒ. vj. cort. Granat. ʒ. ij. flor. Rosac. sicc. ʒ. j. Boli, Myrrhæ. an. ʒ. ʒ. Salis ʒ. j. succi Ab-

synthij vel Galeopsis vel Vrticæ, aut Hederæ terrestr. Punicorum ad ʒ. iij. Aceti ʒ. j. cum Melle & Terebinthin. vel Oxyfaccharo fiat cataplasma, addendo interdum Vitellos ouorum tres. Interdum & ol. Nucum vel Rosaceum ne subitò exiccetur.

Vel: R. residentiam decocti pro foru, alterutrius confusam, adde Nucum iuglandium antiq. nucl. ʒ. j. ʒ. farinæ Orobi & Cicerum an. ʒ. ij. Mellis ʒ. j. ʒ. Salis ʒ. j. fiat cataplasma.

Vntuosa ex oleis vel adipibus, cum putredinem augeant, non adeò competunt, nisi vt minùs citò siccetur emplastrum, parum de illis quæ vim aliquam habent digerendi, addatur. Sic fit emplastrum expertum ex Sabina puluerisata cum Fermento, addendo parum olei Lini vel Nucum, aut de Vitellis ouorum, vel Tartari.

Vnguentum Ægyptiacum post ablutionem imponatur, cui & Alumen addi potest, atque dum paratur simul coqui.

Caustica, si perseveret putredo, apponenda, vt lac Tithymali; vel alia alibi descripta.

Vel Ossibus humanis confusis & puluerisatis misce Arsenicum, eoque vttere. Cui rad. Mandragoræ addunt, fortè ne dolorem moueat. Alij radic. Pentaphyli quoque adiciunt.

Postquam caro putris à sana recessit, vt vlcus curabimus.

Possimus & aliis vehementer abstergentibus in vlceribus, & carnem detrahentibus, in vlcere excrescente expositis, vti.

Caries ossium, quando illa corrosa, cariosa, nigra fiunt, in vlceribus prauis, profundis, sinuosis ad ossa vsque pertingentibus, eaque vitiantibus, & vlcerum curationem impedit, & membri quoque si perseveret, firmitatem vitiat. Quam incipientem vt auferamus, medicamenta in profundum ad ossa vsque intrudi atque injici debent, dilatato prius, si angustum vulnus sit, vlceris foramine, per turundam siccâ, quæ vbi madorem à vulnere conceperit, intumescens locum dilatet. Sicuti intrusâ rad. Gentianæ aridâ, quæ tamen simul etiam abstergit, vel spongiolâ arctè in formam suppositorii vin-

*Caries
ex cor-
ruptione
ossium,
curatio.*

ctā, aliisve hoc perficitur. Vel si nondum pateat aditus, sectione vlcis os aperire possumus.

Quibus factis, medicamēta indimus abstergetia, alias etiā cathēretica, vt sicuti à carne putredinē, ita ab ossibus cariem abradāt.

Quodd si verò hisce, vitium ab ossibus auferri nequeat: Vti &, si alia ossis adsit vel restet asperitas, instrumento acuto, ad hoc apto, os denudatum prius, radimus & æquale reddimus, vel illud quod protuberat, abscindimus, donec os læue & mundum rursus appareat.

Nonnunquam cauterio actuali os corruptum vrimus, tunc enim pars adusta à sana sponte abscedit separaturque. Quod vt in variis locis, vbi ossa ita vitata sunt fieri solet, sic in digitorum extremis ossibus, in Paronychia tam subito hoc modo lædi solitis, mox faciendum, vt internodio corrupto ablato, illud quod ei contiguum fuit, conseruari possit.

Quibus factis, osseque sic purgato, vlcus postea remediis, quæ eius naturæ postulat, curabitur.


F I N I S.



Cum ob assiduitatem laborum Typographicorum receptum sequens, priori ferè simile, omisum sit, illud ne desideretur, Lector ad Pag. 598 circa fin. ante receptum pilularum de Hermodactylis dictarum, &c. inserere non grauabitur.

Vel istis : Rhabbarbari, Agarie. an. ʒ. ʒ. My- robalan. Cheb. Citrin. an. ʒ. j. Aloës ʒ. ij. Sar- cocollæ, Bdellij, Sagapeni an. ʒ. ʒ. rad. Aristol. Valerian. Mei, Gentianæ, herb. Iuæ, Cha-	mædr. summ. Centaur. Hyperic. fem. Petrof. Maced. an. ʒ. j. Spicæ, Zedoariæ, Zingib. Ma- ceris, salis Gemmæ an. ʒ. ʒ. cum syr. de Cau- libus, fiat massa.
---	--

*Cetera verò Errata, quæ occurrunt, cum tanti momenti non sint, diligens Lector
sponte emendare velit.*



I N D E X

AFFECTVVM omnium qui in hoc opere tractantur, & in margine ple-
rumque adnotati reperiuntur, tam Symptomatum in generibus pro-
positorum, quàm Morborum in causis descriptorum: Quibus, vbi cuiusq;
cura inueniatur, numero indice, singulis (vti in tractatu de functionum læ-
sionibus) addito, significatur.



Abscessus 637. cau-
sa 658. cura 660
Achores: vide, Ti-
nea.

Aeglops 230. causa 233. cu-
ra 238. 238

Alcola 284. vide, Oris vlcera.

Angina vera 314. causa 315.
cura 329. 337

Angina notha 313. causa 317.
cura 319. 322

Angine sexta species 314. vide
Dysphn. in primo tractatu.

Antides 314. causa 315.
cura 319. 328

Anthrax, Carbunculus 645.
causa 665. cura 714

Anthrax pestilentialis 645.
causa 665. cura 714

Aphra 284. vide Oris vlcera.

Apostema: vide, Abscessus.

Arthritis generalis 569. causa
577. præcautio & cura 592

Arthritidis species peculiaris 577.
causa ibid. cura 591

Arthritis maligna 589. causa
ibid. cura 630

Articulorū dolor: vide, Arthritis.

Auditus dolor seu offensio 1.
causa ibid. cura 2

Auditum offendens Strepitus cau-
sa Auditus doloris seu offensio-
nis 2 cura 2

Aurium dolor 266. causa 267.
cura 269

Aurium pruritus 267. causa
ibid. cura 269. 276

Aurium calida intemperies, causa
Pruritus in auribus 267.
cura 269

Aurium inflammatio, causa Do-
loris in auribus 268. cura 269

Aurium vana inflammatio 637.
causa 660. cura 681

Aurium frigida intemperies, cau-
sa Doloris in auribus 268.
cura 274

Auribus infesta qualitas maligna,
causa Doloris in auribus 268.
cura 275

Aurium irritatio, causa Pruritus
sen Titillationis in auribus 269.
cura 276

Aurium interior distentio, causa
Doloris in auribus 269.
cura 274

Aurium vulnus aliæve læsio, causa
Doloris in auribus 269.
cura 276

Aurium abscessus, causa Doloris
in auribus 272. cura ibid.

Aurium vlcus, causa Doloris in
auribus 272. cura ibid.

B

Bubo sine inflammatione 636.
causa 661. 662. cura 693

Bubo cum inflammatione 636.
causa 660. cura 693

Bubones in iuuenibus dum cre-
scunt 661. causa ibid.

Bubo Veneræ, Schlier 636.

causa 661. cura 693
Bubo malignus pestilens 636.
causa 661. 662. cura 693

C

Calculus & arena in hepate
illiusq; vesicula, causa Gra-
uis hypochondriaci doloris 445.
cura 450

Calculus & arena in renibus, cau-
sa Grauis hypochondriaci dolo-
ris 444. cura 456

Calculus & arena in vteribus,
causa Nephritici doloris 445.
cura 456

Calculus sub lingua: 284. vide
Ranam.

Cancer pteri 498. illius cerui-
cis & pudendi 530. exulcer.
531. causa 532. cura 535. 536

Cancer 639. causa 664. cura
708

Cancer exulceratus, Carcinoma
640. causa 565. cura 611

Cancer Krebslin: vide, Furun-
lus.

Cancer vel Herpes exedens gingi-
uarū Durchsaule Germ. 284.
vide Aphras.

Capitis dolor 203. causa 206.
cura 210

Capitis grauedo 203. causa 206.
cura 210

Capitis grauedo externa 572.
causa 578. cura 590

Cephalalgia 203. causa 206.
cura 210

Ceph-

- Cephalea* 204. causa 210. cura ibid.
Cephalea externa 571. causa 576. cura 590
Cerebri calida intemperies, causa *Capitis doloris* 206. cura 210
Carcinoma: vide, *Cancer exulceratus*.
Carbunculus: vide, *Anthrax*.
Cardiaca 369. vide, *Cordis rodens dolor*.
Cardialgia: vide, *Cordis dolor*.
Cardilaa 370. vide, *Ventriculi imbecillitas & calida constitutio*.
Cardiognos: vide, *Cordis rodens dolor*.
Casus, causa *Contusionis*: vide, *Contusio*.
Cerebri à sanguine repletio, causa *Cephalalgia sanguinea*, biliosa, melancholica, pituitosa 206. cura 210
Cerebrū impetentes vapores, causa *Capitis dolor* 206. cura 210
Cerebri frigida intemperies, causa *Capitis doloris* 208. cura 210
Cerebri vellicatio & distentio, causa *Capitis doloris* 208. cura 210
Cerebro inimica qualitas, causa *Capitis doloris* 209. cura 210
Cerebri dispositio patibilis & imbecillitas, causa *Cephalea & Hemisrania* 210. cura ibid.
Chiragra 570. Zipperlin Germ. vide *Arthritis*.
Chymosis oculi 229. vide, *Ophthalmia vera*.
Clauus: vide, *Cephalea externa*.
Colicus dolor 484. causa 487. 492. cura 499. 518
Coli anfractus distentio ab excrementis & flatibus, causa *Colici doloris* 488. cura 499
Coli cellularum distentio à retentis excrementis & corporibus, causa *Colici doloris* 488. cura 499
Coli inflammatio, causa *Colici doloris* 492. cura 518
Coli intestini causa, *Cordis dolor* 379. cura 438
Coli affectus, causa *Hypochondriaci doloris* 449. cura 450
Columella 313. causa 318. cura 319
Condyloma in oculo: vide *Oculi vlcera*.
Condyloma pudendi mulieris 530. causa 556. cura 562
Condyloma podis: is *Feigwarthen* 554. causa 556. cura 562
Contusio cum Solo dolore 632. causa 635. cura 690
Contusio cum tumore 635. causa 669. cura 690
Contusio cum vulnere: vide *Vulnus*.
Conuoluulus 491. 492. causa 485. cura 499
Cordis dolor 367. causa 371. cura 382
Cordis comprimens vel distendens dolor 368. causa 373. cura 585
Cordis rodens dolor seu morsus 368. causa 372. 373. 374. cura 585. 587
Cordis ardens dolor 369. causa 372. cura 388
Cordis ardens ebulliens dolor *Sodt Germ.* 369. causa 375. cura 388
Cordis calor seu intemperies calida, & simul cum ea, omnium corporis partium, causa *Febris* 24. cura 75
Cordis calor à sanguine in vasis inflammato, à causa externa accensus, causa *febris Ephemera & Synochi pura* 26. cura 75. 76
Cordis calor à sanguine in vasis inflammato, à morbo proueniens, causa *febris Ephemera & Synochi Symptomaticarum*, morbis eiusmodi comitatarum 30. cura 196
Cordis calor à sanguine in vasis inflammato, à causa externa accensus, cuius portio extra vasa in partem aliquam effunditur, proueniens, causa *febris Synochi primariae*, inflammatione, bubone, erysipellate, ethymatibus, exanthematibus, anthrace, comitata 31. cura 192
Cordis calor à sanguine in venis putrescente, causa *februm Continuarum putridarum* 39. cura 79
Cordis calor à sanguine in venis putrescente, cordi vicinis, causa *Synochi putris*, *Causonis*, *Lipyrria*, *Colliquantis* 39. cura eadem cum *Continuis putridis*.
Cordis calor à sanguine in arteriis putrescente, causa *Causonis* 41. cura eadem cum *Continuis putridis*.
Cordis calor à sanguine in venis putrescente accensus, cuius portio extra vasa in partem aliquam effunditur, causa *Februm Continuarum putridarum*, tumoribus, pustulis, maculis, comitatarum 41. cura eadem cum *Continuis putridis*.
Cordis calor à sanguine in venis meseraicis putrescente accensus, causa *februm Intermittentium* 46. cura 196
Cordis calor à sanguine in venis meseraicis diuersis in locis putrescente, accensus, causa *februm Duplicium*, *Triplcium* 53. cura 189
Cordis calor à sanguine in venis meseraicis & vena cana simul putrescente accensus, causa *Hemipitritae* 53. cura 190
Cordis calor ab humore extra vasa, vel parte, vt secundina, fetu mortuo, vel corpore alio, vt vermibus putrescentibus, accensus, causa *februm Lentarum*, quae eiusmodi affectus comitatur 55. cura 203
Cordis

I N D E X.

Cordis calor à sanguinis in vasis
putredine & malignitate ac-
census, causa februm Maligna-
rum putridarum 61. cura 82
Cordis calor à veneno accensus,
causa februm Pestilentium &
Venenatarum 143. cura 144. 282
Cordis temperamenti in calidius
conuersio, permanens, causa fe-
brium Hecticarum 72. cura 182
Coxendicus dolor 569. causam,
curam: vide Arthritis.
Cutis abrasio vel attritio, inter-
trigo 646. causa 669. 670.
cura 742
Cutis frictio causa Abrasionis il-
lius & Scabiei 669. cura 742
Cutis erosio, causa illius Abrasio-
nis 670. cura 742
Cutis exsiccatio ab externis cau-
sis, causa Molestia ex contactu
rei asperæ & Fissurarum ac Per-
mionum 657. cura 742
Cutis siccitas ab humore prone-
miens, causa Fissurarum 672.
cura 742
Cutis capitis ab humore peruerso
erosio, causa Tinea 672.
cura 722
Cutis à sanguine perfusio, causa
Erysipelatis 657. cura 742
Cynanche: vide, Angina.

D

Defluxiones seu destillationes
in corporis habitum dela-
bantes, Fluß Germ. 568. cau-
sa 577. præcautio & cura 592
Dentium dolor 297. causa 298.
cura 303
Dentium dolor in dentitione in-
fantium 297. causa 303.
cura 312
Dentium dolor euulso dente 298.
causa 383. cura 312
Dentium stupor: vide, Hemodia.
Dentium doloris causa, Defluxio
300. cura 303
Dentium doloris causa, Intempe-
ries frigida 300. cura 310

Dentium doloris causa, Calor &
Inflammatio 299. cura 303
Dentium doloris causa, ipsorum
Irritatio 300. cura 311
Dentium doloris causa, Dentes
vitiati vel constricti 300.
cura 310
Dentium asperitas, causa Hæmo-
dia 301. cura 312

E

Ephelides pustula in scabie
642. causa 559. 662.
cura in Scabie.
Epicauma: vide, oculi vlcera.
Epiphora 642. causa 659. 661.
cura 703
Epimyctis 642. causa 666.
cura 722
Erysipelas, Rothlauff/Carfun-
ckel 632. causa 657. 662.
cura 676
Erysipelas phlegmonodes, œdema-
todes, exulceratum 632. 633.
causa 657. 661. cura 676
Erysipelas in cruribus hydropico-
rum 676. causa 658. cura 676
Erysipelata parua 633.
causa 661. cura 676
Exitura chirurgorum 661. vide
Abscessum.

F

Faucium dolor 313. causa 315.
cura 319
Faucium asperitas 313. vide Vocis
defectum, in primo tractatu.
Faucium irritatio molesta 313.
causa ab inbarentibus: vide De-
glutitionis defectum, in primo
tractatu.
Faucium vlcerosus dolor 315.
causa 318. cura 332. 334
Faucium inflammatio, causa An-
gina vera 315. cura 305.
illius abscessus 327
Faucium tumor ex defluxione,
causa Angina notha 317.
cura 319. 322
Faucium exulceratio, causa vlce-
rosi illius doloris 318. cura 332

Fauus 641. vide, Tinea.
Febris æstiva 3. causa 24.
curatio 74
Febris Ephemera, diaria 4.
causa 28. cura 75
Febris Synochus, pura, diaria, plu-
rium dierum 4. causa 28. 29.
cura 76
Febris Continua putrida, conti-
nens, conclusa, Hauptwehe/
Zaubhauptwehe Germ. 6.
causa 37. cura 79
Febris Synochus, continua putride
species, tertiana, quartana, quo-
tidiana, inordinata 7.
causa 74. cura 79
Febris Synochus putrida, continua
putride species 2. causa 42.
cura 79
Febris Synochus, acmaistica, epac-
maistica, paracmaistica tam pu-
ra quam impura: vide Synochus
pura & putrida.
Febris Causus, Ardens, continua
putride species 8. causa 39.
cura 80
Febris Leipyrias, continua putri-
da species 8. causa 39. cura 80
Febris Syncopalis, continua putri-
da species 9. causa 39. cura 80
Febris Colligans, caufonis species
9. causa 42. cura 80
Febris Intermittens, Raltwehe
Germ. 19. tertiana, quarta-
na, quotidiana 21. quintana,
sextana 22. causa 46. cura 106
Febris Intermittens Duplex ter-
tiana, quartana, Triplex quar-
tana 22. causa 53. cura 189
Febris Intermittens Exquisita,
Notha tertiana, quartana 52.
causa ibid. cura 106
Febris Epiala intermittens spe-
cies 23. causa, vide Febr. in-
termitt.
Febris Syncopalis intermittens
species 24. causa, vide Febr.
intermittens.
Febris Maligna putrida 10.

- C**ausa 61. cura 143
Febris pestilens 5. causa 66.
 praecautio & curatio 144
Febris Venenata 14. causa, cura 182
Febris Hectica 10. causa 66. cura 182
Febris Marasmodies, *Marasmus* 11. vide *Hectica*.
Febris Intermittens cum Hectica composita 13. causa 72. cura 191
Febris putrida continua cum Hectica composita 11. causa 72. cura 191
Febris Hemitriticus, *Semiterrianus* 12. causa 53. cura 190
Febris Epiala, *hemitritici* species 13. vide *Hemitriticus*.
Febris Syncopalis, *hemitritici* species 13. vide *Hemitriticus*.
Febris Ephemera, *Synochus pura*, *Venenata*, inflammatione externâ comitata 14. causa. 66. cura 195
Febris Synochus pura, *erysipelate* externo comitata, *Raruncel* Germ. 14. causa 34. cura 192
Febris Ephemera, *Synochus pura*, *Pestilens*, *Venenata*, *bubone* comitata 15. causa 34. 66. cura 192
Febris Continua putrida, *Maligna putrida*, *Pestilens*, *anthrace* comitata 15. causa 32. 36. 41. 66. cura 202
Febris Synochus pura, *Continua putrida*, *Maligna putrida*, *Pestilens*, *Venenata*, *exanthematibus* comitata 9. causa 32. 36. 41. 82. cura 192
Febris Synochus pura, *Continua putrida*, *Maligna putrida*, *Pestilens*, *ecthymatibus* comitata 16. causa 31. 34. 41. cura 198
Febris Ephemera, *Synochus pura*, *symptomatica*, *morbus calidis* & *biliosis* & *cholera morbo*, *dysenteria*, *dolore dentium* comitata 17. causa 39. 31. cura 196
Febris Synochus primaria, inflammationibus internis, vt *pleuritide*, *peripneumoniâ*, *hepate*, *splenitide*, *phrenitide*, *anginâ*: &c. comitata 137. causa 28. cura 196
Febris Phlegmonodes, *Typhodes*, *Crymnodes* 34. causa *ibid.* cura 196
Febris Synochus pura, *morbus calidis in habitu corporis*, vt *arthritide* comitata 17. causa 34. cura 196
Febris Hectica, *phrissi* comitata 18. causa 59. cura 202
Febris Lenta, *phrissi* comitata 55. causa *ibid.* cura 202
Febris Lenta, *Cachexia* comitata 18. causa 59. cura 202
Febris Lenta, *secundine*, *fœtus mortui retentioni*, & *vermibus* comitata 19. causa 60. cura 203
Fistula lachrymalis 231. causa 236. cura 238. 265
Fistula: vide *Ulcus fistulosum*.
Fistula Rhagades Græc. 646. causa 657. 672. cura 742
Furuncululus, *Dorhien* 635. causa 659. cura 681
- G
- G**angrana; *Ralt brand* Ger. 654. causa 658. cura 814
Gargareonis lapsus vel *elongatio*: vide *Columella*.
Gargareonis elongatio & *tumor a defluxione*, causa *Columella* 318. cura 319. 329
Gargareonis inflammatio, causa *Vuule* 315. cura 319. 328
Gargareonis exulceratio, causa *Ulcerosi doloris illiusq; absorptionis* 318. cura 332
Gargareonis absorptio 315. causa 318. cura 332
Genitalium dolor 529. causa 532. cura 534
Genitalium marium dolor interior 529. ad *Mictionem* cum
- dolore refertur.**
Gingivarum perforatio, causa *Doloris dentium*, in *dentitione* 202. cura 310
Gingivarum lesio causa *doloris dentium* eo euulso 202. cura 210
Gingivarum tumor & *inflammatio* 344
Glândularum tumores & *inflammationes* 635. causa 659. cura 693
Glândularum à sanguine repletio citra inflammationem, causa *Bubonum* citra inflammationem. 659. 661. cura 693
Glandularum à sanguine repletio, causa inflammationum, *Pani* & *Phygethli* in *bubonibus* & *parotidibus* 660. cura 693
Glandularum à sanguine maligno repletio, causa *Bubonum venereorum* & *pestilentialium* & *Parotid. pestilentialium* 665. cura 693
Gonagra 570. vide *Arthritis*.
Gustus dolor seu Insuauitas 1. causa 1. cura 2
- H
- H**abitus corporis dolor 567. causa 568. cura 589
Habitus corporis dolores, quibus alia symptomata copulata praevalent 567. causa 573. 574. cura 589
Habitus corporis partium cum Spasmo discurrente dolore 589. causa *ibid.* cura 630
Habitus corporis partium cum Sensu deprauato dolore 589. causa *ibid.* cura 630
Habitus corporis distendens flatulentus dolor 591. causa, cura *ib.*
Habitus corporis distendens cum tumore in ruptura dolor 576. causa *ibid.* cura 589
Habitus corporis partium compressio & *distectio*, causa *dolorum* quorundam, in quibus alia symptomata praevalent 574. 575. cura

cura 589
Habitus corporis partium à flatibus distentio, causa flatulenti illic doloris 591. *cura* ibid.
Habitus corporis partis à ruptura distentio, causa doloris distendentis, cum ruptura accidentis 576. *cura* 589
Habitus corporis partes occupans, humoris defluxio, causa Defluxionum & Arthritidis frigide, illiusq. specierum 577. *præcautio & cura* 592
Habitus corporis partes occupans sanguinis influxus, causa Arthritidis calida illiusq. specierum 585. *cura* 592
Habitus corporis partes occupans cōgestio humoris, causa Cephalæ externa, Grauedinis externa, & Arthritidis alicuius 577. *cura* 591
Habitus corporis partes infestans maligna qualitas, causa Luis venerea 587. *cura* 629
Habitus corporis partes infestans maligna qualitas, causa Cephalæ externa maligna 589. *cura* 629
Habitus corp. partes infestans maligna qualitas, causa Arthritidis cuiusdā malignæ 589. *cura* 529
Habitus corporis partes infestans maligna qualitas, causa doloris cum Spasmo discurrente 589. *cura* 629
Habitus corporis partes infestans maligna qualitas, causa doloris cum Sensu tactus deprauato 589. *cura* 629
Hemicrania 204. *causa* 210. *cura* ibid.
Hamodia 298. *causa* 301. *cura* 310
Hamorrhoides caca 543. *causa* 555. *cura* 557
Hamorrhoidalis vene repletio à sanguine, causa Hamorrhoidis caca 555. *cura* 557

Hepatis obstructio ab humore, tumore, causa graui hypochondriaci doloris 445. *cura* 450
Hepatis inflammatio, causa Ardentis doloris in hypochondriis 443. *cura* 450
Hepatitis: vide Hepatis inflammatio.
Herpes miliaris, Zittermahl Germ. man. 644. *causa* 667. *cura* 778
Herpes esthiomenus 644. *Germ.* **Burm.** *causa* 667. *cura* 718
Herpes phlyctenodes 642. *causa* 668. *cura* 718
Homoplate dolor 570. *vide Arthrit.*
Hypochondriacus dolor 438. *causa* 443. *cura* 450
Hypochondriacus Grauis & obtusus dolor 439. *causa* 445. *cura* 450
Hypochondriacus Ardens & inflammans dolor 440. *causa* 443. *cura* 450
Hypochondriacus diuellens acerbissimus dolor: vide Nephriticus dolor.
Hypochondriacus punctorius dolor 441. *causa* 448. *cura* 482
Hypochondriacus tensius & lancinans dolor 441. *causa* 449. *cura* 450

I

Ictus virulentus seu venenatus animalium 550. *causa* 671. *cura* 781
Ignis persicus: vide Anthrax.
Ignis sacer vel syluestris 644. *vide Herpes.*
Iliacus dolor 484. *causa* 489. 493. *cura* 499
Impetigo, Lichen Grac. 643. *causa* 668. *cura* 857
Intertrigo: vide Cutis abrasio.
Intestinorum refrigeratio, causa Torminum ventris 492. *cura* 499
Intestinorum distensio à copia excrementorum & flatuum, cau-

sa Vētris doloris 487. *cura* 499
Intestinorum tenuium exitus meatus obstructio, causa Iliaci doloris 489. *cura* 499
Intestinorum phlogosis, erysipelas à bile, causa Iliaci doloris 493. *cura* 518
Intestinorum tenuium inflammatio, causa Conuolululi 492. *cura* 518
Intestinorum conuolutio causa Conuolululi 491. *cura* 499
Ischiadicus dolor: vide Coxendicus dolor.

L

Labiorum fissura: vide Fissura.
Lateralis dolor: vide Pleuritis
Lepa Græcorum vel Psora deterior 643. *causa* 688. *cura* 722
Lienaris vel Spleneticus falsò dictus punctorius dolor, Willheffen Germ. vide Hypochondriacus punctorius dolor.
Lienis obstructio ab humore, tumore, causa grauis hypochondriaci doloris 445. *cura* 450
Lienis inflammatio, causa Ardentis doloris in Hypochondriis 443. *cura* 450
Linguam & fauces offendens Sapores, causa Gustus doloris seu insuauitatis 2. *cura* 2
Lingua punctio, nullo apparente morbo 283. *causa* 285. *cura: vide in Stupore & Paralyfi, in primo tractatu.*
Lingue neruorum affectus, causa Punctionis & ardoris in lingua nullo apparente affectu 285. *curam vide in Stupore, Paralyfi, in primo tractatu.*
Lippitudo: vide Epiphora.
Luis venerea species, Lemmy Germ. 572. *causa* 587. *cura* 629
Lumborum dolor & endywehe: vide Nephriticus dolor.
Lupus: vide Cancer.

M

M Amillarum inflamatio 635.
 causa 660. cura 699
M amillarum à sanguine reple-
 tio, causa. Inflammationum in
 illis 660. cura 699
M anuum fissura: vide Fissura.
M iserere mei: vide Conuoluulus.
M orbus Neapolitanus, Gallicus:
 vide Lues venerea.
M orsus vulnerans 649.
 causa 671. cura 752
M orsus virulentus & venenatus
 649. causa 671. cura 782.

N

N Ares offendens Fœtor, causa
 Olfactus, doloris seu insua-
 uitatis 2. cura 2
N arium pruritus & titillatio
 276. causa 277. cura 279
N arium intrinsecus ardens dolor
 276. causa 277. cura 279
N arium extrinsecus alarum do-
 lor 637. causa 660. cura 681
N arium vlcerosus dolor 276.
 causa 278. cura 282
N arium irritatio causa Pruritus
 & Titillationis in illis 277.
 cura 279
N arium calida intemperies & in-
 flammatio, causa Doloris arden-
 tis in ipsarum interioribus 277.
 cura 279. & exterioribus 660.
 cura 681
N arium Excoriatio, Vulnus, Vl-
 cus, causa Doloris vlcerosi in i-
 psis 277. cura 279. 280
N ephritis 440. vide Renum in-
 flammatio.
N ephriticus dolor, Græcè 442.
 causa 445. cura 456
N oli me tangere: vide Cancer.
N oma: vide Vlcerà exedentia..

O

O culorum dolor 227. cau-
 sa 232. cura 237
O culorum conuulsus dolor seu con-
 tractio post somnum
 228. causa 235. cura 238. 251

O culorum pruritus 228. causa
 232. 235. 236. cura 238. 251
O culorum punctio 228. causa 232.
 cura 238. 251
O culi asperitas 230. causa 232.
 235. cura 238
O culi scabrities 230. causa 236.
 cura 238. 261
O culi vesica: vide Phlyctena o-
 culi.
O culi vlcerà in cantho maiore
 230. causa 236. cura 238. 264
O culi globi vlcerà 231. causa
 236. cura 238. 263
O culi vulnera 231. causa 236.
 cura 238. 265
O culi irritatio à splendore, causa
 Visionis doloris seu offensionis 1.
 cura 2
O culi calida, frigida, sicca intem-
 peries, causa Pruritus & Pun-
 ctionis in oculo 232.
 cura 238. 251
O culi siccitas, causa Asperitatis in
 oculo 232. cura 238
O culi calida intemperies cum af-
 fluxu sanguinis, causa Ophthal-
 mia non vera 233. cura 238. 251
O culi inflamatio, causa Ophthal-
 mia vera 233. cura 238. 251
O culi canthi inflammatio, causa
 Aegylopiis 233. cura 238. 258
O culi à defluxione affectus, causa
 Pruritus & Epiphora 234.
 cura 238. 258
O culi à vaporibus distentio, causa
 Oculi contractionis post somnum
 235. cura 238. 251
O culi vellicatio, causa Pruritus,
 Asperitatis, Ophthalmia & E-
 piphora 236. cura 238. 258
O culi solutio continui, causa Phly-
 ctæna, Scabrities, Vlcerum, Fistu-
 la, Vulnerum in oculo 236. cu-
 ra 238. 261. 262. 264. 265. 266
O esophagi ardens dolor 316.
 causa ibid. cura 319. 331
O esophagi inflamatio, causa Ar-
 dentis illius doloris 316. cura.

319. 331. vbi & abscessus cura.
O esophagi exulceratio & vul-
 nus, causa Fauicium vlcerosi do-
 loris 318. cura 334
O lfactus dolor seu insauitas 1.
 causa 1. cura 2
O phthalmia non vera 228. cau-
 sa 233. cura 238. 251
O phthalmia vera 229. cau-
 sa 233. cura 238. 251
O ris dolor 282. causa 285.
 cura 287
O ris & lingue asperitas 283. vide
 Gustus lesio & Loquelæ defectus
 in primo tractatu.
O ris & lingue calor, tumor &
 ardor, Breuè Germ. nonnun-
 quam & fissura & pustula 283.
 causa 286. cura 287
O ris & lingue vlcerosus dolor cū
 excoriatione, fissuris, exulcera-
 tione 284. causa 286. cura 291
O ris & lingue intemperies & cali-
 da inflammatio, causa caloris,
 tumoris & ardoris, & fissur. &
 pustularumq; in illis 286.
 cura 287
O ris & lingue solutio continui,
 causa Vlcerosi doloris cum exco-
 riatione, fissuris, exulceratione
 in illis 286. cura 291
O ris labiorum inflammatio 637.
 causa 660. cura 681
O sium Caries & corruptio 655.
 causa ibid. cura 816
O sium lesio cum vulnere 650.
 vide Vulnus.
O zæna 279. vide Narium vlcus.

P

P alpebrarum fissura: vide Fis-
 sura.
P araritium digitorum: vide Pa-
 ronychia.
P anus, Phlygethon Græcis: vide
 Bubo vel Parotis cura in infla-
 matione.
P apillarum fissura: vide Fissura.
P apillarum inflammatio 637.
 causa 660. cura 681
 Papu-

I N D E X.

- Papula*: vide *Herpes*.
- Paristhymia* 214. causa 319. cura 329
- Paronychia* *Burm am Finger* 637. causa 650. 663. cura 681
- Paronychia* *ulcerata* 653. causa *ibid.* cura 788
- Parotis* *Ohrenmüggelle* cum inflammatione & pestilens 627. causa 636. cura 693
- Partium corporis exteriorum* quarundam insueta attritatio, causa *Titillationis* 636. cura 673
- Partium* *externarum* quarundam, vt *Laborum*, *oris*, *podicis*, *pudendi*. Item *Papillarum*, *Narium*, *Aurium*, & *Digitorum* extremitatum à sanguine repletio, causa *Inflammationum* in istis, & *Paronychie* 660. cura 681
- Partium* corruptio causa *Gangrene* 658. cura 815
- Partium* *neruorum* corruptio, causa *Ulcus aqua Glidwasser* exundantis 658. cura 784
- Partium* *caloris* *natiui* extinctio, causa *Sphaceli* 658. cura 913
- Pedum* *Fissura*: vide *Fissura*.
- Pedum* *ulcera* *peruersa* 653. causa *ibid.* & 671. cura 784
- Penis* *glandis* & *præputij* *inflammatio* 637. causa 660. cura 933
- Peripneumonia* 336. causa 338. cura 347
- Peritonæi* *distictio* à flatibus, causa *Puncturæ* *hypochondriaci* doloris 448. cura 482
- Peritonæi* *tensio* *viscerum* & *vasorum* illi *adiacentium* occasione, causa *Tensio* & *lancinantis* *hypochondriaci* doloris 449. cura 450
- Pectus*, *chymethlon* 646. causa 457. cura 742
- Pestis*, *Pestilencia*: vide *Febris pestilens*.
- Phagedæna*: vide *Ulcera depauperata*.
- Phlegmone*, *Inflammatio* 634. causa 662. cura 681
- Phlegmone* *erysipelatodes*, *edematodes* 634. causa 661. cura 681
- Phlogosis* 632. 633. vide *Erysipelus* & *Phlegmone*.
- Phlyctæna* 642. causa 668. cura 742
- Phlyctæna oculi* 230. causa 236. cura 238
- Phyma*: vide *Bubo* vel *Parotis* cum inflammatione.
- Picrocoli*: vide *Cordis* *rodēs* dolor.
- Plaga*: vide *Vulnus*.
- Pleuritis* *falsa*, *Flatulenta*, *Pituitosa* 335. causa 337
- Pleuritis* *vera*, *Drüsigeschwär* 335. causa 338. cura 347
- Pleuritis* *Succingentis* *tunica* *periculi* *à* *cæteris* 337. causa 338. cura 360
- Pleuritis* seu *Peripneumonia* cum *Pleuritide* *succingentis* *concurrentis* 360. causa, cura *ibid.*
- Podagra* 570. causa 577. 584. præcautio & curatio 592
- Podicis* dolor 543. causa 554. cura 557
- Podicis* *inflammans* dolor 543. causa 555. cura 556
- Podicis* *ulcerosus* dolor 545. causa 547. cura 559
- Podicis* *condyloma*: vide *Condyloma*.
- Podicis* *inflammatio* vel *phlogosis*, causa *inflammantis* *podicis* doloris 555. cura 565
- Podicis* *vlus* & *vulnus*, causa *Ulcerosi* *podicis* doloris 556. cura 566
- Podicis* *peruersus* humor, causa *Condylomatis* *in* *ano* 556. cura 565
- Podicis* *fissura*: vide *Fissura*.
- Podicis* *labiorum* & *cutis* *rugosa* *inflammatio* 637. causa 660. cura 681
- Pollicis* & *indicis* *interstitiū* *pos-*
- fidens* *inflammatio*, *Græppellen* 637. causa 660. cura 681
- Præputij* *fissura*: vide *Fissura*.
- Prurigo* *Chrismo*, *Græc.* 643. causa 667. cura 722
- Pruritus* 631. causa 666. cura 673
- Pseudophthalmia* 228. vide *Ophthalmia* non vera.
- Pterophthalmia*: vide *Oculi* *scabrities*.
- Psoa* *Græcorum* 643. causa 668. cura 722
- Pudendi* *fissura*: vide *Fissura*.
- Pudendi* *mulieris* *colliculorum* & *alarum* *inflammatio* 637. causa 660. cura 681
- Pulmonum* *inflammatio*, causa *Pleuritidis* vera, & *Peripneumonie* 338. cura 347
- Punctorius* dolor, *Stich* *Germ.* vide *Pleuritis*.
- Punctura* *lata*: vide *Vulnus punctum* *factum*.
- Punctura* *angusta* 647. causa 670. cura 776

R

Rana tumor sub lingua, *Batrachios* 283. vide *Oris* *inflammationem*.

Reductio: vide *Paronychiam*.

Renum obstructio ab humore, tumore, causa *Gravis* *hypochondriaci* doloris 445. cura 450

Renum *inflammatio*, causa *Ardentis* doloris in *hypochondriis* 443. cura 450

Rhagades: vide *Fissuras*.

Rhyas, *caruncula* *oculi* *absumptio* 237. causa *ibid.* cura in *oculi* *ulceribus*.

S

Scabies *vulgaris* *humida*, *Germ.* *Raud* 640. causa 666. 670. cura 722

Scabies *Fera*, *agria*, *Herbroten* *Germ.* 641. causa 666. cura 722

Scabies *secca* 642. causa 666.

- cura* 722
Scabies foeda, *Mager Germ.* 643.
causa *ibid.* *cura* 722
Sclerophthalmia 229. *vide Ophthalmia non vera.*
Scorbutus 276. *vide Gingivarum tumor, inflamm.*
Septi transversa causa, *Comprimens cordis dolor* 378. *cura* 438
Soda Arabum: *vide Cephalalgia.*
Sphacelus, Syderatio 655.
causa 658. *cura* 767
Splenitis: *vide Lienis inflammatio.*
Stomachi dolor: *vide Cordis dolor.*
Sudor Anglicus 10. *vide Febris maligna putrida.*
Superficie corporis dolor 630.
causa 655. *cura* 673
Superficie corporis dolor ex calore 631. *causa* 656. *cura* 675
Superficie corporis dolor ex frigore 631. *causa* 656. *cura* 874
Superficie corporis dolor ex contactu rei aspera 631. *causa* 657.
cura 675
Superficie corporis dolor ex contusione 631. *causa* 669.
cura 690
Superficie corporis dolor ex compressione, distensione externa 631. *causa* 669. *cura* 675
Superficie corporis afficiens calorem & frigus, causa Dolorum inde genitorum 656. *cura* 574
Superficie corporis comprimens, distendens, feriens, vis & impetus, causa Dolorum inde provenientium 669. *cura* 675
Superficie corporis, saepe & interiora secans, pungens, contundens lesio, causa Vulnerum eiusmodi 670. *cura* 678
Superficie corporis adurens, calor, ignis, causticum, causa Vitiatio 670. *cura* 747
Superficie corporis ladentia virulenta, venenata instrumenti, morsus, ictus animalium, causa
- Vulnerum eiusmodi* 670.
cura 781
Superficie corporis alicubi adimplens sanguis, causa Phlegmones 658. *cura* 681
Superficie corporis innuadens suppuratio, causa Abscessus, iug, ruptis, Vlcera 658. *cura* 702
Superficie corporis obsidens certo in loco, maligna qualitas causa Cancris 664. *cura* 708
Superficie corporis alicubi innuadens pestilens venenum, causa Anthracis pestilentialis 665. *non pestilentialis* 666. *cura* 714
Superficie corporis obsidentes humores biliosi, salsi, acres, pravi, causa Herpetis, Phlyctena, Scabiei 666. *cura* 718
Superficie corporis infestantes humores acres, pravi, maligni, causa Vlcera exedentium, depascentium, varicosorum & malignorum 673. *cura* 784
- T
- Taraxis*: *vide Epiphora.*
Terminibus, Hundsbatern Germ. 654. *causa* 666
cura 722
Testium inflammatio 636.
causa 660. *cura* 609
Testium a sanguine repletio, causa inflammationum in illis 660.
cura 699
Thoracis musculorum distentio a defluxo humore, causa Pleuritidis falsa P. tuitosa 338.
cura 363
Thoracis tunica succingentis distentio a flatibus, causa Pleuritidis Flatulenta 337. *cura* 363
Thoracis succingentis tunica inflammatio, causa Pleuritidis priuata, Succingentis dicta 338.
cura 360
Tinea der Grinde 641.
causa 672. *cura* 722
Titillatio 630. *causa* 656.
cura 673
- Tonsillarum inflammatio, causa Antiadum* 315. *cura* 319
Tonsillarum tumor a defluxione, causa Paristhmia 218. *cura* 219
Tonsillarum exulceratio, causa vlcerosi Faucium doloris 218.
cura 333
Tormina, Grimmen: *vide Ventris dolor.*
Tuberculum, Erssen Germ. aliud Blutenessen 634. *causa* 662.
cura 681
- V
- Variex*: *vide Vlcera varicosa.*
Ventris dolor 483. *causa* 487.
cura 499
Ventris distendens circa vesica regionem dolor 485. *causa* 495.
cura 520
Ventris inflammans circa vesica regionem dolor 485.
causa 496. *cura* 525
Ventriculi dolor: *vide cordis dolor.*
Ventriculi imbecillitas dicta cordis molestia 370. *causa* 377.
cura 398
Ventriculi calidior, appellata Cordis molestia 370. *causa* 378.
cura 485
Ventriculi ardor ebulliens, Eodt Germ. vide Cordis ardens dolor.
Ventriculi calida interperies simplex, causa Sitis potius quam doloris 331. *cura*, *vide Ventriculi calidior constitutio.*
Ventriculi inflammatio, causa Ardentis cordis doloris 372.
cura 381
Ventriculi frigida interperies, causa Rodentis cordis doloris 372.
cura 385
Ventriculi distentio, aggrauatio, compressio, causa Comprimentis cordis doloris, nonnunquam & Rodentis 373. *cura* 386
Ventriculi inflatio 373.
causa *ibid.* *cura* 386
Ventriculi vellicatio, causa Rodentis cordis doloris 375.
cura

I N D E X.

- cura* 388
Ventriculi irritatio grauis, causa
nunc Rodentis, nunc Ardentis
cordis doloris 375. *cura* 388
Ventriculi erysipelas 370. *cusa*
Ardentissimi cordis doloris 377.
cura 388
Ventriculi imbecillus constitutio à
caloris natiui defectu, intemperie
frigida & humida, refrigeratio-
ne actuali, distensione, inflatione,
laxitate, alioue organi vitio,
causa illius molestia, que Imbe-
cillitas ventriculi dicitur 377
cura 398
Ventriculi calidior constitutio, cau-
sa illius molestia, que Calidior
ventriculi molestia dicitur 378.
cura 485
Ventriculi neruorum causa, Cor-
dis dolor 378. *cura* 438
Ventriculi affectus, causa Hypo-
chôdriaci doloris 449. *cura* 450
Vermes aurium 274 *cura* *ibid.*
Vermes in naribus 279. *vide*
Vermes.
Vesica distentio, causa Distenden-
tis circa vesica regionem Ventris
doloris 495. *cura* 520
Vesica inflammatio, causa Inflam-
mationis circa vesica regionem
ventris doloris 495. *cura* 524
Visus dolor seu offensio. i. causa 1.
cura 2
Vlcus 651. *causa* 663. *cura* 784
Vlcera plana, causa, sinuosa: vide
Vlcus.
Vlcera putrida 653. *causa* 672.
cura 784
Vlcera vermicosa 653. *causa* 672.
cura 784
Vlcera exedentia 653. *causa* 673.
cura 784
Vlcera depascentia 953. *cau-*
sa 673. *cura* 784
Vlcera serpentina: vide Vlcera exe-
dentia & depascentia.
- Vlcera aquam, Glidwasser à chi-*
rurgis nostris vocatam, exsudan-
tia 653. *causa* 693. *cura* 784
Vlcera varicosa 654. *cau-*
sa 673. *cura* 784
Vlcera cacoëthe 652. *causa* 672.
cura 784
Vlcera maligna 654. *causa* 673.
cura 784
Vlcera luis venerea: vide Vlcera
maligna.
Vlcera Elephantiorum: vide Vl-
cera maligna.
Vlcera fistulosa 652. *causa* *ibid.*
cura 907
Vlcera callosa 652. *causa* *ibid.*
cura 910
Vlcera excrefcentia 651. *causa*
ibid. *cura* 911
Vlcera phlegmonosa, erysipelato-
sa 652. *causa* 672. *cura* 967
Vlcera œdematosa 652.
causa 672. *cura* 910
Vlcera erysipelatum exulcer. 654.
causa 672. *cura* 784
Vlcera capitis manantia: vide Ti-
nea vel Scabies manans.
Vnguii frigidus dolor, Rûneglen
Germ. 631. *causa* 656.
cura 674
Vomica: vide Abscessus.
Vstio 647. *causa* 670. *cura* 747
Vterinus dolor frequentior, Bâr-
mutter 485. *causa* 497.
cura 520
Vterinus dolor alter post partum
486. causa 496. *cura* 520
Vterinus dolor inflammans 486.
causa 498. *cura* 525
Vterinus dolor inflammans post
partum 486. *causa* 498.
cura 525
Vterinus dolor: vide Hypochon-
driacus, lancinans & tensuus
dolor.
Vteri fundi distentio, causa Vteri-
ni doloris post partum 496.
- cura* 520
Vteri vasorum distentio, causa V-
terini frequentioris doloris 487.
cura 520
Vteri fundi inflammatio, causa
Vterini inflamantis doloris 498.
cura 525
Vteri inflammatio post partum,
causa Vterini post partum in-
flamantis doloris 498. *cura* 525
Vteri inflammans dolor 530.
causa 531. *cura* 534
Vteri vlcerosus dolor 531.
causa 532. *cura* 535
Vteri illiusq. cervicis cancer &
carcinoma: vide Cancer.
Vteri condyloma: vide Cœdyloma.
Vteri inflamatio, causa inflam-
tis vteri doloris 531. *cura* 534
Vteri vlcus, causa Vlcerosi vteri
doloris 532. *cura* 535
Vteri malignus humor, causa Can-
cri in vtero 532. *cura* 534
Vulnus 534. *causa* 670.
cura 752
Vulnus amplum, sectum, punctum
647. causa 670. *cura* 752
Vulnus seu ictus à sclopeto: vide
Vulnus.
Vulnus contusum 649. *causa*
670. cura 754
Vulnus angustum: vide Punctura.
Vulnus phlegmonodes 650. *causa*
cura 913
Vulnus in vlcus degenerans: vide
Vlcus.
Vulnus venenatum virulentu 650.
causa 670. 671. *cura* 781
Vulnus cum osium lesione 650.
causa *ibid.* *cura* 759
Vuula 314. *causa* 315.
cura 319.

X

X Enophthalmia 228. *vide*
 Ophtalmia non vera.
 Xirophthalmia 229. *vide Ophtal-*
mia non vera.

FELICIS PLATERI
ARCHIATRI ET
PROFESS. BASIL.

Praxeos

Seu

DE COGNOSCENDIS, PRÆDICEN-
dis, præcauendis, curandisq; affectibus
homini incommodantibus,

TOMVS TERTIVS
ET VLTIMVS.

DE VITIIS,

Libris duobus agens: quorum primus Cor-
poris: secundus Excretorum
vitia continet.

*Singula ipsorum Symptomata, in generibus: Morbos eorumq; Causas,
in causis: & Curam in curatione proponens.*



BASILEÆ, IMPENSIS LVDOV. REGIS,
TYPIS IOANNIS SCHROETERI.


MDCXXV.

*Ad Illustrissimum Potentissimumq; S. Rom. Imp.
Principem,*

**IO. FRIDERICHVM DVCEM
WIRTEMBERGENSEM ET TECCEN-
sem, Comitem Montisbeligard. Dominum in
Heidenheim & Oberkirch.**

Principem Dominumq; meum clementiss.

FELIX PLATERVS ARCHIATROS BASIL.



*ACTVM non agam, Illustrissime Princeps, repetendo quâ
causâ motus ego septuagenario nunc maior, & paulo minus
sexaginta annis in Medico studio versatus, artisq; illius v-
sum annos plus quinquaginta iam exercens, & triginta
septem in Academia nostra Basiliensi publicè docens, ata-
te ingrauescente animum ad scribendum appulerim, at-
que ea qua longâ & multâ observatione, usu atque experien-
tiâ cognoueram, publici boni & humana sanitatis presentis
conseruanda, amissaq; recuperanda amore ductus, in lucem
emittere, totiq; orbi bona fide communicare, aggressus sum:*

*primò opere meo Anatomico, inde Praeactici tractatus parte primâ, anniq; spacio interie-
cto alterâ, editis. Siquidem eius rei rationes in praefationibus, libris illis praemissis, abun-
dè satis à me fuerunt explicata. A quo tempore nihil mihi magis fuit in votis, quàm ut
ea qua restabant in hoc genere, absoluendo desiderio meo satisfacerem. Ad quod per-
agendum, non solum mea voluntas vehemensq; studiorum ac praeclararum & utilium
rerum cognoscendarum naturalis ardor, in hac quoq; mea senectâ adhuc flagrans, me im-
pulsit, sed & illud plurimum excitauit, quòd intelligerem, mea scripta non solum Germa-
niae nostrae, verum etiam externarum gentium Medicis, huiusq; facultatis studiosis, nec
non aliis, quibus res singulares & necessarias cognoscere volupe est, absit dicto inuidia,
probari, illorumq; lectione summopere eos delectari, me ut qua superessent, ad finem per-
ducerem, nec ceptam operum meorum telam imperfectam relinquerem, viua voce & lit-
teris rogantes atque indefinenter sollicitantes. Accessit Illustrissimi ac Potentissimi Prin-
cipis, Friderici Ducis Wirtembergici, parentis Ill. Cels. T. laudatissimae memoria, co-
hortatio & augusta autoritas, quâ mihi tractatum primum, eius Ill. Celsitudini inscri-
ptum offerenti, ad reliqua perficienda, coram & scripto calcar addidit, & praeter spem se-
quentium quoque praxeos meae tractatum patronum & protectorem se futurum, labo-
resq; meos gratiose suscepturum promissit, uti huius in secundi tractatus epistola dedica-
toria, mentio fuit iniecta. Itaque ut voluntati & desiderio tam multorum magnorumq;*

hortatorum, imprimis Maximi Principis manitis, mihiq; adeò ipsi sponte eò propendenti, satisfacerem, non destui ab eo tempore, quo secundam operis partem vulgaueram, toto hoc quinquennio, etsi ob atatem grandem non parum molestum esset, nec citra valetudinis iacturam & periculum fieret, dies noctesq; in tertio & ultimo tractatu praxeos meae, elaborando, & quae reliqua erant, perficiendis atq; absolvendis, desudare, nec manum de tabula, nisi totâ Praxeos medicae structurâ absolutâ, tollere volui. Id verò singulari Dei gratiâ & beneficio mihi videor esse tandem consequutus, tertio hoc & ultimo tractatu, in quo omnis generis vitia, quae hominem deformant, contaminant atq; defœdant, continentur, conscripto; sicq; eum prioribus tractatibus, in quibus Functionum lesiones & Dolores explicantur, totam pragmaticeam atq; commentationem praxeos Medicae, sub qua Chirurgia & Pharmacorum præparandorum ratio continetur, multis lucubrationibus compleuisse, atq; plurimorum expectationi satisfecisse. Persuasissimumq; mihi est, me omnibus numeris absoluto opere practico concinnato, cumq; presenti atate communicato, ac ad posteros transmissio, non solum communi mortalium bono & saluti consuluisse, sed etiam rectius de quamplurimis, hætenus pro veris habitis, sentiendi, multosq; errores corrigendi, & quae vana sunt cumq; superstitione coniuncta, quia experientia & rationis fundamentis destituuntur, explodendi, atq; in multa occulta & dubia amplius inquirendi, ut veritas omnibus, inueteratis licet opinionibus, logissimè preferenda, magis magisq; inuestigata elucescat, occasionem & ansam præbuisse. Compellendus iam mihi atq; suppliciter orandus esset Illustrissimus celeberrima recordationis Princeps, Ill. Cels. T. parens, ut quemadmodum duobus priorib. tractatibus nomen suum Illustrissimum præfigi passus est, ita & huius tertij & ultimi patrociniū suscipere non graueretur. Verum cum Deo, qui tempora & atates mutat, regna transfert atq; constituit, visum sit, ex hac caduca & mortali vita eum in caelestem illam beatorum patriam auocare, æquum videbatur, ut qui patri in Reip. administratione successisset filius, paternarum ut ditionum ita & virtutum hæres, in plenum sponsonis & patrociniū paterni ius quoq; veniret. Quo nomine sanè ego omnesq; boni se consolari & vicissim sibi gratulari merito debent, quòd extincto parente, omnis generis virtutum ornamentis inclyto, relictus tamen sit filius, qui etsi atate patre longè sit inferior, nihilominus paternas spiret virtutes, patrisq; vestigiis insistere studeat. Nam ut pater pleraq; omnes Europa prouincias & regna perlustrauit, ut prudentiam, Principibus ad gubernationem politicam rectè instituendam, apprimè necessariam, acquireret maiorem; ita filius patri in Reipublica administratione succedaneus, peregrinationum Europæarum subsidio, magnam experientiam, multiplicem rerum usum, insignemq; prudentiam sibi comparauit, & quod summè ei gloriosum est, cum potentissimis regibus ac principibus, familiaritatem & amicitiam perpetuò duraturam contraxit. Apud Christianissimum Gallia Regem, quanto in honore T. Cel. fuerit, Illustrissime Princeps Iohannes Friderice, quantoq; amore ille Cels. T. complexus sit, publicè constat. Quis etiam ignorat, quo fauore Imperator ipse potentissimus, Cel. T. sui prosequutus? Quid eius Serenissimos fratres Austria Archiduces commemorem? Quam magnificè & humaniter excepta & habita est T. Cels. Vienna, à Serenissimo Archiduce Matthia? Quam sumptuose Bruxellis à Serenissimo Archiduce Alberto tractata & donis cohonestata? Ut reliquos Serenissimos & Illustrissimos Electores ac Principes Germaniæ aliarumq; regionum vti & Italia silentio præteream, qui ad Cels. T. excipiendam, tractandamq; quàm splendidissi-

D E D I C A T O R I A .

mè, nihil fecerunt reliquum. Apud quos Ill. Cels. T. tantâ moderatione, tantâ prudentiâ, tantâ humanitate, comitate, morum, sermonis suauitate & conuersationis grauitate, magnificentiâ & decore Principe digno, vſam eſſe famâ increbuit, vt totus orbis Cels. T. laudibus perſonet, & omnes parente adhuc ſuperſtite, T. Cels. Principem Celiſſimum, omnibusq; virtutibus verè Illuſtriſſimum fore, augurarentur. Et proſectò opinionem de Cel. T. conceptam, in ipſo adminiſtrationis Reipublicæ aditu, vt alia reticcam, ampliſſimo hoc documento Cel. T. comprobauit, cùm miſſis Baſileam legatis, teſtiata eſſet, percipere ſe, ſinceram & minimè fucatam Germanicam, veterem, auitamq; beneuolentiam & amicitiam, inter illuſtriſſimam domum Wirtembergicam & Baſileenſium ciuitatem inſtaurare & conſeruare. Quæ reſ iam ante, me de T. Cels. patrono in locum Illuſtriſſimi parentis ſancta recordationis, aſciſcendo cogitantem, magis accendit, & in propoſito confirmauit: ſiquidem bonam ſpem alebam, me, qui Illuſtriſſimis & nunquam ſatis laudata memoria Principibus & Ducibus Wirtembergicis, ſuperioribus quadraginta annis medendo inſeruierim, & imprimis magna in gratia apud T. Cels. Illuſtriſſimum parentem ſeliſſimæ memoria fuerim, non in minori apud T. quog; Cels. futurum, Tuamq; Cels. labores & conatus meos, exemplo parentis beata memoria collaudaturum, tractatumq; hunc, inter tres poſtremum, quem Cels. T. humilimè dedico atque conſecro, clementer & benignè ſuſcepturam. Speroq; opus hoc vel eo nomine Cels. T. acceptius fore, quòd à me Medico ſenè offeratur, qui plus quàm hominum myriadi, cuiuſcunq; gentis conditionis & ſtatus, inter quos & quidam fuerunt Regiâ ſtirpe nati, Principesq; alij ſummi, medicinam hæcenus faciundo, innotuerim. Cui uti Cels. T. nomen Illuſtriſſimum, in ipſa ſtatim fronte præferenti lux & ſplendor acceſſurus eſt maximus, ſic & Cels. T. auguſti nominis, quamuis per ſe celeberrimi, celebritas per vniuerſum orbem eadem operâ ampliùs reſonabit. Quòd ſi opus hoc meum, de quo non ſum dubius, Cels. T. gratum fuiſſe cognouero, erit id mihi incitamento, multa adhuc quæ apud me ſunt, in humani generis bonum, expromendi & in publicum proferendi. Accipiat igitur Illuſtriſſ. Celfit. T. hoc meum quod offero debita meæ erga Illuſtriſſ. domum Wirtembergicam gratitudinis & humilis cultus pignus, præcipueq; erga Illuſtriſſ. Cels. T. obſeruantia & ſubmiſſionis, tanquam boni ominis, a Felice Medico pro Felici adminiſtratione, in ipſo ſuæ gubernationis veſtibulo ſupplex oblatum munus, cum precatione & voto, quòd à me ſeptuagenario maiore proſectum, Deus Opt. Maximus, uti Patriarcharum ratum & efficax eſſe velit: Vt nimirum Illuſtr. Cels. T. quàm diutiſſimè uiuat, & ad extremam uſque ætatem valetudine firma fruens, paciſicè ac tranquillè, cum ampliſſimo publici boni incremento, pietatis, ſtudiorum & optimarum diſciplinarum, in Eccleſiis, celeberrima Tubingenſum Academia, reliquiſq; Gymnaſiis & Scholis, immenſo augmento & proſectu, populum ſuæ fidei & proteſtioni à Deo Opt. Max. commiſſum, ſeliſſimè gubernet & regat, ac decurſo vitæ huius mortalis ſpacio, æternam felicitatem & beatitudinem conſequatur. Amen. Baſilea 1. Iulij Anno Chriſti 1608.

In Clarissimi

FELICIS PLATERI,
Archiatři & Antecessoris
Bafilienfis,

*Tertiam medicinæ practicæ partem
ex puris Iambis*

MELOS.

PLATERE nostri Apollo viue ſeculi;
PLATERE dux Medentium;
Probata quàm tua illa praxis omnibus,
Acuta quàmq; & ardua.
Nouellulo illa namque condita ordine
Nouella multa continet,
Vel explicata quæ haud ſatis prioribus,
Vel indicata nullibi.
Priore namque parte Functionibus
Seuera quæ ægritudinum
Lues reſiſtat & repugnet omnibus,
Sagace comminiſceris
Tui cerebri acumine. Hinc Doloribus
Potentiæ quid inditum
Homullulorum in ægra membra triſtium;
Truciq; quæ tyrannide
Et ima cordis, ipſa & intima oſium
Edantq; & ebibant ſimul,
In altero probè explicas volumine.
At hoc ſequentē tertio
Abominanda quæ cutis ſit arida
Et hæc, ibiq; hæditas:
Lepræ quid anſa, & anſa quæ impetiginis,
Origo quæq; mentagra.

Ea omnia, ima quæ anxiant & extima,
Ad vnguem in hiſce paginis
Fido recludis integrâ, & ſequentium
Libens reponis uſui.
O abſolutum opus tuum, PLATERE mi!
O abſolutum epos quoque!
Tuo quod inde nomini repullulans
Ad aſtra celfa ſe exſerit.
Ita ô quaterq; & amplius beatus eſ!
Solo qui ita omni eſ vtilis.
Ita ô domi celèbris & foris cluiſ!
Domiq; qui & foris tui
Vigore in aui, & hac ſenectâ in optimâ
Medere menteq; & manu.
Hygia ô decus, PLATERE nobiliſ!
Soli ô decusq; Rauraci!
Ad uſque longa ſic medendo ſecula
Diurna, & hac valentiâ
Tuiq; cordis atque corporis proba,
Valoris eſſe nullius,
Quod inde latè & inde vulgò dicitur:
Senectâ & ipſa morbus eſt.

Caspar Conradus VratiſL.
Phil.ac Med.D. &
P. L. Cæſ.

Ad

Ad Excellentiss. ac Clariss. Virum

DN. FELICEM PLATERVM

ARCHIATRVM BASIL. TERTIVM

fuae praxeos tractatum, magno cum Rei-
publ. Asclepiadeæ desiderio
evulgantem.

Non tibi Mnemosynes auratos arce colossos
Viuida post cineres Fama, PLATERE, pareat?
A latebris vter: tibi risit Apollo, putillum
Anxia te fouit sacro Hygiæ sinu.
Inde Machaonia tam laudabaris in arte,
Vix numerans vita lustra quaterna tuae:
Vt qui latratus geminat per Auerna tris fauces.
Mutiret, Cereris subq; Acheronte gener.
Iam cum fertilior maturis venit ab annis
Vsus, & excreuit cum genio ingenium,
Oenotrij, Franciæq; proculq; hinc disita tempe
In te Pæniæ obstupere manus.
Te Heroës, procures, & amica voce Dynasta
Compellant, ac quos regius auxit honos.
Scilicet vt venerum generosior herbula florem
Vertit, vbi roseam vertit Apollo rotam:
Sic quibus effictum est pectus meliore metallo,
Gloria subsequitur non remoranda comes.
Matte tuis FELIX, felix felicibus ausis,
Matte tua FELIX mente, manu, calamo.
Sed qua morbosus techna procul exulet hostis,
Dum plures methodo nobiliore doces,
Iam vitam longam esse, breuem sed diceret artem.
E Coe rediens finibus Hippocrates.
Amplius haud ventres intercutis humor aquai.
Diffilat, vel pota plus sitiuntur aquæ.
Non excrementis anima spiramina claudit,
Vlcerat aut sanies ilia profluuij.
Obscitant thalamos non tristia nubila cordis;
Non species rugis frontem inamæna premit.
Non turget, non sorditie cutis horrida squallet;
Non tunica euertit stamina ventriculus.
Quid multis? Senij quod hyems non pascitur artus:
Et tot sint Genij pondera sacra tui.
Non tibi Mnemosynes auratos arce colossos
Viuida post cineres Fama, PLATERE, pareat?

Scribebam

CASPAR DORNAVIVS Variscus.

AMPLISSIMO ATQVE EXCELLENTISSIMO
VIRO, DOMINO
D. FELICI PLATERO,
ARCHIATRO BASILIENSI,
ATQVE AMPLISS. FACULTATIS
MEDICÆ DECANO,
DOMINO PATRONO AC PRÆCE-
PTORI OBSERVANDO,

Ex nominis sui Anagrammatismo,
qui est

POLLVX ARTE FIES.

Quod Nautis Pollux, quod Castor, & Vrsa biformis,
Cum dubiis fertur puppis onusta vadis:
Hoc scriptis, PLATERE, tuis es, maxime nobis,
Qui sacra morbis fuga castra tenemus Hera.
Namque graui cum membra tremunt languentia morbo,
Nec, quibus auxiliis hic reprimatur, adest:
Ocyus hac praxis tua certum monstrat ad vnguem,
Et Labyrintham detegit arte viam.
Nempe diu hoc docuit proprio Metagrammate nomen,
O POLLVX FIES, quo sonat, ARTE tuâ!
Factus es arte tuâ Pollux; sed factus es arti:
Plena tuo sic nunc surgit ab ingenio.
Tu modo perge, tuiq; libri da cetera nobis
Pignora, quæ pote sunt te eripuisse neci.

M. Caspar Conradus VratisL. SiL.
Poëta Laur. Cæs.





ELOGIVM IN MAGNIFICAM DO-
MVM, LOCVPLETISSIMVM ET ABSOLVTISSIMVM
Microcosmum, magnis sumptibus, indefesso labore, singularique indu-
stria, ex variis vniuersi orbis partibus conquisitis rebus omnis ge-
neris selectissimis, à FELICE PLATERO Medico emi-
nentis. in ingenuorum hominum gra-
tiam extructum,

A^o IO. ALBOISIO MEDICO REGIO GALLO.

Hospes siste gradum, mundum si cernere paruum
Atque simul positum quicquid in orbe, velis.
Nam Calum hic videas & quicquid in aethere fulget,
Quicquid alit Tellus, quicquid & Aequor habet,
Omnigenas fruges, Cerealia semina, miras
Fertilis Aegyptus quasque recondit opes,
Alba liguſtra, Rosas, vt purpureumq; hyacinthum,
Narcissi flores, O Cytherea tui,
Flagrantem Nardum, violas & lilia cingit
Et quibus auricomum blanda puella caput,
Arbusta & frutices, hortos, viridaria, fructus,
Et segetes, patulis, Ambrosiamq; comis,
Mœnu datum à superis insana in pocula Circes,
Et Grajis dicta est quæ Favonœa viris;
Angelicam, Medicam Plantarum mille colores,
Innumeras facies, innumerumq; genus,
Et lapides, gemmas, interna metalla, Bitumen,
Atque Sales, imò cuncta recocta solo,
Et gummi, lachrymas, & Thura Sabaa, tenetque
Quicquid diues Arabs, India quicquid habet.
Sic licet his laribus mundi spectare theatrum,
Quaque domus fuerat, iam tibi Mundus erit.
Seu tibi Platerus πιδανός opifexq; pusilli
Orbiculi fuerit, seu simularit opus;
Hisq; adytis vastum breuib; contraxerit orbem,
Ingenua summis proximis arte Diis?
Quemq; olea Pallas, lauroq; coronat Apollo.
Nobilis & primas cui Medicina dedit,
Contulit, & cestum Venus, illecebrasq; pudica
Balthœolum & vera φίλτρον amicitiae,
Huic salium Charites, docta recinuntq; Camœna;
Huic ludit modulis Calliopeq; suis,
Hunc Hermesq; beat, linguarum artiq; magister,
Omnis, & Aoni; turba venusta chori.
Sed pietate magis fulget PLATERVS, & illum
Ars ita felicem, jore, pietasq; facit.



ALIVD ELOGIVM IN CLARISS. VIRI, MEDI-
CQ. PRÆSTANTISS. FELICIS PLATERI DOMVM,
tanto Domino dominari dignissimam, TH. B.

Hanc quisquis, hospes, aspicias domum, domum
Si te videre fortè credis, falleris.
Nam quicquid orbis continet dignum aspici.
Quæ continet domus, domum cur dixeris?
Vin' æeris, vin' aquoris, seu fluminum
Vin' orbis vniuersa quæ patent sola
Stans intueri vno in loco miracula?
Mentem hic habes, oculos habes quod expleat.
Quid amplius? quod iure mireris magis,
Huius herus & artifex domus, domum
Et nomine & reapse Felix anteit:
Homo artium omnium, omnis homo solertia,
Felicis vt domum & hominem si videris
Non iam domum, sed orbis epitomam in domo
Homineq, in vno homines bonos, industrios,
Et eruditos penè cunctos videris.

ALIVD ELOGIVM, IN EANDEM DOMVM
GEORGIVS REMVS.

Dic, Musa, Felicis, domum felicem, Heri
Quæ ciuium ades vrbe vincit omnium,
Patria decus, culta decus Germanidos,
Vixus inter eos, librum ditissima
Hac est suppellex in domo, pretiosior
Gemmis & auro, quam parauit hic Herus
Et magna, rara, singularia, vndique
Collecta, tutò quæ latent penetralibus.
Hortusq, genialis, profert germina,
Quæ decolor serit Indus, Aethiops niger.
Heic ~~οὐκ ἔστιν~~ alter, heic ~~οὐκ ἔστιν~~
Felix opes congestis istas hic Herus,
Reapse felix, abditas cui res datum
Videre, naturaq, nosse mystica.
Patriæ vir hic decus, decus Germanidos,
Quem dixerim latere naturalium
Nihil, nihil quod concauo Luna subest,
Hunc, ô Minerua, Faustitas, Felicitas,
Salusq, conseruate cum domo virum:
Felicis vt felix herus fiet domus,
Felicis vt felix heri fiet domus:
Dominetur vt domui diu dominus sue.



DE VITIIS,

LIBER I

CORPORIS VITIA

continens.



IN CORPORE illiusve partibus quæ consistunt vitia, partim morbi sunt organici, partim symptomata in affectu sensibili, partim causæ morborum; & visu, multa etiam tactu

percipiuntur. Et vel in destructione formæ illorum: Aut permutatione corporis coloris observantur: Vel in eo quod illis accrescit aliud quoddam vitium: Vel plura simul diuersisque generis vitia: Vel quod corpus illiusve partes decrescendo vitiositatem acquirunt.

Destructionis formæ seu structuræ corporis partium vitia, sub se comprehendunt morbos organicos: in numero abundante, *Corpus geminum, Partes duplicatas, triplicatas, Sextum digitum, Triorches, Dentes plures*: in numero deficiente, *Partium, Dentium, Pilorum, Vnguium defectum, Caluitiem, Alopetiam*: in magnitudine aucta, *Corporis & Partium, Vnguium, Pilorum incrementum, Orificiorum amplitudinem, Carnositatem, Mammarum molem*: in magnitudine diminuta, *Corporis & Partium paruitatem, Orificiorum angustiam, Phymosin, Mutilata, Papillas absumptas, Dentium & Vnguium breuitatem, Pilos lanuginosos, Barba defectum, Gracilitatem corporis & membrorum, Mammæ flaccidas*: in figura indecenti *Membra male figurata, Pilos crispas, Vngues inæquales*: in diuisione partium, *Labij superioris diuisionem, Dentium cariem & fracturam, Vnguium erosionem, Scabritiem, fissuras, Pilorum fissuras, Furfures, Squamas manuum*: in connexu partium dissoluto, *Gingivarum separationem a dentibus*: in

concretionem, *Orificiorum & Partium concretionem*: in coniunctione partium, *Pilos intricatos*: In situs peruersione, *Varos, Gibbum, Oculorum prominentiam, Dentium mobilitatem, prominentiam, Vnguium mobilitatem*. Quæ omnia simul explicabimus in **DEFORMATIONE**,
CAP. I.

Pag. 1

Permutationis coloris vitia sub se comprehendunt *Cachexiam, Icterum, Ruborem, Pallorem, Nigredinem, Commaculationes, Colorationes, Maculas omnis generis*: atque inter eas, *Lentigines, Guttam rosaceam, Ampetiginem, Vitiliginem, Sugillata, Erysipelas, Exanthemata, Ecthymata, Maculas in febribus & luibus, Oculorum colores diuersos & maculas, Vnguium maculas, Pilos diuersimodè coloratos, Canitiem*: Quæ simul tractabuntur in **DISCOLORATIONE**,
CAP. II.

pag. 56

Accrescendo corpori & ab eo protuberando quæ se offerunt vitia, sub se continent, *Leucophegmiam, Inflammationem corporis, Ascytem, Tympanitem, Ventris tumorem in pregnantibus, in Mola, in Menstruis retentis, Sarcinata, Carnem luxuriantem, Sarcocelem, Polypum, Pudendi carnositatem, Condyloma, Gingivarum carnem luxuriantem, Epulin, Encanthin, Oedema, Tumorem edematofum, Phisodes, tumores flatulentos, Pedum inruescentiam, Hydrocelem, Pneumatocelen, Scroli inflationem, Inguinis aquosi tumorem, Hydrocephalon, Hydromphalon, Bronchocelen, Phlyctenas, Hydroas, Mamillarum tumorem, Varices, Cirsocelen, Aneurisma, Gravidulas, Scrophulas, Strumas, Bubones, Parotim, Testium duritiem, Scirrhus externos & internos Hepatis, Lienis, Vteri, Steatoma, Atheroma, Melicerim, Ranam sub lingua, Testudinem, Ganglion,*

Talpam in capite, Nodos, in osibus, articulis, Callos osium, vnguium, cutis, Cicatrices, Foueas, Umbilici prominentiam, Verrucas, Clauum, Varos, Hordeolum, Grandinem, in palpebris, Cele & Hernias; de quibus omnibus agemus simul in EXTURBANTIA. CAP. III. pag. 166.

Quæ pluribus diuersisque vitiis corpori accrescentibus se offert corporis vitiositas, sub se habet luem *Elephantiam, Veneream,*

Stomatacen; Quas describemus simul in DE-FOEDATIONE. CAP. IV. pag. 344.

Decrescendo quæ se in corpore vitia manifestant, sub se continent, *Marcorem, Tabem, Phtisim, Marasum, Colliquationem corporis, Atrophiam generalem & particularem membrorum & oculi.* Quæ simul explicabuntur in CONSUMPTIONE.

CAP. V. p. 434.



DE



DE DEFORMATIONE.

CAPVT I.

Genera.



FORMATIONE hic significamus partium corporis formæ naturalis & conuenientis peruerſionē ſeu deſtructionem; quæ fit, cum partes corporis quantitate in numero vel magnitudine, vel qualitate in figura indecenti peccant, morbisq; hiſce organicis eâ ratione deformes redduntur. Nam quod colorem alienum attinet, de eo in diſcoloratione agemus. Sin verò alio modo partes corporis extuberent, aut aliquid illis adnaſcatur, vel ſi conſumantur, in extuberantia & conſumptione partium corporis, peculiaribus capitibus ea deſcribentur. Quod ſi intrinſecus hæc vitia deprehendantur, ſicut de gemino poro cholidochi inuento ſcribit Galenus, alij de vno tantum rene, de abſentia hepatis vel lienis, vel ſi alia eiufmodi in numero, vti & magnitudine ac figurâ peccantia vitia, quæ ab ortu vel à morbis, quibus partes ſæpe abſumuntur vel imminuuntur, proceſſerunt, in corpore lateant, cum non conſpiciantur, non in hiſce deformationibus, ſed actionum quibus incommodant, læſionibus, rectius deſcribuntur. Hiſce functionibus, licet & externæ hæ deformationes plerumque aliquo modo obſint, quia tamen hæ earum deformitates clariùs quàm functionum læſiones oculis patent, de illis potius hoc capite agemus.

*Corpus
gemini.*

Número abundante variæ ſunt in corpore deformationes, ab ortu ſerè prodeuntes, quæ ſi magnæ ſint, monſtroſæ vocantur. Veluti cum corpora gemina certis in locis connata videntur: qualia paſſim depicta deſcriptaque inueniuntur, egoque ipſe virum meis oculis vidi, qui alium eiufdem magni-

tudinis integrum, & nullis corporis membris deſtitutum, ſolo dempto capite, quo peſtori ipſius veluti inſerto, & collotenus innato, propendebat, incolumem ad ætatem multam ab ortu geſtarat; cui omnino ſimilem, ante annos complures in Heluetia à ſe viſum, Stumpfius in ſua memorat historia Heluetica.

Membris quoque duplicibus, vt Capitibus, Brachiis, Pedibus, cæterisque Minoribus partibus geminis pronatos aliquos fuiſſe, hiſtoriæ teſtantur. Frequens eſt quod quidam digitorum numero naturali maiore inueniuntur, ita vt ſex in vna naſcantur manu, pollice ſerè duplici, altero minore, maiori qui inualidus exiſtit, adnato. Alias in vtraque manu ſex, vti & in vno pede, in altero ſeptem deprehendimus. Teſticulos tres, in vna burſa, aliquos geſtaſſe, quos Triorches vocarunt, perhibent; quod quidem fieri poſſe, cum & in aliis partibus idem contingat, veriſimile videtur. Veruntamen vt hoc quidem aſſeuerarent, impoſuit ipſis, quod vaſis feminariis durities quædam adnata inſenſilis, vel eorundem dilatatio permanens, teſtem repræſentans accreuerit, ſicut ipſemet, contactu cum explorarem, in quibusdam deprehendi.

Dentes numerum conſuetum non ſemper ſeruant, aliàs enim plures, aliàs pauciores comparent. Aliquando & duplex ordo ſeu phalanx dentium deprehenſa fuit, quod tamen non adeò deformat, aut incommodat, vti alia illorum vitia, quæ in reliquis turpitudinibus explicantur.

Pili cum ob infinitum ipſorum numerum, & quorundam obſcuritatem numerari nequeant, non aliter in numero aucto peccare obſeruantur, quàm ſi in locis, inſolitè præſertim, quibusdam abundant, quod tamen vitium ad magnitudinem auctam, vbi & de-

*Partes
duplicata,
triplicata.*

*Digitus
ſextus.*

Triorches.

*Dentium
numerus
auctus.*

scribetur, potius pertinet, cum pili non tunc de nouo nascantur, sed qui prius poris infixi (cum nullus sit porus in quo non pilus hæreat) & obscuri ac latentes erant, tunc incremento manifestentur.

Partiū defectus. In numero deficiente frequentiora & plura se offerunt deformationum vitia. Qualia sunt cum organa quædam ab ortu defunt: Veluti in monstris; cuiusmodi vidimus, brachio utroque carentia, quorum loco pedibus scribebant, aliaq; obibant munia. Quod & in aliis partibus interdum, vt sine illis nascantur, obseruatur. Quæ vti rara sunt, sic frequentius numerus partium, non ab ortu, sed postea casu aliquo imminuitur: Vt quando partes integræ amputantur, quod prominentioribus maxime accidit, veluti manibus, pedibus, ipforumve digitis, naso, vel auribus; Vel cum oculi eruntur, caruncula in oculo perditur, quod vitium Rhyas appellatur. Quod & referre possumus testium castrationem, quæ etsi, cum non in parte apparente fiat, deformitatem per se minime adferat, tamen quia ambobus testibus exsectis, alia accedunt vitia, maxime si in pubertatis adhuc annis hoc fiat, quæ eos Eunuchos esse produnt, ut vox effæminata, barbæ carentia, hoc pacto deformitatem in ipsis parit.

Dentium defectus. Dentes numero frequentius deficiunt, idq; non solum in senili ætate, ad quam vix aliquis nullo amisso dente peruenit, sed & citra eam. Multis incisori dentis sponte excidunt, in quibus postea spacium illud, quod ore aperto videtur, turpe esse censetur. Illud tamen denticidium in infantibus, cum mox alij succrescant, non ita pro vitio habetur. Frequentissimè dentibus molaribus, ob vitium aliquod erutis, numerus imminuitur.

Vnguium defectus. Vngues integros in pedibus vel manibus, sponte abscessisse obseruauimus, aliisq; interdum nullis renatis; qui alioquin difficulter vi penitus auferri queunt.

Pilorum defectus. Pilorum defectus frequens admodum occurrit, in Capite præsertim, vbi pili prolixiores cum sint, si deficiant, maiorem adferunt deformationem: Vti in Caluitie dicta, in qua in vertice & syncipite utrinque, plus

minusve cutis nuda & glabra existit: iam senescentibus quibusdam superuenire solitum, nonnunquam & ante senium in aliis contingens vitium.

Defluunt & capilli capitis in Alopecia appellata, in morbis quibusdam diuturnis vel acutis, ipso declinationibus, inæqualiter hinc inde deficientibus pilis, areisq; nudis illic apparentibus: Vel etiam æqualiter, præcipue circa occiput & tempora, vt in Alopecia quæ in Lue venerea occurrit. Vel cum ab occipitio duæ areæ pilis destitutæ per tempora utrinque ad frontem deductæ apparent, in Ophiasis dicta.

In Barba hoc idem accidit, vt pili inordinatè excidunt, raramque barbam efficiant, vel omnino ablati nudum mentum reddat. Fiuntque hæc ferè quando in capillis hoc idem accidit.

Quod & superciliis palpebrisque euenire potest, vel vnà cum reliquorum defluuiio, vel etiam præcipue in hisce locis in elephantiasi. In reliquis quoque pilosis corporis sedibus idem contingit interdum.

In magnitudine aucta quæ accidit deformatio, duo potissimum sub se comprehendit genera, quorum primum est partium supra terminum præscriptum incrementum, quod originale ferè existit. Illudque vitium corpori vniuerso quandoque accidit, non quando præter regionis communem hominum staturam, hæc cæteris nonnihil maior in quibusdam inuenitur, cum si proportionata adhuc sit, & in actionibus edendis robur potius quam impedimentum præstet, nondum præternaturalis censeatur, sed cum ea vel in longitudine aut amplitudine adeo modum excedit, vt iam grauamen potius quam adiumentum aliquod ad functiones obeundas corpori adferat, & deformatione potius, quam elegantiam conciliet: sicuti eiusmodi monstra aliquando se offerunt, atque ego puellam in ditione Basiliensi Dürnen cognoui vidiq; quæ cum annum vix quintum ætatis attigisset, corporis vastitate mulierem iam adultam, eamque grandem & obæsam adæquaret.

In Partibus hoc quoq; contingit, vt magnitudine ceteras superantes, deformes nonnunquam

Alopecia.

Ophiasis.

Incrementum totius corporis.

Partium immodica magnitudo.

gnitudo,
Vitiū
rificiorū
in illis ni-
mia am-
plitudo.

nunquam, & vt minus commodè functiones edant, reddantur. Sic aliqui Capite nimis vasto procreantur, inter quos & satuos aliquos esse obseruamus. Alij alia membra grandiora, & quæ cæteris proportionem minimè respondent, vt Collum, Pedes, Dignos obtinent, vel Nasum vastum, Aures patulas, Oculos magnos, Dentes nimium largos vel longos, maximè si vnus in amissi oppositi dentis vacuum spacium excreseat ultra reliquorum longitudinem. Huc & pertinent orificia quædam nimis ampla, vt Os latum, Nares diductæ, aliæve occultiora, admodum ampliata, quæ vulgo deformia esse censentur, cum tamen nondum vitiosa sint, donec hæc deformitas etiam incommodet. Vti & Linguae moles tanta, vt blæsi infiant. Vel Colis tanta magnitudo, quæ ad actum obeundum impotentes reddat. Huc & referri possunt, Vngues adeo crassi, vt rerum minutarum apprehensionem prohibeant. Præter quod vitium, aliud etiam si longius excrecant in illis existit, quod tamen cum amputando possit emendari, negligentiae potius quam naturæ vitio adscribendum. Quod idem & de pilis, si prolixiores incuriā fiant, cum absecari possint, est iudicium. Licet ipsorum hæc aucta magnitudo deformis tunc censeatur, quando in locis insolitis excrecant, vt si frontem maiori ex parte obducant, id deforme esse, cum frontem amplam & depilem, pulchritudini addere aliquid censeant vulgò. Imprimis verò & turpe & horredum apparet, si mulier barbata sit, in quibus locis etsi pili abradantur, remanentibus tamen pilorum radicibus, moxque renascentibus, deformitas hæc se nihilominus prodit & manifestat.

Interdum & pilus vnus aut alter, vel pauci saltem, in verruca alibi excrecentes, deformant, maximè in facie, si illic vbi pars nuda aliàs esse deberet, hoc se patefaciat, vel mulieri, vt sæpè fit in mento ac si barbæ esset portio, eueniat.

Carnosi-
tas ni-
mia.

Alterum deformitatis in adaucta magnitudine genus, sub se Carnositatem & Pinguitudinem nimiam comprehendit, quæ sic dicitur, quando carnis vel pinguedinis mole, corpus vel partes aliquæ illius obrute,

nimum auctæ, non solum pulchræ minus esse censentur, sed & grauatae, pigrae, vel aliter impeditæ ad munera obeunda, existunt. Quo pacto vniuersum Corpus sæpè adeo ætate crescente pinguescit & crassescit, vt non solum indecorum sit, sed & tarditatem segnitiei quæ, ad ritè aliquid obeundum adferat, & ad onus hoc gestandum pigros efficiat, qui cum validius se exercere volunt, lassitudinem subito & spirandi difficultatem sentiunt. Vnde otiosi & desidiosi somnolentique plerumque existunt. Et si iuuenibus hoc accadat, vitam longæuam, vt Hipp. carnosos minus viuidos quam graciles esse testatur, vix dum attingunt.

Hoc idem certis in locis accidere potest, vt deformitas quædam, nonnunquam & impedimentum quoddam inde exsurgat. Vt cum venter seu abdomen tantopere mole pinguedinis infarctum, supra modum prominere & propendet, in ventrosis hominibus. Vel Mammæ supra decentem extuberantiam, quæ pulchra habetur, nimium augeantur, vel adeo turgidæ fiunt, vt in immensum sæpe excrecentes, totum pectus occupent, vteriusque nonnunquam, nisi constrictæ retineantur, exspatiantur, pondereque respirationem impeditam nonnihil reddant, idque in mulieribus Mammosis ob id dictis. Quod & referri potest, quando & instar mammarum, moles cum eleuatis similiter papillis in pectore virorum prominet, quod alioquin pinguibus euenit. Vel quod magis præternaturale, si mamillæ viris etiam, & non solum papillæ nudæ crescant, sicut in quibusdam accidisse vidimus. Quod malas seu genas, protuberantiores & furas in pedibus summè crassissimas attinet, alij deforme quoque, alij pulchrū potius esse iudicant.

Mamma-
rum ma-
les.

Huc & Sarcomata ea referre possumus, in quibus non aliena caro corpori accrescit, sed ipsa caro excrecit nimium, vt Gingiuarum caro luxurians, Carunculæ in oculo excrecentia nimia, quod vitium Encanthida vocant. Verum quia cum alijs sarcomatum speciebus similitudinem quandam habent, in extuberantijs describuntur.

In magnitudine diminuta deformatio eueniens, similiter duo constituit, quæ adau-

Parui-
tas corporis
in parte.

*tium, il-
luc q; a-
rificiorū
nimia
angu-
stia.* **Ææ opponuntur, genera.** Quorum primum
toti corpori ab ortu euenit, vt pigmæorum
instar parui toto vitæ curriculo maneant, &
sic tanquam insolentes & admirandi homi-
nes in aulis principum alantur, aliàs ob cor-
poris debilitatem, ad opera validiora inepti.
Idem in partibus quandoq; spectatur, vt Ca-
put nimis paruum, sicuti quandoq; in stultis
tale videtur: Pectus angustum & constrictū,
quo anhelosi redduntur, aliæque partes ab
origine non decentem magnitudinem ean-
demque cum cæteris proportionem nactæ,
si hæc deformationem aliquam aut impedi-
mentum adferant.

*Phymo-
sis.* Huc & orificiorum quorundā nimia per-
tinet angustia. Vt Vteri sinus, Virgæ cutis in
Phymosi dicta præputio nimis arcto, adeo vt
glans detegi nequeat, actionibus (vt in illis
ostensum) incommodantes.

*Partes
mutila-
te.* Frequentius magnitudo partium immi-
nuitur, portione aliquā ablata, mutilatisque
ex parte membris, quod eò maiorem defor-
mationem adfert, quò pars conspectui ma-
gis exposita mutila existit; vt si in naso hoc
accidat & auribus, eoque maius in actione
detrimentum, si in parte magis necessaria
hoc fiat, vt in digitis, cæterisque partibus,
quas penitus abscetas, maius adhuc nocu-
mētum in numero deficiente adferre, osten-
dimus. Huc & pertinet Papillarum in fœ-
minarum mamillis diminutio, tanta sæpè vt
nihil de illis amplius ferè restet, quod non
solum turpe, sed & in illis quæ lactare debe-
bant, cum infans tunc lac sugere nequeat,
lactationis defectum, sicuti in ea functione
læsa illius mentionem fecimus, parit.

*Gingivæ
consum-
pta.* Gingivarum quoq; consumptio sub hoc
genere comprehenditur, nudos circa radi-
ces dentes relinquens, atque vt minùs fir-
mi sint faciliusque excidant, occasionem
præbens.

*Dentium
atq; un-
guis bre-
uitas.* Dentes si breuiores cæteris eiusdem aciei
occurrant, huc quoque referre possumus, at-
que Ungues, si & illi breuiores, quàm ipsa
caro illis substrata existat, cum tunc res mi-
nores apprehendere commodè nequeant.

*Pili la-
uuginosi.* Pili iidem, si adeo tenues & breues red-
dantur, vt quandoque cum post defluxum
recrescunt, accidit, vt instar rei situ & muco

obductæ, lanuginem potius quàm pilos ex-
primant. Vel si illis in locis vbi crassius & *Barba
tardius
emascens.*
longiùs excrescere destinato tempore debe-
bant, vt in mento, ad productionem barbæ
in viris, tardiùs erumpant, quod quia diu-
tiùs quàm par erat, pueri esse videntur, in-
decorum aliquo pacto esse censetur. Maxi-
mè verò si ob castrationem vtriusque testis, *Barba
carentia
in Eu-
nuchis.*
antequam barba crescat, ea non prodeat am-
plius, & imberbes maneant, quod & in ipsis,
cum eos euitatos esse prodat, indecens exi-
stit, & deformitatem in senescentibus, fa-
cie ipsorum rugas ducente; & vt ait Comi-
cus, senem mulierem referente, maiorem
adfert.

Secundum genus magnitudinis immi-
nutæ est Gracilitas, quæ carnositati & pin-
guitudini opponitur: spectaturq; hæc in iis-
dem partibus, si minùs quàm decebat, car-
ne pinguedinèue oppletæ. graciles admo-
dum sint. Veluti in toto corpore, interdum
euenit, non quando illud decrescit & consu-
mitur, de quo in consumptione illius age-
mus, nec enim cum naturâ gracilior, nulla
tamen incommoda inde patitur, siquidem
vti ex Hippocrate ostendimus, qui graciles
sunt, diutiùs quàm qui carnosi, viuunt; sed
si illud adeo sit macre, vt non solum defor-
mem illius aspectum præbeat, sed & minùs
vegetum, ac imbecillius reddatur: Maximè
si in cruribus & brachiis aridis atque graci-
libus, in genis collapsis, scapulis prominen-
tibus, ventre depresso, hoc fiat. Quò & mam-
marum refertur gracilitas quæ deformis est:
non quando parue sunt, quod pulcrum esse
censetur, sed quando molliores, vel etiam
flaccidæ & pendulæ existunt, quod pro in-
decoro, in iunioribus præsertim puellis &
mulieribus habetur.

In figura partium indecenti deformatio
facta, plura sub se cōprehendit genera. Quo-
rum primum est, si aliis modis quàm iam o-
stensum, in numero & magnitudine illa vi-
tietur, maximeque ab inæqualitate alia, quæ
in illis diuersimodè se offert, ab ortu plerun-
que profecta, aliàs etiam casu adueniens.
Sicuti in capite, si Caput nimis acutum, a-
liòve modo malè formatum existat. Frons
item rugosa; Nasus sumus, curuus; Os in-
tortum,

*Gracili-
tas cor-
poris.*

*Membro-
rum gra-
cilitas.*

*Māma
molles,
flaccida
& pen-
dula.*

*Membro-
rum figura
indecentis.*

9
tortum, vti & labia; & in reliquis partibus, si illæ curuæ, aliòve modo inæquales sint. Quæ omnia ad amussim describere, superfluum; nec parui interim laboris esset. Huc tamen & pilorum illa intorsio, etiam si ad ornatum faciat, referri potest: quando nimium crispi, vt in Æthiopibus sunt, cum alioquin leuiter crispi, pro pulchris habeantur. Et si omninò recti sint, minùs decentes esse à quibusdam iudicentur. Præcipuè verò & vngues, si gibbosi & rugosi sint, deformes existunt.

Secundum genus figuræ partium vitiosæ est, si continuitas illarum, quâ vnitas eas esse oportebat, diuisa sit aut soluta, vti vocant, vel connexus quo iunctæ erant, dissoluatur. Quæ continui solutio quando in vulneribus & vlceribus fit, cum dolor aliæque functionum læsiones huic præualeant, in illis iam descripta fuit. Quòd si tamen hisce sanatis, diuisio nihilominus aliqua remanserit, quæ partis figuram decentem vitiat, illa huc potius est referenda.

Vti & illa, quæ citra læsionem ab ortu contingit, quam in locis certis diuersimodè se offerentem, infantes in lucem secum adferunt. Inter quas partium ab inuicem separationes, illos etiam labio superiore diuiso aliquoties nasci contingit, quòd vitium peculiari nomine nostri *Nasenscharten* à lepore, cuius labium quoque naturaliter hiare videtur, ac si scissum esset, vocant, admodum os, cum dentes per hanc fissuram pateant, deformans.

Ad hæc partium diuisiones figuram illarum destruentes, etiam illa quæ frequentissima est, pertinet, quâ ob cariosorum & fracturorum dentium inæqualitatem, os adeò defœdatur, vt inde tota persona minùs pulcra communiter aestimetur, atque ob id fœminæ minùs amentur. Quòd idè Poëta inter remedia amoris proponit, inquiens: Si malè dentata est, fac sæpè vt rideat ipsa. Eam deformitatem dentium auget nigredo, vel exigua tantum dentium fragmenta relicta.

Non paruam deformationem quoq; adferunt, vnguium in digitis solutæ continuitatis vitia, eoq; magis, si in manibus, cum

semper oculis pateant, hæc existant, pedibusque nudis ea pateant, eò deteriora, si renascentibus vnguibus, hæc tamen inhæreant, nec cum vnguibus auferantur, quando crescendo procedunt, & longius prominent, atque amputantur. Inter quæ frequentior est, erosio & scabrities vnguium, perseverans in quibusdam deformitas, eoq; maior si simul illi crassescant, liueant vel etiam nigricent. Huc & fissuræ vnguium pertinent, si in longum fissi sint; Vel quòd frequentius fit, si per transversum diuisi, & veluti in duas laminas dissecti sint. E quibus vitiis aliqua morborum quorundam, vt pforæ, elephantiasis, luis venereæ sunt symptomata, cæterisque (vti in illis ostensum) copulantur, aliàs verò etià peculiaria sunt quibusdam vitia illos dedecorantia.

Pilorum etiam diuisiones seu fissuræ in barba & capillis, minùs decoræ esse videntur; quia inæqualitatem quandam & implicationem in ipsis inducunt, si præsertim in pluribus, vti sæpè solet, hoc fiat.

Hisce quoque deformationibus illæ adscribuntur, quæ à cuticula à vera cute abscedente prodeunt, & eò potius quòd deformant, quàm dolore aut aliâ noxâ, vitiosa habentur, sicuti horum quoque in cutis excoaricatione seu intertrigene meminimus: Vt sunt Furfures appellati, cum furfurum instar à capitis pilosa fede, dum caput vnguibus vel pectine fricatur, decidant. Quòd vitium si consuetum quibusdam sit, furfurèsque statim ex leui causa, copiosè instar niuis, in subiectas vestes delabantur, pro deformi habetur. Magisque adhuc si ex barba in viris, vel ex superciliis per frictionem similiter decidant; Vel aliis depilibus in locis, à cute furfurum vel squamarum modo abradantur.

Quò & pertinet peculiare vitium, quòd Galli Pelatellam vocant, cum in vola manuum cutis inæqualiter scissa, & squàmosa, à reliqua abscedens, ab illis qui hoc vicio laborant, vnguibus continuo, etsi nullus adsit pruritus, citra dolorem auellitur, huic loco turpitudinem quoq; adferens potius quàm aliud impedimentum.

Quæ in connexu partium dissoluto oc-

paratio
à denti-
bus.

currunt vitia, si pereapars non solum separatur, sed integra à corpore abscedat, ad numerum deficientem pertinent: si verò corpori adhuc hæreat, huc referuntur, vti frequens hoc vitium, quo Gingivæ à dentibus separatae, iisdem non amplius adnectuntur, sed nudos circa radices dentes relinquant.

Cōtinua-
tio seu cō-
cretio ori-
ficiorum
seu par-
tium qua
distat
esse de-
bebant.

Tertium genus quo figura partium deformatur, illud est, quando partes quæ ab invicem separatae esse debebant, continuantur & coalescunt, sicuti ab ortu, tum ab aliis etiam læsionibus quandoque evenit, idque variis modis: E quibus deformationes functiones simul lædentes, magisque eo nomine incommodantes, in illis explicantur; Cuiusmodi sunt orificiorum quorundam occlusiones, veluti Narium, Labiorum, Palmarum, Podicis, Vteri cervicis, Præputij foraminis, quando hæc connata vel concretæ, respirationi, comestioni, visioni, egestioni, generationi obfunt: Sicuti etiam aliarum partium continuatio actioni impedimentum adferens. Quod & refertur, partium quarundam conglutinatio, non quidem admodum nocens, turpes tamen apparent: Vt si digiti pedum duo vel plures connati sint, quod ab ortu quibusdam procedit, & minus, quàm in manibus officit.

Coniun-
ctio par-
tium inde-
sens, fla-
bilis.

Ad hanc partium præternaturalem continuatione etiam referri potest illa, quæ partes mutuo coniunguntur, sicque coniunctæ permanent, vt disiungi non possint: Vt si ex spasmò, os oclusum & constrictum maneat; quod actionem illius cum magis impediatur vel tollatur, quàm deformat, in illarum læsionibus describitur. Huc tamen maxime pertinet, pilorum mutuo iunctorum, adeo arcta intricatio atque implicatio, vt nullo pacto amplius discerni aut extricari possint. Quæ complicatio cum quibusdam accidit, certis in locis, Tricæ dictæ efformantur, quas, quia sceminarum capillos invicem arte contextos, sua intricatione confusa simili modo è capite vel barba dependentes præsentant, Schreffer nostri vocant. Et quia à nocturno spectro, capillos fugente, sicque conglutinante, hoc proficisci supersticiosè credunt, illi quoque incubi nomine, quem

Schrette
sui Schreffer.

à spiritu incumbente, simili modo procedere existimant, iuncto, Schrefferin Schreffer appellat.

Quartum genus figuram dedecorans est, si situs partium pervertatur aut transmutetur, parte aliquà in alium locum inclinante vel translata, vnde concinna figura membri destruitur. Qualis est quæ in pedibus accidit cum intrò vel foràs in Varis, ob id appellatis contorquentur. Atque illa quæ in digitis pedum frequenter se offert, calceorum angustia continuo compressis, adeo vt successu temporis ad latera nimium torqueantur, vel etiam reflectantur eoque vt pedi incumbant. Vti etiam est prominentia seu extuberantia, cum membrorum abbreviatione vel elongatione & curvitate in Luxationibus & Fracturis ossium hinc inde in diuersis corporis sedibus occurrens. Quæ noxæ figuram partis præter impedimenta alia in functionum læsionibus exposita, aliquando admodum viciant. Et ex illis imprimis Gibbus, non solum dorsi & pectoris figuram destruens, sed & totum corpus breue, curuum & inconcinnum reddens, hominem admodum deformat.

Gibbus.

Huc & referri posset intestinorum in scrotum prolapsus aliave loca, loca illa quoque deformans. Verum cum tumor & prolapsus eorum potius tunc quàm figuræ vitium consideretur, in extuberantibus tumoribus & procidentibus, in excretis describetur.

Sed & hanc deformationem à situs partium peruersione profectam, pertinet Oculorum prominentia, sic dicta, quando oculi ex sua sede extrorsum plus solito prominent, circa tamen læsionem, sed cum deformatione quadam, aliàs ab ortu, aliàs postea eveniens. Dentium itidem, anteriorum præcipue mobilitas huc pertinet, cum vacillantes in hanc illamque sedem facile sponte vel commoti, moventur; sicuti totam anteriorem dentium seriem extrorsum inflectere aliquos potuisse, observauimus. Dein & eorundem dentium in exteriora prominentia stabilis, deformitatem quoque in labiis diductis, nonnunquam & conuenientibus, si procul emineant, quod in carnibus, quia rarum pulchrum, apparentem parit: Vt quoque

Oculorum
promi-
nentia.

Dentium
mobili-
tas.

Dentium
promi-
nentia.

13 quoque si transuersum vel obliquum, non rectum situm dentes habeant.

Vngues
mobili-
tas. Postremò & vngues, situ interdum permutato, huc illucve inclinantes, mobilesque facti diu sæpè antequam decidant sic hærentes, deformationem pariunt.

Causa.

Omnium deformationum enarratarum causæ proximæ dependent vel à causis infitis, vel aduentitiis.

Ab infitis causis deformationes illæ originem trahunt, quas ab ortu corpori & partibus quibusdam contingere, in generibus ostendimus, & vel in numero magnitudinè redundante, vel deficiente, vel figura indecenti, cum partes non rectè formatae vel diuisæ, vel continuatæ aut cōcretæ sunt, consistunt. Idque potissimum à semine parentum, cum ex eo partes omnes formantur, pro cuius ratione, hæ quoque formam accipiunt, & liberi nunc patri, nunc matri, vti & sexu similes redduntur, & si illud labæ aliqua aspersum, eandem inde quoque concipiunt, non solum membra illa externa cute & carne constantia, sed & pili ac vngues, cum & hæ corporis partes sint cartilagineæ, sicuti in Anatome nostra ostendimus, nec ab extremetis, vti de pilis communiter refertur, sed semine, in prima etiam foetus formatione, quem admodum in embryonibus videre licet, suum nanciscantur ortum.

Cæterum quo pacto semē paternum maternumve, vitia hæc in sobolem propaget, ardua est quæstio, nec aliter eam definire licet, nisi hoc aliquando à seminis indispotione quadam indecenti fieri, quam, cum ab vniuersi corporis partibus promanare soleat, à vitiosis partibus acquirit, eamque pro ut hæ figurâ, magnitudine vel numero peccant, inde contractam in foetus formatione iisdem partibus imprimit, & similia vel ex parte, vel omninò vitia in illis producit. Quod tamen non semper euenit, vt numero vel magnitudine excedentibus deficientibusque partibus, idem in foetu contingat, cum sæpius liberi eorum quibus membra ab ortu deficiunt, vel amputata mutilatæ

sunt, eadem membra integra & absoluta, nisi quod in quibusdam inualidiora sint, consequantur. In pilis tamen capitis & barbæ illud maximè accidere videmus, quod plures paucioresve crassiores, tenuioresve, hocque illòve modo formati & colorati sint, vti in parentibus, sic & in liberis, sicuti in coloris vitiis dicitur. Id autem feminis quoque causâ accidere, & hæreditariam esse eiusmodi pilorum constitutionem, sub qua & caluities comprehenditur, satis demonstrat, quodd pili nigri & crispi Æthiopibus hæreditarij existant. Atque in hac quidem gente vt & in aliis, si nascantur pili crispi, semen quoque, sed aliter quàm in aliis pilis formandis causam præbet, eo nimirum modo, quod pororum in cute, obliquitatem producens, pilos non rectè, sed obliquè per eos emergentes curuari, atque sic crispòs euadere sit necesse. Vti & quodd complicati tricas dictas constituent, pororū formatione semē quoque efficit, quando poros plures coniunctos & obliquos in cutis aliqua sede format, ex quibus deinde pili copiosiores angustiore in loco positi, & propter curuitatem inuicem intricat, nascuntur. Quæ sic in crispis pilis, in capilliosa capitis cute præsertim molitur, vt mox à natiuitate tales enascantur. In tricis verò tardius hoc, in capillis, non nisi spacio temporis, & in barba cum illa crescit, & in vtrisque cum pili crassescant admodumque prolongantur, efficit.

Ab vbertate feminis quoque proficisci potest, vt plures maiorésve quàm par erat, partes nascantur, vel ab illius penuria, vt contrarium eueniat, quod cum in omnibus partibus possit accidere, vti & in dentibus, sic etiam in pilis vt vberiores vel tenuiores crescant, inde procedere potest.

Ab alia quoque feminis transmutatione permissione, foetus figuram à naturali alienam adipisci potest. Vti & ex commistione geminorum seminum conceptorum, mutuaque illorum in certis locis concretione (nisi vndique peculiaribus inuolucris conclusa à se inuicem discernantur) prouenire potest, vt duo foetus, illis in sedibus conuati, aut etiam vnus alteri parte aliqua inclusus, prodeant.

Quæ feminis permutatio committitur, uti à variis causis, sic frequenter etiam ab impressione quadam oritur, quam conceptus tempore, vel dum grauida est mater, ex terrore vel alio affectu, aut etiam profunda meditatione aut imaginatione passa est. Cuiusmodi & illa, quæ ex desiderio cibi alicuius, dum grauida mulier picâ laborans, aliquid deprauatè appetit, concepta, in causa est, ut fœtus vitia in numero vel magnitudine aut figura peccantia, contrahat. Quo pacto aliquando partes veluti nouas, corporis alias partes exprimentes; aut fructum aliudve referentes, corpori ab ortu accreta; atque inter reliqua, pilos murium pilis con-similes, in femore enatos, sobolem, cum mater grauida, murem abigens, hunc locum manu percussisset, in lucem protulisse & deinceps retinuisse, vidimus: uti & alia varia & monstrosa hoc pacto contigisse constat. Quæ uti ab imaginatione variis modis accidere possunt, sic ab eadem & illud profici-scitur, quodd liberii parentibus minùs aliquando similes, immò plurimùm sæpè ab illorum forma discrepent, cum parentes aliis intenti, alias formas dum conceptio fit, vel mulier vterum gestat, mente concipiant. Quæ dissimilitudo cum animus hominis pluribus longè magis quàm cæterorum animalium sit intentus, atque inquietus, qui in varias meditationes facillè voluitur, frequentiùs in homine quàm in animantibus accidit, quæ cum sensum tantum in ea quæ præ oculis sunt, in congressu conuertant, sibi plerunquè & formâ & colore, uti in discoloratione ostendemus, similem sobolem procreant.

Sanguis mater-nus, causa quorundam viti-orum, ab ortu, in Magni-tudine aucta vel immi-nuta, vel Figura indecen-ti acci-dentiu.

A sanguine materno, cum partes eo dum in vtero fœtus conclusus adhuc est, alatur augeaturque, vitia quoque aliqua originalia suboriri possunt, non quæ in numero partium aucto vel imminuto, cum ex eo nulla pars, sed omnis à semine procreetur, sed in magnitudine præsertim excedente vel deficiente, vel etiam figura indecenti se offerunt. Quæ vitia à sanguinis materni copia vel paucitate, aliavè illius mutatione aut permissione, sicuti in internis causis explicabitur, dependent.

Ab aduentitiis causis varia deformationum exsurgunt genera: è quibus causis si læsio aliqua à vulnere profecta continuitatem concinnam partium destruat, figuramque eo modo vitiet, fiatque illud in parte sensibili, quia dolorem tunc simul infert, in doloribus de ea actum fuit. Uti & si ab alio impetu extrinsecus inueniente, partesque nimio impetu dislocante, vel etiam disrumpente, figura indecens similiter prodeat, cum partis motus abolitio tunc quoque accedat, in immobilitate, ubi de luxationib. & fracturis egimus, hæc tractata fuerunt.

Aliæ verò deformationes partium huc pertinentes, quæ in numero, magnitudine vel figura peccant, variis à causis procedunt, illisque vel externis vel internis.

Ab externis causis partium vitia deformationes producentia, diuersimodè proueniunt. Uti quando inflicto vulnere amputantur vel mutilantur; idque vel casu in conflictu, aliavè modo, vel necessariò propter morbum, ut cum ob vlcus partes absumuntur, uti papillæ, ab exulceratione, ob frictionem frequentem & in spacelo partes emortuæ abscinduntur, in ruptura testes excantur, aut quando alioquin ex vulnere, continuitas soluitur, sanatoque vulnere, partium hæc separatio remanet. Vel quando alia vi Dentes ob dolorem aut alium affectum eruantur; Pili vel casu per vim, vel studio in tineâ morbo euelluntur. Oculi ob conatum vehementem nonnihil prominent vel protuberant: Vel quando ob masticationem & morsum duriorum ciborum, diu præsertim continuatum, gingivæ à dentibus separantur, quo dentium radicibus denudatis, minùs firmiter, quàm cum gingivis adhuc dentes connexi sunt, constituunt, mobilesque interdum facti, faciliùs excidunt, anteriores præsertim, unâ tantum radice niten-tes, cum alij qui validiùs inhaerent, vix sic, nisi radicum accedat, uti dicetur, attenuatio, vacillare aut excidere possint, ut caluariis dentes, licet carne omni destituantur, firmiter adhuc insertos, immobilesque esse videmus. Morsu quoque valido, cum ossa, nuclei fructuum, aliavè duriora comminuuntur, dentes etiam cōfringuntur. Sæpe verò cum

Vulnus aut vlcus, causa partium Mutilationis vel Ablationis aut Separationis vel Divisionis.

Uti illata partibus, causa Dentium. caries, mobilitatis aut contra-ctionis. Pilorum casus et Oculorum promi-nentia.

17

acie cultri, vti quidam peruerso more confueuerunt, dentes frequentius repurgantur, non solum dentium læuitas per attritionem continuam exasperatur, sed & cōtinuā substantiæ illorum abrasione, tandem etiam dentes atterentur corrodunturque.

Calor vehemens extrinsecus adueniens, causa Dentium mobilitatis vel lapsus vel fractura.

Quæ vti à violentia ille procedunt, ita & dentes mobiles fiunt & vacillant, si calidissimis & frequentissimis cibis frequenter ingestis, sæpè incalescant & veluti adurantur, adeo vt tādē exsiccatis & attenuatis ipsorum radicibus, non amplius firmiter sed admodum laxè alueolis insistant, sicque in situ peccāt: vel numero, si ab eadem causa penitus excidant: aut si eodem calore ciborum dura dentium substantia nimium exsicceatur, & tandem etiam vratur, etiam dissiliunt, vel portione ab illis recedente, reliqua confracta & iners remanet, vel cavitās in ipsis gignitur. Quæ & frequentior causa, quod dentes tot caui vel non integri amplius, etiam in iuuenibus inueniantur, in illis præsertim qui calidissimis cibis sunt assueti, iusculisq; feruentibus adhuc utuntur, quæ ne os adustione lædatur prius flatu oris non nihil temperare solent. Hæcque causa est potissima, quare Germani nostri, qui calidis iusculis adeo delectantur, dentes vitiosos citius quam alij populi consequantur, quam tamen defluxionibus malè adscribunt, cum sicuti in dentium doloribus ostensum est, hæc in dentium substantiam minimè labi possint.

Calor feruens, causa Pilorum defluxij.

A simili calore & feruore, pilorum radicibus pari modo exsiccatis attenuatisque, pili in poris non amplius hærentes, vel spontè decidunt, vel leui labore à cute deraduntur, idque aquæ feruentis vel flammæ admotæ ferè occasione, quâ ratione à porcis postquâ mactati sunt, pili detrahuntur, & gallinæ aquæ calenti immerse, pennarum radicibus eodem modo exsiccatis, deplumantur, & in quibusdam eiusmodi externis iniuriis pili abscedunt, si modò non tanta fiat perustio, quâ cutis ita constringatur, vt poris oblitteratis, pilos amplius citra illius dilacerationē auferre minimè sinat, vti in porcis assusâ supra modum feruente aquâ accidit, qui postea sufficienter à pilis mundari nequeunt, quem errorem communiter Verbrüngen vo-

cant. Hoc si fieri ab hisce causis, nec ex humectatione cutis, poris relaxatis & ampliatis, pilos facilius recedere, inde patet, quod & citra feruorem, madefactio, idem, quod tamen non fit, etsi quàm diutissime in aqua moderatè calida sedeant, præstitura esset, dentes quinetiam eadem ratione excidere possent.

Sed & vngues pari modo, vti & vngulæ in animalibus, maiori tamen æstu, decidunt vel auferuntur.

Ab erodentibus medicamentis vel etiam putrefacientibus, partes quædam teneriores absumi possunt, vt Gingiæ, Caruncula in oculo, &c. & psilotris dictis, pili quoque arte auferuntur. Quæ similiter radices pilorum potius absumendo, quàm poros aperiendo, ipsos deciduos faciunt.

Erodentia & putrefacientia medicamenta, causa Partium absumptionis, & Pilorum defectus.

Ab internis causis enarrata vitiorum seu deformationum genera quædam quoque prodeunt, ab humoribus sc. diuersis morbisque, vel parte aliqua aliam, vti dicitur, impellente, pfecta. Veluti à sanguine, cum partes eò, non solum quamdiu homo crescit, foueantur atque augeantur, sed & postmodum quicquid de illorum substantia consumitur, rursus ab eo reponatur. Quæ vitia sanguinis causâ partibus accidentia, diuersimodè, tum ratione illius quantitatis, tum pinguedinis accidunt.

Quantitate si sanguis redundet, partes nimium alendo augendoq; carnosiores reddit, quod nō solum dum corpora adhuc crescunt, sed & postea cum iam consistere debebant accidit, vt tunc supra modum augeantur, quod nisi hæreditariò à semine sanguineque parentum proueniat, vnde quoque carnositas illa originem trahere potest, à sanguine proprio prodire necesse est. Hinc plethoricorum corpora adeo carnosâ fieri contingit. Cuius plethoræ vti variæ causæ sunt, sic non minima & frequentior cibi copiosioris ingerendi praua consuetudo: quam cum appetitus nimius excitet, illeque maxime corporis exercitio incitetur, cuius gratiâ ciborum distributio citius peragitur, euenit, ut qui exercitiis dediti sunt, non tamen immoderatis, plethoram, indeque corporis molem, sicuti Athletæ olim eandem ob cau-

Sanguinis copia, causa Carnositatis.

sam, sibi accerant. Quæ & à contraria causa quiete scilicet prouenire possunt, vt qui otiosi sunt & desidēs, ac voracitati interrim dediti, cū minū de corporum ipsorum substantiā absumatur, & multū semper apponatur, vastū & crassū corpus tandem consequantur. Quod & aliquando ob sanguinis euacuationem naturalem suppressam, quo copiosius congesto, corpora admodum excrescunt, prouenit. Quomodo mulieres ætate illā, quā à menstruo sanguine non ampliū purgantur, etsi prius dum ille consuetim fluebat, aut à foetu concepto in alimoniam absumebatur, graciliores essent, postea habiliores fieri, admodumque sæpē excrescere solent. Quibus de causis à sanguinis abundantia profectis, vti carnositatem corporum prodire, ita à contrariis gracilitatem induci, facili licet colligere, vt non necesse illius etiam causas altius hīc repetere.

*Sanguinis
penuria
causa
Gracili-
tatis.*

*Succi nu-
trientis re-
dundans
causa vel pe-
nuria
causa vt
partes a-
liquæ
plus iusto
excrescunt
decre-
scantq;,
vti &
Vngues
& Pili
crassescunt
atque e-
longan-
tur, vel
subsistit,
aut at-
tenuen-
tur vel
utiam
desiunt.*

Verū vti etiam iam dictus sanguis carnem potissimū augendo imminuendōve, corpora carnosiora graciliorāve reddit, sic & vt aliæ etiam partes interdum plus iusto excrescant decrescantque efficit, quando illis appositus, & in succum ad eas nutriendas aptum conuersus, redundans plus, vel non sufficiens minū quam par erat, nutriendo auget minuitve. Quod ea ætate quæ corpora adhuc crescunt, in quibusdā partibus, tam mollioribus quam durioribus, vt & in ossibus, contingere potest, post illud verō tempus non nisi ferē in illis partibus, quas toto vitæ decursu cū iniuriis externis attritæ, quantum ab illis recedit, reponi postulent, crescere oportet. Veluti in dentibus, vnguibus & pilis, sed diuersa ratione. In dentibus enim si non atteratur vnus aut alter, ab opposito illi dente, vti aliās in masticatione fieri solet, sed ob defectum dentis non fiat attritio, tunc succus nutriens redundans, facit vt longius aliis excrescat, atque vltra terminum elongetur. In vnguibus verō & pilis, si succus enutriens copiosior illis accedat, præterquam quod citius elongantur, crassitiem inde etiam consequuntur, quod in vnguibus sæpē accidit. Cuius etiam causa inter reliquas cōmotio valida circa vnguī

radices facta esse potest, dum manus sæpē & validē & cum illis vngues exercentur, succique attractio ita promouetur, vnde operariis vngues citius quam aliis crassescere videmus. Quod & frequens vnguīum amputatio facit, maximē si prius balneo emollian- tur, tunc enim succus magis allicitus, crassiores eos successu reddit.

Idem & pilis ea ratione, cū primū in barba lanuginis instar se exerunt, si sæpē abradantur, vt magis magisq; crassescāt, elongentur seque manifestent, euenire videmus. Ex defectu quoque succi nutrientis vngues & pilos, fieri potest, vt qui recrefcūt tenuiores sint prius, quod in pilis præcipue sed rariū euenit, lanuginem referentibus. Frequentius fit, vt ob illorum nutrimenti penuriam radicibus exiccatis decidant, pili præsertim, quam potissimam causam Desluuij capillorum & pilorum, vel vt non crescant, Barba inprimis, esse, vel hoc demonstrat, quod medicamenta quæ pilorum regenerationis causā adhibentur, succum attrahendo calore suo, sicuti in curatione ostendetur, illud præstent. Quem succi defectum, & caluitiei causam præcipuam esse statuimus; nam licet pili in capitis summa cute crescāt, & ad ætatis aliquod tempus persistant, postea tamen aliās diu ante senium, aliās eo adueniente, quod sedes hæc carne destituatur, atque ex cute membranisque ossibus instratis constet, vnde citius quam cætera corporis loca siccatur, atq; ex succis fit, ideoq; non ampliū irrigatur, caluities sequitur. Huius causa, vti diximus, insita interdum est, aliās verō externæ etiam iniuriæ, internæq; quæ corpus siccant, quod & curæ referuntur, à quibus non solum canos, exiccatis nimium pilis, vti illic demonstrabitur, sed & caluos exiccato tunc etiam succo, fieri vulgō creditur, illudque aliquibus subito accidisse historiæ comprobant.

In reliquis corporis partibus vti & vnguibus, si ex eodem succo nutriente aliæ extuberantiæ nascantur, cū tumores sint potius quæ aucta substantia, in extuberantiis, vbi de tumoribus eiusmodi agimus, describuntur.

His à succo nutriente luxuriante profectis

*Succi
nutrientis*

incom-

*causa
Concre-
tionis
partis.*

incommodis, accedit & illud in figura partis vitium, quo partes quæ dissitæ esse debebāt, inuicem conglutinantur. Quod fit, si ob cutis tunicarumq; ablationē in partibus separatis, mutuo tamen accumbentibus & contiguis, eo loco vbi se mutuo tangunt, succo vtriusque exudante, inuicemque confuso & concrecente, partes simul coalescant. Sicuti intercedente hoc veluti glutine, etiam cutis incisa, per cicatricem caro ex vulnere separata, per nouam carnem, vel ossa confracta, per callum mutuo rursus naturaliter ex hoc succo conglutinantur.

*Pingu-
dine in
sanguine
abundā-
tia, deso-
cietate
causa
Pinguio-
riū Ma-
cilentio-
rumve
corporū
aut par-
tium.*

Pinguedine si sanguis abundet, pinguiora, uti si illa deficiat, macilentiora redduntur corpora. Nam cum omnis sanguis expinguiore quoque partim constet materiā, uti lac ex butyro sa, illaque exsudans ē venis, membraneis sedibus, non frigore concreta uti putarunt, cum corpus actu calidum semper intrinsecus existat, sed ex sua natura à sanguine separata concrescat, membrisque suā glutinositate accrescat & adglutinetur, sicq; corporis substantiam quoque augeat, prout ea copiosior parciorque in sanguine continebitur, eo maiori minorive etiam quantitate in partibus collecta, corporis molem augebit minuēte, illiusque potius causā quam carnis, corpora in immensum sæpe excrescent vel admodum decrescent: Verum non in toto corpore, in quo ex carne carnositas inducitur, hoc accidit, sed illis præcipue in locis, in quibus naturaliter pinguedo amplius quam in cæteris abundare solet, ut abdomine seu ventre, mammisque in mulieribus, eodemq; in loco in viris pinguibus aliisque nonnullis in sedibus pinguioribus.

Quod verò pinguedinis in sanguine maior minorve sit quantitas, ab eadem sanguinis quantitate proficisci potest, cum in multo sanguine, partem hanc illius, pinguedinem scilicet, quoque redundare necesse sit, unde tunc vtriusque exuperantibus & carnosiora & pinguiora simul euadent corpora, ut si secus, graciliora magisque macra. Verum si sanguis non solum quia copiosus, multum habeat in se pinguedinis, sed ex sua natura, etsi quantitate alias non ita exupe-

ret, pinguior quam par erat existat, quod fieri in eo nonnunquam in sanguine emisso, in pinguiore illius portione, quæ in illius superficie concrescit apparet, quam pituitam vulgus chirurgorum esse iudicat, tunc & pinguiora magis quam carnosiora euadunt corpora. Quam pinguedinem sanguinis, non solum eius constitutio ad eam producendam apta, sed & assumpta pinguiora, quibus tantopere aliqui delectantur & vtuntur, coaceruare possunt.

Ab humoribus aliis & morbis varia quoque deformationum prodeunt genera. Vt numeri deficientis, si ab illis, non à causis externis defectus ille procedat: Sicuti in vlceribus prauis quandoque contingit, aliquas partes, sponte per suppurationē vel corruptionem inde profectam, consumi: quod ut in variis locis, sic & in naso & oculo potest accidere; à quibus & gingivæ interdum absumuntur: quæ & propter tophos dentibus accrescentes, si se gingivis substernant, sensim à dentibus separari solent, & quod minus illis denuò accrescere possint, impediri, unde dentium nexus infirmior, uti dictū, redditur. Ab aliis quoque morbis quibusdam dentium, à defluxione in alueolos potius quam dentes labente, illicq; fibras membranasque quibus vinciuntur, humectante laxanteque profectis, dentium quandoque mobilitas, aliquando & casus proficisci potest. Vel si alio modo in alueolis consistentes humor vitiosus, radices dentium exedendo vel corrumpendo, eos infirmos vel deciduos reddat. Sicuti grauibis morbis quibusdam, dentium hunc defectum superuenire obseruamus: & in lue Venerea, ex usu hydrargyri, sputo vehementius concitato, dentes adeo labefactari, ut plerique flecti & moueri possint, nonnunquam etiam excidant.

Sed & pilorum defluuii causa à morbis vitiosisq; humoribus dependet, cum ab illis radices ipsorum exiccantur vel attenuantur vel absumuntur. Quod in morbis calidis ut febribus ardentissimis euenit, ut non solum inde corpus, sed & pilorum radices, quæ molles sunt & tumidæ, siccentur, sicque attenuentur vel consumantur, sicuti in eiusmodi febrium declinationibus aliquando

*Macra
praua
causa
partium
absum-
tionis.*

*Tophi
dentium
causa
Gingiu-
narum
separa-
tionis ab
illis.*

*Deflu-
xio in
dentium
alueolos,
causa
Dentiu
mobili-
tatis &
casus.*

*Humor
vitiosus
circa de-
ntium ra-
dices co-
gestus,
causa
Dentiu
mobili-
tatis &
casus.*

*Calor fe-
brilis,
causa
Pilorum
defluuii.*

*Humor
prauus
& mali-
gna cir-
ca poros
cogestus
causa
Pilorum
defluuij.*

euenit, vt pili capitis rariores ob defluxum hunc appareant, vel plerique excidant. Ab humoribus quibusdam, qui eam naturam in se habent, vt pilorum radices exedere & absumere possint, si circa poros cutis colligantur, defluuium illorum in Alopecia, & in Ophiassi illis in locis vbi hi consistunt, sequitur: quod vel ob vim acrem, vel malitiam quandam peculiarem molitur, cum rarius hoc aliàs, etiam si cutis multis prauis humoribus scatèat, accidat: Atque id etiam non lentore suo laxando poros & radices nimium emolliendo, vti aliqui censent, facere, satis hoc demonstrat, quod multæ eiusmodi humiditates cutem imbuentes, tamè pilorum defluuium minimè procreent. Qui humores vti à variis causis gigni & coaceruari illic possunt, sic & in acutis morbis eò propulsi illud defluuium, quod aliquando à calore radices. exiccante proficisci potest, & in declinationibus illorum euenire diximus, quoque efficiunt. Imprimis verò à vi aliqua maligna hoc procedere, ex eo patet, quod in illis morbis qui exitiosâ & venenatâ qualitate, cuti potius, quàm aliis partibus insidiantur, in iisque vitia diuersa proferunt, vt elephantiasis & lue venerea, pili quoque aliquando certis in locis, quos potissimum infestant, excidant.

*Calor fe-
bris
causa.
Impres-
sionis fa-
ctam
vngue
vel Di-
uisionis.*

In vnguibus quoque cum similem cum pilis, vti alibi ostendimus, substantiam cartilagineam obtinuerint, cutique duntaxat vti illi inhæreant, idem accidere potest, vt ab iisdem causis, quibus & pilos infestari diximus & defluere, illi quoque labem aliquam patiantur, integritque digitis abscedant, rarius tamen quàm pili, cum firmitus & pertinacius hæreant. A calore tamen etiam in febribus feruentissimis aliquando contingit, vt & vngues circa radices arefacti, vel ex parte consumpti, postea cum morbo cessante excreſcunt, in illis impressum obseruetur transversum vestigium, vel separatio quedam illos diuides. Et à qualitate eadem exitiosa, quâ pilos in lue elephantica & venerea defluere diximus, vnguium quoque radices infestæ, labes iisdem imprimitur, ob quam et si non cadant vti pili, licet & quandoque hoc fiat, vel aliàs consumantur vngues, tamen

*Quali-
tas exi-
tiosa vel
humor
vitiosus
causa.
Vnguium
excretionis.*

*aut Sca-
bricitas,
alterius-
re labii.*

alia vitia inde contrahunt, vt erosi vel scabri aliòve modo deformati appareant. Quod & vitium ab aliis humoribus prauis & vitiosis quâ à succo vngues nutriende, vnde eos crassescere in sanguine ostendimus, extra hos aliosve morbos, vnguibus accidere potest.

*Dentes
& Vn-
gue se in-
uicem
propellentes
causa
et deci-
dant.*

A parte aliqua etiam detrudente, numerus partium quandoque imminuitur, vti in dentibus contingit, quos dum crescunt adhuc in iunioribus, alij seu ipsorum appendices, quibus innituntur, sensim emergentes, extrudunt, & tamdiu donec locum ipsorum occupent, illic spacium inane relinquunt. Idem & in vnguibus sed rarius contingit, vt nouus sub alio crescens, superiorem tandem depellat, quod etiam à succi abundantia, vt gemini nascantur euenit.

CURATIO.

*Partiū
corporis
quarun-
dam re-
ductio
curatio.*

IN numero abundante quod exoritur vitium seu deformatio, ab ortu inhærens, tum in corpore, tum membris & partibus illius, si impedimentum aliud minimè adferat, cum non alia ratione, quàm partem auferendo, corrigi queat, si non sine vitæ periculo, aut magnâ quæ subsequitur læsione, fieri possit, non faciliè tentanda. Quod si verò non admodum incommodet, atque citra grauiorem noxam tolli queat, tunc sublatio tentari potest; vt si dens aliquis superabundans quod rarum, masticationem impediat, illum euellere licebit. Vel etiam sextus digitus adhuc exilis & languidus, quandoque nouaculâ refecari potest, vel forpice abscindi; quo facto, vti in vulneribus dictum, mox sanguis compescendus, curatioque debita instituenda.

*Partiū
quarun-
dam, vti
& Testis
defectus
cura.*

In numero deficientium vitiorum, si Organa aliqua defint, ab ortu vel casu, vti & si Testes execti sint, restitui illa nulla ratione possunt, neque enim in animantibus aut hominibus, sicuti in plantis, quarum rami absecti rursus repullulant, natura in locum partium amissarum, nouas solet producere, neque arte vllâ id effici potest. Idcirco nullâ hinc Medici operâ, nisi ad præcauendū, ne membrum aliquod pereat, iniurias externas arcedendo, & causas alias auertendo, in curatione opus erit. Vt tamen deformitas hæc in quibusdam

25

Partiū
quarun-
dam a-
missarū,
vbi
Pedu,
Era hū,
Nasi, O-
culi, ar-
tificialis
repara-
tio.

busdam partibus deperditis corrigatur, arte efficitis aliis instrumentis, eam palliare aliqui solent. Sic in locum pedis vel brachij, aut manus amissæ, alia ad horum formam fabricata, in locum ipsorum substituuntur, corporique vbi pars deest, affiguntur, quæ aliquando adeo ingeniosè articulis flexibilia fabrefiunt, vt & vsum aliquem, eundo vel apprehendendo præstare possint. Sic & nasi amissi deformitas illa abominanda, alio factitio, pictoque nonnihil, emendatur. Vidimus quoque in locum oculi eruti, alium artificialem ex ebore concinnatum, quandam immittere rursusque eximere citra molestiam potuisse, sicque continuò ferè gestasse, neque aliter quam verum esse oculum, intuentes iudicasse, nisi ex eo quòd immobilis esset, magisque illic sedes hæc maderet, oculum ficticiū esse animaduertere licuerit.

Dentium
defectus
cura.

Dentium lapsus sponte, casuue aliquo factus, in infantibus, radicibus remanentibus sponte reparatur, alique in amissorum locum succrescunt: In adultis verò si hoc accidat, vel reliquo etiam vitæ tempore, vbi iam radices vel appendices vt vocant, exactè ipsis coaluerint, cum si excidant vel euellantur, radix vnà auferatur, vel si portio illius remanserit, ea fiat inutilis, recrescere minimè amplius possunt. Licet enim omni tempore, quantum de dentibus continuò atteritur, cum sani & integri adhuc manet, recrescat, adeo vt etiam, nisi opposito dente impediēte, vterius extra reliquorum seriem, vti superius dictum, prolongentur, tamen cum auferuntur aut vitiantur, hoc in illis, vtpote absentibus, aut emortuis, amplius fieri nequit. Hunc tamen defectum, qui vno vel altero dente absente accidit, indeque natam deformitatem, in anteriore sede dentium conspicuè apparentem, artificiales dentes ex offe solido facti emendare possunt, quos adeo solerter efformatos, atque interuallis firmiter insertos aliquos continuò gestasse obseruauimus, vt à veris minimè discernerentur.

Vnguibus deciduis pari ratione, alij quandoque sponte subnascuntur, alias cum etiam ab ori ad extremum senium crescere non

desinant, alij mox succedunt, nonnunquam verò deletis etiam penitus radicibus, non amplius emergunt, & nuda hæc loca relinquuntur, neque ars medica hinc aliquid adferre potest.

Pilorum etiam defectus ad numerum deficientem pertinens, cum radicibus illorumque seminibus penitus amissis illis accidat, reparari nullo modo potest, quòd partem corporis omnino ablatam, de nouo progignere sit impossibile. Vti & ille defectus, quo pori pilorum inter se coalescunt, corrigi amplius minimè potest. Quapropter in caluitie vera, cutisque cicatrice, aut alio illius omnimodo coalitu, vel in ea alopecia, in qua pili radicibus extirpati sunt, eos producere velle, Æthiopem esset lauare. Pilorum verò ille defectus, in quo pili quidem defluunt adeo, vt nihil de illis qui deciderunt residui amplius appareat, radicibus tamen ipsorum seminibusve permanentibus, tunc vel sponte vel arte adhibita possunt renasci, cum alioquin per totam vitam crescere non desinant. Quòd si ille defectus occurrat, quem ad magnitudinem deficientem referri diximus, quo pili tempore illis deputato, non vterius excrescunt, vt barbæ, eaque vel omnino non, vt in castratis, vel tardius, aut non satis amplo spacio erumpat; vt quibusdam hominibus accidit, eam nulla arte euocare possumus, in aliis quoque valde arduum illud conari, licet ad hanc rem varia tentari soleant, sed plerunque successu tardius, & non prius donec natura sponte hoc molia- tur, consequente.

Pilorum
defectus
in Cal-
uitie,
Alope-
cia, Os-
phiasis
curatio.

In curatione autem horum defectuum, prognostico semper præmissio, desperatum malum relinquentes, in reliquis curam pro ratione causæ quæ primùm submouenda instituere debemus; tum externæ, si inde pilorum sequatur defectus; tum internæ, si ab excrementis prauis aut malignis pilorum fiat defluuium, euacuando hæc per deiectiones seu purgationes; Vel per habitum corporis. Dein ad pilorum generationem per exhibita vel admota topica procedendum.

Barbæ
defectus
curatio.

Per purgantia causam auferre studemus, si à vitioso succo alopecia pcedat, vt ille qui

in sanguine latet, educatur, & cacochymia hæc tollatur, sanguisq; laudatus pro nutrimento singularum partium, sic etiam conueniens pro pilis deceter alendis, gignatur. Quæ purgationes si frequentiores aut potentiores sint, etiã aliquid ex habitu corporis educendo, causam pilos corrumpentem auferre, atq; in lue Venerea, qualitatem illam malignam, quæ pilorum defluuium parit, eliciendo, vnã cum lue simul hunc ab ipsa profectum defectum sanare queunt.

Pro ratione autem excrementorum redundantium, purgationes eiusmodi instituuntur, & quoniam cum sero eiusmodi aeres vel falsi humores vnã cum sanguine per venas ad cutis poros delati pilorum radices exedunt, illis potissimum educendis purgantia accommodantur: eadem ferè, qualia scabiei peruersis speciebus, inter quas & tinea comprehenditur, vbi pili simul vitiantur, conuenire diximus, ibique diuersas harum formas descripsimus. Sicuti & si qualitas maligna in lue Venerea pilos infestet, iisdem purgationibus, si eo modo hanc luem curare velimus, vtendum erit.

Per habitum corporis euacuatio, vitiosam illic circa pilorum radices residentem illuuiem rectius educit, indeq; auferit, quæ per sudores manifestos, vel etiam transpirationem occultam perficitur. Et proin si talis illic materia hæreat, purgationib; præmissis, postea etiam sudores exhibitis ad motisque mouere studebimus, quæ si eos propellere nequeant, tamen per insensibilem transpirationem aliquid de excrementis illis educunt. Inprimis verò in pilorum defluuii in lue Venerea, à vi venenata procedente, hæc vix dum aliã viã quàm per corporis habitum, iam dictis euacuationibus repurgari potest, & sic casus ille pilorũ luesq; ipsa curari, sicuti in illius cura ostendemus, vbi & sudatoria eiusmodi varia describemus.

Per assumpta pilorum generationem vel productionem difficulter promouere possumus, licet illud quibusdam effici posse quæ ad superficiem corporis seu cutem excrementa propellant, illi existimarint, qui ab excrementis fuliginosis pilos nasci, suamq; originem trahere docuerunt. Et proinde ea

quæ id præstare existimant, ad pilorum prouentum propinant: Eiusmodi sunt Ficus, quas propriã quadam facultate ad cutem excrementa protrudere posse, ex eo colligunt, quòd vulgò pediculos progignere credantur, quos ex ffordibus in cute collectis, ab eiusmodi excrementis vi ficuum eò propulsis, prouenire existimant, cum tamen fordes illæ, vnde alioquin pediculi oriri solent, ab externis potius cuti adhærentibus nascantur, & adhuc an ficus pediculos gignant, dubium sit, illiq; opinioni fortè id occasionem præbuerit, quòd, cum semina ficuum & formã & copiã, inprimisque dentibus contrita, vt pediculi pollice confusi, crescent, sicque pediculis nonnihil respondeant, etiam pediculos gignere posse, inde existimarint. Alij quoque in eundem finem, vt ad extimam cutem excrementa ad pilorum prouentum propellantur, Theriacam causã trochiscorum de Viperis, quos recipit, exhibent, existimantes carnem viperarum sumptam, idem in corpore efficere posse, quod in viperis & serpentib; quæ eius vi exuuiũ deponunt, nimirum etiam excrementa ad cutem deducendo, pilorum generationem promouere. Certum tamen est, theriacam sudores mouendi excrementa circa cutem hærentia potius educere, quàm illic coacervare. Et si viperarum aut serpentum caro vires eas exuuium secernendi habet, potius excrementa è corpore propellet, quàm in eo cumulabit, sicuti in elephantiasis cura demonstrauimus. Postremò cum certum sit, sicuti alibi copiosius docuimus, pilos non ab excrementis, aut fuligine quadam incognita nutriri, multò minus nasci, sed ab excrementis, si radicibus ipsorum apponantur, potius abscedere, eosque vti vngues & cartilagine alie, succo illis accommodo à sanguine allicito, ali, non est quòd excrementa ad cutem propellendo aliquid in pilorum generatione, effici posse nobis persuadeamus, sed contrario modo, vti dictum, excrementa hæc absumendo, atque extra corpus propellendo, hoc rectius perfici. Qui vti in lue Venerea, præcipuus ad defluuium pilorum sanandum scopus est, per corporis scilicet exteriora, vti dictum, vim illam malignam

29

lignam expellere, sic & si ab excrementorum congestione, aliis de causis alopecia fiat, idem obseruandum.

Per adnota loco affecto, præcipuè efficitur, vt pili capitis, barbæ, superciliorum & palpebrarum qui defluerunt renascantur, vel etiam illi qui barbam cõstituere debent, copiosè producantur. Adhibendo remedia, quæ vel proprietate occultâ pilos generant vel augent, vt sunt multa ab animantibus petita, experientiâ saltem cognita; Vel quæ vi siccante & nonnihil adstringente, qualia sunt plæraque, quæ in hunc vsum adhibentur, id præstant, idque forrè, quia succum, ad pilorum radices delatum, exiccando crassiorèque reddendo, illis sic nutrimentum vberius magisq; aptum subministrant. Vel quæ succum ad superficiem trahendo, epispastica medicamenta, eundem pilorum radicibus, ad hos alendos accommodant. Ex quibus vel separatim, vel inuicem permistis remedia ad pilorù regenerationem, vel barbæ productionè parantur. In defluuiò quoque pilorum, cum primùm incipit, vt casum illorum præcaueamus, vel cum iam aliquotusque processit, qui supersunt conseruari queant, validiora adhuc adstringetia prædictis permiscemus, quæ poros constringendo pilos deciduos ne faciliè labantur, retineant eosq; firment. Validiora quoque exiccantia & simul digerentia hisce addimus, si prauis humores pilos depopulentur, ad eos absumendos. Sed & nonnunquam in certa quadam venenata qualitate, vt Luis Venereæ, pilorum defluuium gignente, sunt qui lenientia adhibita, vt lac, perniciem illius contemperando, casum pilorum auertere posse, docent. Eiusmodi autem cuiuscunq; generis remedia, hoc illòve modo pilos vel regenerantia vel producentia aut conseruantia, variis modis applicantur, aut per ablutiones aut fots administrantur.

Applicantur diuersimodè ex simplicioribus primùm à plantis petita varia. Veluti radic. Nymphææ, fol. Betæ & Brassicæ cum Sale; rad. Asphodeli cum Aceto; fol. Cynoglossæ cum adipe suillo vel alio. Et quando nutrimentum pilorum alliciendum, Cepas, Allium, Squilla, Raphanus affricantur; Vel

radices Ranunculi illiusve folia, aut Nasturtium ad Erysimon, similiaque.

Pulueres plantarum quarundam misti cum Melle vel Oleis prædictis, Axungia, Pice, Resinâ, aliisve inunguntur, vel alias apponuntur: Veluti Harundinum corticum, vel radicum Adianthi; fol. Trichomanes, Abrotani, Myrthi, Absynthij, bacc. Myrthi & Iuniperi, Myrobalanorum. Et ad alliciendum, pul. radic. Azari, Hellebori, Thapsiæ, herb. Rutæ, sem. Sinapis, Staphisagr. Nasturtij, Erucae, Rutæ.

Semen Hyosquiami cõmunis cum oleo Irino illitum, supercilia & barbam elapsa, regnere docetur.

Cineres plantarum etiam quarundam vstarum idem efficiunt, vt prædicti pulueres, in formam linimenti redacti. Veluti cineres Auellandarum & Nucum putaminum. Item Abrotani, Adianthi, Trichomanes, Harundinum cortic. vel radicum; cort. Pini, radic. Asphodeli, Cyclaminis, Allij, fol. Myrthi, Absynthij, fol. Visci, Nucum Cupressi, Ossium daſylor. & sem. Lini cum stipula combusta. Hordei item.

Succi plantarum per se vel aliis cõmixti illinuntur: Vt quando attrahendum, Ceparum, Allij, vel Squillæ, Raphani, Thapsiæ item, vel Cyclaminis: Quando siccandum, Arundinum, Abrotani, Lapatij, fol. Myrthi vel Salicis, aliarumve prædictarum plantarum.

Aloë cum Vino dissoluta etiam conuenit: Liqueor item emanans è vulnerato tilie trunco; Lac Chondrillæ palpebrarum defluuium sanare docet Diosc.

Aqua stillatitia Mellis confert; vt i Aqua vitæ seu vini illita.

Mucago quæ à radicibus Vlmi decoctis prius exprimitur, conuenit.

Mel quoque pilos gignere creditur, validiusque allicit Mel anacardinum.

Olea varia in eundem vsum adhibentur, vt oleum expressum ex Auellandarum vel Amygdalarum aut Persicorum vel Nucum nucleis; vel ipsi nucleis contusi affricantur. Item oleum Oliuarum verus, vel Lucernarum, Laurinum, Raphaninum, ex baccis Iuniperi vel Spica exstillatum. Vel Myrthinum, Rosaceum, & in quo Abrotanum alia ve plantæ

plantæ vel Colocynthis coxerint, aliaque omnis ferè generis calida, à practicis vsurpantur.

Ad pilos prolongandos aliqui priuatim oleum in quo radic. Salicum & Myrobalan. emblicæ coxerint, commendant.

E' lachrymis Ladanum inprimis conuenit, dissolutum cum Melle, vel cum pili firmandi cum oleo Myrthi vel Rosarum, vel cum Vino austero aut succo Myrthi. Cui & Myrrha interdum additur. Vsurpantur & Thus, Mastiche, Sandaracha item, aliæve gummi cum Resina. Et cum attrahere volumus, addimus Euphorbium. Gummi chondrillæ in palpebrarum casu laudat Diosc.

Ab animantibus desumpta varia ad pilorum reparationem adhibentur. Veluti Apes contritæ cum alueolis, vel alioquin puluis illarum aut Vesparum.

Cantharides paræ rubræ, maculis nigris, vti & ventre, quæ iuxta truncos cariosos arborum magnâ copiâ versantur quas Galli, Gelines de nostre dame vocant, siccata, puluerisatæ cum Oleo spicæ mistæ, admodum efficaces habentur.

Officinarum Cantharidum puluis adhibitus validè allicit, qui ne exulceret, cum ol. Viol. vel Amygdalarum prius miscetur vel coquitur.

Lacertarum amputato capite & cauda exiccatarum puluis cum oleo de Vitellis oui apponitur.

Stercus murium cum Aceto admotum attrahit, vti & alia stercorea.

Sordities alueorum apum illita prodest.

Cineres animalium semi vel penitus vstorû, ad pilos producendos efficaces habentur, misti cum Melle vel oleo Spicæ, Iuniperi, Myrthi, aliõve: vel axungia, vt Vrsi, aliisve: vel cum Pice aut Resina, aut cum Vino vel Aceto illiti: Veluti cineres Apum, Vesparû: Cantharidum, Cicadarum, Muscarum, Asellorum, Talpæ vel illius pellis, Murium vel illorum capitum, Leporis capitis, Lacertarum, Ranarum, Sanguisugæ, Hypocampi, Erinac. marin. Vngularum muli, Caprarum, Pellis Vrsi, Vulpis, Erinacei terrestris, fenestæ Anguiû, capillorum Hominis, setarum Vrsi vel Porci, stercoris Murium & Caprarû.

Axungia commendantur, Vrsi inprimis, dein & Talpæ, Lucij item piscis. Dein & alia, vt Anseris, Anatis, Gallinæ, Hirci, Porci, Cuniculi. Oesypum illinit Diosc.

Oleum Lumbricorum capillos augere docent: Vti & oleum Ouorum: oleum in quo Lacertæ decoctæ sint, ad pilos prolongandos conducit.

Mucago quæ ex carne Limacum contusa, additis in super aliquot Apibus vel Vespiis desumitur: Et sanies quæ ex illis, cum punguntur, effluxit, palpebras deciduas reparat.

Sanguinem Testudinis marinæ parum resiccatum commendant.

Fella item porci hirci vel tauri illita.

E' terrestribus, Halcyonium vel Spuma maris cum Aceto illinuntur. Vel Cineres ab ipsis vsti adhibentur. Vsurpantur & Sal Nitrum, Sulphur viuum, Ostreorum testæ, Cotis limatura. Succique aliqui acres efflorescentes, reliquis permista.

Lapis Lazuli vel Armenus tritus atque inunctus cum liquore aliquo, superciliorum & palpebrarum pilos reparare dicitur.

Plumbum & Antimonium limata & trita subtiliter, cum axungia aliqua mista, superciliorum casum emendare, scribitur. Fortè si non verè, saltem quia denigrando, vt minus vitium hoc appareat, sicque illud palliant. Stibium vstum alij commendant.

E' Compositis applicationibus, hæ quæ sequuntur, ad pilorum regenerationem in illorum casu, vel productionem in barba, selectiores & præcipue sequentes existunt.

Linimentû vtile: R. ol. Myrtini, Amygd. dulc. an. ʒ. j. β. cort. rad. Harundinû seu Canarum, vel in illorum penuria truncorum Caulium vstorum, Adianthi seu Trichomanes, Abrotani combustorû an. ʒ. ij. Capitem murium vstorum, Apum combustarû cum fauis quibus inherent ʒ. j. β. Ladani ʒ. ij. Mellis ʒ. j. fiat Linimentum.

Vel: R. Olei in quo coxerit Abrotanum ʒ. ij. Mellis ʒ. j. cinerum pellis Talpæ vel Erinacei ʒ. j. cineris Apum vel Vesparum ʒ. β. cineris putaminum Auellandarum ʒ. ij. Stercoris Murium ʒ. j. axungia Vrsi ʒ. j. Ladani ʒ. ij. misce pro Linimento; cui Gallia moschata ob ladanû & boni odoris gratiâ addi potest.

33
potest. Vel Moschus aut oleum destill. Garyophyllorum.

Aur: R. olei Nucum & Laurini an. 3. j. β. olei de Baccis Iuniperi vel Spicæ 3. β. succi Lapathij & Abrotani vel fol. Myrthi an. 3. j. coquantur parum, addē Mellis albi 3. j. β. pulueris Apum 3. β. pulu. rad. Azari 3. j. Ladani 3. β. Styracis liquid. parum.

Validius aget & attrahet, si addas cinerum Cantharidum rubrarum maculis nigris 3. β. cinerum Cantharid. offic. 9. j.

Ad alliciendum nutrimentum pilorum, sic fieri poterit: R. succi Raphani 3. j. succi Caparum 3. β. Mellis 3. j. β. Ladani 3. ij. Myrrhæ 3. j. Euphorbij 3. β. Halcyonij alicuius vel Spumæ maris 3. j. Vel horum loco Salis vel Nitri 3. β. Picis vel Resinæ dissol. in Vino 3. vj. misce, fiat Linimentum.

In casu superciliorum & barbæ, hoc expertum: R. feminis Hyosquiami 3. ij. Stercoris muris 3. j. pulueris foliorum Trichomanes & feminis Nigellæ an. 3. β. Spicæ nardi 9. β. olei Iuniperi q. f. fiat Inunctio.

Multæ aliæ illitiones, ad pilos propagandos vel regenerandos ex prioribus simplicioribus inuicem commixtis parari possunt.

Ad præseruandum casum pilorum cum ille metuitur, vnctiones tales fiant: R. olei Myrtillorū, vel Lentiscini 3. ij. Ladani, Hypocistidis vel Acaciæ dissolut. in Vino austero vel Aceto an. 3. ij. Aluminis vel Salis 3. j. Ceræ q. f. fiat Vnguentum.

Vel: R. olei Rosæ Omphacin. Cydoniorum an. 3. j. Ladani dissoluti in Omphacio 3. ij. Mastiches 3. j. β. pulueris Gallarum vel Nucum cupressi, Myrobalan. an. 3. j. misce pro Inunctione.

Istis & cineres Auellanae, Nucum, Apum, aliæve ex supradictis exiccantibus addere possumus.

Abluuntur vel fouentur similiter loca, in quibus vt pili recrescant vel excrescant volumus, vel adhibendo simul linimenta, ante vel post illorū vsum, vel per se illis vtendo. Fiuntque ex decocto Abrotani, Capill. Ven. seu Adianthi, Trichomanes, Marrubij, Verbena, fol. Myrthi, Rumicis, fl. Rosm. Cham. summit. Rosmarini & Saluæ; Si caput abluendum, rad. Harundinum, vel cort. Vlmi,

Thapsia si haberi potest, sem. Lini torrefacti, Spicæ nardi vt vult Diosc. Et si à prauis humoribus casus pilorum procedat, addimus quæ abstergendo simul eos absumat. Veluti fol. Sennæ, ras. Ligni Gaici, aliæq; interdum detergentia, vt rad. Bryoniæ, Cucum. agrest. Serpētariæ, Blitum, Lupinos, Fabas, Furfur, decoquendo tunc hæc in lixiuio debiliore.

Vel fiat lotio ex Lixiuio facto ex cineribus Iuniperi, Abrotani, Marrubij, Auellanae, Amygdalarum, Cochlearum, additis etiam interdum aliis cineribus ex quibus illitiones parari diximus. In hoc lixiuio & alia possunt incoqui.

Aquis stillatitiis, aliquando lotiones vel fatus fiunt, vel etiam illitiones: Veluti aqua ex Abratono, Adiatho, Trichomane, addito Melle destillatâ, quæ additis Cineribus & Ladano, inungi potest.

Conuenit etiam ex Lardo & Melle facta aqua, additis aliis quoque plantis.

Alia ex Mellis, Vrinæ pueri & Vini optimi & Lactis æqua singulorum portione elicitâ, utilis est. Quibus & cum destillanda erit, Abrotanum aliæve plantas possumus addere: Interdum & ad efficaciam Sinapi.

Vrinam Vaccæ vel Equæ, in qua semen Fœnogr. ebullierit, aliqui in hæc rem illinūt.

Ad præcauendum casum pilorum, ablutiones magis adstringentes fiunt ex decocto facto in Vino austero vel Lixiuio, aut Aqua extinctionis ferri, Myrthi fol. & baccar. cort. Vlmi, rad. Salicis, Agrimonie, Abrotani, Capillarium, Ros. rubr. Gallarum, Nucis cupressi, additis simul aliis, quæ pilis iam defluxis conuenire diximus.

Lactis fori defluuium capill. à Lue Venerea, cohiberi vti dictum, docent, cui & Butyrum addi potest, oleum Amygdal. dulc. & similia lenientia, & sic inungi, vt acrimonia humorum contemperetur.

Præter hæc quæ extrinsecus vsurpantur remedia, Fumum seu fuliginem qui ab accenso ligno Pini suscitatur vel Olibano, aut aliis gummi, vel potius Styrace, cum odorem simul gratum spiret, pilorum in palpebris generationem, si recipiatur, promouere existimant.

Frictio loci pro pilis reparandis & educen-

dis alliciendo succum, iuuat, tum frequens, tum aspera, donec locus rubeat, vel quæ foliis ficus, aut aliis asperis perficitur: Vel cum acri succo præditis, vt radic. Raphani, Cæpis, Alliis, Squillâ similibusque.

Abrasio lanuginis primum illius, quæ cutem obiter obsidet, & vix dum adhuc apparet, vel pilorum aliàs tenuiorum, quos augeri cupimus, cum nouacula frequenter iterata, plurimum vt crassiores sensim euadant atque elongentur, adiuuat, sic enim vt fucus nutriens magis alliciatur, & pili, dum rursus recreſcant, commodissimè perficitur, & hac ratione barba citius quàm aliis artibus producit, atque in defluuiis capillorum, minùs si affecerint decidunt, validiusque recreſcunt.

Per fucum glabrities superciliorum corrigitur, si colore nigro ex fuligine facto cum oleo Nucum, & glutine Fernisio, vt hæreat, loca illa nuda, pingantur. Quod & in aliis locis fieri potest.

Corporis totius incrementum partium magnitudinis aucta & Orificiorum amplitudinis nimia cura.
In magnitudine adaueta occurrens corporis totius vel partium illius incrementum nimium, vel orificiorum quorundam illius amplitudo, originalia si sint vitia, emendari nulla arte possunt, neque etiam à partibus nimium auctis aliquid sectione auferre, aut orificia lata suere, aut ex parte conglutinare velle, cum functionum ipsarum læsio inde sequeretur, tutum, cum huius potius quàm deformitatis illius, sit habenda ratio.

Vterisq; nusi seu canna nimie amplitudinis cura.
Ad orificiorum tamen quorundam nimiam amplitudinem contrahendam, stringendamque, si præsertim non naturalis sit, sed per vim citra tamen rupturam inducta, præfidiis quibusdam mulieres præsertim illud moliri, in uteri externo orificio tentant, tum conceptionis faciliore reddendæ causâ, tum interdum si corruptæ fuerint, ne hoc in illis deprehendatur.

Idque adhibitis frequenter huic regioni, potenter adstringentibus, vnde tandem coarctari hæc loca existimant. Vsurpaturq; ad hanc rem Infessio vel forus, factus ex decocto Gallarum, cortic. Granatorum in Aquapluuiali vel ferrata; addito etiam Vino rubro, vel Acero, & Alumine.

Adduntur interdum & radic. Consolidæ,

fol. Sumach, Plantagin. Quercus, nuces Cupressi, cortic. Pini, aliaque adstringentia, atque odorata, vt Cyperus.

Applicatum Atramentum scriptorium cum petiis vehementer adstringit.

Vel sequens: R. Gallarum, vel cort. Granator. aut Balauft. 3. β. Mastiches vel Thuris, Sanguinis draconis an. 3. ij. Asphalti vel Mumie, Aluminis an. 3. j. Piperis albi 3. j. cum infus. Gummi Arabici in Vino rubro & succo Pyrorum immaturorum vel Prunellorum fiat pasta, admoueat, utque.

Vel conspergat puluere ex Bolo, Gallis & Mastiche facto, cui Antimonium & Scoria Ferri addi poterit.

Vnguium quoque crassities nimia, si non solum in illis qui iam sunt, sed & in succrescentibus similiter se offerat, corrigi nequit, cum etsi quid ab illis deradatur, rursus in aliis qui recreſcunt vitium hoc redeat.

Longiores autem quàm par est facti vngues, etsi naturaliter sic procedant, cum deformitatem adferant & incommodent, amputari ad carnem viuam eousque debent, ne vel illi extra carnem, vel caro extra vngues nimium promineant, vti hoc qui munditiei student, facere solent.

Pilorum prolixitatis vel nimie excreſcentie cura.
Pili prolixiores quàm vsus illorum, aut consuetudo regionis ferat, tondendo, ad eam quæ decens est & utilis longitudinem citra negotium magnum, vti consuetum est reducuntur.

Hæc verò eorum deformitas, quam in Locis consuetis, vbi aliàs obscuri & tenuissimi esse solent, excreſcentes inducunt, vt si in frontem longius descendant: vel mulieribus in labio superiore, vti frequentius fit, mystax oriatur; vel quod insolitum & horrendum in mento quoq; barba illis prodeat; vel in obscenis locis pili nimium luxurient, tunc pilos hosce auferre quod facilius fit, & ne renascantur amplius, quod cauere magis arduum est, studebimus: idque topicis ferè præmissâ tamen præparatione aliquâ, si opus sit, & postea ad motis medicamentis; vel ad u. pilos euellendo, aut reſecando, vel cutem vrendo perficimus.

Præmittitur præparatio aliqua, in plethoricis maxime, sanguinem minuendo vel di-

37

uertendo, si adurentia, vti dicitur, adhibere velimus, vt cum dolor aliquis inde exurgit, sanguis minùs affluat, inflammationemque quæ interdum sequitur, non accersat. Purgantibus quoque sanguinem ab ichoribus & serositate mundando, eumq; minùs fluxibilem reddendo, idem effcimus.

Sudores ante topicorum usum si calore balnei promoueantur, vel partes aquâ calidâ foueantur, relaxatis vti putant poris, feliciùs topica operari docent, & proin in balneo sicco interdum hisce vti iubent. Quod tamen cum etiam sine illis succedat, non adeò necesse est, balneum tamen interdum additum, hoc commodi in horum vsu adferre solùm videmus, quod vt quæ illinuntur, cum pilis & fordibus, meliùs à corpore abstergantur & secedant, efficiat, & proin tunc cum firmiùs illita hærent, & cum in locis obscœnis hæc moliri volumus, vbi minùs recedunt, balnea sic possunt competere.

Ad motis topicis variis illud præstatur, & præcipuè certiusque Psilotris medicamentis, sic quòd cutem depilando denudent, nominatis. Quod causticâ vi potissimùm agunt, quâ vrendo, vti de aqua feruente diximus, vt abscedant, efficiunt, & si validiùs agant, cutemq; vehementer adurant, vt quoque radicibus absumptis, cicatriceque indurata non ampliùs renascantur, efficiunt. Quæ tamen cautè administranda erunt, & si locus inde vratur, vltio vti in ambustis dictum, sananda.

Alia vi quàm causticâ, quædâ ex illis quæ pilos auferre docent, operantur, idque fortè proprietate quadam, cum alia certa qualitas, quâ hoc faciant, designari in illis nequeat. Quâ & ne iterum renascantur, fortè plus agunt, & proin causticis ferè miscentur, vel si ne recrecant saltem impedire debent, præmissis illis, & iam pilis ablatis rectiùs administrantur. Præter autem illa quæ proprietate illorum prouentum impediunt, alia ex illis, etiam vi adstrictoria prædita, quæ repellendo nutrimentum ipsorum arceant, illis miscentur. Imprimisque ne renascantur, narcotica adhibent, fortè existimantes frigiditate summa hæc repellendo id præstare, quæ cum in illis minimè sit, alia vi vel sum-

mè digerente, quam iis inesse alibi ostendimus, operabuntur, vel vt dolorem ex vsu causticorum contrahi solitum mulcerent, istis admista primùm fuere, quod postea, cum ad pilorum renascetiã prohibendam factum fuisse creditum fuerit, eo nomine in vsu in hoc casu venerunt.

Parantur autem eiusmodi medicamenta, quæ ad depilandum, & ne pili iterum recrecant, vsurpantur: Et vel illinuntur aut affricantur, vel alio modo adhibentur, ex simplicioribus primùm sequentibus.

A plantis desumptis, Dryopteris radicem tritam & Cyperum Babylonæam affricata, pilos auellere docet Dioscorides.

Lupinorum farina, cum Oleo vel Aceto vsurpata, aliquid præstare dicitur.

Vitis albæ seu Bryoniæ acini rubri, sicuti coria depilat, vnde plantam hanc Psilotrum nominarunt, sic & pilos affricati demunt. Quibus contusis vt minùs exulcerent, Acetum addi potest.

Succus Tithymalorum efficaciter id facit, sed faciliè inflammat, vnde Albumine oui vel Lacte aut Oleo contemperari poterit. Idem facit succus Cucum. asini eodem modo illitus.

Alij succi potius ne renascantur pili, illinuntur: Veluti Fumariæ, Brassicæ: Inprimis narcotici, Hyosciami, Cicutæ, Papaueris succi.

Aquam ex illis plantis narcoticis exstillatam, idem efficere creditur, si sæpè eâ madesiat locus, vti & Telephij & Semperuiui, separatim simulve mista.

Liquor seu succus exudans è sarmentis vitium dum cremantur, vtilis esse perhibetur.

Gummi Hederae dissolutum liquore conuenienti, valdè probatur.

Ab animantibus petitis, Leporem marinum & Vrticam marinam, per se vel inuicem trita apposita, approbat Diosc.

Formicæ insuper cum ouis contusæ ad motæ probantur.

Oua Formicarum item contusa addito Lacte canino, vel farinâ Lupinorum cum Aceto forti.

Talpæ, Ranarum viridium, sanguifugarum pulueres vel cineres, cum Oleo vel Axun-

gia admota; Vti & Salamadræ & Noctiluçæ. Quæ si ouis Formicarum contusis excipiantur, efficaciam maiorem adipiscuntur.

Stercus Hirundinum cum Aceto idem præstat.

Humores item aliqui inuncti: Veluti sanguis Vespertilionis, Ranae, Testudinis cum Aceto, Talpæ cum vitreolo: Lac item caninum, Fel tauri vel Pulli nigri, vrina Canina.

Decoctum Talpæ cum aqua Salis ad consumptionem pæne factum, pilos auferri prædicant, sed renasci albos.

Oleum in quo Salamandra marina decocta fuerit, à Dioscorid. additur; alij oleum Hyosciami applicant.

Sal sæpè capiti inspersum amouere capillos dicitur.

Crocus ferri quem Martis vocant, cum oleo illinitur.

E' compositis efficacius magisq; probatum psilotrum sequens existit: R. Calcis viua 3.j. Auripigmenti 3.j. vel. 3.j. β. adde parum Albuminis oui & tâtillum Lixiuij tonforum, vngatur Locus cum digito, & intra quadrantem horæ abluatur & fricetur Lixiuo. Si non recedunt, auge parum per auripigmenti quantitatem, atque experire donec succedat. Sunt qui Sapone Gallico hæc excipiunt, sicque illinunt.

Rusma à Turcis appellatum, aliquod fossile ferri excrementum seu scorizæ simile, sed leuius, nigrum & veluti adustum, psilotrum esse præ cæteris omnibus efficacissimum, Turcicisq; sceminis, illiusq; loci populis vstitatissimū, docet Bellonius, quod sine vstione loca glabra reddat, nullo pilorum remanente vestigio, si illius puluis adiecta Calcis viua pulueris mediâ parte, in Aqua simul macerata inungantur, & postea in balneo mox iterum vnâ cum pilis abstergantur. Fortè chalcanti hoc rusma genus aliquod erit, sory vel melanteria vocatum, ad descriptionem illius proximè accedens.

Alia Psilotra sic aliqui parant: R. Calcis viua 3.j. Auripigmenti 3.β. puluerisata decoque in Aqua vel Lixiuo: Postea illine.

Alij cineres Cornu cerui, cum mediâ quantitate Auripigmenti in Aqua fluuiatili decoquant, sicque vtuntur.

Auripigmenti puluis succo Hyosciami exceptus & inunctus, pilos euellit & renasci prohibet, vel saltem ne dolorem sæuiorem inferat, succus ille additus impedit.

Aliud efficax: R. Auripigmenti 3.j. gummi Hederæ 3.v. fiat puluis, adde Quorū formicarum contusorum cochlij. & cum Aceto incorporentur. Potest & sanguis Vespertilionis vel Ranarum addi, vel succus Hyosciami, fortè ne iterum renascantur.

Vsurpant aliqui decoctum Tithymali in Aceto, additâ Calce viuâ, si excoriet, Malua simul incoqui poterit, vel potius Lacte contemperari.

Aqua pilos demens & renasci prohibens: R. Salis nitri 3.vij. Aluminis 3.vj. contundantur: Exstillatâ aquâ madesiat locus, atq; vbi siccata fuerit, repetatur.

Lixiuum in quo coxerint radices Vrticæ & in quo ferrū equi rubiginosum contineatur, idem efficit, si pilis per depilatoriū prius ablatis in dies ter eo calido locus lauetur. Ne renascantur præcipuè prohibetur, hoc medicamento: R. succor. ex Narcoticis prædictis 3.ij. sanguinis Vespertilionis vel alterius ex supradictis humoribus 3.β. sicque vsurpetur, addito & gummi Hederæ. Vel illis mucago Psyllij ad 3.β. misceatur, vel pulueris Cerusæ & Plumbi vsti an. 3.j. addatur.

Vel: R. Opij 3.β. Sanguinis draconis 3.j. β. coquantur in Aceto, addito interdum succo Hyosciami.

Aqua elicita probatur ex plantis vel succis Papaueris, Hyosciami, Cicutæ, Telephio & Semperuiuo, addito sanguine aliquo ex supradictis, item Alumine & Aceto.

Euellantur aliàs pili, non vi, cum plures sic extraherentur non sine dolore, atque si singuli euellendi, multum temporis requireretur & molestia; sed arte alia, & ferè sine dolore, Emplastro quodam tenacissimo, illic vbi eos eradicare volumus, cuti impoſito retentoque aliquandiu donec firmiter adhæserit, posteaq; iterum detracto; sic enim pili emplastro inhærentes, non magno labore educuntur.

In hanc rem valdè conueniens: hoc est: R. resinæ Abietinæ, quâ lectos nostræ inungunt mulieres, vel Laricæ, circiter cochlearia

41

ria quatuor, Mastiches instar auellanae pulverisatæ, dissoluantur & coquantur parum ad ignem, continuò agitandò, & postea in aquam frigidam effusa, malaxentur pro Emplastro.

Aliter paratur etiam additâ Colophoniâ, & paucò gummi Ammoniaco, vel Galbano, sic enim cute emollitâ aniplius, facilius pili cedunt.

Additis quibusdam quæ pilos simul euellunt, & actû & potentiâ operabitur, veluti Gummi hederæ.

Vel sic: R. Picis naualis 3.ß. Mastiches vel Gummi hederæ 3.ij. Auripigmeti 3.j.ß. cum Resina fiat emplastrum.

Absecantur pili facilè forficulâ, sed longè exactius rasorio, cute prius Aquâ calidâ, vel Lixiuio nonnihil calefactâ, humectatâ & emollitâ, vti aliàs pili quos penitus auferre volumus, abradi solent; sed quia tunc adhuc extremitates ipsorum poris infixæ remanent, atque apparenter coloratam cutem reddunt, & quia subitò iterum emergentes, eam exasperant, & quò frequentius abraduntur, eò crassiores euadunt, abrasio sola hanc deformitatem non auert, sed tantum, vti vocant, ad tempus palliat.

Vritur cutis per imper, non ad auferendos pilos, cum tunc absecuntur, sed ne renascatur, cum radices pilorum sic absumantur, & pori oblitterentur. Quod vti psilotris fortioribus quoq; effici posse ostendimus, sic & cauterio actuali perficitur. Fieri q; hoc debet Bractea auri ignitâ, subitò per cutem deductâ; sic enim etsi vltio appareat, eâ tamen sanatâ post se maculam cicatricis minimè relinquit.

Carnositas seu Pinguitudo nimia corporis illiusve partium, ne grauamen aliquod aut tarditatem ad actiones obeundas adferat, potius præcaueri aliquo pacto, quàm tolli debet, cum si corpus, quod prius grande erat, admodum attenuetur, rugosum, inæquale & deformè fiat: Vti & priuatæ aliquæ partes, veluti mammae vastæ cum subsident, flaccidæ & pendulae fiunt: Quemadmodum & genæ, suræ, venterque qui prius distentus erat, si collabatur, admodum rugosus apparet.

Verum ad præcautionem huius molis antequam corpori adueniat, vel correctionem aliquam illius si iam adsit, ne præsertim vterius augeatur, illud, sanguinis illiq; innatæ pinguedinis nimium prouentum impediendo, præstabimus: Idq; primum per cibandi rationem parcam, vel quæ parum nutriet. Cæterum si saltem moderatius quàm aliàs eâ vti solebant, vtantur, cum per eam sanguis magis laudatus potius, quàm parciore gignatur, ad molem corporis minuendam parum cõferet. Et si multum de ea detrahatur, cum eam diutius non ferant, nec hanc viam illis præscribendo, multum proficimur. Sicuti verò si victu pauci nutrimur vti assuescant, & à plantis petita potius quàm ab animalibus comedat, Aquamq; potius quàm Vinum, vel illud saltem tenue & inualidum, bibant, sicque corpus emacient, & per hanc regulam exquisitiorem castigent.

Labore valido & continuo, corporum substantiâ plus solito absumptâ, illiusque præsertim pinguedine, ea spacio temporis quoque decrescunt, tandemq; marcescunt, præsertim si victus ratio prædicta huic accedat. Exercitiis aliis, cum concoctio melius procedat, corpora potius augentur, quàm diminuantur.

Euacuationibus magnis aut sæpè repetitis, per quam sanguis & succus nutriens corpori vel partibus subtrahitur, illarum quoq; incrementum vel prohibetur vel emendatur. Vti per sudores multos; calore ob motus validos vel balnea, aliòve modo, sæpè repetitos. Per sanguinis emissiones venâ sectâ, scarificationes, per purgationes frequenter usurpata. Quæ vti studio in hisce casibus instituuntur, sic casu ex largâ sanguinis profusione, vel seminis in venere immoderatâ, aut alui fluxionibus magnis, vel morbis diuturnis aut acutis corpus absummentibus, illius carnositas tollitur, macilentiaq; inducitur. Quod & ob senium illis accidit.

Alterantibus quæ calidam & siccam corporis cõstitutionem perseueratè gignunt, vt minus obæsum & carnosum fiat, potest effici, vel si tale iam fuerit, diminui. Qualis temperatura, victus ratione vel medicamentis eiusmodi, aliòve modo tandè inducitur.

Corporis
partium
vtilium
quarundam,
Carnositas seu
Pinguitudo
nimia
curat.

Inprimis verò ad obæfos extenuandos commendant decocta quædam sæpè bibita, facta in Vino, vt Coryli iulum qui ab ea dependet. Item radic. Polypodij & herbæ Cariphyllatæ, Cancami, Rosmarini, addito Zingibere:

Vel Aquam ab hisce exstillatam sæpè sumptam.

Acetū frequenter bibitum idem molitur.

Quod & pulueres ex sequentibus cum vino haustos præstare aiunt, veluti semin. Fraxini, Polij, Petrofelini.

Item Tartarum vini sæpè datum, vel gummi Sandaracæ 3.ß. cum Oxytelite: Sal item Viperarum.

Piperis frequentem vsum maciem inducere docetur.

Pilulæ ex amarīs paratæ 3.ß. pondere singulis matutinis sumptæ ad idem conferunt. Vt ex radic. Aristol. Gentianæ an 3. j. rad. Rubiæ, summit. Centaurij minoris ana 3.ß. Aluminis 3. j. cum succo Polypodij vel Cariphyllatæ fiat massa.

Mammarum incrementū, præcipuè prohibere mulieres quæ pulchritudini student, conantur, tum vt minores maneant, quod venustum esse putant, vel ne in nimiam molem excrecentes oneri etiam sint; quod tutius nonnihil quàm in cæteris partibus, cum certo tempore primū prorumpere incipiant, fieri potest.

Perficiturque non solum obseruatis iis, quæ totius quoque corporis incrementum impedire, modò diximus, sed & topicis admotis, quæ nutrimentum ipsarum repellendo, refrigerando aut adstringendo, vel absumendo, vi digerente & exsiccante, sic quoque ne vltra decorum excrecant, eas retineant.

Quod iisdem quoque remediis, quæ ad lactis prouentum in vberibus impediendum, vel illud quod genitum est resoluendum, in lactis exuperantia descripta sunt, mamillis applicatis ex parte præstari potest.

Ad hæc fomentatio mamillarum sæpè iterata cum spongia, vel panno linteo intincto, & admota relictaque donec siccetur, incrementum eorum prohibet. Paratur ea ex decocto in Vino rubro, addito & Aceto, Al-

chimillæ, Equiseti, Myrthi, Plantaginis, Rosarum, Melissæ, Menthæ, Gallarū aliorumq; adstringentium.

Vel fiat ex diluto aut decoctione Salis ammoniaci & Aluminis in Vino.

Aqua stillatitia elicita ex supradictis, similiter vsurpari potest, addito Alumine; probatur & aqua è nucibus Pineis immaturis exstillata.

Item alia, ex Ovis conquassatis, cum Alumine & Cretæ albæ pul. in pastam redactis elicita.

Cotonea, Poma, Pyra immatura, Mespila, Sorba, Pruna syluestria confusa cum Aceto mista, vel in eo cocta, apposita similiter operantur. Vel cocta in Omphacio, unā cum putamine Gallarum.

Inprimisque Cicuta recens confusa per se vel cum Aceto applicata: folia item Hyosciami: Dein & Mentha & Melissa.

Conuenit & sequens emplastrum: R. Mastiches Thuris ana 3.ß. Gallarum, Nucum cupress. an. 3. ij. Boli vel Argillæ aut terræ Cimoliæ vel Rubricæ fabrilis 3. iij. puluerisata excipiantur Alumine oui & Aceto vel Melle: Et sic applicetur.

Vel: R. cortic. Granatorum 3. iij. Balauft. 3. ij. Acaciæ vel Hypocistid. 3.ß. excipiantur Aceto & mucilagine seminis Psyllij.

Vel vtatur hoc vnguento: R. Cerusæ 3. iij. Alabastri vel Cretæ albæ 3. ij. Camphoræ 3. j. Boracis 3.ß. infusionis gummi Tragach. 3.ß. olei Myrtini q. s. fiat vnguentum.

Attritura quæ ex coribus duabus mutuo attritis secedit, aceto mista, pro inunctione commendatur. Naxiam corem illitam eas cohibere ne excrecant, docet Dioscorides.

Squatinam piscem mamillis impositum, admodum eas constringere à quibusdam perhibetur.

Paruitas corporis aut membrorum nimia, insita ab ortu, emendari nequit, neque alia vi mutilata membra reparari amplius possunt, nisi quod arte per instrumenta quædam, quibus & amissas partes aliquas effingi posse, in numeri defectu diximus, quod in magnitudine decedit, in quibusdam suppleri queat.

Aliàs quoque in locum alicuius membri portio-

Corporis illiusre partium quarundam partium curatio. Partium mutilarum curatio.

portionis amissæ, noua quædam caro supplantari, illaque ad formam prioris aliquo modo efformari potest. Quod in Naso ex parte ablato, chirurgi quidam ingeniosi efficere se posse prædicant, qui refricatâ cicatrice cuticulâq; à nâsi extremitate abrasâ, in musculosa carne brachij ipsius ægri vulnere secto, diuisioni, nâsi remanentiam eo modo vti diximus, cuticulâ denudatam, utrique nari prius stylum imponentes, indunt, caputque cum brachio conuincunt, sicque iuncta, donec naso caro noua accrescat, retinent, quo facto portionem quæ naso formâdo sufficiat, excindunt, & ad formam prioris adaptant, naresque stylis exemptis aperiunt, & dein nouam cicatricem illi obducunt. Quod si in naso succedit, etiam in aliis membris mutilatis, similiter tentatum procederet, & licet adnexa hæc, caro parti ad functiones edendas nullum subsidium præberet, tamen deformitatem illius nonnihil sic quoque tege-
re posset.

Papilla-
rum ab-
sumpta-
rum cu-
ratio.

Ad papillas omnino vel ex parte amissas, aliquo pacto educendas, eousq; vt infans per eas fugere possit, capulam Glandis vel semitestam Auellanae, Resinâ iariceâ vel aliâ impletam, illic vbi hæ defunt, applicare, atque aliquandiu retinere solent mulieres.

Gingi-
marum
consum-
ptiarum
curatio.

Gingiuarum carnosâ caro, cum nuda veluti sit, nec crassiore tunica obsecta, attritione consumpta, regenerari aliquo pacto rursus potest. Quod vt efficiamus, si putredo vel alia corruptio gingiuas adhuc occupet, ea primum auferenda erit. Idq; Aceto squillitico, eas frequenter fricando vel Omphacio cum Melle. Vel etiam fortioribus, vt mixturâ ex puluere radice Draconteæ cum Melle, misto paratâ: Vel vnguento Ægyptiaco contemperato cum Vino, aliisve eiusmodi abstergentibus putredinemque arcentibus, in oris vlceribus expositis.

Postea ad regenerationem huius carnis, siccantibus sarcoticis, quæ & eam dentibus conglutinant, frequenter gingiuas perficient. Vt hoc puluere, qui ex radic. Ireos 3.j. farin. Orôbi 3.ij. Thuris masculi vel Mastiches 3.j. Sarcocollæ 3.ß. Aluminis vsti 3.j. radic. Angelicæ, boni odoris gratiâ, vel Cyperi vt vult Dioscorid. aut Gariophyll. pa-

rum, vel Moschi vel Ambrae tantillum, fiat puluis.

Commodè etiam addi potest radix Aristoloch. sed amara est. Item Myrrha, sed ingrata est, illiusq; proin loco Benzoinum vel Storax sumi poterit. Vtiliter & Sanguis draconis additur, sed admodum rubore dentes afficit. Quod & Hæmatites qui alioquin etiam conuenit, facit.

Conferunt & cineres Pulegij, vt docet Dioscorides. Item Cornu cerui vsum, Spodium, aliaq; multa ex supradictis, quæ dentes mobiles firmare docuimus, eoq; magis, si ob gingiuarum absumptionem vel relaxationem dentes minus firmi sint. Competût & dentifricia siccantia, in dentium immunditie exposita.

Calcinatio Thuris & Mastiches puluerifactorum, Melle permistorum, addito in super puluere Corallorum & pauco Salis vel Aluminis, puluerisata & affricata multum proderit.

Trochisci de Orobo ex farina illius Melle subacta parati, plerunque in hoc affectu vsurpantur.

Possunt & pulueres prædicti, Melle vel Oxymelite squillitico excipi, sicque in trochiscos formari, ad vsum exiccari & asseruari.

Orificiorum quorundam nimia angustia, vt Vteri sinus & præputij in Phymosi, si tanta sit, vt non solum deformitatem pariat, sed actionem illius tollat, vel saltem difficilior rem reddat, tunc ea dilatanda erit, idque vi sectione factâ. Quæ in Præputij phymosi cutem diuidendo, vel circumscindendo & portionem anteriorem aliquousque præscindendo, vt in circumcisione faciendâ hoc adeo frequens est, sine periculo potest perfici.

In Vteri sinus orificij nimis arcti latere, diuisio sectione factâ illud ampliat, vt hoc sæpe quoq; tentatum auuit, et si maiore cum dolore & labore fiat.

Quapropter non nisi tutoribus præmissis prius, si fortè ea iuuarent, rem aggredi decet. Fouenda igitur hæc loca admodum relaxantibus, humectantibus & emollientibus foribus & balneis, vel vngenda, idem præstantibus vnguentis, aut pessariis intro-

Orificio-
rum quo-
rundam
angustia
curatio.

Phymo-
sis cura.

Vteri si-
nus an-
gustia
curatio.

intromissis, qualia varia in vteri ceruicis duritie, & scyrrho fuerunt exposita. Quibus dum utimur, Turunda crassa, quæ orificium hoc adimpleat, ex radice sicca Gentianæ, vel Spongiâ arêtè ligatâ, formata, illi immitti debet, vt dū intumescit, sensim foramen illud diducat, atq; sic si sæpe repetatur, dilatet.

Gracilitas vehemens corporis certarumve partium, non quæ ob consumptionem eius accidit, sed originalis existit, plerunque talis permanet, nec immutatur. Aliàs verò ad carnositatem, vel pinguedinem aliquam à contrariis causis, quæ sanguinis & succi inde nati nutrientis proventum augent, reducitur. Veluti viuendi ratione decenti, in cibo, potu, somno, euacuationibus naturalibus, corporis animique motibus instituta; vnde aliqui habitiores fiunt.

*Mammæ
marum
gracili-
tatis seu
Molli-
tiei &
Flacidi-
tatis
curatio.*

Mammarum inprimis gracilitatem, quæ cum molles flaccidæ & pendulæ sunt, illis accidit, & pro turpi habetur, corrigere student mulieres illæ, quæ venustatem corpori conciliare curâ student cosmeticâ. Adhibitisque indurantibus, eas duriores firmioresq; reddere contendunt; iisdem ferè præfidiis topicis adstringentibus & siccantibus, quibus & incrementum ipsarum impediri diximus.

*Partiū
figure
indecentis
curatio.*

Figuræ indecentis partium quarundam vitia ipsas deformantia, quæ præter ea, quæ in numero & magnitudine peccant, ipsis accidunt, de quibus iam egimus, quando alias malè formatæ sunt, ut caput, nasus, os, aliaue loca, cum ab ortu talia procedant, correctionem nullam admittunt. Vti nec dentium vnguiumq; eiusmodi inæqualitas formæue alia vitiosa.

*Pilorum
crisporū
emendatio.*

Quæ si in pilis se offerat, vt cum curui vel supra modū crispi sunt, eos abscidendo si plures sint vel euellendo si pauciores, auferimus. Quod tamen cum adeo indecorum minime sit, non ita necesse est moliri, nisi molestia aliqua inde sequatur; Vt sit quando in palpebris curui nascuntur, inflexique oculi sedisse inferentes eam pungunt, quos auferre cogit necessitas.

Rectificari quoq; eiusmodi pilos curuos posse existimât, si viscositate Limaquum, obiter tågâtur: Quod & glutine alio fieri potest.

Recrefcere etiam rectos euulsis prioribus docent, si pori, quibus insitebant pili, oleo, in quo Lacerta cocta fuerit, sæpe vngantur: Vel sanguine Ranæ, præsertim si radice Laureolæ puluis vel cineres Origani combusti, illi permisceantur.

Rectos penitus pilos, - cum aliqui certis præsertim in locis minus decoros esse, crisposq; illic magis decere existiment, eos arte crispas reddere student; idque præsertim vehementer astringentium vsu. Qualia inter ea quæ pilos denigrant, exposita fuerunt, eligendo efficaciora; vt pro ablutione, decoctum Gallarū, cortic. Granatorum, Nucum cupressi, Balaustiorum similiumq; cum Lixiuio factum. Quibus & alia addunt quæ pilos crispas existimant, vt radic. Asphodeli, Ebuli cum folijs, semen item Hyosciami.

Illinuntur quoque ex iisdem parata vnguenta, veluti: R. olei Myrtini vel Lentscini 3. ij. olei Hyosciami 3. β. succi Myrti & Aceti ana 3. j. coquantur, adde pulu. rad. Asphodeli vel Ebuli 3. ij. cineris Castanearum echinorum, nucum Pinearum ana 3. β. rasur. Cornu arietis, gummi Arabic. Trachach. ana 3. j. Myrrhæ 3. β. Mellis q. s. fiat vnguentum.

Alij idem præstari posse existimant, si Mucilaginosi sæpe abluantur, in Aqua vel Lixiuio coctis, vt radic. Althææ, seminibus Lini, Fœnogr. Psyllij, item Gummi Arabico, fortè sic pilos emolliri, Vt facilius curuentur, credentes, vel poris inde relaxatis amplioribus factis, minus tunc rectè pilos, sed curuatiim procedere existimantes. Alij simul rad. Filicis, fol. Betæ, Lithargyriumq; addunt, & siccatos rursus pilos, oleo Myrtino inungunt. Sunt qui radicem Ebuli cum oleo tritam capiti illinant. Ferro cadente pilos obvoluendo mulieres certius illud perficiunt.

Diuisio in parte aliqua, quæ vnita esse debebat, siue post vulnus curatum remanserit, vel separatio hæc illius ab ortu processerit, si in carnosiss locis eueniat, vniri rursus potest. Veluti illa scissura labij superioris, quam infantes aliqui in lucem secum adferunt, ad modum deformans, quam Has. nscharr. vocant, in qua labia iterum concrefunt, si vtrinq; à lateribus ipsorum, vbi diuisa sunt, carnistenuis portiuncula, cuticulâ inuestita, ampu-

*Pilos re-
ctos ri-
stos red-
dentia.*

*Partiū
quæ vnita
esse
debebat
Diuisio-
nis cura.
Labij
superioris
vbi diuisa
fuerit
cura.*

49

amputetur, posteaq; sutione vel aciculis infixis labia coniungantur, emplastrisque impositis, donec rursus coalescant, retineantur, eoque modo, quemadmodum in vulnere cura descripsimus, procedatur. Quod & in aliis locis diuisis, si deformatio aut incommodum inde sequatur, si fortè concreverent, eo modo tentari poterit, quod in carnosioribus sedibus succedit, in aliis vero ægrè.

Gingivaru separatio à dentibus ratio.

Gingivaru separatio à dentibus, si à violento morfu procedat, ab eo cauere oportet, atque potius in sano loco, ubi cibi erunt masticandi. Si à tophis adnatis oriatur, illi primum erunt extergendi vel auferendi, cum hisce præsentibus, caro minimè possit accrescere; quibus ablatis, caro melius dentium radicibus adhærescet, nonnunquam & denuò coalescet. Ob eamque causam remedia quæ in hanc rem adhibentur, ea potissimum sunt, quæ dentes mundificare, in ipsorum immunditie exposuimus; & quæ carnem generare in gingivaru consumptione diximus, cum illa dentes repurgando, hæc carnem non solum generando, sed eadem vi siccante conglutinando, sicuti illic ostensum, id præstare possint.

Præter quæ ad conglutinationem hanc, collutiones oris, quæ & siccando & cōstringendo id præstant, adhiberi possunt. Qualis hæc est: R. radic. Consolidæ, Pentaphylli, Ireos ana 3. j. radic. Aristolochiæ, Panacis ana 3. β. radic. Angelicæ & Cyperi ana 3. ij. herb. Pimpinellæ, Verbenæ, Hyperici, Pulegij ana M. j. Rosarum rubr. P. j. Balaustrorum 3. ij. Myrobalan. citrin. 3. iij. femin. Orobi 3. ij. Mastiches, Thuris ana 3. β. decoquantur in Vino & Melle, addendo parum Aceri squillit. aromatiz. Cinamom. Colluat eo os frequenter. Addi potest & Aluminis parum.

Dentiu fractura, Cavitas & Corruptionis curatio.

Dentes fracti vel diuisi aut abrupti, vel caui aut alioquin carioli & corrupti, reparari amplius nequeunt, & proin si inutiles sint, & molestiam adferant, euellendi erunt. Quod si verò adhuc vsum aliquem in masticatione præbeant, præsertimque si ob vicinorum aliorum absentiam, illis adhuc opus sit, tunc relinquendi: sed ne ulterius corrumpantur, quantum fieri potest, prospiciendum.

Quod fit si eam oris sedem sæpè colluamus, decocto radic. Capparorum, Pétaphylli, Aristolochiæ, Cyperi, fol. Menthæ, Gallarum, sem. Nigellæ, baccarum Lauri, in Vino vel Aceto, vel Aqua ferrata facto.

Valetque præcipuè decoctum rad. Tithymali in Aceto.

Hisce Alumen additum, efficaciora hæc reddit.

Vel colluat os aqua Saluiæ, Rosmarini, cui & Sal. & Vinum permisceantur.

Aut Acet. squillit. parum diluta, si nimis sit efficax.

Fricentur in super dentes corrupti, dentificiis in sorditie & discoloratione ipsorum mundanda expositis, quæ siccando etiam corruptionem arcent. Vel puluere sequenti: R. Osis sepiæ 3. ij. Coralli vsti, Cornu cerui combusti ana 3. j. Mastiches, Aluminis ana 3. β. fiat puluis.

Vel ex Origani, Rosmarini, Parietariæ cum Melle & Sale prius permistorum combustorumque cineribus.

In dentem vitiosum indimus puluerem Gallæ, rad. Peucedani, sem. Staphisagr. Pulegij. Aliquando & Chrysocollam Borracem dictam.

Ad dentes auferendos cum inutiles sunt, chirurgi suas adhibent forcipes, & id genus varia instrumenta, quibus eos extrahunt; in quo aliqui adeò sunt industrij, vt cum sine labore hoc eos facere astantibus videatur, se admirandos reddant, atque circumforanei facti populum allicientes, illique hac arte, etiam multa similia se præstare posse, persuadentes, quæstum sic faciant. Nam vniculis vti alij qui mobiles sunt, extrahi, cum firmiter hæreant, vix possunt, eoq; minus, si parum de illis abruptis aut corruptis superfit.

Visione, tum quia radices sic exiccantur, vel dentes confringuntur, vt postea facilius excidant, vel eximi possint, effici potest. Quod immisso in cauum aut cariosum dentem, Cauterio actuali, stylo scilicet candente, vel potenciali, vel Aqua forti, vel lacte Tithymali, Sory: sicuti in dentium dolore hæc quoque proposita fuerunt, perficitur. Ranunculi radicem, Cyclaminis succum immissa, idem præstare docet Dioscorides.

Aliaq; quæ tamen caustica minimè sunt, vt rad. Chamæleontis nigri, Chelidonij succum; Olei amurcam cum omphacio, Cedriam & Pastinacæ piscis aculeum.

Vt sponte elabatur dens, cõferre posse putant, si in illum immittatur Gummi Hederae, vel adeps Ranæ viridis aut temporariæ, sanguis Lacertæ.

Vel si denti ipsiusve radici admoueatur (prius reliquis munitis fermento aut cera, ne eos quoque tangat) rad. Mori per triduum in Aceto infusa, siccataq; postea & puluerisata.

Hyosquiami item nigri radix vel folia, admodum calefacta; radici dentis adnota.

Colocynthis quoque sylvestris in Aceto infusa, trita & cum Melle cocta.

Vel & pingued. Ranarum, succi Chelidonæ & Aquæ vitæ æquas portiones: Et illic vel impone.

Aut succum Chelidonij atque Arthemisiæ cum Aceto sic adhibe.

Eruca folijs caulium adhærens denti appositâ idem facere docetur.

Aqua elicitâ ex sale Ammoniaco, similiter operari censetur.

*Vnguin-
Scabri-
ties et Fi-
surarum
curatio.* Vngues scabri vel fissi reintegrari aut æquales fieri nequeunt, sed crescendo procedentes tandem abeunt, quod vt melius fiat, neque alij similes succedât, vel quando subsistunt vt auferantur, primum leuioribus admotis illud tentatur.

Veluti Pice, Cerâ, Resinâ, liquefactis & applicatis, Mastiche item, Colophonia cum Terebinth. dissol. addito interdum & sulphure.

Passulis itidem per se, vel cum Oppopanax mistis & admotis.

Radice Lapatii in aceto addit Diofcor. & Chelidoniû minus, Cupressiq; pilulam.

Nasturtium cum semine Lini etiam probatur.

Quibus & Ciminum, radic. Costi adduntur, Melleque vel pulpa Passularum aut Axungia excipiuntur, misto & Sale quandoq; vel Alumine.

Fortiora vngues scabros detrahentia, sunt radices & folia Ranunculi applicata.

Arsenicum cum Visco, vel gummi Sera-

pino aut Cerâ vel Sæuo aut Oleo cõmistum.

Aut Cantharides cum vnguento Rosaceo vel alio.

Pilorum fissuræ seu scissuræ, nisi in pluribus hoc fiat, negliguntur: Cui vitio si quodque emendationem adhibere velimus, fissi pili pars tenuior erit vltcrius, singulos pilos diuidendo, detrahenda, atq; ea quæ remanet circa extremitates Felle inungenda: eaque postea rursus decocto aliquo pilos generante, veluti ex Abrotano, Capillaribus herbis rad. Cannarum alijsq; in simplicibus quæ pilos producunt expositis, facto, eluenda.

Sunt qui mucilagine aliqua vel visco aut colla diuisos eiusmodi pilos rursus conglutinando, tempus inutiliter impendunt.

*Furfuris
curatio.* Furfures capitis, quando non sponte, sed ex fricatione solum decidunt, negliguntur, vel solâ pestinatione. & frictione capitis ablutioneque ex lixiuio consuetâ, auferuntur. Quando verò admodum exuperant, & perse continuo delabentes, vestes perfundunt, vti & si in barba conspiciuntur, indeq; prodeant, aut etiam alijs in sedibus occurrant, tunc cura illis adhibetur: Corpore prius purgato, si ab excrementis gignantur: Vel morbo sanato, si inde proueniant.

Topica quæ adhibentur, sordes & serosus humores cuticulam exedentes, furfuresque sic gignentes, consumere atque abstergere debent, & mitius validiusq; id præstare, prout pertinaciter hæc hærent, additis semper etiam lenientibus, vt cum hæc cutem admodum siccando exasperent & findant, leniendo hoc simul impedianr. Vel hisce post aliorum vsum primum ob eam causam vtendum.

Ablutiones varijs modis sunt; Imprimisque Lixiuio communi vel tonsorum, quod validius est, adhibito insuper Sapone, illum simul affricando; quæ communis est ratio.

Vel Lixiuio permisceatur succus Betæ aut parum Aceti; Item Mel & parumper Fellis.

Vel loco lixiuii, Vrina, Aqua salsa aut Vinum sumatur, eaque simpliciter vel additis iam dictis vsurpentur.

Aquâ calidâ facta ablutio, exasperatam

53
cutem vfu detergentium, iterū lenit, quare post horum vsum adhibetur, in qua Malua, Fœnogræcum prius coqui possunt.

Decoctum fol. Salicis & corticis eius, pro lotionē valdè probatur.

Vel decoctum Blii albi & Brassicæ cum radic. Item Maluæ, Parietariæ Saponariæ, Lupinorum, Fabarum, Fœnogr. Melonum, & baccarum Euonymi. Item rad. Cūcum. asin. Squillæ.

Inunctiones variæ in hanc rem sunt: Potestq; sequens vnguentum parari: R. olei Amygdal. amar. vel Nucum ʒ.ij. olei Viola-
cei, Irini vel Cheirini an. ʒ.j. succi Blii ʒ.ij. ʒ. Aceti ʒ. ʒ. coquantur parū adde Fellis tauri ʒ. iij. Sulphuris ʒ. ij. Vitreoli ʒ. j. Nitri ʒ. ʒ. fiat Linimentum. Quod & Colocynth. ʒ. ʒ. addita efficacius reddit.

Vel: R. nucleorum Amygdal. rostorum & Nucum rancidarum ana ʒ. ʒ. contundatur in pastam. Vel horum loco sumatur farina Lupinorum & Fœnogræci, miscendo pul. Sulphuris ʒ. ʒ. Boli vel alteris Terræ pinguis, (Cimoliam laudant) ʒ. ij. Fæcis Vini ʒ. j. Fellis tauri ʒ. j. Mellis communis vel squillitici q. s. fiat Linimentum. Potest ad di seminis Sinapis vel Staphisagriæ ʒ. j.

Cinis rad. Liliorum vel Allij, Melle exceptus & inunctus.

Myrobalanorum citrinarum puluis cum succo Blii & Aceto inungitur.

Oui vitellum & albumen, testâ illius confractâ, capiti infusum & inunctum, postea ablutum, admodum lenit, post detergentium exasperatam cutem, vsum.

Pomata illitio, vt minus findatur cutis, cauet.

Aqua conueniens fit ex summit. Hyperici, Chamæpithydis, Parietar. vel Saponariæ ana M. j. ʒ. farin. Lupinorum, Fœnogræc. ana. ʒ. j. Sulphuris ʒ. vj. Tartari ʒ. ij. Nitri ʒ. j. affundendo Vini rubri ʒ. j. Aceti ʒ. ij. aquæ Rosarum ʒ. j. Eliciat aqua.

Frictio capitis cum Sale vel Nitro vel farina Lupinorum conuenit.

Pestinatione furfures decidunt & velutiningunt.

Manu vole Squamæ in manuum vola abscedentes, quæ in affectu quem Pelatellam Galli vocant, si-

mili ratione vti de furfuribus diximus, abstergentibus & simul emollientibus abiguntur. Vel si ad viuam cutem usque desinant, iisdem remedijs quibus Abrasiones cutis sanari diximus, curantur.

Concretio partium quæ dissitæ esse debebant, vel orificiorum quæ aperta esse oportebat, ab ortu vel casu alio producta, vix dum aliâ ratione quàm per vim inductam rursus diuellitur. Et proin si hæc continuatio partium non adeo actionibus incommodet, sed solum quia inconsumpta deformis aliquo pacto existat, negligitur. Quod si verò functionibus plurimum obsit, qualis est foraminum quorundam vt Cervicis, Vteri, Podicis, aliorumve obturatio, tunc sectione vel cauterio ea referare necessitas cogit, eo pacto sicuti in functionum illarum læsionibus descriptum fuit, quod eò facilius & tutius succedit, si illa concretio interueniente solum membranâ vel carne non adeo spissâ, facta sit.

Occlusio sola citra concretionem orificiorum stabilis, vti Oris in spasmo, cum similiter actiones impediatur, in harum defectu, quo pacto hæc aperienda, edoctum fuit.

Coniunctio alia partium minus decora permanens, cum in pilis inuicem intricatis tantum ferè se offerat, pestinando ordinariè facile corrigitur. Quod si verò complicati & integri tricas referentes è capillis vel barbâ dependentes, deformationem maiorem pariant cum aliud impedimentum minimè adferant, plerunque intacti relinquuntur, cum eos amplius discernere vix possimus, & si amputentur, sic inuoluti recrescant. Minusque hi qui eiusmodi tricas gestant, in illis corrigendis laborant, cum virilitatis hosce indices statuantes, illis eas decori potius, quàm dedecori esse, sibi persuadeant.

In Situs partium peruersione quæ se offert deformitas, si cum functionis illius graui offensa vel dolore iungatur, vt in luxationibus, fracturis, rupturis, in hisce curationibus, horum affectuum fuit exposita: Vti & Gibbi præ cæteris corpus admodum deformantis.

In Digtis pedū ad latera nimium deductis, vel aliò reflexis, cum hoc à calceis vti-

rum cu-
ratio.

Parti-
qua dis-
sita, vel
orificio-
rum quæ
aperta es-
se debeat
Concreti-
onis cura

Pilorum
intricato-
rum & co-
mplicato-
rum tricas
curatio.

Parium
Situs per-
uerfio-
nis cura
tio.

ostendimus; procedat, inprimis ne angustiores gestent, cauendum, hocque vitium sic proueniendum; quod factum postea emendare vix amplius licebit.

*Oculorū.
Promi-
nen-ia.
cura.*

Oculorum ē sua orbita nimia prominentia, ab ortu facta, incurabilis est: Ob conatum verò vehementiorem proueniens, eo cessante, rursū quoque remittit, ita vt applicatione astringentium opus minimè habeant, cum si illa leuiter astringerent, eos reprimere minimè possent: si fortius, oculum corrugando plus nocerent. Et cum nec flatus nec humiditas alia, oculi interiora replendo, oculum protrudere queant, frustra hisce absumendis, vti aliqui faciunt, oculo topica applicaremus.

*Dentiu.
Mobilitatū cura.*

Dentium sitūs permutatio in mobilitate aut vacillatione ipsorum, vt curetur, illiq; in sua sede rursū firmentur; & ne excidant, caueatur, siccantibus & constringentibus ad motis efficitur, eligendo quæ non tanto pere, vti aliqua adstringentia facere solent, dentes denigrent, addendoq; illis quæ gratum odorem ori simul conciliant.

Collutiones oris in hanc rem fiunt, radicum Pentaphylli, Bistortæ, Capparorum, Tapsibarbari, foliorum Myrti, Lentisci, Oleæ, Viburni, Potentillæ, Fragariæ, Mespilorum, Cornorum, Sorborum, Rosarum, Balaustiorum, Gallarum; quæ tamen dentes denigrant, Cortic. Vlmi, Capularum glandium, Spongiæ, Bedeguar, Musci arborei, decoctorum in aqua pluuiali vel ferrata, aut Vino rubro, addendo quandoque Acetum.

Hisce Alumen additum, efficacius decoctum reddit.

Ad humiditatem simul eliciendam, quæ plerunque adest, radix Pyretri simul cum illis incoqui poterit, & ad odorem suauem reddendū, radic. Angelicæ, summit. Rosmarini, vel Saluiæ, atque ex aromatibus quædam. Sunt qui gummosa vnà incoquant, vnde tamen pauca accedit adstrictio, vt Mastichen & similia.

Aliæ collutiones ex variis misturis fiunt. Vt ex Alumine, cum Aceto soluto, addito Melle.

Colymbadum muriam probat Diosc. & Sory in collutionibus.

Ex aquis itē factæ oris ablutiones aliquid quoque efficiunt, vt ex aqua peculi Rosarum, Equiseti, addito Aceto.

Commanducata quædam idem præstare possunt, vt Helenium & baccae Virgæ sanguineæ & Crespini. Itē Mastiche masticata.

Oleum syluestris oleæ ore retentū, commotos dentes firmare docet Diosc.

Pulueres affricantur dentibus & gingiuis in eundem vsū: Vt Corallij alijq; siccantes, quos in dentibus dealbandis descripsimus, addendo Sal vel Alumen, quod vsū magis adstringit: addunt etiam nonnunquam cineres ex combustis Rosmarino, Saluiæ, Myrtho, Lentisco, Oleastro: Item ex ossibus Daſtylorū & Oleæ, & Astacis vsitis. Vel alios pulueres adstringentes, vt radic. Cyperi, Nucis cupressi, Spōgiæ bedeguar, Rosarum, vel Hypocistidis aut Acaciæ & Mastiches, Boli seu Terræ alicuius aliæ pinguis. Odorata itē vt Cinamomū, Garyophillos, Lignū aloës.

Vngues mobiles cum firmari nequeant, vitium inde natum non aliā ratione, quàm si penitus abscedant, corrigitur, præsertim aliis in illorum locum subnascantibus; nisi enim hoc fiat, illaq; loca nuda relinquantur, maius inde vitium exoritur. Vt verò à cute recedat vngues mobiles, aliā arte non opus erit, cum sponte tandem decident. Quod vt citius fiat, Dioscorides vnam passam applicare iubet, &c.

*Vnguiū
mobilitatū cura.*

DE DISCOLO- RATIONE.

CAPVT II.

Genera.

Discolorationem corporis eam vocamus, quando illud colorem alienum obtinet, in Cure, Oculis, Dentibus, Pilis, Vnguibus, vbi patent, apparentem:

Cutis discoloratio, quæ vbi nuda & depilis est, solum apparet, aliàs Generalis totius est corporis, aliàs Particularis quorundam saltem locorum.

Generalis discoloratio cutis est, quando illa vndiq; ferè non vno solum in loco alium colo-

57

colorem à natiuo, qui plus minusve albus seu rubicundus est, acquirit. Vti fit, cum viduum colorē amittit, vel alienum alioquin contrahit, vel inueniunt obtinet, in Cachexia, Ictero, Pallore, Rubore & Nigredine.

Cachexia.

Cachexia discoloratio est, in qua colore florido cutis deperdito, plerumque habitus corporis decens, quem Euexiam vocant, in malum, vnde cachexia dicitur, immutatur. In hoc enim cutis plus iusto albicat seu pallet, vel ex albo liuescit, & ad colorem plumbeum vergit, corporisq; superficies plenior nonnihil tumidiorque apparet. Hunc quoque affectum dyspnœa plerumque comitatur, quæ eos dum se exercent, aut altiora scandunt, maximè fatigat, accedente simul pulsatione arteriarum, circa iugulum & in colli lateribus, cordisque palpitatione, lassitudineque spontanea, in pedibus maximè; inprimisque cordis compressius dolor, de quo præcipuè conqueruntur, illis molestus est. Qui affectus licet omnibus accidere possit, virginibus tamen magis est frequens, eoque tempore quo menses primùm in illis prodire atq; incipere debent, ferè eas inuadere solet, sæpeq; ad multos menses, vel etiam annos durare, mensuris interim minimè superuenientibus; vel si illis quibus iam hæc fluxerunt, eueniat, iis iterū suppressis, Febris quandoq; lenta, vt in febribus dictum, huic affectui copulatur. Interdum verò etiam aliorum morborum, vt ventriculi, hepatis, lienis accidentia superueniunt, vrinæq; nisi alio affectu comite mutantur, plerumq; albæ seu crudæ & aqueæ existunt. Et si hic affectus diu perseueret, corporis totius habitu ampliùs in molem seu tumorem excrescete, Leucophlegmaria cachexiam hanc sequitur, sicuti illic explicabitur.

Cachexia Hydropis initium.

Est & alia cachexiæ species, in qua cum pallore corporis, vt dictum, enarratisque aliis accidentibus, pedum tumor iungitur, qui si persistat diutius, vter similiter distenditur atque intumescit. Hicque affectus seu dispositio Hydropem ascitum præcedit, illiusque veluti principium est, sicuti in hydropse demonstrabitur.

Cachexia tertia species.

Occurrit & tertia species, in qua pallor corporis non simplex, sed colore vitioso ad

flauum, viridem, atrumve inclinante, nondum tamen saturato, vt in ictero, se manifestat, cum compressio quoque cordis dolore, eiusque & arteriarum pulsatione, cæterisque, vt prior, symptomatibus. Quam Cachochymiam à causa communiter appellare solent. Quæ & in icterum, vel etiam hydrophis dictas species conuerti potest.

Est & harum specierum vna, in qua cum indecentibus dictis coloribus, cæterisque symptomatibus, corporis habitus potius decrescit quàm increfcit, corpusq; macrescit atque attenuatur, vnde malè habitum seu cachecticum dici potest. Quæ species si diutius perseueret, corporisque sequatur omnimoda cōsumptio, & tabes, in Atrophiam, à causa sic appellatam, vt in corporis diminutionis affectibus explicabitur, conuertitur.

Cachexia cum atrophia corporis.

Icterus discoloratio est, in qua cutis alieno colore tingitur, quod nomen ab Ictero seu Ictide aue, quæ mustelam vel galgulam esse volunt, cuius intuitu hoc vitium curari putant, illi fuit inditum. Aliàs etiam Arcuatus, quod in oculis colorem arcus cælestis repræsentet, appellatur, Regiusq; morbus, vel quod (vti puto) magnatibus ob intemperantiā sit familiaris, vel quod mulsa, q regius olim erat potus, vti docet, sanetur.

Morbus Arcuatus Regius.

Variat autem hic affectus pro diuersitate coloris potissimùm, qui nunc citrinus est, tuncq; Icterus citrinus seu flauus, à Germanis Gelsucht dicitur: aliàs magis saturatus & croceus existit, aliàs etiam niret & splendescit, & tunc Aurigo ab auri colore nominatur: Aliàs ad viriditatem aliquam hic color tendit, aliàs etiam ad nigredinē, quæ interdum flauitiei præualēt, vnde & tunc Icterus niger appellatur. Qui colores primùm ferè in oculis, mox in facie, vtpote sede patiente, apparēt. Aliàs maiorem corporis partem, vel etiam vniuersam in superficie occupant. Interdum & vrinæ eodem colore inficiuntur, quæ nunc admodum crocæ, nunc nigræ visuntur, adeo vt & illis lintheamina vel indusia, simili colore intingantur: Interim ipsorum excrementis, quæ tincta naturaliter esse debebāt, minimè tinctis, sed cineritiis potius, vel penitus albis existētibus, & proin minimè ad deijciendū stimulantibus.

Aurigo.

Hic affectus per se nonnunquam incipit, & colores primum elucescunt, accedente ferè dolore compressiuo, circa cordis dictam foueam, qui & sæpè iæterum præcedit, & illius est prænuntius, ita vt & hunc dolorem nullâ flauitie adhuc se manifestante, nostri die Gelsucht, quod tam facile eum sequatur, appellent. Aliàs iæterum grauioribus morbi illorumq; accidentia comitantur, vel etiam sequuntur, vt hydrops. Aliàs febres aliòsve morbos, vt colicum, iæterus sequitur. Sicuti in variis eiusmodi affectibus expositum fuit.

Rubedo discoloratio est, eaque momentanea in Iratis & Pudore suffusis, vel diutius perseverans, in illis qui nimium incaluerunt, vel diuturnior, in morbis calidis, febribus præsertim: quæ cuiuscunque generis rubedo, in facie maximè elucet.

*Pallor
seu palli-
ditas.*

Pallor discoloratio est, in qua cutis minùs colorata quàm decebat, existit, seu colorem viuidum amittit. Qualis palliditas in illis qui admodum frigent, se offert, atq; iis qui morerent & tristantur, familiaris est, & terrore percussis subito oboritur, vt & animo delinquentibus, in quibus mortis imaginem tantisper donec ad se redeant, representat. Interdum & diuturnus pallor, morbi alicuius est prænuntius, frequenter quoq; morborum comes, & inconualescētibus adhuc aliquandiu perseverans. Qui pallor vt in vniuerso corpore, ita in facie potissimum se prodit, atque illis in locis, quæ prius magis rubere solebāt, vt labiis & malis, liuidus apparet: Dein & pallor quoque in vnguibus atque in glande, quando eam rubere non necesse est, vel aliàs nequit, obseruatur.

*Nigredo
Æthio-
pum.*

Nigredo discoloratio est, in qua nigra cutis apparet: Estque vel perfecta nigredo, qualem quibusdam ab ortu innatam fuisse, aliqui testantur, quā Æthiopum instar nigri euaserint.

*Nigredo
vulgo des-
ta, uui
fuscus
color.*

Alia nigredo vulgò appellatur, quando cutis minùs alba est, & ad fuscum seu obscurum colorem, quem quoque nigrum vocāt, admodum inclināt. Quem, etsi naturalis sit naturis color, quia tamen inuenustum, vel minùs pulchrum esse, qui ei colorem propius ad candorem accedetem præferunt, ab

iisdem ad discolorationes quoque refer- tur, huicq; emendando vel saltem pallian- do similiter curam, vt in ea dicitur, ad- hibent.

Huc & referri potest obsoletus seu obscu- rus color, quem cutis rugosa, maximè æta- tis decursu facta, in senibus adipiscitur: Nam quæ ex morbo ob maciem proficiscitur, per- manens minimè est.

Particularis discoloratio certis duntaxat quibusdam cutis sedibus accidit: idque vel ob Maculas, aut commaculationes alias.

Commaculationes cutis ab externis pro- gressæ, colores alienos illi quandoque im- primunt, aliàs saltem obducunt.

Qualis est Nigredo vulgò dicta, à Solis p- *Comacu-
latis cu-
tis.* ustione cuti impressa, in facie, manibus, & pectoris illa regione quæ denudari solet, se patefaciens.

Obsoletus item color à sordibus, in im- mundis hominibus, cuti adhærentibus con- tractus, colorem illius obfuscans.

Colores item alii, à commaculationibus, *Colora-
tio cutis.* & coloribus externis profecti, cutem aliter colorantes & pingentes. Quod illis potis- simum accidit, qui eiusmodi colores tractāt versantque vnde manus inficiuntur: Vel his qui se hisce conspurcant.

Quo pacto cutis nunc nigro, nunc ru- bro, nunc croceo, nunc viridi, aliòve colo- re commaculatur, qui colores aliquan- do subito aliàs etiam admodum impressi re- manent, nec dum facile ampliùs delentur, prò ratione causæ, vt in ea fusiùs explica- bitur.

Maculis variis cutis discoloratur. Quæ aliàs solo colore alieno conspicuæ sunt; a- liàs etiam nonnihil imminet vel extube- rant. E quibus aliquæ sine alio morbo comi- te, aliquæ in morbis quibusdam se produnt.

Quæ sine morbo comite per se exoriun- tur, sunt Originales maculæ, Lentigines, Pulicares maculæ, Erysipelata, Sanguineæ maculæ Gutta rosea, Impetigines, Vitili- gines, Sugillationes.

Originales maculæ sunt, quas infans in lucē editus mox secum ac vtero adfert, quæ Næui, Signa & Notæ appellantur, Germa- manis *Macula
origina-
les.* Annähler. Hæ variis modis se habēt, *Næui.
Annä-
ler.* colo-

coloresq; vti & formas diuerſas exprimunt, aliàs enim fraga, nunc ceraſum aliudve referunt, aliàs depreſſæ lata ſeu parua, couæ, colore tâtum alieno ſe pateſcunt. Et nunc in facie, nunc trunco corporis, vel adnexis illi artubus alicubi conſiſtunt.

Lentiginosæ. Lentigines ſunt maculæ fuſco colore præditæ, quæ lentes maiores minoresve, & colore & figurâ omnino, niſi quod non extuberent, exprimunt, vnde nomen à lentibus hoc illis inditum, Germani hæc à folij aridi colore, quem referunt, *Laubſteck* vocant. Hiſce cutis interdum parcius, aliàs copioſiſſimè & quaſi guttatim conſperſa apparet, adeo vt pororum numero lentes reſpodeant, ſine dolore aut moleſtia, corpus ſolum diſcolorantes, faciemque potiſſimum, interdum & manus peſtoris que apertam ſedem, vtpote aëri expoſitas ſemper partes: aliquando & per alias corporis ſedes, pedes & brachia diſſeminantur; eò maniſteſiores, quod corpus magis album exiſtit. Aſtatis tempore aliquando prorumpentes, hyeme ruſum euaneſcentes: aliæ perennes.

Macula fuſa lata. Eiuſmodi coloris fuſcæ maculæ, latæ, palmæ amplitudine, interdum certis in ſedibus corporis, idque certis temporibus oboriuntur, certis que deſinunt.

Macula pulicæ. Pulicæres maculæ dicuntur, quæ pulicum iſtus relictos reſerunt. Sunt enim exiguæ & rotundæ, porumque vnum vel alterum aut plures, ſed diſtinctim ambiunt atque includunt, nec ſenſum aliter quàm leui pruritu commouent.

Macula eryſipelatodes. Eryſipelata ſunt maculæ quæ parua eryſipelata in eo affectu expoſita repræſentant, ab illis tantum, quod citra ardorē caloremque, leuem tantum pruritu commoueat, differentes. Aliàs verò vltèrius adhuc ſe expandens macula eiuſmodi rubra, tibiæ totam ſerè ſedem rubore exacto tingit, vbi eryſipelas illud, quod cum febre ſe offerre, mox oſtendemus, ab hoc tamen quod citra grauiorem offenſam, ſolo pruritu moleſtiam aliquam exhibeat, differens. Sicuti inter equitadum, mihi adhuc iuniori ſæpè accidit, ſole diutius ocream radijs eius expoſitam, peruriente, pes enim ille, ruborem exactiſſimum prurientem, ſenſimque bidui ſpatio

iterum remittentem, ſæpius contraxit.

Sanguineæ maculæ exactè rubræ ſanguinis inſtar faciem, collum, peſtus, ceterasque interdum corporis ſedes, tam anguſto quàm amplo ſpacio, nunc depreſſæ, nunc plus minusve elevata opplent, pertinaciterque hærent, nec etiam niſi pruritu moleſtanti.

Gutta roſacea, eſt rubedo maculoſa, per quam facies ſaltem, & in ea frons, malæ, naſus, ac ſi guttis rubris ſeu roſeis anguſtioribus amplioribusve, plus minusque prominentibus, conſperſa eſſent, appareret, ad quod nomen alludentes Galli hunc affectum Couppe roſe, quod vitreolū ſignificat, cum quo tamen nihil habet ſimile, appellant. Eiuſmodi facies tandem & puſtuloſa fit, atque extuberantijs admodum inæqualis & horrida, quibus auſtis naſus aliquando pomis vti vocant repletus, in immenſum excreſcit.

Impetigines vocamus maculas latas non niſi circa ambitum rubeſcentes, cum cutis aſperitate illiusque veluti eroſione, Impetiginibus Lichenibus dictis in ſcabiæ expoſitis quodammodo ſimiles, niſi quod non ita pruriunt, nec adeo late ſe diſfundunt, aut numero abundant, ſed vel in facie, manibus alibive in cute diu ſæpè citra aliam noxam perſeuerant. Has Germani vti & Herpetem miliarem, à quo tamen, quod non ut ille, vrant, diſſerunt, Zittermahl vocant. Alij eas Geſecht appellant: Galli vt puto Dactres.

Vitilignes ſeu Alphæ, quod colorem cutis mutant, dictæ, maculæ ſunt, quæ aliàs magis quàm ipſa cutis albicant, quas Leucas, Arabes Albaras nominant; Aliàs verò magis obſcuræ ſunt & non niſi nigricantes, quas Melas vocant, vtramque ſpeciem Malum mortuum vulgus appellat, alij Morphæam illam albam, hanc nigram vocant. Sunt autem non continuatæ hæ maculæ ſed diſperſæ guttarum inſtar per cutem, ſedem mutant & ſerpentes, non tamen aſperæ, nec ſquamoſæ aut exulceratæ, & ſine ſenſu, vel planè obtuſo, vnde licet frictæ & ruborē leuem concipiant, vel profundius cuti in hærentes etiam pungantur, non tamen dolore vllum adferunt, nec ſanguis ex illis, ſed aquoſa

aquosa è punctura sanies effluit. Pili è poris quos alphæ possident, excidunt, quorum loco alij albi tenues Lanuginis instar succrescunt.

Sugillata, Ecchymoses, Vibices, Stigmata, Peliomata.

Sugillationes liuidæ sunt maculæ post contusiones euenientes, quæ ab humore eas excitante, Ecchymoses vel Ecchymonata appellantur, & si ab ictu proueniant, Vibices, Germanis *Schnatten* nominantur & Stigmata, atq; ob liuiditatem Peliomata, & quia ad cæruleum colorem mox inclinant, à Germanis *Blawmäher* vocantur, tandem etiam ad nigredinem aliquam tendunt, & circa ambitum interdum flauescunt. Suntque inæquales admodum maculæ, nunc collectæ & amplæ, aliàs dispersæ & expansæ, aliàs cum tumore leui & dolore ab initio, quando à læsione aliqua externa proficiunt, se manifestantes, quibus tamē euanescentibus, maculæ hæc diu sæpè manent.

In morbis variæ occurrunt maculæ, quæ vel Planæ manent, vel in Pustulas eleuantur: veluti in febribus, lumbis, alijsque interdum morbis.

Erysipelas.

In febribus synochis frequentius se offert macula rubra, lata & dispersa, quam Erysipelas vocant, pedes fere nonnunquam & faciem occupans, in doloribus quos ardore suo mouet, descripta.

Exanthemata.

Quamplurimæ maculæ rubræ simul efflorescunt in febribus synochis, in infantibus præcipuè, rarius in adultis, per faciem, pectus atque vniuersum corpus dispersæ, ambitum pororum lentis maioris minorisve amplitudine comprehendentes, quas Exanthemata quasi Efflorescentias vocant.

Ecchymata.

Aliæ maculæ rubicundæ copiosè quoque in febribus synochis, infantum præcipuè, iisdem fere in locis quibus exanthemata prorumpunt, quæ sensim ad lentis seu semipisi altitudinem vsque excrescunt, & in pustulas eiusmodi attolluntur, quæ vel denudè paulatim subsident atque euanescent, vel liuescentes & prurientes suppurantur, & apertæ ichorem profundentes, crustâ nigrâ obducuntur, quibus innumbris vel disitis, vel coniunctis & concrecentibus, corpus ad eò descendatur, vti horridum aspectum præbeat. Sed & sanatis illis, ali-

quando vestigijs seu cicatricibus impressis remanentibus, facies illorum toto dein vitæ tempore veluti alueolis aliquousque pertusa, minùs ob id decora videtur. Has pustulas Ecchymata, quòd impetuosè erumpant, vocant: item Variolas quasi paruos varos, & Morbillos, vel Papulas, non tamen feras, quales in Herpete sunt, Germani eas quòd infantibus ad eò consuetæ sint, vt vix aliquis ab illis sit immunis. *Kindsblattern* appellant, quarum & in febribus à quibus prodeunt, meminimus. Eiusmodi quoque pustulæ non solum cutem vndique occupant, sed & oculos, narium, oris & faucium interiora aliquando adimplent, sicuti in harum sedium affectibus demonstratum fuit.

In febribus alijs malignis, pestilentialibus, venenatis, & iam enarrata exanthemata, & ecchymata atq; aliæ maculæ se interdum præferunt, quas Petechias appellant, nunc Rubræ pulicum ictuum relictas notas rubras exprimentes, nunc Violaceæ vel Fuscæ aut Subnigræ, sicuti in eiusmodi febribus demonstratum fuit. Vbi & latam aliquando maculam apparuisse ostendibus.

Macula febrilis maligna, rum pestilentialium, venenatarum. Petechia Ital.

In lue Elephantica, pustulæ subrubræ vel liuidæ faciem, artusq; possident: Et in luis Venereæ altero genere, maculis rubris vel liuidis facies corpusque conspergitur: In lue Stomacace dicta, maculæ variegatæ in cruribus, interdum & in reliquo corpore efflorescunt. Quæ omnes harum luum maculæ, in lumbis eiusmodi, capite de Infectione, quò & pertinent, exactè describuntur.

Macula lutea in Spasmo.

In spasmo quodam miro, maculam luteam aliquando ex contactu subito in digitis subortam, moxq; iterum discussam in quodam fuisse, in Spasmo ostendibus.

Oculi discolorantur interdum, quando à naturali ipsorum colore, qui in sede pellucidâ, iride appellatâ, in centro niger, minori maioriue spatio, & in ambitu illius glaucus vel fuscus elucet, & extra hunc circulum in reliquo oculi globo albus apparet, declinantes, vel rubent vel flauescunt; dein & quando Maculas obtinent: Vel alioquin inueniuntur ipsorum color esse vulgò putatur.

Oculorum rubedo.

Rubent oculi frequenter etiam in sanis, quando

65

quando calore externo vel motu corpus nimium incaluit, vel in morbis calidis capitis vel ipsorum oculorum, vt ophalmiâ & epiphorâ, in qua palpebræ potiùs, quàm oculi globus intrinsecus præter naturam rubedinem, adhuc maiorem adipiscuntur. In Elephantia si inter reliqua vitia etiâ oculorum occurrit rubedo: sicuti huiusmodi oculorum rubedines in morbis, in quibus contingunt, vberius descriptæ fuerunt.

Oculorū
flauities.

Flauescunt oculi in ictero, sicuti illic expositum, colorque ille citius ferè in illorum albo quàm reliquâ cute apparet, cum cutis adeo exactè alba, vt oculi crassa tunica minimè existat, & proin non tam citò in ea, vt in albisimo hoc subiecto, color pateat.

Oculorū
sugillat.

Maculæ in oculis diuersæ quoque oboriuntur, eosque discolorant: Vt sunt rubræ vel liuidæ in Sugillatione oculi, vel Hipposphasmate appellatis, non solum in oculi albo, sed & ipsâ tunicâ inde dictâ, quæ maculæ magis cruentæ aliquando, quàm quando in cute fiunt, visuntur.

Oculorū
Exanthemata, Ecchymata.

Exanthemata & Ecchymata, vt reliquum corpus, ita & oculi globum interdum infestant & commaculant, visionemque insuper lædunt.

Oculorū
Alba
macula.

Albis quoque maculis, cornea oculi sedes impeditur, quæ si ante pupillam ponantur, visioni obfunt, si verò in alba sede occurrant, nec colorem mutant, nec visioni officiant; sicuti hæc in oculi albugine, cicatrice & suffusione, in visus læsione explicata fuerunt.

Oculi
Glaucoi,
Cesij, Nigri.

Inuenustum colorem oculorum vulgus esse ceter, si glaucoi admodum appareant vel cæsij aut grysei, vt nostri eos appellant, quia pellucida sedes pupillam ambiens, quæ colore variare solet, tali colore prædita existit. Cum, quò magis ea cum pupillæ sede, quæ semper nigra cernitur, nigricat, oculos eò pulchriores, Nigros ob id appellatos, esse putent, licet veteribus glaucoi præsertim probarentur oculi, à quibus & Minerva laudata, Glaucois dicebatur. Nostro verò seculo improbantur, & si corrigi possent, corrigerentur.

Dentes
Flauo, nigri.

Dentes quoque cum naturalis ipsorum color albus sit, faciliè & in plerisque colo-

re alieno inficiuntur, atque sic discolorantur. Vt cum ex adhærentibus sordibus flauescunt vel liuent, vel ex corruptione ipsorum vel exhalationibus in morbis vehementer nigricant, sicuti in causis explicabitur.

Vngues colore vel maculis aduersis vix dum, nisi quatenus erosiones aliæque vitia, colore quoque tetro prædita, in illis se offerunt, infestantur. Interdum tamen liuere plus iusto, aliàs rubere videntur, qui colores non in ipsis resident, sed in subiectâ carne subsistentes, per ipsos translucent, & ac si in ipsis essent, apparent. Vti & maculæ in Sugillatione sub ipsis natæ, sic per illos visuntur, atque nigredo circa extremitates à sordibus subiectis. Frequenter tamen ipsi vngues maculis albis, exilibus, tanquam punctis in iunioribus præsertim, vno saltem vel pluribus in locis notantur, quæ circa radicem primum exortæ, vnâ cum vngue crescendo, donec cum eo amputentur, cedunt, succrescentibus sæpe mox aliis. Hæ notæ in adultis & senibus si appareant, viuacitatem significare, vulgus iudicat.

Pili discolorati seu præternaturali colore præditi, tunc ferè solum esse censentur, quando exactè albi redduntur, idque ferè ex morbo, post quem prioribus rectè coloratis deciditibus, alij albi & tenues lanuginis instar succrescunt. Vel quando iunioribus adhuc, maturius, vt Cani fiant, accidit, cum in senibus canities quoque non solum naturalis, sed & decori honorique sit. Vnde Poëta inquit: Magna fuit quondam capitis reuerentia cani. Quæ canities non solum in capillis capitis, sed & in barba, in eaque ferè citius quàm in illis, etsi multis annis post enascente, sese offert. Longè minùs pili discolorati esse iudicabuntur, si vel rufi aut nigri admodum existant, licet vulgus eos quoque minùs corporis venustati conuenire existimet, è contra verò flauo vel aureo colore præditos, aut medio modo se habentes, pulchritudini adumentum adferre censeat, cum & hi colores secundum naturam se habeant, ni forte Æthiopum instar crispis & nigerrimis vt in illis, nascantur.

Vnguiū
Macula.

Pili
Albi, Lanuginosi.

Canities.

Pili,
Rufi,
Nigri,
Flauo.

Causæ.

OMnium discolorationum tam generalium quam particularium commaculationum & macularum, in cute, oculis, dentibus, vnguibus & pilis se offerentium causæ proficiscuntur, vel ab humoribus, vt Semine, Sanguine, Succo nutriente, Bile; vel à Prauis humoribus, aut Sordibus, aut aliis Commaculationibus; vel à Calore, Frigore aut Siccitate, quemadmodum hoc eo ordine explicabitur.

Semen parvum causa discolorationis & macularum quæ in cute, oculis & pilis, originalem.

A femine sicuti deformationes aliquas in partium numero, magnitudine aut figura contingentes, ab ortu proficisci, in deformatione ostendimus, ita & ab eodem discolorationes aliquæ & maculæ hæreditariæ cum fœtu in lucem quandoque prodeunt. Quæ etiam vt & formæ & figuræ vitia originalia à femine patris vel matris originem trahunt, quemadmodum & naturalem colorem cutis ob eandem causam à parentibus in liberos deriuari, coloreq; illis plerumque correspondere videmus. Nigredinemq; appellatam, quam inuenustam esse autumant, eum ab ortu innata sit, ab iisdem simili colore præditis, vel si tales minimè sint, ab illorum femine tamen proficisci; Oculisq; cæcis vel nigris liberos parentes sæpè imitari; & pilos quoque quales parentum fuerunt, nunc nigros, nunc flauos, nunc rufos nancisci. Quod vt in homine frequenter fit, ita semper ferè in animantibus, vt sobolem colore sibi similem progignant, accidit; eoque nomine pro colorum, quos expetimus, ratione, animalia eiusdem coloris ad generationem commiscemus. Quod & in volatiliu genere euenire fuit obseruatum, in columbis præsertim, quarum si vna tantum vel duæ nigrae, aliterve coloratae, reliquis omnibus albis existētibus inueniantur, pulli totidē illius coloris, & nō plures nanciscuntur, & si oculi columbæ parentis nigri vel subflauī aut crystallini erunt, tales in pullis etiam apparebunt: quam rem adeò follicitè, qui columbarū venustatis sunt studiosi, obseruant, vt & columbas coloribus illis quos oderunt, ornatas, ne pulli iisdem præditi gignantur, à commissione remoueant.

Hæc autem similitudo colorum naturalium vt à femine rectè & naturaliter disposito proficiscitur, sic si secus se habeat, colores alieni, vt & maculæ diuersæ, ab iisdem causis à quibus & formæ vitia ab ortu prodire diximus, prouenire possunt: Nimirum vel à dispositione quadam illius consimili, vel alia eius transmutatione aut permistione, à variis causis profecta, inter quas & imaginatio adeò multum potest, vt si mulier in ipso conceptionis momento, vel etiam post eam, vterum gestans, aliquid ex intuitu vel imaginatione animo firmiter cōcipiat, illud fœtui similiter imprimatur, sicuti ex intuitu picturæ Æthiopis in coitu, mulierem infantem similem nigrum enixam esse, historię testantur; aliæque multæ maculæ, cuiusmodi nunc mora nigra, nunc cerasa rubra, nunc diuersos pavonis Indici colli colores, aliarumve rerum, repræsentantes, hac ratione ab ortu quibusdam innatas, in diuersis obseruauimus. Quod vt in homine, sic & in animantibus, ex imaginatione hac, tum pilos, tum pennas coloris consimilis transmutatione aliquando quoq; nasci, aliqui docuerunt; sicuti ex aspectu coloris varij virgarū, quæ detractis corticum portiunculis, partim virides, vbi cortices remanserant, partim verò albæ apparebant, greges pecorum dum coibant, partus variegato quoq; colore enixos fuisse, idq; Iacobi arte, vt plures à focero suo Labano auferret pecudes, sacræ testantur literæ. Simili modo diuersis coloribus columbas gigni, si eorundem colorum in columbario pingantur, narrat Plinius.

A Sanguine cutem carnemq; subiectam possidente atque irrigante (quod naturaliter fieri solere, eumque non solum in venis capillaribus cutaneis colligi, sed & propriæ cutis carnisque substantiam eodem imbui, in phlegmone describendā ostendimus) vt genuinus cutis color ad rubedinem nonnihil inclinans, & per cuticulam transparens exurgit, vel etiam exacta quædam rubedo in certis locis prodit, vt in labiis, & glande ob fungosam quidem illorum carnem, sanguine copiosius irrigatam, glandis verò sanguine arterioso cum tumere debet, perfusam, atq; malis quas in quibusdam naturis sanguis

69

sanguis magis quam alias sedes cutaneas occupat: sic si plus solito in superficiem corporis feratur, rubicundior adhuc color in illis nascitur, in Ruboris generalis specie dicta. In qua tamen rubedo in facie, quæ ob teneritatem & laxitatem sanguinem facilius suscipit, magis elucescit. Quemadmodum à calore externo, sanguine cum spiritibus extrorsum euocato, corpus incallescere & rubere, faciemque rubore suffundi, nonnunquam & oculorum album simul tingi videmus: Vel etiam per animi affectus, in quibus sanguis cum spiritibus concitatus in exteriora diffunditur, ut ex ira, faciem inflamari: Atque ex pudore erubescere, quæ tamen mox sanguine recedente, rursus euanescit.

Sanguinis in superficie corporis defectus causa Palloris.

Quæ uti à Sanguine in superficie corporis consistente eueniunt, sic & ex illius Defectu in hisce locis, colore viuido amisso, Pallor inducitur. Qui illis in locis quæ ex sua natura magis rubere debebant, illis minus rubentibus, liuidus apparet, ut in faciei malis, labiis & glande, uti & vnguibus, qui cum ob subiectæ carnis ruborem, per illos cum perlucidi sint, translucentem, rubicundiores sint, sanguine illic deficiente, liuere dicuntur. Destituuntur autem hæ externæ sedes sanguine, si ille per inedias, mœrores, hæmorrhagias, morbos, sicuti hæc in imbecillitatibus aliis inde natis symptomatibus alibi exposuimus, absumatur. Vel si alioquin inde refugiat, tamdiu donec ille rursus redeat, pallent, uti in glande tunc cum non necesse est. Sicuti & à frigore externo eam repellente accidit, cutem in frigentibus minus coloratam reddi, quam cum calet, atque illis quorum malæ rubebant, sanguine ex frigore nonnihil veluti congelato, eas tunc liuidas, plumbeo vel fusco colore tinctas apparere. Dein & sanguine cum spiritibus subito intro reuocatis idem euenit, in animi quibusdam affectibus, ut metu & terrore, vel animi deliquis & syncope prehenfis, quos tamdiu donec hæc remeant, pallor occupat.

À sanguine quinetiam macularum diuersa genera prodeunt, prout ille diuersimodè se habet, imprimis; quatenus vel in veram cutem diffunditur, vel poris saltem, aut sub cuticulam se insinuat.

In veram cutem sanguis feruidus & accessus, in febre synocha diffusus, rubedinem illam cum ardore iunctam, quam Erysipelas vocant, efficit: Nonnunquam & exanthemata atque ecchymata, in eadem Synocha erumpentia; quod quo pacto fiat, in eiusmodi febribus fuit expostum.

Quod si quoque sanguis ab aliis causis quam à febre, externis internisque, sanguine allicientibus aut expellentibus, ad cutem se diffundat, rubras alias maculas procreat.

Veluti Erysipelata illa, quæ vno aliòve loco prodeunt: Item Rubedinem illam tibiæ, qualem à solis æstu vrente pedes proficisci, in generibus ostendimus.

Dein & ob sanguinis copiam, tenuitatem, caliditatem nonnunquam & impuritatem, maculæ illæ Sanguineæ in facie cæterisque corporis sedibus, in quas natura eum expellit, nascuntur.

Imprimis; illa rubedo faciei, quam Guttam rosaceam vocant, quæ uti à causis supradictis potest procedere, ita à vini frequentiore & immoderato potu, inebrietati deditis sæpius contingit, quod inde visceribus sanguificationi destinatis, sanguineque ipso plus iusto incalесcentibus, ille in loca hæc, ob naturam illorum, ad suscipiendum idonea, copiosius & frequentius delatus sanguis, eaque creberrimè irrigando, tandem ruborem hunc permanentem pustulasque procreat. Quod vitium diuturnum & pertinax est, cum sanguis nondum extra suam sedem naturalem excidens, minimè suppuretur, nec alias faciliè quoque inde discutiatur, Faciemque potissimum infestat, cum hæc alioquin plus quam alia loca sanguine abundare videatur, quod rubedo naturaliter in facie plerunque quam cæteris locis magis apparens, in genis præsertim, quæ vel per se in quibusdam naturis, vel ex solo pudore mox erubescunt, satis demonstrat, sanguinem in faciem faciliè diffundi, indeque rursus si secundum naturam adhuc se habeat, remeare posse. Quod tamen, quando quantitate qualitatè peccans, frequentius eò impellitur, minimè fit, sed illic subsistens fixisque, uti dictum, remanens, permanentem eiusmodi affectum parit.

Sanguis in verâ cutem effusus, causâ Erysipelatum, Ecchymatum, Ecthy-matum, Macularumque sanguinearum, Gutta rosacea, atque Impetiginis illius quæ guttermot vocant.

Fit quoque vt si sanguinis portio aliqua acrior ad cutis aliquam sedem elabatur, eam exasperando, & non nihil rodendo, maculas illas inæquales subrubentes quoque pariat, quas Imperigines vocauimus & Germani Zittermahl appellant.

Sanguis in cutis pororum ambitu se diffundens, causa Macularum Rubrarum, aruarum & Sanguinearum.

Ad poros saltem cutis sanguis allicitus, inq; eorum ambitum exiguo tantum spacio se diffundens, maculas paruas quandoq; gignit. Quod vti à prioribus causis quoq; potest accidere, ita in sudoribus, sanguine interdem cum sero vterius ad poros delato & hærente, eiusmodi maculæ post eos remanent. Et ictu bestiolarum, sanguine allicito, maculæ quandoque eiusmodi, vti ex pulicum ictu, quem morsum vocant, accidere videmus, relinquuntur, quæ tamen rursus sanguinis exigua hac portiunculâ discussâ, sponte euanescent.

Sanguis sub cuticulâ erumpens, causa Sanguillationum & punctorum quorundam Sanguineorum.

Sub cuticulâ, si sanguis è vera cute, in qua naturaliter etiam consistere diximus, erumpat, tunc extra suam sedem delatus, cum remeare in eam amplius nequeat, illic subsistens, & per cuticulam transparens, maculas eas, colorem sanguinis à natura derelicti, & proin nigricantis vel concreti repræsentantes, & in Sanguillatione dictâ apparentes, efficit, easque prout amplum, exiguumve spaciū occupârit, vel exiguas, vel latas, vel oblongas. Quæ & si sanguinis hæc portio non corrumpatur, quod aliquando, quoniam adhuc inclusa est, euenit, diu ita eodem in loco subsistere possunt. Alias verò sanguine illo serosiore existente, vel ex corruptione attenuato, se diffundente, vterius disperguntur, tandemque sensim eo dissipato flauescunt, absumptq; & discusso euanescent, aliquando verò sanguis ille putrescens cuticulam exedit, & per eam ruptam emanat.

Huius autem sanguinis eruptionis sub cuticulâ, causa frequentior est, contusio in vera cute vel venulis illius facta, per quam solutâ illius cōtinuitate intrinsecus, sanguis ex ea sub cuticulam fertur. Quâ ratione ex ictu valido diuersorum occurrentium, variæ sugillationes, vti & inter cætera sæpius ex flagri aut virgarum percussione, vibices ille seu striæ, in longum vti ipsi ictus facti sunt ductæ, prodeunt. Veluti & ex simili læsione.

Oculi globi, sanguine ex adnatæ tunicæ venis, sub eam se insinuante, vel in corneam quoque tunicam se infundente, oculi sugillationes originem trahunt. Post venam cutaneam à chirurgis sectam, sæpè eiusmodi sugillationes se offerunt, quando eâ penitus pertusa, sanguis ex ea non solum foras exilit, sed portio illius sub cuticulam diffunditur, perq; loca illa vt cubiti interiora aliæve, sparsas sugillationes parit. Præter hæc violentas causas, quæ continuum soluunt, vix dum aliæ existunt, quæ sanguinem sub cuticulam euocare possunt.

A calore tamen summo extrinsecus intrinsecusve in morbis occurrente & cutem nimium dilatante, sanguinemq; fundente allicienteque, puncta quædam eiusmodi cruenta aliquando sub cuticula sugillationis instar apparuisse, vidimus. Quod & ob sanguinis tenuitatem & serositatem accidere potest, si ille ad poros cutis effusus, nō exfudet, sed illic veluti guttatim sub cuticulâ effusus persistat, quod tamen vti & eius exsudatio, rarissimum existit, quamuis aliquando hoc accidisse, in excretis demonstrabimus.

A succo nutriente ex sanguine partibus afsimilato genito, & generalis discoloratio, & maculæ diuersæ oriuntur, prout ille transmutatus vel vniuersum corpus peruadit, vel ad certas saltem partes perfertur.

Vniuersum corpus peruadens & nutriens succus crudus seu imperfectè coctus, totius corporis viuudum colorem destruit, aliumq; accersit in Cachexia dictâ, cuius diuersæ species, prout vel tantum crudus, aut simul etiam serosus vel vitiosus existit, exsurgunt. Nam si crudior sit, qualem etiam naturaliter in sanguinis massa contineri, illiusque partem quam pituitam vocant, constituere eamque alimentariam, quæ vnâ cum reliqua sanguinis massa corpori nutriendo adhuc sit idonea, statuunt, illeque in sanguine redundet, vel maior sanguinis pars talis euadat, cum non sit perfectè elaboratus aut sufficienter rubicundus, non tamen eousq; deprauatus, quin corpus adhuc nutrire possit, tunc substantiæ corporis se ad nutritionem apponens, illique adhærescens, similem in cute & carne discolorationem seu color-

Succus nutriens vniuersum corpus crude, causa Cachexia, prout vitiosus Carcinoma.

73

colorem pallidum aut album producit, eoq; magis à viuido colore recedentem, quò sanguis amplius à naturali recesserit, vel alioquin ex cacochymia accedente, prauis insuper succis vel serositate aut aquositate permistus fuerit. Huic accedunt etiam alia insuper vitia, & plærunque in fœmineo sexu præsertim virginibus menstruorum defectus, cum sanguis ille crassus, crudus non adeò commodè & copiosè ad vteri venas possit defluere, nec natura, quæ puriorem tantum sanguinem ad vterum pro nutriendo fœtu, tum quando conceptus est, tum etiã prius menstruatim ablegare solet, hunc crudum vel etiam cacochymicum, vtpote id præstandum minùs aptum eò deriuat, sicuti in menstruorù suppressione, cachexiam potiùs illorum defectus, quàm menstrua suppressa cachexiæ, causam esse demonstrauimus.

Quòd si quoque cum cachexia & cacochymia, prauis humores circa lienem collecti illic in arterias transferantur meseraicas, cordis simul vrget, vt in hoc casu explicatum fuit, palpitatio, aliq; symptomata tum ob cacochymiam, tum aliorum viscerum accedentes morbos.

Sed & succo eiusmodi crudo copiosiore existente, diutiusque corpus alente, ita vt id eo intumescat, cachexia in leucophlegmatiam vertitur, & si feri simul accedat redundantia, in serosam Leucophlegmatiam, vel si serum potiùs in cachexia præualeat & congeratur, tumor pedum, mox & ventris cum habitus corporis diminutione, hydropsque tandem ascites cachexiam sequetur. Vel si succus ille, qui corpus nutrire debebat, adeò vitiosus fiat, vt ad nutriendum penitus inutilis sit, vel etiã paucus, corporis decrescencia potiùs succedet, & in Atrophiam cachexia conuertetur. Sicuti in Hydropè, ascite & Atrophia, quo pacto cachexiam prægressam hæc sequantur, ostendimus.

Hæc autem sanguinis cruditas, vel etiam vitiositas, si cacochymia simul adsit, aut serositas si hydropis suspicio, nonnunquam ab alimentis originem trahit, si talium continuus sit vsus, quæ eiusmodi succum crudum vel vitiosum aut aqueum gignere pos-

sunt: qualia in ventriculi imbecillitate explicata fuerunt, vt non opus sit eadem hic repetere. Inter quæ fructus sunt horarii, quorum immoderatiore vsu, cum iuniores præsertim peccent, præ cæteris hanc ob causam cachexiæ sunt obnoxij, maximeque virgines cum debiliores sint, minusque exercentur.

Viscerum seu Partium chylosi & sanguificationi destinatarum affectarum causâ, crudus ille sanguis cachexiam gignens, vt & malus succus cacochymiam procreans, vel serositas hydropem producens, oritur accumulaturque, cuiusmodi sunt ventriculus, hepar, lien, ipsisque adnexa vasa membranæque. Ventriculi enim intemperiei imbecillitatis, aut alterius affectus causâ, si concoctio fiat imperfecta vel vitiosa, imperfectus quoq; & crudus gignitur chylus, vel vitiosus aut aqueus, qui postea in secunda concoctione, cum nõ sufficienter elaborari possit, similem producit sanguinem, eoq; magis, si viscera secundæ concoctionis labem quoq; aliquam patiantur. Verum quoniam eiusmodi morbi sint ventriculi, cum & simul compressiui illius dolorem efficiant, in doloribus cordis dictis, fuerunt expositi.

Hepatis, Lienis Venarumque vitio, cum hæc ad sanguinis generationem faciant, sanguis imperfectius elaboratus, crudus vel vitiosus aut aqueus gignitur. Hepatis quidem, cum instrumentum sit sanguificationis. Dein & lienis morborum causâ sanguificationem impediri, omisis multis aliis argumentis alibi expositis, quibus lienem quoque sanguificationis organum esse demonstrauimus, vel eo solo sanguificationem liene affecto impediri, comprobari posse existimamus, quod hepate penitus sano, tamen lien malè affectus, sicuti sectio sæpiùs hoc patefecit, sanguificationis noxas enarratas, vt & hydropem, vt illic dicitur, sæpè procreauerit, vt non opus sit consensum, quem lien cum hepate habet, illius causam statuere. Dein & venarum affectarum causâ, cum ad sanguinis elaborationem opitulentur, siue præcipuè hoc præ cæteris, vt aliqui censent, faciant, siue aliquo saltem modo, illum ab hepate prius elaboratum, perfectio-

nem reddant, quod omnibus in confesso est, sanguis minùs absolute concoquitur, crudiorque remanet. Idque venarum meseraicarum ab hepate & liene prodeuntium, præcipue occasione, cum in illis prima chyli, quem rapiunt & continent, fiat permutatio, & ad sanguinem præparatio. Morbi verò hepatis, lienis venisque accidentales, unde imminuta sanguificatione, crudus sanguis indeque cachexia gignitur, vel sola vel vitioso accedente simul chymo, sunt Imbecillitas, Intemperies, Obstructio, Durities aut alia Læsiō.

Imbecillitas seu debilitas hepatis, lienis & venarum, quæ propter consensum cum visceribus, quibus continuantur, quando hæc læduntur, simul patiuntur, ea quæ à caloris natiui penuria profecta, sic proprie dicitur, si functiones ipsorum eousque labefactet, ut sanguis non sufficienter elaboretur, crudiorque ob id generetur, cachexiæ hoc pacto causa existit, in qua corporis calor natiuus amittitur, molesque illius augetur, dyspnœaque ob viscera hæc affecta, & compressius dolor, ventriculo simul compatiēte, molesta sunt, urinæque ob cruditatem hanc crudæ apparent atque aqueæ, præsertim si ob seri copiam nimium dilutæ minusque bile tinctæ sint, vel etiam ob alias causas, sicuti in illis explicabitur. Quæ viscerum horum imbecillitas si diutius duret, facit ut cachexia hæc leucophlegmatiam, cumulato crudo humore, ut in ea ostensum est, producat, eamque si serosus simul à causis aliis huic imbecillitati iunctis cumuletur, uti in leucophlegmatia docuimus, serosam. Vti & si ob eandem hanc hepatis attractricis præsertim facultatis imbecillitatem, serum non sufficienter è venis meseraicis attractum redundet, hydrops ascites, sicuti in illius hæc causa explicanda in hydrope demonstrauimus, cachexia sequetur. Quod si quoque tanta sit horum viscerum imbecillitas, ut non solum crudus sanguis inde, sed non sufficiens quoque corpori alendo, gignatur quantitas, cachexiam, in qua corpus potius macre quam tumidum sit, producat, vel si per eam sanguificatio ferè penitus aboleatur, Atrophia (sicuti in ea describetur) inde potius

gignetur. Cognoscitur autem cachexiam ab imbecillitate hac profectam fuisse, si nullis aliis viscerum horum morborum accidentibus concurrentibus, viscera hæc debilitata esse pateat ex colore vitioso præcipue, tuncque sic affecti, Hepatici vel Splenetici vocantur.

Hæc autem illarum imbecillitas, à caloris natiui dissipatione in ipsis contrahitur, quæ ab insitis causis procedit, ab ortu vel per ætatem, vel aduentitiis, & post varias horum viscerum intemperies, aliòsve morbos diuturnos vel acutos relinquitur. Inter quos & febres sunt, in quibus hæc viscera calore nimio, vel potionibus frigidis, in quo febricitantes præcipue delinquant, labefactata, hancque imbecillitatem adepti in causa sunt, ut post eiusmodi febres cachexia, & si perseueret tumor totius corporis, & si maior sit læsiō, pedum & ventris, sequantur. Dein & immoderata sanguinis profusio, & imprimis menstrui, imbecillitatem hisce visceribus procreando, non solum ob spirituum dissipationem, sed & quod & venæ sanguinis calore foueantur, & inanitæ ab eo minùs reficiantur, cachexiam efficit, non solum ob crudum illum succum, qui tunc generatur, sed & quia per eam, sanguine exhausto, corpus viuendum colorem amittit; quod si magna esset profusio, potius contabesceret quam tumeret. Verum & aliæ excretionēs per quas spiritus absumentur, idem faciunt. Inter quas Venus immodica non infrequens in virili sexu potissimum occasionem præbet.

Intemperies horum viscerum vasorumque sanguificationi destinatorum, tum imbecillitatem si continuetur iam dictam inducendo, tum per se actiones illorum imminuendo, eodem pacto cachexiam vel simplicem vel in leucophlegmatiam aut ascitem degenerantem, gignere potest. Qualis inprimis est frigida, functiones horum potissimum labefactans. Cuiusmodi à talium frigidorum copioso & nimio usu, diuque continuato accersiri potest: Vel à refrigeratione externa, cui corpus expositum fuit, contrahi. E' quibus & prægressis talis constitutio cognoscitur, & quod sitis nulla tunc affligat, corpusque

uniuersum frigidius appareat, cæteraque frigiditatis concurrant indicia.

Sed & calida horum viscerum, hepatisq; inprimis intemperies, etsi ab initio statim, & diu sæpè etiam perseverans, cachexiam, hoc est malum corporis habitum, aut pallorem seu colorem fœdum minimè inducat, sed potius colore viuido naturali, vel si præternaturalis fiat, rubro, qualem in ebriosis aliquando in facie elucere videmus, se manifestet, nec dum adhuc noxas grauiiores pariat, quàm sitim inordinatam & ferè continuam, quâ potissimùm hæc intemperies horum viscerum calida & sicca cognoscitur, tamen spacio temporis, in aliis citius, in aliis tardius, viscera hæc labefactans, eaque imbecilliora ad functiones suas edendas reddens, læsâ sic sanguificatione, corpus quoque discoloratum maleq; habitum efficiendo, cachexiam producit; quæ, quia tandem viscera hæc, calore nimio & diurno excitata, indurescunt & finduntur, in hydropem primum tumorum pedum & dyspnœa se partefacientem, mox cæteris quoque illius accidentibus subsequenter, plerunque conuertitur, sicuti in hydropse ascite, quomodo hoc fiat, abundè declaratum fuit, ubi & causas huius Intemperiei calidæ & siccæ, à vini immoderato ciborumque calidorum continuo vsu, vel morbis prægressis calidis potissimùm, dependere ostendimus.

Obstructio & infarctus hepatis venarum præcipuarum portæ & cauæ, quia prouentui vitiosorum humorum biliosorumq; maximè, quos in venis meseraicis sanguini confundi, in febrium intermittentium causis ostendimus, occasionem præbet, ob impeditam illorum à sanguine in secunda hac concoctione exactam separationem, Cachexiæ quoque illiusque potissimùm Cacochymicæ dictæ, causa fieri potest. In qua si sanguis impurus in corpus distribuatur, color fœdus potius quàm albidus apparet, illeque nonnihil vel fuscus aut virescens vel flauescens, non tamen adèd exactè, vt quando poris cholidocis obstructis, bilis à sanguine minimè separata, copiosius quàm hîc accidit, redundat, sicuti in icteri causis declarabitur, ob quam & causam in hac cacochymia, vri-

næ non ita aqueæ, vt in alia cachexia, sed nonnihil adhuc coloratæ existunt. Sed & si illuuius eiusmodi biliosa, ab eadem obstructione retenta, & in venas meseraicas refluxa, non adèd in corpus distribuatur, pallor verius quàm color in cachexia illa alienus se offeret, vt & vrinæ magis crudæ & aqueæ, & ob copiam bilis in venis meseraicis coaceruatam, fluor alui potius quàm illius constipatio, excrementaque biliosa magis quàm alba, secus atque in ictero apparebunt. Et si ab obstructione enarratâ, hepatis simul sequatur imbecillitas, quæ inde quoque tandem prodire potest, vel aliis accedentibus insuper causis, simul enasci, tunc quia diminuta sit sanguinis elaboratio, Cachexia à crudo sanguine genita prodibit, in qua crudus succus corpus alens, tumidum reddit. Si verò obstructio tanta sit, vt per eam & sanguinis seu crudi seu cocti distributio, in venam cauam non sufficienter perficiatur, aut sanguis adèd vitiosus gignatur, vt corpus minus quàm oportebat, alere possit, id potius decrescet: vt si rota distributio illius per obstructionem adèd magnam impedita, aut sanguis ineptus omnino nutritioni sit, Atrophia, vt in ea explicabitur, sequetur.

Huius autem obstructionis in hepate factæ causa, vel à chylo crassiore & viscosiore, à cibo simili genito, aliàs proficiscitur, si illic se affigens ductibusque quibusdam hærens magis magisque condensatus, loca hæc obturet; vel si, vt aliqui voluerunt, chylus crudus ob calorem, à motu validiore vel balneis, mox à cibo excitatum, in venas citius quàm decebat, rapiebatur, atq; sic retentus, obstruat. Quod etiam à sanguine exiccato & veluti affo similiter accidere potest, quem eiusmodi vasis in hepate insertum induratumq; & veluti incineratum, obstructiones tales peperisse: & hepatum animalium inter epulandum penitiori inspectione aliquando sic euenire deprehendimus. A seroso humore easdem obstructiones in hepate fieri posse, easdem obseruationes, in homine & animalibus factæ, nos docuerunt, qui arenulas quamplurimas exactè rubras, quas prius diu & frequenter per vrinas aliqui excreuerant,

vasa hepatis certis in locis oppleuisse, aliquando inuenimus, aliàs etiam in calculum vel tophum friabilem vel solidum concretas, quæ per vasa hæc aliquousque dispersa, corallum album, nunc alias stirias tophaceas referebant. Quæ à feri terrestritate, hisce vasorum angustis & sinibus se affigentes, adhærenteque, ut in renibus generari, in calculi renum descriptione abundè demonstrauimus. A pituita obstructions hæc præcipuè gigni, plerique statuunt. Quæ nisi uti cætera excrementa in hepate ex crudiorè chylò vel sanguinè gignatur, illicq; congeratur, à ventriculo & intestinis, vbi plerunq; redundat, per venas meseraicas cum chylò huc usque translata, illicque subsistens, obstructions hæc efficit, eoque citius si mucosa fuerit, vel etiam tenuis adhuc & aquea, quæ etiam facilius venarum meseraicarum oscula subire potest, si diutius retenta in venis calore hepatis crassescat mucosaq; fiat & viscosa.

In Liene quoque facta Obstructio, quia & tunc sanguificatio læditur, atque crudi & prauis humores tum in liene tum in venæ portæ ramis cumulantur, qui ex sinistro venæ portæ trunco in dextrum indeque in hepatis remeare possunt, hincque cum sanguine distribui, cachexiam, eo modo, eamque ferè cacochymicam progignere potest, sædo quoque colore se manifestante, in qua si in arteriæ ramos prauis succi hi quoque se infnuent, cordis & arteriarum pulsus ob causam in illis affectibus explicatam, vehementius vrget.

A Duritie horum viscerum, vel scirrò illorum substantiæ innato, aut alio tumore duro in abscessum tandem degenerante, quia & tunc ipsorum ductus ex parte vel omnino obturantur, Cachexia cruda vel cacochymica, eadem ratione uti ab obstructionis aliis causis facta, emergere potest, quæ, si ab eiusmodi affectibus non solum viscera obstruantur, sed & findantur & dehiscant, in hydropem ascitem abit. Quod cum frequentius fiat, nos illas hepatis & lienis durities, uti & scirrhos tumoresque, quo pacto se habeant, causasque illorum, quomodo vel à nimia horum viscerum exiccatione, vel

etiam à succo crassiore hæc viscera alente procedant, in hydropis Ascitis quem plerunq; inducunt, causis vberius describemus: Et in Atrophia, quomodo & illa inde proficisci queat, ostendemus.

Præter hosce tumores lienem alio quoque modo intumescere posse, idque à flatibus, scribunt. Verum quomodo hi in eo, cum cauitatem nullam habeat, colligi possint, illumque inflare, non video. Fortè cum flatus in hypocondrio sinistro colliguntur, illudq; distendunt, vel ventriculus sinistrum latus magis occupans, à flatibus intumescit, aut colon eo in loco distentum prominet, hoc in liene accidere putant.

Certis tantum partibus communicatus succus nutriens, Maculas in illis diuersas efficit, prout vel poris cutis, vel diuisioni alicuius se insinuat.

Ad poros cutis, succus qui pilos illi infusos alere debebat, deueniens, maculas quas Lentescit vocant, frequenter producit: hic enim illis prius assimilaris, coloreque antequam illorum radicibus apponitur non nihil correspondens, si ab iis ulterius in pororum ambitum aliquousque dispergatur, maculas eiusmodi colorem fuscum plus minusve ad pilorum colorem, dum illis assimilaris, adipiscitur, non nihil inclinantem procreat. Quæ diffusio huius succi in poros, à calore externo nimium illum attrahente, porosque simul dilatante, interdum proficiscitur, si tunc succus pilos enutriens non tantum pilorum radicibus se affigat, sed & ulterius diffusus, illicque subsistens maculas illas subfuscas plus minusve, pro cutis coloris diuersitate efficiat, magisque in cute alba apparentes, faciemque pectus & manus potissimum, cum hæc sedes calori solis sint amplius expositæ, occupantes; quæ & quandiu calida aeris constitutio viget, vix delentur.

Huic quoque pororum nimia à natura laxitas, opitulari potest, ut illorum causa succus non solum pilos aliat, sed & cutis portunculam quæ illos ambit, simili colore inficiat, qui postea ægrè amplius, cum nouo continuo accedente simili succo, locus ille cum pilo nutriatur, extirpatur, qui cum succus sit adhuc ad nutriendum idoneus, nec suppuratur nec

Succus nutriens pilos in poros diffusos causa Lentiginis.

81
nec corrumpitur. Quæ pororū laxitas, cum illic maximè vbi cutis tenerior existit, se offerat, in causa quoque est, vt lentes in illis potius locis nascantur, illicque melius etiam conspiciantur: quamobrem & in manuum digitorumque conuexo potius quam volâ lentes prodire patereque videmus.

Fortè & pilis, tenuissimis præsertim, quales etiam in nudis alioquin apparentibus sedibus poris insiti sunt, attritis vnâ cum radicibus, succo qui eos alere debuit ob id luxuriante, eadem maculæ possunt enasci, illis maximè in locis, vbi frequenti lotionè & frictione, vt in facie & manibus, abstersione sic eradicantur.

Succus nutritiens pilos, porus se ingerens vitiosus, causa Vitiliginis.
A succo pilos nutriente, porisque se ingerente, si vitiosus sit, maculæ quas Vitilignes seu Alphas vocant, prodeunt, quando ille ad poros delatus, ob vitium ad pilos alendos aut perfectos procreandos inutilis, in ambitum illic pororum, se in cutem exiguo spacio circumfundens, vt lentes, simili ratione à nutrimento pilorum oriri modò ostendimus, sic hîc maculas eiusmodi pro sacci prauis diuersitate nunc albas, nunc subnigras gignit; ob quam causam pili illic infixi, cum cōuenienti nutrimento destituantur, decidunt, & si alibi ibidem recrecant, ob hoc nutrimenti vitium, imperfecti, tenues nimirum & lanuginosi albi que, quamuis prius aliter colorati fuerint, recrescunt, cutisque illic à succo hoc prauo alba corruptaque & insensibilis fit, punctaque non sanguinem sed saniem virosam, vel albam materiam expromit. Erumpuntque hæ maculæ nunc hoc, nunc illo loco, quocunque natura vitiosum hunc succum ad poros ablegat.

Talis autem succus vitiosus ex deprauata assimilatione illius loci, vbi maculæ hæ fiunt, prodit, per quam sanguis ille, qui ad nutritionem eò defertur, non in succum conuenientem, sed prauum locoque deprauato similem, & à quo deinceps fouetur, vitiosusque nutritur, conuertitur, eadem ferè ratione, vt in elephantiasi, hoc itidem in cutaneis pluribus locis, ampliori spacio accidere ostendimus, sic hîc angustiori loco, in paucioribus sedibus euenit, & quemadmodum in ea ex peculiari quadam cutis lue, alia vi-

tia prodeunt, ita hæ maculæ ex alia, non tamen adeò ab ea quæ in elephantiasi se offert, diuersa, cum alphæ sæpè elephantiasim præcedant, eamque venturam significant. Cuius deprauatæ assimilationis causa quoque vt & elephantiasis, venenata quædam vis, vel similis nonnihil huic vel dissimilis, à semine profecta, vel in sanguine aliisve humoribus suscitata latens, vel per cōtagium corpus inuadens, esse potest. Alia enim ratione, nec pituita nec melancholia, quos humores eiusmodi alphas producere putat, suis qualitatibus hoc efficere, neque hæ quoque à crudo sanguine, vt aliqui docent, proficisci possent, cum in cachexia, quæ inde oritur, nullæ eiusmodi maculæ se offerant, & si inde nascerentur, totum corpus vt ex crudo sanguine intumescit, ita maculis illis vniuersum scateret.

Bilis quæ colore eximio prædita est, si ad *Bilis ad superficiem corporis feratur; hæc simili colore tingitur, Ictericæ cuiuscunque causæ esse potest. Qui color eò melius & citius elucet, quò in albicantem magis sedem cadit, vt in oculorum fit albo, cuteque minus fusca. Hoc autem non naturalis bilis quæ in venis consistit, & sanguinis tenuior pars est, nec flauescit sed rubet, efficit, verum excrementitia dicta, quæ in venis meseraicis contenta, illic in vesiculam propriam separatur, flauetque; vel præternaturalis, quæ ex huius corruptione genita, amplius flauescit aut virescit vel etiam nigrescit. Eiusmodi bilis, si è venis meseraicis, sero quod omnium humorum est vehiculum, diluta, vnâ cum sanguine in venam cauam, atque inde eiusdem ferri beneficio cum illo per venas ad exteriora corporis feratur, illicque in cutem aliasque membranas, vt & oculi tunicam, sparsim non punctim, sicuti cum maculas & pustulas biliosas gignit, effundatur, tunc se in eam insinuans, colore quo prædita est, colorat, nec, cum sero contemperata sit, adeò atque cum pura in pustulis ab illa genitis eò defertur, ardore afficit, nisi quatenus pruritus mouet. Sed & portio huius bilis cum sero ad renes indeque ad vesicam delata, vrinas simili colore imbuat, crassasque reddit.*

Quod autē eiusmodi bilis ē venis meseraicis in cauē ramos transferatur, indeq; in exteriora corporis & in cute subsistat, nec per sudores dissipetur, causæ concurrunt variæ, quarum præcipuē sunt Segregatio illius & Excretio impedita.

Segregatio bilis in venis meseraicis, cum in hepate fiat, illicque ē venæ portæ venis in porū cholidocī ramos transferatur, indeque illi adnatam vesiculā, si ea vel morbo aliquo hepatis impediatur, vel ob copiam perfici nequeat, in venis portæ retenta, tandem, vti dictum, in venæ cauæ ramos irrumpit.

Quod ab obstructione horū bilis meatuum per hepatis substantiā disperforū frequenter euenit, cū tūc, etsi à sanguine in venis hepatis segregetur, tamē propter hanc pororum oburationem, in vesiculā repurgari nō possit, & proin cum fero & sanguine in venā cauam trāslata, & per corpus distributa, illud, vti dictū, colore quo eximio prædita est, tingat & discolorēt. Quæ obstructio à causis iisdem, à quib. obstructio in aliis vasis hepatis fieri, & cachexiā gignere, in ea describēda ostendimus, hīc etiā in ictero dependere potest, vt à chylo, sanguine, fero vel pituita, si hæc, dum bilis fit in poros hosce distributio, simul illis se ingerāt, illicq; retenta, crassescāt vel in arenulas tophosve conuertantur, cuiusmodi quoq; materia sectione in iis inuenitur. Sed & à bile ipsa tenaciore in poris illis angustioribus diutius herente, eadem obstructio fieri potest, si præsertim eam illic acquirat duritiē, qualem in auribus nōnunquā illi cōtingere, auresq; obrurare videm⁹, dum ab illis expurgātur; quod dum ratione ipsius bilis, si viscosior quā par erat, gignatur, vel ob calorē hepatis, eā adassantis potest accidere. Sicuti & in ipsa vesicula illius, & poro ad intestina desinente hoc fieri quoq; posse, & quandoque in calculum conuerti, si illic obstructio oboriatur, mox ostendimus.

Tumores quoq; & scirrhi hepatis, vti vasa alia hepatis prementes & angustātes, Cachexiæ vti in ea declaratū fuit, sic & si hosce meatus bilis eo modo occludant, ictero occasionem præbent, qui tunc hydropem qui inde quoque sequitur, vti in eo ostenderur, præcedit, eumque comitatur.

Quod & si abscessus aliquis vel putredo aut corruptio in hoc viscere accadat, euenire potest, vt tunc nō segregatis sed confusis inter se humorib⁹, & icterus & hydrops simul sequantur. Inflammatio etiā hepatis simili modo hæce vias arctando, & simul bilem accendendo, atq; in venam cauā propellendo, icterū cæteris illius symptomatib⁹ copulat.

Ob copiam bilis & nimiam illius in venis meseraicis redundantiam quandoq; accidit, vt, cum vniuersa, quod in hepate fit, in suam vesiculam segregari nequeat, aut illa eam recipere non valeat, etsi aliquando admodum ampla, & capax inueniatur, tūc portio illius in venam cauam rapta, indeq; ad exteriora delata, colore flauo, si naturam excrementitiæ bilis seruet, vel si ab ea degenerans, ob corruptionem in venis meseraicis, amplius flauescat, vel viridis aut atra fiat, simili colore cutem imbuat, icterumq; vel flauum vel nigrum producat. Quod aliquando etiam antequam alium morbū gignat, facit, quando illic turgens in venasq; irrepens, icterū mox subsequendorum à bile genitorum morborum prænuncium parit. Alias verò prius ibi putrescens febresq; intermittētes gignens, cum in harum paroxysmis portio illius semper aliqua in venas transfusa, per sudores dissipetur, si hoc non sufficienter fiat, illicque subsistat, icterum febrī copulat: vel si vniuersa febrium hæc materia per crisiſim ē venis meseraicis ad cutem transfundatur, icterum febrem soluentem, procreat. Quod & in aliis ex corruptione vel redundantia bilis in hisce venis genitis morbis potest accidere, vt illos hac ratione icterus comitetur vel sequatur, sicuti in colico dolore à bile, frequenter euenire diximus, si illa partim ad intestina delata, partim remanens, icterum colico dolori iungat, vel etiam cessante dolore colico, quia non sufficienter medicamentis vel sponte expurgata fuit, postea icterū, qui facile eum sequi solet, post se relinquat. Sicuti hæc in horum affectuum tractatione vbius explicata fuerunt. Adiuuante interim sæpē vi naturæ, quæ cum id quod noxium illique molestum est, ægrè ferat, acri hoc humore, licet dum in venis adhuc remanet, sanguine contemperatus, diutius

sæpè latere possit, excitata, eum si non ad intestina, quo venæ meseraicæ desinunt, vti cathartico præsertim commota plærunque facere solet, excutiat, in venas maiores, vti dictum, transfundit. Quæ & causa fortè, quod à Veneno sumpto icterus quandoque producat, naturâ sic exagitante & conturbante humores, nisi alia occulta vi, qua in venenis diuersas molitur operationes, hoc faciat, in illis præsertim, in quibus bilis abundat copia. Cuius causâ vti diuersa icteri prodeunt genera, vti dictum, sic eò citius hoc fiet, si morbus aliquis iecoris enarratus, segregationem hanc bilis simul impediât.

Quam segregationem in liene, ab illius quoque morbis, veluti obstructione, & duritie, similiter vt in hepate, impediri, & tunc atram bilem, quam in liene coaceruari & contineri existimant, in venas abripi indeq; Icterus nigrum prouenire, aliqui docuerunt. Verum cum in liene eiusmodi bilis nullibi, nec sinus aut vesicula aliqua, quâ recipi deberet, deprehendatur, inde sanè ea prodire minimè poterit, neque etsi adesset, in venam cauam, quæ nullo ramo lienem attingit, deferri, sed si in alia vasa transferretur, eam in arteriæ ramos, quibus lien intexitur, deuenire necesse esset, vnde longè grauiora, quàm icterus, sequerentur accidentia. Quare atram hanc bilem non necesse est in liene perquirere, cum hæc in venæ portæ ramis, quorum dexter ad hepar fertur, sinister ad lienem (à quo in lienem portionem aliquam illius perferri posse, non negamus) contenta, si præternaturalis fiat, vti dictum, & flauum & viridem & nigrum colorem induat, nec dum alia via, tam à sinistra quàm dextra sede, quam per hepar, vti dictum, in venam cauam transfundi possit: Quod nisi fiat, lienis solus affectus icterum nunquam inducet. Causas autem huius bilis tam flauæ quàm viridis & atræ redundantia, in febribus intermittentibus, quæ inde quoque prodeunt, vti & quartanam ab ea bile, non quæ in liene est, prodire ostendimus, abundè exposuimus, vt non necesse sit eas hic repetere.

Excretio bilis per porum cholidocum in

intestina, si non fiat, tunc regurgitans è vesicula rursum per porum illius superiora in hepar, illiusque venas, eodem modo, vt cum non segregatur, in venam cauam transiens, icterum parit, tuncque excrementa alui nulla bile perfusa, minimè colorata sunt, nec aluum ad excernendum stimulant. Hoc autem ab iisdem causis, à quibus obstruendo vasa illa in hepate segregationem impediri diximus, etiam hîc fieri potest, vt humoribus, si in porum delabantur eumque obstruant: vel etiam tumoribus, si vesiculæ huius ceruicem vel porum descendentem comprimant: Vel proprio huius vesiculæ affectu, veluti est illius inflammatio vel tumor. Quò & calculos qui aliquando in ea inueniuntur, aurei argenteiue coloris referimus, bilem item ipsam tenaciorem factam & valde incrassatam, qualem ex auribus expurgari interdum videmus, cui similem in vesicula fellis sectione inuenimus. Quæ duo si in angustias huius vesiculæ perueniant, poroque inhæreant, bilis descensum & expurgationem, vti dictum, impediunt.

Verum non solum quia bilis hoc pacto non excernitur, icterus fit, sed & per venam cauam, ad cutem vsque effusa, quæ per poros cum sudore vnâ cum sero euacuari posset, vti sæpè fit, si ea quoque excretio impediatur, subsistens, cutem colorabit, minùs, si portio illius, vel planè non, si tota, vt cum exigua illius est quantitas, sudoribus exhauriatur & absumatur. Quæ sudoris suppressio, ob pororum cutis adstrictionem à diuersis causis alibi explicatis, proficisci solet, vnde & in biliosis sudoribus in illis qui hisce abundant, calore & balnei præsertim concitatis, si subito frigori se exponant, cutem sæpè colorari flauitie videmus, eamque etiam per sudores novos rursum absumi.

A bile sincera maculæ vix dum, de quibus hîc agimus, gignuntur, nec lentes quidem, quas à nutrimento nasci docuimus; Vti verò aliæ maculæ seu pustulæ potius ardore & dolore molestæ, quam colore discolorantes, vt sunt herpes; de quibus indoloribus egimus.

*Fumo-
re prau-
in mor-
bu mali-
gno, cau-
sa Ma-
cularum
peruer-
sarum in
febris
malignis
& lue-
bus.*

A prauis humoribus in morbis malignis variæ maculæ generantur, quales in febribus puris, putridis, malignis, pestilentia- libus, venenatis & lue venereâ, elephantia, stomacace, aut aliis morbis suboriri, in gene- ribus prius ostendimus. Qui humores vene- nâve, quibus viribus id efficiant, in illis mor- bis, quorum & simul causæ, vti & macula- rum in illis prodeuntium existunt, quan- tum quidem in eiusmodi occultis causis as- sequi licet, descripsimus.

*Sordes
causa.
Coloris
obsoleti.
in cute et
nigri sub
Vnguibus.
Den-
tiumq;
flauitres
& ni-
gredinis.*

A fordibus adhærentibus, cutis color ob- fuscatur & obsoletus redditur, sicuti cum de- fordibus in Reiectis agemus, unde hæ pro- ueniant, explicabimus.

*Colores
ab exter-
na profe-
cti causa
Discolo-
rationis
Cuti.
Vnguibus
& Den-
tium.*

Sub vnguibus quoque collectæ sordes, inter ipsos & cutem, vbi dehiscunt, per ipsos translucetes, faciunt vt extremitates ipso- rum nigræ & turpes esse videantur.

Dentes inprimis, fordibus inquinantur, & vel flauescunt, vel liuent, aut nigricant, quæ cum albissimi sint, eò citius in illis ap- parent. Quarum sordium causas similiter in fordiu descriptione, in reiectis proponemus.

Ab aliis aliter commaculantibus, vel al- lium colorem inducentibus vel imprimen- tibus, cutis, dentes, vngues & pili quoq; di- uersos colores adipisci possunt. Sic cutis in- manibus præsertim nigra fit contactu nu- cum viridium, talisque ad dies aliquot ma- net: Alias crocea, rubra, cœrulea alioue mo- do colorata, à succis aliis, fructuum dum de- cerpuntur, vel coloribus dum illi versantur, efficitur. Quæ & ratione Americani nudi po- puli, studio se decoris gratiâ diuersimodè pingunt. Et ex nostris pueri lasciui scarifica- tæ cute & puluere sclopetario infricato, vt certas notas vel characteres cuti imprimât, arte efficere solent. Dentes quoque ab inge- stis sic colorari possunt, inter quæ adstrin- gentia dentes potissimum denigrant. Vn- gues discolorantur & nigri sunt in coriariis ob calcis & lixiuij frequerem tractationem, diuque hic color in illis perseverat.

*Calor cu-
tem di-
latans
causa co-
loris. Ru-
bicun-
dioris &*

Calor non solum sanguinem alliciendo, viuidum vel rubrum colorem, frigusque eundem reprimendo, pallorem corpori con- ciliat, vti ostensum fuit, sed & calor quia cu- tem dilatando, vt per eam sanguineus color

*Viuidio-
ris.
Frigus
cutem
consen-
sans cau-
sa Colo-
ri Ob-
scurioris.
Siccitas
cutis,
causa il-
lus Co-
loris ob-
scurioris
& Ni-
gredinis
vulgo dis-
ta.*

melius elucescat, efficit, & frigus eandem constringendo & condensando minus pel- lucidam reddit, vt qui calent colorem viui- diorem, qui frigent, opacum & obscurum magis obtineant, in causa sunt.

Siccitas nimia cutis, colorem etiam im- mutat, eamque fuscâ magis efficit, tum quia exiccando spissiore, vel constringen- do rugosiore reddit, cum crassities illius, vt opaca fiat, efficiat, & rugæ vmbra facien- tes, obscuritatem in ea inducant. Sicuti ab ardore solis cute diu exiccata & veluti per- uisâ, eam nigriorem, vti vocant, fieri cerni- mus; Et ex senio cutem aridam factam fu- scâ magis apparere. Idem quoq; si à mor- bo aliisve externis iniuriis sicca admodum reddatur, vel alioquin ob consumptionem subiectæ carnis laxata, quæ prius tensa fue- rat, rugas acquirat, euenire; Vel etiam ni- mium humectata, in balneo similiter corru- gari.

*Siccitas
membra-
narum
Oculi
causa
Macu-
larum
albarum
in illis.*

In oculis ob exiccata & indurata cal- losamque factam tunicam corneam, in ea Maculæ albæ, Albugines & Cicatrices dicte, nascuntur. Atque ob exiccata tenacemq; factum, sensimque induratum & veluti ex- coctum humorem aqueum, macula quoque alba, hypochyma, per corneæ sedem pupillæ oppositam, translucet, cum perspicuitate qua cornea tunica & humor ille prædita esse debebant; amissa albedo illa subsequatur, sicuti videmus album oui crudum pelluci- dum & clarum esse, coctum & incrassatum: exactè album reddi, luciditatemque amitte- re. Quæ in oculis eiusmodi lucidarum par- tium exiccario & induratio, à causis variis proficiscitur, sicuti eas in hisce maculis de- scribendis, in visus defectibus, qui inde pro- ueniunt, abundè declarauimus.

*Siccitas
in Vn-
guibus
causa
Macu-
larum
albarum
in illis.*

In vnguibus maculæ quoque albæ, illic vbi transparentia ipforum, à causis non nihil similibz, in puncto veluti deperditur, oriun- tur; quod si à nutrimento, quo aluntur, ac- cidit, si in eo porriuncula vel minima sit, ab ea quæ pellucidam vnguium substantiam reparare, lucidamque continere debebat, a- liena, nihilominus tamen nutriendæ adhuc apta: quæ aliunde, vt ab ossium vicinorum nutrimento crassiore detedens, & hinc lu- cidior.

89
eidiori vnguim permista, vnguis eam portiunculam cui apponitur opacam & albam, nec vt aliam, pellucidam reddit, quod in iunioribus eò frequentius euenit, cum dum corpora crescunt, ossaque tunc quoque augentur, copiosiori nutrimento abundantia, ab ipsis eò facilius aliquid hoc deriuari, illisque apponi possit, sicuti ex succorum nutrientium confusione, duos varios tumores quoque nasci solere, in illis explicauimus.

Cæterum & vngues non solum exiguo hoc spacio, sublata pelluciditate, albis maculis notati depræhenduntur, sed & vniuersos albos & opacos factos fuisse in quibusdam senibus obseruauimus, illis ætatis causâ adeo exiccati & induratis, vt vndiq; transparentiam amiserint; quâ ratione & cornua & ossa & calamos pennarum, vsta albescere cernimus.

Siccitas Pilorum causa Canities.
In pilis hoc idem accidit, vt dealbentur seu canescant; postquam pelluciditatem (quam pili quoq; vt vngues & cornea tunica obtinuerunt, licet ob exilitatem non ita in illis hoc conspicuum euadat, ex splendore tamen ipsorum cognosci potest) ob omnimodam exiccationem & indurationem amiserunt. Quod in illis æquæ ac in cæteris, eoq; frequentius accidit, cum sint alioquin siccissimi: ob quam causam ætatis decursu vt aliæ partes siccescunt, sic & illi amplius exiccati induratique, quod circa radices primum fit, vnde crescendo & procedendo, tandem toto ductu cani euadunt, atq; in senibus alias citius alias tardius, pro siccitate citius tardiusve obortâ, vel in principio illius vel progressu, vel extremo canities se offert. Ab aliis causis, cum pili non tam facile alterentur, ægrè hoc euenit, licet ob curas & mœorem canescere aliquos posse vulgus autumat, quod tamen vix alia ratione, quam senium maturando, facere possunt: Et si subito aliquos canos factos fuisse scribant. Quod autem pili interdum non eadem in sede, sed distinctis in locis albescant, vel etiam in illis qui vnâ sedem comprehendunt, aliquibus saltem hoc, aliis minimè accidat, pilorum dispositio inæqualis, vt & cutis cui insigantur, esse potest: Vbi & hoc obseruatur,

quod quod crassiores sunt pili, eò maturius canescunt, & quod in nigrioribus citius quâ rubris, cum in illis albedo incipiens citius cognoscatur, se patefaciat. Quæ & causa esse potest, quod in barba, etsi iunior, vt dici solet, sit capillis, canities interdum celerius quàm in illis se exerat.

Curatio.

Variat, prout discolorationes hæ vel in Cute aut Oculis fiunt: Vel in Dentibus, Vnguibus & Pilis accidunt.

Cutis discolorationibus conueniens cura, accommodatur primum Generalioribus, postea Particularibus.

Generalioribus quæ debetur cura, proportionè causæ & vt illa vel à succo nutriente, aut à bile, vel à sanguine aut semine dependet, dirigitur.

A succo nutriente crudo & imperfecto *Cachexia cura.* quæ procedit Cachexia, in qua color flori-dus amittitur, Pallorq; introducitur, vel alienus simul accedit, si cacochymia adsit, eaq; ab hepatis aut lienis imbecillitate nondum adeo confirmata, vel ab obstructionibus ab humoribus nondum adeo infixis oriatur, facilius curationem admittet. Si vero hæc imbecillitas viscerum sanguificationis, aut obstructio altius radices egerit, tunc in leucophlegmaticam, vt dictum, facile conuertitur, vel in hydropem ascitem abit, è quibus hydropis speciebus, nisi grauior accedat noxa, illa facilius, hæc difficilius sanatur. Omniumque difficillimè vel vix dum curari potest cachexia, si viscerum extrema adsit debilitas aut obstructio, ab indurata materia vel topico profecta, vt & si durities, scirrhus aut tumor aliquis in hisce visceribus, vnde hydrops ascites sequitur, occurrat, incurabilis.

Curatio cachexiæ secundum causam in-ituenda; quam diximus esse viscerum, hepatis vel lienis, aut etiam venarum meseraicarum imbecillitatem, intemperiem frigidâ vel calidam, obstructionem, atq; in hisce visceribus duritiem & tumores duos. Quæ si causa aliqua externa internave, excitarit, illa ante omnia erit auertenda, vt victus indecens, immoderata sanguinis profusio, venus

nimia, aliave à quibus hosce affectus originem traxisse, & adhuc eosdem fouere cognoscimus: Dein & illuuius, quæ in hisce cumulatur, euacuanda: Atque interim si ab imbecillitate nata fuerit cachexia, eam corrigemus; si ab intemperie frigida vel calida, eam alterabimus: si ab obstructione, eam aperiemus, si à duritie vel tumore duro, ea emollire & dissoluere studebimus; intus forisque administratis remediis, vtendo maxime iis, quæ visceribus hisce appropriata censentur, & proin Hepatica vel Splenetica dicuntur, vel saltem ea semper cæteris quæ id præstant, permiscendo, additis quoq; quæ ventriculū, si ille debilitatus sit, respiciant. Quæ omnia remedia, cum vnum sepe, ex diuersis præsertim cōpositum, diuersis causis accommodari queat, in duas classes distribuemus. Atq; in vna, ea quæ & in imbecillitate, intemperie frigida, obstructione, duritie vel tumore duro, nunc vni alicui ex illis causis, nunc pluribus accommodantur, describemus. In altera verò, illa remedia, quæ si ab intemperie calida cachexia dependeat, cum hæc peculiarem & nonnihil ab illis variantem curam requirat, locum habebunt, proponemus; nunc à curatione illa exorsuri, quæ primæ classis remediis sequentibus modis administratur.

Venæ apertio per sectionem nonnunquam locum habebit in eiusmodi cachexiis, si hepatis adsit obstructio & plethora, quæ forrè sic moto sanguinis fluxu eoq; concitato, humores in hepatis vasis infecti vnà cum sanguine nonnihil cedent, maxime verò si cacochymia simul adsit in sanguine, ad eam exhauriendam conueniet: Fitque in brachio dextro, vbi humilior vena conuenientior censetur & proin hepatica dicitur, quæ & in manu secari potest; vel etiam in crurum inferioribus, si menses, vti fere fit, suppressi sint. In splenis verò eiusmodi affectibus, si cacochymia quoque colligatur in venis, illius causâ in sinistro brachio aperitur, in quo lienarem & in manu saluatellam peculiari-ter splene affecto, incisam probant.

Hæmorrhoidum apertio vel prouocatio pervenas meseraicas, reuellendo tum in hepatis tum lienis tum venarum meseraica-

rum obstructionibus plurimum proderit, tum etiam cacochymiam illic collectam educendo.

Vomitus in obstructionibus & hepatis & lienis, non solum cruditates auferendo, sed & naturam ad excretionem sollicitando, prodesse potest, qui facilius à cibo sumpto concitatur.

Clysmata quæ emolliant, stimulent & obstructiones soluant, injiciuntur, suntque ex decocto communis Clysmatis, addendo decocto radic. Aperitivas, Cicera rubra, semina quatuor Frigida maiora, dissoluendoque in eo elect. purgantia, nonnunquam & Vrinæ quartarium j. & Fermenti acris ʒ. ʒ. & præter olea communia, etiam Capparorum vel Irimum.

Vel vtendum Clysteribus in Leucophlegmatia expositis.

Purgationes per aluum instituuntur in obstructionibus, vt sic natura mota semper aliquid ex angustis protrudat, dein & in aliis causis vt viscerum imbecillitate, vel intemperie aut duritie, quia multa colliguntur excrementa, eæ quoque tunc locum habebunt; Paranturque ex cholagogis & phlegmagogis, & in lienis præsertim affectibus, melanagogis, cum melancholicum succum illic redundare credat, addendo hisce etiam quæ ventriculū respiciunt, statusq; discutunt, si in leucophlegmatiam tendat, vel hydragoga si in hydropem ascitem vergat, sicuti illis in affectibus eiusmodi purgantia descripta sunt. Hic verò in cachexia sequentia præsertim conueniunt.

Decoctum in obstructione hepatis continens: R. rad. Liquiritiæ ʒ. j. rad. Cichoræ, Iridis an. ʒ. j. rad. Apij veri vel alt. off. ʒ. ʒ. rad. Azari ʒ. ij. Chamæpythidis, Chamædr. Eupator. Capill. vener. an. M. j. feminis Fœniculi ʒ. ij. Petrosel. Erucæ an. ʒ. j. florum Sambuci p. j. Passularum ʒ. ij. fol. Sennæ ʒ. j. sem. Carthami conquis. radic. Polypod. an. ʒ. j. fiat decoctio in Aqua & tertia parte Vini, & in colatura inf. Rhabarb. elect. ʒ. ʒ. Agarici ʒ. iij. Zingiber. ʒ. j. Spicæ ʒ. ʒ. fiat expressio, adde Sacchari q. s. aromatiz. Cinamom. vel Gario-phyll. Pro tribus vicibus.

Vinum ex iisdem aridis, in Vini tb. quatuor

23
tuor vel quinque infusus factum, melius operabitur, fietque efficacius, si Absynthij 3.ij. summitat. Centaurij 3.j. radic. Aristoloch. & Scyllæ præpar. 3.ij. addas.

Aliud decoctum in splenis potissimum eiusmodi affectibus: R. cort. rad. Cappar. Tamaricis an. 3.j. macerentur in aqua & tertia parte Aceti, herbarum Chamædreos, Asplenij ana M.j. florum Buglosi vtriusque, Genistæ ana P.j. seminis Foeniculi 3.ij. femin. Viticis 3.j. Passularum enucleat. 3.vj. rad. Polypodij 3.j. foliorum Sennæ 3.j. fiat decoctio: Pro tribus vicibus, aromatizetur Cinnamon, dulcoretur Saccharo vel Syrupo Cappill. Ven. aut alio.

Vel sic: R. Cortic. Capparum 3.j. Mercurialis, Fumariæ, Thymi, Epithymi ana M.j. foliorum Genistæ, Tamaricis, Rosmar. Borraginis, vel Buglosi ana P.j. Passularum par. x. Sebesten paria quinque, foliorum Sennæ 3.j. Polypodij 3.j. fiat decoctio, in colatura infunde Myrobalan. Indarum vel Chebularum vel etiam aliarum 3.β. Rhabarbari 3.ij. fiat expressio, adde Sacchari q.s. fiat decoctum pro tribus vicibus. Si in decocto cort. rad. Hellebori nigri ad 3.j. addatur efficacius erit.

Simplicius decoctum in lienis obstructionibus fit ex Mercurialis & Fumariæ recentium decoctione in sero Lactis vel Aqua caféi vel lure macro Caponis vel Galli antiqui, cui & alia addi possunt.

Potest & dari decoctum vel Vinū in Leucophlegmatia descripta, si præsertim in eam vergere cachexia videatur.

Potio ex infusione Rhabarbari 3.iiij. facta in Vino absynth. aut aquis Aperitiuis conuenit: Vel puluis cum eiusmodi liquoribus bibitus, vel cum aqua Plantaginis, si fluor menstruus nimius adsit, cachexiamque induxerit. Cui & syrupus Rosarum solutius ad 3.ij. misceri potest. Vel detur potio quæ in Leucophlegmatia descripta est.

Exhibentur & Potiones ex aliis decoctis alterantibus mox explicandis factæ, infundendo Rhabarbar. Agaricum aliave, & dissoluendo electuaria purgantia cholagoga in hepatis, melanagoga in lienis potissimum affectibus.

Pilulæ cum amara & gummata recipere possint, illaque in cachexia præsertim profint, maiori adhuc successu vsurpantur; sæpius vsurpatæ si leuiiores sint.

In obstructionibus & duritiis conuenientes hæ sunt: R. gummi Ammoniaci dissoluti in succo Iridis, Rhabarb. pulu. an. 3.β. cum Oxymelite fiant pilulæ. Pro vna vice: Potest & addi Agaricus, ut magis operetur.

Vel fiant tales: R. Aloës 3.ij. Rhabarbari, Agarici vel Mechoacæ an. 3.j.β. Gummi ammon. dissoluti in Aceto simplici vel scyllitico 3.β. Mastiches 3.j. rad. Gentianæ, Aristoloch. vel Rubiæ, summit. Centaur. min. de vno vel tribus ad 3.ij. rad. Azari, sem. Apij an. 3.j. Zingiber. Spicæ an. 3.β. cum extracto vel succo Absynthij inspissato, vel alio, ut Iridis, vel syrupo Byzantino alioue, aut Terebinthina fiat massa: Potest acicū efficacius purgare volumus, Diacrydio.

Vel sic: R. Turbith 3.j.β. Rhabarb. 3.j. gummi Laccæ vel Bdellij vel Sagapeni, Mastich. an. 3.j. rad. Azari femin. Viticis an. 3.j. Schœnanthi, Spicæ, Croci an. 3.β. excipiantur ut superiores; fiat massa: cuius operatio Diacrydio quoque intendi potest.

Vel fiant tales: R. Aloës optim. 3.ij. Rhabarb. Agarici an. 3.j. Scammon. 3.β. trochisc. de Eupator. vel Rhabarbar. vel aliorum puluerum de oppilantium; an. 3.j. Spicæ 3.β. Mastiches 3.j. gummi Ammoniac. dissolut. in Aceto 3.β. cum syrupo de Absynthio fiat massa.

Ex vñtatis, pilulæ de Eupatorio Mesuæi vtilis sunt, quæ sunt ex rhabarbaro, myrobalanis, aloë, mastiche, croco, succo aggerati, (quod est eupatorium Mesuæi) absynthij, endiuæ.

Vel pilulæ de Rhabarbaro, paratæ ut illæ ex rhabarbaro, myrobalan. & loco aloës ex hiera picra; item mastiche & præter hæc, ex sem. apij, fœniculi, trochisc. diarrh. succis absynthij, liquiritiæ, aquâ fœniculi.

Item pilulæ de Agarico in pituitosis, vri & menstruorum suppressione, quæ R. agaricum, turbith, hieram picram, colocynthidem, myrrham, sarcocollam vel mastichem, rad. ireos, marrubium.

Vel ex fortioribus aggregatiuæ. Quibus
omni-

omnibus etiam gummi Ammoniacum dissolut. in Aceto, cum durities adest, addi potest, possuntque cum succo Iridis vel Absynthij formari. In splenis affectibus etiam fortioribus vtuntur, de quinque generibus Myrobalanorum, alijsque melancholico humori purgando dicatis.

Cum supressi sunt simul menses, pilulæ villissimæ: R. Aloës 3.j. β. Myrrhæ, Rubiæ tinctorum vel Aristoloch. ana 3. β. Agarici, Turbith. ana 3. j. gummi Ammoniæ dissol. in succo Iridis 3. β. Cum syrupo de radicibus: Capiat frequenter.

Si menses nimium fluant aut hemorrhoides, sic fiant: R. Myrobalanorum citrinarum 3.j. Rhabarbari 3.j. β. pulu. Diarrhodon vel Triasant. 3. β. cum succo Rosarum rubr. fiat massula: Sumat 3. β. vel plus, aliquoties.

Electuarium in obstructionibus: R. Mechoacæ 3. iij. Turbithi 3. j. Rhabarbari 3. ij. Cinamomi 3. j. β. Zingib. 3. j. Spicæ 3. j. pul. Triasantali vel alterius 3. j. pulpæ Passul. coctæ parum cum saccharo q. s. ad hæc excipienda: Potest misceri etiam Diacrydium: Detur portio.

Rhabarbarum solum ad 3. iij. puluerisatum & cum pulpa Passularum in bolum redactum & sumptum, hepati valde conuenire, ex eo patet, quod Rhabarbarum anima hepatis esse dicatur: quod aliqui etiam comedunt.

Tabulæ ad idem: R. Rhabarbar. 3. j. β. Mechoacæ 3. j. radic. Gentianæ 3. j. foliorum Absynthij 3. β. Maioran. 3. j. Cinamomi 3. j. Mastiches, Gummi ammoniaci dissol. in Vino ana 3. β. Sacchari dissol. in Vino albo generoso, addendo succi rad. Iridis 3. j. Coquantur in tabellas: si Turbith. addatur vel Diacrydium, potentiùs purgabit.

Alterantia quæ exhibentur causâ hepatis vel lienis imbecillitatis, calorē natium in illis debilitatum reparare vel excitare debent, idque appropriatis potissimum hisce visceribus medicamentis, proprietate illâ suâ id agentibus, temperatis potius quam frigidis, vel si frigida simul adsit intemperies, calidioribus. Obstructionem verò occasione vtimur aperientibus & abstergentibus; fortiora ex illis in lienis obstructione vsur-

pantes, addendo semper quædam, quæ adstrictione leui in hepate, minori in liene obstructo, prædita, illa simul roborent, vel quæ alioquin illis appropriata nihilominus obstructiones solvere possint, qualis est endiua & cichorium, hepati amica, quæ simul aperire, amaritudo in ipsis declarat, vti & illud quod non ita vt creditur, refrigerent. His etiam si suspicio de arenulis sit vel calculo in hepate, quæ ea propellant, admiscetur.

Duritie verò & tumorum causâ, emollientibus vtimur, admiscendo quæ simul quod emollitum est dissoluant atque absumant, aut hæc per vices vsurpando. Quæ emollientia, si tumor alius durus, qui in abscessum conuerti posset, viscera occuparet, cum maturent, eo pacto quoque in eo conuenient. Præter quæ in splenis affectibus, quæ flatu discutiunt, plerunque prædictis permiscere solent, tum quod flatibus faciliè illud effici, nonnunquam & intumescere ab ijs posse existiment. Verum cum ideo quod hi vel in hypochondrijs aut ventriculo vel colo collecti, vti dictum, in opinionem hanc venerint, si liene vel hepate obstructo vel indurato, hi illis in locis concurrant, tunc eo nomine prædictis quoque admisceri possunt. Cæterum hæc qualiacunque remedia diuersis formis nunc simplicibus liquidis vel solidis, nunc inuicem permixtis misturis exhibentur.

Inter liquida quæ bibuntur, Decocta varia sunt, quæ vel sic assumuntur, vel prius in syropos, cocta ad vsum reseruantur, idque sequentibus modis.

In sculis incoquantur radices & herbæ Petroselinij, Fœniculi, turiones vel radic. Asparagi, Graminis, Cicera, fem. Melonum, & splene affecto, etiam Portulaca.

Medicata decocta, quæ ante purgationem aliquot vicibus, præparationis loco, vel etiâ postmodum sumi possunt, ad viscera ab obstructione liberanda, fiunt varia sequentibus modis.

Vsitatum in forma syrapi asseruati solitum, est Syrupus de duabus radicibus dictis & ex decocto radic. petroselin. & fœniculi cum saccharo factus.

Ex quinque radicibus aperitiuis sic fieri potest

potest: R. rad. Apij off. seu apij palustr. Petroselin. off. seu apij veri, Fœniculi macerat. in vino an. 3. ij. radic. Graminis, Asparagi vel Rusci an. 3. j. fiat decoctio, & cum saccharo inspissetur, in formam syrupi, vel capiatur per se.

Cōpositus amplius sic parabitur: R. quinque rad. Aperitiu. an. 3. j. rad. Iridis, Liquiritiæ, Calami offic. id est Acori veri, vel Enulæ an. 3. 6. herbarum Endiuæ, Cichorii cum radicibus, Dentis leonis cum radicibus, Eupatorii, Chamædreos, Chamæp. Veronicæ an. M. j. florum Sambuci P. j. seminum quatuor Frigid. maior. 3. iij. semin. Endiuæ, Portulac. an. 3. j. 6. sem. Asparagi 3. j. sem. Anisi 3. ij. Fœniculi, Apij off. vel Petroselin. off. an. 3. j. Pasfularum enucl. 3. j. 6. Cicerum rubr. vel nigr. P. j. fiat decoctio in Aquâ, addita tertia parte Vini, si præsertim radices in Vino non fuerint maceratæ, & in colaturæ q. s. pro aliquot dosibus, dissolue Sacchari q. s. ad dulcorandum, aromatiz. Cinam. 3. j. Spicæ, Schœnanti an. 3. 6. fiat apozema: Pro aliquot dosibus. Vel aucta Sacchari quantitate rursus coquatur ad consistentiam syrupi, si ad usum seruari debeat.

Aliud, quod & lieni magis accommodatur, efficacius fiet, si prædictis omnibus vel aliquibus, addantur cort. radic. Cappari, cort. Tamaricis vel Fraxini, ab externa tunica abraforum an. 3. j. radic. Azari vel Rubiæ 3. 6. herbarum Capilli veneris veri offic. seu Adianthi, vel illius loco Trichomanes, Ceterach, Cuscutæ, Buglosi angusti vel latifolij, Fumariæ, Lupuli an. M. j. florum Buglosi vtriusque Tamaricis, Genistæ an. P. j. seminum Viticis vel Rutæ 3. j. misceantur cum cæteris, & fiat decoctum vt prius.

Cum adhuc validius aperiendum, amara addimus, vt rad. Aristoloch. Scyllam præpar. Absynthium vulg. vel Roma. Marrubium, summit. Centaurij minoris.

Si ventriculi simul adsit imbecillitas, vel flatuum copia, horum causâ addi possunt cæteris, rad. Imperatoriæ, Calamentu, Mentha, Maiorana, Rosmarinus, Polium, semen Carui, Cimini, bacca Lauri. Item Mastiche quandoque decoctionibus hisce additur.

Probatur & decoctum radicum Filicis, Rhapontici, Eryngij, Valerianæ, Crocodilij,

Cardui, Salicis, Pentaphylli, Polemonij, Anchusæ, Smyrni, Nymphææ. Item herb. Hyperici, Scordij, Pilosellæ; Item Pimpinellæ, Filipendulæ cum radicibus, fol. Pini & Picæ, seminum Cappari, Periclymeni, Xyridis, Buni, Erucae. E' quibus vel vnum vel plura inuicem decoqui possunt, vel superioribus quoque decoctis permisceri.

Si hydropis metus sit, adduntur etiam semin. Hederae, gummi Lacca, & hydragoga, vt in hydropse docebitur.

In duritie & scirrhorum viscerum, eadem conferunt, additis simul nonnihil emollientibus: Veluti radic. Altheæ, herb. Maluæ, Viol. Ficub. flor. Chamomill. Meliloti, Violarum & similibus.

Ex succis è plantis expressis, aliqui in formam quoque syrupi cocti, in usu sunt, veluti ex acidis succis parati, qui cum calor & sitis adsunt, conueniunt; Acetosus simplex dictus, qui ex aceto aqua & saccharo coquitur.

Oxymel simplex, fit ex aceto melle & aquâ, squilliticum ex Aceto squillitico.

Oxysaccharum ex succo granatorum, aceto, saccharo.

Ex decoctis & succis acidis facti aliqui syrupi, sunt vsitati, veluti compositi.

De quinque radicibus Mesuæ: R. decoctum radic. quinque aperitiuar. saccharum & acetum.

Oxymel compositum fit ex aceto, melle, aquâ, vt simplex, & decocto rad. apij, petroselin. fœniculi, rusci, asparagi, semin. apij, fœniculi, petroselin.

Oxymel diureticum Neotericorum: R. præter acetum mel & aquam, decoctum radic. apij, petroselin. fœniculi, raphani, asari, leuistici, florum genistæ, semin. fœnic. petroselin. asparagi, rusci, coriandri, cumini.

Oxysaccharum compositum Nicol. fit ex granatorum succo, in quo infusa sint radic. fœniculi, asparagi, rusci, graminis, capill. veneris, scolopendr. polytricum, ceterach, hepatica, violæ.

Acetosus compositus: R. vt simpl. acetum, aquam, saccharum, & præter hæc rad. fœnic. apij, endiuæ, sem. anisi, fœniculi, apij, endiuæ. Quibus addunt aliqui succos endiuæ, apij & liquiritiam, rosas & spicam.

Byzantinus compos. Mesuæi: R. ex prædictis in acetosa compos. acetū, aquam, saccharum, sem. anisi, fœniculi, apij, succum endiu. apij, liquirit. rosas, spicam, & præter hæc succum lupuli, buglossi.

Ex aliis succis amariusculis sic fiunt vsitati syrupi: De Endiuiæ ex succo endiuiæ cum saccharo coctus.

De Fumaria simpl. qui fit ex succo illius & saccharo.

De Lupulo, qui fit ex succis lupul. fumar. & saccharo.

Byzantinus simpl. Mesuæi, qui R. succos endiuiæ, apij, lupuli, buglossi & saccharum.

Ex succis aliis simili ratione syrupi possunt parari, & de ipsis denominari. Veluti ex succis Apij offic. Petros. off. Fœniculi, Eupatorii, aliarumque plantarum aperitiuarum, vel visceribus appropriatarum.

Ex decoctis & succis compositi syrupi in vsu sunt sequentes, quorum tres hepatis, tres posteriores lienis magis obstructionibus soluendis, accommodati censentur, duoq; potestremi simul purgant.

De Endiuiæ compositus fit ex decocto endiuiæ, scariolæ, hepaticæ, buglossi, lactucæ, eupator. melissæ, flor. cord. sem. frig. mai. fantalo alb. rubro & succo endiuiæ, granat. & saccharo.

De Cichorea, cum vel sine rhabarbaro & illius correctiu. spica, Nicol. fit ex decoct. endiu. domesticæ & sylu. cichorii, taraxacon. cicerbitæ, hepaticæ, lactucæ, fumariæ, lupul. capill. alkekengi, ceterach, rad. fœniculi, apij, asparagi, hordei & saccharo.

De Eupatorio Mes. cum Rhabarbaro quoque paratur, & R. rad. apij, fœniculi, endiuiæ, glycirrhizæ, spinæ albæ & Arab. rhabarbarū azarum herb. cuscutam, absynthium, capill. ven. eupatorium, flor. ros. bugl. femina, anisi, fœniculi, schoenanthum, spicam, folium, mastichen, suc. apij, endiuiæ.

De Scolopendr. fit ex decocto scolopendr. phyllitidis, endiuiæ vtriusque, lichenis, cuscutæ, absynth. capill. fl. buglossi. vtriusque; rad. fœn. petros. rufci, sem. quatuor frig. mai. folij, spicæ, cassiæ lignæ, laccæ, & saccharo.

De Fumaria compos. fit ex succo eodem & saccharo & decocto myrobalanorum, cu-

scutæ, absynth. viol. qui minor Fumariæ dicitur. Maiori præter hæc addunt ex purg. in decocto epithymum, polypodiū, tamarind. pruna, passul. liquir. flor. buglossi. vtriusque, ros. pulpam cassiæ.

De Epithymo Mesuæi fit ex iisdem ex quibus syrupus de Fumaria compos. maior, exceptâ cassiâ, additis insuper agarico, thymo, calamentâ, stœchade, semin. fœniculi, anisi & sapâ.

Succi aliqui plantarum dictarū expressi crudi quoque propinari possunt, sed potius vti dictum, in syrupos decocti vsurpantur. Huc tamen & Vinum referendum, quod si tenue & clarum sit, facili penetrâdo, obstructionibus quoque soluendis opportunum.

Vina medicata per infusionem seu macerationem quorundam in vino, accedente interdum leui ebullitione in vase duplici, varia præparari possunt, valde efficacia. Vti ex infus. Absynthij vulg. vel Pontici vinum Absynthites dictum. Quod aliqui parant admistione tantilli Aquæ vitæ, quæ ab Absynthio illi indito amaritudinem hauserit; vel illius aq. vitæ, quæ comis absynthij superfusa, & accensa, rursusque antequam penitus absumatur extincta fuerit.

Vel fiat tale: R. Cichoreæ, Apij officin. rad. Iridis an. 3. j. Absynthij 3. ij. Chamædreos, Chamæpyth. Eupator. vulg. Maioranæ an. 3. j. seminis Fœniculi 3. j. 6. sem. Petrosel. offic. 3. j. his omnibus siccis incisis adde Vini circiter libras quinque.

Et si leni accommodandum sit, cort. rad. Capparum, cort. medij Tamaricis vel Fraxini vel Sambuci an. 3. vj. foliorum Ceterach, florum Genistæ vel Sambuci, seminis Vitis an. 3. j. in Aceto prius macerari possunt, antequam cæteris addantur: Vel Acetum Vini dum coquitur, misceri.

Efficacius erit sed valde amarum, si Centaur. minor sum. 3. j. addas, vel etiam radic. Gentianæ vel Aristol. 3. ij. rad. Asari 3. j. vel quoque Scyllæ præpar. tantundem.

Possunt & alia addi in decoctis proposita, vti rad. Rhabotici & Filicis, Valerianæ, cort. Frangulæ, Rubiæ, Acori veri aliaque illic exposita, quæ siccata vires suas retinent: vel ex solis his vina parari.

Vinum passulatum hepar proprietate iuuare & imbecillum roborare dicitur, quod & gratum & colorem & saporem Vini dulcis ex parte refert: R. Passul. minor. lb. v. Cinamom. conquis. 3. ij. impositis in dolium affundantur Aquæ puræ feruescentis adhuc ab ebullitione Mensur. x. feruentur in obturato vase donec effuerescant, ad vsum. Huic & alia de obstruentia addi possunt, vt radices aliquæ aperitiuæ non ingrata.

Chalybeatum vinum, in quo chalybs extinguitur, similiter operatur, & lieni affecto inprimis conuenit: Quod ex limaturæ Chalybis præparatæ cum Aceto 3. 6. infusione in Vini lb. iij. vel iij. factum, efficacius erit: Vel si chalybis sic præparati puluis, Vinis medicatis prioribus addatur.

In vase seu poculo formato ex ligno Fraxini vel Tamaricis Vinum retentum aliquandiu, bibitum, vim inde suscipere creditur, & lieni potissimum affecto conuenire.

Aquæ stillatitiæ ex efficacioribus plantis elicite, vtiliter quoque dantur, veluti aqua Apij, Absynthij, Centaurij min. rad. Gentianæ, aliæ ve plantarum conuenientium, quæ per se sumuntur, vel electuariis sumptis superbibuntur.

Ex Vitreolo & Tartari tertia parte, addito duplo Silicium, calcinatis in puluerem, & in caua retētis donec dissoluantur, aqua exstillata, rursusque materiæ puluerisatæ superfusa, iterumque destillata, idque tertio, datâ cochlear. mensurâ mirè iuuare in omnibus obstructionibus & hydrope docent Chymici.

Spiritus Tartari in antiquis obstructionibus valde commendatur.

Oleum amygd. dulc. emolliendo durities viscerum, si bibatur, emendare aliquomodo potest: Vti & ol. Amygdal. amararum, quod simul obstructions aperit. Possunt & alia in induratis visceribus, vt oleum commune, Lini, Sesaminum, Cnicinum assumi.

Liquores alij similiter bibuntur; veluti per infusionem facta Lixiua quædam, qualia in hydrope ascite describuntur, exhibita, penetrando & abstergendo, obstructions tollere possunt.

Vrina hominis bibita abstergendo & pe-

netrando, vti de lixiuiis dictum, obstructiones aperit.

Aqua extinctionis Chalybis vel Ferri, sicuti de Vino chalybeato dictum, etiam conuenit sæpè hausta.

Acidæ atramentosæ naturales aquæ si bibantur, cachexias etiam inueteratas sanare possunt, nihilq; magis hoc remedij genere vtilitatum, in nostris regionibus, vnde se coaceruatim ad hæc loca vbi scaturigo harum est aquarum, conferunt, easque manè ieiuni & vesperi continuantes, ad dies viginti vel etiam triginta, bibunt, à poculo vno ad plura indies ascendendo, donec ad mensuram integram, si ferre queant, perueniant. Quarum vsu vel per aluum egregiè purgantur, materiamque atram egerunt, vel copiosè admodum, dum corpus mox post illarum potum exercent, sudant. Quibus sudoribus non solum aqua assatim ieiunè bibita, sed & quod sua aciditate penetrat, occasionem præbet, venasque meseraicas & vasa visceribus intexta, diu peruadens, obstructione liberat, illuuiemque quæ illic hærebat per aluum, & tenuiorem, per vrinas & sudores propellit.

Ex iis quæ in substantia sumuntur, in cibis vel illorum condimentis, probantur; Panis cuius pastæ, petroselinum recens incisum cum ouis imponitur, placentaque inde formatur: Eadem ratione ex Rosmarino fieri potest: vel semine Foeniculi immisto, alijsve vtilibus.

Olera ex herbis iisdem alijsve cocta, addito Buryro & Aceto, inter quæ & Beta cum Sinapi & Aceto probatur. Sium item in acetariis vti & Nasturtium. Rad. Petroselin. Foenicul. turiones Asparagorum recentes, & Vitis nigræ viticulæ teneriores, cocta, comesta.

Capparum cum aceto condit. vsus, in lienis potissimum affectibus.

Amygdalæ item amaræ esitatz: Item Eruu coctū, Lupini cocti cū ruta & pipere. Diosc.

Passularum frequens vsus ad eò hepatis conuenire dicitur, vt generationem sanguinis promouendo impinguare credantur; Licet reliqua dulcia hepatis obesse, & ab eo hepar intumescere doceatur.

Hepata lupi, leporis, anferis, Limacum item commendantur.

Conferuæ & condituæ laudantur, Cichoreæ, flor. & rad. Apij offic. radicum Iridis, florum & radicum, Capillarium herbarum, Absynthij, Iringorum, radic. Valerianæ, Absynthij Pontici comarum, Enulæ radicum, Genistæ, Sambuci, Ebuli, & Tamaricis florum.

Rob. de Sambuco, Ebulo, de baccis Iuniperi.

Extracta molliora in formam rob. decocta, ex plantis variis sic fiunt, & electuariis permista, vel per se sumuntur. Vt Absynthij, ex succo. Iridis aliarumve plantarum, Rhapontici item & Cyclaminis succi, extracta, quæ in induratis visceribus profunt.

Pulueres varij fiunt, quorum aliqui qui præsertim efficaciores sunt, per se sumuntur cum vino aliòve liquore conuenienti, vel in compositiones alias asseruantur, nonnunquam in trochiscos prius formati: Ex simplicioribus sic fiunt pulueres à plantis desumpti, rad. Filicis, Capparium, Rhapontici, Aristolochiæ, fol. Cererach, Cuscutæ, summ. Centaurij, Absynthij.

Salia ex quibusdam plantis facta, vt sal Absynthij commendant Chymici.

Ex animalium quorundam partibus parati pulueres, imbecillitati viscerum admodum succurrere plerisque persuasum: Vti Intestinis gallinacei generis vel Lupi, si prius ea vino eluatur, & in furno adeo exiccantur, vt puluerisari queant, vel si in cineres vrantur, atq; Antispodium dictum inde paratur, rursusq; Vino vel Aqua conuenienti extinguantur vel lauentur, siccanturque, sicque exhibeantur, per se in Vino vel Aqua aut liquore alio, vel addito Cinamomo aliisve aromatib. vel odoratis, vt puluere Diambræ, Diamosci & Saccharo ros. ad gratiam, vel etiam conferuis & aliis misturis permiscantur.

Imprimis interior rugosa crassa ventriculi gallinarum membrana similiter præparata, & exhibitæ in usu est. Hisce & cineres Cancrorum marinorum aliqui addunt.

Iecur Lupinum præparatum hepatis valde appropriatum esse censetur, illiusque pul-

uis, vt prius dictum, exhibetur, vel aliis miscetur. Cuius efficaciam & hepar Leporinum esse aliqui docent.

Lien equinus simili modo paratus & datus, spleni competere docetur, vt & forte lien lupinus.

Cochlearum cineres spleni quoque accommodant, quos cum puluere sem. Lini & Vrticæ propinatos, illud induratum emollire scribunt.

Stercus anserinum siccatum similiter exhibent, cui & alia nonnunquam miscent, vt minus cognoscatur.

Chalybis seu ferri purioris limaturæ præparata, hoc est infusa in Aceto, solo vel mixta cum Vino, puluis in obstructionibus & duritie viscerum, splenis potissimum, additis saccharo & cinamom. ad gratiam, aliisve, cum puluere Stercoris anserini datus, efficacissimus censetur. Quod à chalybe quoque abraditur, dum ensis vel cultri acies acuitur, siccatum similique modo præparatum, idem & forte efficacius, cum in tenuissimum pollinem sic redigatur, efficit.

Vel si limatura dicta, affusâ aquâ regali quam fortem vocant, ita vratur, & in puluerem subtilissimum flauum, Crocum Martis seu ferri ob id dictum redigatur, qui tamen sæpè prius, vt vis aquæ eluatur, ablui debet.

Si in aceto fortissimo limatura macerata, in rubiginem tota vel maior, illius pars redigatur, tutius Crocus ille vsurpabitur; Vel si ferro immerso in Acerum, ferrugo exsudans in eos vsus colligatur.

Quintam essentiam ferri Matthiolus commendat.

Cotem noxiam & Alcyonium tertij generis probat Diosc. Item Corallium.

Compositi vsitati pulueres seu species, ex quibus trochisci vel electuaria formantur, sunt pulueres Trochiscorum de Rosis Mesuæi & Galeni. Item de Croco Nicol. de Absynthio Mesuæi, de Rhabarbaro Mesuæi & Actuarij, de Eupatorio Mesuæo & Actuar. de Cappariis. Mesu. & de Scolopendr. de Lacca. Dein & species electuariorum, Dialaccæ maioris Mesuæi & minoris. Item alterius, Actuarij & Diacurcumæ maioris & minoris.

Ad horum imitationem eligendo ex singulis quæ magis vtilia esse censemus, nos pulveres parabimus, qui vti & illorum species, vel per se exhiberi possunt, cum liquore aliquo, vel in tabulis prius redigi, vel cum asseruari debent, vt & illæ prius, cum Vino generoso vel succis Eupatorii vel Absynthij vel Fœniculi, vel Endiuia, aut syrups, in trochiscos, vel addito Saccharo vel Melle in electuaria redigi. Fiuntque hi pulveres sequenti modo.

Primus: R. Rosarum rubr. 3.ij. Absynthij 3.j. Cinamom. vel Cassiæ lign. 3.ij. Spicæ, Schœnanti an. 3.j. Mastiches 3.ß. fiat pulvis.

Huius loco Trochisci de Rosis Mesuæi qui eadem recipiunt, & cum succo Eupatorii formantur, sumi possunt.

Efficacior erit, si Myrrhæ 3.j. & Croci 3.ß. addas, è quibus additis rosis & schœnantho suos trochiscos de Rosis Galen. componit. Et Nicol. suos Trochiscos de Croco eodem ferè modo parat.

Secundus: R. Rhabarbari 3.ij. rad. Asari, Rubiæ an. 3.ß. Absynthij Pontici quod præferunt, vel Vulgaris, cum viribus illi vti odor & sapor ostendit, minimè cedat 3.j. Rosarum rubr. 3.ij. femin. Anisi 3.j. femin. Apij 3.ß. Spicæ 3.j. fiat pulvis.

Ex iisdem trochisci de Rhabarbaro Mesuæi, additis amygdal. amaris parantur, & cum succis absynthij vel fœniculi vel aqua cuscutæ formantur, huius loco vsurpari possunt. Vel trochisci de Absynthio Mesuæi, qui eadem quæ trochisci de rhabarbaro, excepta rubiâ, & præter hæc mastichem & foliū recipiunt, & cum succo endiuia excipiuntur. Vel etiam trochisci de Eupatorio, qui quoque rhabarbarum, asarum, rosas, femin. anisi, vt illa, & præter hæc spodium, mannam, admittunt, & cum succo eupatorii formantur.

Tertius: R. gummi Laccæ 3.j.ß. Mastiches, Bdellij vel Myrrhæ an. 3.ß. Rhabarb. 3.j. rad. Rubiæ, rad. Asari an. 3.ß. rad. Aristol. Gentianæ an. 3.j. femin. Anisi, Fœniculi an. 3.j. femin. Apij, Ameos an. 3.ß. Croci 3.j. Cinamom. vel Cassiæ lign. 3.ß. Spicæ, Schœnanti an. 3.ß. fiat pulvis.

Hæc eadem compositio Dialacca maior

Mesuæi recipit, & præter hæc costum, sabi-
nam, hyfopum, amygdal. amar. piper & zingiber, quibus speciebus horum loco vti possumus. Quæ aliàs cum succo absynthij, eupatorii & melle, in formam electuarij rediguntur. Est & minor Dialacca, tantum è lacca, myrrha, bdellio, rhabarbaro, costo, rubiâ, aristol. liquirit. croco, schœnantho, pipere & melle composita. Sunt & trochisci Laccæ Mesuæi ex lacca, rhabarbaro, paucis in super additis, quoque concinnati. Quibus minoribus compositionibus tutius ferè quàm maiori illa quæ propter aromata admodum calefacit, vtimur: quorum tamen in hydropo frequens vsus.

Est & alia compositio in hydropo quoque admodum in vsu, Diacurcuma Mesuæi appellata, seu Diacrocon, cum croci bonam quantitatem recipiat, vt obstructionibus hepatis, & præsertim fellis in iſtero, quas crocum solueredocent, magis hoc remediū accommodetur, quod quædam cum dialacca communia, vt crocum, rhabarb. azarum, costum, rubiam, semina anisi, apij, spicam, schœnanthum, cassiam, cinamomum, myrrham, & præter ea in super meum, phu, calament. scordium, ceterach, sem. petroselin. Macedon. dauci, bacc. iuniperi, carpopalsamū, tragach. oppopanacem, succum liquirit. absynthij & eupatorii recipit, & in electuariū redigitur. Est & Diacurcuma minor, ex croco, myrrha, costo, schœnantho, cassiâ, cinam. & melle tantum parata.

Quartus pulvis ad lienis affectus præcipuè directus: R. Cort. rad. capparorum 3.ij. Aristoloch. rot. 3.j. Gentianæ 3.ß. Ceterach. 3.j.ß. florum Genistæ 3.ß. sem. Viticis 3.j. sem. Rutæ 3.ß. gummi Ammon. 3.j. fiat pulvis. Qui cum gummi Ammoniaco in Aceto infusus in trochiscos vtiliter formatur.

Huius loco trochiscis de Scolopendrio vti possumus, qui eadem continent, vel trochiscis de Capparibus Mesuæi, qui acorum, cyperum, calamentham, sem. nigellæ, nasturtij, amygdal. amar. succum eupat. simul recipiunt.

Ex hisce pulueribus vti & aliis hepaticis, alij quoque pulveres per admistionem aliorum fieri possunt. Vt: R. puluer. alicuius

Scopum accommodati 3.j.β. spec. Triasant. vel Diarrhod. 3.j. vel loco illius Santal. trium 3.β. quatuor femin. frigid. Minor. 3.j. feminis Hederæ 3.j. ciner. intest. Galli vel Lupi 3.j. Cinamom. 3.β. fiat pulvis: Detur per se vel cum Saccharo, vel in tabul. redigatur, cum Saccharo dissol. in aqua Absynthij, Cuscutæ vel aliis.

Trochisci de myrrha etiam obstructions aperiunt, & si menses suppressi sint, simul eos prouocant: Dantur soli, vel aliis pulueribus misti.

Hiscæ & Ventriculo affecto species Arom. ros. Diagalangæ, Diacalamenthi & virium causâ Diambrae nonnunquam permiscetur.

Misturæ ex enarratis liquoribus, atque illis quæ in substantia vsurpantur, diuersæ fiunt, tum potionum, tum electuariorum, tum pilularum.

Potiones in forma Iulepi ex commistione syruporum cum aquis fiunt, tum ad præparandum ante purgationes, tum alteradum, sumendo syropos & aquas expositas: Vel etiam alias aquas plantarum, quæ solæ non aded commodè, vel cum tanto effectu bibuntur: vti Cichorij, Endiuia, Hepaticæ, Eupatorij in hepatis, & Cuscutæ, Lupulorû, Fumariæ, Buglossi vtriusque, Tamaricis in lienis affectibus, & cum syrups miscendo, vti & aliarum plantarum aquas.

Vel talis Iulepus sicalor & fitis adfint: R. Aquæ fontis lb. iij. cui & aliæ aquæ stillatitiæ permisceri possunt, Vini gran. quartarium j. Aceti albi quartar. β. Sacchari vel Mellis quartarios tres, clarificentur ad vsum; possent & parum decoqui.

Vel fiat Iulepus: R. succos aliquos prædictarum herbarum ad 3.j.β. Aquæ stillatic. duplum, addendo & Saccharum, clarific. & aromatiz. Cinamom. cui & Vinum acidulum misceri potest.

Lactea potio ex resinæ Laricæ vel Abietinæ 3.j. vel 3.ij. dissolutis cum Vino dulci, ob illius insuauitatem & Vitello oui, non solum abstergendo renum sinus expurgat, sed & hepatis & lienis infarctus admodum exterit aliumque simul soluit.

Electuaria diuersimodè fiunt, exēpli gratiâ.

In obstructione hepatis & imbecillitate: R. conferv. flor. Cichorij & condituræ radic. cum illius an. 3.j.β. conferv. vel condit. radic. Apij offic. 3.j. pulpæ Carnium Passularum parum coctæ in formam rob 3.ij. pulu. triantali 3.j. fiat electuarium; Superbibat aquas conuenientes.

In splenis eiusmodi affectibus: R. conferv. Capill. vener. & imprimis Asplenij, conferv. flor. Tamaricis ana 3.j.β. conferv. florû Genistæ 3.j. cort. rad. Capparum 3.j. feminis Portulacæ & Viticis an. 3.β. cum Syrupo de quinque radicibus fiat electuarium. Potest addi limaturæ Chalybis præpar. 3.β. Superbibat post assumptionem huius, aquas spleni dicatas.

In metu hydropis: R. conferv. flor. Cichorij 3.j.β. conferv. radic. Apij 3.j. conferv. flor. Genistæ 3.β. rob de Ebulo vel Sambuco 3.j. Amygdal. amar. 3.vj. medull. sem. Melorum 3.j. pulpæ Passul. 3.j.β. rasur. Eboris & Cornu cerui an. 3.β. rad. Asari 3.ij. Spicæ, cineris intestin. Gall. vel Lupi, vel Lumbricorum an. 3.j. Syrupi de Absynth. 3.vj. misceantur, fiat electuarium: Possit & Hepar lupi addi & parum Laccæ; Vel ex speciebus supradictis aliquibus 3.j. & cum syrupo de Eupatorio vel Radicibus formari.

Vsitata electuaria sunt, quorum species seu pulueres prius conuenire diximus.

Est & aliud Cyphoides Andromachi dictum, hepatis imbecillitati accommodatû, quod de Vino Arabes nominant, & rectius Elect. de passulis diceretur; quod paratur ex passulis, bdellio, myrrha, terebinth. melle, vino, calam. arom. aspalat. casia, cinamom. schoenantho, spicâ, croco. Sunt qui addendo f. hyosquiami & opium, ex ea opiatam faciant.

Nos ad illius similitudinem, electuarium de Passulis eiusmodi componemus: R. Passul. mundæ. quartar. j. coquantur in Vino, addendo Mellis 3.iiij. contendantur in pul. tem, misce pulueris Calami aromat. offic. Cinamom. Casia an. 3.j.β. Spicæ, Schoenanthi an. 3.β. Croci 3.j. fiat electuarium.

Confectio Raued Seni Mesuæi in obstructionibus vilis; paratur ex rhubarb. succis absynthij, eupatorij, amygd. amar. fumariæ, sem.

fem. anisi, apij, spicâ, croco, casia lign. schœnantho, myrrhâ, melle.

Item Diacostum Mesuæi; quod fit ex costol. aristol. rhabarbaro, asaro, casia lign. cinamom. femin. apij, anisi, schœnantho, myrrhâ, croco & saccharo.

Electuarium de Scoria ferri Rhazis, in splenis affectibus, ex myrobal. scoriâ ferri in aceto infus. thure, spicâ, schœnantho, ammi, melle, zingibere, pipere paratur.

De Chalybis limatura electuarium etiam in vsu est.

Pilulæ ex ingratissimis pulueribus prædictis, vel trochiscis formari possunt; vel Bolus aliquis & sic deglutiri:

Vel alia alio modo ad bibendū vel comedendum alias incommoda sic assumi; vt: R. Hepatis lupi præpar. 3.j. cineris intestin. Lupi, vel Gallin. 3.ß. Stercoris anserini sicci vel columbini 3.j. cum succo Absynthij, fiat massa: Capiat frequenter; Potest & Chalybis limatura addi:

Aut succi omnino amari, aut extracta coctione eousque vt in pilulas formari queant indurata sic deglutiri possunt: Vel si molliores, pulueribus additis sic incorporari, hoc vel etiam alio modo: R. extracti seu succi inspiss. radic. Gentianæ, vel summit. Centaurij min. & Absynthij, incorporetur pulueris radic. Azari 3.ß. feminis Apij, Petroselin. 3.j. Spicæ, Schœnanthi ana 3.j. fiat massula.

In duritie & scirrhus viscerum, vt in obstructionibus ex gummi Ammoniaci 3.ß. vel 3.j. dissolutis in Oxymelle vel Aceto, simplicibus vel squilliticis, aut etiam succo Iridis vel Bryoniæ, bolus vel pilulæ formantur, commodiusque sic sumuntur.

Possunt & alia illi misceri, veluti: R. gummi Ammoniac. dissol. in succo Iridis 3.j. puluer. rad. Filicis 3.ß. fol. Ceterach, feminis Viticis ana 3.j. limaturæ Chalybis præpar. 3.ß. hepatis Lupi præpar. 3.j. cum Oxymel. vel vel Felle vrsi, quod durities admodum & obstructiones dissoluit, fiat massa pilul. Capiat. 3.j. per vices.

Alia quædam gummi eadem ratione exhibita idem ferè præstant, vt Galbanum, Bdellium, Sagapenum vel gummi Pini,

item Lacca cum in hydropem cachexia vergit, separatim iunctimve, & cum Oppopanax sumpta.

In splenis obstructionibus: R. gummi Pini 3.ß. Visci quercin. 3.j. cum Cera fiant pilulæ.

Mastiche, Myrrhâ, Styrax ceteris gummi vel pulueribus admixta similiter dantur: Vti & Asphaltum, seu Bitumen verum, illudque durius quod Gagatem lapidem vocent.

Vel fiant tales pilulæ, quæ loco electuarij Cyphoides, cum ingrata & glutinosa contineant, vsurpari possunt: R. Myrrhæ Bdellij ana 3.j. Croci 3.ß. Spicæ, Schœnanthi ana 3.j. cum Terebinthina fiant pilulæ: Capiat portionem.

Extrinsecus si hepatis vel lienis imbecillitatis causâ, vel quia obstructa induratave aut scirrhusa sunt, cachexia oriatur, hypochondriis, dextro si hepar laboret, sinistro si lien, & circa posteriora magis, cum lien, vetriculo subiaceat, & versus superiora, cum ren sinister illi subiaceat, remedia applicabuntur. Nonnunquam & vniuerso ventri, si in venis meseraicis obstructio quoque sit, vel glandulæ mesenterij, vti sæpè fit, induratae simul sint. Applicando ea quæ attenuando, & incidendo, si obstructiones adsint, soluant. Vel si durities, primum quæ eam emolliant, mox etiam discutiant, eligendo validiora, si lien affectus sit, cum compacta magis illius sit substantia, addendo in vtriusque visceris eiusmodi morbis, quæ proprietate, vel etiam leui adstrictione prædita, illa simul roborât, & si flatu adsint, qui in sinistro hypochondrio frequentius, ventriculi potius quam lienis causâ, cuius substantia flatibus impleri, vt putarunt, minimè potest, occurrunt, quæ eos simul discutiant, ventriculum debilem aliquo pacto foueant. In hosce vsus sequentia remedia parantur.

Inunctiones variis modis fiunt, in obstructionibus potissimum hepatis: R. olei Amygdal. amar. Nardini ana 3.j.ß. olei Cheirini 3.j. olei Rosacei vel Mastichini 3.ß. succorum Apij vel Petroselin. offic. Aceti ana 3.ß. fiat decoctio ad succorum consumptionem, addé rad. Azari, feminis Apij vel Petroselin. offic. ana 3.j. Santalorum omnium 3.ß. Spicæ, Schœ-

Schoenanthi an. ʒ. j. Possunt addi pulu. radic. Cyperi vel Rosarum rubr. & Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Oleum in quo Hepar lupi incisum coexit, hepatis regioni inunctum, imbecillitatem illius corrigere, sanguificationemque admodum iuuare docent. Vti & si ex Hepate Galei piscis vel Raiarum eodem modo oleum paratur.

In lienis obstructionibus sic fieri poterit: R. olei Capparum ʒ. ij. olei Absynthini, olei Amygdal. amar. vel nucleorum Persicorum, succi Ebuli, Aceti fortis an. ʒ. j. pulu. rad. Aristoloch. Azari, feminis Viticis an. ʒ. ʒ. Spicæ, vtriusque an. ʒ. j. Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Vel decoquantur in Olei communis partib. ij. Vini parte j. Aceti parte semisse, Tamaricis folia vel flores, rad. Capparum, & radix Gentianæ, folia Ceterach: Et ex eo oleo fiat inunctio.

In duritie & scirrhorum viscerum, hepatis præsertim: R. olei Liliorum, Irini ana ʒ. ij. olei Amygdal. dulc. Chamomelin. vel Anethini aut de Meliloto an. ʒ. j. ʒ. Axungie Gallinæ vel Anseris, medullæ cruris Vituli vel Cerui an. ʒ. j. succi Iridis ʒ. ij. succi Apij seu Petroselinij ʒ. j. gummi Ammoniac. dissol. in Aceto ʒ. vj. coquantur ad consumpt. succorum, adde pulueris rad. Cyclaminis & Bryoniæ an. ʒ. j. rad. Azari ʒ. ʒ. Spicæ ʒ. j. Ceræ q. s. fiat Linimentum.

Oleum in quo radix Cucumer. aggrestit, Bryoniæ, Cyclaminis, Liliorum bulbi, addito Vino & parum Aceti coxerint, inunctum, valde est efficax.

Si lien induratus sit: R. olei Irini ʒ. iij. olei de Capparibus ʒ. j. ʒ. succi Mercurialis, Ebuli vel Sambuci, Aceti an. ʒ. j. gummi Ammoniaci dissol. in aqua Vitæ, Bdellij vel Galbani an. ʒ. vj. Oppopan. ʒ. ʒ. coquantur ad consumpt. succorum, adde pulu. rad. Cucumer. syluest. Cyclamin. an. ʒ. j. Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Vel: R. rad. Cyclaminis ʒ. j. rad. Bryoniæ ʒ. ʒ. radic. Capparum ʒ. ij. rad. Azari ʒ. j. Spicæ ʒ. ʒ. baccarum Lauri ʒ. ij. contundantur & coquantur in Olei & Aceti æquis partibus, fumanturque huius olei ʒ. iij. mucilag. feminis Lini & Fœnogr. an. ʒ. j. gummi Ammo-

niaci dissol. in Aqua vitæ ʒ. j. Styrcis liquide ʒ. j. axungie Gallinæ ʒ. j. Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Emplastrum ex gummi Ammoniac, additis nonnunquam & aliis gummi generibus, dissolutis in Aceto forti paratum, calidumque splenis regioni applicatum, illius duritiem emollit; addito pauco Oleo spicæ, melius penetrat & operatur.

Vsitata vnguenta & emplastra pro visceribus induratis sunt vnguentum Dialtheæ, emplastrum de Meliloto, quæ efficaciora fient, si gummi prædicta illis addantur. Item emplastrum Diachylon ireatum & gummatum, Ceroneum, Polyarchon Galeni.

Cataplasmata in lienis duritie præcipue vsurpantur. Quæ, cum admodum emollire volumus, parantur, ex rad. Liliorum, Capparum, Allij, Scyllæ, Bryoniæ, Cyclaminis, Dracunculi, Iridis, Raphani; feminibus Lini, Fœnogræci; foliis Brassicæ, Hederæ, Absynthij, Centaurij; floribus Sambuci, Meliloti, Chamomill. Ficubus, Passulis, decoctis in Vino, Aceto & Oleo, addendo farin. Cicerum vel Lupinorum; & lienis causâ, radic. Capparum, fol. Ceterach, Tamaricis, & cum discutere simul volumus, Itatidem, Lepidiū, Teucrium, Linguam canis, Vrticam, Pulegium, eaque omnia decoquendo in Vino, Aceto & Oleo, & contundendo, cum farina Lupinorum vel Cicerum.

Radix Mandragoræ costâ in oleo Lini vel Amygdal. dulc. & Aceto, efficacissimum remedium: vti & Cicuta vel Hyosquiamus sic applicata. Item radices Liliorum eodem modo costæ & contusæ. Quibus gummi, olea pulueresque conuenientes addi possunt.

Splen vulpis vel hœdi lienii applicatus, interger vel contusus, in eiusmodi illius affectibus utilis censetur. Sanguinem, qui è vena post aurem festa emittitur, inunctum lienii, idem efficere, veteres prodiderunt.

Lapis molaris vel pyrites, aut alius siliceus durus candens, si in Aceto acerrimo extinguitur, pannisque linteis inuolutus, spleni duro sæpè adhibeatur, illum emollit. Vel si ab iisdem lapidibus candentibus Aceto aspersis, vapor eleuatus pannis excipiat, & cum

113
cum illis sic lateri admoueat, vel vapor ipse latere excipiat.

Afsium lapidem cū Calce viuā, ex Aceto illinire iubet splenis regioni Dioscorides.

Fotus sunt in hepatis obstructione hoc pacto: R. Absynth. Eupator. summitat. Centaurij an. M. j. radices Azari 3. β. Santalorum omnium 3. iij. Calsiæ lignæ 3. ij. Spicēnardi, Schœnanthi an. 3. j. seminis Apij, Cuscutæ an. 3. j. β. fiat decoctio in Vini & Aquæ æquis partibus: Pro Fomentatione.

In liene obstructo sunt fotus ex decocto facto in Aqua, Vino & Aceto, radicum Capparum, cort. Fraxini vel Tamaricis, Sambuci, herb. Absynthij, Asplenij, Cuscutæ, florum Chamomill. Genistæ, Tamaricis, Sambucij, semin. Portulacæ, Viticis, Apij, Fœniculi, addendo parum de radice Cyperi, & Spicâ vel Schœnâtho. Huic decocto succus Apij quoque misceri potest.

In induratis & scirrhis visceribus sunt ex decocto in Aqua, Vino, Aceto, vel decocto intestinorum facto, plantarum sequentium, vt radic. Altheæ, Lilliorum, Bryoniæ, Iridis, vel etiam Panacis & Vlmi, herb. Maluæ, Altheæ, Geranij, Marrubij, Absynthij, florum Chamomill. Meliloti, Anethi, Sambuci, Violarum, semin. Lini, Fœnogræci, Maluæ, Altheæ, Ficuum, Passularum, additis rad. Azari, Spicâ vtraque: Et si magna emollitione opus sit, rad. Cucumeris asini, Cyclaminis, Mandragoræ. Sin magis discutiendum, Calamenthâ, Pulegio, Origano, Melissâ, Thymo, si. Stœchados vel Lauandulæ. Quod si in lieni sit durities vel scirrhus, admiscēda quedam de puriori fotu. Qui efficaciore redditur, succo Bryoniæ vel Iridis addito.

Ex succis eiusmodi, miscendo & succum Cyclaminis, vel Cucum. asini; item Apij & oleum Amygdalar. amar. vel de Capparibus, cum Vino & Aceto eoque acri vel squillitico, causâ lienis, fotus facti, valde emolliunt.

Vel si in Aceto acerrimo, Marcasita, extingatur, in eoque pannus duplicatus vel phyltrum madefactum, lienis regioni applicetur.

Epithemata hepati imbecilliori vel obstructo quoque aliquid emolumenti adferre possunt, hoc pacto: R. aquarum Endiuæ vel

Cichorij 3. iij. aquæ Apij 3. ij. aquarū Absynthij, summitatum Centaurij vel Gentianæ an. 3. j. Aceti rosacei 3. ij. Santalorum omnium, vel specierum Triasantali 3. j. radic. Asari 3. β. Spicæ, Schœnanthi an. 3. j. misce.

Sacculi ex iisdem ex quibus fotus parati, loco illorum applicari possunt.

Regimine vtendum exquisito; in Victus ratione, cauendo à lentis, crassis, crudis alimentis, & præsertim præpostero illorū vsu, à fructuum horariorum nimio esu & aquæ frigidæ immoderata & intempestiua potione, maxime si inde cachexia prodierit, vt & à ciborū varietate. Condiendo quoq; cibos illis quæ eorum concoctionem adiuuant, in ventriculi imbecillitate descriptis, cum primæ concoctionis vitium non emendet altera, atq; incoquendo & infarciendo cibos iis quæ aperiunt & abstergunt, in cachexia expositis. Inter quæ Saccharum in condituris, non tam ob gratiam, quàm abstersionem, & quod in eo singulare, à paucis obseruatum, quia à putredine arcet, commendandum.

Ab hepatis vel etiam lienis intemperie calida, quam & siccitas sequi solet, si cachexia suborta sit, quæ in hydropem ascitem, vt dictum, facile degenerat, antequam ille superueniat, vel etiâ in illius principio, ad intemperiem calidam visceris affecti, quæ adhuc remansit, emendādā, imbecillitatem quæ inde secuta est, corrigendam, & obstructiones aliquæ accefferint, ad eas referendas, remediis vtimur intus forisque, quæ non nihil refrigerando illa simul roborent, hepar præsertim, ne nimium frigidis lædantur, quapropter quæ caliditate aliqua & leui adstrictione prædita, illorum vires conseruant, vt spicam, absynthium, frigidis permiscemus, & si obstructiones concurrant, aperientia atque abstergentia simul addimus. Quod si verò iam induratis vel fissis visceribus, hydrops radices egerit, tunc eo modo sicuti in hydrope ascite docuimus, in cura procedendum. Antequam verò hæc adueniant, curatio ratione cachexiæ illius, sequenti modo erit instituenda.

Purgationes ex illis quæ bilem maxime respiciunt, atque ex Rhabbarbo cæterisque quæ hepar non adeo accendunt, si recre-

mentorum sit abundantia, sunt instituendæ. Eligendo eiusmodi purgantia ex illis quæ in cachexiæ prioribus causis quoque descripta sunt.

Alterationis causâ in victu, iussulis incoquât Endiuia, Scariolam, Cichorium, Lactucam, Sonchum, vel ea cocta comedant, vel iisdem in Acetariis vtantur. Fructibus vescantur acidulis, coctis, vel succo ipsorum cibos condiant, vel pro condimentis vtantur, vt succo Granatorum acidorum, qui effervescentia vinosus factus, Vinum granatorum dicitur: vel succo Ribes, Berberis, Vuæ aggregitis, Limonum, Citriorum eo modo vtantur.

Potus ordinarius sit Vinum album tenue, dilutum aquâ coctâ. Vel si summa sitis vigeat, Aquam bibant, cui Aceti vel Succu acidu permissione, vinositas quædam vel aciditas concilietur, vel illâ vinum temperetur. Decoctum radic. Cichoreæ, loco potus vsurpari potest, solum vel Vino mistum.

Iulepus utilis per vices sumendus: R. succorum acidorum vnum vel plures ad quart. j. succi Endiuie 3. ij. Aceti 3. j. Aquæ ros. 3. ij. Sacchari q. s. decoquantur in formam Zulapij: Et vtatur, Camphoræ tantillum aliqui permiscant, quæ penetrationis potius causâ, quàm refrigerationis proderit.

Decoctum medicatum sic fit: R. Endiuie M. j. Acetosæ, Lactucæ, Polytrici an. M. β. Tamarindorum 3. j. Prunorum acidorum numero xij. seminum Portulacæ, Endiuie, Cuscutæ an. 3. j. quatuor seminum Frigidorum maiorum 3. ij. seminis Berberis 3. j. β. Rosarum, Violarum an. p. j. coquantur in Aqua, addendo Aceti rosacei 3. ij. & in colatura adde succu aliquem ex supradictis, Sacchari q. s. His Rhabarbarum vel Mannam, cum laxare volumus, addimus.

Syrupi vsitati sunt Endiuie & Cichoreæ simplices & cõpositi, atq; ex acidis qui acetu recipiunt, sicuti huius prius in Cachexiæ prioris cura descripti sunt. Quibus & refrigerationis causâ, syrupos de Acetositar. Citri de Limonibus, Granatoru vti & alios, vt Violarum, Portulacæ, Nenupharis addere possumus: Item alios denouo ex succo Ribes, Berberis, alijsve succis acidis coctos.

Aquæ hic quoque præcipuè sumuntur ad syrupos diluendos, vel alio modo sumendas, Endiuie, Cichorij, Hepaticæ, Cuscutæ, quibus & viscerum roboris causâ, Eupatorij, Absynthij, similesque aquas miscemus.

Pulueres seu species, quæ per se aliàs sumuntur, aliàs in alias formas, trochisci, tabularum, electuariorum, pilularum rediguntur, sequentibus modis vsurpari poterunt; Quorum hic valdè conueniens, etiam in obstructionibus: R. Santali rubri & albi an. 3. j. Santali citrini 3. β. florum Rosarum rub. 3. ij. florum Violarum 3. β. quatuor vel trium florum Frigidoru maiorum 3. j. β. seminis Portulacæ, Endiuie an. 3. β. Antispodij ex ebore, vel rasuræ Eboris 3. ij. fiat puluis, qui cum infusione gummi Tragachanti in aqua Rosarum, vel cum succo Berberorum in trochiscos formari potest.

Si Rhabarbarum addamus & Camphoram, tunc Diatriasantal Nicolai non nihil respondebit; quod præter ea quæ hunc puluerem subintrant, etiam succum liquiritiæ, gummi arabicum & amyllum recipit, sæpequæ duplicato rhabarbaro vsurpatur: Quâ compositione vsitatâ, loco prioris vti possumus.

Est & alia compositio magis operosa, Diarrhedon abbatis Nicolai, quæ & santala, rosas, violas, quatuor sem. frigid. maior. & minora, spodium, gummi arabicum & tragachantum, succum liquirit. rhabarbarum & camphoram, vti diatriasantaloni, & præter hæc, azarum, gran. berberis, sem. anisi, feniculi, ocimi, papauer. mastichem, crocum, spicam, cardamomû, lignum aloës, garyoph. cinamom. moschum, margaritas, os de corde cerui recipit: In obstructionibus quoque vsurpari solita, minusque calefaciens.

Sunt & trochisci Diarrhedon Nicolai, ex rosis, santalis, spodio, croco & caphurâ tantum parati, simpliciores longè quàm prior compositio.

Vti & trochisci de Santalis, sed magis stiptici; qui santalos, rosas, quatuor sem. frigid. maiora, semen portulacæ, semen berberis, spodium, camphoram, & bolum insuper recipiunt.

Vel alij adstrictione quoque præditi, Trochisci de Berberis.

Quorum loco hisce vti possumus minus stipticis: R. trium Santal. Rosar. an. 3. j. Rhabbari 3. j. β. Spodij ex ebore 3. j. feminis Endiuia, Portulacæ, Acetosa an. 3. β. feminis Melonum 3. j. β. Camphoræ 3. β. Sacchari vel Mannæ 3. ij. fiat pulvis, vel cum infusione gummi Tragachantifacian aqua Endiuia, fiant Trochisci.

Pulvis foliorum Endiuia & Cichoreæ, cum vino frequenter sumptus, probatur, cui semen Securidacæ aliqui addunt, & ad gratiam parum Cinamomi.

Tabulæ ex enarratis pulueribus vsitatis Diatrionfantaloni & Diarrhodon factæ, præcipue in vsu sunt. Quæ & ex aliis simili ratione parari possunt, additâ interdum conferuâ florum Cichorij, aliisve.

Ex succo berberis tabulas valde iucundas, calorem contemperantes, sic parari curamus: R. succi racemorum Berberis maturorum 3. ij. Sacchari 15. j. Aquæ fontis vel Endiuia vel Rosar. q. s. Coquantur & redigantur in formam tabularum.

Eadem ratione tabulæ ex succo Ribes, Granatorum, Limonum, Citri factæ, idem præstant, gratæque admodum sunt.

Electuaria varia ex hisce confervis, condituris pulueribusq; cōcinnari possunt, veluti hoc pacto: R. conferv. florum Cichorij, & radic. Cichor. condit. an. 3. j. β. conferv. Violarum, Capilli veneris & Buglosi an. 3. β. sem. Melonum medullæ 3. j. β. pulueris Triasantal 3. j. Cum syrupo de Acetosa, fiat Electuarium humidum, vel illius loco addito Saccharo rosato tabulato, conditum.

Opiatas aliqui ad hepar refrigerandum, vt Philonium, sed nullo successu, cum calida recipiat, exhibent.

Aquarum atramentosarum acidarum naturalium, more vsitato ad aliquot septimanas cōtinuatus potus, vti in priori cachexia cura descriptus, ad calorem hepatis corrigendum, præter cætera illic exposita commoda, magnam adfert vtilitatem, si maturè antequam hydrops ingruat, aquaque iam in pedibus & ventre coaceruerur, hoc fiat, nam eâ iam è venis excidente, cum illius copiam

augeat, amplius minime iuuabit, sed potius tumorem in hydropo augebit, si præsertim, vti tunc ferè fit, parum mingant, interim tamen multum bibant, quod proin pluribus nocuisse deprehendimus, vnde tutius foret, si bibones illi, quibus perpetua sitis calorem hepatis præfagit, etiam antequam cachexia inuaderet, vinum temperarent, aquam in potu ordinariè, vel per vices vti & quotannis vel alternis annis biberent.

Extrinsècus applicatis, horum viscerum & hepatis præsertim intemperie calidâ quoq; non nihil refrigerantib., vti & siccitatè humectantibus emendabimus, additis semper iis, quæ ne ab illis lædantur, leui adstrictione & proprietate impediunt. Vti sequentia existunt.

Inunctio refrigerans & humectans: R. ol. Violac. Nenuph. vel Cucurb. vel de Salicib. lotorum in Aceto vel succo Endiuia 3. ij. ol. Cydoniorum, Rosarum, Myrthi vel Myrthilorum aut Lentsicini an. 3. j. ol. Mastichini 3. β. feminum Frigidorum minorum & Acetosa, florum Rosarum an. 3. β. Santalorum omnium 3. j. Spicæ 3. j. Camphoræ 3. β. Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Alia magis hepati appropriata: R. ol. Rosacei & Violacei an. 3. j. β. ol. Nenuph. Absynthini an. 3. j. succorum Endiuia 3. j. β. succi Eupatorii 3. j. Aceti rosacei 3. vj. decoquantur ad succorum consumptionem, adde Santali rubri & albi an. 3. j. feminis Endiuia, Portulacæ an. 3. β. Spicæ nardi 3. j. Ceræ q. s. fiat vnguentum. Hisce & Camphoram quandoque vel trochiscos de Camphora addunt.

Vsitatum ad hepatis intemperiem est Vnguentum Santalinum, quod fit ex fantalis tribus, rosis, spodio, bolo, camphorâ, oleo rosaceo & cerâ:

Item Vnguentum Rosaceum, quod ex rosis illarumq; succo, & oleo amygdalarum dulcium paratur: cui opium aliqui addunt, quod cum non refrigerare sæpè iam ostenderit: eo nomine nihil iuuabit, nisi cum durities adest, ad eam emolliendam, quod narcotica præstare docuimus, cæteris permisceatur.

Possit & infrigidans Galeni adhiberi, additâ Spicâ.

Epithema hepati applicandum sic commodè fit: R. aquæ Endiuia, vel Cichorij, He-

patice ana ꝑ. iij. aquæ Violarum vel Lactu-
cæ vel Solani, Rosarum ana ꝑ. ij, aquæ Ab-
synthia ꝑ. j. Aceri rosacei vel Vini acid. ꝑ. j. ꝑ.
Santalorum omnium ana ꝑ. ꝑ. Spicæ nardi
ꝑ. j. Camphoræ ꝑ. ꝑ. misce. Possunt & succi
Intybacei addi: Item aqua Acetosæ, Apij,
Cuscutæ, & pulueres seminum Portulacæ,
Endiuia, Apij, Rosarum rubrarum, Spodij &
Masticæ, ob Ventriculum vicinum.

Fotus ad idem fit ex decocto facto in Aqua
communi vel stillatitia conuenienti, addito
Aceto rosaceo vel Vino ex herbis Endiuia,
Cichoreâ, Absynthio, seminibus quatuor
Frigidis maioribus & minoribus, cui Cype-
rus, Spica, Schoenanthum, aliæ pulueres
expositi induntur.

Vel in sacculo hæc cocta, expressa dein ap-
plicanda, qui & ex pulueribus, seminum
Frigidorum minorum, flor. Violarum, Rosa-
rum, Nymphaeæ, addito Spodio & Spicâ, in
panno inclusis parari poterit, sicq; irroratus
prius in aquis destinatis & Aceto, apponi.

Portulaca recens contusa cum aqua Ro-
sarum & Aceto commodè applicatur, cui &
Camphora, aliæque addi possunt.

Vel Cataplasma ex farina Hordei, vel Len-
tium, inspissatum succo Endiuia vel Portu-
lacæ, Oleoque Rosaceo, vel etiam aliis ex su-
peradijs admoueat.

In Viuendi ratione, potissimum sibi ca-
ueant à Vino generoso, à Cibis acribus, aro-
marisatis, salis. Utantur potius humectanti-
bus iusculis, carnibus, cuiusmodi in hec-
ticis descripta fuerunt, sic fortè siccitas hæc à ca-
lore nata, in visceribus impressa poterit cor-
rigi, quod ægrè fit, vbi iam confirmata
fuerit.

À bile qui nascitur icterus, in quo corpus
alio colore tingitur: Si ob copiam eius, ci-
tra alium morbum eueniat, cum natura per
hanc viam non conuenientem se exoneret,
bilis hæc potius ad intestina erit reuocanda.
Quod & in febribus si icterus eas comite-
tur, erit faciendum. Si verò eam sequatur, fe-
bre, per sudores soluat, motus hic nature
potius promouendus quàm impediendus erit.
In aliis morbis quibus icterus iunctus
est, si hoc fiat, illorum potissimum habenda
est ratio, bilem interim semper per vias de-

centes euacuando, & per aluum ac vrinas
reuellendo ac deriuando. Quod si segrega-
tio illius impedita sit, ob hepatis obstructio-
nes, durities, scirrhus, corruptionem, vnde
& hydrops, vel si inflammatio adfit, pro ra-
tione effectuum horum procedendum, & cu-
ratio instituenda. Si excretio ob pori choli-
doci obstructionem accadat, eadem quæ in
obstructione hepatis, vti & si illius sit infla-
matio, quæ in inflammatione illius descripta,
exhibebuntur atque admouebuntur. Si à
veneno sumpto icterus procedat, huic subito
euacuando, cura adhibebitur, per vomitum,
clysmata; si ab ictu aut morsu bestia, per ea
quæ foras venenum rursus euocant, vt cu-
curbitulas aliæque. Dein exhibenda quæ il-
lius perniciem retundunt, antidota aliæque,
inter quæ Cornu cerui & Ebur, & veneno
resistunt, & ictero sanando appropriata sunt.
Præter quæ causæ ratione administrata,
huius symptomatis coloris scilicet præ-
ternaturalis occasione, si sublatâ causâ re-
maneat, topicis adhibitis, reliquias exterge-
mus: Fiuntque hæc omnia per sequentia
remedia.

Sanguinis detractio si copiosa bilis in ve-
næ cauæ ramis insit, & nil alioquin obstat,
quia portionem illius euacuat, ea ratione
proderit; quam & postea sanguine refrige-
rato & concreto, non sanguini, sed sero fla-
uo permixtam esse, illius flauities ostendit.

Sunt qui venas in fronte, vel sub lingua,
ad flauitiem oculorum & faciei auferendam,
aperiunt, exiguo sanè commodo.

Alioquin nisi copia illius in venis sit, cum
exhauriendo venam cauam, vt facilius è ve-
nis meseraicis postea sanguis & cum eo bi-
liosus humor in eam transferatur, ratione ic-
teri, nisi fortè alterius morbi comitis causâ
instituat, parum proderit. Quod & in men-
struis prouocandis intelligendum, cum &
hæc à vena caua prodeant: quæ si in icteri-
cis vti & cachecticis suppressa sint, venæ se-
ctione aliæ arte, nisi prius hæc sanentur,
cum ab illis suppressio illorum potius, quàm
à menstruis retentis hi affectus proueniant,
vti alibi ostendimus, vix promouentur.

Hæmorrhoides quia à venis meseraicis
bilem, quamcunq; tam flauam quàm atram
expura-

expurgant, si fluant spontè vel promotæ, plurimum iuuabunt.

Clysmata ad deiectiones promouendas, si bilis non ad intestina feratur, nec excrementa tingat, aut aluum sollicitet, valde conueniunt, quæ stimulo non solum excrementa, quæ subsistunt, educant, sed & naturam excitando, & aperiendo simul, vt è venis meseraicis, & poro cholidoco, huc peruenire possint, promoueant.

Quo nomine primum emollientes mox stimulant, & qui bili expurgandæ sint accommodati, injiciantur Clysteres, in colicis doloribus expositi & febribus biliosis, aliisve biliosis morbis, addendo quæ vias aperiant, radices & herbas aperitiuas, tandem etiam ad fortissima, si hæc non proficiant, accedendo.

Vomitibus consideratâ causâ, quandoque conueniet: Præsertim si à veneno sumpto icterus proueniat.

Purgantia per deiectiones in genere, ad bilem è venis meseraicis, vbi primum colligitur & in alias venas trāsferatur, repurgandam, accommodantur; quod cholagogis solis, si hæc tantum bilem purgarent, fieri deberet, sed cum & phlegmagoga id ipsum faciant, vti experientia docet, & pleriq; talia etiam præscribunt, parum in eo laborandū, modò causæ hæc rectè accommodentur, quo nomine cum ab obstructionibus hæc bilis congestio potissimum oriatur, hisce soluendis, purgantia vti & alia plerunque remedia accommodantur. Qualia purgantia varia in cachexia, hepatis præsertim causâ facta, descripta sunt, quæ & hic vsurpari possunt. Quibus & sequentia addenda sunt.

Amara vehementer, cum non solum ad obstructiones soluendas conferant, sed & oscula venarum meseraicarum aperiendo, vt bilis, quæ per meatum illi destinatum ad intestina peruenire nequit, hac via eò remeet, & sic ne in venam cauam nimium feratur, efficiant, in ictero ab obstructione admodum vsurpantur; eoque nomine Aloës ad eò in eo exhiberi inter purgantia solet: Tum in forma pilularum, dando inprimis pilulas de Hiera, atque addendo vt simul stimulo melius id quod cupimus præ-

stent, Rhabarbari & Agarici, eandem quantitatē: Vel alias fortiores pilulas illis permiscemus, vt de Rhabarbari vel Aggregatiuas.

Vel dandæ hæc, similes illis, a Galeno approbatæ, quæ R. Aloës 3.ß. Epithymi vel Senne vel Polypodij 3. j. Euphorbij, Sulphuris an. 3.ß. Cum Vino vel Aqua fermentur.

In potione Hiera picra propinatur in eundem vsu, sicq; potissimum in ictero vtilis fit, quæ & in vermibus pellendis, qui aliquando ob bilis absentiam, in excrementis, cum minus tunc amara sint, crescunt, proderit: R. pulueris Hiera picra simplicis. (in qua crocus ob flauitiem etiam ictero resistere creditur) 3. j.ß. Rhabarbari, foliorum Sennæ ana 3. j. Mechoacæ 3.ß. rasuræ Eboris & Cornu cerui an. 3. j. Cinamomi, Spicæ ana 3.ß. fiat puluis: Detur 3. j. cum Sero lactis vel Vino. Si Diacrydij 3. j. addatur, magis operabitur.

Hiera colocynthidis, si loco simplicis sumatur, ob duplicem aloës & colocynthidis summam amaritudinem, longè potentius vias, vti dictum, referabit & naturam excitabit. Quo nomine & vinum ex infusione colocynthidis, in illius pomo excauato, vel aliâ maceratione paratum, exhibent.

Portiones sunt ex Catholico, Diaphœnico, de succo Rosarum, Diaprunis laxat. Diapsyllio, dissolutis in aqua Absynthij, aliisve, nonnunquam additis & syrupis conuenientibus.

Electuarium de Cyclamine aluum subducit & sudores mouet.

Fiunt & ex infusione Rhabarbari cum spica & cinamomo, in vino vel aquis, Agarici trochiscati in Melle, additis aquis, syrupis & electuariis supradictis purgantibus, vel solis hisce infusionibus vsurpatis.

Ex Apozemate præparante, addito Polypodio, Carthamo, Sennâ in decoctione, & postea infundendo Rhabarbarum, Myrobalanos, Agaricum, fit Apozema purgans per dies aliquot assumendum.

Vel Pilulæ Aggregatiuæ Auræ solæ vel mixtæ, vel cum additione pilularum de Rhabarbaro.

Sudorum prouocatio bilem vnâ cum sero è venæ caue ramis exturbat, nec non eam.

quæ cutem inuasit per poros simul abripit: qui proin, prius tamen eâ quæ in venis mēseraicis huic materiam præbuit expurgatâ, ne inde hac commotione in venas abripiatur, prouocati prodesse hac ratione possunt. Qui & exhibitis alibi expositis adhibitisque balneis, vt postea dicitur, euocantur.

Mictionem concitare quoque, ad bilem, quæ aliàs copiosè per vrinas expurgatur eamq; tingit, ampliùs adhuc per hanc viam educendam, conuenit. Quod vt & ea quæ obstructions soluunt iam exponenda partim faciunt, sic ampliùs si diuretica illis addantur id præstabunt, hoc pacto: R. Cicerû rubrorum p.j. feminis Melonum 3.j. feminis Fœniculi 3.ij. feminis Cuscutæ 3.j. Santali rubri 3.j. Spicæ nardi, radicis Azari an. 3.j. decoquatur in Aquis stillatitiis conuenientibus, vel Comuni, vt colaturæ tb.j. remaneat; aromatisetur Cinamomo & Santalo citrin. Dulcoretur saccharo. Pro aliquot vicibus.

Alterantia ante & post purgantia & præparationem & obstructions soluendas, nõnunquam & tumores & scirrhus dissoluentes, si & hi accedant in iſtero, multa in cachexia descripta, quæ hepatis sic affecto accommodata fuerunt, hic in iſtero iisdem causis obseruatis, vsurpari poterunt; selectis iis potissimùm, quæ non nimis calefaciunt bilemq; concitant: Præter quæ iſtero potissimùm sequentia quoque conueniunt.

Decocta, quæ bibant tribus matutinis vel etiam vltèrius, facta in aqua, vel Aquâ & Vino, interdum addito & Aceto, fiunt ex variis. Inter quæ decoctum ex multis hoc pacto componitur, quod & ex paucioribus parari posset: R. quinque radicum Aperitiuarum, radic. Lapatij an. 3.ß. radicis Iridis, Aristolochiæ rotundæ, Azari an. 3.ij. cortic. Tamaricis 3.ß. herbarû Cichoræ, Pentaphylli, Filipendulæ cum toto, Chamæpythios, Chamædr. Capillarium quinque, Endiuia, Hepaticæ, Eupatorij, Cuscutæ an. m.j. summitatum Absynthij, Rosmarini, Marrubij, Chelidoniæ maioris an. m.ß. florum Sambuci, Genistæ an. p.j. Cicerum rubrorum vel nigrorum p.j. Quatuor seminum frigidorum maiorum an. 3.j. seminum Anisi 3.ß. semi-

num Carui 3.ij. seminum Petroselinij, Napi an. 3.j. Prunorum, Ficuum ana paria quinq;: fiat decoctio in Aqua & Vino, & in colaturæ tb.j.ß. dissolue Sacchari q. s. aromatisetur Cinamomo vel Cassiâ lignæ, Spicâ, Santalis, fiat apozema: Pro quatuor vel quinq; vicibus.

Præter hæc, decocta etiam probantur Oxyridis, Hyperici, Chirithmi cum toto, Pulegij, Origani, Polij, Mentaſtri, Serpilli, Chamæcisti, Anthemidis, Conizæ cum floribus: & radicum Anchusæ, Libanotidis, Vincetoxicij, seu Hirundinariæ Eryngij, Carduorum & cortic. Frangulæ.

Item decoctum radicis Chelidoniæ, cum Enula, Musco quercino & Croco.

In Vino simplicia hæc arida infusa si macerentur, & vinum postea aliquot vicibus exhibeatur, potentiùs operabitur.

Vel fiat tale Vinum: R. radicum Cichorij, Fœniculi, Asparagi an. 3.vj. radicis Asari 3.ij. Marrubij, Absynthij, Centaurij min. siccat. an. 2.ij. summitat. Rosmarini p.j. florum Lauandulæ, p.ß. Nardi Indi, vel Celicæ, Squænanthi an. 3. semis incidantur, adde Vini albi tb.ij. macerentur ad vsu. Si Rhabbarbari 3.ij. addantur, simul ad aluum deriuabit. Si Chalybis limaturæ 3.ij. addas, eximium erit.

Confert & Vinum simplicius, in quo vel multo dum efferueſcit, Asarum solum, vel Chalybis limatura, huius vel illius 3.ß. circiter, prius infusa macerataq; aliquandiu fuerit. Carbones de quercino ligno eiusdè ponderis cum Chalybe, in Vino vſtulo prius chalybe alio integro, macerabat mulier quædam, infusumque propinando in iſtero sanando, hoc remedio quæſtum faciebat.

Vinum Scyllinum probat Dioscorides. Castoris dentes anteriores in Vino macerât alij, illudque propinant.

Aliud sic fit: R. Zarsæ parillæ 3.ij. radicis Fœniculi, Petroselinij, Pimpinellæ, Iridis, Rhapontici an. 3.ß. Enulæ 3.ij. rad. Gentianæ, Azari, Pyrethri an. 3.j. herbarum Eupatorij, Absynthij, Cuscutæ, Marrubij, Chamædr. Chamæpyth. an. m.ß. summit. Centaurij minoris p.j. femin. Anisi, Fœniculi, Apij an. 3.j. Cinamomi, Galangæ an. 3.j.ß. Infundantur in

125
in Vini ꝑ. viij. ad vsum. Si addas Turbethi
ꝑ. ij. Rhabarbari, Agarici an. ꝑ. ij. Zingiberis
ꝑ. ꝑ. purgabit simul.

Possunt & hæc in Aqua & Vino decoqui,
additis purgantibus, vel sine illis, sicq; sumi.
Sunt qui Aquam ex eiusmodi materia addi-
tis purgantibus elicitam ꝑ. ij. ꝑ. mensurâ bi-
bitam, admodum commendent.

Succi per se bibiti, aliqui iuuant, ab ꝑ. j. ꝑ.
ad ꝑ. ij. addito interdû Saccharo, aliàs etiam
Vino, tum ad gratiam, tum efficaciam. Pro-
banturq; inprimis succi Quinquefolij, La-
patij radices, Vrticæ mortuæ, Marrubij, Li-
monum, Cyclaminis, Cichorij, cum toto. Vel
possunt à plantis quarum decoctum conue-
nit exprimi & vsurpari. Melopeponum suc-
cum exhibet Matthiolus.

Aqua Raphani bibita, in ictero peculiari-
ter laudatur.

Potiones aliæ fiunt ex variorum mistura:
Veluti ex pulueribus cum vino, vel aquis,
syrupis, aliisve decoctis contemperatis. E-
quibus simpliciores fiunt, ex puluere corti-
cis Arantiorum, Eboris rasurâ, Chalybis li-
maturâ, Lumbricorum cinere vel puluere,
Calculis è vesica fellis bouis, Sulphure, quod
& cum Ovo forbili dat Dioscorides.

Ex aliis multis vel solis vel inuicem mistis
pulis bibendus hoc pacto componi poterit:
ꝑ. rad. Chelidonie maioris, Hirundinariæ,
Rubie an. ꝑ. ij. radic. Gentianæ, Aristol. Asari
an. ꝑ. j. foliorum Absynthij, Marrubij, Verbe-
næ, Capilli veneris, flor. Genistæ, Cnici, An-
thos, seminum Carui, Endiuie, Chamædr.
Cuscutæ, Aquileie an. ꝑ. ꝑ. ras. Cornu Cerui
& Eboris an. ꝑ. j. Chalybis limaturæ præpar.
cum aceto ꝑ. j. ꝑ. Lumbricorum exiccatorum
ꝑ. j. Cinamomi, Nucis moschat. vel maceris
Spicæ an. ꝑ. j. ꝑ. Myrrhæ, Mastiches vel Thuris
an. ꝑ. j. Croci ꝑ. j. fiat pulvis: Detur ꝑ. j. vel am-
plius, addito Saccharo, per se, vel sine eo,
cum Vino vel alio Liquore, vel cum decocto
Cicerum aliòve.

Amarus sed efficax pulvis: ꝑ. rad. Gen-
tianæ ꝑ. j. summit. Centaur. minoris, cort. A-
rantiorum, rasuræ Eboris, Cornu cerui vel
Antispodij ex hisce combustis parati, Cina-
momi an. ꝑ. j. fiat pulvis: Capiat ꝑ. j. cum Vi-
no vel aliis Liquoribus.

Trochisci in ictero ad hydropem tenden-
te: ꝑ. Rhabarbari ꝑ. ij. radices Asari, gummi
Laccæ an. ꝑ. j. ꝑ. Cinamomi, Spicæ nardi, Schoe-
nanthij, Casticæ lign. an. ꝑ. j. cum succo Absyn-
thij & Eupatorij, vel Tryphêrâ Sarracenicâ
excipiatur: fiant trochisci: Utatur cum Vi-
no vel aquis.

Vsitati pulueres in obstructionibus hisce
conuenientes sunt trochiscorû de Rhabar-
baro, de Eupatorio, de Absynthio pulueres:
Item Triasantali, Diarrhod. abbatis, Diacur-
cumæ, Dialaccæ: in quibus Rhabarbarum,
quod omnes recipiunt, aliquando duplica-
tur: Danturq; per se de vno vel de pluri-
bus ex hisce parati pulueres, cum Vino, vel
alio vt dictum modo: vel cæteris formis per-
missi.

Fiunt & aliæ potiones expressione Can-
cri contusi cum Chelidonia, addendo a-
quam & postea exprimendo, haustumq; ex-
hibendo.

Vrina pueri ad ꝑ. v. aliquoties propinata
probat, quæ Saccharo vel Melle dulcorari
potest.

Stercus Anserinum decoquant aliqui in
aqua & Vino, & colaturam propinant.

Comestum Cuminum ilicò à balneo pro-
bant. Quod & adhuc mulieres nostræ post
balneum in vsu habent, & illius efficaciam
magnam esse credunt. Buphtalmum à bal-
neo quoque exhibet Dioscorides, flores for-
tè illius luteos.

Præter hæc Saluie folia sæpius sumpta,
quendam curarunt, quod & Erucae sylue-
stris folia comesta efficere docent.

Pediculos alij numero vndecim deuora-
tos iuuare credunt.

Electuarium conueniens: ꝑ. conseruæ
florum vel radicum Cichorij, Capillorum ve-
neris, de vna vel pluribus speciebus an. ꝑ. j.
Conseruæ vel condituræ radices Apij, Iridis,
cortic. Arantiorum an. ꝑ. j. rasuræ Eboris &
Cornu cerui an. ꝑ. j. ꝑ. puluerum vsitatorum
vnum aut alterum ad ꝑ. j. Redigantur in for-
mam electuarij, cum syrupo aliquo ex supra-
dictis: Capiat bolum, superbibendo aquas
vel Vinum medicatum, vt suprâ.

Efficacius fiet, si huic electuario addas A-
mygd, amar. ꝑ. ij. quatuor seminû frigidorum
Maio-

Maiorum ana 3.j. Rhabarbari 3.j. Limaturæ Chalybis præpar. 3.j. puluer. Lumbricorum 3.ß. Croci 3.ß. Cinamomi, Nucis mosh. ana 3.ß. & cum Oxymellite squillitico vel diuretico fiat Elestuarium.

Pilulæ ex simplicibus, quæ ob ingratū saporem & odorem in pulueris forma difficulter sumuntur, formari possunt, sicque sumi; Vel ex vno aliquo simplici: Vel pluribus hoc pacto: R. radic. Aristoloch. Gentianæ, Rubiæ, Rhabarbari, Myrrhæ ana 3.ß. Chalybis limaturæ præpar. 3.j. Stercoris canis sicci 3.j. Croci 3.ß. excipiantur succo, vel syrupo de Absynthio aut de Præpsio, fiat massa: Capiat 3.j.

Possunt & pulueres vsitati sic excipi, & in pillulis exhiberi.

Extrinsecus remedia adhibentur, Hepatis regioni, si illi? affectus ictero causam præbeat, vt obstructio vel durities, eadem quæ in cachexia in simili casu hepatis illi applicantur, & inunctionis & emplastra & forus, quæ & hic conuenire poterunt, vt non opus sit ea hic repetere.

Cæteris quoque corporis locis, colore alieno tinctis, præsidia adhibentur; vt sunt Balnea, quæ ad bilem è superficie corporis extirpandam, si illa post curationem causâ sublatâ, nihilominus illic adhuc hæreat, nec per insensibilem transpirationem, vti aliàs solet, sponte exhalet, colorque scædus remanserit, vsurpantur: Siccaque cum per sudores maximè bilem è cute exhaurire cupimus, imperantur: Stuphas aëre accenso calefaciendo, illisque sudores eliciendo: quæ si lingno accenso Sambucino vel Iuniperino calefiant, potentius operari creduntur. Vti & si prius antequam balneum intrent, sudorifera quædam assumant.

Humida balnea tum ad bilem per sudores eliciendam, tum abstergendam & discutendam, decoquendo in illis quæ hæc præstant, vsurpantur, veluti est Parietaria, Beta, Malua, Althea, Saponaria, Centaurium, Absynthium, Præpsium, Fumaria, Acetosa, Enula, Chamomilla, Melilotus, Rosmarinus, Origani, Viscum quercinum, Chelidonia maior, & Chrysanthemum, quæ tria luteo succo & colore prædita, fortè ad bilem fla-

uam extirpandam, hac similitudine, huic affectui accommodarunt: Additis quoque Fabis, Lupis, Furfuribus & Hordeo.

Ablutiones ad scædum icteri colorem extirpandum, tum balneo enarrato sunt, dum in eo sedent, corpusq; hinc inde lauant, faciemque simul abluunt, tum priuatis etiam ablutionibus: Vt cum in fine balnei sicci vel humidi se lixiuio abluunt, aliisve in cutis aliis turpitudinibus explicandis.

Facies quoque, cum hæc in omnium conspectu sit, vt natium colorem recuperet, abluuntur non solum in balneo, sed etiam extra hoc, Decocto simili, vel Vino, vel Aceto albo, dilutis parum Aquâ communi vel Rosarum, Fabarum, Acetosæ. Vel succis aliis vt Granatorum, Limonum, Citri, vel Syrupis acetosis, dissolutis in aquis vel decoctis.

Oculorum flauities vt deleatur, Aquæ illis instillandæ, addito succo si ferre possint Granatorum: Vel vinum dilutum. Succus item Coriandri.

Naribus quæ sternutationem, aut aliam excretionem per eas prouocant, ad bilem simul extirpandam, vt è facie & oculis citius abscedat, vti docent, immittuntur. Vngendo intrinsecus nares Scammoneâ, (quam potius quod bilem attrahere credatur, eligunt, quod nos, quia sternutationem mouet, vti experientia docet, facere existimamus) cum melle permistâ: quod potentius Elaterium cum Lactæ distemperatum, faciet. Mitius hoc præstant alia errhina passim explicata. Inter quæ ex succo Præpsij, Sicla, addito semine Nigellæ parata, hic præsertim laudantur, naribus inuncta vel attracta, vti & decoctum Nigellæ.

Odorem etiam Nigellæ contusæ, & Aceti acerrimi aliquid efficere docent.

Frictiones tum post balneum, tum aliàs, linteis, aliòve modo, ad absorbendas biliosas reliquias profunt.

Applicationes in plantis pedum factas, vulgus magnificat, ex Chelidonia maiori, Visco quercino, tum integris, tum contusis: addito interdum & Marrubio, Vino & Aceto, aliquando & Sale. Quæ & simul carpis applicata, efficacius operabuntur.

Mictionem supra Stercus equinū recens

29

egestum, dum calet, ab ægro factam, plures sanasse ictericos, quidam mihi pro certo affirmavit.

Victus ratio sit conueniens: Bibat Vinum album tenue, dilutum decocto radicis Graminis vel Asparagi, aut aliarum aperientium, & in reliqua viuendi ratione rectè procedat.

*Ruboris
curatio.*

A sanguine quæ oritur Rubedo, quâ facies potissimum offenditur, si sit erubescencia ex verecundia, vel rubor ob iram efflorescens, vti subito erumpit, sic & mox sedatis hisce affectibus desinit. Dein & perseverans aliquandiu rubedo, quæ ob corporis calorem, à causa externa, morbôve aliquo profectum accidit, non aliam quàm quæ calori restinguendo conuenit, curam requirit.

*Palloris
curatio.*

Postea & Pallor, qui ob defectum sanguinis, amisso tantisper viuido colore euenit, si ob frigus nascatur, tamdiu dum corpus rursus incalescat, perdurat: Vti & qui ab animi defectu vel illius affectu proficiscitur, mox iterum quando ad se redeunt, euanescit. Et qui in morbis se offert, illis curatis, deinde cessat, nec dum illius causâ peculiare quid instituitur.

*Nigredo
Æthio-
pum.*

A semine ab ortu procedens Nigredo innata, si tanta sit, vt sicuti aliquando accidisse scribitur, Æthiopem referat, eam abolere velle, esset, vt vulgò dicitur, Æthiopem lauare, siquidem id foret impossibile.

*Nigredinis
vul-
gò dicta
curatio.*

Alia vulgò dicta Nigredo, quando cutis minus alba, obsoleto colore seu fusco prædita est, ab ortu homini innata, ab illis qui pulchritudinem veram, non in colore albidioræ quærunt, & proin hominem minimè discolorare censent, nihili sit, nec illius corrigendæ causâ aliquid præsumunt. Hi verò qui venustati operam dant, atq; ob fusciditatem illam, se minus pulchros esse, minusq; proin aliis placere, sibi persuadent, eam vel corrigere aut saltem palliare, cum auferri penitus nequeat, summopere student.

Quando verò cutis minus alba ob rugas, eam (vti dictum) obscurantes, & opacam fuscâque magis reddentes, euadit: tunc si rugæ hæ non sint stabiles, si nempe à causa externa aut morbo, cutis laxetur indeque corrugetur, hisce sublatis, spontè cutis iterum

tensa redditur, rugas amittit, pristinumque colorem adipiscitur. Quod si perseverantes sint rugæ, cute planè exiccata & constricta, maximè ob ætatem in senibus, tunc licet eas tollere penitus impossibile videatur, & Medicus, qui hoc polliceri auderet, cum ratione insanire diceretur.

Qui foret eximius, si rugas pellere posset, Archiatros, dignus quem vetula turpis amaret:

Interea tamen & hisce & exterminandis, vel saltem minuendis, remedia inuenta fuerunt, quibus senes, reiuuenescere cupientes, magno studio incumbunt.

Hæc autem omnia duplici arte perficiuntur, Comptoriâ vnâ dictâ, quæ naturali nigro huic colori, albo acquisitio obdueto, sed instabili, alium ad tempus palliat, sicque fallendo eos, qui hunc verum esse colorem putant, fucum facit, quapropter Fucos id præstantia adminicula nominant. Altera Cosmetica arte appellata hoc fit, quæ non alium colorem addit, nec fallit, sed verè obsoletum hunc cutis colorem emendâdo, non nihil elegantiorè nitidiorèque, magisq; stabilem reddit: Vel etiam rugas tollendo vel emendando, opacum inde natum colorem, aliquo pacto corrigit. Dein vt maior appareat elegantia, Rubicundo colore certis partibus appicto, tunc quoque Fucis appellatis, arteq; comptoriâ corpus pulchrius & coloratius reddere solent. Cæterum quo pacto hoc dealbando & detergendo, derugando & rubificâdo remedia præstent, nunc ostendendum.

Dealbantia eiusmodi topica admota, quæ Fucos vocant, quibus scemineum genus, pulchritudinis maximè studiosum, quod masculinum dedecet, faciem, manus, aliaue loca quæ nuda possunt conspici, pingunt, & colorant, ex alba materia concinnantur; eligiturq; plerumq; ea, quæ & simul vi exergente & digerente prædita sit, vel si illâ destituatur, talia quæ id moliantur, illi permiscenda; sic enim non solum dealbando quod instabile & minus decens est, sed & e cute succum hunc, colorem illi fuscum conferentem, continuo horum vsu exugendo absumendoq; nouumq; alliciendo, colorem

Comptoria arte parata remedia.

Fuci. Cosmetica arte parata remedia.

minùs fuscum illi tandem cōciliabit; & quia cutem detergendo attenuat, sic quoque nidiorem magisque perspicuam reddendo, obscuritatemque illi, quæ quod crassior & nigrior est, magis elucet, adimendo, vt sic quoque minùs nigra, vti dicunt, appareat, efficiet. Quo nomine & emollientia quædam hisce compositionibus, si crassior & durior præsertim sit cutis, admiscuntur, tum etiam vt præter colorem decentem, mollietiam, quæ in manibus & facie probatur, adipiscatur: cuius rei causâ, & vt nitor simul splendorque faciei appareat, quod etiam venustum esse censetur, mucilaginosâ & pinguiâ etiam vsurpant.

Sic autem compositi fuci formâ liquoris lactis instar albi, vel vnguenti illinuntur, atque inuncti exiccari permittuntur. Et si colore albo spissiore se prodant, ne fucus & dolus deprehendatur, quod quæ honestiores videri voluñt, maximè verentur, aut donec rursus se conspiciendas præbeant, se detocto aliquo conuenienti faciei quoque venustatem conciliante; non tamen pingente, vt infra præscribetur, leuiter vt de albedine aliquid remaneat, abluunt, idque quando fucus iam penitus abolitus censetur: qui sæpè diu durat, repetunt.

Materia autem horum à variis desumitur, albo colore præditis, vti sequentibus. Ex Cerussa, cum albissima sit, & ob leuitatem & pinguedinem, melius hæreat, faciei dealbatio commodè fieri poterit, si prius puluerisata cribrataque & aliquoties lota, rursusque siccata fuerit, vel costâ in aqua eousque, donec denuò siccetur, in formulas rotundas, vel trochiscos formetur, è quibus vnus aliquis conuenientibus, in manus vola aliterve dissolutus, faciei cum manu aut alio modo illinitur vel adfricatur.

Ex serpentariæ maioris seu dracontij radice albissima, formulæ quoque seu trochisci prædicto modo vsurpandi fiunt, albi amydi & cerussæ instar, qui Gersæ serpentariæ nomine appellantur, quæ præter albedinem quam inducit, vi abstergente validâ etiam, vti diximus, operatur: Paraturque ex succo radicis Serpentariæ maioris expresso, atque insolatione aut calore alio sen-

sim exiccato, ac in formulas redacto.

Vel sumuntur iam dictæ radices recentes, & prius mundatæ contunduntur, cumque affusa aquâ calida vel alia cōuenienti dissoluntur, liquorque per pannum exprimitur, sicque aliquandiu, donec cremor albus subsederit, relinquitur, à quo postea aqua innatans, effunditur, illicque noua alia affunditur, quæ denuò vbi post tempus aliquod iterum quieuerit, à subsidentia separatur, & cum hoc ter quaterve factum fuerit, remanentia tandem exiccata, formataque vt dictum, ad vsum seruat.

Communis Gersæ huius præparandi ratio, ex radicibus siccis serpentariæ fit. Quæ prius ab externa tunica fusca repurgatæ, postea in puluerem rediguntur, qui dein in aqua dissolutus, rursus calore sensim exiccatur, denuoque puluerisatus, dilutusque ter quaterve hoc pacto, in formulas redigitur, & ad vsum asseruatur.

Ex serpentariæ minoris seu Ari radice maiori, albedine & viribus non admodum ab simili, in alterius penuria, Gersa enarrata, similiter parari poterit, vel ex vtriusque radicibus simul, in maioris inopia.

Ex Cucumeris asini radice alba & friabili, Gersa similiter vti ex Serpentariæ pulvere fieri posset, & eadem ratione administrari.

Ex Cerussa & serpentaria aliæ formulæ hoc pacto fiunt: R. Gersæ serpentariæ modo aliquo, vti dictum, præparatæ ʒ. j. Cerussæ præpar. ʒ. ʒ. Boracis ʒ. ij. Potest & Camphoræ ʒ. ʒ. nisi odor obftet, addi. Cū Infus. gummi Tragachant. factâ in aqua Rosarum, fiant trochisci vel pilulæ ad vsum. Possunt & species Vnguenti Citrini vel aliquâ in illis exposita, permisceri.

Aliquando & Cerussa & radix Serpentariæ sic præparata, oleo Amygdalarum dulcium, vel de Been, vel aliis vtilib. excipiuntur, & sic illinuntur, quibus & Ceræ albæ portio pro Vnguento parando addi poterit.

Ex sublimato albo quoque summeque ex tergente, illitiones faciei parantur, admodum faciem detergentes & dealbâtes; quod ne eam exulceret, variis modis præparatur, & contemperatur, admistis illis, quæ idem, sed lenius operantur. Dein & ne dum faciei adhi-

adhibetur, portio illius aliqua ori illapsa, dentes, vti aliàs facere solet, denigret, aut alio modo iis noceat, aquâ vel oleo interea in ore aliquandiu contento, præcauetur.

Liquor lactis instar ex eo simplicior atq; utilior hoc modo paratur, quo facies illinitur: R. Sublimati subtilissimè triti ʒ. ʒ. Albumin. ouorum conuassatorum num. ij. vel iij. Emulsionis lacteæ seminis Papaueris albi, quæ facta sit ex t̄b. j. illius seminis cum Aqua t̄b. x. agitentur hæc quàm diutissimè in mortario lapideo, sensim albumen primum, postea emulsionem affundendo, eâ quantitate quæ sufficiens sit, quæ exploratur stylo vel aciculâ, ex orichalco fabricatâ; si enim in liquorem hunc immersa retentaq; aliquandiu maculam nullam concepiat, rectè se habet, si verò inde tangatur, rursus affusâ emulsione dictâ temperari debet.

Huic liquori Sacchari candi interdum, aliàs & Boracis calcinati pulueres ad ʒ. ij. permiscuntur.

Alius liquor albus sic fit: R. pastam ex farina albissima triticea aut Amydo, cum Lacte caprino subactâ paratam, eaq; coquatur in furno leuiter, & cum crustam incipit acquirere, rursus eximatur, & cum lactis caprini recentis mensurâ tantâ, quâ omnino in liquorem lactis spissi instar redigi possit, diluatur. Cuius t̄b. v. Sublimati ʒ. ij. diligenter permisce, plus minúsve, prout per probâ immisso stylo, vti supradictum, iustum illius pondus esse deprehenderis: Sicq; vrere: Addendo quandoque Cerussæ ʒ. j. Boracis ʒ. ij. Conchiliorum vel Porcellanarum calcinarum ad ʒ. ʒ. Camphoræque parum.

Pasta sicca, calcis seu amydi instar exiccata, ex sublimato composita, sæpè ad fucandum vsurpatur. Cuius portiuncula in vola manus distemperata, cum Vino collutionis oris, vel aquâ Rosarum faciei inungitur: Vel mista cum Pomata, aut oleo seminis Cucurbitarum, aut Amygdalarum dulcium aliòve illinitur, quæ hoc pacto cõponitur: R. Sublimati puluerisati ʒ. j. Argenti viui ʒ. ij. vel iij. succi Limonium vel Aceti parum, agitentur diligenter donec albescant, postea cum Salua hominis ieiuni, qui eam dum saccharum candum masticat, expuit, rursus diu

agitentur, tandem Albumen oui permiscendo idem fiat eousque, donec in formam pastæ vel linimenti redigantur. Quæ mistura dein rursus diluatur Aquæ puræ fontis bonâ quantitate, bulliant simul aliquandiu, postea donec sedimentum subsideat, quiescant, aquaque clara per inclinationem sensim effundatur & abjiciatur, residentiæque noua affundatur, rursusq; postquam ebullierit & quieuerit, effundatur: Tertioq; hoc, sed tunc aquâ Rosaceâ, vel Fabarum, aut Myrthi vel aliâ conuenienti sumptâ, repetatur, & donec ferè absumatur, decoquatur, remanentiæque calori fornacis aut solis, vsque dum exiccatur, exponatur. Aliquando & citra ebullitionem, solâ maceratione diutinâ, in qua aliquoties eam auferendo, nouamque administrando, in calore prædicto infusio hæc præparatur, tandemque exiccatur.

Interdum cum Sublimato & Argento viuo, Camphora simul ad ʒ. j. additur, & maioris precij potius quàm utilitatis causâ, pulueris Margaritarum vel Porcellanarum vstarum eadem quantitas: Folia item aliquot Auri & Argenti, ad malignitatem (vti docent) argenti viui, indeque parati sublimati reprimendam.

Ex Lithargyrio seu spuma Argenti albus liquor maceratione vel coctione efficitur, quem Lac virginale vocant, quod faciei similiter decentem colorem adfert, quia tamen ruborem potius illius nimium corrigit, ea in illius discoloratione explicabitur.

Ex Borace dicta, quæ Chrysocolle est aurifabrorum, atque ex nitro paratur, similiter illitiones faciei fieri possunt, subtiliter puluerisata, & Oleo seminis cucurbitæ, aliòve excepta.

Vel misceatur cum infusione gûmi Tragachanti, sicque inungatur. Potest & Cerussa cum Borace permisceri, & hoc illòve modo excipi.

Ex lapideis, vt Marmore albo seu Alabaistro, Amiantho, Lapide speculari, Magnetide quem Talcum vocant, Chrysallo, Corallo albo, atque ex Conchiliis diuersis, crudis vel priùs vltis, seu calcinatis, liquore vel oleo, conuenientibus aut Pomata exceptis,

similiter faciei sunt in hunc usum illitiones.

Additis quandoq; & aliis, veluti: R. prædictorum quorundam, 3.ß. Cerussæ 3.ij. Boracis 3.j. Thuris albi, Camphoræ ana 3.ß. succi Limonium 3.j. olei Amygdal. dulc. vel alterius q. si fiat Linimentum.

Vel vtantur horum loco vnguento Citrino appellato; quod ex lapideis prædictis, vt alabastro, amiantho seu lapide speculari vel talco, chrystallo, corallis & conchaceis, vt vmbilico marino, purpuris & buccinis, dein & cerussa, borace, thure albo, camphorâ, & præter hæc etiam ex gessa serpentaria, nitro, amylo, tragachanto, axungia porci & gallinæ, citrique succo, vnde huic vnguento nomen, præparatur.

Magneridis seu Talci leuissimo & subtilissimo polline derafo seu puluerisato, si facies manûsve fricentur, mirè & præ cæteris dealbantur, eo ita se illis insinuante, vt color ille aliquandiu perseveret nec facile cedat.

Ex Ouorum crustis testaceis calcinatis puluerisatis similiter sunt inunctiones, eodem modo, vt de supradictis dictum, illas vel solas, vel aliis permixtas, in formam vnguenti redigendo.

Ex Amydo cum sit albissimum & subtilissimum dissoluto vel incorporato vti superiora, conueniens quoque fit illitio. Possent & farinæ aliquæ similiter adhiberi albissimæ. Melonum & Peponum siccatorum farina, sic quoque admota laudatur.

Ab emulsionibus lacteis, seminum Melonum vel Amygdalarû, factis cum aqua conuenienti, facies etiam elegantiam accipit.

Sunt feminae quæ iis sic vtuntur; sumunt Amygdalam amaram vnam vel duas, easq; linteo obuolutas mastificant ieiunè, atque sic spuito cum alba emulsione permixto, faciem illinunt.

Detergentia alia, præter fucos iam enarratos, localia remedia, quæ à fucis tantum quod non albo colore pingunt, differunt, in cæteris eodem modo componuntur & operantur, sunt sequentia, quibus facies vel abluatur, fouetur, aut illinitur.

Aquæ plerunque vsurpantur stillaticæ, quales sunt ex simplicioribus, Sigilli Salomonis, florum Fabarum, radic. Serpentariæ,

vel Ari, Cyclaminis, Raphani, Gentianæ, Maluæ, florum Liliorum, Verbasci, Nymphææ vel Melonum, Phasæolorum, Pinearum, additis aquis odoratis, vt simul suauem odorem concilient, vt est Rosarum simplex vel moschata aut camphorata, florum Arantiorum, rad. Iridis, &c.

Liliorum aqua & quæ ex resina Abietina destillatur, curem crassam simul attenuat.

Compositæ variæ ad hosce vsus sunt, sequentibus modis paratæ: Veluti ex Cucurbita, Pepone aut Melone, maturis dissectis in partes, addito Lacte caprino, & Ovis conquassatis, destillata.

Vel ex malis Limoniis, Arantiis, Citriis, simili permissione parata.

Ex Pane alia sic fit: R. Panis communis albi, vel Hordeacei vel Furfuracei, cui crusta detracta sit lb. ij. Lactis caprini lb. iij. Oua conquassata num. 10. Eliciatum aqua.

Potest & Saccharum ad 3. iij. addi, & sic destillari.

Vel Vini lb. 8. & Limonium malum recēs j. vel ij. aut succi illius 3. j.ß. & Camphoræ 3. j.

Vel: R. prædicta, adde farinæ Fabarum vel Cicerum aut Oryzæ 3. iij. Amygdal. amar. 3. ij. quatuor semin. Frigid. maior. 3. j. Et destilla.

Vt potentius extergat, addi possunt, radic. Serpentariæ & Sigilli Salomonis ana 3. j.ß. rad. Ireos 3. j. Potest & Mastiches 3.ß. & Boracis 3. ij. addi, aliæve.

Ex Oryza itidem quæ destillatur aqua, macerata in aqua Limonum vel Fabarum aut alia, donec intumescat, posteaque ad lb. j. Mastiches pulu. 3.ß. addendo.

Ex albuminibus Ouorum cum succo Limonû permixtis, aqua alia extrahitur. Quibus & antequam destillentur, Borax, Alumen vel Sal addi possunt.

Ex Limacibus item, si cum Lacte caprino, & Axungia porci vel hœdi reteti, & paucâ Camphorâ destillentur.

Ex Vrina, prius Sale, præsertim fossili, quod Gemmæ vocant, bene salita, aqua destillata similiter conuenit, additis ad grauem vrinæ odorem reprimendum, Garyophillis, Cinamomo, aliisve odoratis, vt Aqua rosarum.

137

Ex Tartaro albo destillatur quoque aqua, dissoluto in Vino, addendo flores Fabarum, Rosmarini vel alios.

Vel: R. Tartari ʒ. j. Aluminis ʒ. ʒ. Boracis ʒ. ij. Camphoræ ʒ. j. Aquæ conuenientis tb. ij. Destillentur.

Vel: R. Tartari calcinati tb. j. Mastiches ʒ. j. cum Albumine ouorum fiat pasta, è qua eliciatur aqua.

Ex sublimato efficax liquor, non ad dealbandum, sed validius detergendum paratur: Vel dissoluto diligenter, & aliquandiu macerato, vel etiam decocto, in aquis destillatis supradictis simplicioribus vel etiam compositis, & præsertim in ea quæ ex Panis, vt prius dictum, exstillatur, addito interdum & succo Limonum. Ad ʒ. j. Sublimati non minus quàm tb. ij. Aquæ sumendæ, atq; an decens sit quantitas, orichalco intruso prius explorandum. Quibus & Cerussa misceri vel incoqui potest, Camphoraq; addi: Et ne lædat, cum lacte Caprino & Albuminibus ouorum aut Mucilaginis temperari.

Ex pluribus illis vel etiam paucioribus talis aqua componi potest: R. radic. Liliorum, Iridis recent. ana ʒ. iv. radic. Serpentariæ vel Ari, Sigilli Salomon. ana ʒ. ij. farinæ Fabarum ʒ. iv. farinæ Oryzæ ʒ. ij. quatuor semin. frigid. Maiorum ʒ. j. Amygdal. amar. ʒ. v. seminū Cydon. ʒ. ʒ. Contundantur omnia addendo Lactis caprini tb. j. Iuris decoctionis Pedum vituli & Cochlearū terrestrium circiter duodecim, quartarios tres: aquarum florum Fabarum & Rosarum ad quartariū j. Album. ouorum conuass. num. xij. Terebinth. dissolutæ in totidem vitellis ouorum ʒ. ʒ. Mellis ʒ. j. Sacchari communis vel candi ʒ. ij. Vini & Aceti ana ʒ. j. Mastiches pulu. ʒ. ʒ. Aluminis, Boracis ana ʒ. ij. Camphoræ ʒ. j. Misce; Destillentur.

Hiscæ & aliæ pefmisceri possunt: veluti rad. Bryoniæ, Cucumeris asinini, Cyclaminis, Lignum Gaiacū, mala Limonia, Arantia, Pepones, Melones, Cucurbitæ, vel succi horum fructuum: Item flores Primulæ Veris, Fabarum, Liliorum, Sambuci: Ciceres, Lupini, Amydum, Pineæ, Semen Psylli; Dein & gummi Tragachantum, vel infusio ipsius, Thus, Myrrha; Cinamomum, Gario-

phylli, Moschus odoris gratiæ, Vrina pueri, Fel bubulum, Lythargyrium, Tartarū, Cerussa, Sapo, Sæuum hœdinum, caprinum, vel Butyrum recens; Quibus & testacea & terrea addunt, à quibus tamen vix aliquid hac coctione, quæ dum destillantur fit, decedit, vt Corallum, Conchacea; interdum & parum Calcis.

Addito Sublimato, hæc aqua efficax est: R. radicis Serpentariæ seu Ari, Cyclaminis, Sigilli Salomonis ad tb. j. Panis medullæ tb. ʒ. Lardi recentis ʒ. j. ʒ. succi Limonum ʒ. ij. in quo dissolutæ sint Porcellanæ, Aluminis ʒ. ij. Sublimati ʒ. ʒ. vel minus: Eliciat aqua.

Decoctum quo facies abluatur, tū ad eam quoq; illustrandam, tum illitiones quas rursum auferre volumus, abluendas, sæpè vsurpatur. Et præsertim Fabarum, Cicerum, Oryzæ & Lupinorum, similitumq; abstergentium. In pingui facie vel tumida, Gaiaci decoctum aliqui approbant.

Liquores quoque aliqui illinuntur; Veluti ex Melone, hac ratione præparatus; Incisus Melo in ollam conjiaciatur, & supra eum Vuæ immaturæ, postea flores Maluæ, atque cortices aliquot Ouorum; hæc bene obturata in clibano calefacto tamdiu seruentur, quàm panis similiter in furnum missus coquitur, quo factò liquor coletur ad vsum.

Ex Cochleis terrestribus seu Limacibus, sic quoque in furno coctis, addito pauco Sale, liquor emanans, à quibusdam vsurpatur.

Aliquando ex Peponibus liquor, vti dictum, paratur, vnà cum illis & cæteris, Limaces quoque permiscet.

Sputo proprio ieiunæ puellæ, in palmam manus expuentes, frontem perfricant, capillosque sic sursum pellunt, nitoremque illi inducunt. Magis dealbabit sputum, si lacteum comestione Amygdalarum amararum prius reddatur.

Linimentis insuper facies vngitur pinguis; quæ nitorem & splendorem illi conciliant, quæ diligenter ne fucus appareat, diducenda.

Id Pomata illita facit.

Inprimisque Medulla ossium Veruecis, quæ ex mundatis prius à carne & conuassatis illius ossibus decoctione elicitur, at-

que innatans ad hunc vsum colligitur.

Oleum Talcī, ad faciem manusque illustrandas & dealbandas, nunc admodum in vfu est magnatibus, magniq; ob id æstimatur cūm & hæc mollia inde reddantur.

Ex mucilaginosīs, infusio gummi Tragachanti diluta inuncta, splendorem faciei addit, vti & Albumen oui conqussatum.

Manus nitidas albas & molles reddētia remedia.
Manibus priuatim quædam, quæ ad faciem minus commodè adhiberi possent, vt non solum tersæ sed & albæ & molles reddantur, adhibentur.

Fitque in hanc rem pasta quædam, quam manibus saponis instar affricant: Quæ varijs modis paratur.

Simplicior ex cerealibus seminibus fit, vt Panis mica, vel Furfure cocto, aut farinâ Hordei, Oryzæ, Cicerum, Lupinorum: quibus vel solis cum aqua subactis vtimur, vel cum Sapone molli aut duro parum dissoluto, & Melle in pastam redactis.

Ex nucleis alijs paratur pasta, veluti Amygdalarum amararum vel dulcium, vel Persicorum, aut etiam Auellandarum vel Pinearum & nucum Been statim contusis, vel prius in lacte maceratis, vel solis, vti dictum Sapone vel Melle exceptis.

Ex alijs seminibus simili modo fit, maxime Cucurbitacei generis & Papaueris albi.

Composita pasta sic fit: R. ex prædictis simplicibus vnam, præsertim quæ ex Amygdalis paratur, vel de duabus aut tribus ad t̃b. j. addendo pulueris Sinapis ʒ. ij. vel plus, radicis Iridis ʒ. β. vnde suavis quoque accedit odor, Mellis q. s. misce. Huic pastæ Ficum pulpa quandoque additur. Hisce & alia addi possunt; vt semen Erucæ, quod loco seminis Sinapis sumitur. Sunt qui Fel boum addant, quod tamen amarorem diu in manibus linquens, non adeò accommodum. Odorem quoque alijs odoratis illi conciliare possumus, vt Santalo citrino, Ligno aloës, radice Angelicæ, floribus Lauandulæ, Aquâ Rosarum simplicī vel Moscharâ alijsq;.

Quædam etiam, ex illis quæ faciem dealbare posse recensuimus, hisce quoque addi poterunt:

Vel fiat ex illis talis manuum illitio: R.

Cerussæ ʒ. β. Amydi ʒ. iij. Coracis, Caphuræ ana ʒ. ij. Dentalis vel testarum Ouorum calcin. ʒ. β. puluerisatis affunde aquas Liliorū Nenupharis, Rosarum, vel alias, ad t̃b. iv. radic. Liliorum ʒ. ij. Panis detractâ crustâ t̃b. β. coquantur optimè, postea adde Album. ouorum conquss. num. xij. Colentur & seruetur ad usum.

Vel fiat infusio gummi Tragachanti in Lacte & succo Limonum, addendo Cerussam, Amylum aliave: Sicq; manus vngatur.

Paratur & pasta ex radicibus Asphodeli coctis & contusis, addendo Tartarum & Oua conqussata.

Vbi maiori mollitie opus est, in durioribus manibus, vngantur oleo semin. Cucurbitarum vel Amygdal. dulcium vel amararum, aliorumve nucleatorū, cum Cera alba dissoluto. Potest & permisceri pulpa Liliorū alborū, & ad extersionē addi oleum Tartari.

Pulpa Peponum affricata, manus molles & mundas reddit.

Derugātia remedia ad faciei potissimum, *Rugas minuentia vel exstirpantia remedia.* nonnunquam & manuum rugas minuentdas, vel etiam, si fieri posset, exstirpandas, tum vt cutis non solum minus opaca, sed & minus implicata & inæqualis appareat, singularia quædam descripta fuere, licet & alia quædam detergētia cosmetica, vti in illis dictum, rugis exterminadis quoq; accommodentur. Quæ tamē peculiariter illis accommodata sunt, & vi detergente, vel etiam simulleniente cutem adstrictam rursus deducendo, vel aliâ proprietate illud efficiunt, sunt sequentia.

Cacaliæ grana trita cum cerato illita probat Dioscorides.

Item Bryoniæ rad. cum Eruo, Fœnogræco & cretâ Chiâ: Vti & Chiam terram.

Alij aquam in hanc rem probant Pinearum conorum recentium, Verbasci florum: Item rad. Afari & Sigilli Salomon.

Inprimis aquam florum & radic. Liliorum cum Rore Maij inunctam.

Succum item Limonum, Primulæ veris, radic. Ari, & Spatulæ foetidæ, vnde cutem eleuari & disrumpi, aliamque subtilem subnasci docent.

141

Decoctum semin. Sefami. Item Ficum cum rad. Bryoniæ.

Oleum Myrrhæ conuenit, Sefaminum, Glandium, Tartari, Amygdal. amar. Lilliorum, è nucleis Pineis, ex baccis Hederæ.

Emplastrum: R. Ceræ puræ 3.j. dissolue cum Lacte afinæ, agitentur; & vbi refrigerit, eam aufer, addendo olei Amygdal. dulcium 3.j. Aluminis, Spermatidis ceti ana 3.ß. dissoluantur, misce, & supra telam extendantur; Et fronti rugosæ vel aliis sedibus eiusmodi applicentur.

Lupini farina Felle caprino permista affricetur.

Vel: R. Axungię Gallinæ 3.ij. Ceræ albę 3.j. Aquæ rosarum 3.j. dissoluantur, adde Cerrussæ 3.ij. Coralli albi 3.j. Camphoræ 3.ß. Fiat illitio.

Pomata illita maximè in vsu est.

Fumus Myrrhæ carbonibus iniectæ, facie exceptus, iuuare dicitur.

Alibi quoque rugas in corpore indecentes auferre student, quæ venustati operam dant mulieres. Veluti eas quæ post partum in ventre relinquuntur.

Idq; hoc Vnguento, quod paratur ex sæuo Hædi vel Arietis loco in aqua Rosarum. Vel horum loco sumunt Pomatam, addendo hisce parum Butyri & Albuminis oui, & puluerem Mastichis Thurisve.

Vel: R. Mastiches, Thuris ana 3.ß. Myrrhæ 3.ij. Cornu cerui vsti 3.j. Amianthi 3.ij. Salis ammoniaci 3.j. farinæ Hordei 3.ij. seminis Nigellæ 3.j. Squillæ vstę 3.ß. cum Melle fiat Vnguentum.

Rubeficientia remedia, quæ rubicundum seu roseum colorem genis, vbi elegantior apparet, & labiis nonnunquam, mulieres quæ ornatui student, adhibent, & sic pallorem vel obsoletum harum partium colorem, pingendo obliterant, fucumq; faciunt, sunt sequentia.

Rubię maioris radix adfricata rubore malas colorat. Vti & si Oleo mista inungantur.

Bryoniæ radicis puluis in aqua distemperatur, vel cum Melle miscetur; & si illa infusione genæ foueantur, vel hoc linimento illinantur, rubere eas docent.

Idem præstare Bulbum marinum & sem.

Anethi inuncta cum Melle & Vino scribunt.

Rubricâ, qualem pictores ex Santali vel Praslij rasurâ maceratâ vel costâ in aqua, vino vel aceto, addito alumine, parare solent, malæ vt rubeant, pinguntur, vti & labia.

Colore alio rubro, ex Cocci baccis factis, vascula testacea intrinsecus colorant Hispanæ mulieres, & Vermeillon de Espagne vocant, sicque seruant; & cum vti volunt, sputo humectantes genas pingunt.

Panno scarlato vel Serico coccineo, Chermesino vocato, parum intincto in aqua Vitæ, genæ fricatæ rubescunt.

Ligulâ coriaccâ vel alio corio rubro, malas vt rubeant, semina aliquę fricare solent.

Moris maturis si malas pingas, & postea semimaturis rursus eas frices, aquaque abluas, remanebit viuus color aliquamdiu; sicuti hoc ipse obseruari.

Particularibus discolorationibus quę debetur cura, alia accommodatur Commaculationibus, alia Maculis.

Commaculationibus competēs cura prouisione causæ quæ externa est, quoque instituitur, prout illa vel ab aëre aut sordibus, aut aliis cutem colorantibus procedit.

Ab aëre seu solis perustione euenientem, *Nigredinis à solis perustione inducitur* Nigredinem appellatam, in facie, manibus aliisque detectis cutis impressam, non vitio sibi, qui ex labore aut peregrinatione hanc contraxerunt, sed laudi ducunt, ob eamque causam non curant, nec quicquam ad eam iterum delendam adhibent, cum sponte æstu remittente, hyemis præsertim tempore, nonnihil remittat vel recedat. Quod si tamen & hæc contracta nigredo displiceat, huic, eam præcauendo, rursusque delendo, prospicimus.

Ne facies, manus aliæve partes nudæ soli diutius expositæ, à radiis illius vstæ denigrentur, hisce mediis præcauetur:

Si Pileo lato, vel aliis umbraculis, à facie, vel chirothecis à manibus, solis radij auertantur.

Vel præmuniantur inunctione Albuminis oui conuassati, vel mucaginis seminis Psyllij vel Cydoniorum, alteriusve, extractæ cum aqua Rosarum, aut infusionis in eadem factæ gummi Tragacanthi. Quibus & Bu-

& Butyrum vel Sēum recentia, vel Pomata, aut oleum Amygdal. dulc. aut Cremor lactis exigua quantitate admisceri possunt, ne facies pinguibus illis iniuncta, vel sine illis vsu exiccantium tensa appareat.

Idem facit Pulpa vel succus Melonū, Anguriarum alteriusve Cucurbitacei generis, additis quoq; ē supradictis vnctuosius parū.

Vel illinatur hoc vnguento, paulo antequam in solem prodeat. R. Pomatæ 3. ij. Cerussæ dissol. in aqua Rosarum 3. j. Thuris vel Mastiches ana 3. β. mucilaginis Cydoniorum 3. j. fiat Linimentum.

Curatio in hac cuticulā nigredine à natura quandoque sola perficitur. Quæ dum nouam minimeq; perustam, continuò in adustæ quæ coneritur locum reponit, hoc vitium successu temporis, si interea à radijs solaribus caueatur, emendat, nisi profundius in veram cutem vitio hæc penetret, tunc enim sponte vix amplius recedit. Atque artis operā tam comptoriā quàm cosmeticā eādem, qualis in naturali nigredine emendanda, descripta fuit, vt corrigatur, opus habet. Quæ cum eodem penitus modo, iisdemq; remedijs perficiatur, hic ea repetere non est necesse.

Adhæc cuticulam quandoque auferendo perustam à facie manibusque, nisi, vti dictū, altius impressio facta sit, huic vitio medemur. Quod separando eam à substrata cute & non nihil attollendo, vt sic sponte secedat, vel sine labore auferri queat, nonnūquā perficitur, applicatione sequenti: R. radic. Liliorum alborum quartarium j. coquatur, parū sub cineribus, postea contundantur, addendo Sacchari candi 3. j. hæc supra faciem collocentur, sæpeq; repetantur, semper postquam deponitur, inungendo cū Melle.

Citius hoc efficiet, si addas Butyri vel Axungię Porci lotæ aquæ Rosarum 3. iij. Terbinth. 3. β. Calcis extinctæ quinquies 3. ij. Sicque applices.

Vel adde radicem Liliorum sic tostarum 3. ij. radic. Arundinis & Serpentariæ Fabarum ana 3. ij. seminis Melonum 3. j. mucilaginis feminis Psyllij vel infusionis gummi Tragachant. 3. j. Vnguenti citrini 3. β. sec. artem fiat Vnguentum.

Si parū de aqua Sublimati decocti addas, citius cutem eleuabit.

Bulbus Cepæ vel Squillæ aut Liliorū affricatus sæpe, cutem ita auellit, vt citra laborem remoueri possit.

A' sordibus & alijs cuti adhærentibus immunditiis obsoletus seu obscurus color, quo pacto cum sordibus auferatur, in sordium tractatione in reiectis explicabitur. Reliquæ quæ manus nitidas albas & molles reddunt, in compticiis iam sunt exposita.

Color ater croceus, viridis, alijsve quo cutis inficitur, aut pingitur, simili ratione, vti aliæ cutis sordes absterguntur, quod aliàs citius, aliàs tardius, prout hi colores se insinuarunt, perficitur.

Imprimis à nucum cortice viridi contracta in manibus digitisque pertinacior nigredo, sed tandem sponte euanescens, citius abstergentium supradictorum vsu cedet, faciliusque adhuc, si succo vel carne Limorum aut Aceto fricetur, additā paucā Colophoniā.

A' moris dum decerpuntur manibus impressa rubedo, aliquandiu quoque manens, subito aufertur, si moris nondum maturis, sed viridibus adhuc, aut saltem rubescentibus, validè partes tinctæ perfricentur, aquæque postea abluantur.

Maculis cura competens, pro causæ diuersitate etiam distinguitur, prout hæc vel à causa interna, quæ est vel sanguis, vel succus nutriendus, vel semen, vel à morbo profisciscuntur.

A' sanguinis sub cuticulam eruptione post cōtusiones aut ictus alios, maculæ lividæ seu Sugillationes relictæ, si contusio tantā sit, vt cura huic præcipuè debeat, curam non aliam quàm contusioni competentem, vti in ea expositum fuit, exigunt. Quod si eā sanatā, nihilominus hæc maculæ vel vibices remanserint, vel non grauius vis illa illata, nisi quod maculas hæc produxit, læserit, hisce tunc præcipuè intendendum. Quæ tamen sponte, vti ferè fit, sanguine sub cure primum vterius diffuso, mox discusso, euanescunt, cum sanguis ille non ita vt si in amplum spacium feratur, conrescere moxque putrescere soleat, sed sero dilutus, & ex corruptione aliqua potiùs attenuatus, diffususque

Commulatio cutis à sordibus curatio.

Colorationis à coloribus externis curatio.

Sugillationum curatio.

fluensque tandem per insensilem transpirationem sensim exhauriri possit. Quod si verò ob copiam vel crassitiem hoc fieri sponte nequeat, diutiusque sanguis perseveret, metusque sit ne concretus, & putrescens vlcus gignat, Topica discutientia & siccantia erunt adhibenda, quibus si statim, dum adhuc sanguis fluit, huic vitio occurrere velimus, ab initio adstringentia quædam miscemus, postea verò solis prædictis utimur: Paranturque ex sequentibus.

Herbæ recentes applicantur contusæ, vel prius parum tostæ aut coctæ, vt Absynthiū, Hyssopus, Calamentum, Origanum, Cānabis, Eruca, Succisa, Hydropiper, Ptarmica, Malua, Ammi: Vel cum Melle miscetur, additis quandoque & farinis, & semine Cimini.

Idem efficit radix Raphani concisa.

Decocto ex prædictis plantis facto in Aquâ, Vino & Melle, addito in principio & Aceto, fatus fiunt. Aquæ calefactæ fatus sæpe repetitus, præsertim Salsæ confert.

Succi etiam inunguntur enarratarum plantarum; Imprimisque succus Absynthij, coctus cum Melle vel Aloë mista cum Melle, miscendo & vtrisque puluerem Cimini. Confert & succus Raphani & Coriandri.

Ex aliis quibusdam variæ etiam fiunt applicationes vel inunctiones, cōfertque imprimis Nucis nucleis tusus cum Melle & Sale.

Vel Sal, Vinū & Mel æquali mensura mista adhibentur.

Cimum puluerisatum cum Vitello oui vel Cerâ vel Melle applicatur. Potest & adjici parum Camphoræ.

Vel: R. farinæ Fabarum, Fœnogr. vel etiâ aliarum ad ʒ. iij. Cimini ʒ. j. pulueris Absynthij ʒ. ij. coquantur in Oinomellite, adde Croci ʒ. ʒ. fiat emplastrum.

Vel: R. radic. Consolid. vtriusque, rad. Iridis ana ʒ. ʒ. vel Raphani ʒ. j. herb. Maluæ, Absynthij ana M. j. florum Chamomill. Meliloti ana p. j. decoquantur in Vino & Aquâ, postea contundantur, misce farinæ Fœnogræci vel alterius ʒ. ij. Cimini ʒ. ʒ. feminis Sinapis vel Erucae ʒ. ij. Thuris, Myrrhæ vel Laccæ ana ʒ. j. Stercoris caprini ʒ. ʒ. Salis ʒ. ij. fellis Bovis ʒ. j. Mellis ʒ. j. Olei Anethini ʒ. ij. fiat Cataplasma.

Efficacissimum hoc est: R. Auripigmenti ʒ. ʒ. Farinarum prædictarum ad ʒ. ij. coquantur in Vino, fiat emplastrum.

Sanguis ex pennæ recentis calami intestini expressus inungatur.

Vel Fel caprinum vel Vaccinum, cū Melle vel Vitello oui contemperatum.

Aut Stercus caprinum vel Vaccinum, addito pulvere Cimini.

Pulmo arietis calidus adhuc & cruentus appositus, dissipat maculas.

Oleum in qua radix Bryoniæ cocta fuerit; vel aliud, vt Commune vel Rosarum vel Chamomill. in quo Sal coxerit, illinatur.

Vel Vnguentum de Alabastro.

Scarificatio huic sanguini sub cute retento viam aperit, quæ adhiberi potest, si plurimus eò effusus fuerit, illicque persistat, ne putrescens, si diutius retineatur, partem viam corrumpat, gangrænamque efficiat, in cuius suspitione, scarificatio profundis plagis inducta, amplius conueniet.

Quod si verò ex illius putredine abscessus indeque vlcus nascatur, vti vlcus sanari debet. Si gangræna, vti ex magna contusione aliquando factum, vt contusio & gangræna, sicuti in illis affectibus dictū, sanari debet.

A sanguinis per cutem dispersione profectæ maculæ, si Pulicæres dictæ rubræ parue illæ sint, alias sponte, mox iterum per insensilem transpirationem, vel cum fadore dissipantur: Vti & Erysipelata illa latiora. Quæ tamen si diutius persistant, etiam curam aliquam requirunt. Sicut & impetiginæ illæ Zittermahl Germanorum, & Sanguineæ, aliæ exacte rubræ per faciem cæterisque sedes sparsæ, quæ difficulter eradicantur; Vti & Gurta rosacea dicta rubedo, ægrè extirpatur, atque ægerimine, si pustulosa simul sit facies, nasusque, vti dictum, inde admodum extuberet.

Hiscæ itaque, si curam adhibere sit animus, quam tamen plerique desperantes negligunt, sic erit instituenda; Primum corpus pro ratione redundantium humorum purgandum, sanguisque per venam apertam brachij, reuulsionis, vel etiam si facies hiscæ occupata sit, frontis, aut sub lingua deriuationis gratiâ, aut per scarificationes in

Macularum rubrarum cum inunctione generum, vt & Pulicæres, Sanguineæ, impetiginæ, Gurta rosacea se offerunt, curatio.

colli lateribus & scapulis incisas, educendus, & per admotas simul cucurbitulas, à facie retrahendus, sæpius eas vel præmissâ scarificatione aut sine ea repetendo. Quod & sanguisugæ faciei sedibus, in naso vel propè eum, iuxta alas aut in malis, vel in mento, vel ponè aures appositæ euacuando & trahendo præstabunt. Alterantibus dein quæ sanguinis feruorem contemperando refrigerandoque, impetum hunc illius in faciem aliâve loca sistant, utemur, eaque per viuendi rationem conuenientem præscriptam & medicamenta quæ illud efficiant, administrabimus. Sicuti quo pacto hoc fieri, corpusque mundum reddi, recteque disponi debeat, passim in morbis à sanguinis influxu genitis declaratum fuit.

Localia præsidia quæ applicantur, sanguinem reprimere vi refrigerante & adstringente in maculis rubris debent, indeque genitum succum redundantem, si in pustulas eleuentur maculæ, vi siccante & digerente absumere, quæ validiora esse debent, si admodum induratae illæ tuberositates ægrè cedant, adhibendo si reliqua non proficiant, etiam quæ erodendo. vrendoque hæc consumunt.

Administrantur autem hæc remedia, in forma liquorum, aquarum & vnguentorū, quibus rubræ maculæ & pustulæ illinuntur vel madefiunt; aut si fortiora sint quæ applicari debent, iis saltem tanguntur; A. variis autem desumuntur.

A. Plantis præcipuè parata, vsurpantur, aqua Fragorum, Fraxini & Florum Verbaſci, additâ interdum Camphorâ. Vinum quoque è fragis illitum prodest.

Alia valde vsitata atque utilis: R. Fragorum veris tempore, autumnii verò. Vuarum acerbarum t̄. j. Lactis caprini t̄. ij. Albumin. ouorum numero xij. vel mucilag. feminis Psyllij & Cydoniorum, vel gūmi Tragachanti factæ in aquâ Rosarum vel Plantaginis ad 3. iij. Camphoræ 3. ij. Destillentur. Potest addi Acetum, succus Limonum vel aliarum plantarum sequentium. Item Alumen, Sulphur.

Vel vtantur sequenti: R. rad. Oxylapathi 3. iij. herb. Plantaginis, Solani, Acerosæ, Mal.

uarum, Fumariæ ana M. j. florum Rosarum, Violarum, Nenupharis, Caprifolij, Salicis ana P. j. Limonum vel Arantiorū aut Pomorum acidorum 7. vel 9. Fragorum vel Mororum immaturorum aut Vuarum immatur. t̄. 3. Aluminis 3. 3. Albumin. ouorum numero x. Aceti 3. ij. Camphoræ 3. j. Destillentur. Sulphur additum efficaciorē reddit, sed odore illius nonnihil inquinatam.

Possunt & addi folia Nymphææ, Cotyledonis, Semperuiui, Fraxinellæ, flores Balauſtiorum recentes vel aridi.

Vel sic paretur: R. Lactis Caprini t̄. iij. farinæ Frumenti tantū q. s. vt cum dicto Lacte in pastam panis redigatur, quam coques in furno, & semicoctam eximes, & à crusta decorticatam, in partes discindes, ac cum t̄. iij. aliis Lactis Caprini dissolues, addendo mala Limonia excorticata, in partes secta xij. radic. Raphani & Oxylapathi ana 3. ij. Albumin. ouorum cōquassatorum, vel cum spongia exceptorum, atque rursus expressorum, donec benè dissoluatur, numero xij. Aluminis 3. 3. Tartari, Sacchari ana 3. iij. Coralli albi 3. ij. testarum Oorum calcinatorū in furno, Camphoræ ana 3. j. misceantur diligenter: Eliciatur aqua per alembicum.

Aluminosa quæ appellatur aqua ex plantagine, portulaca, omphacio, alumine & albumin. ouorum elicita, similiter conuenit.

Puluis radicis Oxylapathi & rad. Asphodeli vsitæ cinis, cum oleo inuncta laudantur.

Ex sanguine leporis vel etiam aliorum animalium calido facta illitio, ad ruborem abigendum conuenit.

Ex Sulphure viuo præsertim paratæ applicationes rubedinē admodum emendant. Si cum succo aliquo refrigeratē aut adstringente, vt succo Semperuiui, Solani vel Plantaginis mistum, vel cum aqua odorata aliqua, vt Rosacea dilutum diuq; maceratum, illinatur.

Vel: R. Sulphuris viui 3. j. Thuris albi 3. 3. Caphoræ 3. ij. dissoluatur cum t̄. j. aquæ Fragorum & Rosarū ad vsū. Potest & succus Limonum vel malorū Granatorum acidorū addi. Efficacior erit, si Salis cōmunis vel Ammoniaci vel Aluminis 3. ij. misceas, vel etiam Lithargyrium coctū in aceto, vel Cerussam.

Vel:

Vel: R. Sulphuris viui ʒ. ʒ. Lithargyrij per coctionem in aceto dealbati ʒ. ij. Thuris ʒ. j. Camphoræ ʒ. ʒ. granorum Paradyfi vel Zingiberis ʒ. j. Vnguenti Citrini vel Albi camphorati ʒ. ij. fiat Linimentum. Si ʒ. ʒ. Auripigmenti addas, erit efficacissimum.

Ex Lithargyrio albus liquor conficitur, quem Lac virginale, vt magis acceptus sit, vocant, quod vt faciei colorem alienum, sic præsertim ruborem illius aufert, & sic conficitur: R. Lithargyrij puluerisati ʒ. ij. aceti albi ʒ. vj. plus minusve, prout potens existit, macerentur aliquandiu, sæpius per vices agitando, vel bulliant parum. Quo facto, sinatur crassior materia subsidere, liquorq; clarus sensim effundatur, coleturq;. Postea R. Aluminis vel Salis, vel vtriusque ʒ. ij. dissoluantur in Aqua fontis vel alterius stillaticie faciem extergentis, vt Fabarum, Liliorum, additæ etiam boni odoris gratiæ, aqua Rosarum, ad ʒ. vj. Interdum huic aquæ, Boracis ʒ. j. aut ij. addimus, vel etiam parum Camphoræ. Hisce duabus aquis cum vt volumus, portionem vtriusq; æqualem ferè commiscemus, tuncq; subito, etsi prius limpida fuerint, in lacteum cremorè albissimum conuertuntur, quo facies illinitur; quam si exasperet, affusis denuò aquis debet dilui. Sed & vtriusque liquoris materiam permiscendo, macerandoque vel coquendo, statim Lac hoc perficitur. Si maiori absterfione opus est, olei Tartari parum illi commiscere possimus, aliæve accommoda.

Alius liquor in rubra tuberosa facie perutilis, vt & si squamosa & crustacea sit: R. Lithargyrij ʒ. j. Aluminis ʒ. j. Boracis ʒ. iij. Cerussæ ʒ. ʒ. Aceti ʒ. ij. Aquæ Rosarum, Plantaginis vel aliarum, ad ʒ. iij. bulliant ad consumptionem tertiæ partis, coletur, adde succi Limonum parum huic quantitati quæ inungi debet.

Aqua per destillationem ex Lacte prædicto virginali elicita, similiter conueniet. Vel talis: R. Lithargyrij triti ʒ. j. Aceti ʒ. ij. macerentur & coquantur, postea adde aquam Fabarum vel alias ad ʒ. j. Eliciat aqua, addendo interdum & alia conuenientia: Veluti Alumen, Boracem, Camphoram, oleum Tartari, antequam destilletur.

Vel vratur hoc vnguento, quod R. Lithargyrij præparatione dealbati (quæ fit si ter in aceto albo infusum, maceretur aliquandiu, rursumque ab eo repurgatum, postea ad vsum siccetur) ʒ. ij. adde aceti albi & olei de femine Cucurbitarum q. s. vt in formam Linimenti redigatur, misce Camphoræ costæ donec dissoluatur in aqua Rosarum ʒ. ʒ. Fiat Illitio.

Ex Tartaro talis concinnatur aqua vtilis & conueniens: R. Tartari calcinati ʒ. ʒ. Aluminis vsti ʒ. j. ʒ. Boracis ʒ. j. Sacchari candi ʒ. ij. Camphoræ ʒ. ij. Albuminum ouorum agitatorum numero xx. mucilaginis seminis Psyllij ʒ. j. ʒ. succi Limonum vel aceti ʒ. ij. Eliciat aqua.

Ex calce alia efficax inunctio: R. Calcis viuæ ʒ. ij. Sulphuris viui ʒ. ʒ. pulueriscentur, bulliant in aceto, ad consistentiam vsq; vnguenti.

Ex Argento viuo factum efficax remedium: R. nucleos Persicorum vel Amygdalarum amaram, eosque mastica parum, ex illisque sic emollicis, & in pastam ferè redactis, lacteum succum per pannum linteum exprime, illique Alumen coctum, seu vt vocant vstum, nucis instar misce. Postea accipe Argenti viui, pisi magnitudine, atq; in vola manus cum salua tamdiu donec nigrescat, confricato, dein cum lacteo succo prædicto permisce beneq; contemperato: eoq; faciem noctu cubitum iturus inunge, manè repetendo, idque spacio hebdomadæ vnus continuando: Quo exacto, vel prius etiam quoties in publicum prodeundum erit, abluatur hoc pacto; fiat pasta ex farina Fabarum & Oryza cum albumine oui conquassato subacta, quæ ad vsum in pilas formata seruetur, & ea emollita rursum per noctem in aqua, & dissoluta, facies cum panno abstergetur.

Aliud sic paratur: R. Argenti viui ʒ. j. resinæ Abietis lotæ aliquoties ʒ. j. agitur probe, postea adde Boracis ʒ. ʒ. Sacchari candi ʒ. j. Ossis sepia ʒ. ij. Saponis ʒ. ij. olei Tartari ʒ. ij. vel plus, cum olei Amygdalarum dulcium & Rosacei q. s. fiat linimentum; potest & succus Oxalidis vel Oxylapathi, vel Limonum addi, & Lithargyrium.

Ex sublimato potētissima sunt remedia,

cautè vt leuiter hæc tantùm tangant, illis applicanda. Quibus maculæ tactæ donec cuticula abeat, tandem euanescent, & pustulæ illitæ arefcunt vel consumuntur. Præparanturque hoc pacto: R. Sublimati 3. j. succi Limonum vel Aceti 3. j. Aquæ alicuius conuenientis 3. iij. Albumin. ouorum numero sex, macerentur benè obturata ad vsum.

Vel sic: R. Sublimati 3. 6. Lithargyrij 3. 6. Aceti albi 3. iij. coquantur ad tertiæ partis consumptionem, colaturæ adde Lac, succum Limonum vel Arantiorum, & parum olei Tartari.

Possunt & alia ex Sublimato & Arsenico erodentia & caustica remedia, quæ in vitiosis maculis descripta sunt, in pertinacioribus eiusmodi pustulis vsurpari.

Fumus ex Sulphure & Thure prunis iniectis, facie exceptus, rubedinem illius delet, vt rosas. rubras sulphure suffumigatas albescere subito videmus: cautè autem spiritu interim retento, oclusisque oculis hoc erit tentandùm.

*Maculæ diuersarum generum, vitio & Viti-
lignum, Lentiginum &
Origina-
tum Næuorum
intra.*

A succo nutriente, porisque se insinuante, vel etiam à semine ab origine procedentibus maculis quæ debetur cura, accommodatur præcipuè illis, quæ à prauo succo originem trahunt; vt cum noceant, grauioraq; minentur, hæ maculæ, si fieri possit, aboleantur, quales sunt Vitiliginis seu Alphi, ipsorumque genera. Quod alias attinet, quæ non à vitioso succo nascuntur, fuscæ maculæ seu Lentiginis, etsi plurimæ per cutem dispersæ occurrant, cum tamen consuetæ sint quibusdam Lentiginosis dictis, & proin non aded in illis improbentur, sponteque æstus solis remittente, interdum remittant, vel minùs tunc appareant, plerunque intactæ relinquuntur. Quod si tamen quæ eas pulchritudini obesse existimant, vt formosiores sint, delere cupiant, cura illis quoq; accommodabitur.

Idem & in Næuis à semine ab ortu natis obseruatur, cum quia originales sunt, non pro vitio habeantur, & plerumque intacti sinantur, nisi fortè aded deformant, vt & illorum ratio sit habenda, quomodoque emendari queant, cogitandum.

Cæterùm in cura harum omnium macu-

larum, causa interna primùm erit submouenda, si ea vitiosa sit, vt in Vitiliginibus albisve peruersis maculis. Quod in aliis, cum causa minimè sit noxia, vt Lentiginibus & Næuis, non necesse est, nisi corpus alioquin impurum, vt topica melius operentur, prius purum reddere in hisce quoque innoxiiis alioquin maculis, sit consultum.

In impuris itaque prius euacuationes aliquas moliemur, iisdem ferè, quibus & aliam corporis illuuiè in multiplici illius immunditie, & præsertim in scabie expurgari, ostendimus, & ne rursus gignantur, regimine idoneo atque alterantibus præcauebimus.

Topica verò quod attinet, quæ ad maculas illas noxias delendas adhibentur, leuioraque existunt, vi exiccante & detergente prædita esse debent, quæ insensibiliter sensim eas absumant, dein si illa non iuuent, fortioribus vtimur, quæ abradendo, maiori vi illud operentur, & nisi succedat, ad erodentia & caustica progredimur, quæ manifestè eas maculas arefaciendo & consumendo deleant. Vel etiam per manualet aperturam factam, tale quid tentamus. Quo pacto etiam in Næuis extirpandis, procedere possumus. In Lentiginibus verò, leuioribus medicamentis hoc saltem efficere conabimur, cum plures se offerant, quibus omnibus fortia adhibere remedia non satis tutum esset, nisi fortè vno aliquo in loco paucas hoc etiam modo eradicare cupiamus. Sed & multa ex hisce localibus remediis, in aliis prauis maculis à sanguine vitioso profectis, veluti impetiginibus aut pustulis faciei rubris, quarum tamen cura illis præsertim accommodata, iam exposita est, quoque prodesse poterunt. Quæ remedia omnia, vel detergere solum, vel radendo atque vrendo, vel pungendo vel radendo operantur.

Detergentia autem citra erosionem remedia tam leuiora quam fortia, quæ omnibus hisce maculis abstergendis competunt, varia existunt, cōueniuntq; etiam illa cōptica & cosmetica, quibus Nigredinè palliari & corrigi, in ea exposuimus, maximeq; in lentiginibus palliandis vel etiam delendis, quæ & in aliis maculis cōtinuo vsualiquid possunt efficere.

Præcipuè verò maculis hisce adhibentur sequen-

153

sequeſtia detergentia, quibus & emollientia quædam, ſi cutis craſſa iſſis inſtrata ſit, permisceamus; quæ maculis affricantur vel inunguntur, idque ſi citius & melius ea operari velimus, in calore ſolis vel ignis: Quæ à diuerſis deſumuntur.

A plantis recentibus petiæ radices vel folia, contuſa vel aliter incifa affricantur vel applicantur: Veluti radix Serpentariæ maioris minorisve, Cyclaminis, Cucumeris agreſtis, Bryoniæ, Iridis, Raphani, bulbi Cæparum, Narcifſi, Porri; item radix Hellebori albi, Sigilli Salomonis, Oxylapathi, Rubiæ, Anchufæ, Capparum, Chamæleontis nigri, Nympheæ, Aſphodeli, folia Chondrillæ, Lactuæ ſylueſtris, Geſſimini, Betæ, Caulium, Loti ſylueſtris, Pulegij, Agnicafſi, Telephij: Acini item vitis ſylueſtris & fructus cucurbitini Momordicæ.

Saponaria recens cõtuſa, ſi affricetur diutius, ſpumam viridem ſaponis inſtar reddit, unde nomen accepit, valideque abſtergit.

Hiſce contuſis, vel ſi duriora ſint, parùm toſtis, farinæ addi poſſunt Lupinorum, Orobi, aliæve aut pulueres: Atque vt validius operentur, Acetum, Mel.

Decoctis enarratarum plantarum, in aqua factis, addito interdum & Vino vel Lixiuio, calidis adhuc, fouentur vel abluuntur maculæ in balneo vel extra illud, maximè ſi plures ſint, vt Lentigines, additis inſuper & aliis abſtergentibus, vt radice Ebuli, Enulæ, Liliorum, foliis herbarum nitroſarum, vt Parietariæ, Mercurialis, Maluæ, Biſmaluæ vel Biance vſinæ, Bugloſſi vtriuſque, Scabioſæ, Fumariæ, Lupulorum, Cichorij, Acetoſæ, Violariæ, Geranij, Millefolij, Abſynthij, Centaurij minoris, Naſturtij & Sennæ, additis quandoque & Furfure, vel farinis Leguminum.

Aquæ ſtillatitiæ ſimiliter competunt ex efficaſioribus plantis; Vti & ex Reſinis, vt Abietina, Laricea elicita, quibus & ſi plures ſint, commodius vtimur.

Succis plantarum illinantur maculæ, veluti radic. Serpentariæ vtriuſque, Cucumeris aſinini ſeu Elaterio inde parato, Iridis, Gentianæ, Lapatij, Capparum, Thapſiæ, aliarumve dictarum plantarum; Imprimisque

ſucco Cæparum, Porri, Squillæ, Aſphodeli, foliorum Scabioſæ, Xyridis, Caulium, Boni Henrici, Limonum.

Olea inunguntur ex plantis concinnata, præſertim in alphis: Veluti oleum ſeminis Sinapis & ſeminis Cataputiæ: Item oleum in quo Laureola vel Tithymalus coxerint, & folia Nerij.

Liquores in Vlmi folliculis contenti, & qui è Betulæ caudice vulnerato exſtillant, maculas quaſcunque exterunt.

Pulueres quarundam plantarum, excepti aceto vel ſucco Limonum aliõve è prædictis, aut Melle, vel Oleo aut Axungia, vel Vitello oui, ſi per ſe potentiùs agant, illinuntur: Veluti radicum Serpentariæ maioris & minoris, Sigilli Salomonis, Cucumeris aſinini, Bryoniæ, Hellebori albi, aliarumque efficaſium prædictarum plantarum. Dein & farinæ ſeminis Lupinorum, Orobi, Fabarum, Auenæ; Item pulueres ſeminum Sinapis, Raphani, Rapi ſylueſtris, Erucæ, Braſſicæ, Vrticæ, Nigellæ, Securidacæ, Ricini, & nucleorum Perſicorum torrefactorum atque Agarici: Cineres etiam Allij, Lilij, bulborum & radicis Ariſtolochiæ.

Ex illis quæ ab animantibus ſumuntur, axungia Thymali piſcis, Impetigines, Zittermaſt dictas, admodum delet, vt & alias maculas.

Sanguis leporinus dum calet adhuc, illitus, in maculis valde probatur.

Fellaitem quadrupedum & piſcium.

Fimus Columbinus vel Ouillus cum Aceto ſubaſtus, valde quæuis extergit.

Oleum in quo Lacerta viua cocta ſit, cum Vino tamdiu donec illud abſumatur, admodum probatur in alphis.

Vti & Formicæ rubræ in pannoligatæ & preſſæ, donec ſuccum reddant, ſi eo illinantur.

Ex terrenis ſuccis ſiſis confert Sal commune vel foſſile Gemmæ dictum aut Ammoniacum, vel Nitrum, atque ex illo parata Borax, Alumen, Halcyonia, cum Aceto vel ſucco Limonum, aliisve diſſoluta.

Lapis Pyrites & Lazuli cum Aceto acerrimo illita, valde iuuant.

Tartarum ex Vini terreſtreitate concre-

tum per se, vel prius vsum, similiter vsurpatum conuenit: Inprimis verò liquor illius, quem Oleum vocant, egregie omnes maculas & pustulas extergit.

Quod & sic potest parari: Tartarum Vini albi cum aceto in pilam redactum, stuppis inuolutum sub cineribus calidis, parum vratur vel calcinetur, postea vsurpetur, sponte in liquorem resolutum vel dissolutum per se vel cum Melle mistum.

Compositæ formæ tam ex his, quam aliis, sequentes fiunt: Contusæ è plantis, quarum decoctum conuenire diximus, factæ applicationes, addito Sale communi, Fosili, Ammoniaco, Nitro, Alumine, profunt.

Aquæ parantur hoc pacto: R. Oxylapathi cum radicibus tb. iv. incidantur: adde acetici 3. iv. Tartari 3. ij. Salis nitri 3. β. Eliciatu aqua ad vsum.

Alia: R. radicis Raphani tb. j. radic. Iridis, Lapatij, Liliorum ana tb. β. Cucumeris agrestis vel Sigilli Salomonis, Vuarum immaturarum ana quartarium j. herbarū Parietaræ, Sij, Centaurij minoris ana m. j. feminis Brassicæ, Rapi vel Erucae ana 3. β. Panis hordeacei vel Fabarum farine quartariū j. Terebinthinæ 3. j. Vrinæ 3. ij. Destillantur.

Potest addi Myrrhæ, Thuris ana 3. β. Styraçis liquidæ 3. j. & sic destillari.

Vel fiat talis: R. nucleorum contusorum ex Amygdalis amaris & Persicis, malis Armeniacis p. ij. farinarum Cicerum, Oryzæ, Fabarum ana ad p. j. quatuor feminum Frigidorum maiorum ana p. β. Irrorentur decocto radicis Lapatij acuti & Limonum, vel Arantiorum aut Citri, miscendo Cerussæ 3. ij. Tartari 3. j. Salis communis vel Nitri, vel Boracis 3. β. Camphoræ 3. j. Ex hac pasta eliciatur aqua.

Aqua valde efficax: R. Tartari calcinati tb. j. Thuris vel Mastiches ana 3. β. Camphoræ 3. ij. Albumina ouorum aliquot, destillantur. Loco tartari Sapo eodem pondere sumi potest.

Lac Virginale hoc etiam conuenit: R. Lithargyrij 3. j. Aluminis, Boracis, Cerussæ ana 3. β. Camphoræ 3. ij. Tartari 3. β. Aceti albi tb. j. aquæ Liliorum & florum Fabarum ana 3. iv. aquæ Rosarum 3. j. decoquantur &

colentur per philtrum, adde succi Limonium depurati, aquæ Lapatij ana 3. ij. Boracis, Camphoræ, Sacchari candi ana 3. v. Iterum leuiter coquantur, & colentur ad vsum.

Linimenta ex succis fiunt enarratis, additis Salis vel Nitri generibus, inter quæ & Borax; nonnunquam miscetur & Camphora.

Alia inunctio: R. succorum radicum Serpentariæ, aliarumve prædictarum herbarū, & Tapsi barbati ad 3. ij. farinæ Lupinorum 3. ij. radicis Iridis 3. j. stercoreis Columbini 3. j. β. olei Amygdalarum amararum vel Ouarum 3. j. β. olei Myrrhæ 3. β. Terebinthinæ q. s. misce.

Alia fiunt vnguenta: R. puluerum aliquorum prædictarum Plantarum 3. β. Salis fossilis vel ammoniaci, aut Nitri vel Boracis vel Aluminis 3. j. Myrrhæ 3. β. Camphoræ 3. j. cum succo Arantiorum misce, vel Melle aut Sapone molli.

Ad lentigines: R. radic. Serpentariæ maioris vel minoris, aut corticis medij Vlmi 3. β. Ofsis sepiæ 3. ij. Thuris 3. j. Storacis liquidæ 3. β. excipiantur, vti dictum. Et illinantur.

In alphis illitio: R. feminis Raphani, Nigellæ ana 3. ij. radicis Hellebori albi, Aluminis vel Salis ammoniaci ana 3. j. Myrrhæ 3. β. Gallarum vstarum 3. j. cum Melle & aceto fiat linimentum.

Validior in alphis sic fit: R. Boracis, vel Nitri, Aluminis ana 3. β. Tartari calcinati 3. ij. farinæ Lupinorum vel Orobi 3. β. radicis Hellebori vtriusque ana 3. β. feminis Sinapis 3. j. Saponis mollis vel alterius 3. iv. succi radicis Lapatij & Enulæ ana 3. j. resinæ Abietis parum, agitentur probe.

Ærugo æris validiora reddit vnguenta, si 3. β. illius cum 3. β. illorum misceatur; Aliquando & Chalcanthum solum, vel cum æruginè, addendo & oleum Tartari, admiscetur.

Vel: R. Vnguenti Ægyptiaci 3. ij. Aluminis vsti 3. j. olei Tartari 3. β. misce. Si nimis exasperet, adde oleum Rosaceum vel aliud.

Vel sic: R. Hellebori albi, radicis Ariana 3. j. β. feminis Staphisagriæ, Raphani ana 3. j. foliorum Sabinæ 3. β. Piperis 3. j. Salis ammoniaci

157

moniaci 3. j. Æruginis æris 3. j. Sulphuris 3. j. cum Aceto fiant trochisci, qui ad vsum dissoluantur in Aceto vel succo Limonum.

Eroderentia & caustica maculas & pustulas enarratas absumunt, alias cum dolore, alias sine eo, vti & in alphis cum sint insensiles agunt, quæ cautè ne vicinas partes tangendo lædant, apponi, hæcquæ illis solum tangi debent.

Ex Sublimato & Arsenico potissimum fiunt, permistis cum prædictis vnguentis.

Sed & solius Sublimati mica cum Vitello aut Albumine oui, aut Mucilagine aliquâ aut Oleo & Axungia mista & temperata, cautione adhibita, applicari poterit.

Vel Aquâ ex decoctione illius paratâ pustulæ aut maculæ tangi, quæ 3. Sublimati 3. 8. Aquarum aliquarum conuenientium, quibus & Rosacea additur, 3. vj. decoquantur ad consumptionem tertiæ partis. Hæc sinimum erodat, amplius dilui potest; com. modè etiam oleû Tartari illi permiscebitur.

Aqua alia quæ in præparatione sublimati remanet, vel aqua aurifabrorum Fortis appellata, idem efficit.

Vel vrantur sequenti: 3. Sublimati 3. j. Cantharidum 3. ij. Arsenici 3. j. Carbonum salicis 3. j. puluerisuntur, decoquantur in aquarum Nenupharis vel Plantaginis 3. iv. donec crassescat, adde Aquæ fortis guttas aliquot, cum bombace intincto tange maculas manè & vesperi, donec vesicæ exsurgant, quas vnguento citrino illines.

Vel componatur pasta sequens, cuius portio liquore aliquo dissoluta admoueat: 3. Sublimati, Aluminis ana pisi magnitudine, adde Boracis 3. ij. vrantur in lamina candente, puluerisuntur, addendo pulueris Mastiches, Sarcocollæ & Sacchari candi ana 3. 8. misceantur quàm diligentissimè, in mortario cum Sapone molli, addito momèto Felis botis, postea farinâ Fabarum & Nucum Auellandarum, bene siccata redigantur in pastam, quæ ad vsum siccetur.

Præter hæc & alia vesicatoria & catheterica adhiberi possunt. Veluti Ranunculi folia & radic. contusas Diosc. docet admouenda. Quod & Laureolæ folia efficiunt: Lac item Tithymalorum aliæque eiusmodi alibi exposita.

Cantharides itidem, vti & Calx viua, sed cum Aceto temperata.

Cauterio hæc quoque tolli possunt si illis adhibeantur actualia vel potentialia, præsertim indolentia ex Calce & Fece Vini parata. Vel si aquâ, in quam cauteria, si non bene ab aëre muniantur, solent diffuere, tangantur.

Punctura in alphis, multis foraminibus facta, conuenit, per quam si sanguis effluat, spes aliqua sanationis erit.

Radere quoque illas frequenter cultello, proderit.

A morbo aliquo procedentium macularum præcipuarum cura, in morbis à quibus dependent, fuit exposita; veluti Erysipelatis in febribus synochis. Dein & earum macularum cura, quæ in Lue venerea, elephantica, scorbutica erumpunt, cum illæ morbum ipsum cum ceteris eiusmodi externis pustulis alijsque vitijs constituent, in cute resistentem, hæcque proferentem, in morbis ipsi, seu luis vbi de curatione illorum agitur, simul proponitur.

Aliæ verò, non diuersam curam à morbo requirunt: Veluti illorum quæ in febribus erumpunt Exanthematum, cum sponte febre cessante euanescent, cura præcipua est ea à frigore externo, ne ab hoc repellantur, munire & arcere.

Vti & aliæ rubræ, violaceæ, nigræque maculæ in febribus peruersis quandoque erumpere solitæ, illis cessantibus, quoque simulabeunt, vel cum morte, quam ferè præagiunt, finiuntur.

Illæ verò maculæ, quæ in pustulas erumpunt, quas Ecthymata seu Variolas vocant, etsi quoque plerumque non aliam quàm quæ febre conuenit curam exigant, in qua eas potius vt erumpant, promouemus quàm retardamus aut impedimus, easque genitas non aliter ferè curamus, cum sponte vel euanescent, vel arescant abeantque, aut in vlcuscula conuertantur, sicque per se sponte sanantur: tamen si hæc tardius procedant, vt citius siccantur vel maturentur, quædam adhiberi possunt.

Ad arefaciendas, decocto hoc madefieri cum penna vel penicillo aut panno linteo debent:

Macula-
rum in fe-
bribus
prodeun-
tium Ery-
sipela-
tum Ex-
anthema-
tum, alia-
rum ve-
nereæ,
Elephan-
tica Sto-
macacæ
curatio.

Pustula-
rum Ec-
thymatis
seu Vari-
olarum
curatio.

debeat: R. Lentium 3. β. corticis medij Tamaricis 3. iij. baccarum Myrthi 3. j. florum Genistæ 3. β. decoquantur in aqua, addendo in fine parum aquæ peculi Rosarum.

Poterunt addi peculiaris vsus gratiâ in decocto Santali rubri 3. ij. vel Croci 3. β. sed tunc colore ab illo rubro, ab hoc croceo tinguntur.

Vehementius siccabit eas, si Salis vel Aluminis mistione salfedinem insuper adipiscatur.

Succo Granatorum medio inter dulcem & acidum sapore, citius quoque exiccabuntur, aliisve illius generis.

Vt maturentur facilius, Axungia porci inungantur, vel Ficubus in uersis fricentur; Aut Vitello oui, aliisve id efficientibus.

Aperiuntur maturatæ sponte ferè. Quod nisi eveniat, vel diutius prorogetur, quia tunc pure retento, caro exeditur, vlcuscula caua inde fiunt, cicatrixque foueam faciens, relinquitur; Vt igitur hoc maxime faciem deformans, præcaueatur, maturius aperiri debent, acu stylôve alio acuto, qui si ex auro sit, minus cicatricè apparentem inde nasci autumant. Frequentius accidit, vt pure in illis maturescentibus exitum quærente, per frictionem pruritu prouocatam, dilaceratæ aperiuntur. Quod tamen nimis sollicitè in infantibus matres præcauere volunt, existimantes inde cicatrices foueatas prodire, cum potius, vt dictum, ab intactis, tardiusque disruptis id accadat.

Postquam apertæ sunt, quia crusta ex pure siccato genitâ obducuntur, cum ea spontè decidat, in eâ auferendâ vix aliquid amplius suscipiendum. Si tamen diutius aliqua hæreant, corio pingui salito fricatæ, vel alio emolliente, facile secedunt. Et cum exigua sint vlcuscula, modò sæpè, à pure & ichore abstergantur, sponte facili, vt non opus sit aliâ curâ, sanantur. Sin verò cicatrices in facie remanserint, eæ vt in illis dictum, tractandæ erunt.

Si non solum cutem sed & nares intrinsecus infestent Variolæ, illicq; vlcerentur, quo pacto tractandæ in narium vlceribus expolitum est: Vt & si fauces & pulmones, in illorum affectibus declaratum est. Inter

reliqua Acetum acre olfactum sæpè, nares ne variolis petantur, prohibet.

Oculorum discolorationum à morbis præcedentium, cura in horum morbis fuit exposita. Veluti Rubedo oculorum in Ophthalmia falsa & vera, & Epiphora. Maculæ rubræ vel liuidæ, in Sugillatione oculi, Albæ maculæ in oculi Albugine, Cicatrice, Suffusione.

Ethymata verò & Exanthemata si oculos petant, hisce præcauendis cura adhibenda, hicque exponenda. Oculis igitur clausis palpebræ circumlinantur sequentibus, de quibus & si aliquid oculis incidat, vel instilletur, non nocebit, sed potius conueniet.

Aqua sic vsurpantur, Rosacea, Plantaginis, Myrthillorum & Coriandri.

Aqua Rosacea Croco vt bene flaua fiat, tincta, communiter illinitur.

Vel decoctum aut infusio foliorum Sumach in prædictis aquis.

Vel instilletur succus Granatorum dulcium & florum, mistus succo Hyosquiami.

Aut puluis florum Hyosquiami tritus cum Vino austero, oculorum palpebris inungatur.

Collyrium vile: R. pulueris foliorum Sumach 3. j. feminis Coriandri præpar. vel Myrthillorum 3. β. Croci 3. j. Camphoræ 3. β. Aquarum prædictarum ad 3. viij. miscè diligenter.

Efficacius erit si parum succi granatorum addatur.

Sapphyro gemmâ, vel Auro puro, si ambitus oculorum circumducatur, eos à variolis tutos manere aliqui existimant.

Vbi iam variolæ oculorum tunicas externas, palpebrasque occuparint, possumus præscripto collyrio similiter vti, illud oculis quoque instillando, addendo Tuthiæ præparatæ vel Trochiscorum alborum Rhazis 3. β. Quod si suppuratæ in vlcus abeant, periculum est de amissione Visus, tuncque vti oculorum vlcera tractari diximus, curari debent, & ad cicatricum ablationem puluis tenuissimus Fabarum cum Saccharo candido, aliaque in cicatricibus oculorum explicata, inspergi.

161

Oculus
dentis
tia reme
dia.

Ad colorem nigrum, qui pulchrior esse putatur, oculis inducendum, & glaucum corrigendum, aliqui hac arte vtendum censent: Collyrium ex puluere subtilissimo Auellanarum, cum Aqua permisto, oculos sæpe inducendum.

Vidimus sponte aliquando cæcios oculos ætatis decursu nigriores factos, idque aliquoties.

Dentium
discoloratio
curatio.

Dentes alieno colore infecti, nec dum amplius albi, sed vel ob sordes vel tephros, aut fuliginem ipsis adhærentia, flauescerent aut nigricantes, variis modis ab illis mundati, rursus dealbantur, eâ curâ quæ in sordibus in reiectis explicabitur.

Vnguium
discoloratio
curatio.

Vnguium discolorationes peculiarem curam minimè exigunt, nisi alia vitia, vt fissuræ, erosiones, &c. concurrant, de quibus in deformationibus iam actum fuit. Nam si liuere videantur ob pallorem corporis, vel Maculam subnigram continere, ob Sugillationem sub ipsis factam, cum hi colores non in ipsis, sed subiectâ carne existant, & per ipsos pellucidos, vt dictum, saltem transparent, non alia cura, quàm quæ in pallore & sugillatione expõsita fuit, hisce quoque debetur. Quod si Nigredo sub vnguium eminentiis à sordibus illic collectis appareat, quid agendum, cum de sordibus in genere in reiectis agemus, demonstrabitur.

Quod puncta vel maculas albas, vnguibz à portione succi crassioris impressas attinet, cum non pro vitiosis sed potius pro vitæ longævæ indicibus habeantur, sicuti in iuuenibus consuetæ eo nomine, maximè si plures appareant, laudantur, ita & senibus si vel vna aut altera se in illis proferant, spem vitæ longioris faciunt, admodumque commendantur.

Pilorum
discoloratio
curatio.

Pilorum discoloratio illa maximè notatur, quâ albi exactè sũt, in Canitie dicta, quæ in senibus, cum veneranda sit, plerumque intacta relinquitur: iuniores vero eam corrigere student. Rufos quidam quoque fastidiunt, cum tamen ab aliis pro elegantibus habeantur. Quos in illis colores delere aliosque introducere, impossibile, cum in albis hæc omnimoda siccitas, propter quam perspicuitate amissâ, sic albescunt, vt in causis dixi-

mus, emendari amplius nequeat: Et in rufis aliõve colore præditis, succus eos nutriens ipsis assimilatus, semper similes in colore producat; vt videmus, & pilis euulsis, similes renasci, & in auium genere si vna aliqua penna euellatur, et si vicinæ aliæ omnes diuersi sint coloris, eiusdem coloris pennam recrescere, quod in columbis sæpius ipse obseruauit.

Vt alium tamen colorem, nigredinemque adipiscantur, senes aliqui, reiuuenescere cupientes, imprimis expetunt. Et iuniores quoque, si certis in locis trica aliqua pilorum alba in barba vel capillis eorum existat, vt hoc in quibusdam obseruatur, eam reliquis pilis similem reddere, aut etiam rufos pilos denigrare cupiunt. Quod sanè arte comptoria potius, quàm alius color, instabilis tamen imprimitur & veluti appingitur, efficitur. Idque adhibendo potissimum adstringentia, quæ eos nigro colore tingere vel saltem obscurare possunt. Cæterum vt illi quoque, qui succrescunt similes euadant, ægrè potest perfici, & proinde se cani pili prodant, nisi continuò utamur, quod tamen solum molestum, sed & capiti præsertim noxium, vix cauere possumus. Abluantur autem vel illinuntur, vt denigrentur capitis vel barbæ pili, sequentibus.

Canities
curatio.Pilorum
discoloratio
curatio.

Decoctum pro ablutione factum, in Lixiuo vel Aqua pluriâ, aut cisternæ aut extinctionis Ferri, Gallarum, Nucum, Juglandiũ viridium, glandiũ Fagi, Cupressi, baccarum Myrthi, radicum Salicis, foliorum Lentisci, Myrthi, Sumach, Mori, Rubi, Cupressi, florum Rosarum: Efficacius fiet si Lithargyrium, Ferri limatura, vel Ferrum, rubiginosum addantur: Item Acetum, vel Succus alius adstringens.

Probatum & decoctum Myrobalanorum. Item à quibusdam & radicum Capparum, foliorum Ophris, Vitis nigrae.

Hisce & caput respicientia, si caput lauare debeat, adduntur. Imprimis Saluia, folia Lauri, & similia.

Vino si abluantur pili, in quo Hirudo suffocata fuerit, eos denigrare tradunt.

Aquæ exstillatæ ex enarratis plantis efficacioribus, aliquid quoque possunt efficere, si

præsertim Sal nitrum vel fossile & Vitreolū, illis antequam destillentur, permisceantur.

Fortè & ex Atramento scriptorio elicita aqua aliquid efficiet, quo si per se vteremur, nimis corpus denigraremus.

Probatum à quibusdam aqua ex Ebulo, admisto gummi Arabico, elicita.

Olea illinuntur; vt illud in quo Lacerta coxerit.

Vel in quo cortices Nucum viridium cum Alumine decocti sint.

Vel illud quod in Pomo colocynthidis excavato infusum, addito simul Auripigmenti modico, & costū sub cineribus, postea exprimitur. Sunt qui semen Hyosquiami addunt.

Vel: R. Olei cōmunis vel omphacini, addito vel sylvestris Oleæ aut Myrtino vel Lentiscino ℞. ℞. succi Nucum viridium 3. iij. Aceti 3. ij. Acaciæ vel Hypocistidis 3. j. Gallarum 3. ℞. Aluminis 3. ij. Vitreoli 3. j. coquatur & colentur. Possunt & alia adstringentia incoqui, vt baccæ Myrthi; Nux cupressi, Myrobalani, Capulæ glandium, Sumach & similia; item Ladanum.

Vntiones aliæ fiunt, vti ex Gallis vel cortice Malorum granatorum, vel aliis & Alumine, decoctis in Aceto vel Oleo.

Velex Succo nucum iuglandium viridiū, aut in illarum penuria, ex Acacia vel Hypocistide, Ladano & Alumine, vel Sale fossili aut Nitro, dissolutis in Aceto vel oleo Myrtino aut succo Betæ.

Aut ex Lithargyrio cocto in Lixiuio, ad cuius ℞. ℞. si Aeris combusti 3. iij. addas, efficacius erit, ampliusque, si olei Tartari 3. ℞. illis postquam cocta sunt, permisceas.

Alia inunctio: R. Lithargyrii & Aeris combusti pondus enarratum, addendo Calcis viuae 3. x. atq; cum aqua in formam linimenti decoque.

Pectinando pilos successiue denigramus, si pectinis dentes pilos discriminantes, inungamus vel madefaciamus prædictis remediis: Aut Ferri limaturâ vel scoriâ, aut Plumbi in Aceto coctâ.

Validius operatur, si Ferri limaturæ 3. ij. in aquâ fortis vel aquâ Capitelli 3. ℞. dissoluantur, addendo pulueris Auripigmenti parum, eoque pectinis interualla. ab extremi-

tatibus remotiora illinantur, ne si circa apices dentium hoc idem fieret, cutis tacta exulceretur.

Plumbeo pectine capillos & barbam frequenter pectinare, albam ipso rum canitiem denigrare, vel obscurare saltem non nihil, vulgò existimant.

Cæterum cum & pili, si admodum nigri existant, minusq; alio aliquo colore, vt flavo præditi sint, non ita pulchri habeantur, nigredinem arte sic quoque mutare vel immuere formæ studiosi conantur.

Et vt minus extremo colore nigro vel albo tincti appareant (quem colorem infantium pilis consuetum, Albū Germani *Pilos nigros cr- rigentis renel- West- Gall- Blond* vocant) sequentibus fieri posse, docent.

Si fumigentur Sulphure liquefacto, prius Lixiuio loti & madidi adhuc, postea siccati inungantur Vnguento Populeonis. Quod Sulphuris accensi fumus potentius agit.

Lixiuium ex cineribus Vitis idem efficit. Vel in quo decoctæ sint radices Enulæ, Centaurij maioris, Raphani, cortices radicis Capparum. Potest & addi Alumen & Sulphur.

Vel fiat hæc illitio: R. Sulphuris 3. ij. Thuris 3. j. Aluminis 3. ℞. Stercoris hirundinum 3. ij. pulueris feminis Raphani, corticum radicis Capparum, rad. Enulæ ana 3. j. Fellis bouis 3. ℞. cum Aceto vel Glutine dissoluto in aqua, fiat linimentum. Addi poterit cinis florum alborum Tapfi barbati.

Ad flavos pilos reddendos, in quo maxime Venetæ laborant matronæ; Præparandi iidem antequam hæc adhibeantur, vt colore rectius imbuatur. Abluendo ante horum usum, Aquâ in qua Alumen, vel Sal aut Nitrum, aut Tartarum dissoluta coctæ sint.

Vel Lixiuio prædicto simplici prius abluantur.

Aqua quâ pili madefiunt, elicita ex Agrimonia Serpentina, Aro; Item Aceto & quartâ parte Nitri; Ex Melle addito gummi Arabico.

Lixiuium quo pili abluuntur, fit ex cineribus sarmentorum Vitis, Paleæ auenæ, addendo nonnunquam cineres ligni Hederæ, stipitum & radicis Caulium vel Fabarum.

Hiscē rasuræ addi possunt, vel pulueres herbarum, ex quibus decocta lixiuia parantur. Quæ omnia stramini Auenæ vel Hordei superponuntur, aquaque per hæc, vt lixiuium fiat, transfunditur.

Decoctum pro ablutione pilorum vsurpatur, fastum in Aqua vel Lixiuio communi aut sarmentorum Vitis aliōve efficaciore, in quo decoquuntur illa quæ croceum succum in se habent, vt Buxi ligni rasura, cortex ligni Berberis, cortex Citri vel Arantiorum, Cortex medius Sambuci, radix Chelidoniæ, Liquiritiæ, Curcumæ, flores Stechados citrine, Tapsi barbati, Genistæ, flos Tinctorius addendo etiam aliquando Rhabarbarum & Crocum. Dein etiam additis aliis plantis, quæ similem colorem pilis adferre creduntur; vt radice Vrticæ, foliis Agrimonie, Capillaribus herbis, paleis item Hordei vel Auenæ, atq; etiam seminibus Lupinorum, Cuminis, Fœnogræci, rasurâ item Eboris, addendo & quandoque Myrrham & Tartarum, vel Sal aut Nitrum.

Oleum inungitur, in quo rasura Buxi, radix Chelidoniæ, Crocus similiaq; coxerint, vti & Myrrha.

Vngtio: R. Myrrhæ 3. ij. Tartari 3. j. β. Salis 3. j. Croci 3. β. cum Oleo in quo aliquid ex supradictis coxerit, fiat linimentum. Addunt & Apes vstas aliqui.

Pilos rufos efficiens remedia.

Ad rufos etiam pilos reddendos, quod in quibusdam regionibus pulchrum esse censetur, fit Lotio illorum ex decocto radicū Rubiæ, Raphani, Lori arboris, ligni Rasuræ, Lupinorum, Absynthij in aqua vel Lixiuio.

Illitiones id præstant succi Raphani vel Lycij Diosc. aut aqua Raphani: Vel oleo Cucumeris syluestris cum Tartaro vsto, vel fæce Vini cremata.


Alkanna siue Henne Arabū (cuius plantæ bacillos ex Aphricæ emporiis adferri scribit Lobelus, luteo intus constantes ligno, quam Dodonæus Cyprum Dioscoridis esse putat, aliam à Ligustro, quam Cyprum illam esse putarunt plantam) ad pilos ruffandos imprimis conuenire docent, Turcisque qui pilos rufos probat, ad eos sic tingendos, vstatum, adeoque efficac, vt & vngues cæterasque partes coloret. Illinuntur autem trita

illius folia, per se vel in succo radiculæ prius madefacta, vt vult Dioscorides. In quorum penuria, si ex bacillis illius ad nos comportatis succus excoqueretur, fortè idem præstaret. Vel Oleum Cyprinum, quod ex eo paratur, & ad ruffandos capillos singulare esse censetur.

Ad odoratos insuper pilos in capillis & barba reddendos, herbæ odoratæ, vt folia Maioranæ, flores Lauandulæ, Gariophylli, Nux moschata, Moschus, Ambra, decoctis linimentis admiscuntur:

Pili odorem gratum conciliantia remedia.

Sapoque odoratus qui variis modis fit, vsurpatur.



DE EXTUBERANTIA.

CAPVT III.

Genera.



Extuberantiam vocamus, quando corpus nō magnitudine nimium augetur, sed alioquin alicubi intumescit, nec partem numero redundantem, sed extuberantiā aliquam certis in locis innatam vel adnatam habet. Quæ extuberantiæ cū extra corporis superficiem promineant, & per se propemodum dolore careant, vel si aliquem habent, aut molestiam partibus quibus insident adferant, protuberantia tamen hæc magis in illis spectetur, hīc potius describuntur. De internis extuberantiis in corpore latentibus, in functionum læsionibus, quibus incommodant, egimus. Cæterum externæ hæc extuberantiæ, cū varia sub se comprehendant genera, nos ea potissimum ad duo hæc reuocamus: quod aliæ extuberantiæ sunt generaliores, aliæ particulares.

Generaliores extuberantiæ, sunt Intumescentiæ dictæ, quæ maius seu amplius corporis spacium occupant, cū vel totum corpus vel media saltem corporis regio, vel venter tantum intumescit: sicuti in singulis nunc demonstrabitur.

Totum corpus intumescit, maximè in facie, manibus, pedibus, nec non cæteris corporis partibus, & plus æquo excrescit, in

Leuco-phlegmatica.

Ana- affectu quem Leucophlegmatiam, à colore
sarca vel albo & humore, qui illi causam præbet, vo-
Hypos- cant; Vel ab eodem subter cutem vel car-
sarica. nem collecto, Anasarcam aut Hyposarcam
appellât, & ad Hydropis seu Aquæ inter-
cutem speciem, ob eandem causam referunt.
Hic affectus cachexiam ferè, quæ præcessit,
pallorèq; se primum patefecit, sequitur, sen-
simque ab ea in hanc corporis molem veluti
carneam & mollem conuertitur, atque ut in
illa, sic & hic. Urinæ remissæ in colore ma-
nent, Languorque adest totius corporis, Fe-
brisque interdum lenta huic affectui impli-
catur, Alique morbi & illorum symptoma-
ta, ut de cachexia dictum, illi copulantur.

Leuco- Est & Leucophlegmatiae altera species,
phlegma quam Serosam à causa appellare possumus,
tia sero- in qua extumescencia hæc adhuc mollior &
sa. laxior priore existit, in pedibus præsertim,
illicque non adè ab asciticorum pedum in-
flatione differens, cum & fouea illis facilius
imprimatur, impressumque diutius rema-
neat vestigium; quam tamen ab hydropæ
ascitide, & generalis hic tumor, & quod
venter non plus reliquo attollatur, aliæque
ascitidis signa, faciliè distinguunt. Est & ter-
tia, leucophlegmatiae species, in qua corpus
in tumorem adhuc pleniorè & molliorè
affurgit; & in pedibus cum asciticorum cru-
ribus & tumore ac splendore, omnimodam
habet similitudinè, qui & tunc magis quam
reliquum corpus tument. Quæ species nunc
sensum, uti alia, aliàs, verò subito hominem
invadit.

Inflatio- Præter hæc species leucophlegmatiae, ob-
totius servauimus & aliam corporis faciei & artuum
corporis, præcipuè, extumescenciam, subito interdum
seu intum- etiam subortam; non ita mollem, sed ten-
escen- sam, & quæ impressionis signum non reti-
tid. net, ac si cutis inflata esset, unde Inflationem
corporis appellare possumus.

Ascites Media corporis sedes à ventris summo ad
hydrops. pedes usque, intumescit in hydropæ Ascite,
quia venter utrem aqua repletum refert, ap-
pellato. In quo Tumor à pedibus ferè inci-
pit, illorumque infimam sedem eminentio-
rem; dein eam quæ in ambitu malleolorum
existit, primum replet, inde sensim ad genu
usque & vltèrius extenditur, maxime in hu-

miliori femorum sede, ampliusque excrescit
interdum sedere vel eunte ægro, decrescit ve-
rò nonnihil eo recumbente noctu, impres-
sumque in hoc tumore aliquandiu remanet
vestigium, qui vbi admodum distensus est,
splendere & pellucidus non nihil esse videtur.
Venter vel statim cum pedibus impleri
incipit, tandem ab hypochondriis ad pubem
usque totius distenditur, costarumque fines &
extremities extrorsum pelluntur, qui &
commotus fluctuat, & si æger in latus se ver-
tat, eò impetu quodam labitur. In huius etiã
cute, sub umbilico in pectinis regione, & in
dorsifedibus tumentibus; pressa vestigia sicut
& in pedibus aliquousque, perseverant. Scrotum
postremò similiter uti venter repletum ad-
modum distenditur & translucet, veluti in
Hydrocele, longèq; magis, adè ut & ad ca-
pitis magnitudinem excrescat. Virga item
intumescens quadruplo maior, translucida
fit, atque etiã curuatur, sarciminis maioris in-
star. Sicque inferior corporis sedes in tumores
excrescit, reliqua superiore decrescente in-
terim & emaciata, atrophialaborante.

Dyspnœa ægrum in hac specie hydropis
vehementer angit; maxime cum loca alta
seandunt vel decumbunt, præcipuumque de
quo conqueruntur, est symptoma; Quæ etiã
nondum apparente tumore, incipit hydro-
pemque præfagit, eoque emergente incre-
mentum sumit, & ab initio circa mediū no-
ctis, concoctione factâ, superueniente com-
pressio cordis dolore, mox magnâ difficul-
tate spiritum ducunt, & suffocationis sen-
tiunt periculum, quo excitati statim surgere
& orthopneumaticorum instar, erecti cerui-
ce sedentes; respirare coguntur. Quando
quoque decumbunt, in alterum latus, siue
dextrum siue sinistrum sit, urgente tunc dy-
spnœa, decumbere diutius nequeunt, aliàs
in neutrum, sed in dorso quamdiu in lecto
sunt, cubare coacti, possunt recumbere. Tan-
dem quoque crescente malo, penitus à de-
cubitu ferè omni, cum per eum mox angan-
tur; abstinere coguntur, & dies noctesque
non solum erecti, sed & capite in anteriora
pectoris inclinato, ut liberiùs spirare queat,
in sella sedentes longo tempore; cum diu-
turnus sit morbus, reliquum, quod breue
super-

169

supereſt ſpaciū vitæ, miſerè tranſigunt. Vi-
res eorum, quia per decubitum quieſcere
ſufficienter nequeunt, ſed corpore erecto
ſemper neceſſe eſt ſint, proſternuntur ſum-
mè, appetitus deſcitur: Siſis perpetua eſt:
Miſtio pauca: Vrinæ interdum admodum
tinctæ, rubræ vel aureæ & craſſæ, aliàs cru-
dæ & aqueæ, interdum non aded mutatæ.

Tym-
panites cū
aſcite co-
pulatæ.

Occurrit & alia hydropiſ aſciti ſpecies, in
qua venter longè ampliù diſtentus & ex-
tenſus, tympani inſtar cū percuitur, ſo-
num edit, in quo fluctuatio quædam ex mo-
tu deprehenditur, cætera priori ſimilia pro-
ferens accidentia, niſi quodd pedes aliquando
illis, non aded vt in alia eius ſpecie tument:
Eſtque tunc cum tympanite aſcites coniun-
ctus.

Tym-
panites ſim-
plex.

Venter ſolus intumeſcit, & tympani inſtar
tenſus eſt, in hydropie Tympanite, ob hanc
ſimilitudinem ſic nominato. In quo Diſten-
tio totius ventris ſeu abdominis tanta eſt, vt
percuffus ſonum etiam inſtar tympani ali-
quem edat, & preſſus mox iterum attolla-
tur, nec diutiùs impreſſionem ſeruet, ſecus
quàm in Aſcite. Liberiùs quinetiam quàm
aſciti ſpirant, nec ex decubitu difficul-
tatem aliquam ſentiunt, nec pedes illis aut al-
iæ partes tument. Præter hæc murmura in-
terdum per ventrem diſcurrentia audiun-
tur, & tormina quandoq; eos moleſtant, vi-
resque labascunt.

Tym-
panites in-
teſtina-
lis.

Eſt & alia tympanitis ſpecies, in qua cum
prædictis accidentibus, ilei & colici affectuū
ſymptomata, vt omnimoda conſtipatio do-
lor & vomitus, concurrunt.

Excreſcit quoque venter in tumorem natu-
raliter, poſt conceptum legitimum, ob fœ-
tum, in gravidis mulieribus; Dein & præ-
ternaturaliter in conceptu deprauato, cū
corpus aliud præter fœtum Mōla nomina-
tum formatur: Vti & nonnunquam extra
conceptum in ſcæmineo ſexu; eo nonnihi-
modo, ac ſi gravidæ eſſent. De quibus tribus
generibus ventris tumorum, quo pacto ſe
habeant, & quibus ſignis internoscantur,
hic quoque agendum.

Ventris
excreſcen-
tia in
Gravi-

Ventris excreſcentia, quæ in gravidis ex-
fœtu ſit mulieribus, etſi cū naturalis ſit, ad
affectus præternaturales, de quibus ſolum

agimus, minimè pertineat, tamen vt eam ab
illis diſtinguamus, & hanc non à cauſa ali-
qua morboſa proficiſci, quam mulieres illi-
cito congressu uſæ, partum celare volentes
prætendere ſolent, cognoscamus; & vt de
conceptu aliquid certi aut veriſimile ſaltem
pronuntiare poſſimus, nec quod facile ſit, in
hac prædictione peccemus, cū mulieres ip-
ſæ quæ vterum geſtant, de hoc præſertim
circa principium dubiæ ſint, ſcīreque ſum-
mopere expetant, ideoque Medicos conſu-
lendo, urinasq; mittendo variis modis ten-
tent, tum ex ſignis, tum accidentibus & ex-
perimentis, qua ratione mulierem conce-
piſſe, cognosci poſſit, demonſtrabimus.

Conſtitutio mulieris ad concipiendum
idonea, vnā cum cæteris indiiciis, ad conce-
ptus cognitionem aliquam facit. Eam eſſe
ſcribunt, ſi præter integram corporis conſti-
tutionem & temperaturam (quam aliqui
conuenientioreſ eſſe putant, ſi mariti tem-
peraturæ ſit contraria, vt ex vtriſque media
exurgat temperies) lumbos habeat la-
tos, ventrem amplum, non nimis, circa pubem
præſertim, obœſum. Verum cū & eas quæ
ſecus ſe habent, concipere nihilominus vi-
deamus, cuiuscunq; temperaturæ, tam cor-
pulentas quàm macilentas, immò etiam
minimè ſtaturę pigmæas, nihil digni ex iſtis
colligere licet. Rectiùs eam ad conceptum
aptioreſ eſſe cenſebimus, quæ ætatem legi-
timam à 14. ad 45 annum habet, quæque pa-
rentibus ſœcundis nata eſt. Et ſi priùs quo-
que conceperit & peperit, magna eſt præ-
ſumptio, ſi de conceptu dubitemus, eam iam
concepiſſe.

Commiſſionem cum maſculo conceptu
præceſſiſſe neceſſe eſt, quam indagare in mu-
ptis ſuperfluum, in aliis verò neceſſarium, à
quibus cū fateri nolunt, variis artibus id
expifcandū, inter quas & hæc erit, cū ma-
gna eſt ſuſpicio, ſi Medicus ſe ex vrina eam
corruptam cognouiſſe aſſeueret, cū vulgò
putent Medicum quæuis ex vrina hariolari
poſſe; vel etiam minis illud parentes, magi-
ſtratus, &c. extorquebunt. Mulier quoque
apud ſeipſam, illud aliis manifeſtare pudore
fortè impediēte, ſi depræhenderit, ſemen
poſt concubitum retetum fuiſſe, nec denud

profluxisse, magnum conceptionis factæ erit inditiū: præsertim si tunc temporis vteri aliquam contractionem veluti suctionem, cum magna voluptate senserit: vti & eodem tempore & sui & mariti seminis effusionem & concursum esse factum.

Menses si subsistant, qui prius ordinariè fluere solebant, primum & præcipuum conceptionis est indicium, quo mulieres se gravidas esse mox conjiciunt, & à primo mense post cōcubitum initio supputationis ducto, partus tempus solent colligere. Et si de conceptu dubiæ sint, Medicis quoque quòd & quando menses cessarint, liberè aperiunt, tam illæ quæ licito, quàm quæ illicito concubitu, quem tamen fateri nolunt, alias suppressionis causas effingentes, vsæ sunt. Licet autem etiam in gravidis mulieribus, aliqua interdum per vterū fiat sanguinis euacuatio, si parca sit, nec mensium instat ordinem seruet, prædictionem conceptus, ea nō facile euerteret. Quod si quoque mulier eo tempore quo concepit, infantem lactans, menstruis aliquandiu caruerit, vti quibusdam hoc peculiare est, licet non statim, postmodum tamen, si penitus menses cessent, mulierem cōcepisse verisimile est, ob eamq; causam matres, hoc sentientes, infantes ab lactare mox solent.

Venter si sensim increscat, nullis morbi alterius præsentibus accidentibus, præcipuū est conceptionis indicium: Præsertim si tumor inde natus sub umbilico magis emineat, durus sit & nonnihil collectus, nulla vt in ascite impressa retinens vestigia, neque vt in tympanite tensus: Dein & eandem magnitudinem, nisi quatenus sensim increscit, si seruet, nec vt in hydropicis asciticis, dum corpus erectum est, augeatur, dum recumbit minuatur: neque etiam corpore inclinato in latus, vt in ascite tumor eo subito pronoluatur. Quæ quidem sic se habent, si non falsus sit, aut irritus, vti dicitur, conceptus, vel alius tumor, vt hydropicus gravidis mulieribus superuenerit, vti aliquando accidisse vidimus, tunc enim ventre vehementiùs intumescente, mulieres ex summa dispncea in suffocationis versantur periculo, quo è medio aliquando tolluntur, nisi per abortum

vel partum verum, si tempus hoc attingere possint, & foetum & aquam profundentes, liberentur.

Mammarum incrementū magnum quoque si cetera adsint, conceptionis est signum, cum in morbosis tumoribus potius flaccescant: Indubitatum, si lac contineat, illudq; reddant, quod & iam gigni, antequam prodeat ex venis mammarum turgidis & liuescentibus, conjicere aliquo modo possumus. Quòd & facit Papillarum augmentum, pruritus, & si circulus papillas ambiens, magis fuscus reddatur.

Foetus in vtero cum moueri incipit, quod medio vteri gestationis tempore, nunc citius nunc tardius fit, seipsum, & proin ex eo gravidam matrè prodit. Cuius motus non cum murmure aut torsione ventris, sed vno impetu vnam ventris sedem impellendo, & veluti intrinsecus trudendo perficitur, & à matre deprehenditur.

Fastidium quorundam ciborum plerumque in iis quæ conceperunt, nunc citius primis mensibus, nunc tardius sequentibus sese offert. Et à vino aliquæ tunc quoque abhorrent atque abstinent; Vomitusque prius illis non consuetus, aliquas similiter instat. Aliæ verò etiam ea, quæ extra conceptum fastidiebant, summo desiderio appetunt, etsi quandoque cibi consueti minime sint, vel etiam alia abominabilia; qui affectus in ipsis Pica dicitur, vti in Appetentia deprauata dictum fuit.

Accidentia alia quoque vtero gerentibus aliqua sunt peculiariora: vt Animi quædam defectio seu potius imbecillitas, quando diutius veluti conclusæ, in vno loco sedere aut moram trahere coguntur, vt in conuiuiis, templis, vnde cordis hanc, vti aiunt, angustiam sentientes, mox surgunt, aërique liberos se exponunt, & vt liberiùs spirare possint, pectus aperiant, oportet. In aliis præsertim plethoricis vel cacochymicis, alia insuper accedunt, vt tumor pedum, varices venarum in cruribus, cæteraque in aliis affectibus hinc inde descripta, ab aliis quoque causis profecta.

Vrinarum indicium quod atinet, cum licet incertum & fallax penitus existat, nihilominus

173

hominus tamē illi tantum vulgus tribuat, ut ex sola earum inspectione, certò aliquid Medicos pronuntiare posse existiment, quibus hoc nomine plurimum negotij facessunt, quippe si nihil certi ex ea se cognoscere posse, fateatur, pro indostioribus habeantur, si aliquid pronuntient, faciliè labantur, & risui, sicuti multis accidit, quibus falsæ urinæ vel etiam pecorum suppositæ fuerunt, se exponant, Medici, cautos admodum & sagaces se hîc præbere debent, ne inscitia per calumniam nota, ut dictum, illis inuratur. Proinde eam intuentur, multa sciscitentur de variis conceptus indiciis, si quæ extorquere queant, oportet, nihilque temerè, sed circumspicere & dubiè respondendum. Imprimis si urinâ sanæ similem deprehenderit Medicus, & inde, ansâ de affectu aliquo inquirendi sumptâ, menstrua suppressa esse, quod sponte libenter fatentur, cognorit, nō à morbis aliquibus, in quibus urinæ plerumque crudæ vel aliter mutatæ apparent, sed potiùs ob conceptum id fieri colligere licebit, aliquoque sic indicio, ex urinis hac ratione potiùs quod sanæ sunt, quàm ex aliis illius notis collecto, uterū, gestare mulierem deprehendet, liberiusque tunc de aliis quoque signis indagando, aliquod pronuntiare poterit. Nam quod alias cōceptionis in urinis notas concernit, ut sunt contenta, instar floccorum urinæ innatantia, vel potiùs, ut ego obseruavi aliquoties in modo nuptis, conceptione iam factâ, quòd urinas veluti purulentas, aliquot diebus, citra renum & vesicæ vitia reddiderint, incerta cum hæc sint penitus, ex illis solis nihil solidi, sed omnibus simul collatis indiciis, tandem aliquid indicandum.

Experimēta quod attinet, quibus an mulier grauida sit nec ne, deprehendi posse existimant, sunt varia. E quibus magis vñtata sunt hæc; Mulsâ cum aqua Cælesti exhibita mulieri dormiturg, si tormina ei excitet, grauidâ esse docet Hippocrates; Ex Allio pessi instar muliebribus indito, si odor ad fauces pertingat, eundemq; exspiret mulier, idem in illa significare censent, cum tamē meo iudicio contrarium potiùs, nimirum minime grauidam esse, hoc argumento probari pos-

set, quòd in grauidis vterus conclusus, exhalationi ab allio sursum per muliebria, viâ præcludat, quæ in non grauidis cum aperta sit, liberius sursum eam penetrare sinet. Præterea si vrina vini albi permissione, fabarum iusculo similis euadat, conceptum quoque arguere scribunt.

An fœtus masculus vel fœminicus vterogestetur, indiciis quoque aliquibus posse discerni, non solum vulgus, sed & Medici quidam præstantissimi opinantur, verum cum hæc incerta & erronea magnâ ex parte esse deprehenderim, ea studio, ne errores fouere videar prætereo.

A conceptu deprauato, si non fœtus, sed *Ventris tumor ex Mola.* Mola appellata vteroque genita reteta eum in tumorem diuersimodè formatum attollat, ut in excretis dicetur, tandè rejicitur; quæ cum indicia & accidentia pleraque conceptus veri notis similia proferat, difficile ab initio præfertim, conceptum hunc præternaturalem cognoscere, eumque à naturali distinguere. Primum enim bonæ constitutionis mulier ad conceptionem apta, & viro cohabitans, huic vitio, ex causa aliqua potest esse obnoxia, licet rariùs hoc fiat. Magna interim molæ in vtero suspicio est, si mulier priùs quoque talem gestarit; maiorque, si sæpiùs illi acciderit, sicuti aliquas quotannis, alias singulis ferè mensibus, eiusmodi reieciisse obseruauimus, interim nihil grauius passas, beneque nihilominus habitas & vegetas.

Alioquin ut in vtero cōceptus, sic & in hoc mox menstruus fluxus desinit, venterque & mammæ simul successiuè ad aliquod tempus vsque incrementum sumunt, postea verò si subsistat mola, venter vel in eodem statu manens, non ampliùs sicut in fœtu vero, augetur, vel si augeatur, nō in eo motus ille sentitur, quem fœtum gerentes, ab illo percipiunt, nec ut in his, est ita adstrictus sed pendulus, talisq; qui veluti pondus aliquod contineat quod cum se mulier in latus vertit, eò prouoluitur: Ex quibus demum, conceptum nullum fuisse, vel falsum esse, suspicari solent.

Quod reliqua accidentia concernit, appetitus imminui vel deprauari, ut in legitimo con-

conceptu, aliâq; illic enarrata accidentia superuenire solent, atque etiam, cum hic conceptus sit præternaturalis, plura peioraque, inter quæ frequentiora sunt, corporis reliqui præter ventrem extenuatio, eiusdemque discoloratio, vëtris punctiones, appetitusq; prostratio diutius durans; ex quibus tamen reuera nihil certi de eo pronuntiare possumus, vti neque ex vrinarum intuitione, quibus etiam in hoc casu cognoscendo vulgus multum tribuit, Medicique sæpè vt peritiores esse videantur, ad ea conuiuent. Adèd vt cõceptum falsum à verò exquisitè discernere, valdè sit arduum; donec vel per abortum factû, vti ferè sit, nunc primis, nunc sequentibus mensibus, vel per partum destinato tempore, ex reiecto præternaturali cognoscatur. Quem quoq; terminû pariendi prætergressa mulier, de vteri gestatione, ex supradictis indiciis certa, si non pariat, nec conatum, aliquem illius sentiat, aliâve indicia, quæ fœtum mortuum retineri demonstrât, nisi hoc nulla conceptione factâ, oriatur, vti iam explicabitur, certum est, non fœtum sed molam vel aliud simile vtero gestari, qualia diu postea eas retinuisse venter turgente, mensibusq; suppressis, accedentibus quoq; aliis insuper malis, obseruauimus, multisq; post mensibus vel annis, cum periculo vitæ, ex larga profusione sanguinis, demum reiexisse, vel ad mortem vsque conseruasse.

*Ventris
extume-
scencia
circa
conceptû
in semine
nisi ac si
grauida
esset.*

Citra conceptum venter interdum intumesceat augeturq; vt in grauidis, ita vt & mulieres ipsæ, atq; inter eas etiam aliquæ quæ prius vterum quoque gestarunt & pepererunt, se grauidas esse putent; eadem de virginibus si hoc illis accidat, suspicio, tum ventris excreſcentiæ causâ, tum quia menses ipsis subſisterunt, tum quia nullo alio morbo illiusq; accidentibus grauioribus, quæ aliàs mensium suppressioni iuncta esse solêt, vti nec hydropis aliorumve tumorum ventris symptomatibus, ab initio præsertim, infestantur. Ex quorum etiam signorum defectu, hanc ventris extuberantiam, ab illis tumoribus ventris in morbis illis natam facile distinguimus.

Ab illo verò tumore ventris, qui ex conceptu tam legitimo quàm deprauato prodit,

hunc internoscimus, si ætatemabilem ad conceptû annis fœmina superarit, vel nondum attigerit, licet nisi iuuenes admodum sint, aut ætate prouectiores, hoc quoque iudicium nos possit fallere, vti minime, si virgo sit, quod tamen cognoscere, si consuetudinem cum viro occultare velit, arduum. Interea tamen quia illarum ventris tumor nō adèd collectus durus & æqualis, vt in grauidis & molam gestantibus existit, dein & quia mamillæ illis non sic augentur, nec motum qualem fœtus edere solet, percipiunt, & signa plethoræ vel alioquin malæ constitutionis, in languore, pallore, compressiuo circa regionem ventriculi dolore, cordisque palpitatione, vrinarumque in peius mutatione, se proferunt: atque aliquando alijs insuper accidentibus superuenientibus, tumor ventris vterius se extendens totum ferè attollit, murmuraque & rugitus edit, hisce indiciis non à conceptione fœtus, ventris hunc tumorem prouenisse, nec mulierem grauidam esse, aliquo modo possumus colligere.

Vti neque molam esse, grauiora hæc in hoc casu, quam in illa vitia suborta demonstrât, sicuti & quâdo tempore partui alioquin destinato præterito, de mola, vti dictum, vel de hoc casu suspicio est: Potissimumq; & indubitanter, quando hæmorrhagia larga subsequente per vterum, cirra carneam aliquam molam, quod aliàs citius ante legitimû pariendi tēpus, aliàs post illud demum accidit, venter vel sensim vel subitò rursus subſidet. Quod cum largissima sanguinis si fiat effusione, vires exhauriendo, ægram summè debilitat, noxasve post se relinquit, vel eam penitus conficit.

Particulares extuberantiæ sunt, quæ certa duntaxat loca possident, tum insuperficie hinc inde, tum in cavitatibus apertis, vt in oculis, ore, pudendis: Suntq; quam plurimæ & diuerſorum generum, & plerumque collecti Tumores: aliàs etiam latius diffusæ intumescentiæ. Et distinguuntur primum: quod aliæ in locis citatis prodeunt, illi persistunt, de quibus primum agemus: aliæ verò retrocedere ab illis possunt, quas postea tractabimus.

Qui persistunt permanentque in suis sedibus tumores, aut etiam diffusæ intumescentiæ, nec vti iam enarratæ retrocedere & abigi rursus possunt, variant primū: quod alij molliores sunt, alij duriores.

Molliores tumores qui tactui plus minusve cedunt, prout magis minusve tensi sunt, & pressi vel mox iterum attolluntur, vel etiam impressionis vestigium aliquandiu retinent, in Carnosos & Cutaneos præcipue tumores diuiduntur.

Carnosus tumor, quia carnem aliquo pacto de nouo veluti adnatam, cute obiectam venisque plenam refert, dicitur, vti & Sarcoma, Sarcitis, Hypofarcosis, Carnis excrescentia. Hic est corpore magis minusve prominet, aliquando & propendet, tumoreque nunc maiore, nunc minore, nunc rotundo, nunc longo, aliterque formato se profert, & pondere nonnunquam illi molestus est, actionesque interdum simul impedit. Hic extrinsecus vbiuis in corpore sponte nasci potest, cute vti reliquum corpus obductus, variis formis, est quibus capitis magnitudine rotundum globum exacte referentem, ceruici appensum & angustiore basi adnatum, pistorem quendam multis annis ad vitæ finem usque gestasse vidimus. Ex vulneribus quoque vel vlceribus sanatis Caro sic luxurias, vbi hæc fuerunt, prodire potest.

In sacco testium seu scroto, eiusmodi carnosus tumor testis accrescens quoque prouenit, qui Sarcocoele, cum omnibus tumoribus in scroto genitis *Kyda* nomen attribuitur, appellatur, quem Germani à carne Carnosel vocant. Hic etsi in eo quod in scroto consistit, cum enterocoele conueniat, tamen ab illa facile distinguitur, quod compressione non cedat, nec ventrem rursus subeat, sed sensim excrescens, nec subito ut in enterocoele eò delabens, semper fixus testisque adnatus permaneat, eumque plus minusve, aliquando & totum includat. Hic tumor in magnam molem quandoque excrescit, saccumque testium adimplens & extendens dependet, pondereque admodum molestus est; non dolens alioquin & concolor.

Intrinsècus eiusmodi tumores carnes variis in locis formæ differentes se offerunt,

membranâ obiecti. In naribus frequenter caro eiusmodi expulular, & Sarcomatis nomen seruat: quæ si adaucta foras est naribus vel intrò in faucium amplitudinem propendat, Polypus vocatur, cum ad illius similitudinem, rotundus & oblongus sit, & angustiore basi venisque per eam ductis, naribus adhæreat, qui & vti narium interior tunica rubet, sed indolens est, quo vti & mollitie à cancro differt: Qui si in naribus gignatur, vti aliquoties fieri vidimus, durus est & pungens, in immensum sæpè excrescens, & in carcinoma desinens, cum polypus præter turpitudinem quam adfert, nares obstruendo, respirationi & voci solum incommodet, rariusque sponte non præcedente alia in naribus læsione, secus ac cæcer nascatur. Hunc luna crescente augeri, decrescere vero minui putant.

In pudendo mulieris carnositas talis quædoque nascitur; vidimusque ex eminentiore illius sede, media quæ est inter labrum vtrumque, processum Clithoridem dictum, adeò excreuisse, ut colli anferini longitudinem & crassitiem adæquaret, & sarciminis instar carnei propenderet, sicque totius vitæ curriculo permansisse. Quod vthermaphroditi aliquæ esse conseretur, cum pro virili membro sumeretur, causam in multis fuisse existimo. Quæ præter eiusmodi carnositatem, excrescentia, tam in pudendo mulieris quam podice illius vti & viri, frequentius prodit, cum dolore aliisque accidentibus Condyloma dicitur, atque in doloribus fuit expositum.

In ore in buccis, caro quoque luxuriare potest, præsertim verò in gingiuis, quarum carnositas adeò sæpè augetur, ut dentes & præsertim molares magna ex parte obtegantur, diciturque Dentium superincarnatio. Aliàs verò certis in gingiuarum locis circa dentium radicem caruncula emergit, quæ priuatim Epulis dicitur. Eiusmodi vna mihi in dentium sedis sine, excreuit, mollis, rubra, pendula, crassa, sed radice tenui nitens, quæ per vices increscens & decrescens, sic in hodiernam diem usque perseverat, nullum impedimentum alioquin adferens.

In oculorum regione, Caruncula quæ in

in o-
culi an-
gulo.

angulo est oculi naturaliter posita, vltcrius nonnunquam excrescit, atque instar tuberculi se exerit, quæ præter molestiam quam parit, etiam interdum prurit. Quod vitium Encanthis vti & ipsa caruncula dicitur.

Cutanei tumores non duri sic vocantur, quod cutem præcipuè occupent, eamque in tumorem mollem vel tensum attollant. Hi autem diuersis in corporis sedibus, vel peculiaribus solum, vt in pedibus, in scroto vel collo occurrunt, eaque loca distendunt. Alij verò cuticulam possident; Alij venas & arterias in cutem deductas.

Oedema.

Inter eos tumores qui diuersis in corporis sedibus accidere solent, præcipuè occurrit Oedema appellatum; quod nomen est tumorem quemuis denotet, tamen propriè huic accommodatur, qui collectus, mollis est, & tactui cedit, atque indolens & concolor vel albus existit, sæpeque admodum magnus euadit. Hic frequentius circa genua vel humerum, aliquando & aliis in locis nascitur.

Pedum.
Oedema
vssu tu-
mor, nō
nunquā
et brachio-
riorum
et manuum.

Est & aliud Oedema diffusum, nec ita circumscriptum, sed expansum, quod Tumorem oedematofum vocant, aliquando vniuersum pedem à genu ad malleolos vsque in immensum tumorem attollens, & duplo vel etiam triplo crassiorum quam esse debebat, reddens, in reliquis priorì oedemati simile. Qualem tumorem citra alium affectum multos diu, alios per totam vitam gestasse, sæpius vidimus, diuersum ab eo qui in hydrope ascite vel leucophlegmatia, non solum in pedibus sed & ventre vel reliquo corpore, de quo iam illic dictum fuit, prodit, cum ille in pedibus perseveret, nec vltcrius feratur, firmiorque nec admodum mollis, nec cui tam facile fouea imprimatur, existat: Eiusmodi crura Germ. Delschenckel i.e. crura oleaginosa, quod quasi vnta videantur, vocant. Sed & similitudine manus cum digitis, nonnunquam & brachia simul aliquotiesque intumuisse, tumidaque quàm diutissimè, aliàs etiam semper permanisse, sæpius obseruauimus. Quod & in aliis partibus hoc pacto accidere potest.

Phlegma-
tum.

Sunt & tumores aliqui ex illis qui diuersis in locis prodire possunt. In quibus curis

magistenfa est, minusque pressioni cedit, Phlegma fodes dicti à flatibus à quibus prodeunt. Vel si medium quid obtinent inter hos & oedemata, Oedemata flatulenta vocari possunt. Quo & Phlyctenæ flatulentæ referuntur.

Oedema
flatulen-
tum,
Phlycteo-
na flatu-
lente.
Pedum
intume-
scientia.

In pedibus solis Tumores diffusi seu intumescentiæ aliquæ se offerunt. Quarum vna tumoris Oedematofii instar diffusa pedes occupat, mollior tamen eo, & hydropicorum pedum intumescentiæ nonnihil similis. Quæ vel sponte à causâ interna procedit, vel in morbis aliquibus pedum, vt scabie peruersa, erysipelate oedematoso, simul se offert, & post eos quoque diu sæpè adhuc remanet. Aliàs verò ex aliis morbis conualescentibus ægris, post febres præsertim, demum superuenit, & maximè circa malleolum & pedem inferiorem, obiter saltem post incessum sub vesperam se manifestat, ægroque confirmato rursum à morbo euanesceat.

Vidimus & in nuda tibiæ sede similem tumorem, secundum ipsius longitudinem diffusum, nec vltcrius pertingentem, certo tempore, præcedente prius pruritu, leui calore & punctione, indolentem alioquin nec alio colore imbutum prodire, in quo non nisi per vim fouea impressa diu hærebat. Qui tumor vt subito se obtulit, ita mox quoque euauit; Per interualla tamen aliquot annis quendam molestit.

Pedum
intume-
scientia
in nuda
tibiæ
sede.

Scrotum tumores eiusmodi priuatim quoque occupare solent, præter eos qui in enterocoele & sarcocoele iam sunt expositi. Quorum vnus frequentior, quo scrotum admodum intumescit ponderosiusque fit, qualem in hydrope ascite scrotum quoque implere diximus, hic sine eo se offerens. Qui cum ab aqua scrotum replente quoque vt in hydrope prodeat, & tumorem in scroto, cuius tumores omnes Kéas vocari diximus, efficiat, Hydrocele appellatur, quem & Aquosum scroti tumorem seu illius Ascitem nominare possemus. Hic ab enterocoele, quod non cedat sed stabilis maneat; à sarcocoele quod non caro sed aqua illum efficiat, quod tactu facile explorare, & adhibito lumine scrotum illuminetur, cernere licet, potissimum distingu-

Hydro-
cele.

tur.

tur. Qui affectus vti adultis sic & infantibus sæpè accidit.

*Pneuma
tocele.*

Est & alius tumor, per quem scrotum vesicæ, alicuius instar inflatur & distenditur, adeò vt etiam translucere, præsertim lumine admoto videatur. Qui cum à flatu oriatur, & vti de priore dictū, tumorem in scroto faciat, Pneumatocele appellatur, quem & Ventosum scroti tumorem vel illius Tympanitem, cum tympani instar tensus sit & pulset, vocare possumus.

*Scroti
inflatio.*

Præter hunc alia quoque scroti occurrit intumescencia, in colicis plerunque doloribus sæuissimis se offerens, qui deorsum in inguina protensi, faciunt, vt vtrumque scrotum aliquousq; infletur, vti & in conatibus magnis diu continuatis hoc aliquando accidit: quæ inflatio crebrò quidem remeat sed mox iterum euanescit. De qua in colicis doloribus quò & pertinet, egimus.

*Inguinis
aquosus
tumor in
mulieribus.*

In Inguine mulierum, aliquando Tumor quidam aquosus colligitur, qui cum hydrocele in viris, causæ potissimum ratione aliquo pacto conuenit, atque vti hydrocele in scroto, sic hic tumor in inguine prominet.

*Hydro-
phalos.*

Circa vmbilicum aquosus tumor, cute illic in tumorem eleuatā, aliquando se offert, quem Hydromphalon vocant. Qui vt rariùs per se, ita potissimum in hydrope ascite aliquoties euenit, vmbilico vesicæ instar aquâ pleno & distento.

*Hydro-
cephalos.*

In capite aquosus quoque tumor in infantibus præcipuè exoritur, atque in ipsius summitate cutem illius crassam & pilosam admodum attollit, quem Hydrocephalon appellant.

*Palpe-
brarum
intume-
scentia.*

In palpebrarum externa sede intumescencia quædam, cedemati diffuso non æsimilis quandoque exurgit, per quam palpebræ inflatæ & tumidæ apparent, nonnunquam & circumferentia quæ eas ambit simul; tum in oculorum morbis tum extra hos, quæ diu sæpè permanet, aliàs mox remittit. Hanc Oedema oculorum aliqui vocarunt; quæ re-
stius Palpebrarū intumescencia dici posset.

*Broncho-
cele.
Gutturis
hernia.*

Collum tumore eximio quoque interdum occupatur, in anteriore illius sede seu gutturæ, amplo spacio extruberante, qui tensus est admodum, adeò vt cum pulsatur

sonum edat, & cum premitur sicuti vter inflatus cedit, sed mox iterum attollitur, quibus à struma facile secernitur, vti & eo quòd fixus est, nec uti illa mobilis. Hunc tumorem, quia in gutture nascitur, & asperæ arteriæ incumbit, ab illo vel hac, quibus ambobus bronchi nomen conuenit, & quia eandem cum cele seu herniā causam habere putant, Bronchocele seu Gutturis herniā vocat. Hæc autem præterquam quòd admodum deformat, vocem raucam efficit, & respirationis difficultatem, quæ aliquando adeò inualefcit, vt de suffocatione sit metus.

Cuticulam summam vesiculæ seu bullæ quædam lucidæ aquosæ aliquando possident, in diuersis corporis sedibus, maxime manibus & pedibus; Vti & aliquando in oculi globo, Phlyctenæ dictæ; quæ perse quidem insensiles sunt: tamen aliquæ ex illis disruptæ, maxime in locis tenerioribus sensibilibus, vel etiam integræ si acrem humorem contineant, dolorem mouent; De quibus in doloribus in Phlyctenis communibus & priuatis oculi egimus. Sunt & quàm plurimæ interdum & minimæ eiusmodi vesiculæ, Hydroa dictæ, in manibus aliisve in locis, scabiem præfagientes vel comitantes & inducentes, quas Germ. Syren vocant, pruritus admodum mouentes, quas proin continuè vnguibus vellere vel acu aperire solent, vt serosus humor exsudet; In oculi globo magnam quoq; vesicam ex succo fructus cucumeris asinini maturo disrupto casu exiliente in oculum, obortam lucidissimam & tenuissimam, sequenti die citra omnem offensam, rursus subsedisse atque euanuisse vidimus.

*Oculi
globi ve-
sica.*

Venas tumor occupat interdum eas quæ lac deferunt, in mamilla vna vel altera, qui eas vel omnino tumidas & distentes reddit, vel collectus alicubi & durus, partim millis insertus, partim exertus deprehenditur: cum dolore aliquo se aliàs offerens, aliàs & cum rubedine circumcirca, quæ inflammationem aliquando, dolore inualecente, conuertitur.

Sanguinem deferentes venas tumor etiam infestat, qui Varix, Cirfos, Germanis

*Varix
Circum-
scriptus.*

Arampffader dicitur, per quem vena distenta & dilatata, secundum ipsius ductum aliquousque tumet, & digiti amplitudine protuberat, liuet vel nigricat, atque conglomerata est, admodumque inæqualis, certis in locis tubera, ceu nodos promens; interdum & tensione quadam, venæ apertionem minans, nonnunquam & pruritu molestiam adferens. In pedibus plerunque, nunc vno nunc pluribus in locis se ostentans, vbi paulo vel etiam procul sub varice, vlcus aliquando se offert, quod quia à varice fouetur, Vlcus varicosum appellatur, & in vlcere descriptum fuit. Sed & sine hoc vlcere in pedibus varices prodeunt, quales, vti multis sic prægnantibus mulieribus consuetæ sunt, quæ & sponte post partum rursus secedunt, alias etiam sine noxa remanent.

Varicosum vlcus.

In aliis locis varices quoque exoriuntur, vti in scroto; vel extrinsecus, tuncque venæ quæ illud implicant, tument, intortæ sunt & nigricant; Vel intrinsecus, & tunc venæ internæ spermaticæ intumescunt & contorquentur, tactuque tumida; deprehenduntur, adeo vti is qui hunc affectum non nouerunt, vel sarcocolem vel tertium testem esse, vnde eos Triorches vocant, suspicionem præbeat; cui tumori vti & reliquis in scroto *νεύρα* nomen quoque imponentes, hunc Cirsocelen vocant. In pudendi mulieris alis varices etiam nasci prodit Aëtius; easque ad cirsocelen refert. In palpebris similiter euenire possunt, illisque in motu impedimentum aliquid adferre.

Cirsocelen.

Venulae nuda in cute.

Eit quoque vti in tenera cute, in albo corpore venæ turgidulae velliiores redditæ, in conspectum si dent, coloreque potius quam tumore deformant, citra aliud incommodum. Quod in coxis frequenter nec non aliis in locis euenire potest.

Aneurisma.

Arteris insidet tumor qui Aneurisma appellatur, dilatata admodum vel arteria, vel ipsius osculo, vti in causis dicitur: Tumorque est pulsus edens veluti arteria, sed magnus & molestus. Hic cum premitur ex parte refugit, sed mox iterum cum imperu erumpit, pugni interdum magnitudine, alias minor. In pedibus & manibus frequentius se offert, alias etiam circa iugulum & pectus,

teste Fernelio. In interioribus corporis quando euenit, cum alia producat symptomata, vt cordis palpitationem & pulsationem, quæ in cachexia sentitur, ibi tractatur.

Duri tumores qui tactui vix cedunt; sedibus præcipue discernuntur: Quod alij in glandulosis: alij in carnosiss: alij in excarnibus: alij in cute potissimum resideant, sicuti demonstrabitur.

In glandulosis sedibus, glandulae sub cute latentes; indurescentes, tumore extrinsecus in illis locis apparente, vel qui tactu, si non nihil lateant, illic inueniri potest, se proferunt. Qui tumores & Glandularum nomen seruant, atque vti glandulae, secus ac scirrhus in hanc illamve partem moueri possunt, sensimque crescunt & plus minusve augentur.

Glandulae.

Tales autem in variis locis, cum in diuersis glandulae sitæ sint, erumpere solent. Quæ in maioribus apparentiores sunt; prominentque amplius, in aliis minus. Et vel pluribus in locis simul vel certis duntaxat erumpunt.

In pluribus corporis sedibus Glandulae eiusmodi adauctæ indurataeque eodem fere tempore simul se produnt. Vt in colli submento ambitu, vbi plures longa interdum serie occurrunt, atque Chirades seu Scrophulae, quia scrophis seu porcis in hac sede frequenter quoque enascuntur, appellantur. Alias quoque non solum in hac colli sede, sed & post aures sub axillis in inguinibus, articularum flexuris, nec infrequenter etiam in pectore, & mulierum mammis, alibi que tumentes & duræ glandulae, visui vel si sub cute non nihil lateant, tactui se offerunt. Quas alibi etiam quam in collo existentes glandulas, Scrophulas similiter, vti eas quæ in collo erumpunt, communiter vocat, minus fortè rectè, cum scrophis si ab illis sic denominentur, in colli glandulis hoc vitium tantum eueniat, nec quod sciam in aliis locis, atque alia pustulae quæ in collo & carne porcorum inueniuntur, quas elephantiasim in illis denotare putant, & sunt vti illic ostensum est, vocant, non sint glandulae induratae sed pustulae de nouo natae; nisi fortè scrophulae quod plures simul nascantur, à multiplici partu

Scrophulae Chirades, Etsi uel les Gall.

por-

porcorum nomen sortitæ sint, hæ quoque quod maiori numero prodeant, sic appellari possint: aut quia plerumque cum tot vnâ erumpunt, in collo simul prodeunt, illicque magis apparent, ob eas totus ille affectus, quem Galli Les Escruelles vocât, Scrophularum nomen fortitur. Malum nonnunquam hæreditarium & quibusdam regionibus familiare, in plures incidens. In quo glandulæ vel induratæ scirrhi instar manet, tuncque Schirrhodes, vel exulceratæ in vlcus serpens abeunt, tuncque Nomodes, vel in carcinoma desinunt & Carcinodes nominantur, magnamque noxam & perniciem corpori sæpe adferunt.

Struma. In certis quandoque tantum locis glandulæ eiusmodi erumpunt, vt in colli sedi gutturi incumbēt, vbi vnâ simplex vel ex duabus tribusque nonnunquam vnâ instar complicata prominet, & in immensum sæpe excrescit, aliàs etiam pendula est aliquouque dependens, quas Strumas vocant, & Scrophularum nomē, cum in collo fiant, illis imponunt. Vti & priores, scrophulas, strumas, vel si paruæ sint strumulas appellat. Tamen cum has strumas à prioribus scrophulis diuersas esse, quod non tanto numero vt illæ emergant longèque maiores plerumque fiant, nec in porcis sic se habeant, deprehenderimus, eas ab illis distinguemus, vt has quidem Strumas, illas verò Scrophulas simus vocaturi. Quæ strumæ præter turpitudinem quam pariunt & impedimentum, si gutturi & iugulo profundè incumbant, raudinem vel etiam dyspnœam aliquam efficiunt: Hæ quoque certis regionibus, vbi plurimis accidunt, ad eodē consuetæ sunt, vt non indecoræ illic habeantur; Aliàs raræ nec ita frequentes. Ex illis vnâ aliquândo profundè latentem, nec conspicuam infantem suffocasse, non cognitâ causâ, donec per sectionem innotuisset, obseruauimus.

Sub axillis & in inguinibus glandulæ hoc pacto, vel solum induratæ, vel etiam in tumorem simul eleuatæ, deprehenduntur, & Bubones priuatiim appellantur, quod si in glandula post aures sita fiat, Parotis dicitur, atque vtraque Frigida vel indolens ad differentiationem illius bubonis & parotidis, quæ

cum calore & inflammatione oriuntur, de quibus in doloribus egimus: In illis enim concoloribus & indolentibus, nihil tale se offert, nisi quod interdum quoque in abscessum desinunt, è quo tandem, vt de abscessu frigido in carnosus locis nato, modò ostendimus, non pus, sed alia materia, vt illic explicatum, progreditur. Eius cuius generis parotide durâ in abscessum indeque in vlcus desinente, etiam calculos aliquot produsse, ipsi vidimus.

Ad eiusmodi glandulas induratas etiam *Testis durities vel scirrhus.* testes induratos referimus: qui interdum simul in magnum tumorem, adeoque sæpe immensum, vt scrotum sacci repleti & distenti instar dependeat, excrescunt, augenturque, huncque affectum Scirrhum testium, ob duritiem quâ scirrhus similis, vocât: quem nos ad glandulosos potius tumores referimus: vt & glandulas aliàs induratas scirrhhodes appellari diximus.

In carnosus locis hinc inde in corpore occurrit durus tumor renitens, firmus ad eodē, vt loco moueri nequeat, circumscriptus, & plus minusve amplius & è corpore prodies, aut in eo profundius hærens, concolor & indolens, Scirrhus nominatus, qui nunc in fieri est, tuncque Incipiens dicitur, aliàs in facto, & Confirmatus appellatur. Hic inflammationes plerumque sequitur, & post eas relinquitur: Aliàs per se incipit sensimque nascitur & augetur. Hunc in cancrum commutari posse aliqui putarunt. Verum nos illos qui hoc asserunt, fortè quod cancrum incipientem vel nondum exulceratum pro scirrhus, cui duritie & formâ nonnihil responder acceperint, & cum exulceratur scirrhus hoc accidisse putarint, sic deceptos fuisse, suspicamur.

In Ventris regione duos collectos tumores hinc inde per abdomen disseminatos aliquando obseruauimus, ad eodē sæpe, si plures præsertim concurrant, ventrem attollentes, vt hydropicos, vel si mulieribus hoc contingat, grauidas esse, vulgus suspicetur: à qua intumescencia facile huius tumoris ventris inæqualis durities eum discernit, tandemque nihil horum esse, diuturnius perseverantia patefacit: cum ad finem vitæ ventrem

eiusmodi induratum aliquas gestasse, obferuauimus, etiam sine magno aliquo partium naturalium incommodo. Quos tumores ad scirrhus quoque, nisi glandulae etiam sint induratae illius loci, vel omenti, huc usque etiam prominentes, referimus.

Præter quos tumores, alij in abdomine quoque se patefaciunt, qui à subiectorum viscerum extuberantiis & tumoribus in sede hac, quæ illis cedere potest, diuersis illius in locis protuberantibus, prodeunt.

*Hepatis
& Lienis
scirrhi vel
durities,
promi-
nentiam
in hypo-
chondriis
efficien-
tia.*

In hypochondrio nunc dextro nunc sinistro prominentia quædam potius quam tumor collectus occurrit costarum spuriarum; in scirrho vel alio duro tumore hepatis & lienis, costam extrorsum propellente. In media verò cordis dicta sede nudâ, ubi costæ ab inuicem dehiscunt, etiam tumores enarrati, si in hepate sint, cum illud à dextro latere eousque pertingat, se proferunt & prominent, vel saltem tangi possunt: Aliter enim eos explorare visu vel tactu minimè possumus, nec nisi ex aliis affectibus comitibus, in quorum descriptione horum quoque tumorum meminimus, eos cognoscere. Qui affectus sunt tensio & dolor grauis in hypochondriis, dolor cordis compressius dictus, icterus, cachexia, hydrops, cuius causâ si venter vniuersus distentus sit, hæc rectè ampliùs distingui nequeunt.

Vteri durities vel scirrhus tumor in ima ventris sede patiens.

In ventris ima sede sub umbilico, tumor durus nonnunquam se quoque manifestat, ab vteri fundi duritie vel scirrho eousque se exerente prodiens: cuius & in vteri inflammatione, à qua facile suboritur, mentionem fecimus.

Quæ in abdomine aliæ se offerunt extuberantiæ, dolorem adferentes, in doloribus expositæ fuerunt. Qualis illa est quæ in media supra umbilicum inter costas nuda sede se offert, ex ventriculi inflatione nata. Aliæque in aliis ventris sedibus, ex intestinorum distentionibus, inter quas admodum extuberat, in sinistro iuxta umbilicum latera illa coli distentio, quæ circa anfractum magnum illius fit; Sicuti hæc in colicis & ventriculi doloribus simul inde natis, quod & pertinent, sunt exposita.

Alius quoque tumor in aliquibus corpo-

ris carnosus sedibus, vti scirrhus enasci interdum solet, non adeò tamen ut ille induratus, & qui inueteratus in Abscessum definit, non illum qui dolorem parit, & inflammationes sequitur, sed qui indolens atque diuturnus & apertus, non pus sed aliam aliquam materiam profundit. Quæ si sæuim referat, abscessus ille Steatoma, si pultem, Atheroma, si mel Meliceris priuatim appellatur. Occurrunt insuper & alij, è quibus exit materia, alium humorem

*Steatoma.
Atheroma.
Meliceris.*

ut grumum, vel partem aliquam, ut glandulam, vnguem, os, pilum, vel etiam alia extra corpus posita, ut lutum, tophum, calculus, carbonem, cortices fructuum, ligniamenta repræsentans, quæ ideò magicis artibus eò deuenisse vulgus opinatur: qui abscessus nullis peculiaribus insigniti sunt nominibus. Hi autem abscessus ex tumoribus enarratis geniti, cuiuscunque generis, ut passim occurrere possunt, sic & sub lingua aliquando deprehensi fuerunt, tumorem illum quem Ranam vocant, nonnihil exprimentes, sed indolentem, è quo in abscessum conuerso, uti & alio qui cum inflammatione fit, de quo in oris partium dolore egimus, calculus aliquando prodiit. In capitis pilosa cute, frequentius eiusmodi tumores emergere solent, illi præsertim qui mollem aliquam profundunt materiam: sicuti in reliquis animantibus, cum vndique pilosa cute obtegantur, similes etiam aliis in locis generantur. Qui abscessus in capite geniti, ob diuersam formam, Testudinis vel Talpæ aliquando nomen sortiuntur.

Rana sub lingua citra inflammationem.

Testudo & Talpæ tumores in capite.

In excarnibus locis in habitu corporis extrinsecus tumores variis in locis inueniuntur, tum in articulorum sedibus, tum extra articulos, illic ubi ossa cute tantum inuestita sunt, vel vngues è cute emergentes patent. In articulorum regionibus illic ubi tendinum, ligamentorum, nervorumque est concursus, circa genu & cubiti aliosque interdum articulos, tumor enascitur Ganglion dictus. Qui tumor sensim hisce partibus accrescens, & circumscriptus, nunc inæqualis, aliàs angustiore termino, aliàs latiore, vniuersum interdum articulum comprehendens, non adeò durus,

Ganglion.

189

durus, sed tamen renitens est; nec planè sine sensu, sed qui fortiter pressus, molestiam aliquam pariat, nec aded fixus quin aliquousque pelli possit, motum articuli liberum impediens, nonnunquam & aded articulum sistens, vt membrum omnino vel aliquousque astrictum, munus suum illic vel planè non, vel non integrè possit perficere: Et si in genu hoc fiat, vbi frequentius nunc in illius lateribus, nunc poplite nunc vtrinque ganglion nascitur, totumque ferè aliquando articulum includit, tunc quò minùs æger stare aut rectè incedere possit, efficit, & vt pes adstrictus sursum, non possit in incessu terram vel nullo modo, vel saltem digitorum pedis eminentiis attingere, vnde vel ambulare sine Scipionis adminiculo nequeunt, vel saltem claudicare coguntur, in causa exiit.

*Nodi in-
sta arti-
culos po-
dagra-
tum.* Sunt & alij tumores articuloꝝ loca possidentes, Nodi appellati; Qui digitorum internodiis in podagra & chiragra Nodosa ob id dicta, longo temporis spacio innascuntur. Quorum alij duri & tephacei, alij verò molles adhuc deprehenduntur, qui & aliquando vterius feruntur, alijsve in locis prodeunt, sicuti in Arthritide hæc vberius exposita sunt, vti & quo pacto dolorem interdum adferant, motumque articuli sistant.

*Nodi in
ossibus
callosi;
Vberis
sein.* In ossibus sedibus tumores durissimi occurrunt, qui firmiter subiectis ossibus insistant, nec ab illis loco moueri possunt, quasi nouum os priori accreuisset, vnde eos Nodos ac si internodiū aliud accessisset, Germ. *Vberlein* i.e. os supra os vocant, cum duritie interdum ossibus non cedant. Quales circa frontem & tempora, tibiarumque longitudinem, in nudis illis regionibus nascuntur: Alias etiam in Carpo & Pedio alijsve similibus in locis. Hi indolentes etsi sint, si tamen vicinas partes premant, molestiam & dolorem interdum pariunt; si articulos occupent, motui ipsorum obsunt. Suntque eiusmodi nodi alias per se incipientes; alias morbi aliquis comites: sicuti Luis venereæ, & Cephalæ cuiusdam, in quibus affectibus cum ossium dicto dolore, nodi eiusmodi erumpunt, non multum alicui a prioribus dissimiles, de quibus in illis affectibus egimus.

Ad eiusmodi nodos & Callus referri potest, si in ossium fracturis denud conglutina-
*Callus
ossum.* tis generis, in nudis illis sedibus, extra ossiū superficiem extuberet & foris promineat, qui si ad articulos vsque se extendat, motui ipsorum simul incommodat.

In vnguibus extuberantia veluti callosa
*Vnguiū
extube-
rantia
callosa.* quædam etiam nonnunquam occurrit, per quam non solum vngues crassescunt, eo modo sicuti in magnitudine adaucta dictū fuit, sed & inæqualiter aded sæpè extuberant, vt vngulas potius, sicuti in puella quadam accidisse vidi, quam vngues referant.

In cute tumores duri quoque occurrunt, Cutanei ob id dicti, variis in locis. Quorum primum genus est, cutis tantum crassior facta & indurata, Callusque & Tilloma appellatur; amplum interdum, alias angustum spaciū comprehendens, & nunc leuiter saltem prominens & sparsus, alias amplius, eleuatus & circumscriptus, tenebricosiorque, reliqua cute, cum spissior sit, quæ de causâ, & cutis eo in loco, vt partes contactum rerum minùs sentiant, efficit, cum per se vti & cuticula ex qua componitur, sit indolens. Hic in vola manuum & plantarum pedum circumferentia, digitorumque internâ sede in manibus & pedibus frequentius occurrit.

Est & alius callus instar cutis cuti impactus; Cicatrix
Cicatrix quem cicatricem vocant quæ insensilis, reliquaque cute albidior, solidiorque, sine poris & pilis, nunc exiguum alias amplius spaciū comprehendens, è verâ cute se interdum exerens, alias verò minimè, & solum albæ maculæ instar conspicua, alias verò cuti profundius insidens. Cuiusmodi cicatrices in variis corporis locis cutaneis, ex vulnere vel vlcere sanato, relictæ inueniuntur.

Huc & refertur inæqualitas illa faciei, quæ
*Variolæ
rum fo-
ueæ in
facie re-
licta.* foueas multis veluti alueolis in facie impressis, ob cicatrices altius immerfas, nec dum cuti æquales, exsurgit, post Variolas relictæ. Quæ cicatrices etsi minimè extuberent, & proin ad extuberantiam non pertineant, vti & aliæ cuti æquales, tamen rectius hæc vnâ cum cæteris describuntur.

Sicuti & fouea illa Umbilici, post oculi
*Umbilici
fouea
funda.* sionem illius ab ortu relicta, si illa ob callum
quo

quo coaluit, nimis profundè latentem profunda nimis, existat.

Vmbilici emsuentia. Vti & extuberantia nimia vmbilici, non illa, quæ in omphacele vel hydrocele se offert, sed quam callus ille nimium excrescens, ut in causis dicitur, parit.

Verruca. Verius tumorem exprimit, tuberculum paruum Verruca vocata, quæ pisi vel ciceris instar è cute prominere & circumscribitur, dura insensibilis & circa radicem, quæ cuti veluti pediculo innititur, angustior. Et si magis propendeat, Verruca pensilis vocatur, siue Acrochordon, fortè quòd tunc chorda ligari possit potius quàm quòd, uti volunt, chordæ instar dependeat. Hanc si non sit concolor sed colore thymum referat, minorque & magis inæqualis, Thymium vocant. Erumpunt autem eiusmodi verrucæ in diuersis locis, frequentius tamen in manibus & pedibus, & plerumque plures simul, inuicem distinctæ, nonnunquam & copulatæ. Quæ præterquam quòd turpes sint, eoque magis si in facie prodeant, ubi ciceris formâ adnatam verrucam Ciceroni nomen dedisse scribunt, molestiam etiam quandoque & impedimentum adferunt.

Thymii verruca species. Minus iam dictis, è cute se exerit Verruca fessilis appellata, cum sit stabilis, nec ut alia mobilis, lupini formam exprimens, radicemque latâ cuti firmiter in hærens, in reliquis ut prior se habens, nisi quòd cum vehementius impellitur, punctiois molestum sensum in super inferat. In hac quandoque pilus vnus vel alter infixus, in facie præsertim, apparent.

Verruca fessilis. Eiusdem generis etiam, & verrucæ fessili similis est in pedum plantis prodiens, Clauus dictus, tum quia clauicæ capitis formam rotundam refert, tum quia dolorem, ac si clauo pungerentur, punctiorum, cum incessu premitur, adfert. Valde molestus proin, & qui incessui plurimum incommodat. Hic quia in ambitus illius cutis concoloris medio seu centro fuscâ aut nigram notam habet, pupillæ oculi instar, & ob id oculo paruo totus assimilatur, à Germanis Egerfenaug, quasi Picæ oculus nominatur.

Clauus. Præter hæc tubercula, sunt & alia caput

Vari. testis.

potissimum infestantia, quæ Vari seu Ionthi appellantur. Suntque pustulæ duræ nonnunquam & callosæ, aliàs humorem aliquem exsudantes, faciem occupantes; interdum & capillosam illius, vel barbatam in mento sedem, tuncque Psyrdracia nominantur.

Psyrdracia.

Interdum alia tubercula dura, priuatim in palpebris gignuntur, verrucarum instar, quorum vnum è palpebræ margine inter cilia prodit, quòd Hordeolum vocant, Germani ad verrucam alludentes, Werren appellant, durum, figurâ hordei, vnde nomen, insensibile, aliàs verò pruritu molestum, rubens. Alterum palpebræ superiori adnascitur, durum, quòd Grando vocatur.

Hordeolum in palpebris Werren.

Qui cedit ab itque rursusque remeatur tumor, & vel Cele in genere vocatur, licet hoc nomen aliis quoque tumoribus accomodetur, à causa verò, uti dicitur, Ruptura, Hernia, Ramex appellatur, & qui hoc affectu laborant, Rupti & Herniosi vocantur. Qualis tumor in inguine tam marium quàm fœminarum quandoque prodit. Qui interdum, ab initio paruus est, mox altior & amplior fit, concolor, nunc mollis, nunc duritiem inæqualem obtinens, pressus retrocedit, moxque iterum redit, magisque conatu ex spiritus retentione propellitur: Hic Epiplocele cum ab omento fiat, & Bubonocèle cum bubonem referat, aliis Bubo herniosus, vel Hernia inguinalis, quòd illic appareat, dicitur.

Grando in palpebris.

Hernia. Ramex. Ruptura.

Hernia inguinalis.

Epiplocele. Bubonocèle.

Aliàs verò Enterocèle tumor hic, si ab intestinis prodeat, appellatur. In qua ramen specie frequentius tumor ille in inguine minimè subsistit, sed inde in scrotum seu saccum testium in masculis descendens, prout saccum ex parte vel totum implet, tumorem maiorem minoremve gignit, cute alioquin in colore non immutatâ, sed cum rugosa aliàs sit, tunc tensâ existente. Hic tumor si prematur aut corpus resupinetur, euanesceat, rursusque his cessantibus, redit, citiusque si ex spiritus retentione conatus eum impellat.

Enterocèle.

In mulieribus quoque eiusmodi tumor Enterocèle inguine aliquando suboritur, qui & interdum ex inguine, uti in viris in

in scrotum, sic hic deorsum sub cutem ex-
porrectus, eam in immensum sæpè tumorem
elevator, & sicuti in viris, rursus remeat ite-
rumque redit.

*Hernia
abdomi-
ni.
Ompha-
locele.*

In Ventris seu abdominis aliis sedibus,
tumores hifce similes etiam prodeunt, ma-
ximèque in umbilici regione, tuncque Om-
phalocele dicitur; In qua umbilicus aliàs le-
uiter, saltem, nucis instar, aliàs magis adhuc,
pomi magnitudine se exerit, atque Umbilici
exitus eminentia & prominentia appella-
tur: aliquando verò ex ipsius sede tumor ma-
gnus emergit, & facci alicuius instar pro-
pendet. Interdum & in ambitu umbilici,
eiusmodi tumores minores maioresve er-
rumpunt, qui *κῆλος*, seu Herniæ generale
nomen feruat. Retrocedunt hi omnes quo-
que pressione & decubitu tumores, quod al-
iàs ægre fit, sed iterum nisi caueatur, vt de
prioribus dictum, remeant.

In enarratis tumoribus seu herniis dolor
aliàs nullus, nec alia quam ex tumore exsur-
git molestia seu impedimentum, aliàs verò
maximè circa initia, in inguine, præsertim
cum ab eo loco in scrotum descendit tumor,
dolor lancinans & veluti lacerans, & pun-
ctorius plus minusve diuexat. Constipatio
alui hosce frequenter molestat, aluiusque in-
terdum penitus supprimitur, si tumor per-
maneant nec abeat; quod quando protrahi-
tur diutius, facces alui euomunt; vt de hoc
affectu quem Conuulsiuum vocant, in Vo-
mitionibus dictum fuit.

Ad tumores qui erumpunt rursusque
refugiunt, referre possemus eos, qui in spas-
mo flatulento, in furis aliisve carnosus locis,
cum dolore summo eminet, rursusque mox
subsident: de quibus in Conuulsione & do-
lore Habitus corporis egimus.

Causa.

OMnium extuberantiarum, siue genera-
liorum intumescuntiarum, siue tumo-
rum particularium causæ proximæ depen-
dent vel ab humoribus, vt semine, vel lacte,
vel sanguine, aut sero; Vel à flatu, illisque
nunc simplicibus vel aliis quoque humori-
bus permixtis; Vel quorundam tumorum
causæ, à parte aliqua corporis loco mora pro-

fiscitur, sicuti nunc in singulis hifce de-
clarabitur.

Semen sicuti deformationibus & disco-
lorationibus quibusdam ab ortu proceden-
tibus occasionem præbet (vti in deforma-
tionum causis demonstratum fuit) ita & tu-
mores diuersi aliqui, ab eo originem tra-
hunt & hæreditarij sunt. Veluti Sarcoma-
ta aliqua, nonnunquam & alia Tubercu-
la mollia durave, & inprimis ex glandulis
induratis in collo natæ Strumæ seu Scro-
phulæ; vnde potius has à parentibus in li-
beros propagari certis in regionibus, quam
cibi vel potus alicuius peculiaris causâ eue-
nire censendum est. Glandulas quoque illas
complures, per corpus disseminatas perni-
ciosas in vlcera cancrofa desinentes, à paren-
tum semine frequenter proficisci, vel hoc de-
monstrat, quod in certis regionibus, vbi hoc
malum vrget, matrimonia nunquā ferè con-
trahantur, nisi prius probè constet, neutram
partem huic vitio obnoxiam fuisse. Sed &
vti aliorum tuberculorum etiam minorum
originalium, causa similiter à parentibus pro-
dire potest, sic & Verrucarū & similium tu-
berculorum, sicuti ciceris formā, vnum in
naso Ciceronem ab ortu gestasse, illiusque
causâ nomen hoc illi indicum fuisse scribi-
tur. Quæ extuberantiæ diuersæ originales
à seminis parentum dispositione ad ea vitia,
quibus illi fuerunt infecti, quoque procedunt.
Quemadmodum & deformationes à semi-
ne progressas, similiter illic ratione & modo
fieri, antè vberius exposuimus.

A conceptu in vtero semine, vti si perfe-
ctum est, foetus ex eo generatur, & venter
naturaliter in grauidis intumescit, sic si im-
perfectum existat, & ex eo mola vel aliud
quid præter foetum gignatur, illudque augea-
tur, ventris tumor similiter, sed præternatu-
ralis procedit. Qui defectus in semine cum
explicatu sit difficilis, tamen si caro ex eo,
quæ nonnunquam vasis implicata est, atque
inuolucris tecta, aut aliud membranci quid
generetur, ab imperfectione potius quadā
seminis viri vel mulieris, quam omnimoda
vitiositate, vnde nihil generaretur, proce-
dere necesse est, nisi vteri matris intempera-
tura, quæ minus absolutum quid gignatur.

*Semen
parentū,
causa
Sarcoma-
tum, Tu-
berculu-
rū, Stru-
marum,
Scrophu-
larū, Ver-
rucarū,
hæredi-
tariarū.*

*Semē im-
perfectū,
causa
Ventrū
tumoris
in Mola.*

simul impediatur. Alioquin cum & vena umbilicalis una quoque nascatur, fit ut & hæc informis massa augeatur, materque ad illius enutritionem sanguinem retinens, eum menstruatur non amplius ac si foetus gestaret, profundat, veraque tandem sanguinem allicientia, in lac interdum conuertant.

Aliis de causis molam gigni, à semine solo mulieris, vel à sanguine menstruo, aut eo quo uterus alitur, haud verisimile, cum citra commisionem seminum viri & mulieris nihil nasci queat, neque à sanguine menstruo, cum licet alimoniam molæ uti & foetui præbeat, nihil tamen in illis procreet; Atque ille quo uterus nutritur sanguis seu succus, si luxurians aliquid producit, sarcoma potius, quod utero inpatum est, quam molam ab eo liberam, & venis duntaxat adhaerentem, procreabit, sicuti in aliis locis eodem modo fieri, in sarcomatis causis ostendimus.

A flatu seu vento Molam non prodire, quam ventosam seu flatulentam vocant, inde liquet, quod si ille utero inclusus hereret. Inflatione potius illius, quam molam cum qua hæc nihil habet, quia tunc nihil noui procreatur, simile progigneret: Cæterum nec sic utrum inflari posse, in uteri doloribus ab illius distentione progressis, demonstrauimus.

Succus nutritiens corporis partes, causa Ex tubercularum, & Tumorum quorumdam specierum. Succus nutritiens singulis corporis partibus nutriendis idoneus, ex sanguine qui illis distribuitur, & apponitur assimilaturque genitus, sicuti si moderatus & laudatus est, partium substantiam alendo, eam in sua mediocritate conseruat, ita si quantitate vel qualitate peccet, pro horum ratione nunc generalem aliquam extumescentiam, nunc particulares tumores aliquos producit. Quod duplici nomine potissimum molitur, Vel gignendo aliam veluti in partibus substantiam, vel eam saltem adaugendo.

Gignendo veluti nouam & superfluum in partibus substantiam, quæ illis vel innascitur vel adnascitur vel adhaerescit, tumores diuersos succus ille qui partes nutrit, producit. Idque quia vel luxuriat seu redundat, & quantitate potius quam qualitate peccat, tunc enim præterquam quod partium

substantiam, quarum est nutrimentum, conseruat, superfluum quoque simul in iis gignit, parti quam alit nonnihil similem, & pro illius ratione nunc mollem nunc duram, vel etiam crassiore, tumoresque ob id duriores, si crassior quam parti conueniebat, existat; parti quam alit nonnihil similem, & pro illius constitutione molliorem duriorumve; Vel etiam quia crassior quam parti nutriendæ conueniebat portio illius existens, duriores in illis tumores procreat. Quod quæ ratione in diuersis partibus quas nutrit, præstet, in singulis nunc explicabitur.

In carnosissimis partibus succus nutritiens seu nutrimentum, carnosos tumores hinc inde in corpore foris intusque prominentes, atque inter se differentes producit; Idque potissimum vel ob copiam, quando exudat vel alioquin abundat, vel ob crassitatem illius; sicuti nunc patebit.

Exudans è carne succus, ob cutis tunicarumque, quibus obuoluitur, quibusque succus coërcetur, & venarum succum hunc deferentium oscula obliterantur, defectum, accidit, ut si succus carni accrescat, nouamque; veluti carnem illi adhaerentem, & ab ea protuberantem gignat, varia Sarcomata producantur. Veluti in vlcere carne impletis, nec dum in cicatrice obductis, succo ex ea expululante; Excrecentia illa carnis, qualem in Vlcere excrecente descripsimus, gignitur. Vel si tunica narium in illarum erosionibus, vlcerebus, alijsve læsionibus ablata sit, eodem modo Polypum, & si gingiua hoc pacto afficiantur, Epulidem producit. Intrinsecus quoque tunicis carnosarum partium diuulsis, succo extra ipsas se diffundente, sarcomata gigni possunt: Sicuti ex contusione, per quam tantum illæ diuelluntur, osculaque venarum nonnihil patefunt, necdum grauior læsio fit aut suppuratio vel exulceratio sequitur, sensim quandoque carnositates eiusmodi excrecentur relinquunturque. Atque ex contusione vasorum spermaticorum in scroto, succo è vasis illis quoque luxuriante, Sarcocoele interdum oritur.

Abundantia huius succi, si accedat enarrata causa, eodem citius huiusmodi sarcomata prodibunt. Cui vel plerumque occasionem dat,

Succus nutritiens è carne exsudans, causa sarcomatosis diuersarum, uti & carnis luxuriantis, Polypus, Epulidis, Gingivæ, variæ carnis luxuriantis, Encanthidis, Sarcocoeles.

197

dat, vel sanguinis ad partem aliquam sæpè repetita attractio, à variis causis promota; Inter quas & impetus alij in partē aliquam citra læsionem facti, succum hunc in partem allicientes, hoc possunt efficere. Quibus cū & sessione incōmoda vel equitando testes ipsiq; adnata vasa sæpè valideq; impelluntur, licet nulla adhuc, vti dictū, fiat alia læsio, sanguine ob id cōtinuè ed attracto, sarcocoele interdum nascitur; Vti & si ob immoderatā venerem, vasis hīce dilatatis ea ratione sanguinis ed quoque fiat influxus; Quod vt in hac aliāve sede fiat, partiū dispositio apta ad recipiendū, cuiusmodi & laxitas illius existit, plurimū adiuuat. Cuius causā & gingivæ sæpè adeo excrefcūt, & caruncula in laxa oculi anguli carne augetur, præsertim si vis illa quam gingivæ masticando, oculus frictione multā ob pruritum factā patiuntur, insuper accedat.

Succus nutritiens crassior, causa Scirrhi, Athero matū, & Steatomatum, Meliceridum.

Crassior succus, quā carni nutriendæ conueniebat, Tumores duriores quā sarcomata existunt, interdum progignit; eosq; simplices, vel si alius humor illi iungatur, cū illo compositos, qualis est Scirrhus appellatus, à succo admodū crasso natus, duritiemq; hanc acquirens, & de die in diem magis indurefcens, firmusq; permanēs: Vnde etiam plures illi scirrhi si modo non sunt glandulæ scirrhosæ, ab illorum causa genitæ, in abdomine prodeunt. Dein & tumor alius durus, qui non adeo confirmatus est, quin tandem in Abscessum desinere possit, in quo diuersa materia, pro succi huius qui tumore hunc genuit diuersitate, & mistione cum aliis humoribus generatur, non tamen vti alij abscessus, à sanguine geniti, suppuratur, aut in pus conuertitur, sed (vti in abscessus descriptione ostensum) in solidam quandam substantiam carni innatā transmutatur, vel in humorem quendam, propriā inclusum vesiculā maturatione abit.

Hæc autem succi huius nutrientis crassa portio, tumores hosce producēs, ab illius incrassatione, vel prius in sanguine, vel hoc succo facta procedere potest. Idque vti variis de causis, ita & ab inflammatione scirrhus hoc pacto gigni, non ea ratione vti putatur, quod sanguis non discussus aut suppuratus sic in-

duretur, vel frigidorum nimia applicatione condēsetur, cum tunc potius putresceret & corrumperetur, sed quod à calore vehementiore inflammationis, sanguine discussio, succus partis illius quæ inflammata erat, incrassatus, induratusq; scirrhum procreet. Præter quā causam, quod succus ille crassior quā decebat, parti oblatus eiusmodi tumores duos producat, fortè non minima illa erit, si nutrimenti alterius partis, quæ crasso admodum succo ali debuit, portio ab ea abscedēs, in carnosas sedes cum illarum nutrimento delata, talem duritiem in illis gignat. Quod & inde comprobari potest, quod in eiusmodi abscessibus ex illis tumoribus genitis, aliquid aliarum partium substantiæ simile inueniatur, nunc pilum, nunc vnguem, nunc os, nunc glandulam referens, quæ vix dum aliis, quā ex succo hæce partes illic in cute vel carne vicina, nutriente, huc cum proprio carnis nutrimento delato, nasci potuissent; vti & si sæuum referat, pinguiorem sanguinis partem, quæ pinguedinem efficit, huc quoq; peruenisse, ex eoq; sic concreuisse, verisimile videtur: Vel si pultem aut mel exprimat, succum carneum, non in pus tale quale in calidis tumoribus per suppurationem nascitur, sed eiusmodi humorē magis tenacem, maturatione vi caloris excoctum fuisse; qui si vltius torreatur, succusq; ille magis terreus sit, aliud quid vt carbonēs, vel calculos similiaq; referet. Hæc si propriā inclusa sint membranā, & illa quoq; à membranoso succo, similiter vti de cæteris partibus dictum, huc perueniente nascetur. Quæ vti in tumore in abscessum degenerante ita fieri possunt; sic & alterius crassioris durioris partis succus carni insertus, Scirrhu hoc pacto quoq; producere poterit. Qui si in cancrum, vti putarunt, desineret, aliquid de veneno illo, è quo cancrum gigni docuimus, huic succo scirrhum gignenti, permistum esse oporteret. Quæ vti probabilia, potius in generatione horum duorum tumorum proponere maluimus, quā pituitam aut melancholiam horum causam, vti plerique statuere; cum si ex eiusmodi excrementis similis tale quid nasceretur, non tam stabile, sed putredini & corruptioni obnoxium esset.

sicuti etiam in aliis tumoribus, quos ab iisdem humoribus proficisci existimarunt, ostendimus.

Succus nutrens crassior, causa Durities & Scirrhi, Hepatis, Lienis & Vteri. Verum & interni tumores duri in parenchymate hepatis & lienis nati, uti & scirrhi, qui tumorem extrinsecus in hypochondriis apparentem, vel tactui expositum proferunt, uti & qui circa vteri regionem à fundi vteri scirrhi prodeunt, eodem modo, sicuti de externis dictum, ab inflatione præcedente, vel consimili succo crasso, gigni possunt, quem admodum quo pacto hoc fiat, in hydropis ascirris, cachexiæ & icteri causa, à tumoribus hisce & scirrhi procedente, exposuimus, & in vteri inflammatione similiter illius scirrhi meminimus, qui aliquando admodum quoque increfcit, & augetur, licet vterus alioquin exiguus sit, qui tamen uti cum foetum continet, admodum excrescit. Sic & hic in molem augeri potest.

Succus nutrens crassior, causa Parotidis & Bubonis, tum indolentis & Strumarum Scrophularumq. In Glandulis succus eas nutrens, vel simplex, ob sui copiam, vel crassitiem, aut aliis etiam humoribus permixtus, durities & tumores, inter quos aliqui etià in abscessum materiam aliquam in se continentem alienam, desinunt, vel alioquin vlcérantur, procreat: Veluti Parotides & Bubones induratos, vel in tumore frigidum dictum conuersos & Strumas in collo, quæ frequentius induratae manent, & Scrophulas illas in pluribus locis nunc in scirrhum, nunc vlcus peruersum abire solitas, quas scrophulas vocamus.

Huius autem succi redundantiæ & crassitiei causa eadem, quæ & scirrhi & tumoris alterius duri esse potest, qui cum hic alioquin in glandulis ad earum nutritionem crassior, quam in aliis carnosus locis esse debuerit, eò facilius vterius in crassatus, eas vel indurat aut saltem tumidas reddit, vel si aliunde quoque ab aliis partibus accersatur, sic in illis duritiem vel tumorem, in quo materia generatur, illis partibus non nihil similis, procreat, quæ materia si tunica quoque inuoluta & conclusa sit, nisi hæc ipsa glandularum sit tunica, ex simili quoque succo, uti illic dictum, nascetur. Cui succo etiam pituitam aliosve humores permisceri interdum, minime negamus, sed solam pituitam aut me-

lancholiam has glandulas gignere, supradictis rationibus nixi, affirmare minime possumus. Sed si à pituita defluente à capite, vel influxu sanguinis infestentur, eas quidem intumescere, minime tamen hoc pacto indurari: Et si illa succo huic permisceatur, tumori, ut citius in abscessum vergat, occasionem præbere, asserimus. Sed & si serum cum eiusmodi crassiore succo permisceatur, dum ille condensatur, & feri terrestreitas exiccatur, calculos gignere posse, uti in podagricorum nodis idem fieri docuimus, ex calculis, quos in parotidibus nos inuenisse diximus, colligere licet. Quod si quoque alius humor prauus accedat, deteriores & quæ facile exulcerantur, glandulæ inde prodibunt. Quales illæ ferè sunt scrophulæ, quæ pluribus in corporis locis similiter erumpunt. In quibus, si humor exedens sit, in vlcera non modea, si aliàs malignus, cacoëtha, si vero veneni illius, quale cancrum gignere diximus, adsit portio, in cancrofa conuertentur. Quorum prauorum humorum origo, in corpore ab eadem causa, quæ & alia eiusmodi peruersa vlcera efficit, in illisque fuit exposita, dependet. Cuiusmodi est, quæ efficit, quod strumosi in collo aliqui populi fiant, quam in primis aquæ niuium, ab Alpigenis bibi solitæ, adscribunt. Quod tamen, cum in aliquibus solum locis, regionis illius, ubi hæc aqua in usu est, accidat, ut in Valesiæ nostræ inferioribus tantum ferè illius vallis partibus, non videtur verisimile. Sed quod & eiusmodi colli strumæ, & scrophulæ illæ plures simul corpora inuadentes, populares sint in quibusdam regionibus, illud potius dispositioni cuidam, naturali istorum hominum ad eas suscipiendum aptæ, attribuendum. Quæ quoniam hæreditaria, & à parentum semine continua generis successione propagata, glandulisque innata est, quod in certis locis hi affectus adeo vulgares sint & regnent, efficit, quæ in huius rei causam statuere, quam aquam ante aliam, minus mihi videtur à ratione alienum. Sicuti & in seminis causa explicanda, quomodo fiat, demonstratum fuit.

In excarni articulorum sede succus crassior, tendines, nervos, membra, ligamentaque.

Succus nutrens crassior, causa Scrophularumq.

201

des nu-
trien, cau-
sa Gan-
glis:

taque illius loci nutriendus, luxurians, tumorem durum eo in loco Ganglion dictum, gignit. Quando quoque ab iis partibus, alicubi ob laborem, ut de cuticula dictum, attritis vel attenuatis, exudans illisque se adglutinandus, similem iis in duritie substantiam producit; idque in hisce articularum sedibus potissimum, cum hi per motum nimium vel diuturnum, magis exerceantur, unde & in poplite propter genu articulum, qui validissimos in motu impetus sustinet, frequentius ganglion enascitur. Quod & præter hasce causas, ab aliis in locis illis factis læsionibus, ut vulneribus, dum sanantur, luxuriante harum partium succo prodire potest. A pituita verò excrementitia uti statuunt, eiusmodi nerveam solidam stabilemque substantiam minimè gigni, iisdem argumentis, quibus nec callos nec nodos cæteraque similia corpora ab ea nasci posse demonstraui-mus, facile comprobamus. Vti & bronchocelen, quam eiusdem generis cum ganglio esse, & a pituita quoque prodire aliqui existimarunt. Cum tamen diuersi sit generis, aliisque de causis; ut in causa flatulenta demonstraui-mus, oriatur.

Succus
enim a
nutriendis
causa
Callosa
cutis.

In cuticula nutrimentum seu succus eam nutriendus cum luxuriat, duritiem illam callosam quam Callum vocant, procreat; Id si succus qui eam reficit, ad cuticulam plus iusto vergat, contingit. Quando nempe alicubi ob laborem continuo attrita, licet non penitus abradatur, nihilominus tamen semper aliquid de ea abscedit attenuaturque; tunc enim succus nutriendus, eò copiosius hac frictione allicitus, non solum eam reparando, sed & sub ea nouam aliamque, si prioris attritio non desinat, rursus sub illa producendo, tandem hisce coalescentibus & induratis, callum illic ubi hoc accidit, gignit. Vti in manuum & pedum eadem sede, quæ tangendo & ambulando magis teritur, solet euenire.

Succus
enim a
nutriendis
causa
Cicatricis.

In cute succus eam nutriendus, diuisioni alicui ex solutione continui ex vulnere vel ulcere factæ, ut eam rursus conglutinet, se ingerens, spatium hoc implendo, callum loco veræ cutis gignit, Cicatricem dictam, à cute vera proin, ut indicatur, quod insensibilis

lis & solidior sit, nec porosa, nec pilis obsita, differentem. Quæ pro ratione solutæ continuitatis iam vnitæ, formam amplitudinemque seruat. Et si succus luxuriat, altior euadit, sin minus cuti similis manet. Quod si vlcus cauum fuerit, illique nondum carne impleto, cicatrix innascatur, profunda & foveæ alicuius instar impressa manet, vel vno loco, si vnum vlcus, vel pluribus si plura, ut in variolis, fuerint.

Sicuti & in vmbilico accidit, ut si foras illius quod in fœtu chordam trans mittebat, postquam ille in lucem prodit, eâ ablata, in profundo coalescat, fovea profunda relinquatur; si verò altius hoc fiat, callus ille foramen cum cute quæ illi complicata est, op- plens, vmbilicum ventris superficiei æqualem reddat, vel si callus vltcrius excre-scat, Vmbilici dictam eminentiam efficiat.

In cutis poros irruens succus, durioribus partibus alendis destinatus, similem in illis substantiam gignendo, Verrucas & Clauos producit. Qui succus ab eo qui cutem cuticulamque alit, prodire potest; nam uti in illorum substantia adhuc consistens, durities callosas & cicatrices gignit, sic in porum vnum pluresve portio illius irrepens, cuti adhærens radicibusque adnascens, excre-scensque, portiunculam exiguam, portam adimplentem duram & callosam generat; quæ nunc extra porum effertur, in verruca pensili, aliàs in eo permanet; in verruca sessili, uti & clauo in pedibus, ubi ex incessu dum crescit pressus, ne vltcrius euagetur, prohibetur, dolorque ex compressione cum subiectam carnem cui infixus est, pungat, mouetur. Quod autem succus ille in poros se ingerat, illorū dilatatio & amplitudo in causa esse potest, cum alioquin angusti penitus esse, & tantum exhalationes unde sudores sunt; transmittere debeant. Quod uti à variis causis prodit, ita in pedibus cute loco vno validius pressa, poroque sic ampliata; clauus facile gignitur, cui callosa cutis simul in eò loco ob eandem causam, uti dictum, iungitur. In manibus quoque cum plerumque se verrucæ offerant, ab externis iniuriis hoc produci, credibile. Vti & in palpebris tubercula dura, quæ Hordeolum & Grandinema

Succus
nutriendus
in cutis
poros il-
lus, plus
causa Ver-
rucarum
& Clau-
orum.

vocant, ab oculorum multa frictione principium sumere possunt. At succo pilos alente, qui singulis poris infixi sunt, radicibusque suis albis nutrimentum ab eo accipiunt, tale quid quoque oriri potest, si crassior vel copiosior in porum infusus, loco pili durā hanc portiunculam, eo modo vti dictum, producat. Qui succus nonnunquam & pilum simul verrucæ huic infixum, vti in facie aliquando apparet, simul generat, vel prius in poro existentem ampliat. Ab humore vti aliqui voluerunt pituitoso, vel alio tale quid quod corporis partium substantiam aliquomodo referat, enasci, haud verisimile, multo minus tam exiguum, si præsertim solitaria sit verruca, vel clauus vnicus, aut saltem non plures; portiunculam, à defluxione humoris illius vel congestione, prodire posse. Nec si contagiosæ essent, quæ solo contactu alterius manum inficientes easdem procrearet, vti voluit Rondel. ab humore pituitoso eas gigni, comprobatur, cum & enarratus succus malignitatem aliquam adipisci possit, vti in maligna causa mox demonstrabimus. Vti & si hereditariæ sint, vel ab ortu processerint, à semine hoc (sicuti in illorum causa demonstratum fuit) prodire potius, quam alio humore præternaturali, patet.

Succus nutriens in poro cutis se infinuans, causa Vari.

Ab alio succo crassiore aliis partibus nutriendis assimilato, poris se infinuante, pustulæ duræ & nonnunquam callosæ, quos Ianthos seu Varos vocant, eadem ratione, sicuti de verrucis diximus, gignuntur. Qui in capite, potissimum capillosa & barbata sede erumpunt; Psylitaria vocata, inde nascuntur, quod illic cutis dura & crassa existens succo crassiore, alatur, à cuius nutrimento ad poros redundans portio, eiusmodi tubercula producit; & si ulterius succus ille diffundatur, eadem in facie, ob illius loci laxitatem efficit. Quæ pustulæ si ex solo hoc nutrimento nascantur, stabiles sunt. Quod si verò excrementitius aliquis humor aut ichor simili illi permisceatur, tunc pustulæ ichorem profundunt, atque interdum suppuratæ in vicuscula abeunt.

Succus ossa nutrens, causa Nodos.

In ossibus succus ea nutrens, Nodos in ipsis quoque gignit. Quod vti in carne à cute tunieis denudatâ accidit, ita hic in ossi-

bus ob perioestium abrasum ab ipsis, aliqua in parte vel exesum, euenit, siquidem succus ossium expullulans, quem perioestia quoque cohibere intra ossa solent, foris se illis affigens, iisque adnascens, Nodos illos veluti osseos progignit. Quod à violentia aliqua externa, vti in equorum pedibus, sic in hominibus nonnunquam aliàs ab alia causa perniciofa, vt lue Venereâ, sicuti illic demonstrabitur, prouenit. Fractis quoque & abruptis ossibus, ex ipsorum fracturis hoc succo luxuriante, Callus quia ea rursus iungit & conglutinat, natus, si vltra ossium amplitudinem excreseat, & nodi instar promineat, Tumorem hoc pacto quoque hic succus gignet.

Succus pinguis nutrens, redundans vel crassior, causa Vnguinis exuberantis callosæ.

In vnguium radicibus succus illis nutrimentum affigens, si copiosior offeratur & apponatur, non solum crassitiem eorum non decentem parit, sed & si admodum luxuriat, vel crassior plus iusto sit, extuberantias inæquales producit, nonnunquam etiam spinulos & duros vngularum reddit. Cuius succi redundantiæ causa, inter reliqua etiam hæc esse potest, si eo per attritionem aliāve læsionem alliciatur, vti in crassitie illorum causa, in magnitudinis auctæ causis demonstrauimus. Vel etiam succus ille, si admodum crassescat, aut ossium vicinorum succo permisceatur, vt ad osseam hanc duritiem & crassitiem redigantur, causat. Quod si alio succo prauo misceatur, præter duritiem alia quoque, vt alibi declarabitur, illorum accedunt vitia.

Succus nutrens corpus crudus, causa Leucophlegmatia.

Augendo corporis substantiam, succus corpus nutrens, extumescantiam parit, si crudus seu imperfecte coctus, loco perfecte cocti & elaborati, vniuersum corpus diu alatur, tumidum, molle & languidum reddens, Leucophlegmatia sic dictæ, quia succum hunc pituitam nominant, causa existit, illiusque simplicis, si impermixtus sit, vel alterius serosæ appellatæ, si serosus vel aqueus humor huic permisceatur, quam rectius Aquæ inter cytēm speciē statuere nos posse ostendimus, quam priorem ex solo succo crudo genitā, quam tamen vt eo quoque referre possent, hunc succum non saltem pituitam, sed aquam concretam aliqui appellare voluerunt.

Huius

Huius autem crudi succi generationis & coaceruationis, causa non alia quam & cachexia, ab eodem succo genitæ existit, sicuti eam illic à sanguine crudiore similem succum gignente, dependere ostendimus, & quomodo vel alimenti assumpti causâ generetur, vel ob viscerum naturalium, ut ventriculi affectus in prima concoctione chylum imperfectum relinquentes, vel hepatis & lienis imbecillitatem, intemperiem aliòque morbos, ut obstructionem & duritiem, quorum causâ in secunda concoctione sanguis non sufficienter elaboratur, succus ille in venis coaceruetur, corporisque habitum nutriendus, ab initio cachexiam, quæ leucophlegmatiam solet præcedere, gignat, mox verò si diutius hoc agat, materiaque illius vberior suppetat, Leucophlegmatiam producat. In seroso quoque humore, quâ ratione ab iisdem ferè causis illius proventus fiat, & crudo permixtus, serosam dictam leucophlegmatiam simul proferat, sufficienter illic ut non opus sit ea hoc loco repetere, descripsimus.

Succus nutritius crudus simpliciter vel serosus, causa Oedematum. Cr. Tumorum. Oedematum serorum de nerforu.

In peculiaribus sedibus crudus succus congestus, Oedemata vel Tumores oedematosos dictos, latius diffusos, parit, in quibus quoque substantia partium quam occupant, aucta potius mollis & tumida, quam pituita excrementitiâ infarcta, quam illius causam statuunt, esse apparet, & proin difficilius, quàm si pituitoso humore scaterent, absumi iterum & in integrum restitui potest. Sed & serosus aqueusque humor simul cum hoc succo illic coaceruatus, molliora magisque aquea seu pituitosiora, si ita ea appellare lubeat, quæ nos serosa vocauimus, gignit oedemata, idque in cruribus potissimum, quæ & tunc vti dictum, hydropicorum cruribus nonnihil sunt similia.

Quorum oedematum serosorum causas in seroso humore exposuimus. Illorum verò quæ solo crudo succo constant causa, aliquando ob prouentum huius succi ab iisdem causis in cachexia & leucophlegmatia, ab eadem causa genitis, dependere potest, si ob partis dispositionem eo potius quàm aliò feratur, ibique recipiatur. Aliàs verò solius partis hæc mala constitutio, quâ sanguinem

allectum non sibi perfecte assimilat, sed crudiorum & imperfectiorum relinquit, causa esse poterit; Si vel frigidior vel imbecillior aliòve modo laxior languidiorque fiat, quod graues ea sedes sæpe morbos, externasve iniurias, sit perpeffa.

Lac redundans in mamillarum ductibus, tumorem vel totam mammam distendentem, vel collectum in certo ipsius loco, vti dictum, parit. Cuius redundantia lactis causa, sanguinis unde lac oritur copia esse potest: Imprimis verò lactis iam geniti in mamillis retentio & collectio, idque plerumque post partum, lactationis tempore, quo si mulieres vti multæ solent, infantem non lactet, hoc illis interdum euenit: alias etiam licet infans lac sugat, quia tamen exfugere penitus non potest, ob copiam, nouo semper lacte succedente seque cumulante, idem solet accidere. Frequentius adhuc, cum infantem ablactates à lactatione cessant, hunc affectum, diebus aliquot postea sentiunt. Vix autem ante partum, etsi mamillæ crescant & lac generari incipiat, interdumque è papillis emanet, illius causâ tumorem patiuntur. Cæterum non solum lactis hanc extuberantiam, causam esse huius mamillarum intumescentiæ, sed & illius concretionem, plerique docent, quod si esset, tumor inde collectus & durus, qui in illis interdum apparet, ea in sede ubi conrescit potius, quàm alia illius distentio oreretur, atque lacti hoc quia è proprijs vasis excidit, accideret, & tunc, cum lac coagulatum, vti & sanguis concretus citra suppurationem vel corruptionem, diutius in parte non possit perseverare, nec nisi ægrè discuti queat, hic tumor in abscessum facile conuerteretur.

Lac redundans causa Mamillarum extuberantia Cr. tum.

Sanguis quâ ratione extra vasa delatus, tumores calidos cum dolore pariat, in doloribus descriptum fuit. Verum interdum & in vasis adhuc persistens, tumores creat, pro ut vel in venis aut arterijs consistit. In venis si hoc accadat, tumentes extrinsecus venas in Varicibus dictis gignit, quando eas adeo implet, & continuo impulsu dilatat, nonnunquam & simul certis in locis validius impellens, in cellulas vel sacculos, sicuti intestina crassa habere obseruamus, eleuat, ut plus

solito è superficie intumescences, nonnunquam velut in odinis protuberantes emineant, & ex dilatatione attenuatæ & transparentes factæ, sanguinis colore tunc magis per eas conspicuo, ex rubro vel lineescere vel nigricare per cutem, & pro ratione ductus venarum, nunc rectè nunc obliquè, nunc curvè & contortim duci videantur, quod si adeo dilatentur, vt vicinos comites nervos premant, aut materia in illis conteta aliter nervos quoq; afficiat, dolor quoque infertur. Quod citius illis in locis sanguis efficit, quod prolapsus in venas illius loci, ægrius, propter situm partis declivem, ab illis remeare potest, vt in cruribus, vnde frequentiores illic atque ampliores nascuntur varices; vti & ob eandem causam in scroto interioribus vasis, cirsocele aliquando nascitur rarius tamen, cum in alia potius quam hæc loca angusta sanguinis, nisi magna, vti dicitur, ad sit causa, fiat in venas profusio. Dein & in alias cutaneas venas sanguis effusus, varices illic gignit, præsertim vbi maior venarum est congeries, veluti in inuolucris, quibusdam, vt scroto, palpebris cæterisque similibus in locis. Cæterum pro ratione sanguinis varices etiam variant, nam si temperatus & purus fuerit, mitiores gignet, qui distendendo tantum molestiam exhibebunt: si verò vel feruidior vel magis fœculentus, vel alioquin alienâ materiâ biblosâ aliâve malignâ permistus, impurus aut deterior existat, magis vrentes, vel alioquin grauius molestantes, deterioresque varices progignet, & simul interdum vlcus in humiliori horum varicum sede, vbi sanguis ille subsidet, vt in cruribus ferè fit, si acris & exedens illius sit materia, vlcus serpens vel alioquin cacoethe excitabit. Quæ omnia à melancholico humore prodire, indeque omnes varices gigni pleriq; existimant, nigredine illorum moti, cum tamen etiam sanguis purus, vti dictum, per cutem translucens, hunc colorem proferat, eò tamè magis alienum, si ille quoq; permutatus aut fœculentior sit.

Quod verò ille sanguis in venas illas adeo copiose feratur, tum loci affecti causâ accidit. Illius quidem, si ob copiam eò expurgetur; quod vt in plethora, sic in mulieribus

gravidis, ob menstruum sanguinem, circa venas vteri retentum, & plus quam ad fœtus enutritionem opus erat, cumulatam, frequenter accidit, vt in venas in pedibus (quas magnam cum vteri venis communionem habere, hoc demonstrat, quod in pede sectæ, menstruum fluxum simul promoueant) delatus, varices qui vtero genitibus familiares sunt, illic excitet, qui post partum, sanguine in partu per vterum se expurgare solente, rursus subsident, nisi venarum hæc dilatatio adeo impressa sit, vt rursus recolligi nequeant. Ob cacochymia illius, nonnunquam etiam in extremitates corporis depulsus in venas, varices in illis producit, & interdum si admodum paruus sit, vlcera simul vti dictum est. Aliquando & cuiuscunque conditionis sit, in illas quoque impellitur, motu vehementiore & perseverantiori illius partis in quam delabitur, in eaque varices excitat: vnde in pedibus, quia eundo, cursu, saltu validius impelluntur, frequentiores fiunt. Et venus immoderata sæpiusque continuata, quia sanguinem in vasa spermatica violentius impellit (quem ex nimio coitu loco seminis reddi obseruauimus) vasis sic dilatatis, Cirsoeales causa existit. Partis affectæ causâ varices in hoc illòve loco facilius fiunt, si debiliior laxiorve & ad influxum recipiendum ea aptior sit, venæq; & plures vel patentiore in eadem occurrant, vel in loco decliui, vti prius dictum, positæ sint.

Alius quoque tumor à sanguine, in venis circa vterum coaceruato, easque distendente, oboritur, qui extumescentiam illam ventris in mulieribus, quam citra conceptum, ac si gravidæ essent, in ipsis apparere, in generibus ostendimus, parit. Quam vteri intumescentiam à sanguinis copia & collectione illic proficisci, vel hoc satis demonstrat, quod mensruus fluxus in illis diu subsisterit, tumorque ille non post partum aliquem fœtus aut molæ, vel alterius humoris excretionem, sed hæmorrhagiam copiosam superuenientem, cesset & soluitur. Hunc autem sanguinem, non quod se in vteri cauum infinuet, vterumque adimplendo dilaret, in tumorem sic eum attollere

Sanguis in Vtris vteri, cau- sa Tumoris ven- tris ac si grvida esset mu- lier, citra concep- tum apparet.

tollere inde patet, quòd cum carnosus & nervosus sit, non ita ac si membraneus esset, ex repletionem alicuius humoris, diduci, nec nisi vnà cum foetu aut malo excrescendo, vti in conceptu ostendimus, augeri atque ampliari queat: & quòd si sanguine impleretur, ille tam longo tempore quin efflueret, retineri minimè posset, vel saltem eum con- crescere & corrumpi interea necesse esset, quod tamen non fieri, cum fluidus adhuc cum prorumpit, existat, & licet aliqui grumi cum eo prodeant, hi in mora portionis alicuius illius inter effluendum primùm nati sint, sufficienter comprobant. Quibus moti, hoc pacto potiùs vteri hanc intumescèntiam gigni putamus. Quòd sanguis longo temporis spatio in vteri venis, quæ eum implicant, retentus & congestus, non solum extrinsecus in ambitu vteri, eas dilaret, atque vti de varicibus modò dictum, tumidas, fortè & varicosas reddet, sed in ipsa crassa vteri substantia venæ illi intextæ, quæ aliàs minimæ sunt & vix apparent, tunc impletæ sensimq; dilatatæ, vteri substantiam quoque non nihil attollant amplioremq; efficiant, & sic illius hic tumor, & venarum illum ambientium dilatatio, intumescèntiam illam ventris proferat: quæ & proin fluxu menstruo redeunte, postquam venæ illæ inanitæ sunt subsidentq; iterum evanescit, nisi alio affectu insuper accedente, veluti cachexia aut hydropis initio, à flatibus vel aqua venter amplius distentus, (sicuti hoc etiam illis quæ ex foetu grauidæ sunt, accidere sæpè vidimus) tumor ille aliter se offert, nec per hæmorrhagiã integrè solvatur.

Sanguis ex arteria sub cutem effusus causa Aneurismatis.

In arteriis sanguis, tumorem eum pulsantem, qui Aneurisma dicitur, gignit, quod eadem ratione ex arteriæ dilatatione, vti & venarum varices, fieri autem: verum hoc quidè in interioribus arteriis accideret, pulsationemque molestam eam quæ in cordis & arteriarum pulsatione sentitur, ab interno aneurismate sic prodire posse, in eo affectu demonstratum fuit. Sed cum arteriarum rami ad cutem vsque minimè dispergantur, nec illi, vti cutanei venarum rami implantentur, hoc eodem modo sicuti in varicibus euenire vix poterit, nisi fortè arteria in loco

alicubi cuti proximo aded intumescat, vt foras hic tumor etiam pertingat, illicque pulsus edat. Quod si sit, ab eadem causa in cordis palpitacione descripta, à qua internum aneurisma prodire diximus, hoc quoque nascetur.

Cæterum non ex sola hac illius dilatatione, clausa & integrâ adhuc arteriâ manente, aneurisma oritur, sed frequentius, si non semper, si in exterioribus fiat, ab illius apertura manifesta aliqua procedit, tunc enim sanguis tenuis & spirituosus ex arteria erumpens sub cutem, eam in tumorem attollat, illicque sinum sibi format, in quem arteria eo ferè modo, sicuti naturaliter in sinus crassæ cerebri membranæ arteriæ se exonerare solet, hic præternaturaliter, sanguinem cum spiritu in illius diastole effundendo, & in systole rursus in sese rapiendo, pulsationem hanc in hoc tumore efficit.

Causa autem huius eruptionis sanguinis ex arteria, osculi illius reformatio plerumque existit, quando à causis iam expositis dilatata, non solum turget, sed & osculo illius simul ex distentione hac diducto & aperto, sanguini vt exilire possit, sub cute viam patefacit. Vel si alioquin ex impetu illo spirituosus sanguinis, arteria ab iisdem causis, quas eam dilatare diximus, osculaq; aperire, tantopere impellatur, vel alioquin ab externa aliqua vi aded lædatur, vt in superficie corporis alicubi disrumpat, sanguinem eo modo vti dictum, sub cutem profundat. Quod quidem hoc pacto, seu è rupta aut aliàs ex dilatatione nimia aperta arteriâ, in externo, non autem interno aneurismate accidere, hæc demonstrant, quòd oscula arteriarum, quibus arteria finitur & clauditur, in extremitatibus corporis, vbi arteriæ desinunt, terminentur, & quòd, si intrinsecus arteria læsa vel aperta, sanguinem profunderet, ille in cavitates corporis delaberetur, nec tumorem, qualis alioquin si solum arteria dilataretur, in interioribus quoque gignitur, produceret. Dein & ex hac arteriosi sanguinis à causis dictis sub cutem effusione, nec sola illius dilatatione, aneurisma externum fieri, idque frequentius si non semper, id quoque comprobant, quòd rotundus ille tumor po-

tius, quàm arteriæ dilatatæ instar oblongus, & varicum modo contortus appareat. Imprimis verò ipsa sectio in cute solâ, tumore obductâ, factâ, sanguinem illic delituisse aperte conuincit, cum mox ille tunc profiliat, atque tantâ sæpè abundantia, vt sicuti obseruatum est, nullo pacto amplius in quodam fisti potuerit, sed largius & penè vniuerso sanguine exhausto, mortem subitanam ægro attulerit, cui ex saltu arteriâ disruptâ, aneurisma hoc, quod pulsatio tale fuisse conuincebat, quodq; diu perseverarat, & in immensum excreuerat, fuit exortum. Vidimus & mulieri cuidam, venâ sectâ, sanguinè cum pulsatione magnâ mensurâ fuisse effusum, qui vix fisti potuit, licet varia adhibita fuerint. relicto postquam vlcus coaluit, tumore eiusmodi pulsante, quem aneurisma esse, facile patebat. Natum id fuit vel idcirco, quia arteria casu secta fuit in excarni cubiti flexura, vbi tumor ille apparebat, sanguine illic sub cutem, postquam vulnus in eadem nō autem in arteria coaluisset, fluxu delata, rursumq; refluxu refugiente: Vel quia arteriæ osculum prius dilatatum erat, antequâ sectio fieret, ideo cute incisâ fluxus illius in hanc sedem, eo vti dictum modo, tumorem illum peperit, postquam sectio iterum coaluit. Nec quod, si sanguis arteriarum sub cutem effunderetur, illic statim concrefceret corrumpereurque, aneurisma eo modo minimè fieri posse conuincit, licet hoc si sanguis è venis in vacua spacia excidat, fiat; tamen cum sanguis ex arteriâ in hoc casu admodū dilatatâ & apertâ profiliens, mox iterum in eandem (vti dictum) recidat, cutisq; illi extra eam loco sit arteriæ, citra concretionem, vti in ipsa arteria, sic & in hunc veluti illi affixum saccum, ferri ab eoq; rursum remeare potest. Quod, cum in venis sanguinem effundētibz fieri nequeat, à venarum sanguine aneurisma non oriri, vt aliqui quodam docuerunt, satis comprobat, & ipsa pulsatio ab arteria hoc proficisci, luculenter demonstrat.

Serosus vel aquosus humor, intumescētijs aliquas generales, & particulares tumores quosdam gignit, idq; varijs in locis; cum in varijs corporis partibus, vt venis syn-

dique corpus intus forisq; perreptantibus; visceribusque, in quæ illæ distribuuntur, vnâ cum sanguine, vel in alijs vasis à sanguine separatus, contineatur. E quibus sedibus; nunc simplex serum, nunc mistum alijs humoribus, erumpens, diuersorū generum tumores producit; variantes maximè, prout vel in cavitates abdominis, scroti, inguinum, vel in habitus corporis superficie, idq; vel in inferioribus solum, aut totius, vel certis saltem corporis locis, illabitur; sicuti in singulis demonstrabitur.

In ventris seu abdominis cavitatem, a- *Serum in abdo-*
quæ instar frequenter serosus humor illa- *mini cas-*
pius, hydropem ascitem gignit; Tuncq; pro *uitatem*
quantitate aquæ illic collectæ, venter plus *effusum,*
minúsve intumescit, atque aliquando adeò *causa*
impletur, vt in vastam molem attollatur, in *Hydro-*
quò libras sexaginta & plures pendentem *pū asci-*
aquæ copiam adhuc remansisse, cum mul- *tu.*
tū prius de ea per pedes effluxisset, paracentesi in-vivis adhuc factâ, vel sectione in mortuis deprehendimus. Quæ aqua nō solum pondere suo grauat, sed & septum premendo, illique incumbendo, motumque illius liberum impediendo, dyspnœam eam parit, de qua tantopere conqueruntur, eaq; maximè quando decumbunt, angūtur, cum aqua tunc versus septum amplius tendens, magis illud grauet, vnde liberius erecto corpore, aqua tunc deorsum ab eo prolabente, spirant. Sed & eadem aqua, si madore suo interiora viscera, hepar, lienem, renes, ventriculum, intestina nimium humectando, debilitet; vel falsedine aut acrimoniâ, quam ex commistione aliorum humorum, vel putredine aut corruptione, pluribus mensibus sæpè retenta concipit, adeò vt nauseosum vel cadauerosum, aut alioquin foetidum odorem spiret, illa potius exiccet, sicuti talia esse ferè deprehenduntur, atque mesenterium, omentum renūq; inuolūcrū, veluti arefacta contracta, adipemque instar glebarum illis adhærentem, in quodam inuenimus. Vel si easdem partes certis in locis aqua illa erodat, exulceret, vel etiam putredinem in illis inducat, aut corrumpat, contaminetq; sicuti omentum plerūq; flauum, putre & fetens in plerisque, præter quam quæd

quodd retractum, vti diximus, fuerat, & mesenterium quoque quibusdam in locis eiusmodi fuisse, in anatome hydropicorum inuenimus; quod si accidat, vti & si alia viscera simili modo ab hac aqua lædantur, grauiora in partium naturalium functionum læsionibus, hydropicis tandem superuenire solita symptomata, vt appetitum deiectum, sitim, cachexiam, atrophiam & diarrhoeas aliaque producat.

Causa verò huius influxus feri in capacitatem ventris, in partibus ventris inferioris serum continentibus consistit, vel visceribus parenchymate constantibus, sanguificationi destinatis, vt hepate, liene, renibus; vel in venis hæc viscera aliasve sedes in ventre perreptantibus, aut etiam vesicâ serum excipiente. E quibus serum, si continuitas ipsarum soluat, vel citra eam, per diapedesin vel anastomosin illarum elabitur. Sicuti in singulis, quomodo id fiat, declarabitur.

Ex hepatis & lienis parenchymatis continuitatis solutione hoc semper accidere, nec aliam esse hydropis causam, Fernelius testatur. Quod nos, frequenter euenire, sectione cognouimus. Idque potissimum ex fissa & dehiscente ipsorum substantia, vnde serum è vasis venæ portæ & cauæ, per eam penetrans, & sub tunicas exsudans, illic coërebitum, eas à subiecta sede separando aquâ implet, atque in vesicas eleuat, quibus disruptis serum in abdomen promanat. Cuiusmodi vesicas plures sæpe, easque interdum amplas limpidasque, hepatis lienique adnatas, in hydrope extinctis hominibus vti & simiâ inuenimus, laniique & qui pecora mactant, has quoque frequenter ostendunt. Verum & tunicis tandem exesis, serum ex hisce visceribus rectâ in abdomen exstillat. Fissuratum autem eiusmodi in hepate & liene causa non minima est, parenchymatis tanta siccitas & ariditas, vt non solum decrescat & imminuatur, sed & tandem rimis dehiscens findatur. Cuius causam intemperiem potius calidam quàm frigidam fuisse, non solum sitis summa hydropicorum, & vrinarum rubedo, aliaque caloris potius quàm frigoris indicia demonstrant, sed & quod illis hoc potissimum eueniat, qui lautius vi-

uendo calidissimis aromatibus cibos conuiunt, vel vina generosissima & meraca bibunt, & in eiusmodi vivendi ratione perseverantes, quidam iuvenes adhuc, quidam adulescentes, maximè verò senes, quo tempore hæc viscera alioquin ætate sicciora euadunt, in hydropem incidunt, & se ab aqua infestari, quam tamen non biberint, ioculariter conqueruntur. Quam potissimum causam, quodd nostris in regionibus hydrops adeò grassetur, esse, iam diu obseruauimus, atque in ebriosis hydropis imminenti, perpetuam sitim quâ ob intemperiem calidam hisce visceribus impressam, diu ante premuntur, quæ illos ad continuam potationem impellit, certissimum prænuncium esse, nisi alius morbus præueniens, eos è medio prius tollat, deprehendimus.

A medicamentorum calidissimorum quoque nimio & frequenti vsu, quibus ventriculus, atque vterum mulieres, calefacere student, vel in aliis frigidis morbis immoderatiùs ægri vtuntur, hoc euenire, visceraque adeò calefieri exsiccarique possunt.

A morbis quibusdam calidis acutis vel diuturnis, vt febribus, ictero similibusque, hæc viscera simili modo exsiccari findique possunt, ideoque hydrops caloris signa potius quàm frigoris proferens, hosce affectus subsequitur.

A tumore duro, qualis est durities horum viscerum, quâ ipsorum substantia vel tota interdum, vel maior illius pars, vel aliqua saltem, induratur, vel tumor in ea collectus durus, in caua simâve hepatis vel lienis sede generatur, scirrhus dictus, vel alius durus tumor, qui in abscessum abire solet, eiusmodi fissuræ in illis, vel aliæ aperturæ, per quas serum in abdomen exstillat, frequenter prodeunt, cum ex duritie hac, tunica horum viscerum faciliè crepet & findatur: & si tumor durus in abscessum conuertatur, indeque in vlcus, viam hac ratione illi patefaciat, vt in vlcere dicetur. Quæ & causa est, quare durities illa vel scirrhus, vel tumor durus in abscessum desinens, hepatis vel lienis, hydropem inducat, cum si citra hanc fissuram aut diuisionem apertam, durities illa vel scirrhus aut tumor se offerant, obstruendo

& arctando solum, iterum, vel cachexiam aut atrophiam, potius pariant, nec dum hydropem, donec tandem hæc læsio viscerum inde procedat, tuncque hydrops priores affectus sequitur, vel si statim hoc fiat, mox comitatur. Vnde & aliæ horum viscerum obstructions, cum substantiam ipforum extrinsecus minimè diuidant, hydropis ascitis si solæ sint, causæ minimè fiunt, uti verò e-narratorum tantum affectuum, hydropisq; interdum anasarcæ dictæ, quemadmodum in singulis hisce fuit expositum.

Huius autem duritiei, sicut & scirrhi causa, eadem horum viscerum siccitas, quæ ea findit, esse potest, si adeo in ea agat, ut ad indurationem usq; torreat, à cibo potuque, medicamentis vel morbis calidis etiam dependens. Vel quæ causa existit, tumorum horum, ut scirrhi & tumoris duri in abscessum desinentis, extrinsecus in corporis carnosis sedibus oboriri solitorum, illorum quoque qui in visceribus hisce prodeunt, causa esse potest. Veluti est succus quo hæc viscera aluntur, crassior quam par erat redditus, quod illi ob chylum & sanguinem ex quibus generatur, vel permissionem crassioris alterius partis succi accidit, ut similem substantiam reponendo, tumores hosce in visceribus gignat, quorum ille qui in abscessum vergit, ob easdem causas, uti in externo, materiam variam, quæ in illis aliquando inuenitur, continere potest. Neque enim ex pituita vel bile aut alio humore, viscerum substantia sic indurari, sed vasa ipforum solum, uti in obstructionibus ostensum, obstrui possunt. Sed & inflammatio in hisce visceribus, si scirrhum gignit, succum ea nutriendem in crassando potius quam alio modo, uti in scirrhus externo ostendimus, ea indurat vel scirrhum in illis producit.

Aliter quoque læsâ & apertâ horum viscerum substantiâ, circa superficiem, serum in abdomen transferri potest. Sicuti in hydropica quadâ puella, hepar vna parte malè affectum, tumore fungoso illi adnato, in quo concretum quid inerat, vidimus, è quo serosus humor exstillare potuit. Potissimum verò hepate & liene vlcera, adeo ut ad superficiem ipforum usque vlcus penetret, se-

rum uti & in cæteris vlceribus, quæ semper madent, exsudans, hydropem etiam accersit. Qualia vlcera post inflammationes suppuratas, vel tumores supradictos in abscessus desinentes, oborta relictaque diu sæpè, purulentas deiectiones mouentia, tandè hydropem efficiunt. Aliæ verò læsiones, alias & præsertim contusiones ab externis iniuriis factas, sequuntur; Sicuti duos ab equo deiectos, & in latus dextrum lapsos, prægressis aliquando hepatis læsi symptomatibus quibusdam, tandem hydropem correptos eoque extinctos fuisse, nouimus. A vulnere extrinsecus ad viscera hæc usque adacto, nisi mors præueniat, vlcus relictum idem potest efficere. Sed & corruptio ac putredo horum viscerum vel ex parte vel omnimoda, qualè in hydropicis sæpissimè vidimus, causa hydropis non infrequens existit, quæ tumores vel erosiones & vlcera, aut alias læsiones horum viscerum, à causis, uti iam expositum, sequitur. Verum & ab aqua iam prius in hydropicis in abdomine collectâ putrescente, si horum viscerum tunica erodatur, vel vterius iporum substantia lædatur, sero tunc inde quoque transsudante, aquæ illius copia in ventre augebitur. Obseruauimus quinetiam ab eadem aqua, & hepatis & lienis tunicis, uti & peritonæo eo in loco ubi illa huic adiacent, exesis, ita concreuisse, ut nec hepar nec lien à regione illa sepi cui adnata erant, citra dilacerationem tunicarum auelli potuerint, ynde fortè quoque serum in cavitatem exsudare potuit.

In renum corpore, cum & illud, uti iam dicta viscera, parenchymate constet, si illius continuïtas eo modo, sicuti de cæteris dictum, soluat, hoc idem fieri posse, hydropemque ascitem inde prodire, & rationibus atque experientiâ moti, asserimus. Cum enim ad eos serum non solum per emulgentes venas continuò cum sanguine deferatur, sed & ibi ab illis secretum, continuò coaceruetur, si substantia renum ad eas sedes usque vel diuisa aut aperta sit, serum ex iis æquè atq; è cæteris visceribus vel exudans, & vesicas prius excitans, vel statim penetrans, copiosius ac citius quam ab aliis visceribus

ribus in abdomen profluet; hydropemque ascitem, qui diu perseverare potest, cum renum læsiones, præsertim si vnus tantum afficiatur, non subito hominem perimant, sed diuturnum morbum procreant, vnoque penitus cōsumpto, vti alibi dictum, alter queat diu adhuc sufficere, procreabit. In quo casu, præter cætera accidentia, ab aquæ hac collectione in abdomine, vti dictum, provenientia, in vrinis interdum aliquid purulenti, si vlcus adsit, deprehenditur, mictioque adhuc longè quàm in cæteris parcior, & sæpè paucissima, si vterque præsertim ren simul affectus sit, cum vrinæ non minima portio in abdomen continuè deferatur, nec vti decebat, ad vesicam perveniat. Harum autem læsionum causæ in renibus, eadem quæ & cæterorum viscerum esse possunt: vt nimia illorum ariditas, sicuti hanc renibus quoque accidere, siccitatemque illorum, calculi simul causam fieri, in eo describendo ostendimus, quam non solum ætas, morbi calidi, sed & vrina calidissima ex ciborum calidorum & vini inprimis potentissimi, vti prius ostensum, vsu accensa, renibus tandem infert.

Dein & vlcera renibus admodum, ob causas in exulcerationibus enarratas, peculiaris, si non solum interiores ipsorum sedes occupent, sed & ad exteriora vergentia, substantiam ipsorum, nunc vno, nunc pluribus vlcusculis perforant, causam hydropi, renum vitio nato, præbere possunt. Vti & renum omnimoda qualem sæpè vidimus corruptio, remanente tantum illius inuolucro veluti marsupio: Postremo & aliæ renum ab externa vi læsiones eiusmodi, vt contusiones vel vulnera idem possunt efficere.

Cæterum non solum hisce rationibus moti hæc sic fieri posse statuimus, sed & tanto certius hoc affirmare possumus, quod eiusmodi casus nobis cum multis aliis spectandis fuerit oblatus. Cum enim nobilissimus quidam vir, hydrope ascite septem mensium spacio conflictatus, post mortem aperiretur, visceraque omnia ventris inferioris quàm diligentissimè fuissent inspecta, nec aliud vitium in illis, quàm quod aqua in abdomine tam diu retenta corruptaq; & viroso

odore prædita, peritonæo & potissimum mesenterio & omento pepererat, deprehenderetur, vterque ren multis vlceribus fistulosis perforatus, aded amplis, vt digitum singula facile reciperent, inuentus fuit, adnatis insuper hinc inde renum corpori vesiculis aqua plenis, quæ ex illis scissis profluebat, erosâ simul vndique renum exteriori tunicâ. Quam renum exulcerationem ab immoderato potu profectam, ex eo collegimus, quod nobilis ille ab adolescentia ad annum senectutis septuagesimum & ultra, vinum generosissimum consuevit & copiosè biberit, & in conuiujs, bibendo nulli cedens, vrinam nihilominus continere ad multas horas potuerit: Quod præterea multum contulisse, hydropemque ex parte causasse iudicauimus, quod in eo splendide & magnificè, vt erat opulentus, viuente, iugi ciborum aromatis conditorum vsu, vti reliqua viscera accendi & siccari ostendimus, ita & renes, ac præsertim ob retentionem hanc vrinæ diuturnam, potissimum erosi vlceratiq; fuerint.

E venis ventris inferioris, & potissimum venæ portæ propaginibus, ab intestinis & ventriculo per mesenterij & omenti membranas deductis, atque in duos truncos collectis, dextroque hepatis, sinistroque lieni insertis, per diapedesin, tunicis ipsarum rarefactis, aut anastomosis, osculis illarum, & præsertim venarum à truncis illis maioribus, in omentum & mesenterium dispersis, illicque finientibus, reueratis, si serum copiosius, quàm alioquin ad partium humectationem ne arescant, naturaliter etiam exudat; emanet & in ventre congeratur, hydrops ascites quoque potest produci. Hoc autem eo modo fieri, serumque per poros cæcos vel oscula, citra solutionem continuitatis è iam dictis venis, promanare posse, idque citra cruoris permissionem, aut seri à sanguine tincturam, comprobant, quod sicuti in alijs quoque sedibus è venis, hoc pacto, tum in corpore variis à sero obortis defluxionibus, tum extra illud per sudores, lachrymas aliasve è corpore per nares, vterum, aliasve sedes factas fluxiones, subito interdum magnaque copia erumpit: ita &

ex venis meseraicis non solum naturaliter semper aliquid in abdomen transfudare, sicuti semper in eo maior eiusmodi deprehenditur, sed & præternaturaliter maiori copia abdomen implere possit, eoque facilius, quam in aliis locis, cum in illis venis serum à poculentis & esculentis progressum, & cum chylo continuo attractum maxime redundet. Et sicuti in diarrhœis spontaneis, vel catarêticorum usu concitatis, illud per oscula earundem venarum, per quæ eas subierat, rursus incrementum effluit, ita & per interiora oscula, quibus rami ipsarum in partes dispersi, circa finem occluduntur, patefacta, nullo cruore tinctum, in spacium abdominis influere potest.

Eadem ratione & serum à sanguine in renibus secretum, in vesicam delabitur. E quibus omnibus, vti ob enarratam causam etiam hydropem ascitem fieri posse, quod aliquibus videtur impossibile, colligimus: Ita in hydropicorum quorundam sectione, cum nullam manifestam in visceribus continui solutionem, sed magnam in venis vti & ventre feri redundantiam deprehenderemus, inde illud eo quo diximus modo in abdomen peruenisse, conjicientes, liberius rem ita habere se affirmare ausi fuimus, eoque magis, cum & in hydrocele, ab eadem causa plerunque in abdomen, indeque in scrotum, vti ostendimus, idem serum destillet.

Huius autem anastomosis & diapedesis in venis meseraicis causa est, feri plerunque in hisce venis nimia redundantia, quæ eas distendendo aperit, vel tenuitas & aquositas, quæ eas facile penetrat. Tunc enim in venis meseraicis accumulatum, nisi per easdem vias, per quas has subiit ad intestina denuò remeans, per alui fluxiones, vti ferè fit, euacuetur, ex vasis hisce, vti dictum, interdum erumpens, in abdomen fertur. Cuius redundantia, si transitus illius à venis meseraicis per hepar in venam cauam impeditus sit, præcipua causa existit: Quod præsertim ob facultatem ipsius hepatis attractricem debilitatam accidit, adeò vt serum, quod chylo partim permixtum, cuius vti & sanguinis portio est, eò defertur,

partim etiam ab eo separatum, continuo à potu has vias pertransit, non sufficienter ad se allicere & in cauam venam transferre possit. Idque ob causas in cachexia, quæ tunc quoque ob hanc hepatis imbecillitatem se offert, expositas. Ab obstructione hepatis ab humore, aut alia duritie, vel scirrho factâ, eundem transitum impediri quoque posse censuerunt; quæ tamen si adeò magna esset, vt serum inde retineretur, etiam sanguis minimè permeare posset, vnde atrophia citius quam hydrops prodiret. Sed & citra hanc causam, si in venam cauam sero translato, naturali illius euacuatione, quæ per vrinas fit, impeditâ, illic adeò cumuletur, vt subsistere nequens, à natura rursus per illius ramos in hepar & venæ portæ propages repellatur, vel alioquin eò regurgitet, illicque coaceruetur, idem poterit accidere. Cuius causa renum facultas attractrix non sufficienter suo fungens munere, esse potest: Vel obstructio tanta, & præsertim in vtroque ipsius vteret, vt serum in vesicam destillare sufficienter vel omnino non possit. Quorum causas in aliis mentionum symptomatibus exposuimus.

A' sudoribus suppressis idem fieri autumarunt, verum cum tunc per vrinam serum rerentur euacuari possit, hæc nisi alia concurrat causa, sola esse minimè poterit. Generatio quoque feri superflua, cuius causam in leucophlegmatia causis vberius ostendimus, si enarratis causis accedat, eò citius & facilius hydropem inducent, quod maiore tunc illius copia existente, celerius eo modo, vti dictum, in abdomen fundatur. Quod vti ab humidis assumptis procedit, ita à potu nimio & ingurgitatione continuâ in ebriis, etiam hydrops ascites, non solum ob viscerum illam læsionem, quæ à vino exurgit, sed quod materiam simul aquæ copiosam subministret, frequenter gignitur, in illis præsertim, qui pro ratione & copia potus, vrinam non profundunt, sero in venis abundante, vnde quoque grauantur, & de grauedine aliquâ ac tensione ventris, antequam hydropici fiant, conquerruntur.

A' soluta continuitate venarum meseraicarum

seraicarum, omentum & mesenterium im-
plicantium, serum in abdomen excidēs, hy-
dropis ascitis causam aliquando esse posse,
tam argumētis probabilibus, quā demon-
strationibus certis ostendi potest. Nam con-
stat aliquādo casu externo, vel vi illatā ven-
tri, ruptā eo impetu venā aliquā, pluribus ac-
cidisse, ut primum inde sanguis & serum si-
mul in ventrem profluxerint, & dein vul-
nere in vlcus, vel etiam corruptionem ali-
quam horum viscerum commutato, quæ
post mortem inuenta fuerunt, inde conti-
nuò sero exstillante, hydropem subsecutum
fuisse, quem etiam cruenta deiectio & vo-
mitio, aliquando primum præcesserat, mox
purulenta comitabatur. Quæ exulceratio
vel corruptio, per quam serum elabitur, in
omento & mesenterio, vbi venæ sunt, ab e-
rosione quoque proficisci potest: cum hu-
mores summē acres & maligni in venis his-
ce, quæ varijs excrementis scatere solent,
retenti, eas hoc pacto exedentes, causam sic
hydropi præbent. Vti & si corruptio hæc
in hisce membranis & vasis, ab aqua in ab-
domine hydropicorum diutius retenta pu-
rescente, easque corrumpente fiat, vti supe-
rius ostensum, sicuti in omnium ferè hydro-
picorum sectionibus, omentum nonnun-
quam & mesenterium hoc pacto infectum
vidimus. Quod cum sit, licet hæc non pri-
ma huius aquæ collectionis causa, cum ali-
unde processerit, existat, quia tamen inde
quoque tunc exstillat, maioris aquæ quanti-
tatis congestioni occasionem præbet, eoque
amplius, si viscera alia simul hac aquā adeò
afficiantur, ut continuitas ipsarum quoque
lædatur.

Ab alijs venis ventris interiora perua-
dentibus, ut vena cava illiusque propagini-
bus, ad renes, vterum partesque alias vti &
musculos & membranas dispersis, per dia-
pedesin vel anastomosin, serum quoque in
ventrem labi posse, hydropique originem
præbere, credibile, idque maximè in cache-
ctis, vel alijs affectibus, in quibus hæc feri-
copia in venis accumulatur, & præsertim
mulieribus, quibus cum hæc serositas per
menstruum fluxum, vel post eum mox in
fluore muliebri, expurgari solebat, si illis

suppressis, serum aliam viam & exitum è ve-
nis quærat. Ex soluta verò illarum conti-
nuitate hoc non adeò facillè in hisce venis fit,
cum si in maioribus hoc accideret, hæmor-
rhagia interna, cum interitu hydropem præ-
veniret, quæ minores sunt, immersæ parti-
bus non tam facillè vti meseraicæ in omen-
to suspensæ, & iniurijs expositæ, hoc pacto
ut illæ lædi possunt.

In vena umbilicali, vbi hepatis inserta, at-
que extra illud peritonæo adnata erat, dila-
tata admodum, cum aliàs in adultis liga-
mentum potius quàm vas cauum referat,
aquam quoque satis copiosam in hydropico
secto deprehendimus. Aliàs verò non so-
lùm illic retentam, sed & inde per idem vas
ad umbilicum vsque in quem desinit pene-
trasse, & sub cute collectam, tumorem instar
vesicæ aquæ plenæ illic peperisse, atque in-
de quoque in abdomen defluxisse, eaq; dis-
rupta è corpore emanasse, vel alioquin illic
viam sibi aperuisse, & per eam è corpore ef-
fluxisse, adeò sæpè copiosè, ut totum ventrē
exaniret, aliquos observamus.

Ei vesica disrupa, urinā in abdomen to-
tum effusā, ventrem ante mortē intumuisse,
in quodam, vidimus, indeque tumorem
illum profectum, post obitum, secto corpore,
deprehendimus, quod ei eius bene poti hu-
mids strati, ventrem alius quidam insiliens,
vesicam ex ebrietate distentam & plenam,
eo impetu ruperat. Quod & vteribus dis-
ruptis vel ex alia læsione apertis, emanante
tunc sero, similiter accidere posse verisimile
videtur, hydropemque inde spacio tempo-
ris, cum hi non statim moriantur, immò ni-
hilominus diu superuiuere possint, quoque
prodire.

In scroti cavitatē si serofus humor dela-
batur, vel tumorem illū qui in hydrope ascite,
vna cum ventris intumescencia, in hac
parte aliquando suboritur, vel eum qui sine
hydrope in hydrocele se in hoc loco offert,
excitabit. Hic autem humor aquam refe-
rens, in vtroque casu non aliunde, quàm ex
abdominis cavitatē, in quam prius delapsus
erat, provenit, indeque in hunc sacculum de-
labitur. Idque duobus modis; Vno per dia-
pedesin vel anastomosin, sero ex abdominis
spacio

*Serum
in scroti
cavitatē
insilla-
tū, causā
Hydro-
celæ.*

spacio sub cutem penetrante, & sub ea in scrotum subsidente; Quod in hydrope ascite, cum eodem modo in pedes quoque è ventre, sicuti mox ostendemus, deriuetur, vt hac ratione quoque in scrotum portio illius transmittatur, euenire potest. Alio modo transitus hic per processum peritonæi, vasa seminaia in scrotum deducentem perficitur, si ille eousque dilatetur, vt aqua in abdomine collecta, per eum in scrotum destillare queat, nam etsi relaxatio non adeò sit ampla, vt illa est per quam intestina in scrotum prolabantur, tamen vel leuiter hac viâ patefactâ, aqua guttatim potest transmitti. Quæ relaxatio proin hîc etiam à sola aqua, quæ hanc sedem inferiorem ventris vbi hi processus prodeunt, continuò alluit & madore suo humectat, proficisci potest vt non maiori vi opus sit, quæ tamen si accedat, maiorque inde sequatur dilatio vel etiam ruptura, sicuti prius in hydropico rupto simul ostendimus, viâ tunc amplius patente, citius scrotum aquâ replebitur. Quod & si humectatio sola in causâ fuerit, eueniet, magnâ aquæ, vt in hydrope fit, præsentē copîa. In hydrocele verò tardius, cum pauca illius sit quantitas, eaque non nisi sensim in abdomen indeq; in scrotum instillet.

Cuius collectionis aquæ in abdomine in hydrope, causam non solum solutam continuitate viscerum & vasorum esse diximus, sed & anastomofin vel diapedesin venarum meseraicarum esse posse ostendimus. Aqua etiam causâ potius, quàm insigni alicuius partis læsione, in hydrocele serum in ventrem transsudare, vel è venarum osculis exstillare; hoc comprobare videtur, quòd in hoc casu, nullo alio, præter scroti tumorem, grauiore affectu, nisi alius accedat morbus, laborent, & non nisi longo tempore hic tumor excrescat, paulatimque per venarum tunicas vel oscula serum efferatur. Idq; ab iisdem causis, à quibus hydropem quoque interdum procedere, demonstrabimus, sed leuioribus, & proin minorem noxam adferentibus. Cum & citra præternaturalem causam, naturaliter sero continuò non nihil patefactis, vel ob ipsius madorem, vel alijs exsudante, atque interiora abdominis irri-

gante, etsi non adeò redundet, tamè de causis, hisce meatibus, in scroto sensim colligi, & processus illius relaxatio, tunc sola hydroceles causa fieri possit.

In inguinum mulierum spacium serosus humor descendens, tumorem hydroceli quodammodo similem, vt eum descripsimus, in ea sede aliquando gignit. Idque ob laxatum foramen per quod vas quoddam ab vtero deductum, extra peritonæum in pubem defertur, illi quod vasa seminaia in viris emittit, nonnihil correspondens. Quæ relaxatio quoq; ab aquæ illius humectatione, & quòd illa prius in abdomine congeratur, ab iisdem, quibus & hydrocele, causis, proficisci potest. Inter quas, conatus vehemens in partu, vt rupturis, in hac quoq; sede factis; sic dilatationi, & per consequens huic tumori aliquando occasionem præbet.

In thoracis cauitatem, in abdomine collectus humor, interdum quoque in hydro-picis defertur, qui post mortem aperto pectore demum deprehenditur, cum prius tumore nullo in illo se prodac, nisi vt in empyemate aliquando fieri diximus, tanta copia illic colligatur, vt in costarum spatiis, alicubi protuberantiam aliquam, quod tamen rarissimum, pariat. Citra hanc tamè ex dyspnœa, quæ tunc hydropicos magis, atque licet erecti sint, angit, aquæ illius collectionem in pectore aliquomodo colligere possumus: cû sicuti in ventre existens, septum inferiore sede alluendo, ita thoraci inserta, superiore quoq; lateri incumbendo, grauet, dupliciq; modo motum illius impediendo, ita difficilem respirationem procreet, eoque amplius, quòd & pulmonum motui aliquo pacto obstat. Cæterum quo pacto è ventre in pectus feratur, aliam viam quàm per septum, quod hæc ab inuicem separat, inuenire non licet, per quod vt per peritonæum, illique adhærentes musculos, eam in ventre hydropicorum transsudare posse, vel per oscula transferri, ostendimus, sic & hîc eodem modo septum permeare poterit; nisi fortè erosio quædam, qualem in septi hac regione in peritonæo, ab aqua in ventre hydropicorum retentâ, aliquando fieri mox ostendimus, vel etiam alia perforatio patens, quam quoque

quoque interdum inuenimus, viam hanc illi patefecerit. Qua ratione & si aqua non ex abdomine in hydrope, sed aliunde in thoracem illapsa, in aliis pectoris affectibus, septum pertransiens, in venterem inferiorem labatur, tumorem in eo, vel si vterius pcedat in pedibus, excitare poterit. Quam & causam, quod asthmatici quandoque hydropici fiant, esse existimamus, nisi hoc ideo quod vtriusque affectus causae simul concurrant, accidat, frequentius tamen occasionem praebere putamus, ut licet nondum, pedes tandem in pectoris eiusmodi affectibus illis intumescant, nisi per alium exitum e pectore aqua sub cute ad inferiora vergat.

*Seri per
venerum
effluxur,
in Hy-
drope a-
scite.*

In vteri capacitatem se ex vena caua infnuantem aquam, eumque dilatantem, tumorem ventris quandoque, qualis hydropicorum existit, gignere docent, hydropemque vterinum vocant. Verum non tantam vteri fundi esse capacitatem, ut tantum aquae capere queat, nec adeo dilatari posse, nisi quando cum foetu simul excrefcit, in vterinis doloribus fuit expositum. Fieri tamen potest, ut & ex sero in abdomine collecto, per vteri orificium exterius, ex parte vel penitus effuso, ventris tumor subsideat, quod & ut in vtero eam collectam fuisse crederent, occasionem forte praebuit. Verum hoc cum fit, tunc venis quae vteri ceruicem potius quam fundum implicant, sanguinemque menstruum in eum, vel aquosum quoque humorem in fluore muliebri, vti illic demonstrabimus, effundunt, se insinuando serum, per anastomosin, naturam operante, ut quod eam grauat expellat, vti in iam dicto fluore, per hanc viam excretionibus destinata, effunditur, ut non opus sit in vteri fundo hanc aquam delituisse, indeque ventrem intumuisse, statuere.

*Seri in
inferiore
corporis
habitus
sedem dis-
persum,
causa Tu-
moris pe-
dum in
Hydro-
pe ascite.*

In inferiorem habitus corporis sedem, serosus humor dispersus, in hydrope ascite, tumorem illic ventris intumescenciae copulatum efficit, eumque in pedibus, cum humor tenuis versus inferiora sua naturam semper vergat, infimaque illorum regione, vbi figuratur, primum apparentem, mox etiam perseuerante influxu, vteriusque pedes implente, sursum etiam vergentem, tandemque per ti-

bias & crura ad superiora vsque, & lumborum & abdominis exteriora ascendentem, illicque sub cute, vnde Aquae inter cutis nomen, illi quoque attribuitur, se manifestantem parit: in quibus locis cutem & vicinas sedes irrigando atque imbaendo, cum non solum in tumore attollat, sed & emolliat, ille pressus cedendo foueam concipit, eamque aliquandiu retinet. Quae cum fiunt, in ventre tunc simul seroso humore coaceruato, ille quoque cum pedibus, citius rardiusve, vti prius ostensum, intumescit. Et cum hic aquosus humor, sub cute collectus vltro citroque ferri possit, accidit, ut si crura deorsum, vti corpore erecto potissimum fit, pendeant, sero tunc magis eo tendente, amplius intumescant, ventrisque tumor non nihil minuat, si vero per decubitum aliove modo attollantur, remeante rursus versus superiora humore, tumor non nihil, alias quoque penitus, in pedibus decrescat, in ventre vero augetur.

Hic vero aqueus humor, in hydrope ascite in pedes crura ventris & lumborum inferiora defluens, e venae cauae ramis exfundas, aut per anastomosin emanans, in ea hydropis specie, quae a copia feri in eiusmodi venis, ob causas enarratas coaceruata oritur, eo deferri potest, sero tunc non solum e venae cauae ramis in abdomen, sed & in exteriora se exonerate, vti in leucophlegmatia serosa, eo quoque modo pedes intumescere ostendimus. Frequentius vero in aliis omnibus ferre causis hydropis ascitis, a viscerum in abdomine contentorum, vti & venarum meseraicarum affectibus, dependetibus, serum ex abdominis cauitate, in quam prius deuenerat, in exteriora haec loca transferri & in pedes vergere, non solum hoc, quod defluente deorsum in crura humore, ventris tumor non nihil subsideat, vti & quod liberior sit respiratio, resfluente vero illo haec rursus redeant, demonstrare videtur: sed & illud certo confirmare, quod sponte vel arte aperta in pedibus tumentibus cuticulam, sero tunc sensim exstillante, successiuè ventris tumor decrescat; aut si affatim erumpat, vel citius effluxus hic perseueret, penitus quoque recedat, multaeque mensurae aquae per hanc viam

sæpè effluant, quam non nisi in abdominis capacitate collectam fuisse, ex iam dictis facile licet conicere, cum in pedibus non solum dum tument, sed & postquam ex parte ob effluxum aquæ detumuerunt, tamen semper adhuc aquæ copiam profundunt, tanta mensura contineri minimè potuerit, ne tumor alius in ascite, quàm in ventre appareat. Dein & cum ex læsione viscerum, in abdomine contentorum, in ventrem aqua labitur, quam frequentiorē ascitis causam esse diximus, nec alibi quàm in ventre huius aquæ sit scarurigo, pedesque quoque intumescant, idque antequam sæpè in ventre tumor obseruetur, eam ipsam ex abdomine in eos defluere, cum extra abdomen nullibi aliàs collecta fuerit, hæc quoque sufficienter comprobant.

Verum uti hæc euidencia sunt, sic quomodo extra peritonæi cauitatem serofus hic humor elabatur, cum per peritonæi membranam non derur manifestus exitus, minus est perspicuum. Quamobrem per diapedesin hoc fieri, & serum per hanc membranam, tumore distentam, & madore emollitam, sub cutem transsudare, atque inter eam & partes subiectas quibus adhærescit, in inferiora, uti in cæteris defluxionibus fit, sensim delabi, eademque viâ sursum remeare posse, ex eo quod & alibi, venas sic transeat, membranasque penetret, colligimus: Vel per anastomosin in oscula venarum, à peritonæo in cutem vicinam dispersarum, sero se insinuante, & per ea in partes subiectas fluente, rursusque resfluente hoc contingere: Aut quia vno pluribusve in locis, ab acri vel putri hac aqua, peritonæi aliqua sedes eousque exeditur, ut aqua per eam sub cutem quoque possit elabi. Sicuti quoque sectione patefactum, hanc membranam non vno sed variis in locis fuisse exesam, idque interdum etiam illic ubi septum succingit, heparque & lien ei incumbit, quorum viscerum tunica tunc si simul abrafa sit, hæc ubi se muruò tangunt, aliquando coalescere, superius in hæc viscerum læsionibus, ostensum fuit. Sed & in hydropico illo rupto, cui intestinum & aqua serotum impleuerant, illudque processu peritonæi adnatum erat, yti demonstra-

tum fuit, hunc coalitum ab hac erosione aquæ, quâ intestini tunica & membrana illius fuit exesa, profectum, hoc uti & priores conglutinationes probat, quod de citra detractionem tunicarum, uti in fistulis videmus, partes nequeat inuicem concrefcere. Deinde cum in viuis sæpè obserauerimus, hanc aquam in vmbilici regione, è ventris cauo, non per venam vmbilicalem, hepatis insertam, quæ si aperiretur ex hepate solo, non autem abdomine aquam non adeo copiosam profunderet, sed per peritonæum sibi viam ad superficiem cutis vsque aperuisse, illicque sub cuticula collectam, eam in amplam vesicam eleuasse, quâ scissâ, ex vniuerso ventre omnis aqua magno cum impetu, effluerit, ex eo quoque, naturam huic aquæ in peritonæi etiam aliis locis, exitum sub cutem diuersis modis moliri posse, cōiicimus, vesicis fortè etiam in interioribus illius natis, aliòve modo continuitate eius solutâ; qualia multa eiusmodi in hydropicis si frequentius post mortem inspicerentur, hæcenus nondum descripta & à plerisque incognita, deprehenderentur.

In totius corporis habitum serofus humor se ingerens, generalem illic intumescentiâ, in Leucophlegmatia illa excitat, quæ non solum crudo nutrimento, sicuti in hac causa explicanda, ab illo nasci ostendimus, sed & à seroso humore, vel minori vel pari, vel etiam maiori quantitate simul accedente, proficiat, scitur, in qua non solum partium substantia plus iusto aucta est, sed & sero irrigata mollior euadit, quæque impressionem facilius recipit, illiusque vestigium diutius retinet. Quæ tamen in pedibus, cum seru ob suam tenuitatem deorsum semper tendat, manifestius apparent, qui tunc cum asciticorum cruribus magnam habent similitudinem. Cui leucophlegmatæ serosæ, nomen illud Aquæ intercutis rectius, quàm illi quæ à solo succo crudo fit, attribuitur.

Prouentus verò huius serosi humoris, in iam dicta Leucophlegmatæ specie, non è ventris capacitate, ut in ascite, sed è venis in habitum corporis distributis procedit, quibus vnâ cum sanguine crudiore, dum ad partium nutritionem effertur, elabatur, atque vti ille

Serum in totius corporis habitum se ingerens causa Leucophlegmatæ serosæ

ille eas crudo succo alit, sic hic aqueo humore simul imbut. Cuius serosi humoris cum crudo permissionis causa, illius in venis nimia abundantia existit, quando cum ea imbecillitate viscerum sanguificationis, à qua sanguine non sufficienter elaborari, in Leucophlegmatiae simplicis causis ostendimus, causae prouentu huius serosi humoris simul producentes, concurrunt. Inter quas hic praecipua erit, Generatio illius immodica, quam in hepate fieri plerique contendunt, atque in secunda hac concoctione, ut serum naturaliter gigni, sic si iecur debilitatum vel refrigeratum fuerit, dum chylum non sufficienter excoquit, & in sanguinem penitus transmutat, in serum conuertere, illudque sic generare docent. Verum non hic serum, sed in prima mox concoctione gigni, suamque illuc formam statim sumere, vsumque mox praestare, haec comprobant, quod in ventriculo partim vna cum chylo, ex puriore succo genitum, portio ipsius fiat tenuior seu serosior, vti serum in lacte, eiusdemque cum chylo cuius pars est, sit usus, partim vero à redundante humore à potu & cibo humidior profectum, & in tenuiorem transmutatum, feri quoque formam nanciscatur, atque intestinis cum caeteris excrementis infusum, à venis meseraicis vna cum chylo, & sine eo quoque vti videmus aliquos mox potum nimium iterum mingere, raptum ad hepar, indeque vti dictum, in venam cauiam transferatur. Vnde copiosum feri prouentum, nimiae potationi, vsuique humidorum potius, quae materiam illi subministrant, quam hepatis noxae attribuire debemus, nisi crudiores succum quem ipsius vitio generari ostendimus, serosum, vti aliqui faciunt, appellare velimus; vel quia secretio feri, quae dum sanguinis elaboratio imperfecta, vti dictum, illic fit, ab eadem causa non decenter procedit, & serum proin sanguini, plus quam oportebat, confusum, nec ab eo, vti alias portio ipsius ex parte segregari solet, separatum, cum aquosior reddit, hac ratione serum hepatis causam, non quidem generari, sed in venis copiosius colligi pronunciare licebit: Et sic leucophlegmatiam illam aquosam hepatis imbecillitatis quoque

causam nasci statuere. Quod potissimum, tunc euenit, si insuper euacuatio illius naturalis, per vrinas non sufficienter fiat, renum facultate attractrice simul debilitata; vel si ex sudorum consuetorum suppressione, per quos alioquin serum se exonerare solet, serositas illa in venis in habitu corporis remaneat. Quae & sola causa, citra hepatis affectum, prouentum serosi humoris in venis potest efficere. Quod ed citius tum ab hac, tum alia causa fiet, si sumpta & bibita, materiam ex qua serum generatur, suppeditent. Quibus causis concurrentibus etiam leucophlegmatia quaedam, in qua serum crudum succum exsuperat, nascetur, vel quae ex solo sero proficiscitur, si hepatis desit, quae crudum succum gignat, imbecillitas. Quemadmodum etiam à solo potu copiose, nullo ducto spiritu, hausto, dum corpus vehementer calebat, & aestuabat, à calore humore illo subito in venas translato, indeque in habitum corporis attracto, aliquos intumuisse illico, vidimus: Vti & corpori calenti & sudanti, frigori exposito, seroque in habitum corporis represso, idem accidisse. Sed & nonnunquam euenit, ut sero è venis meseraicis, ob causas prius expositas, in abdomen eodem tempore, quo in habitum corporis fertur, influente, hydrops simul accedat ascites, geminaeque hydropis species, ascites & anasarca tunc coincidunt.

In certas corporis sedes serosus humor *Serum in* delatus, ibique collectus, particulares quoque *pedes ex-* tumores vel intumescencias excitat. Vt *tra hy-* quando in pedes citra hydropem ascitem, de *dropem* quo iam diximus, se ingerens, Intumescen- *ascitem* tiam eam, quae in tumore oedematoso se of- *se insi-* fert molliorem, & quae ad hydropicorum *nuans,* pedum intumescenciam nonnihil accedit, *causa* qualem in generibus descripsimus, gignit. *intumo-* Quod fit, quando vna cum crudo nutrimen- *scencia-* to, vnde oedemata prodire dicemus, ob cau- *rum illa* sas in Leucophlegmatia serosa expositas, *genita-* circa hasce inferiores sedes collectus, in pe- *rum.* des illabitur. Vel quando in morbis pedum, ut erysipelate oedematoso vel aliis, cum humonibus reliquis, haec excrementa in pedes feruntur, eosque morbos simul procreant, & discussis reliquis, illis aliquandiu manen-

tibus, etiam tumor remanet. Vel cum ex defluxione in oculos facta, in epiphoris, & lachrymis, palpebrae simul sero imbutae intumescunt, in Palpebrarum seu Oculorum oedemate dicto. Vel quando in aliorum morborum acutorum vel diuturnorum declinationibus, naturam quod residuum superfuit excrementorum, una cum sero deorsum in hasce sedes infimas exonerante, pedes post hosce morbos tumere incipiunt, eoque citius, cum quod per decubitum, longum pedes eleuati, cum ambulare incipiunt, deorsum spectantes, humorem facilius admittant. Quem tumorem pedum in conualescentibus, cum nihil inde mali sequatur, vulgo pro signo bono habet, quo loco & nos, quia reliquiae morborum sic expurgantur, habere possumus, qui & cum tenues eiusmodi humiditates mox iterum dissipentur, non diu durat, nisi talis sit, qui post morbum, hydrope sequente, in illius principio se primum in pedibus manifestat, multos ideo, qui bonum esse cessent, fallens, a quo tamen cum alia quoque hydropis accidentia tunc se offerant, facile distinguitur.

Sero in nudam tibiariū sedem diffusum causa particularis in eadem intumescit illuc genitum.

A solo quoque seroso humore, in nudam tibiariū longitudinis sede, in cutem & periossia diffuso, tumescit illam, qualem in quodam nos vidisse, in generibus exposuimus, progenitam fuisse, indicio fuit, quod subito facta, moxque iterum euaneuit, impressaque vi maiore in hac parte ossibus intrata, retinebat aliquandiu vestigia. Qui a natura ed, ob ipsius copiam, quod sudores perpetui quibus affligebatur, satis ostenderunt, & tenuitatem atque acrimoniā, unde pruritus quoque infestabat, propellebatur, accedente insuper laxa pedum ab hoc humore saepius irrigatorum, aliisque externis humiditatibus contracta dispositione.

Sero sub cute capitis collectio causa Hydrocephali.

In extimam corporis superficiei sedem aliquam sero effuso sub cutem, si eam a subiectis sedibus diuellat, spaciumque illud adimpleat, tumorem collectum illic excitabit. Vti sub crassa capitis tunica hoc interdum accidit, in Hydrocephalo dicto tumore, ob copiam serosorum & sicuti volunt pituitosorum excrementorum illic gigni solitorum, si illa non aliò defluxu, vel discussa subsistant, & co-

ceruata sinum sibi faciendo, cutem in tumorem hunc attollant.

In umbilici regione sub cutem sero quoque effuso, Hydromphalos gignitur, per venam umbilicalem dilatata ed translato, vel ob copiam illius in illa vena, vel alias causas, ductu hoc non arescente, sicuti & in hydrope hoc ob aquae copiam euenire diximus.

Sero in umbilico collectio causa Hydrophali.

In palpebras se insinuante seroso humore, illarum intumescencia prodit, quod facilius fit, cum lachrymae ad oculos effusa, ed quoque subsidere possint, adiuuante interdum oculorum frequenti frictione, cum facile pruriunt.

Sero palpebras irrigans causa in partium intumescencia.

Sub cuticulam sero quoque effuso, si eam a subiecta carne & venarum ed desinentium osculis, quibus continuatur, eaque occlusa retinet, separet, vesiculas illic Phlyctenas dictas procreat. Quod & fit, si sub alias externarum partium membranas, veluti oculorum externam tunicam adnatam, se ingerat. Cuius causa interdum quoque existit, serum redundans ed translato, atque quo minus per poros sudore exauriatur impeditum, & proin sub cuticulam effusum, eamque subleuans. Quod si falsum vel acre, naturam exfuscitans, in plures partes propellatur, Hydroas illas quae in scabiosis nascuntur, procreat. Sed & alia vis externa, per quam cuticula a subiecta sede auulsa, nondum tamen scissa, viam illi per quam sub eam exsudat, aperit, illudque quod illic in exilibus venis continetur, simul allicit. Vti per frictionem atque vstionem accidit, sicuti in doloribus qui tunc simul adsunt, vel vesicis ruptis superueniunt, vel scabie quam etiam inducunt, illic & in phlyctenis fuit expositum.

Sero sub cute uia seu membranam adnatam oculi profuso causa Phlyctenarum.

Flatus intumescitias & tumores aliquos enarratorum generum parit, variantes quoque, prout vel in abdominis cauo, vel scroto, vel ventriculo & intestinis, aut in aliis spatiis corporis continetur.

In abdominis cauitate collectus retentusque flatus, hydropis quem Tympanitem vocat, praecipua causa existit, cum rarius solus, sed una cum aquoso humore permixtus, hunc affectum inducat: Idque cum in abdominis cauitatem delatus, illicque coaceruatus, ventrem.

Flatus in abdominis cauo alium alium unde irrepsens vel illic genitus.

causa
Tympa-
nitis sim-
pliciter, vel
si cum a-
qua se
offerat,
composita
cum
ascite.

trem dilatat, & in immensum sæpe distendit, in quo flatum inesse, ex murmure & sono quem dum percutitur, edit, cognoscimus. Qui & dolore interdum ob distentionem membranarum subiectarum, lancinantem & punctorium simul inducit. Quos flatus in abdomen irrumpentes, cum alia non sint viscera in ventre inferiore, in quibus flatus tam copiose congeri possint, à ventriculo & intestinis prodire necesse est, à quibus si in abdomen illabantur, facile illud flatibus implebunt. Cæterum per quam viam hoc fiat dubium, nam per cæcos meatus ventriculi vel intestinorum eos erumpere, cum etiam tenuissimis membranis facile coercerentur, & humore tenuis facilius transsuderet quàm flatus erumpat, vix fieri posse videtur: dein & per solutionem aliquam continui manifestam in illis visceribus, eos non elabi, illud demonstrat, quòd tunc etiam chylus excrementaque alia ex illis simul, quod tamen non fit, prociderent. Itaque in oscula venarum meseraicarum, si ab intestinis vel ventriculo flatus in abdomen ferantur, eos primum se insinuare, atque ex venis meseraicis rursus eodem modo sicuti serosum humorem, inde quoque elabi diximus, in ventris spacium procidere, magis verisimile existit, quod & aqua ut dictum, cum flatibus in tympanite, in ventre plerumque permixta, hæc simul per eandem viam huc peruenisse, aliquo pacto comprobatur. Nisi alio pacto, quo aliqui quoque spectare videntur, flatus per intestinorum tunicam interioriorem in exterioriorem, penetrando illic mesenterium, ubi illi connascitur, se ingerant, atque inter duas illius tunicas coerciti, eas tandem permeantes abdomini inserantur. Quod siue hoc illòve modo fiat, quod tamen rarum est, unde & tympanites hoc pacto factus rarus, non nisi ex maxima flatuum copia, à qua intestina adeò dilatentur, ut attenuata ad extremum usque, eos transmittere possint, potest procedere. Idque nisi ita in intestinis sint còclusi, ut nullo pacto alium exitum supra infraque habere possint, facere non poterunt.

Horum verò flatuum redundantiam, ipsorum continua in ventriculo atque intestinis

generatio efficit, à summa illius imbecillitate procedens, calore suo debili in flatibus præraque quæ excoquere deberet, conuertens, à qua etiam hepate simul debilitata, si haec quoque causa accedente feri simul fiat proventus, ut in hydropse ascite docuimus, tympanites ex aqua & flatu commixtus, ut ferè fit, prodibit. Quod verò per intestina minime deorsum per naturalem exitum prodeant, summa obstructio vel intestinorum conuolutio efficit, cuius causâ colici dolores primum, cum alui constipatione, se offerunt, sicuti in illis affectibus, & à qua causa hæc prodeant, demonstratum fuit, illisque perseverantibus, si flatus in abdomen, ut dictum, ferantur, venter intumescere incipit, remanente ab initio adhuc colico dolore, aluique constipatione eousque, donec ex dilatatione continua, viâ patefactâ, flatus qui in intestinis erant, liberiores transitum consequuti; tantam vim non amplius adferant, quibus licet erumpentibus, qui tamen hi flatus qui extra intestina in vtre ventris inclusi sunt, vix dum prodeunt, venter distentus remanet, colicusque dolor in tympanitem conuertitur.

Ex soluta aliqua continuitate manifesta in ventriculo vel intestinis, ob summam hanc ex flatibus distentionem, vel aliam ob causam factâ, flatus in tympanite in spacium ventris interdum erumpere, fortè si eiusmodi corpora frequentius aperirentur, deprehenderetur, quod & hinc colligere possumus, quod cum omnium deterrima sit hydropis species, læsionem quoque magnam in ea esse oporteat, quæ in ascite si simili modo fiat, eum incurabilem reddit. Quæ soluta continuitas si tanta sit, ut & chylus faecesque in ventrem simul procideret, citius interimeret, si verò soli flatus vel aqua, quod & citra crassiora hæc corpora fieri potest, exeant, vita prolongabitur.

Præter hanc tympanitis causam, ab illapsu flatuum intestinorum in abdomen dependentem, alia à congestionem & generationem illorum in ipsa ventris cavitatem proficisci potest. Quod fit quando aquosus humor, quo abdomen interius semper madere diximus, copiosius quàm par erat, è venis

meseraicis, sicuti ostendimus, transsudās vel oscula penetrans, illic collectus, in flatum resoluitur, qui postea retentus, cum illi nō pateat exitus, cumulusque, Tympanitem tandem producit. Qui si totus humor in flatum abeat, quod vix fit, purus & simplex erit, si verò portio aquae adhuc remaneat, ex flatibus & aqua compositus, vti frequentius fit, erit. In quibus speciebus si aqua non ad eō redundet, nec in pedes nec aliō ex ventris cavitare decidat, neque etiam alibi extumescantiam faciet, neq; in abdomine ad eō deprehendi poterit. Quod si verò tanta illius remāserit copia, nouā cōtinuō affluente, vt tumor ille ventris prāter tensionem, etiam fluctuationē aquae labentis in latera si eō corpus inclinet, aegro adferat, & deorsum quoq; subsidens pedum tumore simul proferat, Tympanitem asciti coniungat. Causa verò huius conuersionis aquae in flatū (cū illa quae eam in abdomen promouet, in ascitis causis fuerit explicata) calor viscerū interiorū esse potest, hanc aquā in vaporem seu flatum crassiores resoluēs. Sicuti vbiq; hac ratione in corporis spaciis ex humiditatibus illic cōtentis in flatum resolui, illicq; flatuum prouentum procreare potest.

In scrotum vti aquam ē ventris cavitare, in hydrope ascite, deferri, tumoremq; illius vel extra eum, hydrocelen excitare in seroso humore ostēdimus: Sic & flatus ex eadem ventris capacitate in scrotum descendens, atq; illud inflans, Pneumatocelen parit. Quod in tympanite accidere nunquam vidimus. Vti & per se hoc rarum quoque, & quando fit, aqua ferē subest. Frequentius verò flatu eō delato, Inflatio scroti illa sequitur, quae in colicis cruciatibus & conatibus aliquando suboritur, moxque iterum euanescit. Ceterum vtriusque causa à dilatatione processus peritonaei semper dependet, eaque leuiore, si per eam flatus tantum solus, vel cum pauca humiditate erumpat in scrotum, sensimque illic colligatur. Quae dilatatio in pneumatocèle à variis causis in herniis expositis, potest accidere, praesertim in tenerioribus puellorum corporibus, qui huic affectui, vti & rupturis, ob clamores praecæternis obnoxij sunt, quem Diastim Germani

vocant; eoque facilius, si flatuum in illorum abdomine sit prouentus, quemadmodum citra tympanitem, illic etiam in sanis aliquin ex humore, in eos resoluti, gigni solent, sicut in omnibus corporis spaciis hoc fit, & tympanitem quoque eo modo prodire posse ostendimus, qui licet non abundant, sponteq; dissipentur, tamen si pateat hic in scrotum desinens meatus, eō sensim perferruntur. Qua ratione etiam inflatio haec non diu durans scroti, à conatibus illis validis processum illum per vim dilatantibus, flatibusque per eum erumpentibus, proficiscitur, per quem tamen mox iterum cessante hoc impetu, flatus remeantes in ventrem, scrotum detumescit, nec inflatio haec processu eo se rursus recolligente, nisi noua vis accedat, redit.

In intestinis & ventriculo retenti flatus, *Flatus in intestinis, & ventriculo retenti, causa Tympanitis intestinalis.* nec dum in spacium abdominis procident, non solum colicos cruciatibus pariunt, sed & si adeo inclusi sint, vt nullo patente exitu, ea in immensum adeo attollant, vt totus venter inde distentus appareat, Tympanitis quoddam genus, & forē frequentius quā aliud, quod illis in ventrem erumpentibus, fieri communiter docent, procreare possunt. Sicuti in illis quos tympaniticos esse putabant, deprehendimus, flatum nullum in sectis post mortem ē ventris cauo erupisse, nec vetrem subsedisse, sed intestina, tenuiora praesertim, adeo flatibus distenta & conuoluta profiluisse, vt in eundem ventrem reponi amplius minimē nequirent, mirumque fuerit, quo pacto in ventre prius clauso adhuc contineri potuerint. Quae & in quodam adeo attenuata ex summa illa dilatatione reperimus, vt non solum tenuissimae vesicae instar vento inflatae & dilatatae pellucida essent, sed & compressione aliquā disrupta, stercora cum flatibus procul effunderent. Cuius tympanitis causa non alia, ab ea quae & alterius existit, flatuum scilicet prouentus, atque intestinorum conuolutio vel insignis obstructio, vti prius ostensum, vnde & in hac specie, nec flatum nec quicquam per alium, longo saepe tempore egerunt.

In ventriculo collectus flatus, cum distendo, *Flatum*

in ventriculo tentum, causa Inflationis ventriculi in intestinis Tumoris in colico dolore prominenti.

dendo, in tumorem qui etiam foris in illius regione prominet, attollit, Inflationemque dictam ventriculi parit, cuius causam in Ventriculi affectibus in hoc casu exposuimus: Vti & si flatus in certis intestinorum anfractibus, vel cellulis hærens, illis in locis in ventre prominentias pariat, in Colicis doloribus qui tunc potius vrgent, causæ declaratæ sunt.

In spacia alia corporis, quæ partes cohærentes intercedunt, flatus nonnunquam, nunc soli, nunc cum sero iuncti, irrupentes, illisque inclusi, extuberantiam aliquam vel tumores pariunt: Vt cum sub cutem vndique delati, Intumescantiam illam generalem corporis, quæ interdum subito quoque inuadit, cutemq; distendendo à subiectis sedibus aliquousq; eleuat, procreant; qua ratione per foramen in cute factum, aërem inflando coturnicum cutem, vt melius deplumari possint, distendere vulgò solent. Eiusmodi autem intumescencia et si rarius eueniat, vixque possit vndiq; corpus hoc pacto inflari, tamen aliquando quoque contingit, vt natura, vel copiâ flatuum, hinc inde in spaciis diuersis corporis collectorum, maxime si feri quoque accedat abundantia, offensa, hæc vno veluti impetu, in morbis quibusdam, vel etiam extra hos si redundant, aut alia accedat simul causa, eam sollicitas, in extimam superficiem sub cutē excutiat. Quod & si à veneno sumpto, vel per istum bestiarum, immisso, aut in corpore genito natura similiter irritata, cum illud expellere nititur, euenire potest.

Peculiares quoque tumores & intumescenciae apparentes, à flatibus sub cutem ab iisdem causis erumpentibus, certis in sedibus nonnunquam prodeunt. Qui si simplices sint, Phlyodes dicuntur: Quod & phlyctenæ flatulentæ referuntur; si verò hoc fiat crudo nutrimento, vel seroso humore simul accedente, Oedemata erunt, vel Intumescencia, flatulenta tunc dicta. Quæ vti sponte oedematum instar à causa interna in variis corporis locis prodire possunt, sic & ab externis aliquando oriuntur. Sicuti tractis nimium capillis, cutem capillis eo in loco subleuatam, succedentibus flatibus aliquan-

diu inflatam permanere videmus. Atque ex frigore, cutem constringente, atque sic eleuante, tenuesque humiditates exprimente manus, & pedes intumescere.

Sub cuticulam si ferantur, eamque in vetricam attollant, sero mox exsudante, Phlyctenæ fiunt, iam non simplices sed flatulentæ dictæ.

In musculorum externorum inuicem incumbentium spacia si ferantur, illic quoque prominentias, quam diu hærent, Spasnumq; flatulentum dictum simul procreant, in quod causas illius exposuimus.

Sub alias membranas externas, vel periosita in nudis ossium sedibus si flatus se insinuent, tumoremque illic excitent, cum ille dolori iungatur, in doloribus illis, à flatibus genitis, causæ horum sunt explicatæ: In alias verò sedes interiores, vel cauitates, vt thoracis, capitis, vteri, cum alia potius accidentia procreet, quam tumores manifestos, de quibus hic agimus, in illis horum facta est mentio.

Sub cutem membranamque generalem cuti substratam adnexamque in colli anterioribus, flatum irrupentem, tumorem illi, quem Bronchocele vocant, progignere, illud indicare videtur, quod in ea colli sede cutis eleuata & distenta appareat, & cum pulsatur, sonum aliquem, ac si aer tantum subesset, edat. Cuius aeris seu flatus collectionis eo in loco non aliam causam esse existimo, quam laxationem seu auulsionem cutis, cum membrana illa, quæ per colli eam sedem expansa, crassior illic & rubicundior, quam alibi, à subiectis asperæ arteriæ musculorumque colli anteriorum sedibus, spaciumq; illic eo modo efficientis, in quod ob fugam vacui aer seu flatus è vicinis locis irrupens, illud non solum implendo, cutem membranamque in tumorem eleuat, sed & continuatione distendens, in immensum tandem adauget. Vnde non tam flatu, quam eiusmodi diuulsionem partium inter se fibris naturaliter cohærentium, causam huius intumescenciae statuimus, quam & merito ob id, causâ huius separationis membranarum ab inuicē, ad rupturas seu herniam bronchocele, quasi rupturam seu herniam

Flatus sub cuticulam delati, causa Phlyctenæ flatulentarum. Flatus in musculorum spacia irrupentes, causa Spasmi flatulentæ.

Flatus sub cutem membranarumq; colli irrupentes, causa Bronchoceles.

Flatus sub cutem certa loca erumpentes, causa Tumoris atq; Intumescenciae quæ Phlyodes & Oedemata vocant.

gutturis, vel circa guttur factam, appellantur. Licet plerique hunc tumorem à pituita à capite eò delapsa prodire censuerint, à qua tamen non fieri, vti neque ab illius congestionem, quod verisimilius esset, si à pituita nasceretur, tumorensus, nec impressum seruans vestigium, satis demonstrat, vti & illud, quodd neque à seroso humore prodeat; Qui & duo humores, si affectum hunc gignerent, & tam diu in hoc diuturno affectu ad dies vitæ vsque nonnunquam perseverante, illic continerentur, putrescentes alias insuper læsiones, quas tamen minimè sentiunt, procrearent. Atque dyspnœa illa & raucedo quam patiuntur, non ab incumbente humore, sed à tensione illa quâ laryngis liberior motus impeditur, proficiscitur. Non negamus interim defluxiones vti in omnia spacia perferri possunt, etiam in hoc affectu aliquando eò delabi, humiditatesque aliquas excrementitias illic quoque congeri, sed tumorem hunc tamen minimè hæc efficere, cum illis humoribus iterum vt in reliquis defluxionibus & congestionibus discussis, tumor nihilominus remaneat. Ceterum causam huius auulsionis membrarum præcipuam esse, conatum illum vehementem, quem spiritum retento, dum excrementa vel foetum excludere nituntur, vel buccas inflando ad flatum fortem exsufflandum obeunt, non solum quod inde subito hoc euenisse viderimus, maximeque in partu, comprobatur, sed & venarum iugularium colli tumor, qui in conatu hoc se quoque offert, aliquomodo ostendit, à quarum venarum non solum cutanearum maiorum iugularium, sed & vicinarum aliarum arteriarum substratarum, in hoc conatu valido vel sæpè & diu continuato, membranae quibus intextæ sunt, eo vt dictum modo tandem, quod tamen rarò fit, separari possunt, & cum spiritus per eum in venis & arteriis ad eò sursum in collum propellatur, sine dubio & flatus in spaciis hinc inde contenti, inter cutem & membranas eò quoque propulsi, hac ratione quoque diuulsionem hanc possunt efficere, vel promouere.

Pars aliqua è sua sede, procidens, extrorsumque delata, tumores Herniosos Celes

nominatos parit, estque hæc vel intestinum aut omentum, quæ hoc faciunt, quando è peritonæi cauitate sub cutem; vel in scrotum prolabuntur. Cuius procidentia causa, cum vnà cum reliquarum partium veluti vteri & podicis prominentis commodius explicetur, nos in excretis tum huius tum aliarum procidentiarum, causas simul explicabimus.

Curatio.

Extuberantiarum diuersorum generum curationem distinguemus, primum ratione causarum, à quibus hæc prodeunt, nimirum quatenus intumescentiæ vel tumores eiusmodi, potissimum originem trahunt; Vel ab humore pituitoso, quem nos crudum succum vocamus, vel seroso, vel flatu; Aut à succo nutriente, illisque vel separatim, vel inuicem permistis; Vel prout tumores à lacte vel à sanguine aut semine proficiscuntur. Quod verò illos tumores attinet, qui à parte aliqua prolapsa procedunt, & Celæ nominantur, cum in illis partium harum aliqua fiat è sede sua, vel è corpore excretio, nos curationem eorum in reiectis, vbi de procidentis agemus, quippe qui etiam ab intestinorum & omenti procidentia proueniunt, cum reliquarum partium procidentis proponemus.

À crudo succo seu pituitoso humore vt vocant, præcipue pronatarum intumescen-
tiarum & tumorum curatio, accommodatur primum generali totius corporis intumescentiæ inde natæ Leucophlegmatia; Postea particulari certarum partium tumori, Oedemati.

Leucophlegmatia si simplex sit, etsi totum corpus in ea tumidum fiat, in ascite verò solum venter & pedes, tamen facilius quam ascites sanatur, cum minor hic sit viscerum læsio, imbecillitasque hæc illorum crudum sanguinem gignens, corrigi possit; difficilius si in ascite tendere videatur, & vix dum si illi iam copuletur. In senibus ægrè amplius sanatur, etsi diu sæpè protrahatur.

Instituenda curatio eo serè modo, sicuti in cachexia, cum hæc illius sit principium, & ab eadem causa in hoc affectu aucta & diutius remanente, dependeant: hepatisque & lienis

Leucophlegmatia curatio.

lienens imbecillitas corrigenda, causam primum amouendo, si à nimio fluxu mensium, hæmorrhoidum aut aliâ hæmorrhagiâ processerit, dein viscera hæc roborando. Si obstructio adfit, ea aperienda soluendaque, aperientibus & abstergentibus iis, quæ moderate illud, si fluxus aliquis adhuc adfit sanguinis, ne nimium illum concitent, efficiât; vel validioribus, si ab eo non sit periculum, quæ simul & menses si hi suppressi sint, commouere possunt; hæcque omnia internisq; remediis perficiuntur. Euacuandi interim semper crudi humores & aquei, qui in primis viis, ventriculo, intestinis & venis, dein etiam in corporis habitu coaceruantur, tum purgantibus per aluum, tum per sudores & urinas exhibitis: Tum etiam extrinsecus admotis, locis maximè tumentibus, quæ materiam corporis partes imbuentem, discutendo absumendoque exhauriant. In leucophlegmatia verò, in qua simul feri copia coaceruatur, vel ea cui ascites iungitur, curatio ferè eadem quæ asciti, in educendâ absumendaque aquâ debetur, causæ interim ratione, remedia huic quoq; accommodando. Cæterum remedia quæ in curatione anasarcae usurpantur, sequenti modo erunt dirigenda.

Purgationes instituuntur ad ventriculum potissimum repurgandum à cruditatibus, & obstructions referendas, abstergentibus & purgantibus, sicut in cachexia eiusmodi purgationes descriptæ sunt, admittis hydragis, si serosa sit leucophlegmatia, sequentibus modis.

Decoctum: R. rad. Aperitiuarum iij. vel v. an. z. j. rad. Iridis, Enulæ an. z. β. rad. Afari z. ij. cort. rad. Cappari, cort. medij Fraxini, cort. Tamaricis an. z. vj. Liquiritiæ z. j. β. Cichorii cum radice, Endiu. Chamæpyth. Capill. Veneris, Eupatorii, Fumariæ, Lupul. an. m. j. Absynthij, Thymi an. m. β. florum Sambuci, Genistæ, Tamaricis an. p. j. Passul. enucleat. paria x. femin. Anisi, Fœniculi an. z. j. β. femin. Endiuæ, Portulacæ, Cuscutæ an. z. j. feminum quatuor frigid. Maiorum z. ij. Polypodij z. j. β. foliorum Sennæ z. ij. Epithymi z. β. fiat decoctio, & in colatur. infunde Agarici trochisc. z. iij. Rhabarbari z. β. fiat expressio, adde sy-

rupi Rosarum solut. z. ij. vel succi Rosarum z. j. Sacchari q. s. fiat Apozema pro v. vel. vj. vicibus, aromat. Cinamom. Spicâ, Schœnantho & Santalis. Quod si per vices eo vti magis conueniet, fiat Syrupus auctâ quantitate Sacchari, mediæ vel perfectæ decoctionis.

Huic syrupo quoque addi possunt in serosa præsertim leucophlegmatia, folia Soldanellæ, vel Mercurialis, semen Carthami, &c.

Vinum: R. rad. Cichoreæ z. j. β. rad. Fœniculi, Iridis an. z. j. rad. Enulæ z. β. rad. Afari z. ij. corticis Tamaricis z. j. Absynthij, Chamæpyth. Eupatorii, Thymi, Epithymi ana z. ij. summit. Centaur. minoris, florum Cordial. seminis Apij veri seu Petroselin. Fœniculi ana z. j. foliorum Sennæ z. j. β. pos. sunt & addi fol. Soldanellæ z. j. Agarici trochisc. Rhabarb. elect. ana z. iij. Spicæ z. j. Infundantur in Vini f. q. Pro quinque dosibus.

Potio communis: R. Rhabarb. z. iij. Agarici troch. z. j. Spicæ gr. vj. macerentur in Vino albo, & postea affusâ aquâ Absynthij vel Centaurij, fiat expressio, adde aliquantum syrupi rosar. solut. vel alterius elect. solutiui, si fortiorem esse velimus, vel cum decocto alicuius Medicinæ, vel in serosa, cû decoctione Mercurialis vel Soldanellæ, fiat potio.

Pilulæ, Electuaria, Tabulæ purgantes in Cachexia descripta, hic quoque locum habent, addendo simul quæ aquas ducunt in serosa leucophlegmatia.

Clysmata quæ feces educant, stimulent & abstergant, flatusque discutiant, locum quoque habent. Quale hoc erit: R. herbarum Emollitiuum vel quatuor ad m. iij. Mercurialis vel Betæ, Pulegij, Calamentæ an. m. j. florum Chamomillæ, Sampfuci, Centaur. min. an. p. j. rad. Iridis, Enulæ, Afari an. z. j. feminum Fœniculi, Carui vel Cimini an. z. ij. fiat decoctio in aqua vel decocto Hordei seu Cicerum, dissolu. in f. q. Benedict. Laxat. vel Hieræ z. β. olei Rutacei, Anethini an. z. j. β. Salis parum, fiat Clyster.

Possit in decocto etiam addi Absynthium, Maiorana, Chamæpythis, flor. Rosmarini, Steechados vel Lauandulæ, Genistæ. Item Agaricus trochisc. & in eo dissolui Muria, Urina Lixiuum, atque alia quædam laxatiua & Olea.

Abstergēs Clyster min⁹ operosus: R. Vrinae pueri ℥. j. cui & Lixiuum addi potest, olei de Lilio vel Chamomill. ℥. ij. fiat Clyster.

Vomit⁹ ventriculū repurgando, vbi principium cruditatis est, ad eam impediendam cum cæteris adiuuat; Qui promouetur iisdem quæ in ventriculi affectibus dicta sunt.

Venæ sectio, si menses retenti sint in foemineo sexu, vti ferè fit, illorum prouocandorum causâ in pedibus fieri potest. Aliàs etiam in consuetis & crudo sanguine repletis, si concedatur, cum per eam illius portionem euacuari nobis cum effluit crudus, maximeque cum conrescit talis apparens ostendat, prodesse eo nomine, vel saltem non multum obesse poterit, cum si non nimium largâ fiat, aded viscera refrigerare nequeat.

Sudorum prouocatio, cum multum absumat de aquosis humoribus, tam ex habitu corporis, quam è venis, cõuenit admodum, per eosque sæpè tumor mox decrescit. Qui, si ferri possint, Exercitiis eliciendi, adhibitis frictionibus indies, repetitis vicibus; quæ & solæ materiam discutiant.

Vel prouocantur per vices exhibitis, vt decocto Gaiaci, addito Sassafras, cum fœnula ceum habeat saporem: Vel aliis non tamen immoderati⁹ hoc mollientibus.

Vel datur hoc decoctum: R. seminis Milij excort. ℥. ij. Aquæ fontan. ℥. ij. coquantur donec quatuor vel quinque vnciæ supersint, huic colaturæ adde Vini albi tantundem; Bibat hydropicus calidum mirè sudores elicit.

Syrupus S. Ambrosij nominatus, simili ferè modo paratus, exhibitus, idem efficit, puerisque hydropicis gratus & vtilis.

Sudatorium aliud: R. Theriacæ ℥. j. β. Calami aromat. quartarium j. decoquantur bene tecta in Mens. j. β. Vini rubri ad cõsumpt. tertie partis: Bibat noctu cubitum iturus haustum, calidè, & totidem manè; sudet.

Aquas theriacales aliqui quoque propinant.

Rob. de Sambuco & Ebulo vulgus vsurpar, dissolutum cum aqua conuenienti, quæ cum decocto Milij, vel aqua florū Iridis, vel Cardui benedicti sumi possunt.

Alterantia ad viscera roboranda, obstructions soluendas, & vrinās promouendas, vt per eas quoque aliqua fiat ab hisce visceribus euacuatio, dein & ad durities, si illæ quoq; adsint; vti aliquando in ea quæ asciti copulatur, emolliendas, varia exhibentur. Qualia pleraq; in cachexia in alterantibus, copiosè, & quo pacto hæc pro ratione causæ diuersitatis sint dirigenda, sunt exposita. Seligenda è singulis, cum magis pertinax sit leucophlegmatia quàm cachexia, efficaciora scopoq; accommodatiora, tum ex illis quæ bibantur, vt decoctis, syrupis, succis, vinis, aquis stillatitiis, oleis, lixiis, vrinis, aquis naturalibus, inter quas tamen aquarum atramentosarum diuturnior & copiosior potus, non nisi diligenti cautione adhibita, concedendus, & si ventriculi vel hepatis magna adsit imbecillitas vel refrigeratio, inhibendus. Item ex illis quæ in substantia sumuntur, veluti quæ in cibis vel condimentis, conseruis, pulueribus, speciebus vsitatis, vel aliis mistis potionibus, electuariis, pilulis exhibentur, è singulis conuenientia desumenda, hæcque etiam vsurpanda.

Quibus & sequentia subiungi poterunt, in quibus & ventriculi, vt illius quoq; concoctio promoueat, cruditæque vitetur, habetur ratio.

Decoctum conueniens: R. radicū Aperitiu. aliquarum ad ℥. j. β. Filipendulæ ℥. j. herbarum Eupatorii, Capillarium, Chamædr. Chamæpyth. Cuscutæ, Maioranæ an. M. j. Hyssopi M. β. sem. Anisi, Fœniculi an. ℥. j. florū Sambuci p. j. fiat decoctio, addendo parum Vini, aromat. Cinamom. Spicæ, Schenântho, addendo Saccharum, fiat Apozema; Pro aliquot vicibus. Si simul laxandum, additur sem. Carthami & Polypodium.

Vinum ex infusione horum fieri potest, & illius loco vsurpari.

Vel hæc decoctio à quibusdam experta: R. granorū Iuniperi ℥. β. rad. Enulæ, Bryoniæ an. ℥. β. herbarum Thymi, Maioranæ, summit. Rosmar. Rutæ, Anthemisiæ an. M. β. coquantur in ℥. iij. Aquæ, dulcoretur, aromatiferetur: Bibat aliquoties.

Aliud: R. Rhapontici ℥. ij. herbarum Absynthij, Marrubij, Ceterach. ana M. j. co-

quantur in Aqua & Vino, ad consumpt. tertiae partis.

Aut decoquatur hoc pacto radix Acori veri, Pulegium & Hedera.

Syrupus de Absynthio inter alios, cruditis causâ probatur, vti & de Betonica, qui ex succo illius cum saccharo decoctus fit.

Aquæ item Absynthij & Betonicae eodem nomine, cæteris aperientibus mistæ probantur: Vti & Enulæ, Maioranæ, Mentæ, &c.

Pulveres stomachici aperitiuis quoque miscentur; Diacalamenti, Diagalangæ, Aromat. ros. & Cordiales imbecillitate viriû, de Gemmis & similes.

Ad concoctionem iuuandam, & pulveres post cibum sumendi, post pastum nominati, quandoque assumuntur.

Conseruæ & condita Betonicae, Acori veri, Zingib. Maioranæ, Stœchados, Rosmarini, Corticum citri, concoctionis causâ, & virium Buglosi vtriusque, hisque affines, cæteris miscentur.

Vel fiat talis: R. Conseruæ flor. Cichorij, confer. rad. Apij, an. 3.j. conf. rad. Iridis, conf. Maioranæ, florum Betonicae & Buglosi an. 3.ß. Laccæ 3.ij. Coralli 3.ß. Cinamomi 3.j. Galangæ, semin. Fœniculian. 3.ß. Spicænar. 3.ß. cineris Intestinatorû & pellicularû Ventriculi gallinae 3.j. cum syrupo de Radicibus vel alio, fiat electuariû: Capiat superbibendo aquas. Si hepar Lupi præparatum addatur, magis appropriatum esse creditur.

Vel: R. Conseruas prædictas, addendo specierum Triasantali vel Diarrhodon 3.ß. Diagalang. Dialaccæ an. 3.j. cinerum pellicul. ventriculi vel intestinatorû Gallinae 3.j.ß. misce: Pro electuario.

Electuariû vel mistura utilis: R. radic. Ireos 3.ij. Amygdal. amararum 3.j.ß. feminis Anisi, Fœniculi an. 3.j. Sacchari ad pondus omnium, fiat Mixtura.

Pilulæ efficaces quæ & menses si suppressi sint, provocant, vrinas ducunt & durities emolliunt: R. Rhabarb. 3.j.ß. rad. Gentianæ, Aristolochiæ, Rubiæ, Costi amar. an. 3.j. sem. Apij, Ameos, granorû Iuniperi an. 3.ß. Squænanthi, Spicæ an. 3.j. gummi Lacce 3.j.ß. cum succo Ireos vel Eupator. fiat massula pilula-

rum, vel additis Amygdalis amaris, fiant trochisci.

Aliæ adhuc efficaciores: R. Rhabarb. rad. Rubiæ, Valerianæ, Afari an. 3.j. foliorum Sabinae, Maioranæ, seminum Apij veri & Paludapij an. 3.ß. Spicæ 3.ß. Cantharidû abruptis alis tenuioribus n. xij. Gummi ammon. diss. in Aceto fortiss. 3.j. cum syrupo de radicibus fiat massa: Capiat à 3.ß. ad 3.ij. superbibendo parum decocti Cicerum & semin. Melonû.

Vel: R. puluerem prædictum cum Gummi dissoluto, adde Amygd. amar. excort. 3.j.ß. feminis Melonum mund. 3.ij. & cum syrupo de Eupatorio, vel radicum, vel syr. Ireos fiat electuariû: Capiat 3.j. superbibendo decoctum Cicerum & Petroselinum.

Externa remedia hepatis vel lienis affectionum causâ, eadem quoque in cachexia declarata sunt, in hoc casu competere possunt, tam inunctiones quàm emplastra, fomenta & aliæ applicationes, eligendo ea pro ratione causæ. Quibus & ventriculo quoque accommodata addi possunt sequentia.

Epithema hepatis regioni applicandum: R. rad. Apij 3.j.ß. rad. Afari 3.ß. Absynthij m.j. flor. Buglos. Borræ. Sambucian. p.j. seminû Cuscutæ 3.ij. Endiuæ Acetosæ an. 3.j. Santal. omnium an. 3.j.ß. Spicænar. vel Castiæ lign. Squænanthi an. 3.ß. decoquantur in Vino & Aqua: Pro fotu regionis hepatis.

Potest & Cerato santalino illiniri regio hepatis.

Ventriculus ad cruditates impediendas sic inungatur: R. olei Absynthini, Mentæ an. 3.j. olei Mastichini vel Cydoniorum & Nardini an. 3.ß. Mastiches 3.ij. Santali, Cypri an. 3.j. Garioph. 3.ß. Ligni Aloës 3.j. Ceræ q. s. fiat Vnguentum.

Vel inungatur oleo Nardino composito.

Emplastrum ad idem fit, miscendo prædictis, pulu. Absynthij, Mentæ, Mastiches, atque inspissando augendoque Ceram, addendo Galliam moschi. Vel vtatur emplastro pro stomacho.

Ad tumida loca, vt subsideant, nonnunquam applicantur quædam discutientia, & si serosus humor redundet, eum absumentia, multaque ex illis quæ in ascire exposita sunt, conuenientia: Veluti sequentia.

Balneis humidis & siccis seu stuphis sudor quoque elicitur materiaque absumitur, tumidaque partes subsident, maiori que successu hic quam in ascite vsurpantur; Ex iisdem, vti illic ostensum, parata.

Immersio corporis vniuersi, capite dempto, in arena vel cineribus, vt in ascite, hic quoque maiori fructu operabitur.

Fotus partium tumidarum ex lixiuio, vti illic quoque demonstratum, conuenit.

Fasciis in Lixiuio vel Oxy-melite madefactis inuoluantur partes tumidae diebus aliquot.

Cataplasmata ex stercorebus vt dictum prae parata idem praestabunt.

Sacculi illic quoque positi applicari possunt, additis etiam aliis discutientibus calidis.

Regimen quod attinet; Aer sit conueniens, temperatus, non vdius sed siccior potius.

Cibus: euchymus, eupeptos; conditus calidis: exiccantibus. ventriculo accommodatis.

Carnem ericij, comestam leucophlegmaticis prodesse scribunt.

Vigiliae, affectus animi siccando, prodesse creduntur, sed debilitando plus obfunt.

Oedematis, Oritus moris oedematis curatio. Oedematata ea quae circumscripto tumore; maxime circa genua & humerum se offerunt, quam ea quae diffusio nec ita collecto per pedes aut brachia tumore, oedematoso dicto. occurrunt, à succo crudo simplici vel sero permixto progressa, difficulter, cum sit substantia carnis: aucta, cedunt, saepeque ad dies vitae permanent.

Quorum curatio, per generalia in quibus totius corporis habetur ratio, remedia, & particularia tumoribus: tantum hisce accommodata, perficienda.

Generalis cura, quae totum corpus respicit, pro ratione causae dirigenda, vt crudilius: sicci prouentus impediatur, qui si vitio viscerum concoctioni destinatorum, vt ventriculi hepatis: vel lienis generetur, tunc quia cachexia simul iuncta erit, quae particulares potius eiusmodi tumores in peculiaribus partibus erumpentes, quam generalem totius corporis in anasarca, vt alias facere solet, parit, curatio ea quae in cachexia exposta fuit, primum erit instituenda, atque

viatus ratione idonea euacuationibusque decentibus, per aluum per sudores factis, vti illic ostensum, perficienda, viscerumque imbecillitati aut morbis aliis occurrendum, antequam particularem curam huic tumori adhibeamus. Quod si verò succus ille crudus oedematata haec proferens, ex partis quam occupat & nutrit, mala constitutione illic congestus prodeat, tunc habitā saltem ratione corporis constitutionis, vt laudatus sanguis gignatur, corpusque purum sit, unde facilius curatio procedit, generalis cura erit particulari praemittenda.

Particularis cura quae oedematibus accommodatur, perficitur ab initio & in augmento illis, quae succum, haec loca nutriendo auctiora reddentem, astringendo premendoque repellant, sicque incrementum impendant. Atque vbi oedematata iam nata fuerint, quae siccando digerendoque eum absumant, sicque tumores hosce dissipent, additis illis quae praeterquam quod id praestant, partem imbecilem & laxā simul roborant: Vel quae per manifestas aperturas nutrimentum ipsorum: exhauriant: Vel si in abscessum desinant, quod rarius fit, quae eum maturent, maturumque aperiant, tandemque vt vlcus, sanent: Quae omnia sequentibus peraguntur.

Adhibemus fotus oedematibus, vel balnea si amplum spacium occupent, vt partes illis immergi queant.

Fiuntque ab initio fotus ad repellendum cum spongia, quae si recens haberi possit, magis astringere creditur, immersa in Posca hoc est Oxycrato.

Vel cum Aceto fortissimo cōtemperato cum Aqua extinctionis ferri, aliave astringente.

In progressu fiat fotus ex Aceto & Lixiuio, vel Aquā falsā arte factā, vel à natura productā.

Postea vbi tumores iam excreuerunt, Aqua falsa sola, vel Nitrosa thermarum conuenient, in qua immergantur partes oedematosa, vel foueantur.

Vel fiant haec ex Lixiuio transcolato per cineres communes, vel fermentorum Vitis, aut ligni Quercus, Illicis, Fagi, Salicum, Ficus: vel Oisium combustorum.

Fortius, fit, si Alumen, Sal vel Nitrum in

eo dissoluas, vel illi incoquas: Nonnunquam & Acetum addas.

Digeret simul partemque roborabit, si de plantis sequentibus aliqua incoquantur: Veluti rad. Ebuli, Acori veri, Lapatij, ex herbis odoratis, Saluia, Rosmarinus, Maiorana, Betonica, Lauri folia, Calamenta, Origanū, summitates Iuniperi, Ruta, Sabina, Arthemisia, fl. Lauandule, vel Stœchados, Chamomillæ, semina Lupinorum, Fabæ, baccae Iuniperi, conquassata, alix ve arthetica calidè.

Vnguenta post forum adhibentur; sitque tale repellens à principio: R. Boli vel Terre alt. pingui. ʒ. ʒ. Aloës ʒ. iij. Acaciæ, Sanguinis draconis an. ʒ. iij. rad. Cyperi ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. Aceti ʒ. j. ʒ. olei Rosacei ʒ. iij. Terebinthinæ q. s. fiat vnguentum, vel additâ cerâ, Cera-tum.

Aliud in progressu admouendum: R. Sulphuris viui ʒ. iij. Salis gemm. ʒ. iij. Cinerum communium vel pecuariarum plantarū ʒ. j. farin. Fabarum ʒ. iij. Aceti fortif. ʒ. j. olei Nucum & Terebinth. q. s. fiat Vnguentum. Potest & addi succus Caulium.

Emplastrum etiam quod tumorem vniuersum complectatur gestandum: R. Ladani ʒ. j. ʒ. Thuris ʒ. j. Styraçis cal. ʒ. ʒ. Sulphuris viui ʒ. vj. Aluminis, Salis nitri an. ʒ. iij. pulu. Vsinæ quercinæ, Istidis, Cinerum communium vel prædict. an. ʒ. j. rad. Acori, Spicæ an. ʒ. ʒ. Croci ʒ. j. stercoris Vaccini exic. ʒ. iij. puluis omnium excipiat Aceto, & cum parum rursus siccatus fuerit, adde Tereb. facis olei Rutacei vel Liliorum, fiat emplastrum.

Vsitata sunt emplastra ad hanc rem, Diachylon ireatum, Ceroneū, Diachalcytheos.

Cataplasma digerens tale fiat: R. rad. Liliorum vel Altheæ, Bryoniæ an. ʒ. iij. rad. Cucum. asinini ʒ. ij. rad. Ebuli, Lapatij an. ʒ. j. foliorum Saluiæ, Rutæ, Tamaricis, vel Salbinæ an. ʒ. j. coquantur in aqua Pluuiialis & Vini æquis partib. addendo sub finem Aceti ʒ. iij. contrundantur, adde farinæ Fabaceæ vel Orobi ʒ. ij. farin. Lupinorum ʒ. j. Cinerum supradict. pro lixiuio ʒ. ʒ. Stercoris vaccæ exiccati ʒ. vj. Salis ʒ. ʒ. Fermenti ʒ. j. ʒ. Axungie porci ʒ. iij. olei Chamomeliæ, Cheiriana ʒ. iij. fiat Cataplasma.

Possunt hisce quæ decoquuntur addi etiam Limacum caro; Item succi loco plantarum illarum, vt Ebuli, Lapatij, aliiv vt Fœniculi.

Sacculi discutientes etiâ adhibiti, aliquid præstant, pulueribus idoneis referti. Vel asperguntur pulueres Spongiæ siccæ, vel madesactæ in liquore aliquo & cum ea sic tumori adligantur.

Fiuntq; ex Saluia, Rosmarino, Betonica, seminib; Carui, Dauci, Fœniculi, &c. Adianthum generationem œdematum impedire censeretur, appositum.

Applicationes aliæ ad maturandum, si in abscessum vergat, eadem quæ in abscessus cura expositæ fuerunt, hîc quoque vsurpari possunt.

Fasciis vincire & stringere locum vbi œdema enascitur, admodum ipsius incrementum prohibet.

Frictio quoque dissipat, eoq; magis, si adhibito Oxyrrhodino & Sale fiat.

Scarificatio vel cauterisatio actu potentiâve operans, in pluribus locis œdematis, illud quoque minuit. Vel si vesicatorium illi ex cantharidibus aliisve paratum adhibeatur.

Palpebrarū œdemata, in quibus palpebre hoc pacto in tumorem eleuantur, simili ratione vti cætera curantur, tum per generalia præsidia, si corpus humiditatib. scateat, tum topica, ea tamen hîc eligenda & palpebris sic accommodanda, ne oculo noxam inde adferamus, quare tunc tutius vtimur inunctionib; spissioribus, ne in oculū defluant, vel emplastris vt hæreant, palpebris admotis, quæ ab initio repellant & postea digerât. Vel si fori vti velimus, ad id quoq; præstandū (omissis illis acrib. ex aceto, sale & lixiuio paratis, vel cautè cū spongiola adhibitis, potius cū digerere volumus) illo vtamur, qui in visus imbecillitate fuit descriptus: Vel inungendè palpebræ inunctione illic quoque expositâ.

Cui & sequens potest adjici: R. Gallarum vel Nucum cupressi ʒ. iij. Cimini ʒ. j. Aloës, Myrrhæ an. ʒ. ij. Croci ʒ. j. Mellis q. s. fiat Vnguentum vel Emplastrum supra palpebras oculo clauso imponendum.

Laudantur & folia Amarici, Ricini & Al-fines, tusa cum polenta apposita.

A seroso humore potissimum prodeuntium intumescendarum & tumorum curatio, primum in ea quæ generalior est intumescencia, mediæ corporis sedis inferioris, Hydrope ascite; Dein in peculiari Intumescencia pedum, & tumore in inguine, qui in scroto occurrit Hydrocele; Postea & in ventre vbi tumor aquosus in mulieribus instat Hydroceles, & iuxta umbilicum Hydromphalo, & in capite Hydrocephalo, & in palpebris ipsarum Inflatione; Postremo & paruis aquosis pustulis Phlyctenis, instituetur.

*Ascitis
hydropis
curatio.*

Ascites hydrops, si ab hepatis aut lienis substantiæ soluta continuitate, à siccitate vel duritie aut scirrho, vel tumore alio, vel vlcere, aut omnimoda corruptione, aut contusione vel vulnere proficiscatur, cum ægrè hæc reparari possint, incurabilis ferè existit; Vti & si à renum eiusmodi læsionibus, vel vterum & vesicæ disruptione prodeat; Aut à venarum meseraicarum, cum omento & mesenterio rupturâ, exesione, vlceratione & corruptione, immedicabilis quoque plerunque existit morbus. Quod si verò à nimia feri copiâ, in venæ portæ vel etiam causæ ductibus coaceruatâ, & ex illis in abdomen exsudante, vel per anastomosen exstillante, prodeat, curationem admittere potest, modò non huius collectionis, omnimoda hepatis vel renum imbecillitas, quæ reparari amplius nequeat, vel vterque vter adeò obstructus, vt reserari non possit, quod rarum est, in causa sint, vel aqua in abdomine diutius retenta, iam viscera vel omentum & mesenterium, cum venis illis intextis, vt sæpè fit, infecerit. Quibus obseruatis, si de causa constet, eò audaciùs aliquid prædicendum, sin ea nos lateat, vti sæpè fit, vel de ea dubitemus, dubiè quoque respondendum. In primis si vrina admodum rufa sit, malû erit, si cruda & alba, maior erit spes.

In curatione hydropis ascitis, causæ primum erit habenda ratio, quæ si à viscerum hepatis & lienis imbecillitate, refrigeratione, obstructione, duritie, scirrho, tumore vel alio duro, procedat, curatio in cachexia potissimum, partim etiam ictero, quæ ab iisdem causis nata, hydropem præcesserunt, copiosè explicata fuit, adeò vt non opus sit

hic eam repetere. Vti & si à calore & siccitate horum viscerum hydrops originem traxerit, in cachexia, cuius quoddam genus quoque illum præire solet, similiter curatio fuit propofita. Quod si verò ob imbecillitatem renum potius accidat, vel vterum omnimodam obturationem, remediis quæ in mictione suppressa præscripta, huic feri retentioni & coaceruationi in venis, occurreremus. Quibus sic institutis, ilicò quoque ad aquam ex abdomine educendam, antequam viscera interna corrumpat, omne studium conuerteremus; per aluum eam educendo, per vrinas, per sudores eam exhauriendo, & nisi hæc succedant, etiam per manifestas sectiones & aperturas, vel externas applicationes, quæ hæc aquas absument, illud moliendo. Quod & in pedibus similiter faciendum, tum vt illorum quoque tumor subsideat, tum vt illic effluente aquâ, illa quoque quæ in abdomine existit, in illius locum succedens, ab eo ex parte per hanc viam euacuetur; scrotoq; si illic aqua quoque consistat, quæ eam consumant, extrinsecus apponenda erunt.

Cæterum in aliis causis, quas auertere difficile vel impossibile, vt viscerum solutâ continuitate, ex siccitate nimia à calore contractâ, refrigerantibus & humectantibus potius, quàm calidis & siccantibus, quibus aliàs in omnibus ferè hydropis causis vti solent, hanc emendare, vti in cachexia eo modo quoque genitâ, exposita sunt, studebimus; & in duritie ac scirrho horum viscerum tumoreque, ea, remediis in cachexia similiter expositis, emollire conabimur; quæ tamen ad præcautionem in hydropis metu plus efficient, cum vbi inualuerint, ea vix amplius queamus corrigere; Vti neque si grauior læsio aut corruptio hæc viscera aut vasa infecerit. In quibus tamen desperatis causis, nihilominus ad symptomata leniendâ, aquas quoque ex ventre & pedibus educere, iisdem vel etiâ extremis remediis tentabimus, vt sic dyspnœa minùs illos grauet, & ne aqua retenta, ob moram & perniciem summam quam acquirit, viscera interna lædendo, grauiora illis pariat accidentia, & in pedibus sponte vel aperturâ priùs factâ erumpen-

pendo, illic inflammationes & gangrænam, unde miserè sæpè ante obitum affliguntur, procreet. Hæc autem omnes operationes per frequentia remedia perficiuntur.

Purgantia in ascite, tum obstructionibus soluendis, tum aquæ educendæ per aluum, accommodantur. E quibus quæ causâ obstructionum usurpantur, potissimum in viscerum obstructionibus, à quib⁹ cachexia & icterus oriuntur, si hæc hydropi iungantur, conuenient. In hydropis verò aliis causis, ideò, quod & illa aquarum deiectionem, naturam sollicitando promouent, cum nulla liquida excretio sine ferro fiat, competere possunt, & cum hisce visceribus multa appropriata recipiant, eo nomine in horum lesionibus etiã tum per se, tum reliquis fortioribus permitta, usurpari; tutiusq; quàm ea, quæ tantum ad aquæ expurgationem exhibentur, Hydragoga dicta, cum illa naturam illiusq; facultatem expultricem, si magnam aquarum copiam profundere debet, admodum commouere & irritare debeant, ob quàm & causam acri & adurente vi quâ illud faciunt, corpus, nisi ritè & preparatè administrentur, facile accendunt, & ventriculū intestinaque rodunt & adurunt. Hæc proinde non nisi cautè, si alia non proficiant, tanquam extrema remedia tentanda, si fortè per ea, natura commota, non solum aquam eam, quæ in venis proximioribus vel distantioribus adhuc consistit, per venarum meseraicarum oscula rursus ad intestina excuteret, quod facilius fit, sed etiam de ea quæ in abdomine collecta redundat, per eandem viam, vti sæpè natura mirabiliter per medicamenta hæc operante, accidit, expurgaret: Quæ omnia sequentibus præsidis perficiuntur.

Communia cæteris quoq; hepatis & lienis maximè ab obstructione dependentibus affectibus, in ictero & cachexia & leucophlegmatia descripta sunt, quæ hic ab initio ad aquas educendâs, vti dictum, aliquando antequam ad vehementiora accedamus, usurpantur. Veluti portiones, ex Rhabarbaro imprimis, quod hisce visceribus adeò amicū censetur, cæterisque adiectis leuioribus fortioribusque catharticis paratæ: Item ex electuar. solutiuis, catholico, diaphœnico, de

succo ros. & præcipuè ex hieris simplicioribus compositisve, syrupis solutiuis, ros. sumariæ, epithymi, polypod. Ex pilulis de hiera, de tribus, de rhabarbaro, de agarico, aggregatiu. quorum formæ aliunde peti possunt.

Quæ verò priuatim hydropi asciti accommodantur catartica remedia, ex hydragogis cum cæteris permittis, vel folis concinnata, sunt sequentia.

Decoctum aquas educens, hepati & lienī insuper appropriatum: R. radic. quinque Aperitiu. 3.ij. radic. Iridis, Valerianæ; Pentaphylli ana 3.j. rad. Asari 3.β. cort. Tamaricis vel radic. Cappari, Sambuci vel Ebuli ana 3.j.β. herb. Cichoreæ cum toto, Dentis leonis cum toto, Endiuæ, Sonchi, Hepaticæ, Eupatorii, Chamædreos, Chamæpythios, Fumariæ, de quinque Capillaribus aliquas ana. M.j. florum Genistæ, Tamaricis, Sambuci vel Ebuli quatuor flor. Cordial. ana P.j. florum Centaur. minor. P.β. seminum quatuor frig. Maior. 3.β. feminis Anisi, Fœniculi, Petroselinī ana. 3.ij. f. Cuscutæ 3.j. Hedera 3.iiij. Prunorū P.v. Tamarin. 3.j.β. Passul. enucl. 3.ij. foliorum Sennæ, Polypod. f. Carthami ana. 3.j.β. Epithymi 3.ij. fiat decoctio in Aqua, addendo poculum vnum Vini albi, & in colatura infunde Agarici trochisc. 3.β. Rhabarbari 3.iiij. Spicæ 3.j. fiat expressio, adde Sacchari vel Mellis q.s. fiat Apozema, aromatizetur Cinamom. Pro quatuor vicibus.

Hoc decoctum hydragogum magis fiet, si Mercurialis vel Soldanellæ M.j. addas, vel Esulæ præpar. 3.j. Vel Chameleæ aut Thymeleæ M.β. Quorum si plura sumantur, Rhabarbarum & Agaricus hic omitti poterunt. Apios rad. aliqui addunt. Quæ fortiora cum usurpantur, minori quantitate ab initio propinari debent, vt antequam dosis eorum exactè definiatur, prius de operatione & vehementiâ illorum constet, quam priusquam exploraueris, ægrè licebit exprimere, quod & in reliquis formis, quæ aliquoties exhiberi debent, obseruandum; adhibita semper simul diligenti, vt vocant, custodia, & lauatio si opus sit, postea usurpanda.

Aliud hydragogum simplicius sic fit: R. fol. Soldanellæ 3.ij. sem. Hedera 3.β. rad.

Asari 3.ij. femin. Anisi 3.ij. fiat decoctio in Aqua & Vino, vel Decoctio aliquo simpliciore ex supradictis: Capiat haustum.

Vel fiat hoc pacto: R. rad. Liquiritiæ 3.j. rad. Enulæ 3.β. rad. Cyclam. 3.j. fol. Soldanellæ M.j. Thymelæ vel Chameleæ vel Laureolæ M.β. vel 3.β. Passul. enucleat. 3.ij. feminis Hederæ 3.ij. sem. Fœniculi 3.ij. decoquantur in iure Cicerum rubr. & in colatura, adde Sacchari & Mellis ros. q. s. iterū parū bulliant, addēdo 3.ij. Vini, aromatiz. Cinamom. & Squænantho vel Spicā: Bibat portionem, & pro operatione illius, reliqua quantitas dirigatur.

Vina per macerationem aut etiam decoctionem facta, & tutius & melius operari, illisq; maxime hydropem, si modo curari possit, sanari, experientiā longā comperimus. Quale illud est, quod R. rad. Iridis 3.j.β. rad. Cichor. Fœnicul. an. 3.j. rad. Enulæ vel Imperator. 3.β. cortic. rad. Sambuci & Ebuli an. 3.j. fol. Absynth. 3.ij. Chamædr. Chamæpyth. an. 3.ij. summ. Rosmarini p.j. flor. Centaurij min. 3.j. femin. Fœniculi 3.ij. femin. Coriandri, Carui, Petrofelin. an. 3.j. foliorum Sennæ 3.j.β. Agaric. trochisc. vel rad. Bryoniæ præpar. vel Mechoacæ 3.β. vel Agaric. Rhabarb. ana 3.ij. & si efficacius esse debeat, Turbith. 3.ij. Arida omnia incisa & comminuta, infundantur in tb.v. vel vj. Vini. Et de eomacerato solum vel cocto in duplici vase: Bibat haustum, & prout operabitur, illius dosis vel augebitur, vel minuetur, atq; successivè exhibebitur.

Vel adde simul prædictis, rad. Gentianæ & Aristoloch. ana 3.β. rad. Asari 3.ij. cortic. Dulcamaræ 3.vj. Thymi 3.j. florum Genistæ p.j. feminis Hederæ 3.β. sem. Apij 3.j. & sic paretur.

Vt potentiùs, in tardis præsertim, aquarum eductionem operetur, hisce vinis adde mus fol. Soldanellæ vel rad. Cyclaminis 3.β. Et si adhuc validius esse debeat, & fol. Chameleæ vel Thymelæ, destituamur, cortic. rad. Esulæ præpar. vel cortic. Hellebori nigri à 3.j. ad 3.j.β. vel Colocynthis 3.β. quæ omnia in vino exhibita, minùs quàm in decocto lædere possunt, addendo simul Spicæ, Squænanthi ana 3.β.

Alia vina simpliciora sed efficacia sunt, si in Vino vel Musto recenti macerentur, vel etiam decoquantur, addito interdum paucō Absynthio, ventriculi gratiā, cort. rad. Sambuci, vel cortex Ebuli, vel cortices medij virides Sambuci vel Dulcamare, vel Ebuli grana: Et hoc vinum detur.

Fortiora sunt: si ex rad. Cucum. sylu. vel Bryoniæ sic vina fiant, vel foliis Chameleæ aut Thymelæ, vel solis, vel vna cum floribus & fructibus, si hæc adsint.

Potiones aliæ, additis succis, ex infus. vel decoctis in Vino sic fiunt: R. Rhabarbari & fol. Soldanellæ an. 3.j. vel 3.ij. infundantur. Expressio detur, addito Syrupō aliquo rosarum solut. vel alio.

Vel: R. Rhabarbari 3.j. vel 3.ij. Irroretur succo Iridis depurato ab 3.β. ad 3.vj. aliis & succo rad. Sambuci addito, & post sufficientem macerationem, adde Vini Absynthij q. s. exprimatur diligenter: Et sic propinetur, vel addantur quoque syrapi.

Efficacior erit, si Rhabarbarū in succi Cyclaminis 3.j.β. vel succi Palmæ Christi 3.β. immergatur, & potio vti prior paretur.

Vel: R. Agarici 3.j. Zingib. 3.ij. Salis gem. 3.j. irrorentur prædictis succis: Et vino addito, expressio detur.

Probatur & potio ex sero vel iure galli facta, hoc modo: R. Polypod. querc. 3.ij. sem. Carthami conq. 3.j. rad. Iridis, recent. 3.j.β. decoquantur in Sero caprino, vel iure galli decrepiti, quod ius iam priùs coctum sit; Vel cum gallo hæc materia infarcto, coquantur: Detur haustum, addendo pulu. rad. Ireos & Cinamomi an. 3.j. & repetatur: Possunt & plura addi ex supradictis ut magis operetur.

Succus Iridis receter expressus, cum semper inueniatur, aluū & vrinās mouet, à 3.ij. ad 3.vj. propinatus, sæpè solus hydropem sustulit, qui & per residentiam priùs depurari potest, præsertim si ad vsum diutius asseruari debeat: Quia fauces inflammat, possumus eum cum vino vel aqua mulsā aut iusculo vel lacte exhibere, vel saccharum aut mel illi permiscere, additis etiam aliis gratiam illi conciliantibus, vel hepaticis.

Vel syrupus ex eo ad vsum paratur, admi-

scendo æquam partem sacchari puluerisati succo, sicque conseruando, vel prius ad consistentiam aliquam, si diu asseruari debeat, coquendo: Sed tunc duplo pondere, vel amplius, prout operationem illius videbimus, exhibebitur.

Vel: R̄. Rhabarb. elect. infusi in vino absynth. & express. 3. iij. succi radic. Iridis recent. express. 3. iij. aquæ Cinam. 3. β. Sacchari quartar. j. β. decoquatur sensim in formam Syrupi. Detur ab 3. j. ad 3. j. β.

Cyclaminis succus eodem modo crudus præparatusq; exhiberi potest: Vel alij succi, vt Sambuci, Ebuli, Bryoniæ, &c. Vel additâ quoq; Rhabarbari infusione, vel etiâ Agarici, in syrupos, vti iridis succus, coqui possunt.

Vel paretur succus hoc modo, à quibusdâ expertum remedium: R̄. Cort. recent. viridium Sambuci, aliquâdo & Dulcamaræ, qui sub derafa exteriori dura tunica mox occurrunt ad m. ij. radic. Bryoniæ rec. 3. j. contundantur seu pistentur diligenter, addendo Vini & Aceti bonam quantitatem, exprimatur succus: Detur duabus vel tribus vicibus.

Efficacissimus inter omnes est succus Cucum. sylvestr. fructuum, præparatus & exiccatus, quem Elaterium vocant, quod fit ex succo pulposo è fructibus penè maturis antequam dissiliunt expresso, & per cribrum transmissio, in vas subiectum, cui postea decoctum segminum quæ de fructu remanserant, in aqua factum colatum miscetur; Hæc simul agitata in sole vel alio calore linteo tecta, collocantur, & postquam aliquandiu steterint, tota supernatans aqua cum humore concreto effunditur, idque toties, donec tota existens aqua liquefacta, stillatim exhausta fuerit; quo facto, quod remansit, in pastillos cogitur. Aliter & citius fit, si liquor ille, supra pannum lintheum triplicatum, cineribus instratum, in medio depressum fundatur, & quod in panno remansit, siccetur, sicq; in pastillos redactum, seruetur.

Aliter sic quoque præparari potest expedite magis: Si succus horum fructuum expressus, cum Sacchari quadrupla quantitate ad consistentiam vel syrupi, vel electuarij coquatur, permiscendo interdum & alia conuenientia. De quibus omnibus parua exhi-

benda à principio est quantitas, donec de viribus medicamento constet.

Extractum seu succus Esulæ, inspissatus in formam rob, etiam in hosce vsus datur: Item rad. Ari; aliàs & Hellebori nigri, Euphorbij; omnia cautè administrando, dosisq; conueniens potius experiunda, quam hic exprimenda.

Conserua facta ex foliis Chameleæ, Thymeleæ, vel Laureolæ, prius maceratis in aceto, contusis & cum Mellis duplo pondere permistis: Cum Lacte vel Sero illius datur.

Electuarium ex aridis eiusmodi plantarum foliis, puluerisatis, & cum melle coctis, interdum eodem modo exhibetur.

Vel fiat hoc electuarium: R̄. fol. Soldanelle, Mezerei, in aceto macerat. postea exiccator. & puluer. folior. Senæ ana 3. iij. medullæ sem. Carthami 3. ij. Turbith. 3. iij. rad. Iridis puluer. 3. j. Mastiches, Laccæ ana 3. j. β. Syrupi ros. solut. q. f. fiat electuarium.

Vel hoc magis tutum: R̄. succi Iridis 3. j. β. Mellis 3. j. leuiter coquantur, in fine miscendo pulu. fol. Soldanellæ 3. vj. rad. Iridis pulu. 3. j. Cinamomi 3. j. β. fiat instar electuarij: Incipiat vsum à 3. ij.

Aliud valde à quibusdam probatum electuarium validissimum, sic paratur: R̄. succi Cucum. sylvestris, (è fructibus nimirum expressi) & radicis eius, succi Laureolæ (foliorum scil.) succi Ireos flor. purpureo (radicis) succi Absynthij & Eupatorii ana 3. j. β. residueant, aqua quæ supernatat limpidior per inclinationem effundatur, crassiori misce pulueris Rhabarbari & Agarici ana 3. ij. seminum Endiuie, Scariolæ, Portulacæ, gummi Mastiches, Laccæ, Tragachanti ana 3. β. Salis gemmæ, Spicæ nardi an. 3. β. Mellis colati 3. ij. stent in calore solis vel fornacis, sæpè agitando, donec ad consistentiam redigantur, quæ asseruari possit: Datur 3. j.

Huius loco hoc componi posset, formâ elegantiori & meliori: R̄. succorum prædictorum ana 3. j. β. Aceti rosac. 3. j. infusionem factam ex Rhabarbari 3. iij. Agarici 3. ij. Salis gemmæ 3. j. in Vini albi 3. vj. & aqu. Cinamomi 3. β. maceratis & express. adde Sacchari, Mellis rosac. ana quartar. j. pulpæ Cydoniorum 3. iij. infus. gummi Tragach. factæ in aqu.

Rosar. 3.ij. coquantur ad formam electuarij, addita Mastiche, vel alijs, vel sine illis; vel etiam omiffa pulpâ, cum Sacchari & Mellis lb. 8. coquantur in formam fyrupi.

Ex vltatus hydragogis electuariis est qd̄ Mezereon dicitur, quod ex folijs mezerei & oleo, melle, agarico, mannâ, saccharo, carne cydoniorum & fero; quod sic parari potest: R̄. Agarici 3.8. Rhabarbari 3.ij. infundantur in Sero lactis atq; exprimantur, & in infusione dissolue Mannâ 3.x. Sacchari, pulpâ Cydoniorum coctâ parum cum aceto ana 3.ij.8. olei Amygd. dulc. 3.ij. coquantur in formam electuarij, permiscendo circa finem pulueris foliorum Mezerei 3.ij.8. hoc est Chameleæ vel Laureolæ, quæ in aceto prius infundi possunt, & sic præparari.

Aliud vfitatum est electuarium Efulæ, quod Scebron vocant, paraturque ex esulâ & myrobalanis, cum succo fœniculi diu per insolationem in massam exiccatis. Quod & vti illud de Mezereo, esulam pro eo sumendo, parari posset.

Est & electuarium Diaphysalidon. Mesuaj, quod fit ex folijs mezerei macer. præp. & oleo mezerei, scammonæ, turbith, agarico, myrobal. quinque generibus, mannâ, cassiâ, tamarind. passulis, penidijs, iride, semini. apij, fœniculi, absynthio, rhabarb. succis volubilis, intybi, apij, eupator. absynth. ol. sesamino.

Benedicta laxatiua, quia esulam recipit, vel Hiera Hermeris cum mezereon contineat, inter hydragoga referuntur.

Pulueres hydragogi aliqui exhibentur cum vino, vel aquâ mulsâ, vel lacte, vel iussulo pulli, vel iure galli decrepiti, vel decocto aliquo, addito interdum saccharo, melle rosaceo, cinamomo, alijsve; sæpeque repetiti rectius operantur: Possunt &, si ingrati sint, pilulæ ex illis formari.

Soldanellæ puluis sæpè exhibitus à 3.j. 8. ad 3.ij. vfitatum præcæteris est remedium.

Mechoacæ vel Bryoniæ puluis sic datur à 3.j. 8. ad 3.ij.

Ebuli rad. vel Sambuci pulu. ad 3.ij.

Azarum cum Musto.

Cucumeris agrestis radic. cortic. puluis ad 3.ij. cum aqua Mulsâ.

Ricini semina à quinque ad plura puluerisata data.

Meliùs hæc conuenient, si hisce pulueribus Rhabarbari puluis quoque addatur, aliaque correctiua, vt spica, cinamomum, mastiche.

Vel sic: R̄. fol. Soldanellæ 3.j.8. Senæ 3.ij. Rhabarbari 3.j. Sacchari 3.j. fiat puluis: Pro vna vice.

Vel: R̄. fol. Soldanellæ 3.j.8. Turbit. 3.j. Rhabarbari 3.8. Zingib. 3.j. Sacchari 3.j. fiat puluis: Detur loco prioris. Si Efulæ præparata tantillum misceas, validum fiet.

Efficacissimum & hoc est: R̄. foliorum Soldanellæ 3.8. Cicadarum pulu. 3.j. fiat puluis: Detur cum iure.

Serapinum gummi vel Sagapenum cum Myrobal. vel Rhabarbaro exhibent aliqui. Singulare à quibusdam censetur, si Serapinum in aceto dissolutum, additis Aloë & trochiscis Alhandal, vel Scammoneâ, in forma pilular. sæpè propinetur.

Pilulæ hydragogæ sunt ex vfitatis, si pilulæ de Rhabarbaro vel Agarico, vel Aggregatiuæ, vel de Euphorbio, de Sagapeno, alia ve, succo rad. Iridis vel Cyclaminis aut Palmæ Christi, alijsve enarratis excipiantur formenturque.

De Rhabarbaro pilulæ Rhazis hydragogæ sunt, fiuntque ex Rhabarbari 3.j. Agarici 3.j. 3.ij. sem. Endiuie 3.j. formanturque cum succo Endiuie & Eupator.

Quæ sic parata, tutiores erunt: R̄. Rhabarbari, Agarici 3.j.8. Spicæ 3.8. cū succo Iridis, in quo fol. Chameleæ vel Laureolæ maduerint & Euphorbium, excipiantur.

De Mezereo pilulæ in vfu quoque sunt, fiuntque ex foliorum Mezerei 3.v. maceratis per triduum in aceto, & Myrobal. 3.j. cum Mânâ vel pulpa Tamarind. & aqua Endiuie.

Horum loco si media tantum sumeretur quantitas Myrobal. & Rhabarbari 3.ij. adderentur, & cum infus. Tragach. formarentur, pilulæ minùs noxiæ fierent.

De Elaterio pilulæ vfitatæ quoque sunt, fiuntque ex Elaterij 3.ij. Aloës 3.ij. Mastiches 3.j. cum succo Sambuci vel Ebuli.

Quorum loco, Elaterij 3.8. vel grana alia quot, addita pilulis Mastichinis pond. 3.8. vel

vel 3. ij. vel De tribus, vel de Rhabar. aut Aggregat. exhibere possumus: Vel cū trochiscis Rhabarbari aut Laccæ misceatur Elateriū.

Sunt & Pilulæ à Philonio descriptæ hydragogæ, quæ ex folijs laureolæ macer. in aceto, diagryd. rhabarbaro, myrobalan. radic. iridis, costi, absynthio, semin. anisi, fœniculi, ligno aloës, laccâ, ære vsto, succoq; fœniculi parantur.

Inter purgantia serum per aluum, sunt & Clysmata, quæ ad serum per venas meseraicas rursus ad intestina reuellendum, iniici possunt, quod abstergendo & naturam sollicitando, osculaq; venarum meseraicarum simul patefaciendo præstant, ex sequentibus parata, quæ & flatus abigendo, distentionē illam ventris nonnihil subleuāt.

Leuius enema sic parabitur: R. herbarum recent. Betæ vel Mercurial. Parietariæ, Geranij illius quod Pedem columbinum vocant, Rutæ ad M. iij. vel iv. florum Sambuci, Genistæ, Hyperici, Chamomill. Anethi, Liliorum alborum ad P. iij. vel iv. feminum Carui 3. ʒ. ʒ. femin. Apij, vel etiam de alijs Calidis maioribus vel minoribus ad 3. ʒ. foliorū Sennæ 3. j. ʒ. aliàs & feminis Carthami 3. j. fiat decoctio, & in s. q. dissolue Hieræ alicuius vel Benedict. laxatiu. vel Fermenti 3. ʒ. Mellis 3. j. olei Laurini 3. j. ʒ. Salis parum: fiat Clyster.

Fortius erit si priori decocto plura purgantia addas: Veluti Agarici vel Turbith. 3. ʒ. Azari 3. iij. Vel si his omisis Colocynthis 3. j. in decocto maceres, omisis tunc vel simul relictis, quæ in eo dissolui diximus purgantibus electuarijs,

Maximè verò ad aquas ducendas efficax fiet; Addendo primo decocto foliorum Soldanellæ vel Chameleæ vel Thymelææ circiter M. j. vel rad. Cucumer. agrest. & Cyclaminis ana 3. j. ʒ. quibus & radicem Apios aliqui addunt: Hocque modo vnâ cum illis quæ in eo dissolui debent, iniiciatur.

Aliud: R. Vrinæ sani hominis biliosi, vel Lixiuij mediocris efficaciz q. s. dissolu. Fermenti acris 3. j. olei Rutacei 3. j. ʒ. misce. Si succi radic. Iridis 3. ʒ. addatur efficacius erit. Qui & prioribus Clysteribus additus eos validiores reddit.

Euacuantia per alias vias quod concernit, ea quæ per Sudores fit euacuatio, cum serum in habitu corporis contentum, in pedibus præsertim nonnunquam & superioribus sedibus, educant, in ascitis quoque conuenient, sed per vim eos elicere velle, in commodū, nonnunquam & noxium, cum si in lecto hoc fiat, exhibitis sudorificis, actualiq; adhibito calore, ægri decubitus ob dyspnœam, citra suffocationis periculum diutius ferre nequeant, & si in stupha tentetur, admodum debilitentur atque amplius accendantur. Itaq; nisi sponte erumpant, & in declinatione morbi crurum tumoris causâ vsurpentur, non temerè ad sudores vi sunt adigendi. Quod si verò ad eos promissint, & erecti quoq; sudare possint, propinentur ea quæ in Leucophlegmatia sudores prouocare docuimus. Quæ etsi sudores non moueant, tamen quia per vrinâs simul operantur, sic iuuare poterunt.

Per Vomitus euacuatio, quia ventrem nimis concutit, & dyspnœam auget, quibusdâ noxia, aliquibus tamē si per vomitum aliqua reuulsio à venis meseraicis ad ventriculum & intestina fiat, vel ob causâ, vnde feri fit prouetus, aliquam ablationem, eo nomine, si præsertim ad vomitum faciles sint, prodesse potest; vti & si aquam copiosam siti euicti biberint, ad illius reuomitum; quam & vt facilius vomant, aliqui vt affatim interdum bibant, sed mox iterum reuomant, concedunt.

Per sternutationem ad renes serum propelli, eoque nomine eam quoque promoueri debere docet Rhazes.

Per sanguinis emissionem quæ sit sedâ venâ, in cura ascitis vix dum aliquid dignū efficiemus, cum læsis visceribus, nisi aliud simul accedat affectus, vti inflammatio, hinc nihil opituletur, & de fero nihil, vel ex abdomine, aut corporis habitu educat, vti neque de eo qui in venis adhuc consistit meseraicis, à quibus vena extrinsecus secta nihil elicit, & ne quidem multum de eo qui in venæ cauæ consistit ramis, cum illud continuò aliò potius quàm eò feratur, videamusque in asciticis, aliquando merum ferè sanguinem, eumque crassum & subnigrum potius

quàm dilutum, venâ sectâ promanare.

Per hæmorrhoides tamen, si vel sponte fluant, vel in consuetis aperiantur, vnâ cum illo sanguine, aqua in venis meseraicis contenta, vel eò rursum è ventris cauo deriuata, nonnunquam, idque sæpè magna quantitate profundi potest.

Per manifestam aperturam, sectione, punctione, vstione factam, aquæ ex abdomine, scroto & pedibus, effluxus, extra corpus nonnunquam procuratur.

Estque expeditior operatio illa, quæ per puncturam abdominis Paracentesin appellatam perficitur, cum per eam aqua vniuersa è ventris cauo possit educi, idque citius quàm vllâ aliâ ratione. Vnde & frequentius, quàm alioquin fieri solet, matureque antequam hæc aqua diutius retenta viscera interna vitiet, viresque collabantur, hæc administrari deberet, cum vulnus hoc leue per cutem musculos & peritonæum tantum adactum, nullum, vti vulgus putat, ægro conciliet periculum, nec intestina facile, dum illud sine maiore impetu imprimitur, lædi possint, cum abdominis superficies aquâ disticta, admodum ab ipsis eleuata distet, illaque inania, vti sectione inueniuntur, à conuexo ipsius separata collapsa iaceant. Dein & cum impossibile sit, si aliâ viâ aqua hæc per alium aut vrinas non externatur, sed illic subsistat, ægrum euadere, satius erit in desperato malo, hoc remedij genus tanquam extremum tentare, quàm ægrum deploratum relinquere, cum nisi causæ magnitudo obstit, hoc pacto interdum liberari possint, vel si moriantur, cum alioquin minimè conualescere potuissent. Medicus prius hæc prædicendo, se à crimine liberare, conscientiamque suam integram seruare queat, ægroque saltem hoc commodi inde proueniat, quod aquâ hac effusâ, à dyspnœa illa graui, aliisque internis doloribus liberatus, placidius expiret.

Cæterum ad hanc decenter administrandam, locus in abdomine sub vmbilico tribus digitis, in lateribus eligi debet, illic vbi oblique & transuersim procedentes epigastrii muscoli, carneis sedibus murum incumbunt, cum rursus eo in loco quàm in medio sub

vmbilico ductu, vbi aponeuroses musculorum concurrentes, lineam albam nerueamque efficiunt, vulnus infligatur. In eo itaque loco phlebotomum scalpellum, vel aliud ad hoc aptum instrumentum acutum, per cutem musculos & peritonæum, ad interiora vsque placide, ne intestina, vti dictum, lædantur, imprimitur, aquaque quæ proflire magno sæpè impetu solet, pelui excipiat. Mox tamen iterum occludendum foramen, ne tota simul, vnde vires prociderent, effluat, ita vt successiuè indies bis terte portionem emittendo rursumque recludendo, sensim aqua citra virium iacturam, quæ interim restaurandæ erunt, educatur. In quo maxima, ne error committatur, & vt aquæ effluxus cum volumus, iterum fisci queat, cautio adhibenda. Quod fiet, si Siphone immisso, qui foramen occludat, ille aperiri rursumque claudi pro voluntate nostra possit. Vel si antequam punctura fit, cutis prius deorsum valide tracta, transuersim aliquoufque ad musculos vsque secetur, & postea demum introrsum scalpellum adigatur, tunc enim inferiore vulneris in cute facto labro, rursum sponte, cum cutis remittitur, sursum remeante, foramen occultatur & obturatur, & cum deorsum trahitur, iterum referatur; sicque ad libitum aquam retinere, vel emittere possumus, & ne inuoluntariè effluat, præcauere: vti & si in latere, in quod æger non recumbere solet aut potest, sectio fiat, vt aqua minùs propèrte effluat, hac quoque ratione cauetur, cum alioquin parum interfit, in dextro sinistrove fiat, quod tamen, obseruato hepatis lienisve affectu, in hoc illove fieri debere, cum abdomen minimè, vti pectus, diuisum sit, aliqui citra rationem docent.

Cæterum & aqua quæ effluit consideranda, nam si limpida & inodora adhuc sit, bona esse iudicatur, quod inde viscera nodum ab ea infecta esse, conijciamus; contra verò, si foetidissima aut subcruenta reddatur, visceribus noxia est censenda.

In scroto punctura facta, eo modo quem in Hydrocele exponemus, non solum vt aqua ex illo effluat, procurat, sed & vt ex abdomine sensim quoque per hanc viam, per

quam prius in scrotum descenderat, si foramen diu apertum seruetur, extra feratur, prodesse potest. Ob quam & causam, etsi in abdomine negligatur, hic saltem, cum tutissimè fiat, institui posset: quæ tamen magna ad curandum hydropem occasio, si modò curari potest, ut plurimum negligitur.

Per scarificationem aquam etiam sub cute collectam educere possumus. Quæ in pedibus facta, non solum eam quæ in vicinia tumidos illic pedes reddidit, euacuat, sed & succedente semper in locum aquæ effluxæ, nouâ tandem etiam à superioribus, atque ipsius etiam abdominis cauo, aquam exhaurit, adeò sæpè potenter, ut diu eâ vel etiam copiosè exstillante, venter penitus detumescat. Quæ scarificandi ratio cum cõsuetâ sit, minùs ab ægris repudiatur, licet & eo nomine possit videri noua, quod cum tunc cute apertâ aqua emanans, inflammationem, sicuti diximus, vehementem, & quæ in gangrænâ interdum cõuertitur, facile pariat, hoc ob vulnera hæc inflicta accidisse, suspicionem facillè possit excitare, medicumque sic calumniâ onerare: Quam ut vitet, hoc à perniciæ, aquæ effluere incipientis, siue per scarificationem aut sponte id fiat, facillè fieri solere, prædicere debet: dein etiam scarificationem rectè administret, & postea gubernet, oportet. Quod fiet, si in pedum carnosa sede, circa furas aut inferiora, nonnunquam & in femore primùm tentetur, cuticulaque vel tantum secetur, cum & tunc aquæ guttæ mox per eam exsudare soleant, vel si nò procedat, etiam cutis vera, sed leuiter duntaxat tundatur, vulneraq; distantia & lata, scalpello proin latiore facta infligantur, serumque quod statim exsudat; placidè linteo molli adhibito, citra frictionem tamen, abstergatur, postea Vnguento albo, succisq; conuenientibus, quibus inflammationem arcemus (inter quos succi Solani, Plátaginis & Hyosciami vulgaris, vel Peruuiani summi viles, vti & Folia parum cõquassata apposita,) eam auertamus: Et imprimis ne fasciæ madidæ maneant, eas sæpè permutando, caueamus, vel Sæuo hircino vel certuino eas illinendo, & sic circumuoluendo, ne humorem concipiant, ad hanc rem idonæas reddamus.

Ventris totius scarificationem aliqui quoque probant, eaque ad musculorum aponeuroses vsque factâ, quæ rectos musculos integunt, aquam è ventre quoque exhauriri posse, docent.

Per vesicarum productionem in pedibus, illarumq; disruptionem, aquæ similiter exitus pateheri potest, & si apertæ maneant, ut deinceps quoque effluxus illius continueatur, procurari. Quæ sponte vi aquæ cutem intrinsecus diu irrigantis, atque etiam ob acrimoniam irritantis vel vrentis, tandem in pedibus solent erumpere: Aliàs arte prouocantur, Vitione leui factâ cuticulæ, per cauterium actuale, cuiusmodi casu aliquando vase æneo calefactorio inter calefaciendum lectum inductâ in pede, hoc pacto, exitu aperto, ut ascuticus sanaretur, occasionem præbuit. Vel hoc vesicatoriis admotis effici potest, prædictione dictum, de periculo inflammationis præmissâ, illisque adhibitis quæ moderate & sensim hoc faciunt, cum vehementer adurentia admouendo, inflammationi citius, quàm à scarificatione occasio præberi possit.

Cæterum non solum in pedibus per vesicas sponte artèue inductas, aqua tum ex illis tum abdomine penè vniuerso quandoq; effluit, sed & in abdomine vmbilicum in amplam & pellucidam vesicam aquaq; plenam, ab ipsius copia dilatatum, in ascuticis aliquoties deprehedimus, è qua dissectâ forpice vel scalpello, quod leui negotio & citra sensum fit, aqua tota nisi per vim compressa fuisset, impetu magno effluxisset: Qui modus aquam educendi, cum adeò sit expeditus, si arte procurari posset, ut vmbilicus hoc pacto intumesceret, quod cucurbitulæ sæpè illi admotæ fortè efficerent, cum illud tentare cupimus, magnum ad curationem adferret adiumentum.

Per Fonticulum, vti vocant, in pedibus excitatum aquæ quoque via aperitur. Qui cauterio actuali si fieret, cum altius quàm pro solius vesicæ productione requiritur, imprimi tunc deberet; inflammationem facillè accerseret; satius ob id & tutius longè potèntiali aliquo, quod sine dolore cutem mor-

tificando aperit, illud, si nihil impediatur, in pedibus moliri, cautione ea quæ in illorum applicatione & gubernatione requiritur, a libi etiam explicata, adhibita. Quod & in scroto sine periculo fieri posset, cute illius sic aperta. In ventre verò per abdomen adeo crassum, fonticulum ad interiora vsque ubi aqua latet, deducere, cum sit arduum, vix tentandum erit.

Alterantia præter ea, quæ ad viscerum imbecillitatem corrigendam, illorumque infarctus, obstructions soluedas, durities emolliendas instituuntur, qualia in cachexia multa proponuntur, & hic quoque, si hydrops illius causâ eueniat, vsurpari possunt, illaque præsertim in eo locum habebunt, quæ sic componuntur, vt simul cum illis operationibus, vel etiam sine illis in aliis illius causis, aquas absument, vrinasque prouocent; Qualia frequentia existunt.

Decoctum adhuc vtile: R. radic. quinque Aperitiuarum, Cichoreæ, Iridis ana 3. j. s. Dentis Leonis, Pentaphylli, Filipendulæ, Valerianæ, Eryngij ana 3. j. radicis Afari 3. s. cortic. medij Tamaricis, Fraxini, Sambuci, radic. Cappari ana 3. vj. herbarum Endiuæ, Eupatorii, Marrubij, Chamædreos, Chamæpytheos, Capillarium, Pimpinellæ, Pilosellæ, Absynthij, Cardui benedicti ana m. j. florum Sambuci, Genistæ, Tamaricis, Hyperici, Buglossi, Borragin. ana p. j. femin. quatuor frigid. Maiorū 3. s. iv. sem. frig. Minorū 3. iij. Cicerum p. j. feminum Apij, Fœniculi, Petroselinij, ana 3. ij. Passularum e-nucleat. 3. ij. Liquiritiæ 3. j. s. fiat decoctio in aqua & quartâ parte vini albi, addendo Sacchari q. s. Potest addi succus Iridis; aromatiferur Cinamomo, Schoenantho, Spicâ celticâ, Nardi, vel Cassiâ lignæ, vel pulueribus Diarrhodon, Triafantal. &c.

His adjici possunt, rad. Cardui albi, Filiculæ, Filicis, Lapatij, Vincetoxici, cortic. Frangulæ, Viscum quercin. Ex herbis Afarina, Plantago, Morsus diaboli, Lupulus, Mentha, Hyssopus, Polium, Betonica, Pulegium, Origanum, Ruta, Maiorana.

Aliud decoctum: R. radic. Fœniculi, Petroselin. ana 3. j. Rhapontic. 3. ij. Absynthij, Ceterach, Eupatori. ana 3. ij. iv. femin. frigidorū

Maiorū ana 3. j. Schoenanthi, Spicæ ana 3. j. decoquantur in iure Pulli vel alio, vt Cicerum; vel in Vino infundantur, omisis tunc seminibus frigidis.

Potionem Rhazes habet quæ magni sit, paratam ex absynthio, cuscutâ, alkekengi, fumariâ, feminib. iv. frigid. maior. squoenantho, & spicâ in sero lactis maceratis.

Ex simplicioribus decoctis probatur Ligni Gaiaci decoctum, ad vrinas mouendas. Item Allij & Rubiæ decoctum cum Melle, Plantagin. maioris decoctum, per se vel cum Lenticula, vt vult Dioscorides, qui & probat Origanum cum Ficu decoctum & Ciceris cum Rosmarino, & Calami odorat. cum semine Apij.

Viscum quercinum ad tñ. j. rasum in mensura j. seu tñ. iij. vel quatuor aquæ ad consumptionem medietatis decoquatur. Dantur manè & serò de colatura 3. iv. diu continuando magno successu: Saccharo dulcorari possunt & aromatizari.

Lumbricorum decoctum, additis diureticis, vtiliter datur. Item Cicadarum puluerifatarum ad 3. ij. decoctum cum aliis.

Vina per infusionem vel decoctionem facta, admodum iuuant. Ex radice Apij, vel Iridis vel Azari, vel cortic. radic. Sambuci, vel Ebuli, semine Hederae, vnum, aliquot, vel plura fumendo.

Absynthites Vinum etiam vtile, quod in debilioribus ventriculis ex generoso, vel etiam Maluatico, quod vrinas mirè ducit, Vinò parari potest: Marrubij item vinum, vti & Scyllinum.

Composita vina fiunt ex pluribus è prædictis simul mistis, vel aliis quoque in decocto expositis additis; exempli gratia: R. radic. Apij, Fœniculi, Iridis ana 3. j. s. Phu veri, Accori veri ana 3. j. Imperatoriæ, Gentianæ ana 3. s. Azari, Scyllæ ana 3. ij. cortic. radic. Sambuci, vel Ebuli, Ligni sassafras ana 3. j. herbarū sicc. Absynthij, Marrubij, Eupatorii, Capillor. veneris, Chamædr. Cardui bened. ana 3. ij. summit. Centaur. minor. florum Genistæ, Tamaricis ana 3. j. acinorū Sambuci aridorū 3. ij. feminum Petroselin. ana 3. j. s. fem. Ammeos, Anethi ana 3. j. Cinamomi 3. ij. Spicæ 3. s. conqussentur pro Vini mensur. ij. vel iij. Lixi-

Lixiua præparata ex Fabarum stipitum, vel Iuniperi ramorum cineribus, per exiccationem omnimodâ in furno factis, per transcolationem frequentem vel macerationem diutinam aquæ bibita aliquoties, plurimum sæpè profuerunt: Aliquique cum diu nihil aliud bibissent, horum sed tunc magis dilutorum vsu fuerunt restituti: Probatum & ex cineribus Genistæ factum: Item Hederae, & imprimis ligni Dulcamaræ, & Gratiolæ. Quod si in hisce omnibus parandis, loco aquæ Vinum sumatur, vel illud aquæ permisceatur, efficacius penetrabit. Vel si cineres horum in nodulum ligati, Vino immergantur, & Vinum illud proderit, eoque magis, si cineres non ex penitus combustis plantis, sed in furno eousque exiccatis, donec in cineres redigantur, colligantur.

Hæc quoque lixiua in Salia decoctione redacta, probant Chymici, illisque vti malunt: Inprimis sale Absynthij, Iuniperino, Gratiolæ, dein & Ebulino.

Vrina vel propria, vel pueri impuberis bibita, mictionem impellendo accelerat. Capræ vrinam cum Spica quotidie bibita laudat Dioscorides.

Aquæ stillatitiæ quia valde penetrant, multum quoque, si assatim ad 3. iv. & diu bibantur, possunt efficere, addito interdum & Vino.

Quales ex simplicioribus sunt, aqua ex Sambuci vel Ebuli radicibus, & floribus, vel etiam acinis separatim simulve destillata: Item ex radicibus floribusq; Iridis, atque ex Hirundinaria: Dein & ex floribus Liliorum alborum, ex Raphano, ex Iuniperi baccis & Smilace hortensi, ex Cuscuta: Vel aliis herbis & radicibus plantarum Aperitiuarum & diureticarum, inter quas & efficax Foeniculum marini aqua: Stercoris humani aquam stillatitiam aliqui extollunt: Alij aquam Nicotianæ dictæ.

Compositæ sunt ex prædictis aliquibus, vel omnibus simul destillatis, addito interdum & succo Iridis: Aliqui Cantharides miscent, vt magis vrinam ducant. Cinamomum, Spica, Schoenanthum, similiaque permitta has aquas magis appropriant; Vel si hisce vbi iam destillatæ fuerint, aromatizentur.

Liquores alios Chymici, & aquas validiores parant, cochleatimq; exhibent: Addendo prædictis herbis, vt Hirundinariæ vel Sambuco aliisve, ex quibus aquas elici diximus, aut aquis ipsarum simplicibus vel compositis, Tartarum & Vitreolum calcinata prius, & parum spiritus Vini, aquam ex illis eliciendo. Vel ex solo Tartaro & Vitreolo, additis Silicibus calcinatis, puluerisatis, sinunt liquorem effluere, eumque postea destillant, & pro experimentis habent.

Succum Laserpitij cum Caricis, Anagallidis cum Vino exhibet Diosc. alij herbe Peti, alij extractum Iuniperi laudant.

Oleum Cnicinum potum: Olea Salium prædictorum miscent cæteris Chymici.

Ex misturis, eæ compositiones, quæ in cachexia à viscerum imbecillitate, obstructione, duritie & scirrho progressa conueniunt, illicque descriptæ sunt, in hydropo ascite, si ab hisce causis quoque nascatur, & tunc cachexia illum præcesserit, vel etiam comitetur, locum habere quoque possunt, & cum vrinis ferè simul prouocet, ea ratione etiam hydropis causâ competunt; Vti sunt illic expositæ.

Portiones ex Iulepis, & lactea illa ex Terbinthina.

Electuaria item, maximeque illud quod in metu hydropis in cachexia ex variis, vti & rob de ebulo & sambuco paratum proposuimus. Et ex vtitatis compositio Dialacca & Diacurcuma, hydropicis etiam accommodantur.

Ex pulueribus quoque seu speciebus vtitatis, tum plerosque, tum maxime duarum iam dictarum compositionum, dare possumus.

Et ex simplicioribus, puluerem summit. Cetaurij minor. & comarum Absynthij Pontici, aliosque aliquos.

Dein & Napi vel Anethi pulueres, cum Vino Absynthite vel Praisij in hydropo propinamus.

Vti & Hepar lupi præparatum, Intestinarum item lupi vel galline pulueres vel cineres. Et præter hæc in hydropo etiam Hepar cuculi: Dein & Splen asini domestici vel syluestris, vel pulli Equini, liene affecto: Item

caro Ericij: Corpus vespertilionis ablato capite: Lumbrici; omnia exiccata & puluerifata, vel in cineres vsta exhibita, per se vel cum alijs pulueribus, in Vino syrupo vel aqua, conuenientibus, appropriata hisce visceribus affectis censentur.

Cantharides vel Cicadæ aut Grilli, si in furno in cineres vrantur, & de puluer 3. j. cum aqua vel syrupo conuenienti detur, vel lacte, potenter vrinas ducunt. Potest addi gummi Ceraforum vel Prunorum, vt minùs exulcerent.

Æs combustum, Magnetem puluerifatum, sunt qui probant, si propinentur.

Pilulæ quoq; in cachexia expositæ, in hydrope inde nato conuenient. Et ad vrinas mouendas in hydrope sequentes sunt efficacissimæ, quæ R. Cantharidum abiectionis tenuioribus 3. 6. adde Mastiches gr. vj. Rhabarb. 3. 6. omnia tenuissimè puluerifata excipiantur resinæ Laricæ vel Abietinæ limpide 3. ij. addendo infusion. gummi Tragach. fact. cum aqua Viol. spissæ adhuc, Butyri recentiss. ana 3. 6. Incorporentur Saccharo cando, vt Pilulæ formari queant: Detur 3. j. ad vires explorandas ab initio.

Extrinsecus ad motus abdomini & partibus subditis tumetibus, aquam in illis contentam conabimur quoque absumere, illis quæ serum ex illis sedibus attrahunt seu eliciunt, & in halitum digerunt seu exicant. Quod varijs modis per externa remedia perficitur.

Fotus vel balnea pro ventre, & pedibus tumentibus, nonnunquam & scroto tumido, fiunt ex Aqua salsa naturali maris, vel fontium, vel nitrosa aut sulphurea, aut bituminosa; Vel artificiali ex permixtione Salis vel Sulphuris paratâ,

Vel ex Lixiuio forti, præsertim in pedibus, per transcolationem cum aqua vel Vino per cineres Vitis, Quercus, Fagi, Fabarum, Brassicæ, Ofsium aliorumve parato: Addito cum fortius esse volumus, Alumine, Sale. In quo & fasciæ madefactæ pedibus obuolui possunt.

Vel ex decocto in eiusmodi lixiuio vel vino, vel aqua fabrorum vel alia aqua facto, fotus vel balnea fiunt: Inprimis ex radic. &

fol. Ebulli: Item Iridis, radic. Vrticæ Asclepiadis, Cyclamin. cort. rad. Vlmi & Filicis herb. Chelidoniâ, Centaurio, Mezereo, Rûrâ, Calamentâ, Origano, Caulibus rubr. flor. Chamomill. Sambuci, alijsve herbis siccantibus, addito Sulphure viuo, Sale vel Alumine: Interdum & Scoriâ ferri: Si Cicadarum vel Cantharidum pulu. 3. iij. in decocto addantur, vrinas simul promoueunt.

Vel fiat hæc fomentatio: R. Lixiu. communis tb. x. Aceti tb. j. Salis vel Aluminis 3. iij. bulliant cum plantis exiccantibus: Et cum spongia foueantur partes tumentes.

Stupha seu balneum siccum, corporis inferioris sedis, vel pedum solum, validius siccatur, humoresq; per sudores simul educit, idque validius si suffitu decocti prædicti, in labro positi, extinctis silicibus, excitato, calefiant: Cui ramos Laureolæ aliqui se cum successu addidisse profitentur.

Vapor seu suffitus, qui à Scoria vel Silicibus vel Marcasitâ, ignitis in Aceto forti immerfis & extinctis, vel Aceto hisce vti & lapidi Molari infuso excitatur, idem præstat: Potentiusque aget, si Ebulus aliâve illi incocta prius fuerint.

Fumus si in stupha excitetur, accenso Asphaltum durissimum, quod Gagatem lapidem vocant, idem facit.

Immergatur & veluti sepeliatur, corporis nudi pars media inferior, tumescens, in arena à sole vel arte calefacta. Quæ si marina sit, propter sal magis exiccabit, vnde & Dioscorides hoc in littore maris fieri debere iubet. Idem præstabit arena alia, Sale conspersa vel Cineribus.

In Cineribus folis hoc quoque fieri potest, qui à combustionè lignorum & herbarum siccantium facti, magis operabuntur.

In Frumenti acervo, vel Furfurum aut Vinaciorum cumulo calido idem fieri potest.

Sacculi Arenâ vel Cineribus & Sale tosto impleti calefacti, ventri & pedibus applicantur: Quibus & herbe siccantes aliæ, seminaq; calida maiora minoraq; addi possunt.

Emplâstra, cataplasmata, inunctiones diuersimodè ventri & pedibus tumentibus, & scroto interdum, si illud aquâ plenum sit, apponun-

apponuntur, ad aquas absumendas; miscendo interim, quæ visceribus simul sint accommodata, sequentibus modis.

Ex simplicioribus, Raphani radix vel Accori; Item Lepidium, confusa, cruda vel cocta cum aceto forti ventri adhibentur: quibus semina Nasturtij vel Sinapis admista, efficaciora hæc reddunt.

Bulbos cum Melle & Pipere tritos & admotos: Item Amurcam in villosa pelle perunctum, probat Dioscorid.

Cucumeris asini radix confusa, & per 24. horas in aceto squillitico macerata, additâ Mellis duplâ quantitate, si coquatur parum, addito p. j. puluer. Cimini, singulare est remedium.

Stercus inprimis Caprinum, dein & Vaccinum ventri & pedibus admota, admodum iuuant, quibus & Columbinum addi potest vel Gallinaceum. Quæ vel simpliciter applicantur, vel mista aut cocta prius cum Urina pueri vel capræ vel Lixiuio. Aliàs cum Vino vel aceto aut Oxymel. simpl. vel squillitico, addendo interdum & Sulphur, interdum & Nitrum vel Sal.

Vel: R. stercoris Caprini vel Vaccini parum exiccati, emplastri de baccis Lauri ana t̄b. β. cineris Cochlearum terrestr. vel aliorum Testaceorum ʒ. β. Aceti, Mellis q. f. fiat emplastrum.

Aliud à quibusdam probatum, sic commodius parabitur: R. Stercoris Columbini, Vini optimi an. t̄b. j. aceti ʒ. iij. succi Ebuli & Iridis ana ʒ. ij. Mellis ʒ. iij. Sulphuris viui ʒ. j. Salis vel Nitri ʒ. β. farinæ Fabarum vel Lupinorum ʒ. j. β. coquantur ad spissitudinem, addendo circa finem baccarum Lauri ʒ. j. semin. Cimini ʒ. β. semin. Nasturtij, radic. Cyperi, Entulæ ana ʒ. ij. florum Chamom. & Anethi ana p. j. Terebinth. q. f. fiat Cataplasma.

Aliud sic fit: R. Stercoris caprini vel vaccini arefacti quartariū j. Thuris, Mastiches, Myrrhæ ana ʒ. j. radic. Cyperi, Costi ana ʒ. β. Cimini ʒ. ij. Sulphuris viui, Salis ana ʒ. iij. Aceti squillitici & Mellis q. f. fiat emplastrum.

Vel: R. Stercorum prædictorum ʒ. ij. fol. Pedis columbin. Rutæ, Parietariæ, Ebuli ad m. ij. coquantur in Urina vel Lixiuio, & aqua salsa, & Vino, pistentur, adde farinæ Lu-

pinorum, bacc. Lauri, ana ʒ. iij. olei Rutacei ʒ. ij. fiat Cataplasma.

Cochlearum terrestrium seu limacum caro confusa applicata valde conuenit. Cui Opercula admiscere iubet Diosc. Quod vt commodius fiat, in puluerem prius redigi debent, quod facilius fit, cum friabilia sint. Si testas admiscere etiam velimus, vt aliqui docent, rectius prius in cineres rediguntur, cum ægrè contundantur: Mucus quoque cochlearum conuenit.

Huic carni sic confusæ, si Stercoris caprini vel vaccini æqua pars addatur, vtile admodum fit emplastrum. Cui viscerum internorum causâ, Mastiche, Spica, Schœnanthum, Asarum addi possunt.

Vel tale fiat additis etiam aliis: R. Baccarum Lauri ʒ. β. feminis Cimini vel Carui ʒ. ij. feminis Nasturtij, Viticis, Staphis agr. an. ʒ. j. rad. Iridis ʒ. iij. radic. Asari ʒ. j. Mastiches, Myrrhæ ana ʒ. ij. Mumia ʒ. j. Spicæ, Schœnanthi ana ʒ. β. Sulphuris viui ʒ. iij. Salis vsti ʒ. ij. cinerum Vitis vel Quercus aut Cochli. ʒ. j. fiat puluis subtilis, irroretur Aceto forti, & cum æqua portione, Stercoris capræ vel vaccæ, vel carne cochlearū, fiat, Cataplasma.

Succis quibusdam si venter illinatur, vel emplastretur, aquæ ab eo exhauriuntur. Efficacissimi sunt succi Cyclaminis, vel loco illius Serpentariæ vel Ari, Cucumeris agr. Mezerei, Chameleæ, vel Thymeleæ, vel in illorum penuria Laureolæ, vel Lathyridis: Item Soldanellæ. Mitiores sunt succi Ebuli, Sambuci, Iridis, Aristolochiæ, Asari, Mercurialis: Hi vel soli vel inuicem permisti excipiuntur farinâ Fabarum vel Lupinorum vel Orobi, addendo interdum Spicam, Asarum, Schœnanthum, atque cataplastmatis instar supra vmbilicum lato spacio applicantur: Vel magis diluta illinuntur.

Vel fiat tale ex illis vnguentum: R. succi Cucum. agr. ʒ. iij. succi Cyclaminis vel illius loco succi Serpentariæ vel Ari ʒ. ij. succi Chameleæ, vel illius loco Laureolæ ʒ. j. succi Ebuli, succi Iridis ana ʒ. j. β. Fellis tauri ʒ. β. olei Nucum, Squillitici, Butyri ana ʒ. iij. fiat decoctio ad succorum aliquam consumptionem, addendo postea puluer. Scammoneæ ʒ. j. β. Colecyntid. ʒ. j. Euphorbij ʒ. ij. pulu.

radic. Cyclamin. si succus non fuerit ad-
fusus 3. iij. Cera q. f. fiat vnguentum.

Si omissis quibusdam parua illius quanti-
tas cum melle coqueretur, esset efficacissimu.

Vel vtendum sequenti liquore pro inun-
ctione partium tumidarum: R. succi Cucum.
agrest. 3. j. β. succi Ebuli vel Iridis 3. ij. fol.
Laureolæ vel Chameleæ M. j. resinæ Lari-
cæ vel Abietinæ 3. xij. Myrrhæ 3. β. Thuris,
Mastiches ana 3. ij. Nucis mosch. 3. β. miscean-
tur atque destillentur.

Aut illinantur oleo sequenti: R. olei Nu-
cum vel Lini 3. ij. β. Vini & Aceti squillitici
3. iij. decoque in illis fructus vel folia Cucu-
mer. asini: item Mezerei vel Laureolæ con-
tusad M. iij. radic. Squillæ, Euphorbij ana 3. β.
colentur ad vsum.

Vt visceribus hæc etiam accomodentur,
Poterimus succis eiusmodi aquas promo-
uentibus, vt Cucum. agrest. vel alteri, æquā
portionem succi Absynthij addere, atq; in-
terdum etiam, si hepar læsum suspicemur,
succis radic. Consolid. maior. tantundem, &
cum Oxymell. simpl. vel squillitico, addito
Gummi ammon. dissol. in Aceto squillitic.
parum decoquere, atque Santalos, Spicam,
spec. Dialacæ vel Diacurcumæ aliæve per-
miscere, torique abdomini apponere.

Aliæ quoque illitiones vel applicationes
ex sequentibus fiunt: R. radic. Cyclaminis
3. j. β. radic. Asari 3. j. radic. Aristoloch. & Py-
rethri ana 3. β. feminum Apij, Rutæ, Sina-
pis ana 3. ij. Spicæ, Schoenanthi ana 3. β. ci-
nerum Cicadarum vel Canthar. 3. j. olei Ab-
synthini, Laurini vel Rutacei ana 3. ij. olei
Scorpionū 3. j. Bdellij in aceto dissol. & Cera
q. f. fiat Linimentum. Vel addendo farin. O-
robi vel Lupinorum, vel Fabarū q. f. fiat Ca-
taplasma. Vel omissis oleis excipiantur pul-
ueres, & farinæ succo Cucumer. asinin. vel
Laureolæ, vel Cyclam. vel Ari, & fiat Vn-
guentum vel Cataplasma, quæ melius Mel-
le addito hærebunt. Vel in formam empla-
stri, additâ Pice & Cera redigantur.

Vel: R. Aeris vsti 3. ij. Aluminis vel Salis
3. β. radicis Iridis 3. iij. farinæ Orobi 3. j. exci-
pantur vti superiora oleis, vt Oleo squilliti-
co, vel succis, & eodem modo adhibeantur.

Vitata vnguenta pro ventre inungendo,

sunt Arthanitæ vnguentum, seu de Cyclo-
mine dictum Mesuæi, præ ceteris efficacissi-
mum. Quod paratur ex succis cyclaminis,
cucum. agrest. aceto, felle taurino, aloë, scam-
moneâ, colocynthide, turbith, mezereo,
gummi euphorb. sagapeno, myrrhâ, poly-
pod. chamomill. pipere, zingiber. sale gem-
mæ, oleo irino, butyro & cera.

Est & aliud de Arthanita seu de Cyclami-
ne minus vnguentum, cum splen induruit,
maximè conueniens. Quod fit ex succis cy-
clamin. ebuli & aceto, tamarice, polypodio,
gummi ammoniaco, bdellio, radice cappa-
rum, spicanardi, & oleo irino.

Aregon siue Arregon falso dictum Vn-
guentum Nicol. in ascite, ventri quoque illi-
tum idem facit. Quod fit ex rad. ari seu ser-
pentariæ, cucumer. asin. bryoniæ, pyrethri,
herbis laureolâ, pulicariâ maiori & minori,
fol. cucumer. asinin. rosmarin. maioran. fer-
pilli, rutæ, lauri, saluiæ, sabina, calamentæ,
gummi, mastiche, oliban. euphorb. aromatis-
zingib. pipere, oleis moscel. communi, lauri-
no, petroleo, adipe vsti, butyr. & cera.

Agrippæ vnguentum Nicolai ad idem v-
surpatur: Quod fit ex radic. bryoniæ, cucum.
asinin. squill. iridis, ebuli, tribul. aquatic.
oleo & cera.

In vesicæ regionem, circa pectinem appli-
cationes & inunctiones eiusmodi pertingen-
tes, vrinam simul mouendo, etiâ proderunt.
Et priuarim quoq; ad eam promouendam,
huic loco ea quæ mictione promouere pos-
sunt, in suppressione illius descripta adhi-
beri possunt. Veluti inter cætera est Fotus
ex decocto Allij & succo Pedis Columbini
& Vrina pueri: Item Inunctio ex oleo Scor-
pionum aliisve.

Podici aliqui etiam remedia adhiberi vo-
lunt, vt inde virtus ad abdomen perueniens,
in eò fortè aquam absumat.

Quod commodius præstabitur, si suffusus
vapor aut fumus, quibus venter & pedes
suffumigantur, etiam podice excipiat.

Fouetur quoque eo nomine podex, vel
inungitur: Aquâ vitæ, cui parum olei de Eu-
phorbio vel de Castoreo, & succus Iridis ad-
mista sint, addendo si vrant, Butyrum vel
Oleum commune: Cataplasmata idem præ-
stabunt.

stabant, eadem quæ ventri aliàs applicâtur.

Narrant Lapidem à colubro aquatico, fuisse caudæ alligato & suspensò, vomitu in suppositam aquam eiectum, tantarum virium esse ad aquam absumendam, vt eam in quam decidit, mox absumat, eum si ventri alligetur, aquam in eo quoque consumere.

Hepatis & Ventriculi, si affecta sint, habetur ratio, remediis quæ in illorum affectibus maximè, in cachexia & obstructionibus expofita sunt.

Viuenti rationem quod attinet, Aer ficior melior quàm vduis.

Exercitium si ferre possint, semper aliquid discutit.

Friciones validius illud præstant, inprimis si fiant manibus prius inunctis Sale & Oleo, vel Hydrelæo, eousque donec erubescat cutis.

Discutiuntque potentius Rubificantia simul adhibita abdomini, inter quæ Sinapis semen cum Vrina illitum probatur.

Cucurbitulæ vniuerso vètri admotæ, etiã ad discursionem opitulantur.

Vigiliæ, etsi eo quòd magis quàm somnus ficiant, probentur; tamen quia ob dyspnœa molestæ, plus debilitant, potiùs de somno vt reficiantur, illis prospiciendum.

In victus ratione, quæ moderatâ & parca magis quàm larga esse debet, vtendum euechymis & eupeptis: Abstinendum ab humidis, & asis potiùs quàm elixis fruendum: A salis, aromatizatis, calidisq; potiùs temperandum, ne sitis quæ alioquin vrget, concitetur. Diureticis tamen oleribus vt licet, vt Petroselin. Fœnicul. Eruca laudatur, & Brassica: Hepata Lupi, Vulpis, Gallinarum, Alaudæ comesta, appropriata censentur.

Potus sit parcissimus; nam omnino ab eo abstinere perdifficile, quod tamen cum aliquibus pluribus diebus fecissent, sanitati restituti fuerunt, illi nimirum quibus viscera nondum læsa erant. Aquæ autem potus, cum multum feri procreet, immodicus præfertim, noxius; si Aceto addito parùm aciscat, vtilior ad sitim restringendam. Vinum tenue acidulum, cum vrinam prouocet, vtile: Aceto condire res quoq; confert, non solum lienis, cuius obstructionibus acetum

inprimis conuenire existimant, sed & hepatis, atque sitis extinguendæ causâ.

Intumescencia pedum diffusa alia ab ea ^{Pedum intumescencia curatio.} quam tumorem œdematosum vocauimus, mollior, à seroso crudoque succo pronata, quæ nunc vnus, nunc vtriusque pedis, vt in hydrope amplum spacium occupat; aliàs in certa aliqua saltem illius parte, vt pede inferiore, vel circa malleolos, aut vti nos obseruasse diximus, in nuda tibiæ sede occurrit, quæ siue hoc illòve modo se offerat, citra alium morbum comitem, diu perseuerat, vel si cesset, & certis temporibus recurrit, difficulter in quibusdam, quibus familiaris & consueta est, amouetur, vel ne redeat, præcauetur: nisi corpus ab eiusmodi excrementis & humiditatibus, quæ natura continuò ad inferiores hæc sedes ablegat, optimè repurgetur, illorumque prouentus impediatur.

Quod moderatâ & parca victus ratione præstabitur, & per multas euacuationes per aluum, per sudores, diu interdum ad septimanam vnâ vel alteram, vel mensis quoque spacium continuatas, vel etiam per mictiones: adhibitis simul aliis quoque particularibus euacuationibus, aliisque alterantibus, hosce humores absumentibus, visceraq; quorum imbecillitatis causâ hæc congeruntur, roborantibus: cuiusmodi remedia in defluxionibus & arthritide, à serosis quoque humoribus hisce dependentibus, aliisq; inde natis morbis, copiose expofita fuerunt, quæ & huic affectui accommodari possunt.

Topica quod attinet, eiusmodi humiditates vnde pedes intumescunt, etiam ab initio repellendæ erunt, iisdem admotis, quibus œdemata diffusa reprimi diximus, postea etiam exiccandæ & absumendæ, iisdem que in eodem casu, & in hydrope ascite propofita fuerunt, ad illud præstandum topicis fortibus, inunctionibus & emplastris. Inprimis autem fasciæ hic aliquid singulare efficient, intumescenciamque hanc continebunt, tandemque ne amplius redeant, prohibebunt, si indies fasciâ longâ palmum latâ, ab imo pedis incipiendo & ad genua vsq; procedendo, pedes strictè manè dum nondum ad eò atq; interdum fieri solet, intumuerunt, obuoluantur.

tur, sicque donec iterum decumbant, vel etiam dies noctesque retineantur, quod & ocreâ molli arctè per futuras in longum pedid adstrictâ, aliisve artibus præstari possit.

*Neu intumescen-
tia post
morbos
remanen-
ti cura.* Aliæ quæ in pedibus accidunt intumescen-
tiae, post morbum aliquem relictæ, illis-
que qui ab eo conualescunt, aliquâdiu con-
tingere solitæ, subsidentibus eò quibusdam
humiditatibus excrementitiis, quæ in mor-
bis remanserant, cum pro bono signo repu-
tentur, ferè negliguntur, & sponte vel post
leuem euacuationem, aut sudores iterum
dissipantur. Quod si verò ex viscerum læsio-
ne aliquâ, post morbum relictâ, aut ab eo in-
ductâ, hoc procedat, tunc quia hydropis est
initium, ut in eo facere iussimus, hîc quoq;
procedendum.

*Hydroce-
les cura.* Hydrocele si cum hydrope ascite iunga-
tur, scrotumq; vnâ cum abdomine aquâ im-
pletum in tumore excrescat, periculosa uti
& ipse ascites existit. In qua sananda eo mo-
do veluti in ascite dictum, cura instituenda,
ascitiq; in genere accommodanda, per quam
si venter subsideat, etiam scrotum spontè de-
tumesceat. Quod nisi fiat, particulatim quoq;
topica in ascite explicata, veluti fofus, suffi-
tus, emplastra scroto erunt applicanda, vel
uti illic quoque edoctum, per puncturam fa-
ctam, aqua ex illo educenda, unde eam quæ
in abdomine erat, subsequi ostendimus.

Quod si verò hydrocele per se citra alium
manifestum morbum in infantibus vel adul-
tis nascatur, scrotumque solum sero ple-
num intumescat, cum impedimentum non
magnum, donec admodum augeatur, adse-
rat, ab initio ferè negligitur, nec dum, do-
nece incrementum acceperit, cura illius sus-
cipitur. Quæ iisdem remediis topicis in ascite
expositis, ut serum, si fieri possit, exhau-
riamus, instituitur. Inter quæ cataplasmata
ex stercore caprino vel vaccino & cochlea-
rum carne facta, neglectis aliis quæ visce-
rum causâ, si ventri applicari debeant, admi-
sentur, erunt efficaciora.

Vel fiat tale cataplasma: R. Stercoris ca-
prini vel vaccini lb.j. Cochlearum terrestriu
coctarum in Lixiuo & incisarum minutim,
numero xij. misce cum stercorebus, & co-
quantur denuò simul cum remanentia il-

lius lixiuij, addendo farinæ Fabarum ʒ. iij.
semin. Cimini ʒ. ʒ. semin. Sinapi ʒ. j. Sulphu-
ris ʒ. j. Cinerum testarum cochlearum & ra-
dicum & Caulium brassicæ crematorum ʒ.
ʒ. misce.

Foueatut interea simul locus affectus fo-
tu ex Lixiuo, cui Salis & Sulphuris portio
admista sit.

Præter hæc remedia vsurpantur & simul
per vices, quæ non solum aquas absument,
sed & valida adstrictione prædita, viam per
quam aqua in scrotum exstillat, constrin-
gendo arctent, & nihilominus siccitate suâ
quam obtinent, aquam quoque exiccent.

Quale hoc est cataplasma, quod paratur
ex stercorebus enarratis, admista tertiâ par-
te Boli rubri, atque aceto vel Oxy-melite.

Vel sequens, quod R. Furfuris subtilissi-
mè triti lb. j. farinæ Fabacæ quartarium j.
seminis Cimini ʒ. ij. Gallarum ʒ. vj. Hypoci-
stidis vel Acaciæ ʒ. ʒ. Aluminis ʒ. ij. coquatur
in Oxy-melite in formam cataplasmatiss.

Hicce si non cedat tumor, per puncturam
curam aggrediemur, quæ leui negotio, &
non ita magno cum dolore, in parte scroti
humiliori perficitur, adigendo scalpellum,
per cutem illic distentam, aquamque donec
nihil amplius prodeat, educendo, & si quid
residui remansit, exprimendo, vulnusque
aliquandiu apertum, immisâ turundâ, ser-
uandum, vel chorda per vulnus, pro aquæ
effluxu, aliudque pro chordæ egressu para-
tum, trahenda, sicque aquæ via patens re-
tinenda.

Præter quam curam, si huic affectui ob-
noxius ita sit aliquis, ut intra certum tempo-
ris spacium aquâ redeunte, noua fiat eius in
scroto collectio, præueniendum hac ratio-
ne, Nimirum aquæ illius in abdomine col-
lectio seu nimia humiditas, bonâ viuendi ra-
tione, euacuationibus decentibus, vsq; eo-
rum quæ serositates in corpore absument,
impediendâ, sicuti in imbecillitate ventri-
culi fuit expositum, & si viscerum sanguifi-
cationi destinatum, aliquod vitium simul
adesse cognoscatur, hicce quæ in cachexia
fuerunt declarata, huic quoq; medendum.

Dein si à relaxatione processu peritonæi
hoc dependere, ex eo maxime quod mox
cedat,

redeat, cognoscamus, ut eam constringamus, viamque sic obturemus, iisdem remediis, quibus in enterocoele & epiplocoe ab eadem causa natis, inguini appositis, illud præstari diximus, hic idem moliri conabimur, quibus si nihil efficiamus, non alio modo huius affectus recursus præcaueri poterit, quam vinciendo hunc processum, sectione prius in inguine factâ, uti in aliis illius relaxationibus & rupturis, per quas intestina in scrotum prouoluuntur, fieri diximus. Quod cum non sine periculo vitæ, vel testis amissione fieri possit, & proin nec illi nisi magna urgeat necessitas, facile suscipiatur, sic longè minùs in hydrocoe, in qua satius est leuem hanc molestiam perferre, vel aliquoties per puncturam quæ non adeo ardua, aquam emittere, quam de supraddictis periclitari.

Inguinis Aquosus tumoris curatio. Aquosus inguinum tumor in mulieribus hydrocelæ respondens, eandem ferè cum ea curationem requirit, applicando similia quæ aquam absument.

Hydromphali cura. Hydromphali circa umbilicum enati cura quoq; nõ dissimili ratione, & per topica administrata, manualèq; operatione perficitur.

Hydrocephali cura. Hydrocephalus in capite vix topicis adhibitis curatur, cum materia ob crassam capitis cutem difficulter digeratur, tentatis tamen prius efficacissimis in œdemate & hydrope expositis, si non succedat; per sectionem aut vñtionem, cura facile perficitur, eoq; tutius, cum hæc citra periculum hæmorrhagiæ maioris, aut doloris in hisce sedibus stupidiore fieri possint, unde satius hoc pacto rem aggredi, quam multis aliis adhibitis, ægrum diutius molestare.

Palpebrarum tumoris curatio. Palpebrarum inflatio, vel sponte iterum actuali calore dissipatur, vel si perseveret, fortibus, qui clausis oculis palpebris adhibentur, vel inunctionibus discutientibus, in œdemate seroso expositis, denuò subsidet.

Phlyctenarum cura. Phlyctenæ seu vesicæ parvæ sero impletæ, interdum sponte subsident, vel vi perforatæ aut scissæ vel disrumpæ per se, aquosum humorem profundentes, cutis scissuram hanc & abrasionem pariunt, tuncque abrasio hæc curis vel scissura, uti in illis dictum fuit, sanantur.

Hydroæ cura. Hydroæ verò illæ parvæ & multæ, quas

Germani Sûren vocant, si quem diuexent ob pruritus, quia copiâ serosi humoris salsi vel biliosi aut alioquin impuri significant, ille expurgandus, corpusq; purum reddendum erit; iisdem remediis quæ in scabiei cura docuimus; ipsas verò quod attinet, ut humor ex illis effluat, aperiendæ erunt: Ad quod faciendum unguibus, pruritus impellit; Vel acu aliòve acuto stylo, uti ferè consuetum est, perficitur; quo facto, crustæ inde natæ & scabies quæ sequitur, aut plerunque comitatur, uti in scabie ostensum, sanabuntur.

Oculi vesicæ curatio, in oculorum doloribus fuit exposita.

A flatu maximè genitarum intumescen-tiarum & tumorum curatio, primùm debetur huic quæ generaliter quoq; est vñtris totius, Tympaniti, & totius corporis Intumescen-tiæ aut Inflationi; Postea peculiari inde nato tumori, in scroto Pneumatocelæ, in gutture Bronchocelæ, vel huic quem Phylodem vocant.

Tympanitis cum tres species ob causarum diuersitatem occurrant, è quibus duæ frequentiores, prima à flatu in intestinis solum consistente profecta, altera à flatu & aqua in abdominis cauo coaceruatis dependens, tertia rarissima à solo flatu ibidem incluso enata, sicuti in causis fuit expositum; nos, quid in singulis agendum sit, explicabimus.

In prima tympanitis specie, quæ à flatibus non in vñtris capacitate, sed ventriculo & intestinis collectis, eaq; adeò distendentibus, ut inde venter intumescat, procedit, si ob conuolutionem intestinorum, aut aliam permanentem obstructionem eueniat, atq; intestina ad extremum vsq; attenuata sint, adeò ut rursus in se redire nequeant, vel etià leui impetu, uti vidimus, disrumpantur, desperatum plerunque malum existit; quod si verò non adeò hæc distentio aut obturatio inualuerint, ita ut colici doloris flatulenti potius sit species, quam verus tympanites, spes sanationis tunc maior affulget.

Cura autem in hac tympanitis specie sit instituenda, ut viam hanc intestinorum interclusam rursus referemus, idque maturè, antequam ad extremum res deuenerit, illudq; Clysteribus iniectis potissimum, qui emol-

Tympanitis intestinalis curatio.

liendo, stimulado, aluum soluant, flatusq; simul dissipent, vel exhibitis purgantibus aliisve intro forisq; adhibitis remediis, iisdem quibus in colicis doloribus simili modo excitatis & alui constipatione, vtendum eiusmodi casibus esse diximus, eaq; illic copiose, vt non opus sit hic repetere, descripsimus.

Tympanitis cum ascite copulata cura.
In altera vero tympanitis specie, in qua & flatus & aqua, abdominis cauum replentia, ventrem in tumorem attollit, cuius & tanquam frequentioris, curam Practici serè tantum attingunt, quia in eo & tympanites & ascites concurrunt, ob geminum hunc affectum, quorum vterq; grauis est, periculum quoque maius exurgit.

Cuius curatio ab ascitis curatione non adeò discrepat, nisi quòd imbecillitatis ventriculi, vnde flatus prodeunt, siquidem inde tunc proueniant, simul habetur ratio, & siue inde siue ab aqua in ventre contenta, in flatumque resoluta proueniant, illis simul dissipandis cura adhibebitur.

In eaque purgantia in principio eadem quae in cachexia & leucophlegmatia, ventriculorum & viscera ab excrementis expurgare diximus, & postmodum quæ & aquas simul educunt, in misto hoc casu similiter vsurpabimus, flatus pellentibus, illis interim amplius, quam in simplici ascite permittis.

Præterea & sequentibus vti possumus: *Rx.* radicis Liquiritiæ 3.j.β. radic. Aperitiuarum ana 3.j. Valerianæ, Ireos, Enulæ 3.β. radic. Asari 3.ij. herbarum Menthæ, Betonice, Marrubij, Capillarium herbarum aliquarum, Chamædryos ana M.j. florum Cordialium, Genistæ, Rosmarini, Stœchados vel Lauandulæ ana P.j. femin. Anisi, Fœniculi ana 3.ij. femin. Petrosel. Seseleos, Endiuia, Cuscutæ ana 3.j. feminum Melonum 3.ij. Passularum enucleat. 3.j. foliorum Sennæ, femin. Carthami ana 3.j.β. Epithymi 3.ij.β. Possent & foliorum Soldanellæ 3.ij. addi: fiat decoctio in aqua & tertia parte vini, infunde Rhabbari, Agarici vel Mechoacæ ana 3.β. Cinamomi, Zingib. Santali ana 3.j. Spicæ, Schoenanthiana 3.β. adde Sacchari q. l. fiat Apozema: Pro tribus vel quatuor vicibus.

Vel Vinum tale ex infusione sequentium fiat: *Rx.* rad. Cichoræ, Fœniculi ana 3.j. rad.

Ireos, Enulæ ana 3.β. radicum Gentianæ, Phu veri ana 3.ij. herbarum Absynthij, Mentæ, Chamæpyth. Ceterach ana M.j. summitat. Centaur. Rosmarin. ana P.j. feminum Fœniculi 3.β. feminis Carui 3.ij. foliorum Sennæ 3.j.β. Agarici trochisc. Rhabbari ana 3.β. Spicæ, Schoenanthi ana 3.β. infundantur in Vini debitâ quâtitate: Pro quatuor vel quinque vicibus.

Clysmata similiter in anasarca & ascite exposita hic competent. Vel sequens flatibus simul dissipandis accommodatum. *Rx.* radic. Ireos, Bryoniæ ana 3.j.β. radic. Gentianæ 3.β. radic. Asari 3.ij. Cortic. radic. Sambuci 3.j. herbarum Rutæ, Matricariæ, Marrubij ana M.j. florum Centaurij min. Chamomill. Meliloti, Anethi vel Sambuci, Lauandulæ vel Stœchados, Rosmarini ana P.j. baccarum Iuniperi vel Lauri 3.vj. feminum Cimini vel Carui, vel Fœniculi 3.β. femin. Petrosel. offic. 3.ij. femin. Fœnogræc. 3.ij.β. feminis Carthami 3.β. Agarici troch. 3.ij.β. foliorum Soldanellæ vel rad. Cucum. asin. 3.ij. (Vel his ommissis purgantibus, parum Colocynthidis addimus) fiat decoctio in aqua & tertia parte vini vel Lixiuij debilis, & in colaturâ q. l. dissol. Fermenti 3.ij. Mellis 3.ij. olei Rutacei 3.ij.β. Salis parum, fiat Clyster.

Possumus, ommissis in decocto cathartici validioribus vel paucioribus additis, dissoluere horum loco Hieras vel Bened. laxat. ad 3.β. & succi Mercurialis vel rad. Iridis 3.j.β. permiscere.

Alterantia quæ variis formis in hydropse ascite exhibita conuenire diximus, hic quoque locum habere possunt, eligendo potissimum ex illis, quæ plura flatus dissipantia simul recipiunt: Vel permiscendo ea ipsis, & sic vtendum.

Inter quæ & talis puluis componi potest: *Rx.* radic. Valerianæ 3.j. rad. Ireos, fol. Chamædreos, Mentæ ana 3.β. feminum Cimini in aceto prius maceratorum & siccatorum, Fœniculi, Carui ana 3.j. cinerum Intestinarum Gallinæ vel Lupi, vel Lumbricorum 3.β. fiat Puluis.

Vel hoc electuarium fieri: *Rx.* conferuæ radic. Cichoræ, conferuæ rad. Valerianæ ana 3.j. conferuæ Maioranæ, Zingib. condit. ana 3.β.

3.ß. spec. Diacimini, Diacurcumæ ana 3.j. cineris Intestin. gallinæ vel lupi 3.ß. cum syrupo de Radicib. fiat Electuarium.

Extrinsecus ea quæ in hydrope ascite præscripsimus, hîc quoque ventri apposita proderunt, cum sicuti aquas, ita & flatus simul absumant, eligendo tamen hîc quæ singulariter flatibus dissipandis destinata sunt, vel talia illis permiscendo, vel per vices nunc his quæ vtrumque faciunt, nunc illis quæ in tympanite à flatibus solis genito competunt, vtendo.

Inprimisq; in mista hac causa conferunt emplastra, ex stercorebus illis descripta, præfertimque ea quæ multa flatibus discutientia simul recipiunt.

Vsitatum emplastrum de Lauri-baccis hîc præsertim accommodum, vel solum vel cæteris admistum, cum & præterquam quod in ascite conuenit, flatibus simul discutendo, tympaniti, si is quoque adsit, conducatur. Quod, vt in Ventriculi imbecillitate dictum, paratur.

Regimen in viuendi ratione quod attinet, idem quod in ascite propositum est, hic etiam obseruandum, & in victus ratione, inprimis ab illis quæ flatuum prouentum procurant, abstinendum.

*Tympanitis sim-
plicu cu-
ratio.* In tertia Tympanitis specie, quæ à flatibus è ventriculo & intestinis in abdominis cauum erumpentibus, ventremq; in tumorem attollentibus oritur, quod raro accidere diximus, grauius adhuc quàm in cæteris se offert periculum, deteriorq; proin hydropis species esse censetur, tum quia ab iisdem causis, vti prima species, obstructione scilicet omnimodâ & conuolutione, summaq; intestinorum attenuatione procedit, tum quia ex abdomine flatibus ægre rursus discuti absumique possunt. Grauiusque adhuc & immedicabile fere erit malum, si extrema ventriculi imbecillitas, flatibus hisce gignendis occasionem præbuerit, eum discussis prioribus ex parte, noui semper succedant, vt & si solutio aliqua manifesta in intestinis facta, flatibus, vt in abdomen ferantur, ianuam aperiat, cum ea amplius reparari nequeat.

Huius curatio, si à suppressione alui à causis dictis originem sumpserit, per eadem re-

media, quibus in prima specie eam aperiri debere ostendimus, aggredienda, & si ab imbecillitate summa ventriculi principii trahatur, ad eam emendandam, vt & flatibus discutientibus absumendisque, cura præcipue erit dirigenda, idque remediis in ventriculi imbecillitate prolixè descriptis.

Purgantia exhibendo, quæ crudos humores, ventriculi imbecillitatis causâ cōgestos, flatibus materiam præbent, euacuent, flatibusq; simul educant. Qualia in cura imbecillitatis ventriculi varia fuerunt proposita.

Possimus ad idem sequenti decocto flatibus simul pellendis accommodo vt: R. rad. Fœniculi, Petroselinæ ana 3.j. rad. Enulæ, Iridis ana 3.ß. Absynthij 3.ij. Mentæ, Majoranæ ana 3.j. florum Rosmarini, Stœchados vel Lauandulæ ana p.j. seminum Anisi, Fœniculi ana 3.ij. sem. Carui 3.j. feminis Carthami conuass. foliorum Sennæ ana 3.vj. fiat decoctio in Aqua & Vino, in fine addendo Rhabbarbari, Agarici trochisc. ana 3.ij. Cinnamonomi 3.j. Spicæ 3.j. & in colatura dissolue Sacchari q. s. fiat decoctum: Pro aliquot vicibus.

Vel hæc omnia, Saccharo dempto, infundantur in Vino; Illudq; aliquoties bibatur.

Alia Potio: R. Rhabbarbari 3.iiij. Spicæ 3.j. Agarici trochisc. 3.ij. Zingib. 3.j. macerentur in vino albo & aqua Fœniculi. fiat expressio: adde Diacarthami vel Diaphœnic. 3.j. detur.

Enemata ad flatibus potissimum dissipandos, eadem quæ in ventriculi imbecillitate, & colicis doloribus flatulētis descripta sunt, hîc quoque possunt competere.

Vel ad rem hanc potissimum destinato clystere, & paratu faciliore hoc vtetur: R. Rutæ recentis m.ij. florum Chamomill. p.ij. baccarum Iuniperi vel Lauri p.j. feminis Cimini vel Carui 3.vj. semin. Fœniculi 3.ß. fiat decoctio in Aqua & Vino, dissolue Mellis, olei Nucum 3.j. olei Spicæ exstillati guttas. vj. misce.

Aut: R. Vini generosi vel Maluatici 3.vj. Aquæ florum Chamomillæ 3.iiij. misce.

Vel: R. Aquæ Rutæ q. s. adde Aquæ seu Spiritus vini 3.ß. fiat iniectio.

Vel: R. Aquæ granorum Iuniperi, seminum Carui, Cimini, Fœniculi, Anisi, vnius vel

vel plurium, quæ post macerationem horum in aqua cōmuni, & extractionem oleorum remanere solet q. f. Atque injiciatur hæc ad flatus pellendos efficacissima.

Hiscæ ex Vino & Aquis paratis Clysteribus succum Rutæ, oleum Rutaceum, Chamomelinum, Anethinum vel Liliorum ad 3. ij. vel iij. addere possumus, vti & Mel.

Vel ex solis oleis tale parare: R. olei Rutacei 3. iij. olei Chamom. Anethini, Liliorum ana 3. ij. olei Spicæ vel Carui, vel Cimini per destillationem elicitæ guttas vj. vel vij.

Alterantia ad primam concoctionem iuvandam, flatusque impediendos & genitos dissipandos, ea quæ illud in ventriculi imbecillitate præstare posse, descripsimus, hic quoque exhibita locum habebunt. Qualia imprimis sunt Vinum sceniculatum vel anisatum, vel quod R. cortic. rad. Fœniculi, & quæ sequuntur: Iuscula quibus baccae lauri feminave incoquantur: Vel illud quod semen carui cæteraque recipit. Portiones aliquæ, vt castoreum cum vino: Pulveres compositi quintus & decimus: Item post pastum appellatus ex seminibus concinnatus: Tabulæ cum oleis stillaticis anisi, fœniculi paratæ: Condituræ & Conseruæ ad flatus destinatæ: Electuarii in quo flatuum præsertim habetur ratio, & similia.

Pulis ad eadem efficax: R. Cimini in Vino albo infusi rursusque siccati 3. ij. semin. Fœniculi 3. j. Mentæ, Maioranæ siccae ana 3. β. Zingib. 3. j. Detur 3. j. Si castorei 3. j. vel seminis addatur, efficacissimus erit.

Vel vrantur hoc electuario: R. conseruæ foliorum Mentæ, Maioranæ ana 3. j. conseruæ Rosmarini, Lauandulæ, Zingib. condit. ana 3. β. feminis Anisi, Fœniculi ana 3. j. sem. Carui, Cimini ana 3. β. vel horum seminum loco, specierum Dianisi vel Diacumini 3. iij. Cinamomi 3. j. Cum syrupo de Absynthio fiat electuarium.

Applicanda ventriculo, quæ cum roborant, præcipueq; ventri quæ flatus absumat, qualia in ventriculi imbecillitate sunt exposita: Inprimis ad flatus resoluendos, illic descripta Olea simplicia, tum compositum ex sem. cimini cæterisque: Vnguentumque ad inflatum ventriculum præscriptum; Cata-

plasma ex pane & seminibus: Fetus ex foliis pulegij, origani, &c. Sacculos ad flatus dissipandos, alium ex radice galangæ, menta, &c. alium ex furfure & milio, quoque approbamus.

Hiscæ etiā iungi possunt sequentia: Veluti Vnguentum hoc, quod R. olei Rutacei 3. ij. olei Liliorum, Mentæ, vel Maioranæ ana 3. j. succi Rutæ, Fœniculi, Aquæ vitæ ana 3. j. β. coquantur ad succorum consumptionem, adde pulueris semin. Cimini, Baccarum lauri ana 3. ij. Ceræ q. f. fiat inunctio. Si omisis pulueribus oleum Spicæ vel Cimini aut Carui per destillationem elicitæ ad 3. j. addas, efficacissimum erit, magisque si Castorei dissoluas in Aqua vitæ 3. β. & misceas.

Cataplasma ex stercore Vaccæ vel Capræ fiat, coquendo in Vino forti, Vrinâ & Lixiuo, addendo puluerem feminis Cimini, Carui, Apij, baccarum Lauri, farinâ Fabaceam & Rutam, vel etiā alias de supradictis plantis, & Sal.

Vel fumatur Ruta, Hyfopus & Absynthium, & Ficus: coquantur in Vino vel Vrina & Aceto, pistentur, addendo farin. Fabacæ & baccarum Lauri p. j. & Nitri portionem, fiat Cataplasma.

Fetus ventris ex decocto sequentium in Vino factō conuenit: Veluti radicem Iridis, Enulæ, herbarum Rutæ, Mentæ, Maioranæ, Rosmarini, florum Chamomillæ, Anethi, baccarum Lauri, Iuniperi, seminum calidorum Maiorum, Minorum & similium supradictorum.

Vel suffitum ex eodem decocto in lecto sub integumentis ad ventrem admittat.

Sacculus ventri apponatur ex sequentibus: R. seminum Milij integri vel Panicis p. ij. seminum Cimini, Carui ana p. β. baccarum Lauri, Furfuris ana p. j. florū Meliloti, Chamom. Anethi, summit. Centaurij, Rosmarini ana p. β. fricentur in sartagine, affuso Vino & Aceto, fiat sacculus. Addi potest & semen Rutæ, Nigellæ Seseleos & Viticis: Item Aromata quædam & Sulphur.

Cucurbita magna, ventosa quod flatus eliciat, dicta, ventris regioni in vmbilici circuitu cum multa flâma affixa, potenter eos dissipat: Vel plures cucurbitulæ sic admotæ.

Viuendi rationem quod concernit, quo pacto hæc, vt cruditas flatuumque inde prouentus vitentur, institui debeat, tum in ciborum quantitate qualitateque conuenienti, tum motibus corporis & animi decentibus, in ventriculi imbecillitate prolixè fuit expositum.

Intumescentia generata seu Inflatione non totius corporis curat.

Intumescencia seu Inflatio generalis totius corporis, à flatibus progressa, quæ rara admodum est, vti verò alia à crudo succo genita, Anasarca dicta frequens, cum non nisi à causâ vehementi aliqua, vel morbo magno proficiscatur, illis cura maximè accommodatur. Quâ si causa tollatur, & si à veneno fiat, vis illius Antidotis infringatur, vel si alius morbus sit, ille abigatur, intumescencia hæc faciliè iterum cessat. Vel si morbus lethalis sit, quem tunc intumescencia hæc insolita præsignat, per mortem cum morbo desinit.

Ad eam tamen remouendam, si persistat, causâ remota, per insensilem transpirationem, sudoresque facis euacuationibus, flatibusque absumptis, intumescencia hæc remittit, quæ & exhibitis id præstantibus perficiuntur, inter quæ & Theriaca aliæve Opiatæ, si à veneno processerit, præterquam quod huic resistit, sudores quoque prouocando, profunt. Dein & extrinsecus vsurpatis stuphis, suffitibus admotisque aliis calidis aquæ & potentiâ, similiter flatus dissipantur, atque intumescencia tollitur: Qualia etiam in tympanite exposita sunt.

Pneumatoceleles curat.

Pneumatocèle si à flatibus & aqua simul, scrotum distendētibz proficiscatur, eadem ratione, præmissâ generali curâ, quâ aquæ & flatuum prouentus impeditur, topica quæ in tympanite cum ascite copulato conuenire diximus, scroto applicata proderunt, vti & ea quæ in hydrocele fuerunt proposita, cum & quæ aquas absumunt, flatus etiam dissipent. Vel vti illic ostensum, si necessitas requirat, per puncturam & aquam & flatus simul educemus.

In simplici verò pneumatocèle, vbi flatus soli scrotum extendunt, tum generalis cura per quam flatuum generatio impeditur, genitique flatus discutiuntur, tum particularis per topica eos absumentia, scroto applicata,

in tympanite exposita, hic quoque locum habebunt: Imprimisque conferet cataplasma ex stercorebus illic descriptum, additâ etiam Sulphuris vnciâ semis.

Vel hoc: R. farinæ Fabacæ lb. ss. farinæ baccarū Lauri ꝑ. iij. seminis Cimini ꝑ. j. pulu. foliorum Rutæ ꝑ. ij. Nitri ꝑ. j. Sulphuris ꝑ. iij. coquatur in Vino generoso, addendo Aquæ vitæ ꝑ. j. fiat Cataplasma.

Fotus, sacculi, suffitus & inunctiones in tympanite descripti, scroto vtiliter in hanc rem quoque adhibentur.

Vel inungatur hoc vnguento: R. olei Rutacei ꝑ. iij. olei de Castoreo, de Piperibus ana ꝑ. j. olei Spicæ per destillat. ꝑ. j. Saponis ꝑ. vj. Aquæ vitæ ꝑ. j. rad. Gentianæ, Hermodact. an. ꝑ. j. rad. Pyrethri, Cyclaminis an. ꝑ. j. sem. Cimini, Staphisagr. an. ꝑ. j. cineris Lumbricorum ꝑ. j. Terebinthinæ q. s. fiat Vnguentum.

Aur fiat emplastrum addendo Mastiches, Thuris q. s.

In inflatione alia, quâ in colicis doloribus, & conatibus validis vtrumque scrotum non nihil intumescit, cum illa non sit stabili, sed cessante vi illâ, sponte rursum intumescencia hæc levis iterum subsideat, nullam aliam curam requirit, nisi vt, ne amplius redeat, causæ auferatur, ne iterata ea sæpius, tandem quoque permanentem inducat pneumatocelem, cuius si aliquod principium appareat, maturè topicis, quæ in eo casu conuenire diximus, illud erit auertendum, flatuumque in scroto collectio impedienda.

Scroti in stationis curatio.

Bronchocele, quæ est intumescencia colli in gutturi regione, nisi maturè antequam omnino excreuerit, occurratur, vix dum amplius abigi potest, sed toto vitæ curriculo permanet, alias citra aliud incommodum, quàm quod turpitudinem eam in collo conspicuam, nisi margine crenato indusij tegatur, adfert, alias verò raucedinem & spirandi difficultatem, eamque sæpè periculosa inducit.

Bronchoceles curat.

Curatio autem licet plerunque humoribus pituitosis, quos eò defluxisse credunt, è capite expurgandis & è loco tumente absumendis, accommodetur, nos tamen qui illius causam flatum esse statuimus, ob relaxa-

tionem seu auulsionem membranę illius loci, cum cure à partibus subiectis, illic feingentem, curam potissimum eò dirigendam esse censemus, ut flatus & si quæ alia humiditas simul illic collecta sit, absumantur, & hæc relaxatio vel separatio rursus in integrum restituatur. Quod cum ægrè possit perfici, uti in herniis illud quoque vix succedere ostendimus; adhuc astringentia quæ illud præstare debebant, gutturis regioni adhibita, vias respirationis stringendo, si præsertim iam prius dyspnœa adsit, respirationi incommodent, maior adhuc hinc difficultas curandi, quàm in herniis circa inguina factis nascitur, minusque spei est, quod nec, si sectio aliqua cutis tentaretur, quæ extremum in herniis sanandis est remedium, hinc aliquid vinciendo aut affigendo illud quod solutum est, efficere queamus.

Nihilominus tamē ab initio cum incipit, vel nondum ad extremum usque excreuit tumor, nec dum dyspnœa accessit, astringentia quædam illi possunt applicari, fortiora plus minusve, prout respirationem inde vel impediri nonnihil vel minimè cognoscimus, vsurpando, additis semper iis quæ flatus humiditatesque absumant.

Vtendum ergo emplastro pro Ruptura visitato vel nostræ descriptionis, cui æqua portio emplastri de Baccis lauri commista sit, vel alia flatus discutientia semina, ut Cimini, similiaque illi incorporata.

Aut cataplasmata adhibenda, quæ in hydrocele ad adstringendum & simul discutiendum, vnum ex stercoribus & bolo, aliud ex farinis & gallis concinnata sunt.

In eundem finem, vt membranarum illa soluta contiguitas, si fieri possit, iungatur, quædam ex illis quæ in herniis propinata aliquid hoc pacto præstare posse ostendimus, hinc quoque tentari atque exhiberi possunt.

Compertumque est experientiâ, puluerem Aluminis vsti, sæpè exhibitum, multum in hoc casu abigendo, vi nimirum adstringente & siccante quâ præualet, profuisse; Qui cum Vino simpliciter 3.ß. pondere dari potest, vel cum aliis pulueribus discutientibus & siccantibus, speciebusque commistus, in forma tragematis exhiberi.

Vel hoc modo: R. radicum Ireos, Galangæ an. 3. j. ß. Pulegij, Satureiæ Herniariæ an. 3. ß. semin. Fœniculi, Anisi an. 3. j. semin. Petroselin. 3. ß. Piperis longi, Spicæ nardi, Nucis mosch. Cinamom. an. 3. ij. Myrrhæ 3. ß. Aluminis vsti 3. ß. Sacchari rosæ tabul. ad pondus omnium. Capit ad 3. j. ß. cum Vino.

In Confirmato hoc tumore, saltem flatibus & humiditatibus, si quæ inhærent, absumendis intenti erimus, & variis ad motus illud efficere tentabimur. Qualia varia in hydrocele & pneumatocèle descripta topica remedia, hinc quoque admota, pdesse poterunt.

Quibus nisi succedat, ad fortiora calidissima transeundum, hoc pacto: R. rad. Bryoniæ, Iridis an. 3. ij. rad. Cucum. asin. vel Squillæ 3. j. ß. incidantur & coquantur in Vino generoso, addendo farinæ Fabarum & Orobi an. 3. ij. Amygdal. amar. vel nucleorum Persicorum 3. j. ß. semin. Cimini 3. ij. Piperis 3. j. pistentur, miscendo olei Liliorum vel Irini 3. ij. fiat Cataplasma.

Vel gestet hoc emplastrum: R. gummi Ammoniaci, Galbani, Bdellij dissolut. in Aceto fortiss. an. 3. ij. puluerum rad. Ireos 3. ß. feminis Sinapis, Vrticæ an. 3. ij. pulpæ Colocynthis 3. ij. Croci 3. j. Salis Gemmæ & Aluminis an. 3. j. cum Picis naualis 3. j. ß. refine Abietis vel Pini 3. ij. dissolutis in oleo Nucis antiquiss. q. l. fiat emplastrum. Cui & odoris & efficacæ gratiâ, oleorum destillatorum Spicæ Carui aliorumve 3. ß. addi potest.

Inunctiones ex oleo de Piperibus vel de Castoreo vel Sycioneo, sunt manibus aquâ Vitæ prius madefactis. Vel ex iisdem additis pulueribus supradictis vnguenta parantur.

Fotus in hydrocele & tympanite descripti similiter hinc adhiberi possunt: In primisq; Aquâ vitæ panno linteo exceptâ tumor sæpè foueri.

Phyodes appellati tumores, vel illi qui à flatu & sero simul prodeunt, quos Oedemata flatulenta vocant, si à flatibus solis aut tenuibus saltem humiditatibus eueniât, mox iterum subsident, nonnunquam verò si cœpiosa aut crassiora hæc sint, diutius permanent.

In Curatione autem horum, causa prima

Phyodes
tumores
catatio.

293

mum auferenda, quæ si interna sit, fouearq; hos affectus, ea exstirpanda, flatuumque proventus, vti & cruditatum & humiditatum impediendus, eaque si redundant, euacuanda, dissipanda, topicaque hæc simul absummentia, applicanda erunt.

Qualia & generalia & particularia præsidia, in tertiæ tympanitis speciei curâ, & pneumatocele & bronchocele sunt exposita.

Quod si verò à causa externa processerint, & ex cutis attractione tumor talis oboritur; Vel ex frigore manus aut pedes intumescant, tunc causâ ablata, sponte hæc rursus abeunt. Vel calore actuali aut potentiâli per fots inunctiones dissoluuntur. Sicuti in aliis à frigore natis affectibus externis & doloribus, hæc sunt exposita.

Phlyctenarum flatulentiarum cura. Huc & Phlyctenæ, quas à flatibus gigni putant, referri possent, in quibus, cum cuticulâ à subiectâ sede liberatâ, serum quoque sub eam exsudat, non alia cura, quàm ea quæ aquosis phlyctenis conuenit, debetur.

A succo nutriente partes genitorum tumorum, atque ab eo vel quia luxuriat, aut alioquin abudat, aut crassior existit, progressum, curatio distinguitur primum, quatenus hi vel in glandulosis sedibus; Vel in carnosus locis, & vel duriores aut molliores; Vel in excarnibus sedibus gignuntur.

Glandularum cura. In glandulosis sedibus, ex succo nutriente enatorum tumorum cura, debetur primum generalioribus glandulis in pluribus corporis sedibus simul occurrentibus; Postea particularibus illis quæ guttur occupant, Strumis; Dein illis quæ post aures prodeunt Parotidibus, & quæ sub axillis vel inguinibus se offerunt, Bubonibus; Postremò & Testibus hoc modo induratis.

Scrophularum cura. Generales Glandulæ quæ in pluribus locis simul offeruntur; Alias tantum in collo plures secundum mentum serie quadam ductæ Scrophulæ, Strumæ quoque dictæ, nonnunquam & in aliis locis simul prodeutes, cum frequentius occurrant, malumque aliquando sit hæreditarium, aliis popolare, curam præ ceteris exigunt, quæ certe non sine labore, nonnunquam & non nisi longo tempore perficitur; aliis verò irrita est, cum scirrhus factæ hæc glandulæ, non amplius ce-

dunt, vel perniciem magnam vti cancrasam adeptæ, in vlcera inemendabilia transeunt, alias verò etsi succedat cura, tamen in eo nõ absoluta esse dicitur, quod licet auferantur, grauiâ tamen post se relinquant vitia, vti cicatrices turpes & inæquales, & noxas aliquas ac læsiones functionum illarum partium, quas obsederunt.

In curatione autem harum, prius corporis totius ratio est habenda, illudque vt mundum & purum sit, ante omnia præparandum, per varias euacuationes & alterationes institutas. Dein scrophularum causâ exhibenda quæ eas absumant, adhibendaque quæ eas dissipent, vel si hoc fieri nequeat, saltem eousque maturent, vt apertæ sponte vel arte, ichorem profundentes sic imminuantur, quod cum sit, & sic vel per se vel arte vlcerantur, tunc vti vlcera peruersa vel exedentia aut cancrosa, in quæ nonnunquam conuertuntur, exhibitis admotisque tractari debent, sicuti in illorum cura explicatum fuit. Interdum & antequam eò deueniant, vel cum scirrhus factæ non amplius aliâ ratione tolli possunt, nec eas tolerare velint, sectione vel vitione auferuntur. Quæ omnia quo pacto administrari debeant, ex sequentibus patebit.

Venæ sectio si plethora adsit, tum reuulsionis loco, tum deriuationis, vti & scarificationes idonæ conducere queunt.

Purgantia in scrophulis vsurpari solita, plerumque defluxionibus pituitosis, unde has nasci putant, accommodant, non solum si in collo, sed & reliquo corpore se exhibeant; & ad pituitâ expurgandam præcipue ea dirigunt; Eam prius præparantes, postea phlegmagogis sæpe & valide expurgantes, per decocta, pilulas, potionesque alias, passim in defluxionibus & morbis pituitosis descripta. Nos verò prout corpus eiusmodi vel plethoricum vel cacochymicum, aut aliquin vitiosis humoribus scatet, hisce euacuandis ea accommodamus, si præsertim hi illis occasionem præbuerint, & cum si magna illuuias vel vitiositas humorum adsit, & deteriores & plures scrophulæ erumpant, tunc etiam maiores purgationes instituimus, cum sine illis vix abigantur.

Si itaq; leuiiores requirantur purgationes, passim descriptæ hæc quoque vsurpari possunt. Si frequentiores & validiores, conueniūt & illæ, quæ in scabie maligna, & lue venerea copiose variis formis descriptæ sunt, corporis hanc sentinam quoq; euacuabunt.

Præter quæ si continuanda sit purgatio, hic syrupus, cum simul ea quæ scrophulas abigunt admittat, exhiberi per vices poterit: qui R. rad. Aperitiu. 3. iij. rad. Iridis, Acori veri, Pæon. an. 3. j. β. rad. Chelid. min. Batrachij, Lepidij, Spatulæ foetid. an. 3. j. rad. Aristol. rotund. Pyrethri, Asari an. 3. β. Squillæ præpar. 3. ij. herbarum. Scrophulariæ, Pimpinellæ, Arthemisiæ, Melissæ, Bëtonicæ, Maioranæ, Capillarium an. m. j. florum Stœchad. vel Lauandulæ, summitatum Rosmarini, Thymi an. p. j. florum Genistæ p. ij. baccarum Iuniperi p. β. seminum calidorum Maiorum & Minorum 3. yj. radicis Liquiritiæ 3. ij. Passularum 3. j. Polypod. 3. ij. foliorum Senne 3. iij. Turbith 3. β. fiat decoctio, & in colatura dissolue Mellis. vel Sacchari tñ. β. decoquatur ad consistentiam eam, quâ aliquamdiu conservari possit ad vsum.

Efficacissimus erit, si loco turbith Esulæ præpar. & infusæ in Oxymellite. 3. ij. vel 3. iij. sumas, radic. Cucumeris agrestis 3. β. Adhuc amplius vti plerumque docent, si Hellebori albi & nigri an. 3. j. decoctioni addas. Vel vt aliqui quoque probant, Laureolam aut Draconteam.

Vinum ex earundem maceratione factū, sumēdo mediam saltem singulorum quantitatem, ad Vini Mens. j. β. æquē & tutius operabitur.

Vt eadem operā, excrementitij & prauis humores per purgationes euacuentur, & simul e parte affecta absumantur, miscere solent purgantia fortia, alterantibus mox describendis, diuq; ea sic exhibent. Et ita Hellebori albi & nigri ana 3. ij. cum puluerum alterantiū mox describendorum 3. v. miscent, & 3. j. per quatuor septimanas manē exhibent, quod singulariter iuuare scribunt.

Alij Diagrydium hisce pulueribus miscent & sic exhibent. Vel Thuri, Coriandro, Spicæ atque Aromatibus permiscendo propinant.

Euphorbium cum succo Iridis in pilulas formatum, & 3. β. de illis tertio semper die exhibitum, valde probant.

Sudorum prouocatio, si scrophularū copia hinc inde per corpus dispersarum, abundantiam humorum excrementitiorum & peruerforum indicet, nonnunquam conuenit, in corporibus præsertim phlegmaticis & humidioribus, cum in calidioribus & biliosioribus non aded possit competere, sed corpus humoresq; magis accendat & effervesce faciat, in quibus temerē sæpè hoc vnico remedio, chirurgi, vti alios multos externos affectus diuturnos, sic & hunc curare se posse existimant, corporaque sæpè frustra emaciant.

Quando tamen hæc euacuatio locum habet, corpore prius purgato, per vices etiam sudores prouocare possumus: Vel continuatis vicibus ad multos dies, adhibita in super ciborum parsimonia, & quorundam abstinentiā. Sicuti in lue Venerea hic modus sudores prouocandi, vsurpando simul & diætā, quam vocant, explicabitur.

Exhibentur in scrophulis quæ vi siccantæ prædita & digerente, vel etiam proprietate quadam illas absumere queant: quæ cum ægrè cedant, diu continuanda erunt. Quo nomine pulueres exiccantes humiditates, in ventriculi & cerebri eiusmodi affectibus, expositi, atque ex illis præsertim qui validius exiccant, vti ex cineribus parati, hic quoque iuuabunt.

Præsertim verò huic affectui destinati pulueres, qui per se vel cum Vino aut Aqua conuenienti, aliòve liquore ieiunè diu sumi debent, sunt sequentes.

Spongiæ in furno aded. exiccatae vel vstæ, vt comminui possit, pulueris 3. j. datur ieiunis, aliquot septimanarum spacio. Potest admisto Saccharo & aromatis gratus vt libentius sumatur, reddi.

Spatulæ foetidæ radicem, Genistæ florum, Amianthi lapidum pulueres similiter exhibiti, præcæteris commendantur.

Vel compositus hic puluis: R. pulueris Spongiæ, eo modo vti dictum, exiccatae 3. β. lapid. Spongiæ, Osis sepiæ vel Pumicis ana. 3. ij. cineris corticum Quorum 3. β. Auellana-

rum igne exiccatarum vel vstarum, Gallarum rad. Aristoloch. an. 3. j. seminis Plantag. Cinamomi an. 3. β. Piperis, Zing. Salis gemmæ ana ʒ. j. fiat Puluis.

Vel sic: R. Spongiæ ʒ. j. lapidis Amianthi & Spongiæ an. 3. vj. foliorum Pimpinellæ & Artemisiæ an. 3. j. rad. Aristolochiæ & Pyrethri an. 3. j. β. fiat Puluis. Potest etiam aromatibus condiri.

Hisc pulueribus purgantia violenta, vt Helleborum album, nigrum & Diagrydium aliqui miscent, sicuti in purgantibus dictum; Sicque vt simul & purgent & absumant, exhibent.

Conueniunt & Spongia marina & Pila marina, vt dictum, in pulueres vel cineres redacta, per se data vel cum cæteris: Chartæ item combustæ cinis: Limatura acus prioribus permixta.

Trochisci de viperis vel cineres Viperarum, vel Spolium ad absumendam eiusmodi materiam plurimi fiunt, & proin reliquis pulueribus aliquomodo permiscuntur; quæ ab aliis serpentibus desumpta, fortè æquè erunt efficacia. Quorum loco & Theriaca quæ eosdem trochiscos recipit, & alioquin utilis est, sæpè sumi potest: Viperinas carnes etiam comestæ prodesse docet Diosc.

Conserua rosarum facta cum Saccharo vel Melle, Genistæ florum, pondere ʒ. ij. aliquoties sumpta, valde laudatur. Idem præfiat conditura vel conserua radicis Spatulæ foetidæ, vel Xiphij, hoc est Gladioli vt aliqui volunt, cum fortè Xiphij nomen etiam Spatulæ foetidæ conueniat, quam Plinius scrophulas abigere docet.

Potiones vulnerariæ dictæ, vt in vulneribus & vlceribus, sic & in exulceratis scrophulis propinatae, eas expurgant & sanant. Quales plures illic inueniuntur; quibus & hic vt licet, vt & sequenti: R. foliorum Agrimoniae, Pyrolæ, Solidag. Sarracen. Filipendulæ vel Pimpinellæ, Ceterach, Caulium rubr. an. m. j. rad. Consolid. maior. ʒ. iij. radic. Liquirit. ʒ. j. β. fiat decoctio in iure Cicerum rubrorum vel decocto Gaiaei, in Aquæ mensuris tribus & tertiâ parte Vini, ad cõsumpt. iij. partis, dulcoretur si velit æger: Bibat multis vicibus.

Vina idem efficientia magisque strumis appropriata, aliqua per multos dies bibuntur. Veluti vinum in quo Scrophularia contrita aliquandiu maduerit, vel decocta fuerit.

Vel hoc: R. rad. Filipendulæ, Spatulæ foetidæ an. ʒ. j. β. rad. Pentaphylli ʒ. j. rad. Aristoloch. rotund. ʒ. β. Scrophulariæ, Pimpinellæ, Pilosellæ, Agrimoniae an. m. j. Artemisiæ, Tanacet. Caulium rubrorum an. m. β. florû Genistæ p. j. semin. Raphani ʒ. ij. semin. Vrticæ ʒ. j. fiat decoctio in Vini generosi Mens. j. & Mellis quartario j. β. Bibat colaturam ad ʒ. iij. diu in eo perseverando.

Probatum & Vinum in quo Talpa decocta fuerit.

Succi Scrophulariæ vel Vitis nigræ radicis, aut Coryledonis per se sumpti cum Vino & Melle; vel Syrupi ex iis parati, profunt.

Aquarum nitrosarum seu aluminosarum, item sulphurearum naturalium potus, aliquandiu continuatus iuuat.

Testiculi apri iunioris comesti commendantur.

Si quoque de pulueribus supradictis ex Spongia paratis, portio Melle excipiat, & in trochiscos formetur, illique noctu in ore contineantur; sic quoque strumas colli abigi posse, aliqui docent.

Gargarisatio frequens ex decocto radic. Ireos, Pyrethri, aliarumque plantarum in Vino facta, aliquid quoque efficiet. Vti & tab. Diaireos in ore retentæ.

Applicationes supra scrophulas fiunt ex iis quæ potenter digerunt, succumque hunc crassum absumunt, additis semper emollientibus duritiem hanc, ne tenuiore parte discussâ, crassior magis induretur, quæ & si ad maturationem scrophulæ tendat, eam quoque adiuuare possunt: Quod si perueniant, atque sponte vel arte vt abscessus aperiantur, & in vlcus desinant, prout illud erit, adhibitis remediis, curari debet. Administrantur scrophulas digerentia, emollientia & maturantia topica remedia, variis formis, tum per illutiones, tum per applicationes, diutius illis adherentes, diuersimodè.

Ex pinguibus & mucilaginosi frequenter fiunt applicationes: R. olei antiqui Oli-

uarum vel Nucum, Liliorū vel Sambucini, Irini, vel Cheirini, Amygdal. amar. an. ʒ. ij. Axungia gallinae, Anseris vel Anatis, mucilaginis seminis Lini, Foenograci an. ʒ. j. β. medullae crurum Vituli vel Hirco vel Cerui, vel Sæui ʒ. j. Ceræ q. s. fiat Vnguentum, vel ceræ quantitate auctâ, Ceratum.

Possunt & alia olea addi efficaciora, veluti faex olei Liliorum vel Oliuarum, quam Amurcam vocant, ad ʒ. j. Vel oleum de Castoreo aut de Euphorbio ʒ. β.

Vel adhuc validiora quæ & sola illita conferunt: Veluti è lachrymis & gummi exstillata, vt oleum Terebinthinae. Vel cocta, vt oleum de Croco, oleum Sycioneum, siue Cucum. asin. Vel in quo aliæ plantę conuenientes mox describendæ, vel illorum succi coxerint, aut macerati diu fuerint. Quale & hoc est: R. succi Bryoniae, Sabinæ vel Rutæ, Chelidonij an. ʒ. ij. Aceri squillit. ʒ. iij. Aquæ vitæ ʒ. j. Mellis ʒ. ij. olei Antiqui, Liliorum, Irini an. ʒ. ij. β. (possunt & alia olea addi ex supradictis) decoquatur ad succorum consumptionem, remanente solo oleo.

Axungia aliæ quoq; Vnguentis eiusmodi adjici possunt, cum omnes vim emolliendi habeant, aliæque ex illis præsertim, quæ à syluestribus & ferocib; animalibus sumuntur, vim quoque digerendi habere credantur. Inprimis autem commendantur præter iam enarrata in vnguento, axungia Porci, & Hominis: Item Gallinacei generis: Piscium item, vt Anguillæ, Thymali, atq; ferocium, Lupi, Vulpis, Taxi, Vrsi, & ex rarioribus, Leonis, Elephantis, Struthiocameli, Vulturis, Aquilæ, quæ vt rara, ita & preciosa esse iudicantur.

Pinguedinem quæ destillat ab anisere dum assatur, prius infarcto multis muribus, valde quidam approbabat.

Butyrum in quo Scrophulariæ radix contusa macerata fuerit aliquandiu, vel cocta, commendatur. Quæ & in oleo sic macerari vel coqui ad eundem vsum poterunt.

Ex gummi & lachrymis sequentes sunt applicationes: R. gūmi Ammoniacy, Bdellij vel Galbani an. ʒ. ij. Oppopanacis ʒ. j. β. dissoluantur in Aceto simpl. vel squillitico, vel Aqua vitæ vel vtrisque, diluantur oleis supra-

scriptis paucioribus pluribusve, mitioribus seu efficaciorib; ad ʒ. ij. vel iij. & fiat linimentū. Vel additâ Cerâ Vnguentum vel Ceratū.

Vel: R. Gummi prædicta dissoluta, & cum vnguento supradicto ex pinguib; mucilaginosissq; parato decenti quantitate, permixto, in formam dictam redigantur.

Hiscæ gummatibus, addi alia quoque gummi possunt, vt Serapinum, Elemi dissoluta: Vel etiam Ladanū, Storax, Calamita, Aloë, Thus, vel Mastiche puluerisata ad ʒ. β. sicque in formam Vnguenti vel Cerati redigi: vel additâ Resinâ & Pice nauali, in formam emplastri.

Ex Pice, Resinâ, Cerâ, additâ Axungia ali-quâ, emplastrum paratum, vtile quoque.

E plantis variæ quoque sunt applicationes. Qualis ex radicib; parata hæc est: R. rad. Bryoniae albæ vel nigræ, quam aliqui albæ præferunt quartarium j. contundatur si recens fuerit, vel incisa coquatur in Vino vel Aceto, vel vtrisque aliâs etiam addito Lixiuio vel Muriâ, vel parum Aquæ vitæ, sicque cataplasmatibus instar applicetur, vel cū Melle prius temperata; Vel cum Oleo aut Axungia conuenienti subacta.

Eadem ratione radices Iridis vel Raphani præparatæ adhiberi possunt, vel cum Bryonia commisceri.

Vel vt efficacius agant, sic misceri debent: R. rad. Bryoniae quart. j. rad. Iridis ʒ. ij. rad. Ari vel Dracunculi, Cyclaminis an. ʒ. j. β. vel plus, præparentur & misceantur vt primū. Si Cucumer. sylu. radix ad ʒ. j. β. addatur, validius agent. Et proprietate quadam simul operabuntur, si his commisceatur Xiphij radix, quam alij Spatulæ foetidæ esse putant, cum hæc à Plinio in scrophulis commendatur, alij Gladioli. Quod & facit radix Anonidis vel Cannæ, apponendo ad ʒ. j.

Ex bulbosis radicibus applicatio quoque fit efficax: Veluti ex bulbis Cœparum, Alliorum, Liliorum, Narcissi, sub prunis parum assorum, vel etiam coctorum & contusorū, mistorumq; eodem modo, vt de prioribus ex radicibus paratis cataplasmatibus diximus. Squilla assa vel cocta, efficaciam maiorem hisce addita tribuit.

Possunt & cataplasmata ex radicib; prioribus

301

ribus & bulbosis istis parata inuicem commisceri, sicque vsurpari.

Ex Ficubus siccatis seu Caricis & Vua passa contusis, vel parum prius coctis, & cum bulboſo eiusmodi cataplasmate permixtis, conueniens quoque fit cataplasma, vel etiam cum prioribus radicibus concinnatis.

Ex herbis aliis à Dioscoride recensitis similiter fiunt applicationes, veluti Scrophulariâ, Galeopſi, Adiantho, Semperuiuo minimo, radicibus Capparum, Quinquefolij & Lapatij contusis quoque vel coctis, vti dictû, iisque vel solis vsurpatis vel additis quoque prioribus radicibus, vti & radic. Altheæ.

Commendantur & ab aliis Sinapis herba, Agnicasti folia, item Sabinæ, Pini & Cupressi, Viscus arborum, similiter vsurpata; Medullam Maizi arundinum aliqui probat appositam: Herbæ acres his quoque permiscuntur aliquando, vt Hydropiper, Esula, Cataputia.

Ex illis quæ ab animantibus sumuntur, admodum hic conueniunt stercora. Veluti ex communibus Bubulum, Asininum, Aprinum, Caprinum, Columbinum, atque ex rarioribus Rupicapræ & Mustelæ fœmus. E quibus aliqua sola, vel plura simul Aceto vel Oxymellite subacta: Vel axungijs & oleis permixta applicantur.

Vel etiam reliquis applicationibus, vt illis quæ ex gummis constant, vel explantis, certâ quantitate permixta ea efficaciora reddunt.

Aut ex Cæpis, Caricis & Stercore inuicem contusis & commixtis, fiat Cataplasma.

Sanguis Mustelæ illitus à Dioscoride commendatur.

Fel item Testudinis per se vsurpatum vel reliquis etiam permixtum.

Ex pulueribus diuersæ sunt applicationes, qui vel materiâ aliquâ incorporantur, & in formam cataplasmatidis, vel vnguenti aut emplastri rediguntur: Vel miscuntur prioribus iam expositionibus, ad vires ipsarum augendas: paranturque ex variis.

Primus pulvis ex seminibus paratur & ex farinarum seminis Lini, Fœnogræci, Fabarum, Lupinorum, (quæ & sola vsurpa-

ta efficax est, vti & Orobacea & Lolacea,) subigantur, vel cum Melle & Acetô, vel horum loco Oxymellite simplici vel squillitico, vel solo Aceto aut Melle.

Vel misceatur illius pulueris ʒ.ij.ß. cum Vnguento pingui primo vel altero gummato: Aut cataplasmatibus ex radicibus, vel bulbis ficubusque paratis.

Alter pulvis ex seminibus, magis dissipans sic fit: R. Farinarum enarratarum ʒ.iiij. semin. Sinapis vel Nasturtij ʒ.ij. semin. Cimini Vrticæ an. ʒ.ij. misce, incorporetur vel misceatur cæteris vti prior.

Quartus pulvis à plantis desumptus proprietate insuper agens: R. Nucum cupressi ʒ.ß. rad. Aristolochiæ, Arundinis vel Xiphij an. ʒ.ij. foliorum Agnicasti, Absynthij an. ʒ.ij. si Spolium serpentis addatur, optimum erit: Excipiantur vti priores.

Vel misceatur portio illius cum Vnguentis prædictis vel Cataplasmatibus, imprimis ex Bulbosis & Ficubus paratis.

Quintus pulvis ex radicibus compositus: R. pulueris radic. Ireos & Bryoniæ ana ʒ.ß. radic. Cucumer. agrestis vel Cyclaminis ʒ.iiij. radic. Ari vel Serpentar. ʒ.ij. radicis Aristolochiæ ʒ.ij. Excipiantur vti priores: Vel subigantur Oleis vel Axungijs conuenientibus, additâ interdum & Cerâ, pro cerato faciendo, vel Resinâ aliquâ aut Pice, pro emplastro formando.

Sextus pulvis valde efficax: R. Sulphuris ʒ.ß. Salis gemmæ vel nitri, Halcyonij quod spumam maris vocant, vel illius loco Pumicis ana ʒ.ij. misce. Vel adde prædictis, seminis Sinapis ʒ.ij. semin. Vrticæ ʒ.ij. fiat pulvis. Potest & Marcastiæ vel Lithargyri ʒ.ij. addi.

Hic vel simplicior vel magis compositus, vti prædictus quintus incorporari, & in easdem formas redigi potest: Vel quantitas aliqua illius cæteris quoque applicationibus misceri.

Septimus ex cineribus fit: Qui desumuntur à combustis lignis Iuniperi aliorumve, vti & Ficum. & stipitem Cauli, herb. Absynthij, Agnicasti, Astacis fluuiatilibus, Cochleis, Spongiâ, Vngulâ asini & in prius Mustelâ vstâ: Excipiunturque hi cineres Aceto

vel Oxymellite, & apponuntur: vel portio illorum cæteris quoq; applicationibus prius dictis vnâ cum prioribus pulueribus, vel sine illis miscetur.

Præter hosce pulueres alij etiâ conueniunt adhibiti: Veluti Lucû fornacum antiquum combustum mistum cum Aceto, quibusdam vel aliis applicationibus additum.

Calx viua subacta cum Melle vel Axungia, vel aliis compositionibus permista.

Ærugo æris, Chalcitis vsta, vnâ cum cæteris pulueribus.

Stercora siccata in puluerem redacta, hoc modo subacta, quoque vsurpari possunt, vel reliquis compositionibus misceri.

Ex vsitatis applicationibus, conueniunt emplastrum Diachylon ireatum, Magnum & Compositum ex gummi & mucilaginis. Quod magis operabitur, si de pulueribus supradictis aliquis illi permisceatur, & malaxetur oleis conuenientibus.

Habet & Galenus emplastrû ad scrophulas tollendas, ex bdellio, ammoniaco, seminibus sinapis & vrticæ, radice aristolochiæ, spumâ maris, sulphure, oleo & cerâ concinnatum.

Est & aliud Oribasij à Mesuæo descriptû.

Vnguentum Apostolorum hic quoq; vtile censetur. Vti & vnguentum de Arthanita.

Narcotica vti extrinsecus adhibita, vim magnam resoluendi habere sepe iam ostendimus, ita & scrophulis admota, multum efficiunt. Veluti folia Mandragoræ, Hyosquiami, Papaueris contusa, vel parum sub prunis tosta, aut cocta aliôve modo per se adhibita: item radix Mandragoræ, vel Farinis simul additis aliisque pulueribus & liquoribus incorporata, aut aliis Cataplasmatibus addita.

Succus expressus eodem modo simplex illitus, aut aliis permistus adhibitus, admodum efficax.

Aqua insuper ab illis exstillata: Quæ hoc pacto ex illis & aliis simul destillata inuncta valde iuuat: R. Hyosquiami, Cicutæ, Chelidoniæ, Sabinæ recent. an. m.ij. Tithymali m.ß. radic. recent. Raphani 3.iiij. radic. Ari 3.j. Cæparum vel Aliorum incisorum 3.iiij. sem. Sinapis 3.ß. Salis 3.j. Eliciatur aqua.

Emplastrum a hoc ex opio magnarum est

virium: R. Opii 3.j. Scammoneæ 3.ij. Myrrhæ 3.j. Croci 3.j. misceantur cum Melle: Pro emplastro.

Vel hoc Vnguentum: R. gummi Ammoniæ vel Galbani 3.j. dissol. in Aqua vitæ, quæ & ipsa narcosi prædita est: In qua aqua vitæ dissolue, Opii 3.j. seminis Hyosquiami 3.ij. Stercoris Gallinæ vel Columb. exicc. 3.ß. Axungia vel Olei q.s. fiat Vnguentum, vel additâ cerâ Ceratum.

Naribus inditum oleum Cucumer. afin. iuuare credunt.

Appensæ radices Plantaginis & Acetosæ aliquid opitulari posse existimant.

Fotus adhibitus cum spongiis scrophulis, ad eas abigendas quoque confert: Vel si cæteris applicationibus præmittatur, vt illæ melius operentur, iuuant.

Fiuntque ex prædictis plantis, ex quibus cataplasmata formari diximus, in Vino, Aceto & Melle, Vrinâ, Lixiuio, Muriâ, Aquâve fabrorum coctis, sumendo vti illic dictum, pauciores pluresve simul.

Vel additis etiam aliis, talis fiat fotus efficax: R. radices duas primi cataplasmatibus, vel plures secundi, adde de bulbis illic expositis tres vel quatuor, Caricarum num. xij. Herbarum illic enarratarum m.ij. vel iij. seminis Sinapis 3.ij. Sulphuris 3.ß. Salis 3.ij. decoquantur vti dictum: Pro fomentatione.

Frictio scrophularum eousque vt ferè rubescant, etiam ad discussionem aliquid adfert emolumenti, & si ante applicationem topicorum fiat, vt vim eorum rectius experiantur, eas disponit.

Sectione scrophulæ quæ aliâ ratione curari nequeunt, interdum auferuntur. In qua faciendâ cutis incumbens, primùm eousque donec nudæ pateant, incidendo aperitur, posteaque apprehensæ, cum suo inuolucro attractæque & à radicibus & connexu à corpore liberatæ, eximuntur. In quo faciendo diligenter, ne neruus aliquis aut vas aliud insigne lædatur, cauendum; Ob quam & causam, si præsertim sub mento consistant, profundeque hæreant, non sine periculo, propter vasa magna vicina, excutantur. Si verò velea in sede, vel etiam aliis in locis ex-

ternis existant, admodumque promineant, minori hoc sit periculo, nisi fortè glandulæ vasorum magnorum diuisionibus interpositæ indurata exsecantur, eæque maximè, quæ articulorum regionibus adiacent, vbi si incuriâ neruus aut tendo lædantur, faciliè illius membri, vti contingere vidimus, contractio sequitur.

Cauterio potentiali, quod sine dolore in cute escharam faciens, eas patefacit, sæpius illud præstitimus, scrophulasque hoc modo eximi curauimus: Vel vt sic denudatæ suppurari melius appositis remediis possint, procurauimus.

Visione per potentialia vel actualia cauteria illud moliri graue & periculosum, cum inflammatio faciliè subsequatur, in loco tamen penitus ignobili, hoc pacto quoque aperiri possunt.

Pungendo scrophulas Pastinacæ vel Raie piscis caudæ osse, quidam eas curari vel ne vlterius excrescant, prohiberi posse, putant.

Contactu solo regum quorundam, quibus à Deo hoc concessum sit, easdem sanari posse, creditur, peculiariterque hoc Régibus Galliæ datum, ad quos, qui hoc malo conficiantur, cateruatim certo tempore ad illud destinato, vt ab illis tangantur, confluunt. Idem diuinitus regibus Angliæ contigisse, eosque similiter tangendo scrophulas sanare asserunt.

Strumatum curatio.

Struma, quo nomine vel simplicem, vel ex duobus tribusue complicatam, gutturi vel solum incumbentem, vel ab eo etiam propendentem intelligimus, si hæreditaria sit illis regionibus consueta, atque iam excreuerit, indurataque sit, vix dum remediis amplius cedit, aut in abscessum conuerti potest, sed toto vitæ curriculo, nisi sectione tollatur, gestatur, vti etiam illa, quæ in quibusdam saltem se offert, pertinax admodum est.

In principio tamen, si præsertim non sit originalis, aut popularis illis locis, aliquid tentandum, & corpore prius decenter mundato, illi quoque aliquid erit applicandum.

Euacuationes autem quod attinet, nisi aliis de causis eæ requirantur, propter vnam strumam non adeo in illis, vti ferè sit, insi-

stendum, vt si plures scrophulæ corpus vident, præsertim vbi alioquin parua spes curationis affuget.

Exhibitis tamen, vti in scrophulis, illis quæ eas absumant, illarum incrementum sæpè impeditum fuisse, nonnunquam & illas nondum confirmatas euauisse, experientiâ compertum. Danturque ex iis quæ in scrophulis exposita sunt, præcipuè pulueres ex Spongia, Amiantho lapide, Spatulâ foetidâ, floribus Genistæ, & compositis, duobus illic expositis, parati: Vti & Conseruæ ibidem descriptæ. Nam quod potiones vulnerarias attinet, cum vix exulcerentur, hic conuenire vix dum possunt.

Applicationes quod attinet, inter ea quoque quæ in scrophulis sanandis multa exposita sunt, efficaciora, cum longè difficilius quàm illæ euincantur, & quæ diutius hærent, viresque idè melius & diutius exerunt, strumis ad mouenda erunt: Veluti emplastrum ex gummi lachrymisque paratum: Vel cataplasmata è radicibus, bulbis aliisve herbis parata, aut quod ex stercoreibus sit, additis hisce etiam pulueribus efficacibus: Veluti puluere sexto ex variis, aut septimo ex cineribus parato, aliisve vt Calce insuper. Vel vtendo hisce pulueribus per se, vti illic dictum, Aceto vel alio efficaci liquore exceptis.

Sectione strumam confirmatam, & quæ alio modo abigi nequit, si, quia indecora est, displiceat, præsertim verò si respirationi incommodet, auferimus, quæ similiter administranda est, sicuti in scrophulis fieri debere ostendimus, tutiusque sit, si procul exerta sit vel propendeat. Non sine periculo verò sit sectio, si vasis inserta vel adnata, altis radicibus adeo hæreat, vt citra horum læsionem excari nequeat, tunc enim satius ab ea abstinere, quàm ægrum in discrimen conjicere, & seipsum diffamare.

Cauterio illud ipsum eo modo, vti in scrophulis dictum, præstari potest.

An contactu, vti illic quoque demonstratum fuit, etiam Strumæ illæ magnæ abigi possint, in dubio relinquam, iudicio aliis, qui ea ipsi viderunt, de ea re permissio.

Parotis frigida dicta, id est glandula indu-

*lunio eno-
natio.*

rata post aures, sine calore & dolore, si confirmata sit & scirrhusa fiat, vix alio modo quam sectione auferri potest. Quæ autem adhuc in principio vel augmento est, vel nondum penitus indurata, facilius ferè quàm in aliis locis glandulæ vel discuti, vel saltem maturari, & in abscessum materiã aliquam in se cõtinentem, vti dictũ, indeq; in vlcus, per quod illuies illa, quæ nunc ichorosa, aliàs purulenta est, vel alia materia pelliculæ quoque inclusa, interdum & tephacea & calculosa vti ostendimus, existit, redigi potest, & sic curari.

Quæ cura quibusdam ex illis quæ in scrophulis dicta sunt, quoque perficitur. Veluti primùm, euacuationibus eodem modo, vt si quæ adest humorum vel excrementorũ copia, illa tollatur, institutis, eoque potissimùm directis, & vt, crassorum humorum prouentus impediatur, quo nomine alterantia varia vsurpantur: Dein exhibitis aliquibus ex illis, quæ scrophulas absumere posse diximus, quæ in scrophulis recensita sunt, si diutius perseverent, atque ægrè cedant, idem tentamus, cum aliàs, cum non tanta sit hęc glandularum vt in scrophulis copia, hæc in sola parotide absumenda, non adeò requirantur.

Ex illis quæ in scrophulis adhibentur, veluti ex pinguibus gummosis, plantarum radicibus, bulbis, herbis, stercoreibus, pulueribus aliisque paratæ applicationes, pleræq; hęc quoque possunt competere.

Et cum ad maturationem aliquam tendunt, ea quæ eam promouent permiscemus: Sicuti hoc cataplasma paratum est, quod fit ex bulbis Cæparum vel Liliorum, radicibus Altheæ atque Iridis, parum sub cineribus asfatis & contusis cum Caricis, addendo farinam Lini vel Fœnogr: Mel atq; Oleum vel Axungiam aliquam.

Vel si ad apertionem vergant: R. Caricarum pistatarum quartarium j. Fermenti ʒj. ʒ. rad. Iridis recent. emollitæ vt contundi possit ʒj. Aloës ʒij. Nitri ʒj. misce cum Oleo vel Axungia.

Aur possumus iis quæ in abscessu, qui inflammationes sequitur, exposta fuerunt, parotides ad suppurationem inclinantes,

maturare, maturasque aperire, & postea vt vlcus sanare.

Si confirmata & scirrhusa facta sit glandula, sectione, vti de scrophulis dictum, vel cauterio potest adimi, cauendo ne vasa maiora illic tangantur.

Bubo frigidus dictus, hoc est glandula tumens & dura, sine calore in inguinibus, vel sub axillis, aliquando scirrhusus quoque fit atque incurabilis, sicuti bubonem pestilentialem, sic toto vitæ tempore permanisse, aliquoties vidimus: Aliàs verò per curam iterum dissipatur: Rariùs in abscessum, vt verò ille qui cum inflammatione est, conuertitur: Vel si hoc fiat, vlcus peruersum ferè post se relinquit.

Tractandus autem ferè eodem modo, vt parotis: Euacuationibus similibus præmissis, & Alterantibus quoque: Inter quæ & in pertinaci bubone, aliqua ex illis quæ exhibitæ, glandulas abigere possunt, hęc tentare licebit.

Admouentur quoque eadem vel similia, qualia in parotidibus tum illis, tum scrophulis conuenire, diximus: Præsertimq; eligendo ex eorum numero, quæ admodum discutiant, simulque emolliant. Quòd si ad maturitatem tendat, eodem modo in illis, vt parotidibus atque abscessu, sicuti illic ostensum, procedendum est.

Per sectiones aut cauteria rem aggredi non facile debemus, cum non admodum incommodent, nec conspici abditis illis in locis latentes sint.

Testes in tumorem citra inflammationem elati atque indurati, quod frequentius priùs præcedente inflammatione fit, tandem etiam scirrhusi facti, sic permanent, & molestiam inter equitandum maximè pariunt, & si in vtroque teste hoc fieret, vasaque spermatica simul induraretur, ad procreandum impotentem hominem redderent: Maturè verò si huic tumori occurratur, illerursus tolli potest.

In cura illius, præmissis generalibus præsidiiis, digerentia emollientibus, inter ea quæ applicantur præualere debent, ne facile suppuratio sequatur, cum per eam testis sæpè vnus, vel etiam alter deperdatur, admouendaque

*Bubonũ
indolentium
cautio.*

*Testium
duritiæ
& Scirrhi
cuius
ratio.*

daque ex remediis in scrophulis explicatis, cataplasmata, emplastra atque fomentationes, quæ potenter operantur, illic descripta.

Quod si verò in abscessum tumor hic vergat, maturatio illius procuranda, & sic uti in abscessu docuimus, suppurandus, aperiendus, vlcusque inde natum postea sanandum.

Si remediis non cedat, induratusque penitus sit testis, nec tolerari possit, per castrationem eo modo, vti in sarcocoele dictum, excisandus.

In carnosus locis, ex succo nutriente professorum durorum tumorum curatio, accommodatur Scirrhus & Tumoribus in abdomine prominentibus, à scirrhus interiore obortis: Item aliis, qui materiam alienam in se continent, vt Atheromati, Steatomati, Meliceridi.

Scirrhi curatio.

Scirrhus in carnosus locis alicubi se offerens, siue inflammationibus succedat, qui & frequentior, siue sponte excrescat, qui rarior, & vel vnus tantum existat, vel plures simul, vti in abdomine aliquando scirrhi in carne, vel glandulis illis scirrhosis factis, occurrunt, si omnino induruerit & confirmatus sit, sineque omni sensu, nec emolliiri, nec discuti aut maturari amplius potest: Si verò nondum perfecte excreuerit, sensusque aliquis adhuc in eo remanserit, spes sanationis aliqua affulget.

Quæ remediis validissimis, cum leuioribus non cedat, tentanda, corpore prius per euacuationes si necesse sit, sic disposito, vt si impurū sit, vel alius prauus humor adfluat, hæc curationem minimè impediant. Cum alioquin ipsius scirrhi causā, si præsertim ob inflammationem, exiccato succo, vel alterius partis succo quo alebatur crassiore huc delato, sicuti ferè, vti in causis ostensum est, inde prodire consuevit, nascatur, vt corpus à crasso succo purgetur, vti plerumque facere solent, non sit adeò laborandum: Sed potius eo insistendum, vt scirrhus adhibeantur, quæ potenter eum emolliant, attenuent, & simul illud quod emollium, & attenuatum est, discutiant, quæ vel inuicem

permista, vel separatim & alternatim adhibentur.

Qualia pleraque inter ea quæ scirrhosis scrophulis adhiberi debere diximus, etiam scirrhus adhibita, simili ratione operari possunt.

Vtendo cum emollire magis volumus, applicationibus ex oleis, axungis aliisque pinguibus & mucilaginosi, vti & gummi & lachrymis paratis illic descriptis.

Vel sequenti Cataplasmate: R. radices Altheæ, Liliorum ana ʒ.ij. radic. Iridis ʒ.ij. herbarum iij. Emolliciuarum, Attriplicis, Brassicæ, Parietariæ circiter m.ij. florum Chamomillæ Meliloti ana p.j. feminis Lin. Fœnogræci ana ʒ.j. fiat decoctio in Aqua vel Iure pingui, contundantur, adde Axungie Gallinæ, Anatis vel Anseris aut alterius circiter vncias duas, olei Oliuarum, Amygdalarum dulcium an. vnciam vnam, fiat Cataplasma.

Fouetur quoque sæpe decocto earundem plantarum: Vel etiam oleo solo Liliorum aut Amygdalarum: Vel in quo emollientia alia cocta sint.

Vbi verò & simul emollire scirrhum & discutere volumus, applicationes diuersæ ex plantarum radicibus, bulbis, herbis; Item ex animalium stercorebus, aliisve, vti pulueribus subactis, vel aliis permistis, emplastrisque vsitatis parata, hæc quoque locum obtinebunt.

Quibus & hæc adjici possunt, quæ scirrhus admota conueniunt, veluti Raphani radix cum Vrtica contusa.

Cæparum bulbi sub prunis aspi parum, & cum Cochlearum carne contusa permisti, additis & aliis nonnunquam.

Viscus arborum cum modico Calcis & Axungie.

Pix vel Resina cum Cera & Axungia dissoluta, addito puluere Marcasitæ, aliisve.

Sanguis taurinus cum Polenta aliisve Farinis incorporatus.

Forus quos scrophulis competere diximus, ad scirrhum digerendum & emollientum quoque adhiberi possunt.

Suffitus hoc idem in scirrhus præstare po-

test; qui ex Aceto acerrimo, superfuso lapidi molari ignito excitatur: Vel si in Aceto Pyrites lapis Marcasta dictus, ignitus immersus vel iniectus extinctus fuerit, vel Scoria ferri, quam fabri candentem adhuc abjiciunt, & vapor ab aceto eleuatus, scirrhum attingat, ibique aliquandiu coërceatur.

Friccio scirrhii ante ipsius suffumigatione, vel remediorum applicationem facta, vti in scrophulis dictum, ipso operationem adiuuat, & simul aliquid discutit.

Sectione vel aliâ vi maiore scirrhum euellere, temerarium esse videtur, cum aded altis firmetur radicibus, vt eum penitus eradicare, non sine periculo liceat, non solum hæmorrhagiæ sed & grauioris læsionis alicuius: Dein & cum, si portio illius auferatur & ea quæ superest, faciliè rursum crescendo augeatur, hoc nomine quoque sæpè frustra dolor & quidem cum periculo inducitur, nihilque interim efficitur.

Abdominis tumorem scirrho spiritus glandularum curatio. Vteri scirrhii curatio.
Tumores alij seu prominentiæ aliquæ, in abdominis regione superiore, à scirrho hepatis vel lienis apparentes, qua ratione curari debeant, in cachexia, vti & hydrope, quæ inde sequuntur, abundè expositum fuit.

In inferiore illius verò sede, circa vteri regionem, si tumor à scirrho vteri fundi profisciscatur, scirrho cura accommodabitur, qui quo pacto præcaueri debeat, si inflammatio in eum tendat, in vteri inflammatione tractatum fuit. Genitus verò vel hanc aliâve ob causam, vti in causis fuit expositum, licet vti reliqui scirrhii, & præsertim in hoc loco positus, difficillimè sanetur, tamen curatio aggredienda, si forè imminui vel aboliri possit.

In quam rem, corpore decenter prius repurgato & disposito, exhibentur etiam quædam ex illis, quæ in duritie & scirrho hepatis & lienis, competere diximus. Veluti pilulæ ex Ammoniaco aliæque varia, in cachexia inde profecta, descripta.

Extrinsecus ventris sedi vbi scirrhus tumor se manifestat, vel tangitur, variæ applicationes, quarum in scirrho externo meminimus, & quæ plerumque in scrophulis, vel etiam in eodem describuntur, hic admodum quoque competunt.

Vt sunt fodus ex oleis adhibiti, vel ex decoctis parati, addendo etiam quæ matricem respiciunt. Veluti radices Altheæ, Liliorum, Iridis, Bryoniæ, Maluam, semen Lini, Fœnogræci, Ficus, flores Chamomillæ, Violarum, Meliloti, aliæque emollientia & digerentia illic exposita; Arthemisiâ, Nepetâ, flores Partheni, Sambuci, Ebuli, Lupuli. Atque in declinatione etiam Calamènthum, Pulegiû, flores Anthos, Stœchados.

Inunctiones emplastra & cataplasmata in scirrho externo proposita, hic quoque ventris tumetis regioni apposita, idem moluntur: Vt sunt illic recensitæ pingues illæ & mucilaginosæ & gummosæ: Item ex plantis paratæ applicationes: Vti & cataplasma in scirrho externo ex plantis concinnatum, descriptum.

Quibus cataplasmatibus & matricem respicientia, supradicta in foru, addere possumus, vti & Rutam insuper & Absynthium.

Præter quæ Mâdragoræ radix, Hyosquiami folia, vel Papaueris aut Cicutæ, si decoquantur in Vino, Oleo & Axungia, & contundantur, efficacia admodum sunt: Quibus gummi dissoluta, aliæve addi poterunt.

Absynthium, Rutam, farinam Lupinorû cum Myrrha admouere iubet Diosc.

Sanguis anserinus cum farina Fœnogræci vel Lupinorum incorporatus Gal.

Ex vîtatibus emplastris & ceratis hic quoque profunt, in scirrho externo dictum Diachylon ireatum compositumque. Item alia in nodis exposita cerata, œsîpata.

Iniectiones in sinum vteri quoque fiunt, quales in declinatione vteri inflammationis, ne in scirrhum vergat, in ipsius inflammationis curatione descripsimus.

Vel etiam aliæ ex oleis vel decoctis in foru expositis paratæ: Quibus & oleum Myrrhæ, Styrcis: item ex Balsaminæ cucurbitulis factum, additum, eas efficaciores reddit.

Pessaria item in inflammatione vteri, quæ scirrhû minatur, exposita, hic indè possunt, additis interdum prædictis quoque oleis. Ad quæ & Fœnogræci succum: item Panacem Herculeum referre possumus, quæ subdita iuuant.

Suffitus itidem illic recensitus : Agerati suffitum commendat Dioscor.

*Athe-
romati,
Staeo-
matum
& Me-
liceridis
cura.*

Atheromata, Steatomata & Melicerides, diu sæpè sine noxa circumferuntur, & proin negliguntur, sponteq; tandem in abscessum delinunt, vti & in capite prodeuntes eiusmodi tumores, quos Talpas & Testudines vocant. Aliàs verò etiam curationem requirunt, quæ non aded est, vti scrophularum & scirrhi difficilis, citiusq; suscipitur, si alicubi parti incòmodent, aut etiam periculum, sicuti de atheromate sub mento nato diximus, adferant.

Perficiturq; ferè eodem modo, vti in scrophulis, strumâ, parotide & scirrho eam fieri debere diximus, per generalia quædam præsidia, corpori accommodata, si ob aliam ferè illuuiem, quàm hanc quæ exigua est, simplici tumore existente, requiratur, vt vel purgatione, aliòve modo euacuetur. Dein & per particularia tumori admota, resoluentia, emollientia, tandem etiam maturantia, in scrophulis exposita, quæ in hosce tumores, cum non penitus duri sint, vti alij, citius & melius vires suas exerunt, eosque si nondum confirmati sint, vel absumunt, vel saltè maturando, vt citius in abscessum, qui in vlcus mutari queat, sicque sanari, conuertunt.

Præter quæ ad melicerides tollendas, Vuam passam à nucleis repurgatam contritam, cum Ruta applicatam laudat Dioscor. Item Rumicem cum oleo Rosarum & Croco, Melilorumque: Et ad steatomata, Chrysanthemi flores cum cerato appositos.

Conferunt & sequentia, radix Cyclaminis vel Ari cum Axungia veteri addito Sulphure.

Calx viua distemperata cum Axungia vel Oleo.

Stercus caninum vel aliud cum Aceto.

Ammoniacum gummi vel Bdellium dissolutum in Aceto, & cum Melle mistum.

Vel vtatur hac picatione: R. Picis naualis diss. 3.j. Sulphuris pulu. 3.ß. malaxentur, extendantur supra corium, fiat emplastrum, quod singulis diebus detractum à madore abstergatur, rursusque reponatur, & de nouo quarto die mutetur.

Fotus similiter vti in Scrophulis & Scirr-

rho dictum, sæpè adhibiti, vt & illic parati, competunt.

Sectione, cum ægrè sponte aperiantur, abscessum natum aperiemus, cutem non transuersem, sed rectâ vel suboblique, ad myrthi vti docent folij figuram, secando, membranamque simul quæ sæuosam vel pultaceam aut mellitam illam materiam continet, à carne subiectâ, sectione liberando, & si quid remanserit, catharticis auferendo: Quibus factis, postea vt vlcus sanabimus.

Cauterio, vti de scrophulis dictum, actuali vel potenciali, hoc idem fieri poterit.

In carnosissimis locis ex succo nutriente exortorum tumorum molliorû cura, primùm distinguitur hoc pacto, quod alia debetur illis qui cum dolore se offerunt, vt sunt Condylomata in podice vel pudendo mulieris, quorum curationem in doloribus harum sedium exposuimus: Alia verò reliquis, quæ sine omni dolore existunt, accommodaturq; primùm illis quæ cute verâ inuestiti sunt, vt Sarcomati hinc inde in corporis cutaneis sedibus, & Sarcocelæ in scroto, & Carnositati in pudendo mulieris enatis: Dein illis qui leui saltè tunicâ inuestiti sunt, vt Polypo in naribus, Gingiuarum carni auctæ circa dentes, Epulidi in ore, Encantidi in oculi angulo nascentibus: Postremò & Carni excrefcenti in vlcere.

Sarcomata quæ hinc inde in corporis cutaneis sedibus excreuerunt, cuteque obiecta sunt, nisi maturè dum crescunt, impediuntur, postea medicamentis extirpari vix amplius possunt, cum sint veluti caro naturalis, & pars aliqua corporis, quam vti absumere potentiâ agentibus applicitis impossibile, ita nec hanc carnem, etsi superflua sit; sed cogimur eam vi auferre, quòd cum non sine periculo hæmorrhagiæ, & læsione alicuius partis subiectæ fieri possit, sariùs illud cum dolorem nullum pariat, intactum relinquere, præsertim si nec impedimentum magnum functionibus quibusdam, nec turpitudinem insignem adferat, vt cum non est in parte aliqua conspicua, sed vestitu regi solitâ.

In curatione tamen, si eam aggredi veli-

mus, in principio illius maximè occurrendum, & vbi primùm expullulat caro, vel etià aliquousq; iam processit, nutrimentum illi subtrahendum, Sanguisq; per venæ apertionem erit detrahendus, item à parte reuellendus, & venâ aliquâ sarcomati vicinâ sectâ deriuandus, scarificationeq; sæpè in eo factâ, ex eo eliciendus, cucurbitulisq; appositis aliò diuertendus: Purgationibus, item sudoribus & inediâ corpus aliquomodo emaciandum, si fortè hoc pacto & plethora, atque ex ea natum sarcoma minueretur.

Topica quoq; validè repellentia, incipièti sarcomati erunt applicanda, quæ succum ex quo gignitur, reprimant: Qualia in incipiente inflammatione plurima sunt exposita.

Dein fasciâ, si commodè fieri potest, stringendum, strictumq; relinquendum, vel aliâ arte premendum, vt Laminâ plumbi illi impositâ, vinculisq; appressâ.

Vbi verò excreuerit, cum carnem eam cum cute illi obnatâ & venis intextis, nec maturatione in pus cōuertere, nec digerentibus absumere queamus, tunc si molè hanc carneam, vel ex parte vel omnino auferre velimus, sectione hoc tutiùs quàm vrendo perficiemus; In qua faciendâ cutem instratâ vel simul auferimus, vel eâ saltem dissectâ inde carnem sectione, vti artis est amputamus, cauendo à vasis substratis quoad fieri poterit, maioribus venis arteriis & neruis, indeq; mox ad hæmorrhagiam restinguentam accedimus, posteaq; vti vulnus sanamus, quæ duo remediis in vulneris cura expositis perficiuntur.

In minoribus eiusmodi sarcomatibus, si sectione ea auferre graue sit, cute in illis solum dissectâ, carnem tunc nudam cathæreticis detrahare studemus, vel etiam cauteriis eam vrere, vel saltem putrefacere, sicq; sensim absumere.

Quòd si quoq; radice consent tenui sarcomata, vbi corpori adhærent, aut alioquin ligari possint, serâ vel chordâ aliâ sericeâ, circa radicem, illis circumdatâ, constrictaq; sensim eousque arctandâ sunt, donec caro nutrimento destituto flaccescat, atque insensilis reddita, minori difficultate postea amputari queat.

Paratur quoq; chorda intincta vel inuncta causticis, vt Arsenico vel Sublimato, quâ sarcomatis radix vinctâ, adeò vritur in ambitu, vt postea sarcoma reliquū emortuum abscedat, quod tamen, cum non nisi cum dolore vehementi & inflammatione plerumq; subsequente perfici queat, tutiùs si chorda in cauterio indolète nostro ab aëre in liquorem abeunte, intincta, vsurpetur, sæpeq; repetatur, procedemus.

Sarcocele seu carnositas in scroto testis adnascens, & in immensum sæpè excrescens, vix dum cum adhuc crescit, impediri, multò minùs cum excreuit, alia arte quàm sectione, quæ cum noxa castrationis sit, auferri potest: ob eamq; causam cura illius negligitur.

Interea tamen si aliquid mutare velimus, maturè ab initio dum in fieri est, faciendum, & venæ sectione in pede vel poplite factâ, sanguis ab hac sede sæpè deriuandus.

Adhibitis sacco testis, illic vbi extuberat adstringentibus repellentibusq; augmentum illius impediendum. Qualia multa quibus fluxionem in oculos impediri, si vicinis illis sedibus adhibeatur, in ophtalmia descripsimus, hîc quoque conuenire possunt. Quibus adhibitis nisi crescere desinat, cum intrinsecus carnositas hæc lateat, scrotumq; proximè illi non sit adnatum, frustra cathæreticis adhibitis hîc aliquid efficeremus, & causticis vel septicis cutem saltem aperiremus, quâ vel hac arte vel sectione apertâ, hæc eadem remedia huic carnositati commodè applicari minimè possent, testisque corruptio & amissio æquè atque si omnia simul amputarentur, quod citiùs sit, esset metuenda.

Multò minùs emollientibus adhibitis, vti aliqui iubent facere, hîc aliquid efficiemus, cum nō sit scirrhus; qui hæc, vt in cura illius dicetur, requirit, sed carnositas, quæ cum emollitur, magis excrescit & augetur, & proin potius, vti ostendimus, adstringentibus & siccantibus debet reprimi, vel vt subsistat nec ultra crescat, indurari.

Mole tamen eius fatigati ægri, si ablationem requirant, sectione hoc faciendū. Quæ communiter à chirurgis eo modo vti in herniis

347

niis eam fieri solere docuimus; in inguine sectâ & apertâ cure, euulsisque vasis seminariis, cum illius loci teste & adnata carne, ligatisq; simul vasis, & sub ligaturâ hisce amputatis administratur, vnde æquè ac dum in hernia hæc excinduntur, ea in sede æger castratur, periculumq; non minùs magnum subire cogitur.

Quod minus esset, si non in inguine, sed scroti latere tumente, scroto dissecto, testis cum carnositate illi adnatâ, per vulnus extractus amputaretur, quâ ratione porcellos, canes aliosque mares cuiusvis animalium generis castrari, & citra aliam curam vel ligaturam, sponte sanari, vulnusque rursus coalescere videmus.

Quod, si dum hoc fit, carnositatis pars aliqua sectione citrà testis læsionem adscindi posset, testisque rursus cum vasis in scrotum reponi, fortè & sic succederet, præsertim si iniectiones vlcus sanantes simul adhiberentur.

Pudendi mulieris carnositatis curatio. Carnositas è pudendo mulieris interdum enata, admodum se quandoq; exerit & pro-pendit, quæ cum impedimentum marito potius in copula, quàm aliud mulieri pariat, & mulierem hoc aliis patefacere pudeat, plerumque intacta finitur, cum præsertim ægrè & non sine periculo auferri queat.

Ab initio tamen admotis iis quæ in sarcomate generalitè dicta sunt, coerceri debet: Et si excreuerit, & cura aliqua necessaria sit, vel ligatura, stringendo marcida erit reddenda, vel chordâ causticâ in ambitu circa radicem vrenda, quo tamen aliquando tentato, cum dolor immensus & inflammatio subsecuta, nos ab opere reuocassent, nihil effectum est, vel septico potius, vti in sarcomate hæc demonstrata sunt, ambitus illius circa radicem mortificandus.

Polypi curatio. Polypi cura vbi excreuit difficilis, quæ re-ctius dum vel incipit vel nondum adeò au-ctus est, procedit, nam confirmatus, non nisi cum labore dolore & periculo auferitur.

In curatione generalia primùm, ad san-guinis influxum ad eam sedem, impediend-um, præmittenda, per venę sectionem, & si corpus impurum sit, deiectionibus sudori-busque motis repurgandum.

Topica polypo accommodantur, tum mi-tiora adhuc, Epulotica seu cicatricem indu-centia, quòd hoc in vlceribus sanandis præ-stent dicta, quæ validè exiccando & adstrin-gendo polypum dum adhuc crescit, reprime-re atq; siccare possunt; sin excrefcens non-dum confirmatus sit, prius scarificatus vel dissectus, sæpè iterata, similiter operantur, vel si excisus fuerit ne recrescat, prohibere, & cicatricem simul inducere possunt. Quòd si hæc parùm aut nihil proficiant, ad fortiora cathæretica trāsimus, quæ adhuc vehementi-ùs siccando valideque simul abstergendo, carnem minuunt. Et si nec hæc sufficienter agant, ad caustica & septica digredimur, quæ erodendo, vrendo & putrefaciendo carnem corrumpant & mortificent: Vel sectione fa-ctâ polypum auferimus.

Eiusmodi autem remedia trium generū, quæ id præstāt varia sunt, è quibus plurima in epuloticis, in vlcerum cicatrice inducen-da, & cathæretica caustica & septica in vlc-eris excrefcantis carne amouendâ, fistulisq; extergendis, aliquaq; in abscessu rumpendo exposita, hæc quoque in polypi curâ conue-nient: Aliaque insuper his addita, variis for-mis polypo applicari poterunt.

Pulveres qui subtilissimè triti polypo as-pergantur, sunt qui in remediis cicatricem generantibus describuntur, ex simpliciori-bus illi qui efficaciores sunt, atque ex com-positis septimus præsertim admodum effi-cax. Ex cathæreticis in vlcere excrefcen-te expositi, ex simplicioribus qui parantur ex radice Hermodactylorum, & Hellebori nigri: Item Boracis, Pumicis, ex Vini facce crematâ: Atque ex compositis inprimis ille, qui R. Aluminis vñi ʒ. iij. &c. Et qui R. Vi-treoli ʒ. iij. Aluminis, &c. Ex fortioribus ve-rò ille qui R. Vitreoli, &c. Alter qui R. Ar-fenici rubri & citrini, &c.

Vel utimur pulvere rad. Ari vel Serpenta-riæ, aut Vuæ seu feminis illorum: Quibus & Hermodactylorum pulvis addi potest: Hel-leborus niger & Scoria æris.

Fuligo cum fumo ab accensis suscitata, nareq; affectâ excepta, retentâ paulisper in-terim respiratione, polypo se affigens, cum-potenter exiccat, si aliquoties hoc repetatur.

Talis

Talis autem à Thure, Mastiche, Pice carbonibus iniectis, excitatur, vel si candela inde cum elychnio indito paretur, ab eaque accensa rursusque extinctâ, fumus fuliginosus in nares intromittatur.

Validius siccabit, si Sulphur addatur, aliave metallica.

Vnguenta polypo applicantur cum paruo linteolo, vel si fortissima sint, per canalem polypo admotum, ad eum propelluntur, ne partes vicinas tangendo lædant. Ex cicatricem gignentibus in vlcere expositis, illud hic maximè cõuenit, quod R. pulueris Sexti mediam partem, hoc est 3. ß. &c. Ex cathæreticis in vlcere excrefcente propositis illud quod R. Hermodactyl. vel Agarici, & qui R. Antimonij, &c. Ex fistulas extergentibus in cura ipsarum declaratis, Vnguentum Ægyptiacum: Vel potentiss. ex Sublimato factum: Vel quod in abscessu aperiendo ponitur ex Sublimato, vel Trochiscis veterum parato.

Præter quæ si mitioribus vti velimus, ex puluere suprascripto ex radice Ari parato, Vnguentum paramus, excipiendo eum Oxymellite squillitico vel succo Granat. acidorum inspissato vel Omphacio.

Vel inungitur Omphacium solum, aut succus expressus ex cortice & granis Granatorum acidorum cõctione vti Omphacium inspissatus.

Succus Ari vel Serpentariæ item illinitur.

Aut utimur validiore hoc Vngueto: R. Vnguenti Ægyptiaci 3. ß. cort. Granatorum, Gallarum an. 3. ß. olei Vitreoli 3. j. misce.

Vel sumitur Chalcanthi aliquod genus, quod maximè erodit, vt Chalcytis vel Myfi, vel Æris ærugo, vel hæc duo simul, & cum Omphacio vel Melle incorporantur, addendo interdum & Æris florem seu squamam.

Efficacissimum fiet, si Arsenicū vel Sublimati tantillum addas.

Liquores aliqui sunt & Aquæ, quibus polypus sæpè madefit, vel si validè agant, penicillo in iis merso tangitur aut inungitur, vel per pilulam cottonis aquis his immersam, vel canalem polypo adhibitum ad eum propelluntur, atque aliquandiu illic retinentur.

Tales autè liquores ex prius recensitis, in fistulis sunt aqua, quæ R. Ærug æris 3. iij. &c. vel quæ R. Auripig. 3. j. Ærug. in. æris 3. iij. &c. & quæ R. Auripigm. Æruginis æris an. 3. j. &c. Vel illa quæ inter ea quæ abscessus aperiant, ponitur, & R. Vitreoli, Arsenici, &c.

Insuper confert & hæc aqua stillatitia, quæ R. Aluminis 16. ß. Chalcanti 3. j. ß. Gallarum vel cortic. Granatorum puluer. 3. iij. Omphacij seu Agrestæ 3. ij. vel succi Vuarum immatur. recentis, si haberi potest: Affunde Aceti fortis q. s. vt in pulstem redigatur: Eliciat per destillationem aqua: Quâ polypus sæpè tangatur vel madefiat.

Potenter & subito operantur vel solo cõtactu, liquor quem spiritum seu oleum Vitreoli vocant.

Vel sic paretur: R. olei Vitreoli 3. j. Aluminis viti 3. j. dissolue cum aqua Plantaginis.

Alius efficacissimus: R. Sublimati 3. j. coquatur in Aquâ fabrorum extinctionis ferri 3. iij. ad consumpt. medietatis: Et per se admove: Vel addendo olei Vitreoli 3. ß. Aluminis viti 3. ß. Achibeatur.

Aquâ aurifabrorum fortis appellatâ, tactus polypus mox flaccescit, cui Auripigmentum etiam miseri poterit.

Oleum in fistulis extergendis descriptū, quod R. Antimonij, &c. hic quoq; proderit.

Cauteria ex Calce, Vini sæcè vsta, indolentia, aliaque quæ abscessum aperire diximus, polypo cautè per canalem, vel aliâ arte ne vicina loca tangat, admotâ, eum tandem vrendo putrefaciendoque absumunt.

Actuali cauterio citius hoc effcimus, ferro candenti per canalem intromisso, polypumque vrendo.

Sectione cum instrumento idoneo, vt forcipe, polypum dissecamus vel amputamus, qui si prius igne candefiat, eum vrendo, simul hæmorrhagiam & ne recrescat, quod aliàs facillè fit, impedimus.

Gingivarum carnis excrefcentia, quam Gingivæ & Dentium superincarnationem vocant, cum vix aliud incommodum adferat, quàm quod in morsu ciborum sanguis leuiter inde emanet, cibosque cruentos aliquo pacto reddat, non admodum curatur: Cum masti-
cando cibos in ea dentium sede, vbi gingivæ
tument,

tument, hæ sæpius impulsæ, ferè decre-
scant iterum & diminuantur, eodem modo
quo illic, neglectâ masticatione, prius ex-
creuerant.

Quòd si verò eòsque augeantur, vt iam
dentes molares ferè obregant, atq; in mor-
su inter dentes veniant, tunc collutionibus
oris admodum siccantibus & abstergenti-
bus, hæ oris sedes sæpius erit ablunda,
quales in oris vlceribus expositæ fuerant.
Et dentifriciis admodum siccantibus & ab-
tergentibus, gingiue tumidæ erunt sæpe
fricandæ, qualia in dentibus sordidis sunt
descripta.

Quæ nisi iuuent, ad validiora erit tranf-
eundum, atque Vnguento ex puluere Ari,
dein & illo quod ex omphacio succisque a-
liis fit, in polypo descriptis, gingiue erunt
illinendæ. Vel oleo Vitreoli, vt illic quo-
que ostensum, solo vel misto leuiter made-
ficiendæ.

Et si dentes admodum vel omnino gin-
giuis obducantur, fortioribus quoque aquis
quæ R. Aluminis tb.ß. Calchanthi, &c. Vel
aquâ Forti, vt illic quoque edoctum, earum
superficies eminens, solùm tangenda, ne si
circa radices dentium hoc fieret, illic quo-
que consumptæ, nudos dentes & imbecil-
les relinquerent. Vnde ne vel hæc aut alia
loca attingant, nec dum aliquid de illis aliò
feratur aut deglutiatur, cauendum, munien-
do dum hæc apponuntur loca vicina, osque
post horû vsum sæpe & studiosè colluendo.

*Epulis
curatio.*

Epulis caruncula iuxta radicem dentium
enascens, cum nullum imprdimentum ferè
adferat, & licet in catarrho aliquando ma-
gis intumescat, sponte tamen iterum subsi-
deat, plerunque negligitur.

Si tamen adeò excreseat, vt dentibus se
interponens, masticationem impediat, &
morsa dolorem pariat, tunc oris collutioni-
bus admodum adstringentibus, caro hæc
laxa facillè flaccescit & minuitur. Quòd si
magnum impedimentum adferat, poten-
tioribus quoque, vt in gingiuarum carne
absumendâ dictum, vtendum, caroque hæc
tangenda, cautione si noxia sint, vt illic di-
ctum, eadem adhibita.

Quòd si pendula sit hæc caro, radice gra-

cili, & setâ vinciri possit, hoc pacto tandem
marcescens euanesceret.

Encanthis seu caruncula in oculi angulo *Encan-
this cu-
ratio.*
excrecens, adeò vt molestiam adferat, præ-
missis quæ influxum sanguinis in hanc se-
dem oculi impediunt, prolixè in ophthalmiâ
expositis.

Topica carunculæ huic apponimus ea,
quæ vi siccante & adstringente quoque exi-
miâ prædita sunt, qualia in oculorum vlce-
ribus collyria variâ descripta, quorum con-
tinuatione, rursus in se hæc caro laxa facillè
retrahitur & subsidet.

Si verò hisce minimè cedat, & ad fortiora
quæ eam absument, transeundum sit, sic il-
lis vtetur, ne oculum lædamus, vel carnem
hanc vniuersam auferamus, vnde Rhyas o-
culi vitium adhuc maius sequeretur, a mi-
rioribus adhuc ad validiora; & si nihil effi-
ciant, ad validissima pergendo. Qualia om-
nis eiusmodi generis remedia in oculo-
rum maculis, & panniculo extergendis &
absumentis, descripta, huic carunculæ, cum
eâ curâ quæ illic quoque annotata est, appo-
sita, similiter eam possunt absumere.

Carnis excrecencia in vlcere excrecen- *Carnis
excrecen-
tia cura-
tio.*
te dicto, enata, si nondum cicatrice obducta
fuerit, facilius reprimatur aut aufertur, eo
modo vt in vlcere excrecente hoc exposi-
tum fuit; si verò iam cute tecta sit & coalue-
rit, cum tunc cum sarcomate conueniat, eo
modo vt alia eiusmodi sarcomata, tractan-
da erit.

In excarnibus locis, a succo nutriente na-
scentium tumorû curatio, primum accom-
modatur illis, qui in articularum sedibus se
offerunt, vt Ganglio & Nodis illic quoque,
vel etiam in nudis ossium sedibus enatis:
Dein & huic, quæ in vnguibus quandoque
visitur, Vnguium extuberantiæ: Demum &
illis qui cuti innati sunt, vt Verrucis, Cla-
uo & Callo cutaneo: Postremò & Varis &
Hordeolo.

Ganglion in articularum regionibus *Gangli-
curatio.*
natus tumor, licet mollior nonnihil scirrhus
existat, ægrè tamen quoq; si aliquousq; pro-
cesserit, sanatur, interdum verò etiam nullâ
ratione euinci potest, sed altius radices agēs,
articuli motum & per consequens membri

impedit, vel etiam ita sistit, vt rectum adstrictumque, sicuti dictum, moueri nequeat.

Occurrendum autem maturè hisce incommodis, antequam vltèrius excrefcens confirmetur ille tumor, & demum quoq; omnia tentanda erunt, vt tumor hic dissipari vel saltem eousque minui possit, quò nihilo minus articulus aliquousq; moueri queat. Quod præmissis decentibus euacuationibus, in durioribus & mollioribus tumoribus iam prius expositis, molimur topicis remediis emollientibus & digerentibus, cauendo quantum fieri potest, ne suppuratio hic aliqua sequatur, cum ea vel sponte facta, vel incuria inducta, vlcera peruerfa & sæpè incurabilia secum trahat, à quibus nervosæ hæ sedes adeò interdum corrumpuntur, vt illius articuli motus deperdatur vel deprauetur: Sed & manuali operatione adhibita, aliquid, vti diceretur, præstari poterit.

Applicationes verò quod atinet, eadem quæ in scrophularum cura descriptæ fuerunt, cum emolliant & digerant, in ganglio quoque competent, additis interdum iis, quæ eiusmodi nervosis locis appropriata sunt, vel cum multa quoque eiusmodi contineant, quæ hæc sedes respiciunt, eorum quantitas, vt cæteris præualeat, augenda.

Quâ ratione foris, quo membrorum affectum fouetur, vel balneum in quod immergitur, ex sequentibus omnibus vel paucioribus parari poterit: R. radic. Altheæ, Liliorum, Bryoniæ, Iridis ana 3. ij. herbarum Maluæ, Brasicæ ana M. ij. Hyosquiami ana M. j. Chamæpytheos vel Saluiæ, Absynthij ana M. ʒ. florum Chamom. Meliloti, Cheiri vel Sambuci ana P. j. semin. Lini, Fœnogr. ana 3. j. baccarum Lauri 3. ʒ. decoquantur in Aqua vel Vino aut Lixiuio pro foris, vel autâ omnium prius dosis Pro balneo.

Hisce & fortiora, vt radix Cucumer. asini, Cyclaminis, Ari, Serpentariæ addi possunt.

Velex illis parata fomentatio in scrophulis exposita, additis simul decocto, quæ in iam dicto foris vltèrius continentur.

Ex decocto Ranarum & Lumbricorū foris, hic commendatur. Vel si cedere aliis nolit, ex aceto acerrimo simplici, vel in quo Lapis Molaris aut Pyrites prius extincti sint.

Aut Lixiuio colato per cineres, & præsertim Ficulneos: Vel Vrina, aliisve eiusmodi in scrophulis expositis, incoquendo interdum & ex supradictis quædam.

Ex oleo Lumbricorum, Ranarū fomentatio quoque vtilis. Vel Sabinæ, quod cæteris præfertur.

Sulphureas thermas Naturales actu calidas, si diu illis infideant, & per mensem aut vltra, vti consuetum est, vtantur, hunc tumorem præ cæteris remediis aliquando amouisse, & membrum adstrictum rursus relaxasse, obseruauimus; ob quam causam vel maturè, vel saltem si alia non proficiant, eò mittantur, illisque tanquam extremo remedio vtantur.

Vnguenta, cataplasmata & emplastra in scrophulis exposita, hic quoque, cum multa inter ea, quæ nervoso generi simul appropriata sint, recipiant, competent. Veluti ex pinguibus & mucilaginosi, vt i & gummosi: Vel ex plantis, stercorebus, pulueribusq; parata. Quibus & vt melius membranosis illis sedibus accommodentur, oleum Lumbricorum, Vulpinum, Ranarum & similia permiscere possumus: Sicuti & axungias, eas præcipuè, quas præ cæteris appropriatas, vt Hominis, Vrsi, Taxi, Vulpis esse credunt.

Fit & emplastrum conueniens hisce sedibus: R. Picis naualis 3. ij. dissoluta in olei Lumbricorum & Irini 3. ʒ. addendo Ladani, Mastiches ana 3. ij. Stryacis calamit. 3. j. cinerum Lumbricorum 3. ʒ. malaxentur oleo in magdaleonem.

Cataplasma hoc quoq; probatur: R. Nucum iuglandium antiqu. nucleorum 3. iij. farinæ Lupinorum vel Orobi 3. ʒ. radic. Raphani, Ireos ana 3. j. Mellis q. s. contundantur, adde parum Salis: Applicetur.

Suffitus etiam probantur ex aceto, in quo igniti lapides, vt in scirrho dictum, extincti sint.

Vel fiat talis: R. Benzoini, Storacis ana 3. ij. Myrrhæ, Bdellij ana 3. j. radic. Ireos 3. ʒ. Marcasitæ 3. ij. cum Terebinth. fiant Trochisci: Ad fumigandum.

Sectio citra læsionem tendinum aut ligamentorum, vel etiam neruorum, cum vix fieri possit, omittenda.

Manuali aliâ operatione possumus procedere, per quam licet ganglion auferri nequeat, vitium tamen inde contractum, aliquo pacto corrigitur.

Per aperturam factâ sectione aliôve modo, ganglion auferre velle, periculofum, cû citra tendinum atque ligamentorum, vel etiam neruorum læsionem, si exacte eximi debeat, vix fieri possit.

Si membra ex tumore illo circa articulum astricta sint, quo pacto ea sensim retrahi, & vel omnino vel saltem aliquouſque reduci queant, idq; variis artibus & instrumentis, in cōtractione membrorum expositum fuit.

Nodi in excarnibus locis geniti, cûm triû sint generum, quorum alij in articularum sedibus enascuntur, vt sunt Podagricorum nodi: Alij verò in nudis ossium sedibus prodeunt, in lue venerea & Cephalæa; Tertij à causa alia violenta, Callosi nodi, nos singulis curam ac commodabimus.

*N. dorû
in Pod-
agricis cu-
ratio.* Podagricorum nodi, qui circa internodia digitorum pedis vel manus, nonnunquam etiam aliis in locis excrescunt, ægre rursus dissipantur, sed plerunque vel aperti humorem aliquem vel tophos proferunt, vel aliquin indurati fixi manent prominentque, & articulum figentes, vt digiti recti vel curui maneant, sicut hæc in podagra ostensa fuerunt, causam præbent.

Vt tamen, si fieri potest, incrementum ipsorum impediatur, vel dissipentur aut citius matureſcant; Primum curatio ipsi podagræ erit accommodanda, quæ hisce causam præbuit, corpus euacuando, exhibendo Antipodagrica dicta illic descripta, quæ adeo operari creduntur, vt si per menses aliquot, vel etiam toto anno, auellana quantitate fumantur, etiam nodos podagricorum dissoluant.

Quod & sequens sic vsurpatum efficere docent, quod R. Hyperici, Chamædreos, Chamæpytheos ana 3. vj. summit. Centaur. minoris 3. β. rad. Aristol. rotund. Phu, Mei, Hermodactyl. Agarici an. 3. iij. radic. Gentiana, Petrosel. an. 3. ij. Spicænardi 3. j. puluerisata optime, excipiantur Melle, fiat electuarium.

Applicantur dein quæ nodos emolliant,

& quod emollitum est obiter digerant, vel quæ eos maturent, sicuti etiam aliis tumoribus hæc adhiberi eo modo debere ostendimus, è quibus multa, atque ex illis efficaciora hic quoque possunt competere. Inprimis verò sequentia.

Vt Cataplasma hoc: R. radic. Altheæ 3. ij. radic. Ireos rec. 3. j. feminis Lini 3. β. coquantur in Vino & Melle, addatur primum Terbinthinæ: Applicetur.

Præsertim verò competunt radix Cannabis sylvestris, Dipſaci, herbæ Vermicularis, Senecio, Cicuta, Hyosquiamus, recetia contrusa, vel prius cocta in Vino vel Aceto, addito interdum Melle vel Oxy mellite, & applicata, nonnunquam additis Axungiiis.

Vel: R. foliorum Rutæ, Burlæ pastoris, additis Passulis enucleatis, contundantur.

Bulbi Cæparum & Allij tosti vel cocti parum, quibus Axungia gallinæ vel alia addi potest, inprimis Taxi aut Muris montani.

Poma putrida applicata, vtilia sunt.

Ammoniacum, Sagapenum, Galbanum dissoluta in aceto acerrimo, vel Oxy mellite, addito interdum Furfure minutim cribrato.

Vel: R. Galbani in aceto forti liquefacti 3. j. β. Visci seu Collæ emollitæ in aceto, Terbinth & Cera ana 3. β. misce.

Stercus caprinum vel caninum, cum Oxyrato, additâ interdum farinâ Hordei, prodest.

Caseus itidem putrescens acris, qualis præcipue sic fit ouillus, pistus & appositus.

Nigellæ semin. & radic. Ireos pulueres, cum Cera liquefacta, continuo supra callos posita, profunt.

Vel puluis Vſneæ quercus & Auellana- rum cum Saponem gallico, addito Nitro.

Cinis corticis Salicis cum aceto acerrimo misceatur, sæpeque tumor eo illinatur.

Vel sic: R. Ochra 3. ij. cineris cortic. Salicis, sem Nigellæ ana 3. j. Stercoris canis sicci 3. j. β. fiat puluis, excipiatur Caseo putris fiat pasta. Cui & Gummi in aceto liquefactum addi potest.

Succum Capparum & Oleum nucis Indicæ commendant.

Fomenta quoque nodis apponuntur, & vt reliquæ applicationes melius operentur,

Aquâ calidâ prius, vel alio decocto emolliente fomentur.

Maximè verò fomentis vel embrocis vitur ad tophos absumendos, & partem simul corroborandam; Ex decocto facto in Vino rubro, Altheæ, Maluæ, Lapatij, &c.

Vel sic: R. Aquæ marinæ vel Salsæ mensur. x. singul. lb. iv. in quibus decoquatur Gaiaci tornati lb. j. Corticis ipsius 3. iv. Absynthij, Iuæ, Betonicæ, florum Stœchados, Rosarum rubr. ana M. vj. radic. Ireos 3. 6. fiat decoctio, donec remaneant Mensuræ vj. rursum affusus Vini rubri mens. xij. decoquantur ad consumpt. iv. partis, & colentur: Pro fotu ad dies 20. vsurpando.

Ex eodém decocto per fistulam seu canalem suffusus, ad locum affectum diu manè admissus, durities discutit, admodumque partem roborat, vti magno successu expertum fuit.

Idem præstat si Vinaceis pars affecta obruatur, primò eligendo succulenta adhuc, mox siccissima.

Inciduntur quandoque nodi, & sic aperiuntur, vt materia contenta prodeat, vnde vel subsident, vel cum medicamenta admota, tunc meliùs in residuum agant, citiùs curantur.

Nodorum in lue Venerea & Cephalæa curatio. In lue Venerea qui erupunt nodi, in fronte, tibiis manuumque externâ sede, cum priuatam curam generalem, quæ huius competit, requirant, & particularia quoque quædam, quo pacto hæc administrari debeant, in huius Luis cura tractabitur.

In Cephalæa nodi interdum erumpentes in fronte, curatâ cephalæâ, vt in ea descriptum, sponte euanescent; Si remanserint, euacuationes aliæque erunt repetenda: Atque topica quæ iam dicta sunt, illis quoque erunt admouenda.

Nodorum callosorum & verrucarum curatio. Alij nodi Callosi dicti, qui per se non ex morbo alio, ob abrasionem periosij, succo ossium luxuriante nascuntur, ac calli vel ossis noui instar ossi adnascuntur, vel à fracti ossis conglutinati rursum callô, nodi instar protuberante, proficiuntur, difficulter quoque auferuntur, & indurati omnino, ad dies vitæ perseverant.

Si tamen vel molestiam aut deformationē

adferant, topicis adhibitis eos emollire & resoluere studebimus: Non aded hîc euacuationibus incumbentes, cum à causa externa, vt labore vel simili ferè proficiantur.

Applicareque possumus hîc varia, ex illis quæ in nodis podagricorum quoque conuenire diximus: Vel etiam alia in scrophulis proposita.

Atque inter ea, narcotica multum operari posse, experientiâ cognouimus, quibus aliquando desperatos nodos in homine, vti & equis dissoluimus: Sumendo radicē Mandragoræ, vel folia Cicutæ aut Hyosquiami, eaque decocta miscendo cum Axungijs, vel decoquendo in aceto fortissimo: Pro fotu & cataplasmate: Quibus & Vrticam mortuam cum successu addidimus.

Ex Hydrargyro parata vnguenta & emplastra, sicuti in lue Venerea, ita & hîc ad nodos illos dissoluendos sunt efficacissima.

Ex vsitatis ad nodos emolliendos, conueniunt Oesypatum ceratû, quod fit ex oleo chamomelino, irino, æsypo, resinâ, terebint. mastiche, cerâ, spicanardi & croco.

Item Zachariæ filij emplastrum, quod paratur ex oleo lini vel leucioij, æsypo, adipe anatis, gallinæ, medullâ cruris vaccæ, mucilage lini, sœnogræci, altheæ, piscium glutine, cerâ.

Dein & Philagrii æsypatum ceratû, quod recipit oleum nardinum, æsypum, adipem anserinum, medullam cruris vaccæ, terebinth. bdellium, ammoniacum, mastichem, styracem, aloë, sœnogræcum & chamemelum macerata, crocum.

Est & aliud quod sæuum vitulinum, olibanum, succum squillæ & ceram recipit: Item aliud Oesypatum Pauli, aliud Democriti Diapente.

Amputantur aliquâdo nodi, si præsertim versus articulos tendant, illorumque liberum motû impediunt, aut premendo dolorē continuum inducât, quod eò tutiùs fit, cû in nodis tantum ossibus, cute ferè solâ obrectis, hî nascâtur: Fitque hoc apertione primû cutis eos denudâdo, postea acuto ferro, ab osse continuo istu absciendo, tandem vulnus inflatum ossi & cuti, vt decet, curâdo: Quod minus tutò, nec ita citò vsitione perficeretur.

Vnguium

Vnguiū
extube-
rantia
callosa
cura.

Vnguium extuberantia callosa, si à læsione aliqua vnguiū procedat, cum vngues crescendo sponte sensim è corpore secedant atque amputentur, vnà cum illis tandem abit.

Si verò ab internis causis hæc inæqualitas in illis proueniat, vel etiam vngularum instar crassescant, cum tunc noui succedentes, tales quoq; euadant, vix amplius attenuantur; Tentandum tamen, si vitio aliquo corporis laborent, vnde hæc enasci posse vel saltem foueri, colligimus, vt illud prius emendetur: & topicis emplastris & balneis validissimè emollientibus, in nodis expositis illam duriciem emolliamus, & ab hac extuberantia semper aliquid deradamus vel absecemus, si fortè qui succrescunt vngues, minus crassi & tuberosi sequerentur.

Calli cutanei
curatione.

Calli cutanei in manibus, cum non adeò obfint, nec cum laboris sint indices, turpitudinem aut vituperium, sed potius laudem concilient, atque hi qui in pedibus circa calcem, vbi plerunque nascuntur, in incessu robur aliquod adferant, curationem vix priuatam exigunt, præsertim cum, si ab attritione vehementiore harum partium aliquamdiu temperetur, spontè sensim euanescant, & cute nouâ succrescente, ab ea secedant, atq; auelli queant.

Quòd si verò adeò incresecant & luxurient, vt impedimentum aliquod in contactu rerum, maximè verò in incessu, vbi clauī instar validius premendo molestant, adferant, tunc quæ valide crassam hanc cutem emolliant, adhibenda erunt remedia.

In primisq; balnea, quibus manus aut pedes immergant; Qualia ex aqua cōmuni parata, actuali calore & madore, corium hoc crassum humectando, possint emollire; eoq; magis si quæ potentiâ simul humectent & emolliant, hisce quoque incoquantur. Vt plantæ emollientes, hinc inde in Clysteribus emollientibus descriptæ, atque eæ ex quibus in scirrho balnea quoque fieri debere diximus: Quibus & pingua quandoque adduntur, vti lūs pingue intestinorū aliæve olea vel axungia.

Præter quæ, inunctiones, emplastra ex oleis, axungiis, mucilaginosi & gummosi, in scirrho exposita, hic quoque conse-

runt: Vti & quædam ex illis quæ clauum emolliunt.

Inter quæ gummi Ammoniacum dissolutum in aceto fortissimo, emplastri instar callo obductum, valde eum mollem reddit.

Abraditur præsertim prius benè emollita cutis hæc dura in manibus, vnguibus & in pedibus circa calcem, post pedum lotionem: Vbi & cum admodum extuberat, lapide tophaceo vel limâ exteritur.

Cauterio indolente callum in lateribus pedum, in incessu valde molestantem, admodumque durum, clauī instar, aliquando abstulimus.

Cicatricum seu callorum illorum cuti infertorum cura, plerunque nulla suscipitur, cum nō pro vitiosis habeantur, imò aliquando, si in acie aut pugna vulneratis acciderint, maximeque in facie appareant, honestæ esse, vtpote quæ non fugientibus, sed in conflictu viriliter pugnantibus contigerint, censentur. Dein & aliam ob causam producunt, si non eleuatae sint, sed tantum instar albæ lineæ vel maculæ cutis superficiei æquales appareant, quia colorem non ita cuti ab simile possident, similiter negliguntur, cum si alium colorem illis inducere vellemus, eas manifestiores redderemus.

Cicatri-
cum cu-
ratio.

Quando verò non nihil prominent, aut alioquin inæqualitatem quandam habent, tunc vt eas cuti æquales reddere queamus, remediis detergentibus moliri tentabimus. Qualia cicatricibus extergendis dicata sunt sequentia.

Decoctum Papaueris erratici & hortensis pro fotu vel lotionem adhibiturum.

Aqua item florum Liliorum & Fabarum: Commendaturque à quibusdam aqua Stercoris humani.

Oleum itidem Myrrhæ, & Vitellorum ouorum, & de Frumento, & ex nucleis Amygdalarum amarar. & Persicorum, Dactylorum & nucum Been expressum: In quorum oleorum defectu, nucleorum expressorum affricatorumque oleum idem præstat.

Sputum proprium dum ieiuni sunt, adfricant vulgò.

Sudor item qui ex Ovis dum sub cineribus assantur, exsudat, prodest.

Axungia thymali piscis inuncta probatur.
Vel fiat vnguentum ex semine Erucę, vel
Sinapis cum Felle bouis aut alio.

Vel ex Borace, Camphorâ & Axungia vel
Medullâ aliquâ.

Glandis vnguentarię coctę in aceto cum
Nitro, illitionem probat Diosc.

Vnguentum: R. radic. Cucum. asini vel
Serpentarię, Ireos, Arundinis ana 3.ij. seminum
Melonum excortic. s. Raphani ana 3.j. Osiũ
vel cornu Cerui, vel Testarum ouorũ
combust. 3.ß. Cretę albę vel Crystalli aut A-
mianthi 3.j.ß. Thuris 3.j. Sacchari candi 3.ijj.
Infus. gummi Tragach. vel mucilag. semin.
Fœnograci 3.j. Olei vel Axungię alicuius
q. s. fiat Linimentum.

Hiscę si nil proficiamus, & omnino eas a-
liquo pacto absumere animus sit, fortioribus
detergentibus & erodentibus, & vrentibus
vri possumus: lisdem quibus maculas perti-
naciosiores in discolorationibus absumi dixi-
mus, & tum illa, tum alia detergentia, quę
hic quoque prodesse possunt, abunde illic
descripsimus.

Radendo donec attenuentur cum cultel-
lo, vti & callosam cutem minui vel cuti adę-
quari tandem posse, censent.

Altius impressę cicatrices, si finem alit-
quem aut foueam faciant, minimę cuti adę-
quari poterunt, nisi illis sectione aut vstione
ablatis, vlcus cauum carne prius impleatur,
tuncquę alia cicatrix inducatur.

*Particula-
rum fo-
nearum
post curã
ipsarum
reluctariũ
curatio.*
Verũ in foueis illis quę plurimę per fa-
ciem & nasum dispersę, post morbillos fa-
natos relinquuntur, cũ fieri nequeat, vt for-
tiora illa singulis locis adhibeantur, nec alia
extergentia hic, quę vulgò præscribuntur,
aliquid abradendo efficerent, sed potius am-
plius excauarent, exigua sanę emendationis
huius vitij spes est, & proin ferẽ negligenda:
exemplo sint magnatum liberi, in quibus si
quid tali curã profici posset, nihil relinqueretur
intentatum. Quod si tamen aliquid ten-
tandum, non deradentibus, sed contrariis
potius, emollientibus & attrahētibus adhi-
bitis illud, vt se attollant, faciesq; aliquo pa-
cto magis plana euadat, moliendum. Veluti
Liliorum decocto, item pedis Vituli, aliisq;
similibus, quę studio, cũ parua spes sit cu-

rationis, omittimus: Huicq; vitio potius præ-
cauendo ne hoc fiat, eo modo, qui in morbil-
lorum cura explicabitur, occurrendum est.

Fouea item profunda vmbilici, à coalitu *Vmbilici
fouea
cura.*
illius nimis profundę factõ procedens, cũ
nullum impedimentum adferat, nec conspi-
cua sit, negligitur; præsertim cũ emenda-
ri nequeat: Vti & extuberantia à callo ex-
crescente prodiens, cũ nec hęc tanti mo-
menti sit, vt curatione egeat; sicuti verò om-
phacele aut hydrocele, quarum cura suo lo-
co exposita est.

Verrucę & Clauis, aliās spõte rursus pro- *Verruca-
rum ex
clauorũ
curatio.*
gressu temporis marcescunt atque abeunt;
Vel si non magnum impedimentum adfe-
rant, nec ita conspiciua sint, negliguntur.
Quando vero hęc, quia deformant faciem
aut manus, vt verrucę, vel dolorem & im-
pedimentum in incessu adferunt, vt clauis in
pedibus, auferre volumus, tunc facilius hoc
in illis, quàm aliis duris tumoribus moliri
possumus, licet enim durissima sint corpora,
& radicibus altis quoq; hæreant, tamen
cũ poris infixæ, non illic cuti verę adeo
continuentur, nec cute, vti alij duri tumores
inuestiantur, & sensu proin omni destituta,
quæuis perferre possint, curatio in illis magis
succedit. Quã sic instituimus, vt hęc vel
citra vim maiore consumamus, aliās verò vi
ea veladuram, vel secemus, vel extraham.

Absumimus verrucas & clauos, adhibi-
tis, quę vel proprietate quadam hęc in illis
operantur, vel alia qualitate nutrimentum
ipforũ exiccante vel absumēte, vnde postea
marcescere atque euanescere incipiunt, tan-
demq; cõsumi; cũ aliās emolliiri hęc dura
corpora vix possint, multò minùs discuti.

A Plantis quædam petita id præstant: Vel
folia recentia contusa, Senecionis, Linarię,
Agrimonię, Sumach, Geranij Robert. Den-
tis leonis, Cichorij verrucarij, Bliti, Populi,
Rutę, Millefolij, Nasturtij. Radices item A-
fari, Iridis, Dipsaci, Chelidonię, Asphodeli.

Efficaciùs operantur pista cum Vino vel
Aceto, eoquę fortissimo, addito quandoque
etiam Sale vel Nitro: Interdum & Pipere,
quandoque aloẽ.

Bulbi Porri, Cepę, Liliorum tosti, cum
axungia aliqua apponuntur.

Succi illiti è prædictis plantis, idem præstant, inprimisq; lacteus ex cauliculis cauis Dentis leonis abruptis, aliarumve inthybaearum plantarum emanans: Et præter hæc succi foliorum & florum Verbasci, Mali punici & Portulacæ: Dein & Laserpitium.

Mel Anacardinū illicitum efficax censetur.

Aqua quæ è farmentorū Vitium extremis, dum viruntur, exudat, affricata pbat. ur.

Pulvis feminis Nigellæ cum Urinâ vel Lixiuio aut Melle exceptus, apponitur.

Vti & feminis Heliotropij, quod fortè tricocon cum verrucas referat, ob hanc similitudinem in eas agere posse, creditum fuit. Veluti & farina Cicerum, Pisorum, Hordei, quâ quoque eas abigi posse putant.

Fermentum triticeum clauos absumit.

Cinis corticum Salicum combustorum cum Aceto subactus, quoq; à plerisque laudatur: Cui & Squillæ cineres vtiliter miscentur.

Thus cum Pice puluerisatum, nonnquam & Sale, Aceto vel succo Cæparum subigitur in formam emplastri.

Ab animantibus desumpta, sequentia applicantur vel affricantur.

Gobius fluuiatilis clauo adligatus & retentus, donec putrescat, eum abigit.

Lacertæ caput incisum commédât Dios. in verrucis & clauo.

Smaridis piscis caput salitum crematum probant, quod Cerâ vel Aceto potest excipi.

Cutis dura squamosa in pedibus gallinarum, quæ si ad ignem parum torreat, separatur, calida sæpe affricata & superposita verrucis, eas delere creditur.

Cornuum recentium succus expressus inungitur.

Sanguinem mulæ vel Menstruum, vt quidam docent, aliqui illinunt.

Stercus canis, Ovinum, Caprinum cum Cera vel Sapone aut Lixiuio vel Urinâ admouetur.

Fel Tauri vel aliud inungitur.

Præter hæc Sal nitrum & Sal Ammoniacum; & Alumen, cum Melle vel Sæuo aut Sapone mista, vsurpantur.

Item Lapis Lazuli puluerisatus cum Aceto incorporatus.

Adurimus quandoq; verrucas & clauos, tunc enim non solum in escharam abeunt, sed & radicibus inde exiccatis & absumptis, non amplius recrescunt, quod actu potentiaque operantibus perficitur, è quibus, si quæ vim maiorem adferunt, adhibeantur, cutis, verrucam aut clauum ambiens, munienda, ne ab illis lædatur.

Ex illis quæ potentia operantur, mitius agunt Ranunculi folia & radix contusa, quæ sæpe admota, tandem aliquid possunt efficere: Vti & aliæ adurentes herbæ.

Validius agunt caustica varia, passim descripta, quæ cautè adhibenda, vt solam verrucam vel clauum attingant, vel prius parte circumcirca cerâ vel alio emplastro munitâ, in medio illius foramine relicto, per quod hæc prominent, sic erunt apponenda.

Inprimis in vsu hîc sunt, lacteus succus, quæ Ficum fructu, vel folijs illius succulentis recentibus abruptis emanat: Vti & Tithymali alicuius lac: Inter cuius species Myrsinites copiosum lac reddit, quod & ad hunc vsum assèruatur, licet & hyeme à planta hac, quæ perennis est, haberi queat: Lathyridis lac idem præstat: Pèpli quineriam vti & Chamæfyses.

Ægyptiacum vnguentum mistum succo Tithymali etiam conuenit; Cuius loco, Ærugo aeris contrita, succo iam dicto potest excipi: Si tantillum Sublimati vel Auripigmenti addatur, erit efficacissimum.

Calx viua cum Sapone mista apponitur; Magis aget, si Vitreolum addas, & parum Æruginis aeris: Vehementius si Arsenicum aut Sublimatum.

Cauterium ex Calcis Lixiuio factum indolens, aliaque in abscessu aperiendò descripta, illud citò & commodè agunt.

Ex Cantharidibus cum fermento pasta idem operatur.

Aqua item fortis appellata aurifabrorum, si guttâ illius donec nigrescant, tangantur.

Vel adhibeatur hoc pacto Aqua ex Vitreolò, Arsenico, &c. vti in abscessu rumpendo descripta est.

Cuius loco hæc potest fieri: R. Salis ammoniaci, Aluminis, Vitreoli ana ʒ. ij. Calcis viuæ ʒ. j. Æruginis aeris ʒ. ʒ. Destillatur.

tur. Efficacior fiet, addito Sublimato vel Arsenico.

Actu adurimus, vel Ferreo stylo candente per canalem ne partes adiacentes lædat, transmissio, tangendo verrucas aut clauum.

Vel bacillum Betulæ accensum, rursusque extinctum adhuc ignitum adhibemus.

Aut Candelam ceream accensam sic inuersam ut guttæ ab ea adhuc vrentes, & flammam secum trahentes, supra verrucam aut clauum cadant, admouemus.

Vel Sulphureo bacillo, aut Papyro, uti in usu habent, ad ignem excitandum accenso, hoc simili modo moliendum: Muniendo in circuitu partem ne vratur, prius emplastro, uti dictum, vel plumbi laminâ tenui, illic ubi verrucæ incumbit percussâ, aliâve arte, tunc, cum hoc modo vel priori verruca aduritur.

Quod & hoc modo fit: Si Nucis semiputamen verrucæ amplitudine perforetur, atque verruca huic foramini intrudatur, ita ut in caua illius sede conspicua sit, postea puluis Sulphuris illi inspergatur, eoque accenso tamdiu, donec vicina pars sentiens dolere incipiat, retineatur tuncque primum abijciatur.

Secamus varijs modis, vel Incidendo aut Scarificando hæc, ut remedia adhibita citius & melius vires suas possint exerere.

Vel abscindimus de illis acutâ nouaculâ sensim superficiem, procedendo eousque, partes sensiles attingendo non amplius perferre possint, quod fit, ut quod reliquum superest, melius quoque medicamenta auferant. Vel etiam, si præsertim ad viam carnem usque hoc fiat, ut sic penitus auferantur; Vrendo postea ne rursus recrecant valide siccantibus, vel Plumbi laminam illis adligando.

Filo sericeo, vel Setâ, si pensiles sint, vel alias vinciri queant, eas circumdantes & stringentes; ligamus, ut sic alimento destitutæ arecant & secedant.

Extrahuntur etiam subito cum suis radicibus, verrucæ aliquæ prominentes, arte quadam & industria, ab huius rei peritis circumforaneis ferè, vnguibus vel alio instrumento, quas prius aliquo vnguento in-

ungunt, quod tanquam magni usus esset in varijs morbis, populo quæstus causâ venale proponunt, ut hac ratione commodius fucum facere plebi possint.

Exhibita quædam verrucas abigere creduntur, vi quadam occultâ & proprietate: Veluti Cichorium verrucarium, nomen tale proin sortitum, in Acetarijs comestum: Item Clinopodium.

Semè itidem Cichorij verrucarij 3. j. pondere ante somnū aliquot diebus sumptum.

Contactu solo verrucas abigi, si totidem Ciceres, quot sunt verrucæ, sumantur, & singulæ verrucæ tangantur, posteaq; linteolo inuoluti, post tergū, lunâ nouâ projiciantur, docet Dioscor. Vulgus sic usurpata pisâ, postea in ignem conijcit: Alij aliter hæc cum pisâ fieri docent.

Vari seu Ionthi, id est extuberantiæ seu pustulæ duræ caput occupantes, tã faciem quam pilosas sedes, Psyraciæ tunc dicti, valide detergentibus, permiscendo nonnunquam & mollientia quædam, & nisi iuuent, etiam erodentibus & causticis curari debent.

Qualia eiusmodi & leuiora & fortiora & validissima remedia, in maculis pertinacibus, vitiliginib. alijsq; capite de discoloratione varia fuerunt descripta, quæ inde peti possunt. Vti & quo pacto corpus prius præparandum & purgandum sit, illic quoque propositum.

Præter quæ varos admodum dissolunt sequentia: Axungia Anseris, Lupi, Cati, & imprimis Thymali piscis illitæ.

Pinguedo item quæ ex Linteo panno dum vitur, exsudat.

Aloës vel Gummi Fœniculi cum Aceto squillitico illita.

Vel: R. succi Lapathij 3. iij. Aceti squillitici 3. j. gummi Ammoniacy dissol. in Aceto 3. 6. Boracis 3. iij. Salis vel Alumin. 3. j. misce.

Valde conueniens: R. succorū foliorum Cæparum, Porrorum & Scabiosæ ana 3. 6. Saponis mollis 3. j. gummi Ammoniacy dissol. in Aceto 3. ij. Myrrhæ, Aloës ana 3. 6. pulueris foliorum Pulegij, Hyssopi, sem. Ocimi ana 3. j. Salis communis vel Nitri vel Aluminis 3. j. Boracis 3. 6. Chalcanthi 3. j. fiat linimentum.

Vel R.

Vari cutis.

Vel: R̄. rad. Lapatij & Enulæ incisæ, decoque in aceto, postea contunde, adde Boracem, Aloën, Thus, Os sepia, vel fortiora etiam.

Vel: R̄. foliorum Pulegij, Hysopi aut Agnicasti exiccat. ana 3. j. farinæ Lupinorum vel Orobi 3. ij. Salium vel Salforum succorū prædictorum aut Boracis 3. j. β. Thuris 3. β. Cum oleo Sinapis vel de Frumento aut A-xungia Thymali, fiat vnguentum.

Vel: R̄. Farinæ Lupinorum 3. ij. farinæ Orobi vel Lentium 3. j. sem. Melonum ex-cortic. 3. ij. sem. Raphani 3. j. radic. Ireos 3. ij. Salis ammoniaci 3. j. cornu Cerui vsti 3. β. in-corporentur cum infus. gūmi Tragach. fiant trochisci, dissoluendi in lacte, ad vsum.

Illicitio ex Fellibus piscium, addito Om-phacio, Melle & Saccharo, varos admodum discutit.

Si è Pfydracis ichor emanat, Lithargy-rium nutritum in aceto & Æris squama, aliaque siccantia, in scabie exposita, inunctio-nibus adduntur.

Erodentia & Caustica in maculis descri-pta, extrema in hisce duris tuberculis sunt remedia.

*Horde-
ls &
Grandi-
ni cura-
tio.* Hordeolum, tuberculum durum palpe-bræ inferiori verrucæ instar adnatum, atque illud quod Grando dicitur, in superiore pro-diens, eadem ferè ratione, vti de verrucis di-ctum, curabitur. Applicando ea, quæ eas absumere posse diximus, sic tamen accom-modando, vt huic solum parti hæreant, nec oculum subeant, eumve, si fortiora præfer-rit sint, lædant.

Præter quæ in hisce tuberculis cōueniunt etiam sequentia admota, nimirum gummi Ammoniacum vel Serapinum, emollita & super corium deducta.

Item Muscæ, ablatis alis, & Formicæ, cū Cera vel Resina mista.

Fæx Vini, Vitreolum cū Melle vel Cera.

Calx cum tertia parte Vitreoli & Tere-binthina.

Adurere quoq; possumus ea, si nil iuuat, sed oculum diligenter muniendo, cū hæc adhibentur tam potentia quàm actu id præ-stantia, vti in verrucis dictum.

Scarificare quoque ea licet: Alio verò mo-

do ea abscindere non satis tutum: Vt neque per vim velle ea euellere.

Filo itidem ea, si commodè licet, ligare possumus, vti verrucas, sed sensim stringen-do, ne dolor inflammationem pariat.

A' Lacte profectæ mamillarum extube-rantiæ & tumoris cura, aliàs cū spōte ple-runque cesset, non suscipitur. Quod si verò adeò vrgeat, vt metus sit inflammationis, tunc cura eò maximè dirigitur, vt prouen-tum lactis & influxum illius in mamas im-pediamus, atque genitum ex parte absuma-mus: Vel illud educamus.

*Mamil-
larū tu-
moru à
lacte co-
rario.*

Si verò concretum, tumorem collectum & duriorem gignat, eum quoque discutere & absumere studebimus; si in abscessum ve-rò vergat, maturare, aperire, vlcusque inde natum, vt in abscessuum & vlcera cura di-ctum, sanare. Quod si verò ex hoc illòve tu-more inflammatio sequatur, illa vt in cura phlegmones in doloribus dictum, curanda.

Impedimus lactis prouentum, Victu te-nui, Euacuationibus per sanguinis missio-nem & purgationem: Propinandoque quæ vt semè ita lac absumunt: Vti est Agnus ca-stus & semen Rutæ.

Influxum, reuellendo & deriuando aliò sanguinem, sistimus; Sanguinis missione è brachio vel pede, si præsertim mulier in par-tu non rectè purgata fuerit; Aliisque quæ menses promouent, Scarificatione, Cucur-bitularum applicatione in scapulis, supra ge-nu, Frictionibus aliisve.

Repellimus sanguinem influentem To-picis, quæ supra venas cutaneas conspicuas, ad mamillas ab axillari descendentes, & in ambitu mamillarum glandularum potius, quàm supra medium illarum ponimus, cū lac si illic concrederet, repelli amplius mi-nimè posset. Verùm & extra mamillas, vbi venæ ab axillis descēdunt, eadem etiam ap-poni poterunt.

Applicantur autem emplastra repellen-tia, defensiva dicta, ex bolo parata, qualia in phlegmonis cura præscripsimus, & in oculo-rum doloribus, si à fluxione fiant, in fronte, temporibusque applicata, defluxiones sistere docuimus: Vel alia etiam ex aliis pa-rata repellentia, descripta iisdem in locis,

quæ & in ambitu, vti diximus, circumponi possunt.

Præcipueque ea quæ mammarum incrementum adstringendo, impedire, in eo casu descripsimus; hîc quoque idem præstare, in lactis adfluxu prohibendo, queunt.

Quod & Epithema ex aqua rosarum, aceto rosac. & Alumine faciet, additâ etiam ad penetrationem magis quàm refrigerationem, Camphorâ.

Resoluimus lac retentum in venis, exicantibus & digerētibus supra mamillas vndique appositis, si distentæ sint, sin tumor collectus in illis appareat, supra eum, quæ & lac abundans & concretum nonnihil aliquo pacto absumere possunt, si non omnino à natura derelictum sit, cum tunc, vti dictum, facilius maturatione in pus conuertatur.

Hoc autem præstant Mentha inprimis, dein & Calamenta, & Apium, Coriandrum, Vitex; Item Absynthium, Marrubium, Baccharis, Ricinus, Epimedium, Ruta, Eruca, Chelidonia, Caules, Sicla, folia Bryoniæ, radix Nenupharis, recentia contusa, vel prius in Vini & Aceti partibus æquis, & Mellis tertiâ parte cocta, & cataplasmatibus instar applicata.

Vel aliud quod ex Pane triticeo vel Furfure, farinis Fabarum, Hordei, Lentium, Lupinorum, Orobi, Fœnogræci, similiter coctis paratur, additis interdum simul & herbis, & permiscendo oleum Anethinum, Chamomelinum, Liliorum.

Vt exempli gratia: R. radic. Althææ, Liliorum ana ʒ.ij. herbarum Mentæ M.ij. Absynthij, Chelidonij ana M.j. florum Chamomillæ P.j. coquantur in Vino, Aceto & Melle vt supra; contundantur, permiscendo farinam Fabarum & Hordei, vel etiam aliarum ad ʒ.iiij. olei Anethini, pinguedinis Anatis ana ʒ.ij. fiat Cataplasma.

Vel sic: R. Farinæ Fabarum & Lentium ana ʒ.iiij. coquantur in Aceto & Mellis tertiâ parte, addendo Menthæ siccæ ʒ.β. Absynthij sicci ʒ.ij. feminis Cimini ʒ.β. feminis Vitis, florum Chamomillæ ana ʒ.ij.β. Storacis liquidæ ʒ.β. Croci ʒ.j. olei Anethini ʒ.ij. fiat Cataplasma: Cui coagulum hœdi ad ʒ.vj. ad lac dissoluendum, si concretum sit, addunt.

Aliud: Panis distemperatus in aqua Portulacæ & Saluæ, addendo Mel pro Cataplasmate.

Sunt quæ Panem in aqua Mentæ, Saluæ, & Portulacæ diu macerant, tandemque applicant.

Supra papillam radicem Chelidonij maioris contusam, positam, lac concretum dissoluere dicitur.

Cicutam lac extinguere docet Dioscorid. quam & mammarum incrementum prohibere, vti & alia narcotica, illic docuimus, vitanè non refrigerant, sed potius admodum discutiente, qualè ipsis inesse, aded vt etiam duros tumores dissoluant, multoties iam declarauimus.

Vnguenta ex succis enarratarum herbarum parata, additis nonnunquam & oleis, vt de Mentha aliisque, lac quoque absument, & concretum dissolunt. Quale hoc est: R. succi Apij, Menthæ ana ʒ.ij. Aceti ʒ.j.β. Mellis ʒ.ij. coquantur parum: Pro illitione.

Vini facem cum aceto mistam, inunctam probat Diosc.

Fotus cum spongia vel panno linteo, in decocto herbarum prædictarum, admodum quoque conueniet.

Vel factus ex Vino generoso, vt Maluatico, addito etiam paucis Croco.

Educimus lac redundans per viam illi destinatam, suctione per infantem, qui si non sufficiat, plures adhibendi, vel hoc, alia quædam mulier faciat, vel ore proprio, aut instrumeto suctorio in hunc vsu fabricato. Si hoc ob papillarum defectum fieri nequeat, ea quæ in amissis papillis & lactationis defectu dicta sunt, facienda erunt.

A sanguine prosectorum tumorum curæ, debetur primùm hisce qui à sanguine Venarum prodeunt, Varicibus, Cirrocelæ, postea huic qui ab arteriarum sanguine enascitur Aneurismati.

Quod verò aliam ventris extumescentiam attinet, quæ citra conceptum in foeminis, ac si grauidæ essent, à menstruis retentis proficiscitur, quia & illa plerunque cum larga sanguinis per vterum profusione finitur, in reiectis quoque, cum de hæmorrhagiis per sinum vteri factis agemus, quo pacto in casu hoc

Ventris
extume-
scencia
citra con-
ceptum in
foemina
cura.

341
 fu hoc procedendum fit, explicabimus.

Varicum
 curatio.

Varices in quibus venæ maiores seu tumentes & distentæ à sanguine, conuolutæque in cruribus plerunq; se offerunt, si mulieribus grauidis accidunt; plerunque vbi pepererunt, rursus sponte subsident. Si permanentes sint, in vtroque sexu, nec aliter molestant, non adeò ipsorum habetur ratio; Si verò pruritu doloreque continuò vel sæpe diuexent, vel vlcus quod ab ipsis varicosum dicitur, gignant, tunc eos curare oportet, cum quamdiu perseverant, vlcus sanari nequeat, sicuti in vlcere varicoso hoc ostensum fuit.

Cæterum in curatione, primùm plethoræ & cacochymia sanguinis habetur ratio, quæ Venæ sectione & purgatione ante omnia emendare oportet, sicuti in variis ab iisdem causis pronatis affectibus, quo pacto hæc instituenda sint, fuit demonstratum.

Admotis dein quibusdam sanguinem & illuuiem venas distendentia, reprimere atq; absumere nitimur: Idque lotionibus vel fotibus ex decocto facto in aqua Fabrorum vel Lixiuio, vel Vrina, radic. Filicis, Cirsij, fol. Agrimoniae, Lauri, Caulium, florum Rosarum, Sambuci, Lauandulæ, Nucum cupressi, Prunorum sylvestrium, sem. Lupinorum & Caulium, addito Sale vel Alumine: & cum validius adstringendum, etiã Vitreolo.

Vel hac fomentatione aut epithemate, quod R. Gypsi vsti ʒ. iij. Boli rubri vel alterius terræ pinguis ʒ. i. β. Acaciae vel Hypocistid. vel Prunorum sylu. siccorum ʒ. j. Sanguinis draconis ʒ. vj. Myrrhæ ʒ. β. Aceti fortis tʒ. j. β. Lixiuij tʒ. iij. Misce: potest & parum Salis vel Vitreoli addi.

Ligaturâ influxum cohibemus, eumque reprimimus: Quæ sit Fasciâ crus vel partem varicosam inuoluendo, & ab imo sursum, vti in cedemate dictum, eam ducendo, sensimque stringendo, idque vel tantum, vel simul totum præmittendo. Vel fasciam in fortum ad faciendum, expressamque vsurpando, quæ vires inde aliquas assumit, maximè si in decocto prunorû sylvestrium prius mersa fuerit; Vel succo illorum aut Agriotarum imbuta.

Sectione quandoque venam ex varicibus

magis turgentem, & quæ ad vlcus quod fouet, per pedem deducitur, exscindimus, idq; maximè cum vlcis sanationem impedit, vt sit vlcus, sicuti in vlcere varicoso dictum fuit, curetur; cum si vlcus absit, ipsaq; venæ solùm appareant, hoc non facile fiat, præsertim cum plures, non sine magna offensâ & periculo exscindi possent: Vti & sanè eas alioquin secando solùm aperire, cum admodum turgent, non satis ob hæmorrhagiam, quæ magna metuitur, tutum est, quod tamen aliqui faciendum docent; cum maiori commodo in altero crure, vena ad sanguinis ex crure affecto reuulsionem, fecerit; Cæterum quando venam varicosam vlcus fouentem exsecare volumus, primùm ductus illius ab vlcere sursum aliquousque vergens, lineâ ductâ notatur, & secundum illius longitudinem, cutis acuto incisório aperitur, venaque denudatur, postea sanguine deorsum frictione propulso, venæ superior sedes vinculo excipitur, & sub eo in longum, vt sanguis effluat, diffecatur; Dein in infima illius sede, vlcere proximâ, denuò vincitur, illiusque portio inter duo vincula penitus exscinditur, vt sic via per quam influxus fiebat, intercludatur: quo facto, postea vlcus sanatur.

Venulæ aliæ minores varicosæ, in scroto testium, alis pudendi mulieris, palpebris, vel alibi in cute apparentes, cum non multum obsint, non adeò curam aliquam requirunt. Si tamen in illis quoque auertendis & minuendis aliquid tentare velimus, reuellendo sanguinem ab hisce sedibus, eumque repellendo & discutiendo, vti ferè in inflammationibus, nisi quòd adstringentia hîc non adeò refrigerare debent, ne sanguis coaguletur, aliquid moliri possumus.

Cirfocele in qua venæ spermaticæ intumescunt, nisi seminis prouentui incommodet, ferè negligitur, cum difficulter aliâ ratione, quàm per castrationem auferri possit, quæ tamen vix nisi sarcocelæ instar in immensum excreseat, & pro sarcocèle sumatur, tentatur. Possumus tamen antequàm eò deueniamus, si seminis prouentui incommodet, fomentationibus aliisq; adhibitis in aliis va-

Cirfocele
 ratio.

ricibus' expositis', hinc quoque aliquid, si forte succederet, experiri.

*Aneurisma
curatio.*

Aneurisma, id est tumor ex arteriæ apertione, illiusque sanguinis sub cutem effusione factus, iam aliquousque progressum, curam vix dum amplius admittit, cum adstringentibus sanguis ille minimè possit repelli, vel arteriæ osculum in profundo plerunque lærens, occludi. Nec hinc aliquam apertionem facere villo modo licet, cum ægrum ob largissimam hæmorrhagiam, quæ inde sequeretur, & quam compescere amplius, impossibile esset, in apertissimum mortis periculum conjiceremus. Ob quam causam, si non à principio validè repellentibus, atque osculum arteriæ glutinantibus, in hæmorrhagiis expositis, aliquid præstemus, postea relinquendum, nisi ligaturâ aliquâ, vel plumbi tenui laminâ, tumore hunc ne adeò protuberet, continere aliquo pacto velimus.

Quod internum Aneurisma concernit, cum non tumorem apparentem extrinsecus, de quo hic agimus, producat, sed cordis palpitationem, in eo affectu, uti & de cachexiâ, in quo etiam hi affectus interdum concurrunt, quo pacto gubernari debeat, ostensum fuit.

A femine profectarum Intumescentiarum, illa quæ naturalis est, ventris, in gravidis mulieribus, à fœtu proficiens, curationem non aliam, quam ut rectè gubernetur mulier, viuidusque maneant fœtus, nec ante tempus illa abortiat, exigit; Sicuti in partu intempestivo, seu abortu quomodo ille præcaueri, decenti mulieris regimine debeat, declarabitur.

*Ventris
extumescencia
in mola
curatio.*

Præternaturalis, verò ventris, intumescencia, quæ in gravidis mulieribus, non à fœtu, sed mola prodit, cum non adeò certò causa cognoscatur, donec mola rejiciatur, cura in reiectis potius explicanda erit.

*Tumoris
origina-
lis cura.*

Tumores verò alij particulares, qui à semine profecti, ab ortu processerunt, ut sunt Sarcomata quædam, Glandulæ, Strumæ, aliive tumores, cum nō aliam curam, quam eam ipsam, quam in aliis ipsorum causis, exposuimus, requirant, hic eam.

reperere non erit
necesse.

DE

DE

DE F O E D A T I O N E.

CAPVT IV.

Genera.



DEFOEDATIONIS nomine intelligimus Lues illas, quæ pluribus simul vitiis illisque contagiosis corpus defœdant contaminantque adeò, ut qui hisce infecti sunt, à consortio hominum sanorum relegentur, eorumque consuetudinem vitare cogantur. Huius autè defœdationis seu Luis duo potissimum occurrunt genera. E quibus vnum non nouum, sed antiquum semperque cognitum, Lues elephantica: aliud nouum, Lues venerea dici potest. Pluribus vitiis corpus in illis dedecoratur, partim vtrique lui communibus, tuberculis, pustulis, vlceribus, pilorum destitutio: partim quibusdam priuaris; uti & aliis insuper malis, cuique lui propriis, tum in functionum læsionibus, tum doloribus.

Præter illa sunt & lues aliæ, quæ nostro hoc seculo primum innotuerunt, corpora pluribus vitiis quoque defœdantes, certis regionibus peculiare, & contagiosæ, inter quas magis cognita scriptisque mandata est lues Stomacace dicta, Septentrionalibus populis frequens, quam & hic describemus, aliis reliquis, qui eas cognouerunt, describendas relictis.

Lues elephantica, Elephas vel Elephantiasis communiter appellatur, ob similitudinem, quam, qui hac infectus est, cum elephanto in multis habere dicitur: nos verò quòd aures ipsorum patulæ & latæ, alarum instar factæ, elephantis aures aliquomodo exprimant, sic denominatam potissimum fuisse credimus, licet alij alias quoque denominationis causas adferant. Hanc lepram communiter, eaque correptos, Leprosos, ob cutis scabritiem, quæ lepra Græcis dicitur, Arabes vocarunt, indeque nomen hoc in vsu mansit. Dicitur & à vultu truci, quando leonis faciem representant, Leontialis, & cum luxuriosi nihilominus sint, Saryriasis; Germani

*Elephan-
tica lues,
seu Ele-
phanta-
sis.*

*Lepra
Arabum
Matæp
vel Lupi
sag.*

mani

345

mani hunc affectum *Malacty* nominat, à malitia huius morbi meo videre, potius quam à Malacia nomē hoc mutuantēs, licet sic quoque aliqui hunc morbum nominare voluerint, fortē eandem ob causā, quōd molli-
ties in hoc affectu, quæ græca malaciæ voce significatur, nulla præualeat. Proprio idiomate, eum *Xussey* & eos qui hoc patiuntur, *Xussey* quasi Relegatos, cum ab aliis separari soleant, appellant.

In hac lue diuersa accidentia se offerunt, quæ, cum ex iis, quomodo comparata sit, & quæ ratione se habeat, cognosci possit, eò diligentius erunt indaganda, & describenda, cū examinibus, ob hanc luem suspecti, magistratus etiam iussu, si illa subterfugere velint, subijciantur, vt si infecti esse deprehendantur, maturē à sanis, ne ipsos inficiant, ad loca separata illisque destinata relegentur. Quæ censura vti ritē fiat, nec vtī sæpē sit, qui tales minimē sunt, pro elephantiscis habeantur; neque qui reuera elephantici sunt, sani iudicentur, è quibus erroribus, prior ægro relegationem, alter sanis periculum contagij accersit; Nos qui censuræ & iudicio plus quam sexcentorum, de hac lue suspectorū, annis triginta & aliquot præsumimus, primū vitia quibus corpus illorum contaminatur, postea actionum quarundam læsiones proponēdo, reiectaque examinando, quomodo ex illis lues dijudicanda, bonā fide recensēbimus.

Vitia externa quibus corpus ipsorum impeditur, potissima in capite & artubus occurrunt, vnde & inspectores hæc ferē tātūm loca, vix dum reliqui trunci corporis alia aliquā parte nudatā, perscrutantur, atque inde certiora huius luis indicia desumunt; In artubus, manus & pedes ipsorumq; digitos, illisq; adnatos ungues, vtī & tibias supra genu ad femora, cubitum supra ipsius flexurā ad humerum vsque. Vt & in capite os, oculos, nasum intus forisque, reliquamque faciem, auresque & pilos in capite, superciliis, ciliis, barbā, & in iam enarratis locis, tumores, vlcera, aliaque vitia iam enarranda, diligenter inspiciendo, perquirendo & examinando: vt ex illis vel solis, si sufficiant, vel pluribus simul coactis, hæc lues iudicetur,

eaque ratione, sicuti nunc in singulis declarabitur, primū ab illis quæ pathognomica sunt, initio factō.

Tubercula quædam in elephantiscis plerunq; occurrunt, per faciem atq; artus disseminata, in facie frontem & genas opplentia, horridumq; aspectum præbetia, illicq; hunc morbum primū prodentia; & in brachiis manuum summitatem cubitumque, in pedibus femora potissimū occupantia. Ea cum impelluntur, loco moueri possunt, doloreque carent, & liuore ad rubedinem aliquam, in facie præsertim tendunt, instar tuberculorum in cancro protuberantium, vnde hanc luem fortē Cancrum generalem appellant. Eiusmodi pustulæ si adsint, siue v-
Cancer generallus.
nā pluribusve in sedibus, plures paucioresve apparentes, elephantiasis certa sunt indicia, quæ nisi compareant, non facile hanc luem esse, nisi alia plura signa concurrant, est affirmandum.

Sunt & alia tubercula hanc luem comitantia, quæ ore hiante, linguā depressā in palato, & faucibus citra radicē linguæ, plura plerunq; alias pauciora inueniuntur, nunc flauescencia, nunc subliuida, inter signa elephantiasis pathognomonica referenda. Qualia etiam ab hisce non admodum discrepantia, in porcis frequenter visuntur, porcisq; ob id omnibus ferē antequam mactentur, faucis à certis quibusdam ad id deputatis laniis vi diductæ inspiciuntur, quibus deprehēsis, leprā infectos porcos, quam *Sinne* vocant, existimantes, ab eorum esu
Sinne / porcorū lepra.
abhorrent.

Vlcera quandoque in elephantiscis inueniuntur, & præcipuē in pedum digitorum interstitiis & platis, in crassa illic & dura cute, dein & in manibus; item iuxta cubiti articulum in acutiore illius præsertim sede, aliisq; artuum locis. Quæ vlcera cutem veram penetrant, & rariū vterius feruntur, sed lata sunt, labiisq; callosis vel prætumidis constant, sanguinemque si lædantur, facile reddunt, carcinomatum omnino instar; vnde & non solum quia tubercula ipsorum, vti dictum, cancerum diuini integer adhuc est, referunt, sed & quia vlcera hæc eundem cancerum repræsentant, eò magis cancerum

vniuersalem elephantiasim vocatam putamus. Hæc quoque vlcera dolorem nullum, quod peculiare his vlceribus accidit, etsi tangantur & nonnihil molestantur, inferunt, vti nec tubercula: vnde forte sinistra hæc opinio, illos sensu tactus omni carere, nata est. Dein & serpunt hæc vlcera, aliq; in loco rursus erumpunt, sanatis prioribus. Ex quibus vlceribus solis, si recte cognoscatur, de hac lue certi quid pronūciare possumus, sed longè rectius, si cætera quoque, vti ferè fit, consentiant. Qui hisce affecti sunt, vt suspicionem lepræ declinent, ab visione ipsis euenisse, solent prætere, cum ambustorum vlcerum cicatricibus, illorum relicta vestigia, ex parte respondeant.

In narium interioribus Vlcera interdum etiam inueniuntur, hisce quoque deteriora, quæ narium septum, fungosaq; illarum ossa exedentia, vt nasus turpiter collabatur, efficiunt, vlterius quoque ad narium amplitudinem serpentina, illa loca depascuntur, palatumq; aliquando perforant, columellam absumunt, indeq; nonnunquam in fauces vsq; pertingūt, & si in asperam arteriam descendant, exitium illis procreant; vti & si in aliis sedibus narium aut faucium, loca illa grauius lædant, mortem accerfunt.

Tumidæ insuper aliquæ in illis partes reddita, hunc affectum demonstrant, inprimis Auriū pinnae in ambitu, vti & auriculæ, quæ plus solito crassescunt, alias etiam admodū intumescunt & latescunt, vt sicuti dictum, elephantum hoc pacto repræsentantes, Elephantes vel elephantici dicantur. Eodem modo Narium alæ augentur & dilatantur, & in immensum sæpè excrefcunt, vnde facies, cuius pulchritudo non parū in deceri nati figura consistit, turpis admodum apparet, eoq; magis, si nasus in medio hac alarum vtrinq; protuberantiā, collapsus & depressus, vti ferè fit, existat, foueamq; instar valli, inter duos illos monticulos efficiat, naresq; resumæ simul fiant. Quæ vitia non solum decorant, sed & cum nares simul occlusæ sint, respirationi, vti dicetur, obsunt. Intumescunt insuper ipsis præter tubercula, faciei, reliquæ partes: Vti & tandem palpebræ, adeo vt inuertiæ pterygij instar, interna ru-

bra ipsarum sedes prominēs, trucem aspectū pbeat: Dein & manus & pedes in ipsis veluti inflata apparent, cū reliquū corpus alioquin consumatur & tabescat: vti & nonnunquam illæ quoque partes similiter marcescunt.

Pellicula in oculo nata, si cæteris accedat signis, magnum huius affectionis argumentum erit. Quæ albo oculi iuxta canthum illius maiorem sensim accrescēs crassescens, que & carnosæ facta, tandem supra pupillam protensa, eandem attingens, visionem lædit, vel obtegens cæcitatem, vti in visus latione dictum, infert.

Scabra & aspera leproforum alioquin est cutis, tum vbi nuda in pedibus, manibus, facie & auribus se offert, tum maximè in capitis pilosa sede & superciliis, vnde tandè furfures & squamulæ, nunc albæ, nunc liuidæ, nunc subnigræ decidunt, nullo vel exiguo cum pruritu. Finditur quoque certis interdum in locis cutis, præcipuè in manibus, duraque & callosa fit. Ungues itidem finduntur turpiterque curuantur, atque vngularum instar quandoq; crassescunt. Scabies alia, sicuti est sicca illa & foeda, quam Mager vocant, vel illa quam Psoram nominant, etsi, quia vniuersum corpus contaminant, elephantiasim saltem caput & artus inficiente, magis hac hominem defœdare videantur, posteriorque illius species, quam psoram deterrimam vocauimus, lepra Græcis dicta, deploratus quoque interdum sit affectus, eoque nomine falsò sæpè pro elephantiasim sumatur, sicuti in psora explicatum fuit, tamen cum nondum sit ille morbus, ab eo erit distinguendus, nec lepra illa Græcorū, lepra Arabum, quæ vera est elephantiasis dicenda, nisi alia illius signa certiora huic quoque copulentur.

Pilorum accedit insuper in hoc malo casus, qui passim decidunt ac desuunt; Tum in capite, quod hinc inde areis ductis caluescit; Tum in mēto, vnde barba illis vel planè excidit, vel rarefcit; Tum in palpebris, quæ superciliis & ciliis decedētibus glabræ fiunt.

Color alienus aliquid adiumenti ad cognitionem huius mali adferre potest, qui non amplius in illis viuus, sed ab eo declinans, cute plus iusto aibescēte seu pallente, vel flau-

fluascente aut subnigricante, tenebricofo colore apparet; præsertimq; facies in illis, vti & oculi rubent vel liuent. Magnū quoq; indicium habetur, si Venæ sub lingua, quas, eam ad superiores dentes reflectente ægro perscrutantur, plus solito nigricare & tumere, varicosarum instar conspiciantur; in quibus tamen, cum non magnam fieri mutationem toties deprehenderim, exigui momenti hanc obseruationem esse existimo.

Functiones in hac lue ab initio, nisi aliud accedat, nullæ ferè læduntur; ob quam & causam cum nec dolor eos vrgeat, licet vestigia aliqua huius affectus appareant, eum negligunt, donec signa illius magis conspicua proferantur, quibus admoniti, seriùs huic malo obuiam ire tunc primùm conantur. Quo tempore cum vitia enarrata externa admodum increcant, & ob id partibus quibusdam incommodè, in operationibus defectum aliquem patiuntur: Præsertim in respiratione, quæ non solum ob nares occlusas, vti dictum, illic intercepta est, ita vt ore aperto spiritum ducere cogantur, sed etiam propter vlcera & tubercula in faucibus nata, sicuti quoque ostensum, sic deprauatur, vt vox inde rauca edatur, vel si amplius noceant, adeò impedita & difficilis fiat, vt æger in suffocationis periculo versetur, quæ & aliquando vitam finiunt, cum aliàs cæterorum vitiorum causâ diu, vti accidit superuiuere possint, nisi vlcera faucium etiam alias læsiones adferendo, illos enecent.

Sed & sensus aliqui in huius morbi progressu læduntur: Veluti visus, qui crescente pelliculâ in oculo, sicuti declaratum fuit, hebetatur, eaque ampliata, penitus amittitur. Tactus sensum adeò aboleri in elephantiscis, adeoque cutem stupere, vulgò creditur, vt dolorem, etsi ea grauius impetatur & lædatur, nullum sentiat, & proin vnum ex documentis, quibus an elephantici sint, explorare solent, hoc statuunt, si re acutâ aciculâ vel acu puncti, vel aquâ feruente perfuncti, minime afficiantur. Verùm hoc non semper, vel in omnibus locis accidere, experientia ipsa comprobatur, cum in certis solum quibusdam locis, & pedibus præsertim tumidis, & iam diu longoque tempore vitiatis, calo-

requè omni, qui contactu deprehendatur, destitutis, & frigidis ac veluti e mortuis hoc euenire possit, vt illic compuncti, etiam ad profunditatem aliquam vsque, sicuti expertus quoque sum, vix dum aliquid, aut nihil etiam sentiât, nec cruor, sed aquosus ichor, vt in alphis pûctis euenit, promanet. Quod fortè occasionem præbuit, etsi rariùs hoc accidat, vt in omnibus elephantiscis, idem euenire, eosque externas iniurias minimè sentire, crederent; nisi fortè ex eo quod vlcera eorum & tubercula indolentia, vti dictum, esse viderent, reliquam cutem quoque insensibilem esse, collegerunt.

Quod reliquas functiones attinet, nisi diuturnitate morbi vires tandem deficere incipiant, munia sua nihilominus obire possunt, cæterasque actiones perficere, cibum appetere, eundemq; concoquere & digere, sanorum instar, quem & proin, si pauperes sint, mendicant. Dein nec incitamentū venereum in illis extinguitur, cum luxuriosos eos esse, exempla multa, cômissorum huius causâ facinorum, hoc satis comprobent, quod etsi alijs causis adscribant, nos, quia ab vxoribus segregati vitam agere coguntur, nec eas attingere audent, hoc ipsis euenire putamus. Sed nec procreationem liberorum in ipsis cessare, inde videre licet, quòd grauidas sepe, cum relegantur, vxores relinquant, etsi iam diu prius elephantiscos eos fuisse, constet: dein & quòd si præter leges scortentur, mulieres aliquando impregnent; vnde elephantiscos similes sibi procreare, scribitur.

In excretis quoque nihil singulare, quod hanc luem demonstrare possit, deprehenditur; cum tamen ex sanguine vel solo, elephantiasim cognosci posse, plerique medici & chirurgi doceant, & vulgus huic signo tanquam certissimo, plus quam cæteris omnibus tribuat, eoq; nomine ab omnibus, qui examini subiiciuntur, sanguinem e vena secta detrahant, eundemq; dijudicent, & si, vti docent, ater vel liuidus aut scaber & veluti arenosus sit, ex eo elephantiasim esse pronuntiant: Alij verò eundem percolantes, vermiculos aliquos in eo perquirunt, illosque huius luis certum indicium esse volunt.

Alij experientiâ quādā in sanguine factâ hoc explorare nituntur; nempe si sal calens sanguini iniectus, minimè dissoluatur; vel acetum perfusum illi non commisceatur, luis huius signum certū asseuerant. Verūm nōs qui superioribus triginta & ampliū annis, plurimorum hac lue infectorum sanguinem diligentissimè inspeximus, obseruauimus & tentauimus, sanctè testamur, neque nos neq; nobis adiunctos chirurgos, ex sanguine quicquam certi quod elephantiasim denotaret, vnquam deprehendere potuisse, sed vel sanorum sanguini similitimum, vel si ab eo recessisset, non plus mutatum, corruptum aut infectum, quàm in febre aliqua vel ictero, aliōve morbo accidere solet, fuisse. Quod & de vrina ipsorum, cuius inspectioni plurimū vulgus tribuit, verè pronuntiare possumus: Vt & de pulsu, cuius mutationem aliquam inquirere, est nodum in scirpo quærere.

*Veneræa
lues.
Neapolitanum,
Gallicum
morbus,
Lues Indica.*

Lues Veneræa, cum inde plerunque hæc contrahatur, dicta, quam aliàs morbum Neapolitanum; Gallicum, quod in ea loca primum peruenerit, vocant, rectius fortè Luem Indicam, appellaturi, utpote ex qua primum prodierit, diuersis quoq; & pluribus vitijs non minùs quàm elephantiasis, atque aliquibus illi similibus, corpus contaminat, & foedum, ægrumq; ac aspectu horrendum, ut illa reddit. Accedit insuper in hac lue aliquando etiam summus dolor, qui si solus occurrat, ad dolores, qui circa ossium regionem versantur, refertur, vbi & in habitus corporis doloribus describitur. Si verò alia insuper accedant vitia, uti ferè fit, raroq; talis dolor citra vnū vel plura cum eo concurrentia, in hac lue se offert, huc pertinet. Huius autem accidentia eò quoq; diligentius sunt recensenda, quod & illa lues contagiosa sit; ut maturè eā cognitā, hac correpti, a sanis separentur, quibus etiā ob id magistratus propria nosodochia, si pauperes sint, quò relegentur, & vbi cura ipsis adhibeatur, destinauit. Præcipua autem accidentia huius luis, sunt sequentia, quorum vnum solam interdum illius genus priuatum constituit, aliàs pluribus simul concurrentibus, cōpositum illius exoritur genus.

Pilorum casus in hac lue frequenter accidit, eamque denotat, uti capillorum capitis, potissimum circa tempora & occiput; item supercilliorum; & in viris barbæ pili, qui si labantur, certius adhuc erit signum, eoque magis si alia quoque huius luis indicia concurrant, licet & si hoc tantum eueniat, hanc luem ostendere possint, quando alterius affectus, in quo quoque pili excidere solent, nulla adsunt signa, & si concubitū cum imundis & suspectis mulieribus fateantur, vel hoc variis artibus ab ipsis extorqueatur.

Maculis quandoque cutis ipsorum hinc inde, nunc certis in locis, in facie, collo, thorace, ventre, circa pudenda præcipuè, nunc per vniversum corpus conspergitur, non tamen attollitur, quæ pulicarum morsus aliàs representant, & rubent, aliàs lentiginum instar obscurè flauescunt seu liuent. Vidimus & sæpenumerò, continuatis maculis eiusmodi latescentibus, amplo spacio curem alicubi commaculatam, frequentius in pectore & dorso, nonnunquam & abdomine, vel etiam aliis in locis, quibus pressis colore alieno refugiente, vestigium pressum albicabat, quod mox ad colorem pristinum redibat. Hæ maculæ vel solæ, si non aliam illarum causam, quàm congressum impurum esse constet, luis huius initium, vel leuiorem illius speciem, sicuti & pilorum defluxus solus, constituunt & arguunt: Quæ tamen alijs insuper accedentibus certiora erunt, morbumque grauiorem esse ostendunt.

Pustulæ eleuatae indolentes, in hac lue aliquando in cute prodeunt, subvibræ vel subflauæ, rotundæ, duræ, & siccæ squamæ seu crustæ obductæ, in fronte, in aurium, narium, faucium ambitu, ac in capillosa capitis sede potissimum apparètes, nec non in collo, thorace, mamillis, brachijs, cæterisque partibus interdum etiam occurrentes; quæ pustulæ hanc luem certò indicant.

Præter quas & aliæ pustulæ malignæ in interioribus locis, ut ore, faucibus, naribus & virilis membri præputio, mulierumque obscenis, oboritur. Quæ pustulæ si præsertim plures concurrant, luem hanc certò produnt, maxime si alia quoq; illius indicia præcesserint vel superuenerint. Infantis

*Luis Veneræa
nunc
genus.*

*Luis Veneræa
nunc
genus.*

*Luis Veneræa
nunc
genus.*

infectis

353

infectis, hæ in ore erumpentes, potissimum illius infectionis signum præbent.

Vlcera, ex enarratis pustulis quibusdam, peruersa ac sordida prodeunt, vti variis, sic frequentius in cutis tenerioribus locis, vt facie, iuxta nares & labia, & in ambitu ob-scœnorum ac podicis: Et in præputio, vlcus illud peruersum, quod Cancrum vocant: In pudendo mulieris, vlcera illic nata; Dein & in vtroq; sexu, vlcera in faucibus, ore, (cujus vlcuscula aphras vocant) naribus, nonnunquam & in podice exorta. Quorum aliqua vltius serpentina, subiectas partes exedunt, atque ossa simul interdum corrumpunt, partibusq; graues noxas, illarumque mutilationem, vel omnimodam amissionem pariunt: Alia in facie nasum depopulâtia, faciem turpem reddunt: Alia labia depascentia, quo minus postea bibere possint, cum forbere potum amplius, quod labijs perficitur, nequeant, in causa sunt; sicuti quendam, cui labia amputata fuerunt, conquerentem audiuius: Alia columellam absumentia, palatum perforantia, vocem raucam, ac veluti per nares efflatam, Cauam dictam, reddunt. Quæ & glandem corrumpentia, ad actum venereum exercendum ineptos vel impotentes reddunt. Sicuti hæc in vlceribus depascentibus, & functionum læsionibus, ab hisce vlceribus prodeuntibus, quoq; exposita sunt. Ex quibus &, si plura præsertim simul prodeant, hanc luem cognoscimus, certius tamen, si alia simul accedant indicia.

Luis Venerea
quartu
genus.

Dolores circa nudam seu excarnem ossium sedem, plerumq; in hac lue se exerunt, in tibijs, homoplata, circa clauiculas in scapulis, in capite maximè circa frontem, & temporibus. Aliquando & in sterno, quod tantum in hac lue dolere creditur. Qui dolores atroces sunt, & versus noctem præsertim sæuiunt, contactuq; exacerbantur, nec anodynis adhibitis, vti alij dolores mitescunt, sed increbescunt. Hi si absq; alijs indicijs hac ratione se offerant, genus huius morbi, in habitus corporis doloribus, quod & pertinet, descriptum, constituunt. Quod si alijs quoque accidentibus iam enarratis iungantur, diuersum ab illo genus efficiunt, & facilius tunc quoque cognoscitur.

Præter hæc & alia accidentia, cum iam enarratis, luem verè constituentibus & significatibus, nonnunquam concurrunt, quæ sola quidem, cum & in alijs affectibus accidere possint, certi quid de hac lue indicare nequeunt, nisi post coitum cum immundis mulieribus euenientia, magnam suspicionem illius præbeant, quod tamen nec tunc quidem, nisi alia accedant signa, indubitanter pronunciare possumus, cum & antequam hæc lues ad nos peruenisset, ex congressu, citra hanc infectionem, bubones venerei, aliaque nunc explicanda accidentia, aliquos corripuerint. Quæ si in lue hac eueniant, mox alia quoq; illius indicia, vt dolor circa ossa, pilorum defluuiû, maculæ postulæ &c, ea comitantur. Sunt autem eiusmodi accidentia quæ tum in hac lue, tum citra hanc in alijs morbis euenire possunt, sequentia, quæ cum alibi exactius descripta sint, nec, si in hac lue prodeant, multum ab illis differant, obiter hoc loco tantum erunt recensenda.

Bubo in inguine Venereus dictus, aliquando mox in huius luis initio erumpit, & rursum euanescit, vel remanens induratur vel suppuratur, nec ab alio bubone venereo citra hanc luem genito, vel simplici differt.

Condylomata in pudendo mulieris, & in podice, tam viri quam femine, alias nascuntur: Quæ eodem modo vti cum si sine hac infectione facta essent, se habent.

Scissuræ in manibus & pedibus, aliquando etiam superueniunt; Cutisque crassa in manuum vola, à subiecta cute interdum abscedens, sine sensu doloris abradi detrahiq; potest. Sicuti etiam sine hac lue, hoc aliquando euenire, alibi descriptum.

Vngues digitorum nonnunquam decidisse, simulq; pilos defluxisse, obseruatum fuit.

Nodi & tuberositates in ea lue specie, quæ doloribus circa ossium sedem, se potissimum exerit, in fronte, nonnunquam alia caluariæ sede, tibijs, alijsq; vbi dolor virget excarnibus locis, si aliquando patefaciunt, sicuti in ea specie, in doloribus qui circa ossa versantur, eo in libro descriptum fuit. Qui non admodum illis absimiles sunt, qui citra hanc luem, dictis in locis interdum oriuntur, sicuti ibidem ostensum fuit.

Purulenta materia nonnunquā maribus præcipue è pene, & aliquādo feminis sponte emanat, atq; indusiū vel lintheamina, subflauo colore commaculat & immunda reddit: Quem effluxū virulentæ cuiusdam materie seu feminis emanatio præcessit, in Gonorrhæa virulenta dicta, quæ & cum lue hac interdū copulatur, aliquādo extra eā accidere solet.

Mictio ardens seu vrens, cum conatu magno & vrinæ stillicidio, vti in aliis affectibus, vbi describitur, ira. & in hac lue nonnunquam offertur.

Quod reliqua attinet in functionū quarundam læsionibus accidentia, cum nō per se ab hoc morbo proueniant, sed ex accidenti enarratorum vitiōrū causā, si ea adeo inualescant, vt illis quoq; incommodent, cum generalia tantum sint, in aliis quoq; diuturnis morbis consueta, hancq; luem nec constituent, nec ab illis signa aliqua certa desumi possint, studio omittimus. Vti & ex vrinis vel sanguine detractō hic aliquid prædicere, vel affirmare cum experientia repugnet, superfluum esse putamus, religioq; nobis est, eiusmodi falsis persuasionibus vulgi sinistram opinionem seu potius stultitiam, omnia ex vrinis patere existimantis, fouere.

Lues Stomacace: quod os potissimum afficiat, à Plinio, vti voluit, cognita & appellata, Scorbutus, communiter in Germaniæ illis locis, vbi regnare solet, vocatur, à Scorbuck Schoorbuyck lingua vernaculā, hoc affectu nominato. Quæ lues, cum in maritimis Septentrionalibus locis primum se patefecerit, sitque contagiosa, non paruum suspicionem mihi mouet, potuisse & illam ex procul disitis regionibus, quas per maria nauigantes hi populi, nostro seculo ad extremos terræ fines vsq; perlustrant, vbi forte familiaris est, contagio, per nautas in loca hæc mari vicina primum peruenisse, vti & lues Indica ab Indis primum in maritima, circa Neapolim loca, translata, toti Europæ innotuit, cum præsertim hæc lues in quibusdam Venereæ non adeo sit dissimilis, & ad eam accedat. Nam & hæc variis vitiis corpus quoque inficit, atque simul actionibus quibusdam incommodat, sicuti iam explicabitur.

Maculæ in cruribus horum erumpunt, exiguæ primum, mox latescentes, ad punctum dein purpureum vel violaceū, tandem nigrum colorem inclinantes: Alias verò tibis amplo spacio, vel etiam vndique & circum circa liuore vel nigrore commaculantur: Interdum maculæ per reliquum corpus quoq; disseminantur. Hæ maculæ quandoque cute illic abscedente, per squamas secidunt, alias subito, ante obitum ferè, euanescent, rursumq; post mortem efflorescunt.

Tument illis gingivæ laxæq; fiunt, & pruriunt dolentq; nonnihil, & cruentæ existunt. Crura itidem illis intumescunt interdum, alias verò admodum attenuantur. Tubercula quibusdam insuper erumpunt, dura in glandulosis corporis sedibus, tum musculorum mediis spaciis, nec non alibi in corpore, nunc indolentes nunc dolorem patientes, ad similitudinem illorum tuberculorū, quæ in glandulis potissimum occurrunt, & peculiarem quandam veluti luem, à Gallis Scrophularum nomine expressam, superius descriptam, constituunt.

Exulceratur etiam postea gingivæ & putrescunt, corrumpunturque, vnde foetidus oris prodit anhelitus, atque illis tandem absumptis, dentium radices nudæ apparent, dentesq; nonnunquam vacillant: vti & in Herpete gingiuarum, quem cancrum illarum vocat, accideret, in oris dolore descripsimus, vbi & Scorbuti, quatenus hanc sedem afficit, meminimus. In tibiis vlcera sed rarius nascuntur, quæ cacoëthie sunt, adeoq; putrida & gangrænosa fiunt, vt omnem sensum amittant.

Tensio & contractio seu rigiditas in cruribus, maxime circa furas, quoq; mox superuenit, cum leui dolore & punctationibus quibusdam in plantis pedum, quod etiam illos, quod minus stare nec incedere possint, cohibet: alias & venæ varicosæ in illis apparent.

Grauedo corporis & spontanea lassitudo, in prima inuasionem mox se offert, pulsusque debilis: Mox tanta sequitur imbecillitas peccorisq; angustia, vt cum æger se erigere vel mouere vult, animo sæpè delinquat, pulsus interim subsistente.

Quod reliqua attinet, Appetentia ciborum

Lues
Stomacace.
Scorbutus motus.

357

in aliis prostrata est, in aliis potius adaucta: Vti & in quibusdam alius fluida in aliis adstricta; Urina rubra turbida; Sudor foetidus.

Comitatur interdū febris lenta hāc lues; aliās illam aliqua præcedere solet, acuta vel maligna: quandoq; quartana eam secuta est, & post eam rursum hęc lues. Grauiore quoque affectus interdum producit, vt euulsiones, resolutiones, atq; alios post se aliquando relinquit, in quos definit, vt atrophiam, tabem, hydropem & dysenteriam, &c.

Causa.

CAusas vnde infectiones seu Lues illę contagiosę & quę plurib⁹ vitiis corpus impetunt: nimirum antiqua illa lues Elephantica, noua item Venerea, vel consueta saltem certis regionib⁹ Stomacace appellata, alięve similes aliis locis populares prodeunt, nō ad certam & manifestā qualitatem aliquam vel humorem sed venenatā potius vim seu venenum, quod malignitate suā, occultē & perniciosē, vti ex effectu patet, agit, referimus. Quod quibus partibus corporis potissimum insidietur, & quos affectus in illis producat, & à qua causā proueniat, in singulis hisce generibus explicabitur.

Sedes affecta in Elephantiasis.

Elephantica lue, membranea solum inuolucra aliqua infici, vitia quę in hisce tantum locis inueniuntur, demonstrant, inprimisque cutem quā corpus obuoluitur, & illius præsertim certa duntaxat loca, aliās etiam plura, in quib⁹ enarrata vitia in generibus exposita, lues hęc procreat, vt tubercula in cute faciei, manuum & pedum, vlcera in cute pedum, plantarum digitorumque interstitiorum, aliorumque locorum, cutisq; intumescētiā in auribus & narium alis, nec non faciei aliarumq; partium, nonnunquam & in illis sedibus cutis scabritiem fissurisq; vti & in vnguibus, cuti inhærentibus, pilorumque cuti infixorum defluuium: Dein & in tunica succingente oris, faucium, nariumque amplitudine, idem venenum tubercula in palato, vlceraque in illis sedibus gignit: Et in adnata oculi tunica, crassitiem, tandemq; panniculum. In cæteris verò corporis partibus, præter recensita inuolucra, veluti musculis, ossibus visceribusq; inter-

nis & vasis, hoc venenum illud non efficere, nec vti vulgò opinantur, hæc in hac lue affici, satis inde liquet, quòd præterquam, quòd nulla vitia eousq; pertinentia in hac lue infectis deprehendantur, nullæ quoq; alię functionum læsiones, nec in motu voluntario, nec animalibus, vitalibus aut naturalibus actionibus, nisi alius accedat morbus, in illis se offerant, nec in sanguine emissio aut excrementis redditus, vel urinā, aliquid quòd viscera hęc affecta esse demonstraret, appareat, sicuti hoc in accidentibus huius luis explicandis, in generibus ostendimus.

Qualitas seu intemperies venenata, causa Elephantiasis.

Affectus verò seu morbus, quem eiusmodi venenum producit, similiter intemperies quædam erit seu qualitas venenata, cuti tunicisque enarratis impressa, non solum veram ipsarum temperaturam peruertens, sed & totam substantiam deprauans, vt succum quo nutritur, & qui in deperditam continuo reponitur, et si à laudato sanguine, cæterisque sanioribus partibus nutriendis apto, profectus sit, postquam illi apponitur, sibi assimilando in similem substantiam prauam, vitiis eiusmodi in ea proferendis idoneam, conuertat. Eodem ferè modo, vti qualitatem aliam venenatam cancerum producere, succoque deprauato eum augeri docuimus. Nam vt ab hac in vna solum sede tumor ille malignus, sic ab illa, plura tubercula aliæque vitia diuersis in locis, procreantur; vnde & quòd consimili ferè ratione & à causā eadem venenatā, diuersas tamen operationes edente, nascantur, elephantiasis, Cancer generalis, vti eum nominare solent, rectius quàm quòd totum corpus vndique inficiat, appellabitur: cum illa non totum, sed vti dictum, cutem tantum tunicasque aliquas solum occupet.

Causa verò à qua hoc venenum, qualitatem hanc noxiam in cute tunicisque dictis gignens, vnde vitia in lue hac producuntur, à variis ortum ducit. Aliās enim per contagium, à lue hac infectis parentibus in fœtum, vel de corpore eā lue infecto, in corpus transfertur: Aliās verò hoc ex aliis humoribus, vel causis in corporibus suscitatur.

A parentibus cum semine hoc venenum in fœtum transiens, hæreditarię elephantia-

sis in eo causa fit. Nam cum semen ab uniuerso corpore promanet, ab infectis partibus portio illius dimanans, labem ab illis eam accipit, quæ in conceptu, dum foetus ex eo formatur, in parte simili, cute scilicet & tunicis affectis, quam hæc seminis portio gignit, impressa manens, rarius mox in natis infantibus se patefacit, sed salubrioris seminis portionis viribus domita, sopita aliquandiu manet, potentiaque tantum inhæret, donec languescentibus aliis, vis hæc noxia præualens, in actumque erumpens, se nunc citius, quod maior est noxa, vel tardius, si minor, atque eâ ætate præsertim, quâ parentes primum hac lue laborare coeperunt, manifestat. Sed & accidit, ut delitescens in liberis ad multam usque ætatem, citius in sobole ipsorum quàm ipsis aliquando se exerat, immò ut & immunes ab hac lue filii, per totam vitam maneant, & in nepotibus ea primum se prodar. Quæ, uti hoc pacto, per contagium à patris vel matris hac lue infectorum semine, in filios vel nepotes propagatur, sic & in parentibus, si saltem dispositi sint ad hanc luem, seminaque aliqua occulta illius, siue aliunde acquisita, aut in ipsis genita sint, in se contineant, etsi huius affectus certa indicia in illis minimè deprehendantur, tamen in liberos eorum, hæc lues deriuari, atque in illis primum erumpere potest. Sicuti à quodam sene, nulla elephantiasis aperta indicia habente, filium illegitimum, & legitimos binos, genitos fuisse, qui circa adolescentiam, elephantiasi horrendâ correpti fuerunt, cum tamen tres filiæ ab eodem procreatæ, per totam vitam immunes ab ea manserint, vidimus. Quod patris feminis inquinati, sed nondum in eo vires suas exerente, in filiis, & in filiabus materni purioris seminis causâ accidisse, credibile erat. Licet in illo ut & aliis hoc poenæ loco Deus etiam sine eiusmodi medio facere soleat.

A corpore hac lue infecto, per contagium venenum hoc in alterum transferri posse, non solum communis & antiqua est opinio, quo & nomine à sanis relegantur, sed & hoc fidem facit, quod lues hæc exteriora, ut cutem præcipuè occupans, per contactum il-

lorum præcipuè locorum, quibus hæc vitia scarent, vel accubitus proximiorum, uti concubitum, in alterius corporis superficiem facilius se ingerat: Vel quod interuentu inquinatæ tunicæ succingentis, per sputum veneno hoc infectum, eorundem poculorum vel cochlearium usu, aut ciborum ab ægris præmororum esu, primum in alterius fauces, indeque in alias sedes, se insinuet. Qua ratione & in lue Venerea illius venenum, uti & bestiarum virulentarum, per sputum corpora inficere posse, ostendimus. Inficiuntur autem hoc pacto eò facilius hi, quorum temperamenta inuicem nonnihil participiant, ut qui sanguine proximi sunt, sicuti aliquoties nunc duos nunc tres fratres in iisdem ædibus, examine habito, lue hac corruptos esse deprehendimus, vel qui alioquin ad eam suscipiendam, dispositionem aliquam idoneam habent, quam aptitudinem qualis sit, explicare vix possumus, sed ex eo saltem talem esse, quod è pluribus, qui iisdem periculis expositi erant, vnus saltem vel alter inficiatur, colligere aliquo pacto possumus. Quinetiam si animalia quædam hac lue infestarentur, uti de quibusdam scribitur, fortè & ab illis per contagium in hominem deriuari posset. Nam etsi virium aliquod in illis natum, cum aliquo elephantorum quandam habeat similitudinem, uti tubercula faucium in porcis, quia tamen non cum illis penitus conueniunt, nec alia in super quæ in homine eâ lue correpto reperiuntur, accedunt, elephantiasin eam vel non esse, vel aliam ab ea quæ soli humano generi poenæ loco, à Deo immissa videtur, luemque solis eiusdem generis animalibus potius, quàm homini contagiosam, asserere non adeò præter rationem erit. An etiam ab aliarum bestiarum virulentarum moribus vel ictibus, aut solo earum, vel aliquius alterius veneni contactu, aut etiam illius assumptione, aut odore, uti de ocimo nungantur, talis lues in corpore possit exurgere, licet, varia ea de re vulgus spargere & credere soleat, certi quid affirmare nolumus, sed experientiæ singulorum committere.

Ab humoribus causam huius luis quoque produci, idque frequentius, ex eo patet, quod

quodd multos elephanticos per contagium minimè hanc luem acquisiuisse conſter, videamusq; ſæpè eos, qui diu cum infectis cōuerſantur, vel etiam per matrimoniū commiſcentur, ſanos tamèn permanere. Deinde cùm nulla alia externa cauſa adduci poſſit, vnde malum hoc ſubortum liceat dicere, ab interna eam profeſſam eſſe, ſatis liquet. Cæterum nec hanc in humoribus noxam, vnde hæc venenata qualitas partibus affectis inducitur, intemperiem aliquam in illis vel putredinem aut corruptionem eſſe, vti vulgò creditur, dicere poſſumus, cùm nullos alios morbos neque illorum accidentia vel indicia, quæ ab eiſmodi humorum tranſmutatione ſuboriri ſolent, proferat, ſed venenatam potiùs in illis qualitatem, quæ ſimilem morbum ſeu affectum venenatum gignit, ſtatuimus. Qualis in ſanguine naſci atque conſiſtere poteſt, & proprietate eà, quā illa certis duntaxat ſedibus nocere ſolet, pro venenorum natura, cui tuniſcisque ſolùm noxam hanc imprimere, nec alias ſedes inſicere. Quod vt faciat, & vt ad ſuperficiem corporis hæc ipſius vis perueniat, non vniuerſam ipſius maſſam ſic inquinatam eſſe neceſſe eſt, cùm ſic exitium ægro pareret, ſed ſi certis duntaxat in locis, ſanguis ſemina eiſmodi venenata in ſe contineat, ab illis noxia vis eoſque etià propagari poteſt. Vel ſi eiſmodi naturæ aduerſum venenum, ab ea ad hæc exteriores ſedes propellatur, non ampliùs in ſanguine, etſi inde originem traxerit, cauſa illius cùm affectu quem genuit, ſed illic ſolùm vbi lues hæc erupit, hærebit, ſubſtantiamque ſic partium, illaque ruſſum ſuccum quo nutritur, vt oſtenſum, peruertet, elephantiaſimq; eo modo & inducet & fouebit. Hæc autem in ſanguine ſemina venenata, niſi per contagiū, vti dictum, ſanguis primùm, indeque poſtea partes inſiciantur, à corruptione aliqua in ſanguine factā alicubi procedere poſſunt, eaque non ſimplici, aut putredine, ſed tantā, in qua in eiſmodi venenatam qualitatem ſanguis alicubi conuertatur, ſicuti & in alia venena eum peruerſi, quæ alias noxas inducere ſolent, in aliis eiſmodi affectibus demonſtrauimus. E quibus, vti

aliquos ſanguine menſtruo, quem venenatum eſſe credunt, prodire docent, ſic & elephantiaſim ab eodem proficiſci, exiſtimant, non ſolùm in muliere, ſi ſanguis ille in ea ſupra tempus expurgationis diutiùs retineatur, ſed in viro per contagium, ſi cum muliere menſtruatā congregiatur, vel ſi eo tempore conceptus fiat, in fœtu hanc luem enaſci. Quæ tamen omnia, ratione menſtrui ſanguinis non eueniunt, cùm, vti alibi oſtendimus, ſuā naturā in ſanis non ſit, vti eum ſtatuunt, vitioſus, niſi ille, vel etiam alius, aliis de cauſis vitium contrahat tale, è quo ſemina illa luis elephantice prædeunt. Quod vitium, an à cibo ſumpto, vel morbo aliquo prægreſſo, aliòve modo in ſanguine venenatam illam vim inducat, indagare, aut quale illud ſit venenum aliter quàm ex effectu deſcribere, aut ex ſanguine emiſſo iudicare velle, cùm in eo abſtruſum lateat, perdifficile.

In aliis humoribus ſi elephantiaſis cauſa lateat, vt melancholico, ſicuti aliqui opinari ſunt, vel etiam alio, nec illa ab ipſius certā qualitate, etſi vitioſa & noxia quoque, vel ex ipſorum natura in præternaturalibus maxime humoribus ſit, vel ex corruptione aut putredine talis fiat, procedet, cùm alij potiùs morbi, qui in elephantiaſis minimè inueniuntur, inde prædeant, ſed & tunc ex illorum eà corruptione quoque prodibit, vnde malignam & venenatam inſuper qualitatem elephantiaſi gignendæ aptam, hi humores induunt, eamque eo vti de ſanguine dictum, modo, in exteriores corporis partes propellendo, easque inquinando, hanc luem producent.

A refrigeratione inſigni extrinſecus membrorum, hanc luem contrahi, vulgò creditur, vnde Germanorum prouerbium; Du erſtueſt daſſ du mōchtiſt mähig werden; Idque maxime, ſi in aqua vel aëre frigidiffimo & niuib; diu verſati fuerint homines: Vel corpore calente vehementer, potiſſimum poſt balneum, frigus ſubitò & ſummū patiantur; vel etiam in calidis tumoribus, vt eryſipelate, membra nimium refrigerent. Verùm cùm inde alia accidentia, & ſi extrema accedat refrigeratio, caloriſque natui

extinctio; mortificatio potius sequatur partium, non possumus hanc causam horum diuersorum vitiorum in hac lue statuere:

Vti neque alios tumores vel vlcera, exteriores haece sedes occupantia, in hanc luem commutari posse asseuerare, licet in erysipellate & herpete hoc accidere posse, existiment multi, falsi ed quod quando in psoam malignam, quam lepram Graeci vocant, conuertuntur, hanc elephantiasis quoque esse speciem, à qua tamen, vti in illis affectibus demonstratum est, admodum differunt, putant. In quam si vel haec vel alia externa vitia transirent, humores qui haec induxerunt, corruptione etiam, in venenatam eiusmodi qualitatem degenerare prius necesse esset.

Sedes affecta in Venerea lue.

In lue Venerea venenum huic lue producendae aptum, membranea quoque inuolucra potissimum infestare, in illisq; non solum vitia, sed & quandoque dolores excitare, in habitus corporis doloribus, in luis huius specie vnà explicandà, ostensum fuit. Nam vt in illa, circa perioestia, dolores atroces iuxta excarnem osium sedem in capite, tibijs, sterno, excitat, nodosque in quibusdam locis, sic & in alijs speciebus eodem modo, vt elephantica lues, cutem potissimum inuadens, & succingentem os, fauces naresque tunicam, pilorum in cute defluuium, in eaque maculas, pustulas, vlcera hinc inde & circa pudenda, atq; in ore, faucibus, naribus, vti in generibus haec omnia diffusè explicata sunt, eaque plura simul vel pauciora, parit.

Qualitas malitiosa, causa Venerea luis.

Affectum verò in hac lue seu morbum, non alium quoque esse, quam intemperiem harum partium seu qualitatem venenatam, talem, quae eiusmodi non solum vitijs, vt elephantiorum venenata illa vis, sed insuper & alijs & doloribus simul producendis proprietates aptas in se habeat, ex illis quae in elephantiasis affectu dicta, & in hac lue in secundo libro exposita sunt, satis patet:

Vbi & quo pacto hoc venenum à venenata causà, per contagium ex commistione maris & feminae, vel alio contactu, vel etiam spuito in corpus aliunde, vel per vaporem aut humorem, transferatur, illicque mem-

braneas, vti dictum, sedes, inuadat, easque inficiat, accidentiaq; enarrata proferat, prolixè & exactè explicatum fuit, vt non opus sit eadem hoc loco repetere.

In lue Stomacace dicta, priuatim quoque quoddam venenum, qualitatem venenatam inducens, similem affectum noxium parere, diuersitas quoque & malitia vitiorum, quae in hoc affectu se offerunt, etiam hinc inde in cute, vt sunt maculae in cruribus, tubercula & vlcera, atque in ore gingivarum tumor, exulceratio, aliaeque insuper laesiones, demonstrare videntur. Quam & potius huius luis causam, quam melancholicum humorem, ad quem tanquam noxiū, grauioribus noxis vel laesionibus oblati, mox recurrere solent, vt causā aliquā manifestā positā, ad occultam deuenire non cogantur, vti aliorum multorum eiusmodi perniciosorum morborum, quorum perniciēs non nisi à veneno eos proficisci posse, satis demonstrat, statuere malumus, quam ea quae fundamento labili nituntur, proponere. Vnde verò hoc venenum exsurgat, qualitasque haec in corpus imprimatur, & an fortè, vti lues Venerea, quemadmodum in generibus meminimus, aliunde in Septentrionalia loca per contagium primum irrepserit, indeque de corpore in corpus propagetur, lubet potius illis, qui haec loca inhabitant, dijudicanda relinquere, quam venenorum causas, quas inuenire perdifficile, atque aliter quam ex effectu dignoscere, impossibile, aliquas abditas in medium proferre.

Curatio.

Elephantiasis seu elephantica lues, est tantum inuolucra corporis aliqua cutemque imprimis, eamque certis duntaxat in locis, possideat, tamen ægerrimè, licet primum illa incipiat, praecaueri, multò minus si confirmata sit, curari poterit, praestimque si haereditaria sit. Nec dum qui eam curarint, hactenus inuenti fuerunt, quamuis ij qui psoam, falsò ab imperitis pro elephantiasi habitam, curarunt, se elephantiasim sanasse, gloriantur. Quae licet ita sint, tamen non negligenda haec lues, statim-

Qualitas malitiosa, causa Stomacace luis.

Elephantiasis curatio.

365

timque ab initio huic, omnibus artibus occurrendum, & si penitus impediri nequeat, saltem vt protrahatur quàm diutissime fieri poterit, cura adhibenda. Atque vbi vitia eruperint, hisce delendis incumbendum, ne ægris si inualecant, tandem exitium pariât, cum nisi id fieret diu sepe possent superuiuere. Dein & cum deformitatem summam hæc vitia creent, vt minus suspecti, diutius in hominum consortio versari queant, cura interdum palliatiua illis quoque adhibetur: Quam magnates à Medicis sæpe magnis promissis efflagitant.

Curatio elephantiasis duplici modo instituitur: Primum generatim toti huic morbo accommodata, postea particulatim vitiis tantum illius inde natis.

Generalis curationis scopus in eo consistit, si fieri possit, vt causam huius luis, venenum scilicet illud euacuantibus educamus, & qualitatem venenatâ inde natam emendemus: Verum cum quæ peculiari quadam vi id efficiant, vel certis euacuationibus, vt in lue venerea, in hac non sint hætenus inuenta, eoque modo in curatione illius procedere nequeamus; Curationis methodus plerunque vitiis hisce prauis, quæ nascuntur delendis, accommodatur. Et proin cura non adeo ab similibus huic, quæ in psora peruersa, aliisque prauis maculis, pustulis vlceribusque malignis vsurpari solet, in elephantiasi quoque instituitur, sequentibus modis.

Purgationes prout corpus humoribus superfluis, vel excrementis scatere cognoscimus, instituuntur, cum eas causæ venenatæ accommodare nequeamus, quam tamen ad melancholicum humorem educendum plerique dirigunt, præcipueque ea quæ illius excretionem moliantur, seligunt, permiscendo, illius humoris acrimoniam suâ humiditate & frigidityte contemperantia, quæ cum & aliis acribus salsis & biliosis pertinacibusque humoribus expurgandis competant, vt in cæteris vitiis externis inde genitis, in scabie peruersâ & in lue venereâ, sic & in hac lue, in qua & hæc plerunq; congeruntur, locum habebunt. Quibus corpora hæc præcautionis loco & ne augeatur

malum, Veris & Autumni tempore, vnâ vice vel pluribus purgamus: Interdum & intermediis temporibus, si impuritas corporis illud requirat.

Perficitur autem hoc ritè: Primum leuioribus communia excrementa eluendo: Vt iniectione Clysmatis stimulantis, qualia passim describuntur, eaque quæ in melancholiæ veræ cura descripta sunt, hic quoque possunt competere.

Vel datur eo nomine Cassia, Catholicon, Tryphera persica, vel Sarracenica, Diase-na dissoluta cum aquis conuenientibus, vel decocto Cicerum, alioue, vel cum Sero caprino.

Vel: R. Rhabarbari infusi in aqua Endiuia, vel Sero lactis ʒj. vel ʒ. iij. Syrupi rosarum solutiui ʒj. ʒ. Cassiæ vel Catholici vel Tryphera persicæ ʒ. ʒ. aquarum Buglossi, Fumariæ q. s. fiat potio.

Horum loco vomitus aliquando, cum, vt minus excrementa coaceruentur, iuuat, in consuetis prouocâdus, tum leuioribus sumptis, tum etiam fortioribus Hellebori præsertim vsu concitatus.

Præparatio antepurgationem humorum præmittitur, cum syrupis, vt Violarum vel Fumariæ simplic. Buglossi, Endiuia; vel etiam Fumariæ composito, Nymphaeæ, de Cucurbitis, dissolutis cum aquis Fumariæ, Lupulorum, Buglossi, Endiuia, Cichorij, Acetosæ, &c. Aromatis. puluere Triasant. vel Santalis.

Vel hoc decocto: R. Buglossi vtriusque cum radicibus M. ij. rad. Graminis, Asparagi, Liquiritiæ an. ʒ. ij. cort. Capparum, Tamari-cis an. ʒ. j. herb. Endiuia, Cichorij, Lactucæ, Capill. an. M. j. florû Cordial. Cicerum rubr. an. P. j. quatuor semin. frigid. Maior. ʒ. vj. sem. Anisi ʒ. ij. Passul. mund. ʒ. ij. fiat decoctio & in ʒ. ij. ʒ. dissolue de Syrupis prædictis, q. s. vel adde Saccharum, aromatis. Triasantalo: Pro ʒ. vj. vel 6. vicibus.

Vel vtatur Iulepo præparante in Melancholiæ curâ exposito: Qui R. syr. Viol. Borrag. &c. Aut eo qui R. succorum Buglossi vtriusque, de Pomis redolentibus: vel decocto quod R. rad. Bugloss. vtriusque.

Purgamus post præparationem prægressam

ſam ſequentibus: R̄. Rhabarb. inful. in aqua Endiuia 3.j. Agarici trochiſc. inful. in ſyrup. Roſ. ſol. 3.ij. conſect. Hamech vel Diaſenæ ſol. 3.ij. ſyrupi Viol. 3.j.β. diſſolu. cum aqua Fumariæ, Lupulorum.

Vel detur, Bolus: R̄. Catholici 3.β. conf. Hamech 3.ij. de ſucco Roſ. 3.j. cum Saccharo, fiat Bolus.

Authæc potio: R̄. herbarum cum radicibus Bugloſſi alterutrius, vel Cichorij aut Endiuia, foliorum Fumariæ, ſummitat. Lupulina M.β. feminum Endiuia, Portulacæ, Melonum, Citri an. 3.β. Aniſi 3.j. ſlorum Cordial. p.j. Paſſul. mund. 3.j. Prunorum numero v. pulp. Tamarind. 3.β. radic. Liquir. Polypod. an. 3.j. foliorum Sennæ mund. 3.vj. Epithymi 3.ij. adde Sacchari q. ſ. fiat potio. Poſſunt infundi Myrobalani, vel Rhabarb. vel electuaria in ea diſſolui.

Horum loco dari poſſunt purgantia in Melancholia cura deſcripta, vt Potio quæ R̄. Catholici 3.j. &c. Vel quæ R̄. Sennæ, Polypodij, &c. vel Pilulæ ibidem propoſitæ.

Præparamus & purgamus interdum ſimul hoc Apozemate: R̄. radic. Graminis, Aſparagi, Ruſci, cortic. Capparum, Fraxini, Tamaricis an. 3.ij. temperentur in Vino acido, vel addito pauco Aceto, radic. Liquiritiæ 3.ij. rad. Enulæ 3.j. herbarum cum radicibus Bugloſſi vtriuſque, Cichorij, Acetoſæ, Lapatij ana M.j. herbarum Fumariæ, Lupuli, Mercurialis, Scabioſæ, Capillariū an. M.ij. herb. Endiuia, Dentis leonis ſeu Roſtri porcini, Lactuæ, Hepaticæ, Lenticulæ aquæ ana M.j. Betonicæ, Thymi, ſummit. Roſmar. Chamæpyth. Chamædr. an. M.β. ſlorum Cordialium, Geniſtæ, Tamaricis, Nenuphar. an. p.j. femin. iij. frigid. Maiorum 3.j. quatuor feminum frigid. Minorum 3.β. ſem. Acetoſæ 3.ij. ſem. Aniſi 3.ij. ſ. Fœniculi 3.ij. Cicerum rubr. p.j. Paſſularum enucleat. 3.ij.β. Prunorum numero x. Iuiub. Sebeſten ana par. v. Tamarind. 3.j. Polypodij quern. 3.ij. Sennæ 3.ij. feminis Carthami conquaſ. 3.j.β. Epithymi 3.vj. coquantur omnia in Aqua cum radicibus eorumq; infuſione vt dictum, addendo Sacchari q. ſ. aromatiz. Santalo citrino, Cinamom. vel puluere Triſantali, vel Diamarg. frigid. Pro 5. vel 6. vicibus.

Per vices purgationes inſtituuntur, aliàs continuando per aliquot dies, aliàs alternis ternis, quaternisve ſemel, bis uſurpando, prout corpus excrementis redundare videmus.

Syrupi in hanc rem parantur, qui ad uſum diutiùs conſeruari poſſunt; Componiturque ex apozemate prædicto purgante & præparante conuenienter talis. Recipiend. radices, herbas, flores, ſuctus, ſemina vti illic demonſtratum, atque addendo Tamar. 3.ij. Polypodij 3.vj. foliorum Sennæ quart. j.β. feminis Carthami conquaſ. 3.ij. Epithymi 3.j. Hellebori nigri 3.β. factaque decoctione in ſ.q. colaturæ, inſundendo Myrobal. citrin. Indarum conſcricat. oleo Amygdal. dulc. an. 3.ij. Rhabbarbari 3.β. Spicæ 3.β. Cinamomi 3.j. Agarici trochiſcati 3.v. factaque expreſſione, miſcendo ſyrupi Roſarum ſolutiui 3.ij. Sacchari lb.β. & decoquendo ad conſiſtentiam ſyrupi: Cuius decens quantitas per ſe, vel cum iure Cicerum, aut ſero Lactis, vel decocto Mercurialis exhibeatur, vel cum aquis conuenientibus.

Ex ſuccis ſic fiet: R̄. rad. Polypod. Liquiritiæ an. 3.ij. foliorum Sennæ 3.ij. feminis Carthami conquaſ. 3.ij.β. Epithymi 3.vj. Tamarind. 3.ij. Paſſul. 3.j. ſemin. Aniſi 3.ij. fiat decoctio in ſero Caprino & in colaturæ lb. ij. adde ſuccorum Fumariæ, Lupulorum, Bugloſſi alterius, Scabioſæ, Lapatij an. 3.ij. Iterum decoquantur & deſpumentur, addendo Sacchari lb.β. coquatur ad conſiſtentiam, aromatizetur Santalis, Cinamomo ad uſum. Si ſuccus Mercurialis addatur, erit efficaciſ.

Hellebori dilutum ſeu decoctum, vt ipſius acrimonia minuatur, aliqui ſic parant. Fit decoctum in Aqua, ex Endiuia, Cichorio, Bugloſſo, vtroque, atque in lb. vj. colaturæ inſunditur Hellebori nigri radic. inciſorum 3.j.β. & poſt macerationem aliquam decoquitur ad conſumpt. duarum partium: Et de tertia dantur 3.ij. cum ſyrupi Viol. 3.β. continuando per aliquot vices.

Epithymi puluerem ad 3.ij. cum ſero Caprino per menſis ſpaciū & ultra propināt. Operabitur melius ſi pulueris & Epithymi, & Sennæ ana 3.j. Tartari 3.β. Sacchari can-

369

di 3.j. cum Sero detur, aliquandiuque continetur, quibus & alia vt Turbith addi possunt, & quæ grata sunt, pauca aromata. Quæ rectius quàm puluis Diafenæ, quem aliàs commendant, propinantur.

Electuarium gratum laxans : R. pulpæ Cassiæ fistularis 3.ij.ß. pulpæ Tamarindorū 3.j.ß. pulpæ Passul. maiorum & Prunorum dulc.rob. de Pomis redolentibus an. 3.j. syrūpi Violac. & Ros. solutiui an. 3.j.ß. Diagyridij 3.ij. subtilissimè triti cum Sacchari candi 3.ß. Turbith 3.ij. pulu. rad. Liquirit. & Cinnamonī an. 3.j.ß. misce in formam electuarij : Capiat 3.ij. experiūdi primū gratiā, postea plus minūsvē prout operatio successerit.

Medicamentosum saporem magis habebit, si omissō Diagyridio & Turbetho, hisce pulpīs Catholicon, Tryphēram, syrupum Rosarū solut. cum infus. Rhabarbari addas ; Item pulu. Rhabarbari, Sennæ. Vel fortiora solutiua elect. vt de succo Rosarū, Hamech, Diafenam, de Citro similiaque.

Conueniunt & in eisdem vsus eiusmodi per vices vsurpatæ purgationes, in Melancholiæ cura expositæ : Vt Apozema vel syrūpus ex succis parata : Vel Vinum aut electuarium : Puluis item.

Vti & alia aliqua, quæ in cura Scabiei peruersæ fuerūt declarata : Vt Serum lactis cum permistione aliorum : Syrupi item vsuales, decoctaque purgantia : Ex succis paratus syrupus ; dein & Vina purgantia : Inprimisq ; Infusum vel decoctū Hellebori, potionesq ; aliæ, electuaria & pilulæ, quorum illic meminimus.

Multa quoque in lue Venerea exposita purgantia, maximè quæ in acrium humorū redundantia illic competere diximus, hic quoque vsurpari poterunt.

Finitā purgatione visceribus robur additur, exhibitione conseruarum Rosarum, Buglossi vtriusque, Cichorij, Violarum, Capill. Nenuph. Vel tabul. Diarrhodon, Triasantalī, Diamargaritonis : Vel Theriacæ, cum cōserua Buglossi similibusve.

Sanguinis detractio per venam sectam, Veris & Autumnī temporibus, cum generales purgationes sunt, ante horum vsū institui solet, ad generalē totius corporis euacuationem faciendam, cum alioquin per eam

semina huius luis, quibus sanguis in venis, vti ostendimus infectus non est, tolli nequeant, atq ; eo nomine minimè institui debeat. Fitq ; hæc in brachio, atque in plethoricis mox quoq ; sequentibus diebus in manu vel pede : Vulgò si sæpius phlebotomiā vtantur, hac malum præcaueri posse creditur : Cum tamen per eam corpore exhausto, lues citius & amplius inualescat. Temere quoque vt vulgatæ opinioni satisfiat, sanguis, vt ex eo lues hæc cognoscatur, dum examini sistuntur, emittitur & censetur.

Scarificationem singulis mensibus repetitam, in scapulis, tibis, adhibitis insuper cucurbitulis, conuenire admodum credunt, vel etiam Sanguisugas illic adhibitas.

Menses mouere, si tardi vel omnino suppressi sint, valde vtile, venā Malleoli sectā, aliisve illud præstantibus.

Hæmorrhoides prouocare in primis quoque conueniens, applicitis in podice sanguisugis, aliisve admotis.

Vtatio per Cauteria actualia & potentialia, si fortè extremum hoc remedium aliquid efficere posset, aliquando tentatur, non solum in brachijs aut tibis, vt magis consuetum, sed & in capitis superficie quandoque facta.

Castratio in virili sexu à veteribus in desperatis interdum instituebatur : idq ; fortè quod per eam totius corporis temperamento immutato, in iis sic effeminatis redditis, atque aliam planè constitutionem adeptis, morbum hunc facilius cessurum, crederent. Quo remedij genere eo minori cum difficultate sunt vsi, quod elephantice alioquin ne alios inficiant, congressus interdictus sit, & illis sublata virilitas nullum adferat in eā functione ipsis non necessariā, incommodū, vtque etiam eo nomine à coitu arcerentur, quam vt sic curarentur.

Alteramus ipsorum corpora, vt si fieri possit, in meliorem statum ducantur : Verum cum intemperies non manifesta, ratione huius luis se patefaciat, non quæ certā qualitate contraria illi resistent, possunt illi opponi : sed vsurpantur plerumque quæ acrium humorum prouentum impediunt, eosque

contemperent. Dein & cum obseruetur in eiusmodi corporibus siccitas, ariditasque & consumptio quædam; quæ humectando reficiendoque corpora eiusmodi, restarent reficiantque, plerunq; ipsis præscribuntur. Inter quæ multa ex illis quæ in hæctica competere diximus, hæc quoq; possunt conuenire: vti & sequentia.

In Aëre puro, non valde feruescente, sed temperatiore, versentur, sintque procul ab illis qui hac lue infecti sunt, semoti.

Cibus euchymus ex carne iuniorum animalium, iuleulis, ouis, lacticiniis, oleribus, fructibusque humectantibus & temperatis: Vt in hæctis & consumptis conuenit.

Ranarum vti & Astacorum fluuiatilium & Testudinum aquaticarum & nemoralium carnes comestæ, vti in hæctis sic & hæc probantur.

Potus sit Aqua vel Vinum non nimium potens vel dilutum: Interdum & laccaprinum bibant, aliaque decocta in hæctica exposita.

Medicamenta varia quæ refrigerant & humectant seu temperata sunt, atque acres humores contemperant, hinc inde in aliis vitiis externis descripta, hæc quoque possunt competere. Vti & illa quæ in febre hæctica describuntur; Iulepi, Syrupi, Aquæ, Confectiones, Condituræ.

Inter reliqua hoc electuarium maxime illis conueniet: quod R̄. conf. florum Buglosi vtriusque ʒj. florum Cichorii, Violarum, Nymphaeæ & Rosarum an. ʒj. capill. Vener. Rosmar. ana ʒ. ʒ. rad. Buglosi condit. ʒj. specierum Triafantali vel Diarrhodon, Diamarg. frigid. an. ʒ. ʒ. trochiscorum de Camphora ʒj. cum syrupo de Pomis redolentibus misce.

Superbibat aquas Fumariæ, Lupul. Buglosi vtriusque, Endiuæ, &c.

Alia multa quæ hepati conueniunt & lienis, quorum vitio sanguinem immundum genitum hui occasione præbere putant, propinant, & foris simul hisce visceribus applicant, passim in morbis ipsorum ab intemperie calida & obstructione progressis descripta. Quæ tamen nisi hæc viscera

manifestè sic affecta cognoscamus, inutiliter plerunque vsurpantur.

Antidota quædam quæ peculiari vi elephantiasi contraria esse creduntur, præ cæteris commendantur, suntque sequentia.

Viperarum carnem quocunque modo assumptam, inprimis elephantiasi resistere, plerique statuunt. Alij etiam aliorum serpentum cuiuscunque generis, etiam cæcorum vocatorum German. Blindenschleich, vsu, cutem cum vitiis illi adnatis abscedere posse, ex eo colligunt, quod cum eiusmodi serpentes exuium quotannis exuant, hoc ab innata illorum carni vi procedere, & proin etiam in homine idem operari posse, existiment.

Exhibetur autem hæc caro ipsis, præparata variis modis: Aliàs cocta in iure aliquo conuenienti cum sale, vti anguillarum caro, pelle etiam, vti in illis, prius detractâ, aut alioquin per coctionem derasâ, capiteque & caudâ amputatis, & exenteratis visceribus: sic enim, cum se anguillas comedere, illis persuadeatur, minus a cibo hoc abhorrebunt. Licet & aliter sic coctam & dein incisam, aliòve modo conditam, vt minus eam agnoscant, præparatione possimus efficere. Cuius vsu cutem squamarum instar certis in locis vitiatis abscedere, aliqui prodiderunt.

Sufficit & ius interdum, in quo caro hæc coxerit, vt illud sorbeant, vel vnâ cum carne comedant. In quo præter sal, semen Anisi, Anethum decoqui possunt; alij etiam Mentham addunt vel Porros.

Syrupus ex iure prædicto serpentum, addito Saccharo, Cinamomo aliquando coquitur, vt ad vsu diutius asseruari possit: Eaquæ formâ sæpius exhibetur.

Alij, si Gallinæ carne serpentum tam diu donec pennæ illis decidant, saginentur, & postea coctæ comedantur, idem præstare docent.

Sunt qui & Vinum in quo Vipera extincta fuerit, propinatum præbent.

Exiccata quoque caro viperarum, vt diu ad vsu feruari, & cum non passim vipera inueniantur, etiam aliò transmitti queat, in trochiscos redigitur. Ad quos

373

parandos fumitur caro ipsarum tantum, ab-
iectis vti dictum etiam extremitatibus & vi-
sceribus, atque cum Anetho & Sale in aqua
coquitur, postea tunditur, & cum panis tri-
ticei micæ quarta parte in pastam cum iure
subigitur, indeque in pastillos formatur at-
que exiccatur: Talesque pastilli trochisci de
Tyro, quo nomine vyperas appellant, vel de
Viperis nominantur. Licet & à serpenti-
bus aliis eodem modo paratos, æquè effica-
ces esse aliqui iudicent.

Hi autem trochisci rariis per se, sed cum
conseruis permisti vsurpantur. Quales in
electuario supradicto descriptæ fuerunt. Cui
& si trochiscorum horum 3. j. vel plus adda-
tur, efficaciores reddentur. Dein & cum hi
trochisci Theriacam subeant, eam propter
ipsum, vel quia aliàs venenis resistit, huic
veneno aduersatur, Elephantiscis quoq; ex-
hibent.

Astacorum fluuiatilium, cancrorum vul-
gò dictorum carnem, eadem vi quâ & ser-
pentum operari, ex eo quòd vti illi exuium,
sic & cancri testam quotannis mutant, colligunt,
nec solum vi resciente, quâ & pro-
desse diximus, sed & hac potissimum opera-
ri, putant.

Erinacei terrestres carnem exiccatam seu
assam in cibis quoque exhibet. Diosc. & Sa-
lamandram aliis medicamentis miscet: Quæ
si quid in hac lue possunt, proprietate qua-
dam illud moliantur.

Sanguinem humanum à recenter iugu-
lato bibitum, profuisse, historiæ aliquæ, si
non potius fabulæ sint, testantur: Aquam in-
de destillatam similiter probant.

Cornu cerui & Eboris rasuram elephan-
tias, vt & aliis venenis resistere aliqui do-
cent. Imprimisque magnatibus, Vnicornu,
vt precium augeatur, cõmendant, magniq;
faciunt.

Smaragdi pulvis exhibitus ab aliquibus
magni fit.

Externa remedia, quibus in generali ele-
phantias vtimur, sunt Balnea, si forè illo-
rum continuo vsu, vis illa venenata & ma-
ligna cuti membranisque impressa, auferri
atque extirpari posset, & si hæc lues maturè
præcaueri, aut etiam si iam inualuerit, cura-

ri: Vel saltem per hæc, in delendis tubercu-
lis, vlceribus & cutis scabritie, aliquoufque
hæc deformitas palliari. Suntque eiusmodi
balnea vel naturalia vel artificialia.

Naturalia balnea sunt Aquarum dulcium
calefactarum, quæ certis temporibus corpo-
re prius & postea quoque bene purgato, fre-
quenter vsurpata, Veris & Autumni tempo-
ribus, ante & post prandium, in iis sedendo,
perseuerando in vsu horum per tot dies, do-
nec cutis efflorescat, rursusque sanetur, de
hac causa maligna in superficie cutis late-
te, multum demere possunt.

Thermæ naturæ calidæ validius id præ-
stant; Sulphuræ præsertim, quales sunt in
Heluetia nostra, in Argouia Badenses, in Va-
lesia Brigenfes, aliæ ve aliis in locis, quæ vti
scabiem cuiuscunq; generis, vi singulari, vti
in ea dictum, sanant, sic & in lue hac eadem
vel malignam illius vim absumere, vel tan-
tum vitia inde nata, si non penitus, saltem ex
parte delere possunt; si diu illis, vti aliàs fie-
ri solet, vtantur. Eoque nomine ad has
thermas non solum, cum de hac lue con-
stat, se vt malum celare aliquandiu possint
conferunt, sed & cum de ea adhuc dubij su-
mus, post examen, eò an forè aliqua inde se-
quutura esset mutatio, illos ablegamus.

Artificialia balnea humida in quibus se-
deant, illisque vti de naturalibus dictum,
diu vtantur, ex aqua fiunt, in qua varia,
quæ cutem rarefaciendo & detergendo pra-
uos succos absument, decoquantur. Qualia
sunt ex radicibus cum foliis, Althea, Lapa-
thum, Ebulus, Enula: radices item Ari, Ser-
pentariæ, Cucumer. agr. Bryoniæ, Cyclami-
nis, Iridis, Raphani, Hellebori vtriusque, Li-
liorum; Item herbæ vnâ cum radicibus,
Malua, Buglossum vtrumque, Cichorium,
Endiuiâ, Sonchus, Beta; Item Absynthium,
folia item Sennæ, Fumariæ, Lupuli, Scabio-
sæ, Saponariæ, Parietariæ, Violaræ, Hepati-
cæ, Lenticulæ aq. Senecionis, Acetosæ, Agri-
monia, Arthemisiæ, Plantag. Polytrici, He-
deræ vtriusque, Chelidonijs vtriusque, Nym-
phæ, Tamaricis; Flores Chamomill. Meli-
loti, Sambuci. Dein & Fabæ aliæve legumi-
na. Furfur macrum; Semina Lini, Fœno-
græci, & Cucurbitacæ generis.

Hifce plerunq; Sulphur, Alumen vel Sal addunt, maxime vbi iam aliquoties leuiori decocto vfi fuerint.

Adduntur & alia, forte artuum caufsa, Primula veris, Chamæpythis. Item odorata plantæ, vt Calamenta, Rosmarinus, Lauen-
dula; Sunt qui & quinque Aperitiuas radi-
ces addant.

In scabie peruersa exposita balnea humi-
da, non multum ab hisce differetia, hic quo-
que locum habere possunt: Inprimisq; effi-
cax illud quod, Gypsum cum aliis recipit.
Vti & decocta quædam, quibus maculas vi-
tiosas ablui debere, in illa ostendimus, pro
balneo hic vsurpari poterunt.

In sanguine humano si sedeant, eoq; bal-
nei vice vtiuntur, profuisse quibusdam, histo-
ria aliquæ testantur.

Sicca balnea in aëre calefacto, cū nimium
corpus accendant, & violenter ad superfi-
ciem corporis, humores propellant, non ita
probantur. Possunt tamen & illis, ex fuffi-
tu decoctionis balnei humidum, leuiter calefa-
ctis & tepesactis, aliquando corpus, antequā
balneum humidum intretur, vt hoc melius
operetur, sic disponere.

Illitiones variæ quoque extrinsecus pro
generali etiam cura huius luis fiunt, in cor-
pore hinc inde, vbi præsertim cutis pustulo-
sa, vlcerosa & scabra tumidaque occurrit, ad
vitia hæc tollenda, & si fieri posset, mali-
gnam illam impressam qualitatem aliquo
pacto auferendam. Fiuntque ex illis quæ vi-
exiccante detergenteque illud agant, addi-
tis insuper iis, quæ proprietate quadam id
efficere posse existimantur, qualia à serpen-
tum genere desumpta existunt; Sic axun-
giæ illorum inunctam, idem quod carnem
ipforum assumptam, præstare posse, putant,
nimirum vt cutis inde cum vitis illi adnatis
abscedat. Vti & oleum in quo caro serpen-
tum coxerit, vel serpens viuus suffocatus
fuerit: Carnem ipsam coctam aliqui inun-
ctionibus quoque miscant.

Ex prædictis itaque tale fiat Vnguentum:
R. radic. Serpentar. vtriusque, Asphodeli vel
Liliorum, Enulæ camp. Betæ, Croci sa-
tini ana ℥.j. pistentur optimè Oleo rosaceo
emphacino, adde vnguenti Citrini ℥.ss.

axungia Serpentis ℥.iij. Terebinthin. ℥.ss.
olei de Frumento vel Vitellis ouorum ℥.j. ss.
olei de Tartaro ℥.ij. Sulphuris viui, Nitri
ana ℥.iij. Lithargyrij vel Cerusæ ℥.ss. Bora-
cis vltæ ℥. vj. Tuthiæ præparat. Sarcocoll.
nutrit. Thuris ana ℥.ij. mucilag. f. Lini ℥.ij.
succ. Lapatij, Fumariæ, Limonum, ana
℥.iij. agitentur inuicem in formam nutri-
ti: Vngantur partes scabræ vlcerosæ & pu-
stulosæ.

Vel fiat tale: R. succorum Limonum
vel Arant. vel Citri, Lapatij, Fumariæ,
Scabiosæ, Enulæ camp. ad ℥.j. Aceti ℥.ij.
Aquæ vitæ ℥.j. olei Rosæ. omphac. Myrti-
lorum vel Mastichini ana quart. j. coquan-
tur ad succorum consumpt. addendo olei
Vitellorum ouorum ℥.ij. de Tartaro ℥.j. ss.
Saponis Gallici ℥.ij. axungia Serpentis vn-
cias iij. Pomatæ ℥.ij. Fellis tauri vel hirci
℥.ss. mucilag. f. Pfylij, vel Lini ℥.ij. Mellis
℥.j. ss. radic. Ari vel Serpent. Cucumer. agrest.
Cyclaminis, Ireos ana ℥.iij. Hellebori vtriuf-
que ℥.ij. seminis Stapisagr. Raphani ana ℥.j.
Boracis & Tartari vlti ana ℥.ss. Sulphuris vi-
ui ℥.iij. Ossis sepiæ ℥.ij. Cochlearum terrestr.
cineris ℥.j. Camphoræ ℥.j. ss. Lithargyr. Tu-
thiæ & Cerusæ ana ℥.j. ss. Agitentur diligen-
ter & fiat Linimentum: Pro partibus affe-
ctis in corpore.

Hifce & alia addi possunt, veluti oleum
de Frumento, de semine Raphani, oleum in
quo coxerit Serpens, succus Cyclaminis:
item Nitrum.

Posset & argentum viuum hisce vn-
guentis addi, quod licet venenatam illam
vim in elephantiasi, vt in lue venerea,
minimè extirpet, & proin non eam vti
illam sanet, tamen quia vitia hæc exter-
na in cute in vrisque admodum emenda-
re solet, ob eam causam illis quandoque mi-
sceri poterit, non tamen eā quantitate aut
eā ratione, præsertim si generaliores siant
inunctiones, quā ad luis Venereæ curatio-
nem, vsurpatur, ne expuitionem moueat,
cū per eam aut alia vi, quā luis venereæ
venenum expellit, non possit hoc in ele-
phantiasi præstare, sed saltem ad vitiorum
ablationem opitulari, & proin in particula-
ribus, quæ tantum vt pustulis adhibentur

remediis, rectius vsurpatur. Quod si tamen generalibus etiam inunctionibus permiscere velimus, poterimus prioribus vnguentis primo præsertim, Argenti viui 3.j. addere.

Vel tale cum eo linimentum parare: R. vnguenti Citrini quartarium j. olei Ouum 3.j. olei de Tartaro 3.ß. Argenti viui dissoluti cum paucâ Terebinthin. & Vnguento prædicto 3.ß. succi Limonum vel Arantiorum 3.ij.ß. Boracis 3.ij. radic. Serpentariæ vel Ari, Lapatij & Asphodeli vel Liliorum parum tostorum & contus. & cum prædictis mistorum ana 3.ij. misce.

Particulares applicationes, vitis tantum adhibentur, à lue hac prodire solitis, vt licet lues hæc sanari nequeat, saltem vitia hæc minus deformant aut noceant. Vsurpanturque tum in vitis externis, si forte ea delere vel aliquo pacto imminuere aut obliterare, vt minus appareant, possent, vt Pustulis, Vlceribus; Aut ea corrigere, vt Pilorum defluuium: Maxime verò in internis vitis, ne illa grauiores noxas inducât, illis quamdiu fieri potest, ea auertere studemus: Vt in Pustulis & Vlceribus internis, in Dyspnœa, atque oculorum Pelliculâ.

In pustulis externis, tuberculis, aliisque tuberositatibus cutis, tum in facie vbi magis patent, tum aliis in locis, applicantur remedia: Fiuntque ex illis quæ exiccando detergendoque potissimum illud agant, vel vi potentiore & causticâ. Quâ ratione & curis nigredinem in cosmeticis, & maculas & pustulas rubras aliasve prauas, vt vitilignes similesque deleri, in eiusmodi vitis ostendimus. Quæ remedia externa illic exposita, tam leuiora quam fortia, vt & interdum caustica illic enarrata, cum pustulæ delendæ sunt, hic quoque locum in eiusmodi vitis tollendis habere possunt: Quæ variis modis & formis applicantur.

Ex illis quæ nondum erodunt, aquæ destillatæ ad faciem plerunque vsurpantur. Qualis hæc est: R. Sulphuris 3.vj. Tartari calcinati 3.ij. Salis nitri, Vini crystallini calcin. ana 3.j. Thuris, Myrrhæ, ana 3.ij. Camphoræ 3.j. succi Lapatij 3.iiij. succi Limonum 3.ij. aquæ Rosarum, florum Faba-

rum vel florum Nymphææ aut Plantag. id. 1b.j. Destillantur.

Alia Aqua: R. Tartari calcinati quartar. j. Boracis 3.ß. Thuris vel Mastiches 3.ij. Sacchari candi 3.j. Camphoræ 3.j. pulueris & subigantur cum mucilagin. feminis Psyllij vel infus. gummi Tragachant. factis cum aqua flor. Fabarum vel Nenuphar. 3.vj. Albuminor. ouorum agitatis numero iij. succi Limonum vel Arantiorum 3.ij. vel iij. Destillantur in alembico.

Alia aquæ quoque idem præstare possunt in discoloratione, inter cosmetica expositæ efficaciores, quæ vrinam, tartarum, sublimatum cum cæteris recipiunt, vel ex pluribus componuntur. Et in pustulosa rubra facie, descriptæ aquæ, inprimisque illæ quæ Lithargyrium & tartarum cum aliis admittunt. Dein & in maculis aliis diuersorum generum ibidem declaratæ aquæ ex variis compositæ & cum tartaro effectæ.

Liquor albus, quo instar lactis virginalis vti possunt, ad illinendam faciem aliæque tubercula: R. Lithargyr. 3.j.ß. Aceti albi 3.vj. succi Limonum vel Arantiorum 3.ij. Aluminis vel Salis gemmæ 3.ij. Tartari calcinati 3.ß. Camphoræ 3.j. macerentur & agitentur sæpe, ad vsum, vel coquantur parum, si statim eo vti velimus.

Vel Sulphuris, Salis nitri & Crytalli seu vitri Crytallini tenuissimæ tritæ aquæ portiones, parum coquantur, in Aceto forti albo: Et cum colatura facies illinatur.

Alij liquores in facie pustulosa in discolorationibus descripti cum sulphure, vel lacte ex lithargyrio parati; horum loco vsurpari poterunt. Vti & lac virginale in maculis aliis ibidem declaratum.

Inunctiones priuatis partibus adhibentur variæ, quales in discoloratione copiose sunt expositæ, vt in cosmeticis, Vnguentum citrinum, quo facies illinitur potissimum, paratum vti illic descriptum fuit. Dein & in pustulosa rubra facie, propositæ ex variis concinnatæ: Vti & in aliis maculis illic descriptæ, ex succis plantarum, aliisque inde petitis, & ex oleo vitellorum ouorum & tartari aliisve cum helleboro fa-

Itæ; Item ex Sanguine leporis & Fellibus. Inter quæ Capræ syluestr. fel in elephantiafi probat Dioscorid. Oleum Lacertæ etiam hic magni fit.

Aliud ad pustulas valdè efficax vnguentum: R. Aloës 3. iij. radic. Afari 3. j. Hellebori vtriusque an. 3. 8. feminis Staphisagr. an. 3. j. Colocynthid. 3. 8. Fellis tauri q. f. fiat Linimentum: Pro facie.

Ex Argento viuo, in discolorationum vti & in luis venereæ maculis & pustulis enarratæ illitiones, hisce quoque vitiis appositæ, admodum oppitulantur, quæ inde peti possunt.

Aliqui hoc remedium extollunt: Qua duo vel tria macerentur in Aceto forti tamdiu, donec testa consumatur, postea contundantur, addêdo quartam partem illius Aceti, misceaturq; pulvis Thuris: Pro facie inungenda. Si Saponem nigrum vel aliud addas, efficacius erit.

Caustica quibus ad pustulas delendas vtimur, in discolorationibus copiosè fuerunt in macularum cura exposita, ex sublimato plerumque præparata. Vti & Cauteria, quibus in elephantorum vitiis delendis quoque vti possumus.

Vel fiat talis illitio: R. Vnguenti Citrini, olei de Tartaro an. 3. 8. succi Limonum 3. j. Sublimati 3. 8. axung. Serpentis vel Gallinæ 3. 8. fiat linimentum: Pro facie.

Sunt qui Vermes natos in serpente sub terrâ defosso colligunt, eosque siccatos cum Cantharidum æquo pondere, & acri Aceto subigunt, atque in vnguentum redigunt.

Ablutiones faciei fiunt, vt vnguenta aliaq; abluamus, ex decocto Furfuris macri, Fabis conquassatis, illarumve Corticibus, Ciceribus, Oryzâ, Hordeo, Lupinis confractis saltem nō in farinam redactis, ne pasta cum decoquitur, fiat, sicuti & decoctum pro facie illustrandâ, in cosmeticis fieri diximus. Cui decocto & flores Fabarum, Nenupharis addi possunt, & Malum arantium in frusta dissectum prius.

Vel lauetur facies aliis aquis, vt florum Fabarum, vel decoctis, in facie tuberosâ rubrâ, vel fuscâ, in cosmeticis & maculis expositis.

In vlceribus externis, serpentibus, callosis, multa ex illis remediis, quæ pustulis conuenire diximus, iuuare poterunt. Vel vtimur illis quibus alia praua eiusmodi vlcera curari, in doloribus exposuimus.

In pilorum casu, topicis præditiis in pilorum defluuio in deformationibus prolixè expositis, illud quoque vitium auertere studebimus.

In pustulis internis & vlceribus inde natis, narium, palati, faucium, non alia remedia, quàm quæ in cæteris harum sedium vlceribus, in doloribus descripta sunt, quoque adhibentur. Vti & si columella exesa sit, raucedoq; inde proveniat, sicuti in vtroque hoc affectu quoque offensum, procedendum.

In dyspnœa & raucedine, pulmonum affectorum causâ, quæ in illis affectibus cura describitur, etiam hic adhibebitur. Et si narium obstructarum causâ difficulter aërem attrahant, illic quoque, quid agendum, declaratum fuit.

In oculis enascens pellicula carnea rubra, ne pupillam obtegat, & cæcitatem pariat, maturè quantum & quamdiu feri poterit, impediendum, idque non aliâ ratione, quàm eâ quæ in panniculi oculi curâ, in visus læsionibus, tum si aliâs ob causas, tum ob hanc luem eueniat, fuit copiosè descripta. Quod si palpebrarum accedat rubedo, xyrophthalmia vel scabrities, eodem quoque modo in illis, vti in aliis illorum eiusmodi affectibus, procedendum.

Lues Venerea etsi à veneno quodam externo occulto, summeque noxio prodeat, tamen eam curari posse, quotidiana docet experientia, magno tamen cum labore, eoque maiore, quò altius corpori impressa est, diutiusque illi infedit, pluraque & grauiora intulit vitia: E quibus aliqua etiam, sublati per curam cæteris, remanentia, noxas inemendabiles in corpore relinquunt.

Curatio huius luis diuiditur primùm in Generalem, quæ vniuersæ luis, & Particularem, quæ vitiis illius & accidentibus separatim accommodatur.

Generalis curationis, quæ luis omnibusq; illius inde natis vitiis simul accommodatur, sco-

Veneræ
luis
ratio.

381

scopus in eo consistit, vt causam huius luis, venenum scilicet illud, per contagium corpori illatū, rursus ex eo educamus, & morbum inde genitum, qualitatē nimirum seu intemperiem illam noxiam, cutaneis & membranosis sedibus impressam, vitiaque hæc in illis producentem, emendemus.

Hoc autem remediis euacuantibus potissimum perfici, experientia docuit, ratioque quomodo hoc fieri possit, ostēdit, nimirum, quod dum naturam ad excretionem sollicitant, vt sic quoque venenum hoc, vna cum cæteris humoribus atque excrementis, per sudores, deiectiones aliasque excretiones expellatur, efficiant, idque eò citius, si euacuantia illa, vim simul occultam seu manifestam qualitatem, quā virus hoc simul exhauriant atque absumant, possideant, vnde & tunc rectius e corpore educitur, qualitasque hæc noxia inde contracta, citius recedit: Eoque perfectius si quæ hæc præstant, proprietate quadam abdita quam possident, huic lvi resistant illiusque veneni vires retundant, noxiamque qualitatem deleant.

Talia autem remedia, quæ iam dictis viribus lviem hanc sanant, cum nunquam vno euacuationis genere, vel vi saltem absumente aut proprietate solā id agent, curatio etiam huius lvis, secundum hæc operationes commodè diuidi nequit. Quam nos clarioris doctrinæ gratiā, sicuti mox ab ipsis origine, præcipuè curari cœpit, per guaiaci & argenti viui vsum, & postea etiam alio modo sine hisce eam sanari posse inuentum est, sic distinguemus, vt quandoquidem ea cura quæ cum argento viuo fit, ab alia maxime discernitur, ita quoque curationem diuidamus, & Primum eam quæ sine argento viuo, Dein & illam quæ cum eo fit, proponamus.

Sine argento viuo quæ huius lvis cura instituitur, duplex existit, aliaque per Sudores potissimum instituitur, alia verò per purgationes, quā ratione curam quoque diuidemus.

Per sudores quæ potissimum instituitur curandi ratio, alias Intrò exhibitis, alias etiam per Foris adnota perficitur.

Cura quæ per intrò exhibitā sudores efficiuntur, frequentior antiquiorque est cæteris: Perficiturque primum exhibitione eorum quæ Sudores prouocant, quæ si proprietatem quandam, quā huic lvi aduersantur, præterea possideant, tantò melius hoc idem præstabunt. Dein & adhibenda simul atque vsurpanda ea, quæ sudorum hanc promotionem iuant, corpusque interim per inediam simul euacuant: Idque per vitæ regimen conueniens. Et præter hæc præmittendæ atque immiscendæ huic curæ alia quoque euacuationes, præcipuè per purgantia. Quæ curandi ratio tribus hisce modis instituta, licet ob diuturnitatē quam exigit, & labores quos sudando, ieiunando purgandoque sustinent, molestiam aliquam pariat, quia tamen tutior est quàm cæteræ, quæ, si in illis delinquatur, non carent periculo, magis ab ægris expetitur & in vsu est.

Per Guaiaci vsum talis cura plerumque instituitur, quod ab Indis vna cum hac lue ad nos translatus, & ad curationem huius lvis, iam ab eo tempore quo in nostris regionibus primum innotuit, vsurpari solitum est: Idque quia non solum sudores mouere cernitur, sed & proprietate quadam huius lvis vim retundere creditur.

Paraturque in hunc vsum Decoctum sudatorium ex ligno illius, quod acrimoniam bituminosamque odorem in se continet, nonnunquam & simul ab illi adnato cortice, sequentibus modis.

Simplicius & communiter vsurpatum decoctum: R. ligni Guaiaci scobis vel rasuræ à trunco duro, seu stipite à cortice nudo extrinsecus flauo, intrinsecus nigro, tornati vel rasi lb. j. affunde Aquæ purissimæ lb. xij. stent in infusione cooperta aliquandiu in vase testaceo incrustato, postea lento igne prunarum sensim coquantur, donec absumptis duabus, tertia pars superfit, de qua vbi subsederit, quod limpidum est in vitrum effundatur, in eoque clauso retineatur, faccesque ad vsum alium vti dicetur, referventur.

Efficatius erit, si, vti qui maiori diligentia illud decoquunt, facere solent, corticis

cisillius qui separatus vel ligno adhuc adhærens, ad nos quoq; peruenit, friabilisque est, contrufi 3. iij. vel iij. ad lb. j. ligni addas, ficq; priori modo decoquas: Vel si hoc priorive modo lignum solum aut vtrumque vltcrius quàm dictum, decoquas, aut aquæ tantum 3. viij. addas.

Hac ratione paratum, cum non ita medicamentosum gustum odoremve habeat, linguamque & fauces non nihil suauiter pungat, libentius ab ægris bibitur, & consuetudine tandem gratum illis fit: Si tamen delicatuli suauiores illius saporem & odorem expeterent, possent hæc Sacchari & Cinnamon additione illi conciliari. Quod Vini permissione aliqui quoque faciunt, sed cum vinum à ieiunis, illisque qui sudant, diu bibitum, vti cum decoctum hoc bibunt, facere necesse est, noxam capiti adferre corpusque quod sudoribus alioquin incalescit, nimium accendere posset, fatius est illud omittere.

Propinatur hoc decoctum vt bibant, ad quatuor, quinque vel etiam sex septimanas, idq; indies summo mane, dum ieiuni sunt, & adhuc in lecto recumbunt, daturq; prius nonnihil calefactum; mensurâ vnc. vj. ad viij. vsque, sensim ascendendo, & circa finem iterum descendendo. Postquam autem biberunt, bene lecti ad sudorem se in lecto componant contineantque, & cum eruperit, tamdiu eum quamdiu ferre possunt, ferant, illiq; ad horas duas vel vltra morem gerant: Inde q; ab eo diligenter pannis calefactis abstergantur, linteaminaque madida aliis siccis calefactis quoque permulentur, & postquam sic ad se redierint, è lecto surgentes, in conclauì tempus prandij, quod post horas duas vel tres illis apponi debet, expectent.

Repetitur hoc decoctum in robustioribus, tum vt efficacius hæc euacuatio procedat, tum vt citius cura absoluat, in lue præferim altius impressâ; Idque sub vespere, tribus vel quatuor ante cœnâ horis, eadem mensurâ, quo tempore denuò in lecto sudandum est. Quod aliqui post cœnam horis aliquot transactis demum fieri volunt, sed minus commodè, cum nox iniqua

propter sudorem ægro reddatur, & cum manè repetendus, sudorem sudori breuiori morâ interpositâ iungendo, æger admodum debilitetur.

Viuendi rationem dum hac curâ decocti ligni vtuntur, quod atinet, cum admodum exquisita esse debeat, factum vt totam hanc curam diætâ appellare soleant, non quod hæc præcipuum curandi scopum compleat, sed quia lue hac infecti, cum curam subeunt, ne sudores diu continuati, ipsos lue hac infectos esse prodant, cum domi residere cogantur, se diætâ conuenienti aliquandiu vti velle prætendentes, eo modo infectionis suspicionem declinare prudenter conantur. Quæ diætâ seu viuendi ratio, in sequentibus potissimum strictè obseruanda.

Ær in quo versatur æger, dum hac curâ vtitur, propter sudores vt eos euocet, nec progressos repellant, calidus sit, foco vel fornace calefactus, in conclauì vel hypocausto, in quo toto curationis tempore bene ab ære externo munito & occluso, se continere illicque dormire & sudare debet, nec libero æri, nisi ille anni temporis ratione calidus sit, & tunc quoque solum circa meridiem se exponere.

Cibus dum cura hæc administratur, sit parcus admodum, & solummodo eâ quantitate, quæ viribus, ne penitus collabantur, sufficiat, quique euchymus & simplex nec varius sit: Idque vt sic quoque per hanc inediâ, aliqua etiam fiat humorum excrementorumque absumptio, minorq; tum ob eam, tum cibum illum exquisitum, illorum prouentus, vnde cura quæ per sudores corpus exhaurit, melius procedit, minusque natura in illis promouendis, quàm si ciborum copiâ grauaretur, & ad concoctionem illorum diutius reuocaretur, impeditur. Ob quam causam sedulo eiusmodi cibandi ratio, strictèque in cura hac obseruatur, vt in die solum bis vel semel si ferre possint, comedant, & quidem citra satietatem & ne vel minimum grauentur. Debet autem cibus esse simplex: duorumque saltem generum ferculis vel ad summum trium in una mensa contenti sint; Atque vt euchymus minimeque excrementitius sit, tantum

385

tantum carne & pane fructibusq; quibusdā fruuntur, sequenti modo administratis.

Caro gallinarum plerunq; in vsu est, præcipuè pullorum, quæ elixa cum suo iure datur, vel etiam adultiorum, cum iusculum inde, quo maximè delectantur, sapidiùs & efficacius fiat: quartam partem illarum pro vice tantum dando. Cuius loco & Vitulina, Hœdina, Veruecina tenera caro sumi, ad ʒ. iij. ad summum: Vel per vices etiam Columbarum, Perdicū, Animum pullorum, eā quantitate solum caro assa etiam cum alia permutteri poterit: Oua sorbilia, vel vitellum illius solum, si tantum de carne detrahatur, illis quinetiam permittuntur.

Panem ex consuetudine ipsis comedere licet, cuius ʒ. iij. cum tenuissimus victus esse debet, sufficiunt; partim cum carne, partim in iusculis eum sumendo. Qui ex farina pura Zeæ vel Triticī pistus, parumque fermentatus & probè coctus esse debet.

Fructus non excrementitij, & proin siccati pro secundā mensā, sed pauci vsurpari possunt, & qui non admodum impleant aut grauent, vt sunt Passulæ, Pruna, Ficus. Si multum nutriant, vt Amygdalæ, tantum illis quantū de pane deditur, concedi poterit.

Condimenta quod concernit, salsa omnia vitanda, & si fieri potest, nec caro nec panis salita vel parcissimè esse debent, non tam quod sudores (vti docent) sal impediāt, sed quia falsi cibi sitibundos eos, ex sudore alioquin tales, ampliùs reddant, & ad potum immoderatum impellant, magisque calidos & inquietos efficiant. Quamobrem & aromaticum vsus vel omittendus vel contemperandus. Acidi fructus, nisi ad calorem mitigandum dentur, improbantur.

Potus in hac diætā, cum citò digeratur, non adedò erit subtrahendus, immò & liberaliùs, si præsertim admodum sitiant, concedendus, cum ille citra grauamen admodum reficiat, & sudoribus vehiculum præbeat, quare & intra cibandi tempus, tum & extra hoc, si sitis vrgeat, bibere ipsis, nisi aliud quid obstat, licebit. Verum non vinum, cum si consueverim illud assatimque biberent, corpus accendendo, caputque & nervos feriendo noceret, & proin non nisi refectiōis causā

in imbecillioribus, haustus illius aliquando puri vel diluti conceditur. Illiusque loco aqua cocta, bibenda ipsis præscribitur, eo modo parata, ne cruditate sua noceat, & sudoribus simul feliciùs mouendis, adiuumentum adferat. Quod sic præparata feliciùs præstabit: Si Guaiaci semel iam decocti remanens scobs cum Aquæ nouæ lb. xij. vel viij. ad medietatis vsque vel ultra consumptionem decoquatur, decoctaq; aqua inde coletur. Quā & liberaliter tam in mēsa, quā extra hanc siti vrgente possunt bibere, illique assuescere, cum & decoctum hoc, vt de primo dictum, non adedò ipsis displicere possit, quin si aliquandiu eo vtantur, tandem sapor illius ceruissæ alicuius instar iis placeat. Si tamen & huic gratiam aliquam addere libeat, poterit hoc Cinamomo illud leuiter aromatizando perfici: Vel Saccharo aut Passulis incoctis, dulce nonnihil reddi. Alia multa immiscere, vt liquiritiam & similia, cum medicamentosis inde sapor illi cōcilietur, quem plerique fastidiunt, superfluum videtur, nisi Vinum huic addere, vrgente summa debilitate, rariùs tamen illis permittatur.

Somnus virium causā, non tantum noctu, sed manè atque ante cœnam, cum sudant, illis conuenit, cum non solum sudores promoueat, sed & in hac quiete eum faciliùs perferant.

Exercitia ambulando in conclauī obeat; Frictionibus vtatur, præsertim post sudores, cum ab illis abstergitur: Pectinet caput similiter, pannis fricat.

Quod reliqua attinet, vt alius respondeat, quæ hoc ieiunio & hisce euacuationibus facile constipatur, promouendum. Caveat à Venere, animum Lusu, Musicā, Colloquiis recreet.

Purgationes aliæ humorum atq; excrementorum crassiorum, per viam cōsuetam, aluum scilicet, huic curæ, quæ per sudores vsu guaiaci fit, semper præmitti debet, nonnunquam & per vices immisceri, eoq; magis si hisce redundant, vt sic corpore puriore reddito, reliquorum actio melius procedat, neque horum illaue impediatur, & cum de morbi causā semper aliquid demat, sic quoque operatio ipsorum adiungetur. Hæc autē

purgantia, cum nullus certus humor, ad quem referri possent, hanc luem, ut dictum, procreet, corporis constitutioni potissimum, prout illa se habet, atque excrementis & humoribus, prout quantitate vel qualitate peccantia se offerunt, accommodantur sequenti modo.

Eluuntur primum per deiectiones obuiæ facies, idq; Clysmate aliquo emolliente, detergente ablutenteque & stimulante iniecto, qualia passim describuntur: Vel Supposito-rio podici intruso aluum irritante.

Vel hoc per exhibita minoratiua perficitur, dando Calsiæ pulpam, Mannam, decoctum aliquod Leniens, infusum Rhabarbari, syrupum Rosarum solut. de floribus Persicorum, Catholicon, aliaque Elestuaria mitiora: Vel Pilulas leuiiores, aut Tabulas, qualia in aliis quoque affectibus hinc inde descripta sunt.

Hiscæ præmissis, si plethora adsit, sanguis & venâ brachij sectâ emittatur, quod in pituitosis aut in macilentis corporibus, nisi consuetudo hoc etiam exigit, non adeo necesse est. Præparatio humorum deinde erit instituenda, eo modo prout eos redundare coniicimus, sumendo si biliosi vel acres sint, syrupos Fumariæ, Lupulorum, Buglossi, Capil. Veneris, Endiuizæ, Cichorij, Violarum, Pomorum redolentium, similiumq; decentem quantitatem, eosq; cum aquis eiusmodi, uti & Scabiosæ aliisve diluendo, sicq; ad aliquot dies ante purgantium usum, Iulepos hoscæ propinando.

In pituitosis atque doloribus addimus syrupum de Stœchade, vel illius loco de floribus Lauandulæ, qui admodum est efficax, paratum, de Betonica & Hysopo; item Mel rosatum similesque miscendo aquas, etiam harum plantarum: Vti & Calamenthæ, Melissæ, &c. & in doloribus circa ossa, aquam Iuæ & Primulæ.

Eadem præparatio decoctis de nouo paratis ex iisdem plantis fieri poterit, additis & aliis interdum.

Aromatisamus eiusmodi Iulepos vel Decocta Cinamomo aliisve gratis & vtilibus aromatibus: Vel speciebus compos. Triasantal, Diarrhodon, Aromatici rosati aliis.

ve. Vel dando tabulam vnam harum, statim post eorum assumptionem.

Purgamus & præparamus eadem operâ frequentius, idque admiscendo præparantibus purgantia mitiora in debilibus & biliosis, aut fortiora in robustioribus & pituitosis, hæc humoribus quos redundare videmus, accommodando, & potissimum ea quæ serofos, falsos acresque humores educunt, si maculæ, præsertim pustulæ & vlcera adsint, vsurpando, qualia in variis morbis, inprimisque in scabiei generibus exposita sunt. Vel si dolores circa ossa præcipue molestant, qualia etiam in articulorum morbis à sanguine & serofis humoribus profectis, competere, in illis ostendimus.

Apozemata seu decocta talia in hanc rem per dies quinque, sex vel plures exhibentur. Qualia hoc pacto parari possunt: R. herbarum cum radicibus sequentium, Cichorij, Endiuizæ satiuorum aut syluestrium, Dentis leonis, Oxylapathi, Acetosæ, Buglossi vtriusque; dein herbarum Capillarium, Scabiosæ, Chamædrios, de omnibus vel pluribus paucioribusve ad M.v. vel vj. herbarum Fumariæ, Lupuli, Mercurialis ana M.j. radic. Alparagi vel Rusci, Graminis ana ʒ.ij. florū Cordialium P.ij. florum Rosarum rubrarum P.ij. florum Tamaricis P.j. Prunorum numero x. Passularum ʒ.ij. Sebesten vel Iuiubar. n.xx. quatuor sem. Maiorum, sem. Anisi an. ʒ.ß. sem. Fœniculi ʒ.ij. fiat decoctio omnium in Aqua, vel decocto prius facto ex ligno Guaiaci colato, uti illud fieri debere ad sudores mouendos mox demonstrabimus, ut sic huic lui, uti putant, magis approprietur, atque in colaturæ s. q. infunde de nouo foliorum Sennæ ʒ.ij. vel iij. Polypodij, semin. Carthami ana ʒ.ij. Epithymi ʒ.j. fiat iterum decoctio eousq; donec decens quantitas remaneat: Quæ, Saccharo in fine decoctionis addito, vel Melle vel Sapâ dulcorabitur, & puluere Cinamo. vel aliorū aromatizabitur.

In humidioribus & pituitosis naturis, sequentibus prædictis addere possumus, ut radicem Acori veri vel Galangæ ʒ.ß. j. rad. E-nulæ cum foliis tenerioribus, Betonicæ, Ma-ioranæ ana M.j. florum Rosmarini, Lauan-dulæ vel Stœchados. ana P.j. summitatum

Thymi P. j. β. Ficum numero xij. seminum Carui 3. dein & illa quæ ichores purgant, Cortic. Sábuci vel Ebuli 3. j. β. atq; validiora interdū purgantia prioribus adicere, veluti Agarici vel Rhæbarbari 3. β. Turbethi 3. iij. Item Soldanellæ 3. ij. Vel in robustis admodum, vti ferè sunt, qui hac lue laborant, Hermodactylorum 3. ij. in ossium præsertim dolore: Vel Colocynthis pulpæ in panno ligatæ 3. β. nam potenter operatur, aut Hellebori nigri 3. j. β.

Hiscæ quandoque & alia addunt, vt si capitis & ossium adsint dolores, alia capiti & artubus appropriata: & nonnunquam quæ venenis resistunt, vt Tormentillæ radicem, & similia.

Possunt & in scabie descripta decocta vsurpari: Veluti illud quod R. radic. Lapatij 3. iij. Graminis, &c.

Vel Vina purgantia exhiberi, quale quoque ex simplicibus quibusdam in decocto priore descriptis, in vino infusis fieri poterit: Vel illud quod in scabiei cura proponitur, propinari.

Purgamus cathartæcis fortioribus vnâ vice, post præparationes factas simplices, vel etiam post alias quæ præparant & simul purgant, si non ab illis sufficienter corpus purgatum censeamus, idque variis modis, vel permiscendo vltimæ exhibitioni, electuariū aut infusum aliudve purgans: Vel Priuato quodam decocto vel potione, electuario, tabulis pilulisve, simili modo obseruando, an cum maculis, pustulis, vlceribus doloribusve hæc lues se offerat, eoque cathartica dirigendo. Quæ plerique aliàs melancholico humori expurgando accommodant, qui luis causam illi tribuunt, & proin præ cæteris, Confessionem hamech in hoc casu probant: Vti & Diasenam; Pilulas item ex lapide Lazuli pararas, de Fumaria, aliaque in melancholicis morbis exposita. Quæ & nos in robustioribus, cum biliosos & acres cuiuscunque generis humores educant, concedimus. Et similiter alia cathartica in scabiei cura exposita, hic quoque conuenire existimamus, vti si dolores circa ossa sint, pilulas de Hermodactylis, Foetidas aliàsve Artheticas, aliaque purgantia in arthritide ex-

posita. Aliaque multa in aliis morbis descripta, tam quæ Scammoneam, quam Colocynthidem recipiunt, quibus etiam indifferenter plerunque Practici, sicuti ex ipsorum scriptis videre licet, etsi vnum aliquem humorem educere cogitent, vtuntur.

Sed & citra præparationem præmissam, antequam illis quæ per habitum corporis euacuant, vtantur, Empirici & Chirurghi corpora mox purgant, citra quoque cathartæcorum delectum, cui nam humori educendo conueniant, modò corpus egregiè ab illis purgetur, copiosæque inde deiectiones sequantur. Vnde & quæuis ac præsertim fortissima ex illis in robustioribus statim exhibent. Atque inter cætera, Vinum in quo pomum Colocynthis per nocte infusum maderit, illis admodum in vsu est. Alij Vinum in quo Lathyridis seu Cataputiæ minoris grana aliquot macerata sint, propinant: Vel grana ipsa aliquot deglutire iubet: Vel Helleborato decocto vel infuso mox ab initio corpus purgant: Quale in scabiei curâ fuit descriptum: Vbi & quâ ratione Empiricus scabiem aliosque morbos pertinaces, Stibij decocto curarit, fuit expositum, quod hic quoque conuenire possit: Vti & imprimis in multis peruersis morbis competens purgatio, quæ ex foliis Hellebori nigri veri, aridis puluerisatis & cum Aloë in formam pilularum redactis, magno successu fit.

Post eiusmodi totius corporis euacuationem factam, corpus sequenti die vno vel etiâ altero reficimus, exhibitione conseruæ Buglossi, Borriginis, Rosarum, Stæchados, Rosmarini, Maioranæ; vel Theriacâ aut Mithridato, aliisve Antidotis. Inter quæ ex ligno Guaiaco parata, hic potissimum conuenire existimant, illiusq; puluerem, vel cum aliis conseruis aut electuariis mistum exhibent: Et Chymici Sal inde paratum magni faciunt: Alij simili modo Zarsæ parillæ puluere vel Sale vtuntur.

Vsuales purgationes interdum dum cura hac p sudores, ex vsu decocti Guaiaci cõcitatos vtuntur, si crassiora adhuc recremèta superesse videamus, & maximè constipati sint, certis dierū intervallis, in quib. à cura quiescunt, instituuntur, aliàs iterum repetuntur.

Fiunt ex decoctis prædictis in formam syrupi, vt conseruari possint, redactis: Vel syrupis vsualibus in scabie descriptis, inter quos & helleboratus est syrupus de Pomis, aliusque à Montano annotatus, & ex succis decoctus: Vel fiunt ex Eleſtuariis simul permistis, Pilulisve vsualibus passim descriptis.

Ex aliis sudatorijs cura præter eam quæ per guaiacum fit, adhibito quoque vitæ regimine decenti, & purgationibus instituitur, illis nimirum, quæ vti ad alios multos morbos diuturnos vel pertinaces, ita & ad curationem huius luis vsurpantur: & licet cum guaiaco nullam habeant in sapore vel odore conuenientiam, tamen proprietatem quoque, quâ huic lui resistunt, aliquam habere existimantur: Vt sunt Zarſa parilla & China dicta, ab Indis etiam perita, & post guaiacum primum cognita, hisque vsibus accommodata.

Ex Zarſa parilla, Americana planta, sic ab Hispanis, quod smilacem asperam referat, vel eadem cum illa sit, quam illi zarſam parillam, id est Rubum viticulam vocant, nominatam, sudatorium ad lueem hanc sanandam, quod nunc ab annis aliquot valde in vsu est. Atque ex decocto illius radicum, quas copiosas multis flagellis longissimis dispergit, sapore exiguo, odore nullo præditis, paratur sequenti modo.

Sumuntur Zarſæ parillæ, in talleolos breues incisæ ʒ. iij. Aquæ puræ lb. xij. macerantur inuicem aliquamdiu, vti de guaiaco diximus, & decoquantur eodem modo, vt tertia pars relinquatur, quæ colata ad vsu referuatur. Hæc media est illius efficacia, quam si augere minuerēve oporteat, plus vel minus radicum addendo vel coquendo, perficitur.

Bibunt hoc decoctum per septimanas aliquot mane, nonnunquam & vesperi, sudantque corpore prius ab initio purgato, intermedijsque aliquibus vicibus, eo penitus modo, qui in guaiaci decocto vsurpando describitur.

Regimine similiter eodē adhibito; quod ærem concernit, cibumque & potum, qui tamen vti illic ex remanētia guaiaci scobis, sic hinc ex residuis radicum talleolis semel

coctis, denuò in noua aqua recoctis paratur, atque bibitur. Quod somnum aliaque attinet, eadem quoque hinc vt illic obseruanda.

Ex China, quæ ab Indiæ orientalis Chinâ dictâ regione aduehitur planta, similiter sudorifera potio ad lueem hanc curandam fieri solet: Ex decocto nimirum radicis illius crassæ & tuberosæ subrubræ, & penitus insipidæ, vnde ἀπὸ τοῦ, hoc est, sine gustu appellatur; Quod decoctum subrubrum nonnihil, non ingratum, nec ventriculo aduersum, sic paratur.

Radicis Chinæ non cariosæ aut levis, sed integræ & ponderosæ ʒ. iij. secetur in orbiculos seu laminas tenues, affunde Aquæ lb. xij. vel viij. solum, si efficacius esse velimus, macerentur & decoquantur, eadem planè ratione, vti de prioribus diximus, feruetur colatura diligenter obturata, quia facile acescit: Quod ne, si diu asseruetur, fiat, media saltem pars coquenda, eaq; mox absumptâ, iterum altera.

Propinatur similiter hoc decoctum vt reliqua sudoresque promouentur, ægerque eodem omninò modo & prius, ac si necesse sit, postea quoque purgatur, & in viuendi ratione gubernatur: Potus ordinarius proſiti ex eadem radice prius coctâ, rursum recoctâ, vti de reliquis dictum, paratur: Quæ & tertio coctâ vires adhuc aliquas retinet, & potu deficiente, interea donec alius paratur, bibi poterit.

Est & alia præter iam dictas nouiter primum inuenta, & ab Indis quoque petita, Sassafras dicta arbor, ex qua sudatorium etiam fit, vti ad curationem aliorum quorundam morborum, sic & huius luis vsurpari solitum. Quod ex decocto ita paratur.

Sumendum radicis vel ligni cum cortice assulatim confacti pondus, quantum chinæ esse debere diximus, ʒ. iij. nimirum, & cum lb. xij. vel viij. Aquæ eodem modo vnâ vice vel diuissim coquendum, atque eadem mensurâ, adhibitaque curâ bibendum. Quod cum grati odoris & saporis sit, eò lubentius sumitur, cum nec ventriculum perturbet, nec flatus copiosos gignat.

Mista ex duobus vel tribus aut quatuor prædictis, fiunt decocta sudatoria ad hanc curam.

ram: Frequentius ad scobis vel rasuræ Guaiaci ℥.ss. addendo ꝑ.ij.℥. vel ꝑ.ij. Zarfæ & cum Aquæ ℥.viij. coquendo, vti priora decocta.

Vel loco zarfæ parillæ ad Guaiacum, radic. Chinæ ꝑ.ij. addimus.

Vel & Guaiacum & Zarsam parillam, & Chinam hoc pondere simul miscemus; coquimusque: Aut Guaiaci pondus minui-
mus, reliquorumque augemus.

Quibus vel duobus vel tribus sæpè Salsas-
fras quoque additur, tum quia idem præstat,
tum quia gratum illis odorem saporemque
conciliat.

Quæ qualiacunque decocta pari mensu-
râ & ordine, regimineque vt in cæteris vsur-
pari debent: Potusque ordinarius ex horum
resistentiâ iterum decoquendo, vt de cæte-
ris dictum, parari.

Composita eiusmodi decocta, ex pluri-
bus etiam aliis cum eo decoctis, aliquando
facere solent; frequentiusque addunt quæ-
dam decocto Guaiaci, nonnunquam & Zar-
fæ parillæ; rarius Chinæ & Salsasfras deco-
cto, ne gratiam amittant. Aliquando & in
mistiis iam dictis, adduntur quædam ob va-
rios vsus; vt quæ calorem quem Guaiaco
inesse putant; contemperent, immiscendo,
Intybacea, Lactucas similiaque. Verum cum,
licet acrimoniam leuem habeat, non tamen
tantopere calefaciat; vt corpus inde accen-
datur, & si hæc qualiscunque illi dematur, mi-
nus commodè sudores promoueat, vti nihil
utilitatis, sed potius impedimentum inde se-
quitur, sic ingratus gustus inde conciliatur,
vt decoctum fastidiant. Alias quæ calidita-
tem decocti augere possunt, vt melius sic su-
dores eliciat; radices calidas, vt Arum, Enu-
lam & Aromata, vti & Aperitiuas radices
vel herbæ, Melissam, Serpillum, Thymum
aliasve odoratas, semen Nigellæ addunt:
Alias quæ capiti & artubus, si illic dolor, ap-
propriata sint: veluti Betonicam, Iuam, flo-
res Rosmarini, Stechados; Alias etiam quæ
sanguinem mundum simul reddant, vt Fu-
mariam; Lupulos, Buglossum, Sambucum,
Ebulum, Iridem aliaque eiusmodi. Præter
quæ, vt melius corpus vsu decocti huius
exiccet, etiam Succinum, Thus, Benzoi-
num miscent.

Quæ permissione decocti inualidius in-
terdum, vel vt alias vires consequatur, ma-
ximè verò vt minùs ægro sapiat, nauseamque
illi pariat, & sic continuum illius vsu ferre
nequeat, efficiunt. Præsertim si & Gentia-
nam summè amaram, & Mumiam tetro o-
dore præditam, vti aliqui volunt, simul de-
coquant, abominabile hoc decoctum red-
dunt. Quod si tamen vel caloris contempe-
randi, vel sudorum promouendorum, vel al-
terius rei (vti dictum) gratiâ, aliquid huic
decocto addere placeat, minùs ingratum
reddetur, si in aquis illarum plantarum, quæ
illud præstant, vel saltem aliquâ illarum quan-
titate, decoctio hæc fiat.

Præter hæc etiam purgantia tam leuiora
quam efficaciora, cum Guaiaco, dum coqui-
tur, multi miscent, veluti Polypodium, Asa-
rum, Epithymum, Carthamum, Agaricum,
alia quoque amarissima, vt Aloën: Im-
primis si in artubus dolor sit, Hermodacty-
los. Nonnunquam & validissima, vt Vera-
trum & Colocynthidem. Quæ decocta pur-
gantia, si in cura huius luis, quæ per sudores
fieri debet, loco purgationis circa initium, vt
corpus prius purgetur, præmittantur, vel per
interualla vsurpentur, locum habere possunt.
Vel si curam hanc non per sudores, sed pur-
gationes potissimum perficere velimus, his-
ce etiam decoctis, loco eorum, quibus in cu-
râ sic institutâ aliàs vtimur, vti poterimus, &
sic continuò vel alternatim, vti illic dictum,
corpus ad finem vsque purgare.

Aliarum quoque plantarum decocta, præ-
ter ea quæ ex guaiaco, zarsâ parillâ, chinâ &
salsasfras, exoticis lignis, radicibus & corti-
cibus ipsorum parantur, ex aliis etiam qui-
busdam simplicibus, idem efficere vel omni-
no vel aliquomodo, experienciâ compertum
fuit; vnde quoque quod & hæc & illa, sudo-
res potius mouendo, quam occultâ vi in cu-
ratione huius luis operentur, constare vide-
tur. Talia autem sudatoria ex sequentibus
decoquantur.

Ex lignorum quorundam, vt Buxi flau-
i, & duritie guaiaco simili, rasurâ tale decoctum
factum, idem efficere docet, non tamen, cum non
vt guaiacum gratum sit, integrâ libram ad co-
cturam, cum ℥.xij. aquæ, sed minùs sumendo.

Ex Iuniperini ligni admodum odorati & nonnihil acris decoctione, pauperes lue hac infectos aliquos sanauit. Sumendo scobis vel rasuræ illius non tantum, quantum guaiaci, cum efficacius ferè sit, sed mediam vel tres saltem illius partes, & cum ℥. ij. aquæ, eodem penitus modo vti guaiacum coquendo & vtendo: Cui & Guaiacum aliæve supradictæ radices addi possunt; Egregium sanè sudatorium & innoxium, etsi aliqui ex Dioscoride, lignum iuniperi exitium parare, demonstrare velint, quod tamen non verum esse, illius frequens vsus approbat, mendumque esse illum Dioscoridis locum, non solum mihi, sed & aliis videtur.

Ex Cedri, Cupressi, Sabinæ bacciferæ lignis odoratissimis, & Agalochi Rhodij rosarum odorem spirantis, decoctione simili modo factâ, idem fieri posse, non dubitamus: Vti & ex aliis, vt de Terebinthi ligno scribunt.

Ex radicibus quibusdam decocta, vti ex zarsa parilla & china, pondere eodem, vel minori, si efficaciores sint, cum aquæ ℥. xij. facta, idem præstare à quibusdam docetur: Veluti ex radicibus Dictamni, Myricæ, Cannarum, Petasitidis, Tormentillæ, Acori veri, Enulæ: Et efficacibus radicibus Iridis, Cyclaminis.

Vel ex herbis quoque, vt Asarinâ, Aspleno, Scordio & Herniariâ.

Aut ex seminibus: inter quæ semen Iuniperi efficacissimum: Cuius decoctum sic factum, cum admodum à semine saporem acrem & odorem concipiat, erit & præ cæteris in cura hac per sudores faciendâ efficacissimum.

Propinquantur & præter decocta enarrata in lue hac, per sudores curandâ, alia ad bibendum, quæ idem efficere, vel aliquomodo existimant: Veluti Vina sudatoria per decoctionem & infusionem facta, ad curationem huius luis in debilioribus & frigidioribus nonnunquam vsurpantur; Quale hoc mellitum & aromatizatum gratumque ob id: ℞. radic. Galangæ vtriusque ℥. ij. Zingiber. ℥. β. Cinamomi ℥. ij. β. Gariophyllorum ℥. j. β. Nucis Mosch. vel Maceris ℥. j. Schœnanthi ℥. β. conquassata injiciantur in dolium, addendo florum vel summitat. Rosmarini p. β. affun-

de Vini albi mediocris mensuras x. Mellis ℥. j. vel plus, seruentur obturata ad vsu: De hoc vino bibat ℥. iij. vel iij. vel plures, singulis matutinis, & fudet, perseverando in vsu illius ad multos dies.

Efficacius sudores mouebit, si granorum Iuniperi quartarium j. vel plus addas.

Vel sic paretur: ℞. radic. Iridis, Acori veri ana ℥. iij. Galangæ ℥. j. radic. Asparagi ℥. j. β. radic. Enulæ ℥. β. radic. Cyclamin. ℥. ij. herbarum Thymi, Scordij, Dictamni Cretici, Herniariæ ana M. j. flor. Rosmarin. Stœchad. vel Lauandul. Chamomill. ana P. j. gran. Iuniperi quartarium j. β. Cinamom. ℥. ij. Gariophyll. ℥. j. Maceris ℥. β. Schœnanthi ℥. ij. conquassata ponantur in dolio, adde rasur. Guaiaci quartar. j. vel plus, Ligni Sassafras ℥. j. infunde Vini mensur. xij. vel plures: Vtatur per dies triginta aut amplius.

Aliud valde efficac, quo solo se hanc lue sanasse aliqui profitentur, quod ℞. foliorum Plantaginis, Oleæ vel Myrthi, Millefolij recent. ana M. j. radic. Cyclaminis ℥. ij. vel plus in robustioribus, Vini albi mediocris ℥. v. Mellis ℥. β. vel in senioribus paulò plus, bulliant ad consumpt. medietatis. Dentur colaturæ ℥. vj. vel vij. fudet. Continuet per dies 25.

Aquæ stillatitiæ ad sudores mouendos, sed vix solæ ad curam huius propinquantur, cum ventriculo minùs conueniant, aliquando tamen illis quoque etiam eam sanare volunt, vel reliquias huius luis quæ remanserunt, extirpare.

Quod maximè præstabit sequens aqua: ℞. rasuræ ligni Guaiaci ℥. j. β. corticis eiusdem puluerisati ℥. β. ligni Sassafras ℥. ij. radic. Graminis & Asparagi ana ℥. β. radic. Enulæ ℥. iij. radic. Cyclaminis ℥. j. β. foliorum Cardui benedict. Pulegij, Acetosæ ana M. j. florum Buglossi vtriusque, Rosarum, Rosmarini, Chamomillæ odoratæ ana P. j. Cinamomi ℥. β. Nucis moschat. ℥. ij. incendantur omnia, adde Theriacæ selectæ quartarium j. Vini generosi, Aquæ Lapatij & Cichorij ana ℥. ij. destillentur: Dentur huius aquæ ℥. iij. vel iij. dissolutæ cum aquis conuenientibus, vel decocto Guaiaci, aut alio sudatorio, vt Milij. Hisce Polypodij quar-

quartar. j. Epithymi ꝓ. j. aliqui permiscant.

Sunt & alia varia sudatoria, tam decocta quam vina, aquæ stillatitiæ, electuaria alia ve formæ, aliis morbis curandis accommodatæ, quæ & hîc fortè si sæpè repeterentur, aliquid præstare possent: qualia in sudore supresso alibique in variis morbis, qui sudorem exigunt, describuntur: Imprimisq; in curâ febris pestilentialis, in qua illa sudatoria, quæ pestis veneno simul resistunt, etiam huius luis veneno aduersari creduntur, & sic non solum sudores mouendo, sed & veneni huius vires infringendo simul opitulari. Vti inter reliqua aquæ etiam sunt Theriacales illic explicatæ.

Regimen quod attinet, quando eiusmodi sudatorijs ex Vino, aquis alijsve modò dictis paratis vtuntur, idem ferè obseruatur, quod & in alijs obseruari diximus, tum vt in conclauis calido se contineant, cibo paucò & simplici vtantur, & pro potu ordinario, aquam cui Guaiaci vel Zarsæ parillæ portio aliqua incocta sit, bibant. Vel si vinum sudatorium illud supra dictum sit gratum, hoc quoq; in prandio & cœna vt possint, quod si nimium accendat, prius diluendum. Sin metuendû ne sudatoriorum horum calidorum vsu, hepar aliæve viscera nimiam incalescat; exhibitis per vices conditis, syrupis nonnihîl refrigerantibus calor temperari; Dein ne aliud supprimatur, huic quoq; prospici; Et vt cura melius succedat, corpus per vices purgari poterit.

Foris admotis cura quæ per sudores sine vsu argenti viui præcipuè instituitur, vix dum perficitur, sed nonnunquam non solum Aëre calidiore, in quo dum in lecto sudant, moram trahere seq; continere debent, vti in vitæ regimine ostendimus: sed & Balneo adiuuatur; Siccoq; imprimis ex aëre in hypocaufto vel labro angusto calefacto, illicque coercito parato: quod, cum corpus in eo conclusum calefaciendo & rarefaciendo, atque ad superficiem sic humores attrahendo, sudores prouocet, ad curam huius luis interdum adhibetur. Quam & fortè, cum vnâ cum illis luis huius semina simul educat, & absumat; diu continuatum, si præsertim altius radices non egerit, curare pos-

set. Verum cum vix hoc solum administratum sufficiat, si eo vti lubeat, tunc potissimum locum habebit, cum sudores per exhibita commoti in lecto minùs promptè succedant, tunc enim balneum ingredi, illiusq; calore sudoribus viam aperire, & ad eos corpus sic disponere, semel iterumve, donec natura eò sponte tendat, licebit. Præcipuè verò balnei sicci in fine curæ huius luis vsus existit, vt per illud, si quid in superficie corporis remanserit in pactum, penitus absumatur, sordesq; si quæ adhæserint, sudoribus qui eas abluunt, auferantur. Tuncque etiam in balneo sicco ablutio, quæ prius nec concessa, nec necessaria erat, Lixiuio, Vino & Aquâ conceditur. Cæterum non tantum in cura luis huius, balnea sicca, vt rectius perficiatur, adhibentur; Sed & antequam illius cura suscipiatur, si de eâ, quia signa non adeò aperta, sed obscura solum se patefaciunt, dubitetur; balneis eiusmodi sudatorijs aliquoties iteratis, latentia huius luis semina ad superficiem euocando, ex maculis, pustulis aliisque vitijs si quæ tunc se prodant, luem hanc cognoscimus, de eaque eò magis certi sumus.

Quæ balnea quâ ratione administrari debeant, cum vulgò cognitum sit, non necesse est vterus explicare. Vt tamen sudores potentius educant, ante ingressum, ægro Theriacam vel Sudatoria quædam propinamus; Eumque quamdiu bene ferre poterit, in eo moram trahere sinimus: Et postquam egressus fuerit, vt ab aëre frigido diligenter muniatur, curamus.

Humidum balneum quod ex Aqua diuersimodè naturâ vel arte calefactâ concinnatur, ad curationem huius luis vix dum vsurpatur, cum madore suo plus obesse quam prodesse experientia docuerit.

Sunt tamen, qui licet balnea aque dulcis, vel alia nimiam adstringentia improbent: Aliqua tamen, quæ admodum rarefaciant, vel validè attrahunt, vt eorum, quæ in cura per sudores operantur, actio adiuuetur, si minùs commodè succedat, vt prius in balneo humido ex iis præparato aliquandiu feedeant, permittunt. In quibus calidas herbas, flores, & semina, omnis generis, imprimis Ebulum, & Enulam, cum toto

& Arthemisiā, & flores Chamomill. Meliloti, gran. Iuniperi: Dein & ligni Guaiaci vel Iuniperi rasuram decoquunt. Quæ tamen cum non adeò sint tuta, nec multum proficiant, rectius omittuntur. Sed & Thermarum quarundam potenter exiccantium vsum, in certis huius speciebus conuenire aliqui docent, quas tamen nullo modo iuuare, sed plurimum nocere, sæpè obseruauimus: Nisi fortè hisce vel aliis etiam balneis, post curam prius exactè absolutam, ad refectiōnem aliquam corporis, vfu tot medicamentorum defatigati, & membris robur addendum, vti velimus; tuncque prioribus artificialibus balneis, quæ artibus appropriata sunt, veluti Iuam, aliaque similia in articulo- rum doloribus explicata, addimus.

Per purgationes quæ potissimum instituitur curandi ratio, non adeò frequēs, cum non ita dudum inuenta sit, existit. Perficiturque corpus sæpius vel validè admodum, exhibitione medicamentorum purgatiū expurgando; & per vices reficiendo. Solaq; hac ratione lues hæc interdum sanatur, vt non opus sit aliis insuper per sudores vel ex- punctiones, aliòve modo factis euacuationi- bus. Aliàs verò aliæ maximè, quæ per sudores fiunt, simul in curā adhibentur, præcipuè si deiectiones quæ per aluum fiunt, longiores vel violentiores, vti si per eas solas curari de- bet, ferè requiritur, ferre nequeant, tūc post purgationes aliquoties repetitas, sudores exhibitione decocti Guaiaci, aliòve modo, diebus aliquot mouemus, indeque rursus purgationes molimur, & sic vice versâ, donec morbus integrè curatus sit. Aliquando & medium curationis tempus purgâdo, reliquum sudores prouocando absumimus. Idq; cura quæ per sudores, exhibitione præcipuè sudatoriorum, perficitur. Sed & extrinsecus balneis siccis in hanc rem aliquot vicibus vtitur, eaque purgationibus hisce quando ab illis quiescunt, intermiscemus.

Ad eiusmodi autem purgationes molien- das, non certa humori alicui saltem destina- ta cathartica seliguntur, cum qualis hanc luem efficiat, ignoretur, sed quæuis naturam ad excretionem hanc sollicitata, hic locum habere possunt, cum illa excitata, eos qui

redundât potiùs, quàm alios expellat. Quod & plerosque Medicos, etsi humori vel me- lâcholico vel pituitoso aliòve, quem causam huius luis statuunt, hæc accommodari de- bere doceant, nihilominus tamen facere vi- demus, & promiscuè cuiuscunque generis catharticis vti, eaque inuicem commiscere. Quæ nos maximè pro corporis temperaturâ & constitutione, & pro virium ratione, mi- tiora in debilibus, fortiora in robustiori- bus vsurpando, & prout vel maculæ, pustu- læ, vlcera dolorēsve se offerunt, sicuti in eâ purgatione faciendâ, quæ in cura per sudo- res fit, obseruari quoque debere, diximus, dirigenda esse censemus: Quæ diuersis mo- dis præparantur.

Ex decoctis seu apozematibus dictis fre- quentiùs; Illa præmissâ generali corporis euacuatione ad tempus aliquod propinan- do, spaciò breuiore, si continuis diebus se- mel in die manè, vel etiam bis, manè scilicet & vesperi, ea ad dies quindecim vel etiam vltra assumere queant; vel longiore, si æger debiliior factus, diem vnum aut alterū quie- scere cogatur, & postea rursus ea repetere, tuncque ad septimanas tres vel quatuor cu- ra protrahenda. Sed & in aliquibus purga- tione per hæc apozemata ter quaterve in se- ptimana factâ, postea spaciū quiescendi per tres dies reliquos illius septimanæ con- ceditur, quibus manè & vesperi quoque in- terdum corroborantia assumant, hacque ra- tione & purgando & reficiendo septimanas iv. vel v. complent. In qua cura, quæ per pur- gationes eiusmodi diu frequentatas perfici- tur, decens quoq; regimen in viuendi ratio- ne adhibebitur. Quod tamen non adeò ex- quisitum & strictum, in cibi præsertim sub- tractione esse debet, cum qui sic purgantur, cibo exquisito sæpius sint reficiendi, nec quo- que, vt cum per sudores cura instituitur, ab aëre liberiore tantopere sunt arcendi, quin si temperatus sit, eum possint in conclauia admittere, vel etiam ex illis in publicum prodire, quod & maximè expetunt, qui hac curâ vtuntur, ne hac lue se infectos esse, si domi inclusi detineantur, prodant, & proin hac ratione potiùs, etsi æquè opèrofa sit ac alia, illisquæ molesta, curari exoptant.

401

Parantur autem eiusmodi decocta hoc pacto. In calidioribus & biliosioribus corporibus, & cum maculæ ac pustulæ ulceraque in hac lue erumpunt, illud præcipue competit: R. Polypodij 3. iij. foliorum Sennæ 3. ij. Epithymi, Myrobalan. citrin. chebul. ana 3. ij. florum Cordialium 3. ij. herbarum Capill. Buglossi vtriufq; ana M. j. radices Cichorii 3. β. feminis Anisi 3. ij. fiat decoctio in aqua pro quinque vel sex dosibus, dulcorando cum Saccharo, dissolue in qualibet, succi Rosarum & Fumariæ ana 3. β. vel horum syruporum, interdum & Violatum ana 3. j. Atque interdum misce, si præsertim minus operetur, Rhabbarbari infusionis factæ in hoc decocto 3. j. Nonnunquam & validiora electuaria dissoluenda, si amplius purgare velimus. Veluti de succo Rosarum, Confect. hamech. &c. Vel interdum omisso ad diem vnum aut alterum hoc decocto, alio fortiori medicamento corpus interim validius purgare, posteaque ad vsum decocti redire possumus. Atque sic indies vel interpolatis vicibus, vti dictum, eiusmodi potionibus vtratur æger, quinquies vel sexies, quibus absolutis nouæ eodem modo, vel paulò efficaciores vel mitiores, prout priores operatæ fuerint, parentur, & donec morbum curatum esse conijciamus, cōtinuentur. Quod si quoque toties decoctum de nouo recoquere arduum sit, auctâ ingredientium quantitate, vti & sacchari, ad consistentiam mediam vel integram syrupi, vt diutius conseruari possit, coctione redigimus, eamque quantitatem de eo, quam sufficienter operari deprehendimus, exhibebimus.

Pro pituitosis, serosioribus & frigidioribus, si dolores circa ossa præsertim molestant, eiusmodi decocta sunt: R. semin. Carthami conuass. 3. j. β. Sennæ fol. 3. ij. Polypod. 3. j. Turbethi 3. β. Epithymi 3. ij. Passul. mundat. 3. j. Ficum num. x. radic. Liquirit. 3. j. radic. Enulæ 3. vj. Galangæ 3. β. Thymi, Betonice, Maiorana, Hyssopi, Chamæp. an. M. j. florum Bugloss. vtriufque, Rosmarin. Stœchados vel Lauandulæ ana p. j. florum Chamomillæ p. β. seminū Coriandri, Anisi, Fœniculi ana 3. j. feminis Nigellæ 3. β. fiat decoctio in aqua, pro v. vel vj. vicibus, dulco-

rentur Melle, dissolue in singulis succi radic. Iridis 3. β. syrupi Rosar. solut. de Fumaria vel Lupul. ana 3. vj. Si efficacius operari velimus, infunde Agarici vel Mechoacæ 3. j. Zingib. 3. j. Vel misce electuarium, vt Diaphœnicon aliudve. Vtatur eiusmodi decoctis, eo planè modo, vti de prioribus dictum est.

Alia quoque decocta hic competere possunt, quibus & quæ huius aduersa creduntur, vt guaiacum, zarsa parilla simul incoquantur. Quæ sæpè repetita, vti alios pertinaces morbos, sic & luem hanc interdum sanant. Quale hoc est, si per dies 25. vel 30. indies vel interposito aliquo, sed breui intervallo, cum necesse est, bibatur: Quod R. ligni Guaiaci rasuræ vel scobis 3. j. Zarsæ parillæ 3. vj. radices Glycirrhizæ 3. β. radices Cichoræ 3. ij. florum Buglossi vtriufque ana 3. j. Passularum 3. β. Prunorum num. vj. mace-rentur in aqua 15. viij. per diem & noctem, fiat decoctio, coletur; & si placet, aromat. paucis Cinamom. In huius colaturæ 3. v. infunde foliorum Sennæ 3. β. Mechoacæ vel Agarici 3. j. Zingib. 3. j. stent per diem & noctem, colentur, misce syrupi Ros. solut. aquæ Mellissæ ana 3. ij. fiat haustus vnus, moxq; pro sequenti die eodem modo secundus, indeq; indies reliqui, donec tota cura absoluta fuerit.

Huius loco decoctum huius fere simile, quod vt in multis morbis curandis, sic & in scabie sanandâ, si per triginta vel plures dies bibatur, in eadem conferre diximus, illicque descripsimus, vsurpari poterit.

Possunt & alia purgantia pauca vel etiam plura, in decoctis Guaiaci vel Zarsæ parillæ cocta vsurpari, in quibus folia Sennæ præualeant, tanquam quæ melius & tutius operantur, vel etiam Hermodactyli qui nunquam ferè in doloribus omittuntur. Sicuti in cura, quæ per decoctum guaiaci fit, eiusmodi purgantium quoque facta est mentio.

Huc & referuntur, decocta Helleborata, vt in melancholicis morbis, aliisque grauib; sic & lue hac curanda commendata, si sæpius illis vti possumus, vel si nimium exagitent, alternis saltem diebus, dieq; quætiis, & medicamentis cordialibus, & antidotis, ciboque exquisito & potu vini resciantur. Quæ & in aliis violentioribus purgantibus

obseruari debent. Imprimis autem inter decocta helleborata, in lue hac probatur, quod R. cortic. Hellebori nigri 3. vj. Myrobalanorum quinque generum ana 3. 8. foliorum Sennæ, Polypodij ana 3. j. Epithymi 3. 8. Sonchi m. j. florum Cordial. p. j. semin. Citri 3. j. ligni Guaiaci rasi 3. iv. Bulliant in tb. viij. aquæ & Vini albi tb. j. 8. Colentur & dulcorentur Saccharo, aromatiz. Cinamom. & Gariophyllis: Capiat ad 3. iij. aut iv. prout operabitur.

Idem præstat aliud Hellebori decoctum vel infusum, in scabiei curâ descriptum, sicuti illi. ita & aliis deterioribus morbis lûique huic sanandæ imprimis vtile.

Vel hoc quod ex cort. Hellebori nigri pulverizati 3. j. vel 3. iv. in Sero lactis infusione, vel alio aliquo decocto fit, manè coquendo: Er colaturam cum syrupo de Fumaria aut Ros. solut. sæpius exhibendo.

Vinum helleboratum ex simplici infusione, etiam citra decoctionem idem præstabit. Quod & tale fieri docent aliqui, si radices Hellebori recentes ad vitium radices defossæ fuerint; atque ex vuis illarum vinum paretur.

Pilulæ ex Argento viuo præcipitato paratæ, Mercuriales dictæ, huc quoque referuntur, quæ violenter corpus purgâdo, vix dum bis terve vsurpatæ, hanc luem quandoque extirpant. Verunt cum de his quæ ex argento viuo parantur remediis, iam separatim simus acturi; de illis ibidem agemus.

Præter hæc purgantia, quorum vsu luem hanc interdum curare possumus, alia quoque; tam leuiora quàm fortiora purgantia medicamenta, diu continuata, idem nonnunquam præstant. Cuiusmodi sunt electuaria, pilule, aliæque purgantium formæ, in aliis diuturnis omnibus morbis quibus cõueniunt, expositæ, tum præcipue illa quibus corpora generatim ante reliquorum vsu purgari debere docuimus. Quod & extracta referuntur, præcipueque foliorum Sennæ, vt & Rhabbarbari aliorumque purgantium.

Vires restaurantia partesque principaliores, ventricul. hepar, cor, cerebrum roborantia remedia, dum huius luis cura per purgantia, vt dictum, peragitur, interpolatis vitiis, cum à purgatione abstinere, illis ex-

hibentur, maximè si violentioribus vtantur, atque etiam extrinsecus ventriculo, si propter illorum vsu laboret, vel cordi, si animus deficiat, quædam adhibentur. Qualia in virium lapsu abundè sunt descripta.

Inprimis verò in hac lue Antidota, quæ vti cæteris venenis, sic & huic lûi aduersari creduntur, vel sola, vel aliis restaurantibus permista, exhibentur. Qualia superius post alia purgantia exhibita descripsimus.

In apozematum prædictorum, quibus luem sanare solemus, vsu, si vires labascunt, die vel vno saltem in septimana, vel duobus aut tribus, prout necessitas requirit, quo quiescunt, sequentia dantur: R. radic. Tormentillæ 3. j. 8. Dictamni 3. ij. sem. Citri, Cardui bened. Acetosæ ana 3. 8. Santalorum omnium 3. j. rasuræ Eboris vel Vnicornu 3. j. Margarit. præpar. 3. 8. Coralli rubri 3. 8. fiat puluis subtilissimus; Cuius 3. ij. misceantur cum conserua Rosarum, cortic. Citri cond. cons. flor. Scabiosæ vel Cordial. an. 3. j. & cum syrupo de Buglossio fiat electuarium: De quo capiat instar nucis moschatæ, superbibendo aquam Melissæ, Scabiosæ, Card. bened. cum Vino mistam.

In frigidioribus & debilioribus huic pulueri adde Cinamomi, Garyophil. an. 3. j. Maeris 3. 8. Conseruæ Rosmar. Maior. atq; Accori ana 3. j. Permisceantur: Sicq; dentur.

Possunt & tabulæ ex enarratis pulueribus & conseruis concinnari, sicque illis, si hæc malint, vti.

Sunt qui de aliis purgantibus vno die exhibent, alteroque die decoctum Buglossi vel Absynthij superbibere iubent, sicque ad aliquot dies perseverare.

In helleboratorum decoctorum & infusionum vsu, alternis vel ternis diebus, prout vires exposcunt, hæc eadem vsurpari possunt, imprimis tamen tunc sequens cõmendatur electuarium, quod & in aliis purgationibus violētis prodesse poterit: R. succi Sonchi in formam Rob decoctione inspissati 3. j. Scordij veri sicci 3. j. semin. Citri 3. 8. Mithridati vel Theriacæ 3. 8. syrupi de Cortice Citri q. s. misce: Pro vsu.

Mithridatum & Theriaca per se quoque interdum dantur, maximeq; si ex nimia purgantium

405

gantium vi, metuatur dysenteria; alia quę in dysenteria dicta sunt, tunc præcautionis loco propinari possunt.

Cum Argento viuo, sic quia argento similis, sed fluida est minera, à Metallicis dicto, Hydrargyro à Græcis, quod aquę instar distillat, & à Chymicis Mercurio vocato, curatio huius luis frequenter instituitur. Differtque ea primum, quatenus illud vel extrinsecus adhibetur, vel intrò sumitur. Quā ratione hanc curam quoque diuidemus.

Per extrinsecus corpori adhiberi Argentum viuum curationi cōmuniter institui solet, non solum à Medicis probatis, sed & Chirurgis aliisq; empiricis, indeq; morbum frequentius, atq; integrè sanari videmus. Verum quā qualitate aut viribus illud perficiatur, dubium; licet enim cū eo forinsecus utimur, ad sudores promouendos corpus simul disponamus, tamen incertum, an hi calore actuali, qui simul tunc adhibetur, vel illius efficaciam, promoueantur. Dein & licet illius vsu expuitiones copiose superueniant, quas vi quadam illi peculiari, cū alia quę hoc pacto illud faciant, hætenus non fuerint cognita, molitur, non solum in hac lue, sed & alias adhibitum aliquandiuq; continuatum, tamen an per hæc expuitiones luem sanet, dubitari quoq; posset. Verisimile tamē videtur ad curationem huius luis, expuitionem hanc plurimum conferre, idque ob hæc argumēta, quod nisi illa hydrargyri vsu concitetur, tandemque superueniat, cura non succedat; & quod vnā cum hac expuitione oris illa vitia, illius nimirum inflammatio, exulceratio, fœtor dentiumq; inquinatio & labefactio sequantur. Quæ à spūto, veneni labe, eò vi hydrargyri propulso, infecto potius, quàm hydrargyri malitiā, vt putant, accidere, probabile. Præterquam illius potentiam, quā manifestam illam euacuationem concitat; forte & aliā insuper vi, quā multa quoque vitia externa in aliis morbis, ita & hæc in hac lue prodeuntia absument, atq; extirpat: Vt etiam alia proprietate huic lue aduersa venenitatem illius qualitatem retundit; Atque vti creditur, huius veneni, est alexipharmacum. Quibus suis qualitatibus & proprietatibus occultis, ex iis effectis no-

bis cognitis, hæc luem illud sanare cum aliā ratione non possit, nec operatio illius aliud demonstret, licet colligere, adeò vt non sit necesse, qualitatem aliquam aliam manifestam, quā calefaciendo aut refrigerando agat, vt viri magni contenderunt, in eo inquirere, & quo pacto id operetur, anxie scrutari. Vti neque conueniens est, ob vitia quæ ori, dum in curatione huius luis adhibetur, contingunt, vel alia accidentia, inter quæ conuulsiones præcipuè metuendæ, quæ si in illius vsu grauiter delinquatur, interdum accidunt, illius vsu tantopere dammare, penitusque rejicere; cū in hac cura, oris hæc vitia facile iterum possint corrigi; & si rectè eo utamur, citra damnum ea possit perfici: Videamusque etiam in alia cura, quæ sine eo suscipitur, tum sudatoriis, tum purgationibus, si sinistrè aut violenter illis utamur, errores quoque plurimos, eosque sæpè maximos committi.

Cæterum cura hæc quæ per argenti viui externum vsu instituitur, variat primum, quod vel eo crudo utimur & fluido adhuc, vel coctione & mitione fixo & concreto.

Crudo adhuc & fluido argento viuo, ad curationem huius luis frequentissimè inunguntur per Linimenta seu vnguenta, quæ Neapolitana, à morbo hoc sic dicto, vocantur. In quibus parandis, argentum viuum vt commodè inungi corporiq; adhærere, atque in illud operari possit, pinguis additis axungis, butyro, oleis & tenacibus resinis & gummi adeò diducitur, vt nulla amplius illius vel minima mica appareat, sed totum hisce confusum, solo colore gryseo, quo ea tingit, sufficienter dissolutum esse cognoscatur. Sumuntque ad argentum viuum sic excipiendum, ea quæ simul rarefaciendo cutem, illiusque poros, viam illi ad penetrationem, sudoribusque ad excretionem aperiant, & digerendo quoq; aliquid de eo quod ad cutem peruenit, absument. Quantitasq; in hisce rectè distribuendis, hæc sæpè obseruatur, vt Argenti viui ʒ. iij. cum materiæ illius ℥. j. excipiantur, quæ media erit argenti viui, pro decenti actione edenda, in corpore non nimium debilitato, quantitas, quam & augere vel minuire pro ratione consti-

tutionum atque operationis modo licebit.

Hoc pacto sequens parabitur in genere conueniens inunctio: R. Argenti viui ʒ. ij. crudi vel prius nonnihil rectificati succo Limonum vel Sputo, Axungiae porci recentis non salitæ, repurgatæ prius à pelliculis, & fusæ, addendo & tertiam partem, si placet, Axungiae gallinæ, Anatis vel Anseris vel Butyri recentis quartarium j. ʒ. Resinæ puræ & claræ abietinæ vel pini lotæ in Aqua vitæ ʒ. j. pulu. Thuris, Mastiches ana ʒ. j. olei Laurini ʒ. ij. olei Chamomelini, Anethini vel Lilliorum aut Rosacei ana ʒ. j. Cerae parum, fiat Linimentum. Agitando primum argentum viuum cum resina in mortario, additâ tandem & axungia, donec omnino dissolutum sit, postea miscendo olea, in quibus cera dissoluta sit, postremo & pulueres.

Ad odorem vinctuosum huius vnguenti aliquo pacto corrigendum, addi potest olei Spicæ ʒ. j. vel plus, cum ad penetrationem admodum iuuat. Cuius odor vehemens, cum curam hanc per vnguenta fieri interdum prodat, illud quidam omittere, qui eâ vtuntur, malunt. Additur & Storax liquida mellioris odoris, tum resolutionis gratiâ.

Ad venenatam hanc vim vel educendam vel infringendam, Theriacam vel Mithridatum ad ʒ. ʒ. hinc vnguentis permiscetur, quæ cum non commodè cum vinctuosis illis miscantur, & vires suas non extrinsecus admota, sed assumpta, exerant, nescio quo successu id fiat.

Si cum doloribus circa ossa & caput potissimum ostendat hæc lues, sic fieri poterit: R. Argenti viui, Axungias, Resinas & Gummi, vt in priore, adde medullæ Cruris vituli vel alterius ʒ. j. oleorū Irini, Cheirini, Lumbriorum vel Vulpini, Laurini ad ʒ. v. pulueris radices Ireos, Hermodactyl. baccarum Lauri ana ʒ. j. Euphorbij ʒ. j. Cerae q. s. fiat Linimentum.

Vt magis penetret, & odoris causâ oleum Spicæ, Storax, calâm. & liquida, Ladanum addi possunt. Et maioris penetrations causâ oleum Terebinthinæ ad ʒ. ʒ. vel Petroleum, quod tamen ob grauem odorem alij recusant.

Atias, & vt amplius neruoso generi ap-

proprietur: In oleis prædictis antequam misceantur, succi ad consumptionem vsque ipsorum decoquantur, vt succus Rutæ, Ebuli, Saluiæ: Aqua item vitæ & Vinum.

Si cum pustulis & vlcerebus se offerat hæc lues, adduntur siccantia quædam, quæ tamen vnguenta, si horum validorum permissione admodum siccant, quia sudores impediunt, non statim ab initio, sed post illorum quæ rarefaciunt vsum, tandem administrari debent. Fiuntq; hoc pacto: R. Argentum viuum, Axungias, Resinas, Gummi, vt in priore, addendo Laurini, de Lateribus ana ʒ. ij. olei Hyperici ʒ. j. Myrrhæ ʒ. ʒ. Lithargyrii, Cerusæ ana ʒ. ij. cineris Sarmen-torum ʒ. ʒ. Cerae q. s. fiat Vnguentum. Oleum Iuniperi loco Spicæ ad ʒ. j. addi poterit, & succus Fumariæ, Lapatij, Bryoniæ in oleo decoqui.

Efficacissimum erit, si Cinnabaris vel M-nij ʒ. ij. addas. Alij Æruginem æris similiter addunt ad ʒ. j. vel etiam Sublimatum. Sed hæc tutius, vt in illis dicetur particularibus vnguentis, immiscetur, quæ solum illic vbi vlcera vel pustulæ sunt, adhibentur, cum vndique illinere non adeo conueniat.

Horum vnguentorum loco sumuntur interdum vsitata quædam, & ad ʒ. j. illorum Argenti viui ʒ. ij. permiscetur, & sic vsurpantur. Veluti ex vnguentis quatuor calidis applicatis communiter, Dialtheæ, & in doloribus Martiatum, Aregon Agrippæ: Vel ex aliis in scabie, Enulatum.

Aliud: R. Argenti viui ʒ. ij. Thuris, Mastiches ana ʒ. ʒ. Axungiae porci, Butyri ana quartar. j. olei Laurini ʒ. iij. Salis ʒ. ʒ. Aluminis vsti, Tartari vini albi ana ʒ. ʒ. Aquæ vitæ ʒ. j. misce, fiat Linimentum, cui in vlcerebus Litharg. & Cerusæ ana ʒ. ij. addi possunt.

Sunt qui sine argento viuo ex solis vnguentis quatuor calidis & oleis, additâ Theriacâ & Mithridato, item pulu. Hellebori, vtriusque Cucumer. asin. Euphorb. Æruginis æris, eiusmodi vnguenta, ad curationem huius luis parare se posse prædicant: quæ tamen, vt & ipsimet fatentur, plerisque non sufficiunt.

Alij etiam ex Argento non trudo, sed sublimato, vel in Cinabrium dictum, permissio-

ne Sulphuris redactis; cum axungijs, resinis & cerâ exceptis atq; Aquâ vitæ additâ, eiusmodi vnguenta parata, aliquid proficere posse putant. Quæ tamen cautè non adeò tuta sunt.

Simplicissima aliqui hæc parant, ex Argento viuo cum axungia, alij etiam cineres Sarmenorum addunt. Alij ex argento viuo cum Terebinthinâ & Aquâ vitæ. Quæ omnia rectè misceri & cautè adhiberi debent.

Vfus autem harum inunctionum hic est. Inungitur illis æger nudus, in conclavi calefacto ad fornacem vel focum, aut stuphâ, in extremitatibus, manibus, pedibus maximè, in volis & plantis, deinde in spinâ dorsif, sensim ab inferioribus sursum ad cervicem eius ascendendo: item in emunctorijs sub axillis & circa inguina, & in iuncturis; nullibi pectus aut caput tangendo. Fiatque hoc matutino tempore semel in die vel bis, manè scilicet & vesperi, si vires constent, vel vno die semel, altero bis. Sic inunctus linteaminibus calidis obuolutus, in lectum calefactum collocetur, illicque bene tectus quamdiu ferre poterit, sudet. Et si sudor difficulter erumpat, lagenâ aquâ feruente plenâ, vel puluinis plumeis, vel nucleis ceraforum aut leguminibus, vt calorem diutius retineant, repletis, pedibus & sub axillis appostitis, aut lateribus aut filicibus calidis sudor prouocetur, alijsve partibus. Atque ita quamdiu commodè sudorem ferre poterit, aut horam vnâ cum dimidiâ, vel vtrâ sudet, posteaque eum abstergat, linteaminibusque muratis sensim se recolligat, & posteaquam surrexerit, parumque deambularit, cibo se reficiat. Continuetque eiusmodi inunctiones ad dies octo vel decem, vel pauciores; desistendo cum expuere incipit, osque affici, quod nisi prædicto tempore fiat, vnguentum Argento viuo demum addito, fortius reddendum, vel bis in die, si hoc non prius factum fuerit, inunctio, donec hæc in ore vitia superueniant, repetenda, quibus dein emendandis cura erit adhibenda, ægerque rirè donec & dolores & vlcera pustulæque abeant, gubernandus, & postremo vt à sordibus ab vnguento relictis expurgetur, in laconico se-

dens & sudans, lixiuio diligenter ablundus, sensimque aëri, temperatiori tamen, ab initio, assuefaciendus.

Viuendi rationem quod attinet, in aëre calido quârum fieri poterit inclusus se contineat. Cibo vtatur euchymo, simplici & moderato. Potus loco, vinum debilioribus, & quando vires deficere incipiunt, conceditur: alijs verò vel dilutum, vel aqua, in cuius lb. iij. Guaiaci 3. ij. decoctæ fuerint.

Euacuationes per purgationes generales & venæ sectionem, si opus sit, antequam inunctiones inchoentur, præcedant: nam corpore bene purgato, cura facilius succedit, quare & interdum intermediis diebus, quibus ab vnctione cessabunt, purgationes, maximè si constipati sint, reiterabuntur, eo modo sicuti in purgantibus exposuimus.

Alio modo inunctiones hæc quoque in delicatioribus vsurpantur, & certis duntaxat partibus adhibentur, sed cura tunc diutius protrahitur, neque semper succedit. Vt si iuncturæ tantum inungantur, vel saltem spina in renum regione, continuando quandoque semel indies vel bis, vt de generali inunctione dictum est. Idem tamè regimen obseruando.

Alias volæ tantum in manibus & plantæ pedum inunguntur, nec dum alia corporis pars, cum debito quoque regimine. Quæ ratio inungendi minus ægris molesta est, minusque curam huius luis detegit, cum adhibitis chirothecis inunctionem in manibus celare possint, eoque magis, si in aërem liberum egredi, quod illis tempore calido interdum permittitur, & se exercere, quod ad sudorem eliciendum illis conuenit, possint, domumque inde reuersi, sudori cæterisque quæ requiruntur, operam deinceps dare queant.

Quæ vnguenta non alio modo quam priora parantur, sed austâ Argenti viui quantitate, efficaciora reddenda.

Ex crudo Argento viuo etiam emplastra, quæ ipsis applicantur, ad curationem huius luis sunt. Vel in forma communi, aut Cera ti vel Sparadrappi, quo nomine linteum panum hisce imbutum vocant. Vsurpanturque hæc rarius, & tantum ferè in illis, qui deli-

rationes cum sint, inunctiones respuunt, quia maiorem molestiam adferunt; & ut diligentius inclusi maneant, requirunt, & potius hæc emplastra, quia tunc illis, uti dicitur, libertas maior conceditur, gestare cupiunt. Verum cum hæc tardius quam vnguenta, quæ illis fortiter inuncta, penitus imprimuntur, operentur, cura, si hæc sola vsurpentur, nisi plus argenti viui, quam vnguenta recipiant, diutiusque illis vtantur, vix succedet, vel imperfecta erit; Quod si fiat, neque emplastrorum vsu expulio vel oris vitia sequantur, inunctionibus vel suffitibus postea adhibitis ea promouebuntur, tuncque emplastra hæc, etsi morbum non penitus sanent, tamen ut citius reliqua curam perficiant, efficient.

Præparantur autem hæ applicationes, ex eadem vnguentorum dictorum materiâ, auctâ amplius quam in illis ad 3.℔. vel ulterius argenti viui quantitate, prout operationem succedere videbimus. Cui & Cinnabarim & Sublimatum aliqui miscant. Hæcque in ceratum Cerae, vel emplastrum Resinae permissione formant, quæ supra pellem tenuem, alutam dictam, extendunt: vel dissolutis illis, pannus linteus pro Sparadrappo vocato parando, aliquoties intingitur.

Vel sumunt alia emplastra vsitata gummata, quæ non argentum viuum recipiunt, ut Ceroneum, de Meliloto, emplastrum filij Zachariæ, Diachylon ireatum, illisque Argenti viui eam quantitatē, quæ in vnguentis dicta fuit, maioremque; adhuc permiscant, sicque adhibent.

Est & aliud vsitatum ceratum vel emplastrum cum Argento viuo paratum; Vigonis ab autore vel Ranarum, quia eas simul recipit, dictum; quod etsi particulatim illic ubi dolores maximè vrgent, adhiberi soleat, tamen & generatim ad curam huius luis, quæ per emplastra fit, vsurpari potest, auctâ Argenti viui & Euphorbij quantitate. Quod & præter argentum viuum, pinguedinem porci & viperæ (cuius loco serpentis sumere possumus) terebinthin. thus, euphorbium, styracem liquidam, ceram, oleum chamomel. anethinum, liliorum, laurinum, de spica, de croco, (cuius loco oleum iuniperi sub-

stituere possumus) succos ebuli, enulæ, vinum, herbam matricariam, flores stæchados, schœnanthi, lithargyrii, ranas, lumbricos.

Vsus horum emplastrorum talis existit; Applicantur linteis latis vel alutis, uti dictum, excepta, iisdem in locis, quibus & vnguenta, veluti manibus & pedibus, quibus obvoluuntur. Item emunctoriis; dein & spinæ longitudini, illicque fasciis vel vestibus interdum indutis retinentur, aliisve artibus & subligaculis. Sicque continuò dies noctesque gestantur, atque tertio vel quarto die renouantur. Interea ut sapè fudent, præsertim dum in lecto quiescunt, opera danda, hacque ratione donec signa in ore appareant, procedendum.

Interea viuendi modum eundem, quem dum vnguentis vtuntur, uti & decentes purgationes obseruare debent: conceditur tamen ipsis, cum cura diutius protrahatur, ipsique hanc potius alicuius libertatis consequendæ causâ, sibi elegerint, ut aëre sereno & calido, progredi in publicum aliquando possint, sicque deambulare aliquandiu vel equitare, quod eò minùs curam ipsorum retardare poterit, cum prodeuntes nihilominus emplastra ipsis adhærentia, secum circumferant.

Paucioribus sedibus, vel etiam solis volis manuum & plantis pledum hæc emplastra apposita, aliquid interdum quoque in cura moliantur. Quâ ratione indutis chirotecis & tibialibus, hæc emplastra retinentur; & ne patefiant, luemque hanc prodant, celantur. Quæ & minùs cognoscitur, si simul cum aliis conuersari illis liceat, nec dum seclusi ab hominum cōsortio arceantur, quod illis ferè liberum permittitur.

Sed & hæc paucioribus sedibus admota, vel etiam solis volis manuum & plantis pedum, quod minori labore fit, sed diutinum tempus requirit, idem in tenerioribus corporibus interdum efficiunt.

Non crudo & fluido adhuc Argento viuo, nec simplici, sed permisto & coctione fixo & concreto, ad curationem huius luis etiâ vtimur, idque duplici ratione sic præparando; vel cum additione Sulphuris aut Chalcanthi.

Cum

Cum Sulphure-Argentum viuum coquendum, vrendumque donec in glebam ruberrimam redigatur, quam Cinnabarim vocat, quodd Cinnabari natiuo, quo nomine Minium natiuum etiam appellant, colore, hæc cinnabaris artificialis respondeat, ita præparatum, ad curationem huius adhibetur, non per illitionem, vti cum crudum est, sed per illius accensi fumum, quo corpus suffumigatur. Nam cum fastidia hæc Cinnabaris, argenti viui vim & efficaciam, quâ in lûem hanc agit, adhuc seruet, cum vritur, ob admistum sulphur, fumum copiosum magisque penetrantem reddens, dum nudum corpus tangit, illique se affigit & insinuat, æquè efficaciter atque cum Argentum viuum inungitur, operatur, atque expuitiones, quæ oris sequuntur vitia, promouet, lûemque hanc abigit; & proin per hæc suffumigatio res hanc lûem frequentius quam per inunctiones nostri chirurgi sanare solent. Vel etiam si quæ reliquæ illius, post curas alias prius adhibitæ, remanserint, hæc suffumigatione eas penitus tollunt.

Huic autem ad suffumigia eiusmodi excitanda, alia insuper quæ præsertim tetrum illius odorem, quem Cinnabaris reddit, corrigunt, permiscunt. Quæ in puluerem simul redigunt, qui carbonibus ad fumum faciendum inspergitur, vel Resinâ exceptus, aut infusione Gummi Tragachanti in trochiscos formatur, qui prunis pro suffumigiis imponuntur. Obseruatâ in hisce eâ Cinnabaris quantitate, vt 3. j. illius, pro vnâ vice vsurpetur, quæ media illius erit quantitas, quam augere minuerêve, consideratis circumstantiis, vti & in aliis diximus, licebit.

Tale igitur suffumigium pro octo vicibus, ne opus sit toties repetere, paratur simplicissimum: R. Cinnabaris 3. j. Thuris folius, vel cum media parte Mastiches 3. iij. fiat puluis; Vtatur 3. 8. pro vnâ vice; vel excipiat Resinâ aliquâ; Terebinth. dictâ, quæ copiosum fumum reddit, aut infus. gummi Tragach. & fiant trochisci pro octo vicibus ad vsum quoque distribuendi.

Vt odorem adhuc gratiorem acquirat: R. Cinnabar. 3. j. Thuris vel Mastiches 3. j. 8. Benzoini 3. vj, vel plus & tunc minus thuris

accipiendum, Storacis calam. 3. 8. Ladani 3. ij. Ligni Aloës vel Santhali albi odor. 3. 8. fiat puluis: Vtatur 3. 8. pro vnâ vice.

Addi possunt & alia odorata gummi vel aromata, vt Gariophylli, Cinamomum, Nux moschata, aliæve.

In vlceribus primo vel secundo pulueri, Myrrhæ 3. 8. commodè additur; confert & Succinum. In prauis vlcerib. etiam validissimè siccantia miscuntur: veluti Antimonij 3. 8. Cadmiæ fossilis 3. ij. Vitri Veneti 3. j.

Interdum adhuc efficaciora in robustioribus, veluti Auripigmenti 3. j. vel Argentum viuum præter Cinnabarim aliter etiam præparatum, vt Sublimatum vel præcipitatum ad 3. j. Hæc cautione tunc adhibita, ne fumû naribus quoad fieri poterit, hauriant.

Theriacam aliqui vti inunctionibus; sic etiam hisce suffumigiis permiscentes; venenum hoc sic se reprimere posse, quoque existimant. Verum cum vrendo vim amittat, vti vix in inunctionibus, licet non ita corumpatur, aliquid agere potest, sic hic nihil adiuuenti adferre posse, putamus.

Administrantur suffumigia hæc sequenti modo: Collocatur æger exutus in locum aliquem angustum, conclusum, calefactum, & diligenter ab aëre externo munitum. Qualis esse potest hypocaustû paruum, probalneo sicco vsurpari solitum. Vel solium seu labrum ad idem paratum, inferius ligneum & superius stramineo camerato obtectum, vel alio ex fulcris & pannis illis obuolutis confecto, vel tentorio ex solis pannis concinnato. In hoc sedens æger, fumû qui puluere carbonibus ardentibus ibi collocatis iniecto, vel trochiscis impositis excitatur, totumque locum adimplet, nudo corpore excipiat, sola facie, vt eum diutius ferre queat, extra locum illum aliquousque exerta, sed ita pannis capiti obuolutis munita, ne aër subintrare queat, quæ tamê circa finem, vt hæc fumum aliquo pacto percipiat, intrò rursum retrahi, illicque parumper quoque retineri debet. Atque ita quandiu æger eiusmodi caloré fumumque virib. non labentibus pferre poterit, in tabernaculo hoc morâ trahere, sudoriq; qui interea emanat, operâ dare debet. Quo tēpore exacto, lintheaminibus calidis

calidis obuolutus, ex loco isto, in aliud conclauē, hoc fumo minimè infectum, non tamen procul ab eo dissitum, ne diutius dum locū mutat, aëri se exponere cogatur, transferendus, ibique in lecto calefacto repositus, uti in inunctionibus quoque fieri debere docuimus, adhuc ad tempus aliquod vsque, quamdiu vires permittunt ei, sudandum. Alia suffumigandi ratio in delicatioribus, minori molestiā perficitur, si iuxta caminū inclusum peripetasmate hoc fiat, cum fumus tunc non adeo inclusus hæreat, sed per caminum mox exhalet, ægerque liberius in eo spirare queat. Et adhuc facilius eum perferet, si in lectum rectā collocatus æger, fumum in vase, quod exactè occludi potest, extra lectum posito, excitatum, per canalem ab eo vase sub stragulis ad ipsum vsq; transeuntem, corpore nudo excipiat, illicq; occlusum retineat, capite interim è lecto prominente, & sub finem solum, ut & illud suffumigetur, reducto atque aliquamdiu retento.

Eiusmodi autem suffumigandi modi indies semel tantum, vel si debilior sit æger, alternis diebus administrantur, aut si vires deficere incipiant, cessando per dies aliquot, postea ubi se recollegerit, rursus repetuntur, idque siue continuatis vicibus seu interpolatis fiat, tamdiu continuando, donec expuitio & in ore superuenientia accidentia, desistendum esse, nos admoneant; quæ postquam decies suffumigati fuerint, nonnunquam & citius ferre eueniunt, aliàs verò nisi pluries hoc fiat, vix succedunt.

Viuendi ratio eadem, quæ dum inunguntur, instituitur. Rescindi tamen cibo & potu frequentius, cum suffumigis plus quam inunctionibus debilitentur, & cibi abstinentia non tantum hic opituletur, quantum verò virium prostratio nocere potest. Purgationesque, ut in inunctionibus, interea adhibentur.

Cum Chalcanti additione atque aceti, argentum viuum in Sublimatū (sic quia cum præparatur, vi ignis in sublime eleuatur, operculoq; accrescit, appellatum,) reductum, ad curationem huius luis extrinsecus quoq; adhibetur, cum liquore aliquo dilurum. Quo liquore extremitates corporis, veluti tibiæ

& brachia illinuntur & madefiunt, Lauatoriaque dicta ex eo sic parantur. Nam cum sublimatum corpori sic affigitur, quia adhuc argenti viui vires retinet, easdem perinde in lue hac sanandā exerit, ac si inungeretur vel suffumigaretur, sicq; expuitiones, vnde etiā os vitiatur, prouocando, luem hanc sanat. Atque vi insuper acri, quam mistione chalcanti atque sublimatione hac adipiscitur, cutem adurens vesicasque excitans, sic quoq; in dolentibus præsertim vel nodosis locis illitum, venenum hoc euocando, operatur. Et tandem sic vel sola vsurpata, hanc luem sanant, doloresq; præsertim & nodos tollunt. Vel si per alias curas hæc non cedant, ea penitus extirpant.

In hisce autem Lauatoriis parandis, Sublimati huius Mercurij, ut vocant, quantitas idonea & media erit, si 3.j. illius cum liquoris alicuius lb. ij. permista sit, à quā prout operabitur, ascendere descendere ve augendo minuendove mercurium, licebit.

Hac itaq; ratione per decoctum ablutio talis fit: R. Mercurij sublimati 3.j. Aquæ communis vel de sequentibus, ut Rosarum, boni odoris causā, vel Scabiosæ, Fumariæ, Maioranae, Saluæ, &c. lb. ij. Vini albi 3. iij. vel Aquæ vitæ 3. ij. bulliant parū & feruentur ad vsum.

Vel: R. Mercurij sublimati 3.j. Aluminis vsti 3. ij. Lithargyrij & Cerusæ ana 3.j. Aquæ vitæ lb. j. β. Aquæ alicuius lb. iij. coquantur ad vsum.

Infusio pro Lotione: R. Mercurij sublim. 3.j. Aluminis 3.j. β. Lithargyrij, Cerusæ ana 3.j. Aquæ vitæ lb. ij. feruentur in maceratione in vitro bene obturata.

Aliter sic per decoctionem fit: R. Mercurij sublimati 3.j. Arsenici 3. iij. Euphorbij 3. β. Aquæ rosarum vel alterius & Aquæ vitæ ana 3. xj. bulliant in vase vitreo parumper.

Vtimur eiusmodi Lauatoriis hoc pacto: Madefiant tibiæ, panno in hisce intincto, & illinantur à genu deorsum, & brachia à cubito antrorsum, repetitis aliquot vicibus, idque manè nonnunquam & vesperi in calore, iuxta focum vel fornacem: Perseuerando ad decem vsq; dies, donec quoq; accidentia in ore cum expuitione superueniant.

Guberneturq; æger interea eo modo, uti

417

cum inunctionibus vtuntur, fieri debere, dictū est: Contineatq; se in loco calido, sudetq; noctu. Cibo vratur exquisito & Potu conuenienti: Purgeturq; & ante harum lotionum vsum, & dum illis vitur, corpus decenter.

Per exhibitum introq; sumptum argentū viuum, hanc luem quoq; sanari posse, experientia similiter docuit, tum si crudum, tum coctione & vstione calcinatum propinetur.

Crudum assumptum, non aliis viribus, quàm quibus cū extrinsecus adhibetur, luem hanc sanare, ex eo patet, quòd nullas alias euacuationes manifestas, nec per sudorem aut aluum, sed saltem eam quæ per os fit, expuitionem scilicet, vt cū foris admouetur, moueat, nec prius, quàm hæc orisque enarrata vitia superueniant, eam cures: Et proin cū hoc idem extrinsecus admotum faciat, & si in corpus sumatur, noxam illi aliquam inferre existimetur, non temerè aut frequenter curandi hæc ratio suscipiēda, nisi forte inueteratā lue, quando cætera præmissa nō iuuant, aut quia minori labore & sumptu cura sic perficitur, aliqui eā vti malint. Quod minori fiet periculo, si diutius in corpore non hæreat, vt ferè sponte, dum crudū adhuc sumitur, pondere suo & lubricitate deorsum ad exitum properat, nec diu subsistit, vel aliis simul, vti dicitur, admittis eò propellitur: Vt sic ventriculum & intestina alioquin sordibus obducta, non tam facile possit lædere, & nihilominus tamen breui hac morā suas vires exerere.

Sumatur autem, cū eo vti volumus, argentum viuum crudum, pro vnâ vice, à granis sex vel octo ad decem vsque, & additis quibus exactè dissolui queat, illis quæ, vt dictum, excretionem illius per aluum accelerent, cū sponte aluum vix moueat, in formam pilularum quas Mercuriales ab eo vocant, redigitur, sicque exhibetur. Idque ferè quotidie, continuando tamdiu, donec in ore calor & fœtor atque expuitio frequens sequi incipiant. Quod ad dies triginta sæpè producit, curaque sic perficitur: Purgationibus generalibus præmissis, vitæque regimine decenti adhibito.

Pilulæ itaq; eiusmodi sic parari poterunt: R. Argenti viui crudi 3. β. extingatur succo

Limonum vel Saluæ, vel Rosarum, aut syrupo Rosarum solut. vel cum Terebinth. adde Agarici trochiscati ʒ. ij. fiant pilulæ tres: Capiat quotidie vnā, in plures si nimis magni sit diuisam, post mediam noctem: Quibus absolutis, tamdiu donec signa supradicta appareāt, possunt repeti. Alias Rhabbarū loco Agarici sumitur: Huic compositioni aliqui Opij, gr. j. vel ij. miscent, fortè vt sensum obtundendo diutius hæreant, vel sudores simul moueant. Nonnunquā & Ambræ vel Moschi grana aliquot addunt, vel olei Cinamomi guttam, iuuadi odoris & cordis recreationis gratiā. Quo nomine, vt & quod aurum argenti viui sit antipharmacū, maximè verò splendoris & prætij causā, hæc pilulæ foliis auri obducuntur.

Alia compositio sic fit: R. Aloës ʒ. j. Rhabbari vel Agarici 3. ij. Mastiches 3. j. Argenti viui extincti cum Terebinthin. 3. ij. vel iij. cum syrup. Rosarum solut. fiat massa, cui & supradicta odorata misceri possunt: Capiat de hac ʒ. j. vel paulò plus, si nullus à prioribus successus.

Alias catharticus validioribus additis, has pilulas, vt & aluum efficacius subducant, effcimus, quæ tunc propter argentum viuum non solum viribus illi innatis, vt dictum, sed & admistione purgatiū, corpus sic expurgando luem hanc curant, & si deiectiones frequentes & copiose sequantur, vt minùs expuitio orisque vitia postea sequantur, procurant. Quod fiet si eiusmodi pilulas vel continuatis aliquot diebus, si ferè possint, vel saltem alternis intermediis diebus, tunc Theriacam propinando, assumant.

Fiuntq; hæc tali modo: R. pilularū ex Argento viuo, rhabbaro, agarico & mastiche paratarū, in euacuatione quæ per os fieri debet, descriptarum, quibus adde Scammoneæ vel Colocynthidis præpar. 3. ij. Detur 3. β. prout vice.

Vel hisce vtatur: R. pilularum Cocchiarum, Fœtid. an. ʒ. β. Rhabbari, Agarici an. 3. j. Argenti viui extincti cū Tereb. 3. iij. cum syrup. Ros. solut. fiat massa: Capiat ʒ. j. vel 3. β. prout operabitur.

Non crudum argentū viuum sed calcinatum, hoc est veluti in calcem redactum,

seu ut vocant Præcipitatum, ac si in fundum vasis, cui adhæret, vi ignis dum coquitur, præcipitaretur, vel potius, ut puto, quia subito & violenter alium mouens, deiectionem veluti præcipitat, ad curationem huius luis quandoque exhibetur. Quod tunc non viribus innatis, ut cum crudum adhuc remansit, quas vitione ex parte amittit, sed nouis inde acquisitis, quibus violenter naturam irritando, deiectiones vehementes cōcitant, perficit, nec dum expurgationes illas, per os mouendo, sed purgando tantum, lue eâ ratione, sicuti etiam ex solis purgationibus, eam sanari posse, prius docuimus, profingat: Idque non longo tempore, ut verò alia purgantia, vsurpatum, sed breuissimo, ut bis tēve vix vltra propinatū, vnde copiosus & alui fluxus & vomitiones simul concitantur, aliquādo & sudores vrinæq; promouentur, morbusq; breui spacio veluti miraculo, non tamen sine periculo, abigitur.

Modus autem præcipitandi seu calcinandi ad hunc vsum sequens existit: Sumuntur Argenti viui ʒ.ij. Aquæ fortis ʒ.iiij. mista hæc per diem vnum aut duos sinuntur in vase vitreo, donec in fundo calcis instar subsideat, à quo liquor innatans per inclinationem sensim effunditur, donec remanentia sicca euadat; vel humiditas illa per vas igni impositum eliciatur: Vel coquendo hæc inuicem donec lapidescant, absumatur. Hoc illôve modo materia illa concreta reddita, puluerifetur, & in crucibulo super ignem, per horam vnam vel amplius, continuo bacillo puluerem illum agitando, calcinetur, hoc est in formam calcis redigatur, minij instar rubescentem, quem puluerem Præcipitatum vocant.

Sumiturque sic præcipitati Mercurij puluis, atque infunditur in aquis Rosarū, Plantaginis vel Scabiosæ, Betonicæ aliisque, & lento igne vel in balneo Mariæ sensim coquitur, donec omnis aqua euaporet, siccusq; relinquatur puluis. Hunc denuò in vase testaceo calcinabis. Hic puluis conseruâ aliquā idoneâ, ut Rosarum, vel pulpâ conuenienti, vel Pomorū exceptus, in massam redigitur: Deq; illa pilula vna pisi minoris maiorisve magnitudine manè propinatur. Sunt

qui puluerem aliquem stomachicum vel Cordialem simul addunt, vel Theriacam vel cum confect. Alkermes dant.

Alij maiore studio & labore præcipitatum ut minus noxium sit, elaborant, atq; ut vocant, rectificant, variis artibus. Primumq; illud in aquâ calidâ lotum, ut aiunt, viuificant, deinde in Aceto quater destillato illi 3. vel 4. digitorum altitudine superinfuso, in vase vitreo bene cooperto per quatuor horas coquunt, acetumque postea ab eo per inclinationem in aliud vas effundunt, seu ut aiunt decantant, nouoque affuso denuò sic coquunt, separantque, idque terriò, postea acerum tribus hisce vicibus collectum, in balneo Mariæ, donec totum euaporet atq; exsillit, coquunt, remanentiamq; salis instar in fundo hærentem colligunt, rursusque in aqua pluuiâ coquunt, & postquam subsederint, quod clarum innatat, effundunt, & in balneo Mariæ denuò, donec tota absumpta fuerit, excoquunt, massamque remanentem seruant, eoque præcipitato, ut de priore dictum, tanquam tutiore vtuntur.

Alij plus adhuc laboris impendentes, massam hanc Spiritu vini macerant, seu ut vocant, digerunt, & per retortam destillant, alioque modo rursus exiccando in puluerem rubrum cogunt: Cuius granum j. in vino exhibitum, mirabiliter in lue hac sananda præstare, docent chymici.

Purgantibus, Mercurio præcipitato simpliciratione parato, additis, pilulas formatas aliqui exhibent, admiscentes illi Rhabarb. folia Sennæ, Scammoneam, alij quoq; Helileborum, Crocum item & cum Amydo contemperantes, & succo Limonum subigentes, pilulas formant, atque vnam continuis pluribus diebus exhibent.

Quæ omnia cum sanè non sine periculo fiant, cautè admodum erunt rentanda, & nonnisi tanquam extrema remedia in vltimis necessitatibus vsurpanda, nec cuius temerè ut præparentur, communicanda. Quibus cum vtimur, ægrum ne animo deficiat, reficientibus remediis intrò forisq; administratis refocillabimus, & si dysenteria, ne suborietur, metus sit, uti in dysenteria dictum, occuremus.

421

Particularis cura quæ accidentibus & vitis ab hac lue profectis separatim accommodatur, pro diuersitate horum instituitur.

Dolores circa ossa nuda in tibiis, homoplata, circa clauiculas, in scapulis, in capite, frontem & tempora, erumpentibus interdum simul & nodis, in eâ specie luis, quam *Emmy* vocant, si post curam huius luis generalem, licet integrè ac sufficienter administratam, nihilominus persistant, ægrumq; molestant, horum causâ certa ipsis accommodanda erunt remedia, quæ nisi iuuent, cura generalis de nouo erit repetenda. Quæ autem priuatim horum dolorum causâ vsurpantur, sunt sequentia.

Vnguentum quod in generali cura huius luis, quæ cum doloribus potissimum se offert, pluribus sedibus inunctum, conuenire descripsimus, si inde non cessent, postea certis tantum partibus dolentibus inunctum, proderit. Vel si Cerâ additâ ceratum ex eo formatum, fronti vel capiti, frontalis aut cucuphæ instar, aut aliis sedibus dolentibus applicetur, illudque continuò sic gestetur & nonnunquam mutetur.

Vel emplastris, ceratis, telis emplastratis, in curâ generali propositis, eo pacto hisce sedibus admotis vtatur, tam ex vnguentis, vt illic dictum, paratis, quàm ex emplastris vsitatis, illic nominatis, vel etiam aliis similibus, vt Calidis 4. vel Diuino, de Gratiâ Dei, de Beronicâ, addito illis Argento viuo, sicuti illic docuimus; concinnatis. Quibus & hîc Euphorbium, Castoreum, radic. Hermodactyl. Iridis, Pyrethri, Hellebori, aliæue calida & arthetica misceri possunt: Inprimisque vsitatum illud ceratum de Ranis vel Vigonis ab auctore vocatum, ad eiusmodi dolores, nodosque illis comites tollendos, summè conducit.

Confert & Ceratum quod nodos absolvere diximus, dolentibus hisce sedibus, in quibus & nodi hi præsertim se offerunt, admotum.

Excellentissimum aliud magno successu à me sæpè vsurpatum sic fit: R. Argenti-viui 3. iij. agitentur cum Tereb. lotæ in aquæ vitæ 3. j. addendo Axungie porci, medullæ Cruris vitulianæ 3. j. ß. ol. Liliorum, Chamomel. Auc-

thini, Laurini, Lumbricorum vel Vulpini an. 3. ß. ol. Spicæ vel Terebint. 3. ij. Euphorbij. Thuris an. 3. ß. Styrcis liquidæ 3. vj. pulueris Hermodactyl. 3. ij. Castorei 3. j. Cerae q. s. fiat Ceratum. Oleum Guaiaci inunctum dolores hosce admodum compescere docent.

Lauatoria ex Argento viuo sublimato, dolentibus partibus in tibiis præcipuè admotæ, dolorem maximè compescunt, atque in hac luis specie cum doloribus & nodis interdum se offerente, tum ad curam generalem, tum particularem, si generalis non sufficiat, locum potissimum obtinent. Quorum descriptio in cura generali fuit exposita.

Aliis quoq; sine argento viuo paratis formæ & vntionibus hosce dolores mitigari posse docent, eaq; proinde adhibet, tum quæ moderato calore anodyna esse dicuntur, tum quæ admodum calefaciendo, nervoso & membranoso generi, sunt appropriata. Verum cum calore & actuali & potentiâli, dolores isti à lue hac contracti, secus atque alij potius irritentur atq; increſcant, sicuti in signis huius luis demonstrauius, non solû nullo leuamine, sed potius cû molestiâ maiore, quæ sequitur, hæc adhibentur, nisi huius luis antidotum summum, Argentum nempe viuum illis additum, illorum vires augeat.

Præter hæc, in eiusmodi doloribus persistentibus, corpora frequenter pilulis, potionibus, aliisve purgantium formis, in capitis atq; articulorum aliis doloribus in habitus corporis doloribus descriptis, de nouo purgare, plurimum conueniet: quibus solis interdum vsurpatis, remanentiæ hæc dolorum extirpantur: Alias cæteris localibus iuncta, ambo vt citius desinant, mutuis viribus agunt. Quibus cum vtimur, quæ & capiti & membris robur addunt, interpolatis vicibus quoque exhibentur. Et si caput doleat, particulares euacuationes per caput purgiaz, aliaque simul instituuntur.

Sed & sudorum prouocatio, per decocta ad generalem curam faciendam destinata, bibita, atque aliquoties repetita, dolores hosce post curam relictos, interdum tollunt, maximè si purgationes atque alia quoque externa adhibeantur. Ad quos potentius euocandos, & reliquias hæcæ aligendas, aquæ

stillatitiæ, hîc quoque propinatæ, egregiè opitulantur. Qualis est quæ ex decocto Guaiaci elicitur, vel composita illa Theriacalis in cura generali, quæ per potiones fit, descripta, quæ in hunc vsum potius aliquoties, quam ad totam curam absolvendam, vti illic docuimus, propinatur.

Narcotica, necessitate urgente, ad dolores compescendos, magno interdum successu propinantur, cum vti sæpè diximus, præterquam quod dolores sedent, somnum simul conciliando, sudores prouocent. Atq; innoxie, sicut sæpissimè obseruauimus, sæpius assumi queant. Quo nomine & Theriaca exhibita, tantopere in doloribus hisce, non solum sudores mouendo, sed & dolores sedando, prodest. Aliæque insuper narcotica idem plerunq; præstantia.

Nodi seu tuberositates, qui in excarnibus quibusdam locis, vt fronte aut aliâ caluariæ, tibiarum nudâ & manuum externâ sede, in lue venereâ erumpunt, si lues hæc perfecte sanetur, plerunq; ferè rursus abeunt. Quæ cura si per inunctiones aut suffimigia fiat, illique nodi simul cum aliis locis inungantur, aut suffumigentur, eò citius recedunt. Quod si verò curatio per exhibita ea, quæ sudores mouët, instituatur, nodiq; nihilominus permaneant, tunc si non exactè lues hæc sanata fuerit, per vngueta & suffitus cura repetenda. Vel hæc sola, si târùm ex lue alioquin sublatâ hi supersint, illis vt recedant, adhibeantur, auctâ tunc in vnguentis eiusmodi axungiarum & oleorum, gummorumque emollientium quantitate.

Emplastra quæ pluribus sedibus applicata, ad huius luis curam interdum vsurpari diximus, priuatim nodis apposita, iuuant: Et imprimis Vigonis ceratum, quod admodum eos emollit & absumit.

Vel hoc illis adhibemus ceratum: R. gummi Ammoniaci vel etiam aliorum, Oppopanis ana vnc. ij. dissol. in aquæ vitæ; axung. Anatis, Gallinæ vel alterius ana vnc. j. medullæ cruris Vituli vel Hirci vnc. j. Ladani, Storacis calamient. ana drachm. ij. Styracis liquid. drachm. j. pulueris radices Hermodactylos Ireos ana drachm. iij. Cinnabaris drachm. j. Argenti viui cum Therebint. dis-

sol. drachm. vj. olei Lumbricorum & Ceræ q. s. fiat Ceratum.

Vel coquantur radices Bryoniæ, Cucum. agrestis & Iridis in Vino & contusis ad lb. ss. misceantur gummi Ammoniacum Galbanum, aliæve dissoluta in Aqua vitæ ad vnc. iij. Styracis liquidæ, pinguedinis Vrsi vel medullæ Equinæ ana vnc. j. Argenti viui cum Therebint. extincti vnc. ij. Pro emplastro.

Vel sumatur radix Bryoniæ nigræ, quam Sigillum S. Mariæ vocant, atque excauata impleatur Mercurio præcipitato, serueturq; aliquandiu in loco humido, postea exempto rursus Mercurio, è radice sectâ succus exprimitur; atque illinatur.

Lauatoria ex Mercurio sublimato, pro cura generali descripta, particularim quoque nodis & extuberantiis adhibita, ad ipsorum dissolutionem plurimum faciunt. Maximè si adeò efficacia sint, vt & vesicas illic excitent, vti ferè facere solent, vel cutem etiam adurant. Quod auctâ Sublimati quantitate, & addito Arsenico, vtrin generalibus lauatoriis formulam descripsimus, perficitur.

Spuma quæ dum guaiacum decoquitur, colligitur, nodos etiam discutit, si sæpè eâ lauentur.

Præter hæc nodis luis huius præcipuè accommodatis, alia insuper remedia, quæ alios nodos absumere, in tumoribus eiusmodi ostendimus, efficaciora præsertim ex hisce quoque vsurpari possunt. Vti in illis etiam hæc, quæ ex Hydrargyro parari modò diximus, similiter competere illis, declarauimus.

Imprimisque herbarum narcoticarum folia & radices, sicuti illic dictum, admota competunt. Vti & radix Bryoniæ nigræ etiam sine Mercurio contusa, apposita mirabilem effectum præbet.

Sunt qui in Lixiuij fortis parte j. & Saponis part. ss. R. habarbarum & Aloën decoquunt, donec in emplastrum redigantur, additaque Cerâ applicant.

Fouentur etiam nodi decoctis emollientibus in scirrhis & nodis podagricorum descriptis, aliisque duritiis.

Sacculus, Auenâ diligenter cecâ imple-

425

tus, calideque applicatus, sæpeque repetitus, valde quoque conuenire dicitur.

Amputantur & nodi, si non cedant & impedimentum adferant, vti in aliorum nodorum curâ demonstrauimus. Et si in fede, articulis aut nervis tendinibusque minimè vicinâ existant, vt in capite, aut metus sit ne ossa subsint carie infecta, eo modo etiam vtuntur cauterio actuali, & si caluariæ vel tibiæ medialis longitudinis pars aliqua infecta sit, vel alterius ossis, nec per vitionem à sanâ abscedat, instrumentis idoneis vel etiâ forpibus vel per treparationem, si in caluaria hoc fiat, portio ossis extrahitur vel auferitur. Quo in caluariâ facto, si meninx nuda appareat, syndone rubrâ antequam emplastra vlceri imponantur, infecta munitur. Dein vlcus vti in capitis vlceribus ostensum, sanatur.

Vlceribus tam externis quàm internis diuersis, in luis huius specie aliquâ, prodire solitis, aliàs si leuiores sint, cura generalis, quâ solâ curantur, sufficit, aliàs verò si altius radices egerint, particularis etiam cura, si præsertim deteriora sint, ne partes depopulentur, ossaque vicina vitient, debetur, illisque statim dum adhuc curâ generali vtuntur, si post eam nihilominus remaneât, adhiberi debet.

In externis vlceribus in facie iuxta nasum, labia, vel circa obscena & podicem, vel in præputio in masculis, vsurpando primum, si sordida sint, quæ illa munda reddant, si putrida, quæ putredinem auferant, si caua quæ carnem regenerant, indeque cicatrice obducantur. Dein & si ossa cariola facta sint, quæ cariem ab illis abradant. Quælia remedia quæ & potentia & actu illud præstent, in vlcerum malignorum curâ, sub quibus & huius luis vlcera comprehensa, copiose fuerunt proposita: Atque in generali ossium cariei curâ, ea quæ & hic faciendæ sunt, abundè declarata.

Conueniuntque imprimis in vlceribus huius luis, quæ argentum viuum vel sublimatum aut calcinatum, seu præcipitatum, aut in cinnabari redactum, simul cum illis quæ vlceribus accommodantur, recipiunt, cum hoc maxime, si sæpe dictum, huic luis

aduersetur. Quale illud est in vlcerum curâ descriptum, quod R. Argenti viui vnc. j. Terebinth. &c. illudque quod sequitur, crurum vlceribus maxime accommodatum.

Vel quod parari poterit ex Vnguentis etiam aliis illic descriptis, quale est Apostolorum, aliave, addendo ad 3. iij. Argenti viui cum Terebinth. dissol. 3. 8. vel Mercurij sublimati aut præcipitati 3. j. vel plus: Vel miscendo Vnguentum generale pro curatione huius luis in inunctionibus descriptum, cum æquâ horum Vnguentorum, quæ vlceribus competunt, proportionem: Vel aliud illic quoque descriptum, & pustulis vel vlceribus si adsint, accommodatum, hic etiam vlceribus post curam relictis, ad mouendum, atque vti illic docuimus, si putrida sint vlcera, Cinnabaris, Ærugo æris, & si necessitas exigat, Sublimatum etiam ei permiscenda, & si de ossis corruptione metus sit, Myrrhæ dosis ad 3. j. augenda. Quod si ossa cariola iam facta sint, Euphorbiû simul ad 3. vj. addendum, quod corruptas squamas ab osse sano separat & detrahit.

Pulueres rad. Hellebori albi, Agarici, fol. Sennæ, admisti, peruersa ista vlcera admodum emendant.

Inter cætera quæ ad curationem horum vlcerum faciunt, etiam oleum commendatur Guaiacinum: Item Antimonij, Petroleum & Iuniperinum.

Spumam dum decoctum Guaiaci coquitur, collectam, vlceribusque illitam, ad sanationem illorum quoque prodesse docent.

Interna alia vlcera in corporis cauitatibus in hac lue prodeuntia, licet & hæc, vt de externis dictum, per generalem curam sanari debeant, tamen & ipsis dum eâ curâ vtimur, vel etiam postea si perseuerent, particularia administrata competent. Quæ non multum ab illis differunt, quæ aliis eiusmodi locis vlceribus enatis, citra hanc luem, competunt. Nam in narium internis exulcerationibus, eodem modo, vti in narium aliis vlceribus docuimus, procedimus, per errhina attracta vel infusa, pulueres qui insperguntur, fumos narium hauriendos. Inter quæ illa quæ decocta Guaiaci, Cinnabari, sublimatum

illic admittere docuimus, peculiariter etiam hic conueniunt: Suffumigatioque ex Cinna-
bari facta non tantum corpore toto excepta
luem hanc, sed & tunc quoque naribus at-
tracta, vlcera hæc potenter sanat, sicuti illic
quoque demonstratum fuit.

In oris & faucium vlceribus diuersis vti
& aphtis, fissuris, excoriationibus, siue hæc à
lue ipsa mox prodeant, vel post hydrargyri
vsum primum erumpant, ea, quæ in aliis
eiusmodi exulcerationibus, in dolore oris
fauciumq; competere diximus, hic quoque
proderunt. Inter quæ & priuata quædã huic
lui præcipuè destinata, quarum aliqua the-
riacam admittunt, recensentur.

In podicis vtriusq; sexus & pudendi mu-
lieris interioribus, vlcera, vti & Condyloma-
mata, vtriusque loci frequentius luem hanc
comitantia, similiter non aliam curam re-
quirunt, quam quæ in doloribus harum se-
dium exposita, atq; istis, quæ ab hac lue pro-
ueniunt, illic quoque accommodata fuit.

In penis interno canali in viris, & cerui-
ce vesicæ, in vtroque sexu vlcera, ardentem
& purulentam mictionem, huius luis acci-
dentia, interdum procreantia, quomodo cu-
rari debeant, cum de mictione purulentâ, in
in reiectis agemus, demonstrabitur; Vti &
in gonorrhæa virulenta, quæ præcedere in-
terdum hæc solet, in excretis, quo pacto pro-
cedendum, docebitur.

Oris inflammatio & pustulæ ex vfu hy-
drargyri superuenire solita, quo pacto præ-
caueri debeant; inunctione ex Lacte aliisq;
pinguibus, in oris dolore expositum fuit.
Atque ibidem quoque declaratum, quomo-
do si sequantur, illis cura cum aliis illius loci
inflammationibus sit adhibenda, & priua-
tim quædam quæ theriacam recipiant, illius
causâ administranda; Et si in vlcera desinât,
de quibus & modò egimus, quomodo ea
sint gubernanda.

Maculis & pustulis aliàs non alia cura,
quàm ea quæ morbo huic conuenit, debe-
tur, quò radicitus extirpato, per varias vti di-
ctum expurgationes, illæ quoque rursus
plerumque auferuntur, vel si non sanato in-
tegrè morbo, remanserint, curâ repetitâ, eaq;
maximè, quæ per extrinsecus corpori admo-

ta, vti dicetur, perficitur, illæ cum morbi re-
liquiis tolluntur. Quòd si verò morbo sub-
lato, quia altius impressæ, nihilominus ad-
huc pertinaciter hæreant, iisdem remediis,
quibus alias maculas & pustulas rubras ma-
ximè, si tales hæ quoque sint, vel alias vitio-
sas extergi, vel absumi aut aduri diximus,
hasce quoque abolebimus.

Inprimisq; cum Argentum viuum, huius
luis vitia potenter tollat, inunctiones gene-
rales, quæ ad morbum sanandum ex eo fiunt,
hæc vitia egregiè simul abigunt.

Tum etiam particulares illis tantum ad-
motæ inunctiones, quales in maculis rubris
aliæ sunt descriptæ.

Vel admoueatur illis solum Argentum
viuum, diligenter agitatum cum Axungia
vel Terebinthinâ aut aliâ Resinâ.

Vel cum succo Limonum & Lapatij diu
agitetur Argentum viuum, addendo Ceru-
sam, Thus, Mastichen, vt fiat Vnguentum.

Vel: R. Argenti viui 3. j. Lithargyrii 3. ij.
Mastiches 3. β. Camphoræ 3. j. Terebinth. 3. j.
olei Vitelli ouorum q. s. agitentur.

Hiscæ prædictis si Sublimati tantillum ad-
das, efficacissima ea reddit.

Vel vtantur Sublimati aquis, misturis, vel
aliis ex eo paratis vnguentis, in maculis ru-
bris & vitiosis copiosè expositis.

Aut si leuioribus illud ab initio tentare
velimus, aliis quoque illic declaratis topicis
remediis: Vel etiam vnguento ex Alumine
vsto, Aloë, succo Arantiorû vel Lapatij, cum
Oxymelite squillitico parato:

Vel emplastro ex rad. Liliorum sub pru-
nis coctorum confusis, & cum Saccharo &
Camphorâ incorporatis, facto.

Aut illitione ex oleo Tartari.

Balneo aliqui etiam hæc abigere in ipsâ
curâ, per inunctiones factâ volunt, balneo-
que ob id insidendum esse post cœnam, &
manè inunctionem fieri debere, docent: In
balneo eadem ferè, quæ & in aliis pustu-
lis conuenire, in illis docuimus, hic quo-
que incoquentes: Veluti Lapatium, Sca-
biosam, Fumariam, Lentesc, Lupinos, Helle-
borum nigrum, Sulphur & similia. Quæ ta-
men nisi morbo integrè sublato, non adeò
conuenire possunt: Quare hiscæ balneis &

429.

aliis circa finem demum uti possumus, illisque vitia hæc remanentia delere, sordesque alias quæ ab inunctionibus adhæserunt, abstergere: Quod tamen etiam in balneo sicco fit securius.

Scissuræ in manibus vel pedibus si persistant, curatione peractâ, indicium est reliquias morbi superesse, quâobrem repetenda cura, maximè per inunctiones, vel hisce tunc solum volæ manuum inungendæ.

Vel Argenti viui ʒ.ʒ. dissoluatur cum ʒ.ij. Vnguenti alicuius de quatuor calidis, aut Enulati, vel Axungia cum Terebinthinâ, additaque Sublimati ʒ.ij. Vngantur fissuræ.

Vel Sublimatum puluerisatum misceatur cum Oleo violarum vel Amygdalarum aut Pomatâ, eâ quantitate ne exulceret, & sic illinatur, addito interdum & Alumine, Borace & Camphorâ.

Vel in aquis coquatur Sublimatum, quâ postea tangantur scissuræ, vel alio modo illinatur hisce formis, quas & maculas delere, in cura harum in discolorationibus & imprimis in fissurarum curatione, in superficie corporis abrasionibus, fuit expositum. Vti & alia ibidem fissuras cæteras quoque sanantia remedia, & hic locum habere possunt.

Vbi & declaratum fuit, quomodo antequam inungatur fissuræ, prius ablui debeât, decocto emolliente, quod & hic conueniet. Cui & abstergentia quædam, ut Lapathum, Fumaria similiaque addi possunt.

Squamæ in manibus se offerentes, si post curam remanserint, iisdem curari poterunt. Vel aliis quoque remediis in eo affectu, si sine lue hac fiant, in deformationis capite declaratis.

Vbi & si furfures superfint, curato alioquin morbo de Furfurum curâ agentes, hi quoque eâ ratione tolli poterunt.

Pilorum defluuium, ut capitis, capillorû, circa tempora & occiput, vel in facie, superciliorû & barbæ, certam huius luis speciem constituens, vel vnâ cum aliis vitis se offerens, per curam generalem, per purgationes, aut alias euacuationes per habitum corporis factas, plerumque cum hac lue curatur, nec ut illius. causâ aliquid priuatim fiat, ne-

cesse est. Quod si verò & hoc vitium relinquitur, cura vel repetenda, vel si lue alias cessasse conjiciamus, hoc solo relicto, topica varia in Alopecia seu pilorû defectu, copiosè exposita, hic quoque locum habebunt. Inter, quæ & humorum acrimoniam, pilorum radices arrodentem contemperant, peculiari-ter hic antequam defluant, adhibita, illorum defluxum prohibere, atque ubi iam deciderunt, ut causâ illius auferatur competere, illic quoque ostendimus. Inunctiones alias quæ argentum viuum recipiunt, uti in aliis huius luis casibus, post curam generalem relictis, peculiariter adhibitas conuenire diximus, hic fortè quoque aliquid præstarent, sed quia capiti & faciei, ubi pilorum hic lapsus præcipue se offert, hæc inungere commodè non licet, aliis potius, quæ sine eo parantur, utemur. Estque inter cætera hoc præstans, quod ex Cantharidibus paruis cum oleo Spicæ mistis, compositum illic descripsimus.

Accidentia alia seu symptomata in lue hac interdum euenire solita, curam ad se se quoque pertrahunt; Inter quæ hæc sunt frequentiora.

Virium lapsus ob nimias per aluum sudoresve factas euacuationes, corrigitur cessando aliquandiu ab iis, nec repetendo, donec ad se redeant; Resciendo interea ægrum victu & potu restaurante, medicamentisq; corroborantibus, intus forisque administratis, in Vitalis spiritus defectu expositis. Quibus & dum eiusmodi euacuationibus utitur æger, ægrum ne vires deficiant, præmunire possumus. Quod si quoq; in ipsâ curâ animo penitus deficiant, & in syncopen cadant, tunc statim ad motus variis, spiritus reuocandi. Quæ omnia, quâ ratione fieri debeant, viresq; vel deiectæ vel omninò lapsæ reparandæ, in vitalis spiritus defectu, abundè fuerunt exposita.

Dyarrhœa vel Dysenteria si ob violentas purgationes aut alioquin superueniant, remedijs in eiusmodi affectibus in reiectis enarratis, iis succurrendum. Inter quæ Narcotica veluti Theriaca aliave opiata data, naturam irritatam sopiendo, & sudores interrim minimè impediendo admo-

admodum, sicuti illic quoque demonstratum, proderunt.

*Stomacae
vis luis
ratio.*

Lues Stomacae seu Scorbutus vulgò dictus, etsi à venenatà quoque causà prodeat, tamen aequè, & citius quàm Lues Venerea curari potest, quod si negligatur, aut malè gubernetur, in hydropem facillè abit, aut alia grauiora infert mala.

Curationem huius luis, quæ illi vniuersæ abigendæ accommodatur, per euacuationes aliquas, atque alterantia quædam manifestis & occultis viribus, huic contrariis, perfici posse, experientia docuit, quibus & causa huius luis abigitur, intemperiesque emendatur.

Euacuationes sic instituendæ, vt quos maximè prauos humores redundare videamus, euacuemus. Quos cum melancholicum esse plerique statuunt, in venis meseraicis circa lienem, vel in eo coaceruatum, huic educendo curam omnè adhibent, tum per sanguinis emissionem, tum per purgationes per aluum factas, tum per sudores.

Sanguinis emissio, si plethora præsertim adsit, ante purgationes fit, tum in brachio, tum in manu, sinistri præsertim lateris. Nonnunquam & in pede, maximè in scemineo sexu, ubi menses substituerunt. Hæmorroidum quoque apertio plurimum affert emolumenti.

Purgationes sic fiunt, vt præmissâalui elutione ab excrementis, per iniecta vel assumpta, sanguineque, si opus sit, detracta, postea præparemus humores superfluos, eosque euacuemus. Quæ omnia cum ad melancholicum succum dirigatur, hæc iisdem & præparantibus & purgantibus perfici possunt, quibus & Lues Venerea, cum eam hoc modo maximè sanare volumus, vtimur, ubi & copiosè descripta sunt. Non tamen hæ purgationes tam diu, vt in illâ lue, continuando, sed ab initio aliquot saltem vicibus faciendæ, & si opus sit, semel atque iterum reiterandæ. Quibus remediis & ea quæ obstructions simul soluant, quas circa viscera lienemque imprimis, huic melancholiæ gignendæ occasionem præbere existimant, permiscant. Sicuti eiusmodi remedia & præparantia & purgantia, obstructionsque

simul soluentia, in aliis variis morbis ab hisce obstructionibus & à melancholia genitis, descripta, hic quoque vsurpari possunt. Quæ ed rectius huic lue accommodantur, si de alterantibus quædam, quæ illi proprietate quadam aduersantur, permisceantur.

Per sudores euacuatio, in cura scorbuti etiam, vt in lue venerea locum habet, quæ tamen non longo tempore, vt in illa continuari debet, sed postquam corpus purgatum fuerit, aliquoties tunc manè in lecto vel etiâ in balneo siccò, si vires ferant, promoueri. Quo nomine & decoctum Guaiaci, Zarsæ parillæ, Salsasias, aliaque in lue venerea copiosè enarrata propinari possunt. Vel possumus dare Theriacam vel Mithridaticam, aut quod valde est conueniens; Rob de baccis Ebuli, Sambuci, Iuniperi, addendo ad 3. iij. horum, Syrupi de Papau. 3. j. atque 3. ij. exhibere. Vel dantur affatim bibendæ aquæ destillatæ, in alterantibus explicandæ.

Alterantibus vtimur quæ malignam intemperiem huius luis, viribus contrariis vel proprietate quadam possint reprimere.

Quæ proprietate illud efficere experientia comperit, acrimoniâ quadam sunt præditæ aliquæ plantæ: Inter primas tenet, quas Cochlearia dicta, acris herba nasturtij instar, quam huic lue imprimis aduersari illiusque esse antidotum, omnes attestantur; tum comesta in acetariis, tum cum Saccharo in conferuam redacta, sæpeque vsurpata: tum succus illius cum Saccharo in formam Syrupi coctus, sicque aliquoties sumptus: Vti & decoctum illius in Lacte vel Vino factum, vel Ceruissâ, atque aliquot diebus continuus potum: Vel Aqua destillata.

Nasturtium aquaticum Brunnsresch nostris, idem præstare censetur, iisdem formis vti Cochlearia assumptum, vel vnâ cum illa sic præparatum & vsurpatum.

Anagallidem aquaticam quam Bachbun-gen vulgò appellant, similiter conuenire docent, quæ tamen non adeò, vt in nasturtium aquaticum, acris est.

Sedi tertium genus quod Illecébram vocant, vrensque non nihil existit, his quoque addunt.

Sinapi item herbam, imprimisque illius semen: Quod conditum cum Melle vti ex eo bellaria fiunt, magni vsus esse censent, nō solam ad curam huius luis, sed & præcautionem: Vti & bellarium ex Lepidio seu Raphano rusticano, quemadmodum cum Amygdalis nostri parare solent.

Alia ad intemperiem prauam illam corrigendam, quam visceribus, imprimis lieni & hepatis inesse putant, obstructionsq; eorundem viscerum liberandas, quæ simul concurrere ferè solent, varia exhibentur, in aliis similibus inde genitis morbis, & melancholicis affectibus descripta, tum in formâ decocti, syrapi, infusionum in Vino, aquarum destillatarum, conseruæ, electuarij, puluerû, indeque effectarum tabularum, pilularum aliarumve.

Quæ ex sequentibus ferè parantur, obstructions soluentibus & spleneticis, radic. Aperitiu. Gariophyllatâ, Anonide, Enulâ, Rhapontico, herbis Fumariâ, Thymo, Epithymo, Polypodio, Buglosso vtroque, Chamædri, Eupatorio, Tamarice, Chelidoniâ, Pimpinellâ; Et amarîs, Gentianâ, Squillâ, Gratiolâ, Absynthio: Item acidis, Acetosâ, Oxî, Et in frigidioribus etiam ex calidis, vt Beticâ, Menthâ, Saluiâ, Rosmarino, Stœchade, Origano, Hysopo, Arthemisiâ, Rutâ, Lauri baccis; Item aromatibus quibusdâ additis vt Nuce mosch. Macere: Dein & ex terrestribus, vt Vitreolo, Chalybe, Ferri scoriâ, Lapide bezoartico aliisque cordialibus.


Symptomata huic lûi copulata quod attinet; Gingiuarum tumor & vlcera, non alia topica, quàm quæ aliis eiusmodi gingiuarum vitiis in oris doloribus, vbi & horum meminit, expōita sunt, hîc requiruntur, vsurpandæq; collusiones & illiriones postea desiccantes, permixtis interim semper iis in hoc casu, huic lûi aduersis, vt decoctis, cochleariæ, nasturtij & anagallidis aquar: Vel succo aut aquis eorum.

In aliis quoque locis si vlcera prodeant, vt vlceribus cacoëticis aliis, similia remedia erunt accommodanda.

Maculas in cruribus vel etiam alibi se offerentes, quod attinet, cum hæ curato morbo, sponte iterum dissipentur, peculiarem

curam minimè exigent: quòd si quædam remaneant, localibus in maculis, in discoloratione, expositis ad motis, abiguntur.

Alia accidentia si superueniant, vt cōtractio, vel resolutio membrorum, vel leucophlegmatix aut hydropis si adsit principiû, tunc eò cura dirigenda erit, & sicuti in eiusmodi casibus in motus læsionibus & tumoribus ostensum fuit, procedendum.



DE CONSUMPTIONE.

CAPVT V.

Genera.



Consumptionem vocamus, quādo corpus illiusve partes consumuntur aut decrescunt, nam si alioquin graciliores sint, cum ad magnitudinem imminutam pertineat, in deformatione de hac egimus: Vti & si internæ partes absumentur, quemadmodum viscera quædam parenchymate constantia, etiam consumpta, citra corruptionem aliquando sectione inuenta fuerunt, vt hepar, lien, renes, quorû attenuationem, Maciæ illorum aliqui vocarunt, & sub hoc titulo descripserunt, quod idem fortè in pulmonibus, corde, cerebro quoque inueniri potest, hæque ipsorum consumptiones, in functionum, quæ tunc inde prodeunt, magnis læsionibus, descriptæ fuerunt. Externarum verò consumptionû, de quibus hîc agimus, duo præcipua occurrunt genera: Vnum in quo totum corpus, alterum in quo partes saltem aliquæ consumuntur.

Totum corpus interdum decrescit & absumitur, idque in amplitudine saltem, longitudine illius nihilominus manente, immò decrescente crassitie, ea quasi aucta esse videtur. Hoc autem magis minûsve fit; nam aliàs saltem minuitur ipsius moles & flaccescit, diciturque Marcor seu Macilentia, etsi ob nutrimenti defectum accidat vt in causis dicitur, Atrophia, vel si penitus ferè vel majori ex parte corpus consumatur & contabescat, Tabes, tuncque in facie, Tempora collapsa, Oculorum sedes minûs quàm de-

Maci-
lentia
Marcor.

Atro-
phia
Tabes.

cebat, impletæ, seu vt vocant concavæ, Naresque acutæ apparent. Qualem faciem quod Hippocrates, eam sic describat, Hippocrateam vocant. In qua præter hæc Maciæ exteꝛ prominent, Osq; hiat, nisi barba in viris faciei has sedes inuestiens, quod minus hoc in illis. obseruetur, obtegat & occultet. In thorace quoque Costæ omnes sunt conspicuæ, atque ipsis interposita adhærens cartilago xiphoides nonnunquam curuata cernitur. Scapulæ etiam alarum instar & Claviculæ veluti arcus, sub quo profunda fovea, procul à thorace se exerunt. In dorso Vertebrae spinæque harum admodum patent. Venter verò collapsus & veluti inanis, nisi hydrops superueniens, eum in tumorem attollat, se offert. In reliquo corpore collum attenuatum, & proin longius admodumque inæquale, cum externâ larynge, pmo Adami dicto, cernitur. Clunes pendulæ vel amissæ, Coxæ nudæ, Coccyx caudæ instar exertus. Crura brachia, manus, pedes ipsorumque digiti, macra & veluti arida existunt, circa articulorum verò regionem, amissâ vicinâ carne, magis adhuc protuberare videntur. Ungues item longiores sunt, & in summâ corporis attenuatione interdum curuantur. Aliquando & radices eorum adeò absumuntur, vt postquam iterum conualuerunt, recrescentes, parte posteriore, quæ succrescit, humilius procedente, quàm illa quæ prius exerta erat, impressionem transfuersam, vnguem veluti diuidentem obtineant, quæ tamen eum vngue crescendo procedens, tandem amittitur. Pili quoque radicibus exiccat, in consumptis, nonnunquam excidunt. Cutis flaccida, corrugata, fusca aridaque existit: In qua venæ sub ea latentes, penè omni illorum ambitu sunt conspicuæ, liuidæque toto ductu apparent.

Hac autem ratione, vel macilentia saltem aliqua, aut atrophica, vel absoluta corporis tabes, in sanis alioquin aliquando se offert; vt in illis qui victu necessario destituti, vel laboribus aut curis attriti, plus minúsve consumuntur: Vel ob senium decrepiti, præsertim facti macilenti, vel etiam sicci & aridi omnino fiunt.

In ægris corporis hæc consumptio frequentè superuenit, morborumque diuersorum est vnum inter cætera symptoma. Acutiorum præsertim & diuturnorum, in quibus corpora magis minúsve macra redduntur, & postquam sanitati restitute sunt, ægri rursum ad pristinam integritatem redeunt: vel aliquando etiam macilenti & flaccidi, toto vitæ tempore permanent, iamque senes, et si ætatem illorum nondum attigerint, esse videntur, vnde hunc marcorem Senium ex morbo aliqui appellarunt.

In aliis grauib; & magnis morbis, corpora, morbo diuturno perseverante, interdum penitus contabescunt & absumuntur: ^{Senium ex morbo.} Tabesque hæc tunc cum symptomatibus illorum morborum comitibus se offert, veluti frequētius cum tussis atq; exspuitione continuâ, quæ tabis species peculiariter ^{Phthisis.} Phthisis, aliis Phthoe, et si hoc nomē alioquin omnem corporis attenuationē significet, appellatur: ^{Pulmonis exulceratio.} Vel ob illius causam mox explicadam. Pulmonis exulceratio: In qua consumptionis specie, tussis indefinenter ægrum dies noctesque fatigat; cui Excreatio ferè semper succedit, quâ interdum crueta spuro permista, ab initio, nonnunquam & puri sanguinem, illumque, aliquando copiosum egerunt, sicuti in hæmoptica passione expositū fuit, quâ per vices cessante, etiam redeunte, purulenta sequitur per tussim excretio, per quam tandem pus syncerum, plerumque in odorem, alias etiam fetidum, nunc album, alias subflauum & virescens, vel etiam nigricans expuant. Quandoque & pulmonum putris portiuncula cum pure ejicitur. Febricula comes est hæctica; comitata ob id dicta & in febrib; descripta, calorem leuem, pulsum citum adferens, cuius causâ & respiratio præsertim ex leui motu concitata fit, vt & ex tussi continuâ. Quibus multos menses, vel etiam annos aut amplius durantibus, ad extremam corporis maciem, & formam aridi cadaueris vel sceleri cutē obrecti, corpus tandem redigitur.

Accedit insuper huic Phthisi interdum etiam ^{Empyema, Suppuratio.} alius affectus, quem Empyema seu Suppurationem, ob puris in pectoris cavo congestionem, vocant, non aliis signis, quàm his quæ

437

& pulmonum exulcerationem denotant, se prodens. Aliàs verò fluctuatione quãdam, in pectoris alterutrâ sede se manifestat, certiusque adhuc, si tuberculum aliquod in costarum spacio se exerat, quod pressum refugit, missumque redit. Quæ signa, si quandoque ea quæ phtisim denotant indicia præcedat, quod rarum est, mox tamen interdum ea subsequuntur, phtisi, vti in causis dicitur illico succedente.

*Maras-
mus.*

Cum febre hætica simplici, hæc corporis consumptio se præcipuè offert, & præter calorem licet non magnum, perseverantem tamen, ægrum afficit sensimque consumit, adeo vt ob hoc præcipuum illius symptoma marcorem, quem Marasimum Græci vocat, febris hæc Marasimodes dicatur, vel Marasmi nomen, etsi omni marcori conveniat, huic tantum feberi attribuitur, eamque Marasimum appellantes, illius marcoris potius quam febris causâ, tres eius gradus statuunt; quorum primum, qui prout corpus plus minusve absumpsit, vel incipientem cum incipit, vel Adæsum, cum augetur, vel Confirmatum, cum ad extremum peruenit, Febrem marasimodem vel Marasimum simpliciter cum additione horum graduum, sicuti hæc vberius in febre hætica exposita fuerunt, nominant. In cuius summo gradu adeo corpus fit siccum & aridum, vt & cartilagine curuentur, quæ proin in costarum extremitatibus & ossæ xiphoidæ prominent, cutisq; tensa & aspera, ungues incurui fiant, pilique excidant.

*Colliqua-
tio cor-
poris.*

Cum alia febre, quam quoq; hætica speciem statuunt, quæ ex ardente febre seu cause prodit, hæc corporis consumptio aliquando iungitur, quæ quia subito, breui, non sensim & longo tempore, vti alia hætica corpus absumit & veluti colliquat, Colliquatio vel Colliquans febris ob id appellatur, qualem in febribus descripsimus.

*Atro-
phia ca-
chexia
copula-
ta.*

Cum aliis accidentibus, vt coloris viuidi amissione seu pallore, compressio cordis, vti vocant, dolore, cæterisque in cachexia expositis accidentibus, quibus intumescantiam corporis in eâ copulari diximus, etiam decrescentia quoque illius & consumptio interdum iungitur, tuncque Atrophia, vti di-

cetur, appellatur, quam etiam cachexiæ speciem, cum & hic corporis malus habitus, si decrescat, occurrat, statuere, eamque sic appellare possemus, etsi cachexiæ nomen aliàs corporis incremento potius quam decremento attribuitur. Hanc atrophiam, sub morborum, vnde prodit, titulo, vt hepatis lienisq; affectibus describunt Prædici, eamq; consumptionem, morborum illorum nominibus comprehendunt, nec sub titulo atrophie priuatim tractant.

Præter eiusmodi atrophiam copulatam *Atro-
phia hy-
drope co-
mitata.* cachexiæ huius speciei, occurrit & alia, hydrope illiusq; accidentibus comitata, per quam licet venter & pedes intumescant, reliqua tamen superiora corporis quoq; attenuantur, nonnunquam & penitus contabescunt, corpusq; ex parte supra modum tumidum, ex parte consumptum euadens, miserum aspectum præbet, sicut hæc in hydrope exposita fuerunt.

Partes peculiare aliquæ interdum consumuntur, plus minusve, tumque partis illius atrophia, quo nomine & quandam tabis speciem, ob eadem quam & illa causam appellant, in causis ostendimus, vocari solet, quam Germ. *Schweinsucht* nominant: Frequentius autem hæc in membris seu artubus exterioribus occurrit: Veluti circa coxam, vbi imminutâ carne illic, & circumcirca idem quoque in pede subiecto, maxime circa femoris & surarum crassitiem accidit, manifestiusque apparet. Vel hæc circa summum humerum aut cubitum, illorumque carnosiora loca occurrit, & in manu quoq; maxime in interuallo, quod pollicis & indicis substrata ossa intercedit, collapsio & impressio se manifestat.

*Oculi a-
trophia
vel tabes.*

Præter hæc atrophias, Oculus potius quam pupilla, vti illi docent, atrophiam contabescere, vel phtisi laborare dicitur, quando non exacte distentus & impletus, sed nonnihil collapsus & subsidens, quasi minor obscuriorq; apparet, pupillæq; foramen seu nigrum oculi angustius, magisque contractum cernitur. Quæ angustatio pupillæ in visus læsione descripta fuit. Quod & oculi hæc subsidencia potius quam tabes, quæ in crassa illius tunica fit, pertinet.

Causa.

Sides aff.
fecta.

OMnium tam generalium, in quibus totum corpus, quàm particularium, in quibus saltem partes aliquae decrescunt, vel contabescunt, causa in partibus præcipue mollioribus, carne & pinguedine consistit, cum hæc citius, ob causas mox dicendas, consumantur, quàm quæ duriores sunt, vt ossa, cartilagine & membranæ, quæ manifestè vix decrescunt, ob solidiorem eorum substantiam, licet absumpto ipsorum succo & humiditate, etiam viuentem adhuc hominem ficcari & arescere, non nihil possint. Hincq; fit, vt carne & pinguedine absumptâ, loca quæ illis prius opplebantur, postea inania relinquantur, ossaque minus testa, & tanquam pelle solum obducta, promineant. Quæ inæqualitas in protuberantiis & cavitatibus illis in locis se maior offert, vbi plures maioresque existunt muscoli, vt in temporibus & facie circa malas, in quibus collapsis, os iugale prominentiam illam efficit, vbi & oculi sedis cavitates anterior, propter musculos & pinguedinem, quæ circa radicem oculi existit, absumpta, retrocedente tunc oculo, se offert. Et in reliquo corpore, absumptis musculis copiosis, collum occupantibus, thoracem inuestientibus, dorsum implentibus, abdomen constituentibus, clunes efficientibus, multa loca inania, & cavitates ostiumque vt vertebrarum, costarum illarumque & laryngis cartilaginum, scapularum, clauicularum & ilij protuberantiæ comparent, & in reliquis membris, absumptis musculis, qui brachia & crura implebant, furasq; constituebant, brachialisq; & pedis interstitia opplebant, & digitorum ossa ambiebant, ea loca nuda & depressa, ossaq; in illis, illorumque præsertim articuli, protuberare cernuntur, unguesque consumptâ etiam digitorum extremâ carne, magis prominere, non verò amplius, vti creditum fuit, in consumptis excrescere, cum tunc potius decrescerent, nisi à natura hoc illis inesset, cum continuè atterantur, vt ad extremum usque vitæ tempus, pauco, vti de ossibus dictum, nutrimento contenti, semper crescerent. Quod & pilis euenit, vt consumpto

vniverso penè corpore, & illi continuè incrementum capiant, nisi etiam tunc exiccatis vi morbi eorum radicibus, vt sæpe fit, defluant. In aliis cartilaginibus, vix dum aliqua consumptionis appareret indicia, nisi quod externæ illæ denudatæ, magis prominent & attenuatæ esse videntur, vnde nasus acutior apparet, dein & ungues, qui soli è cartilaginibus se è cute exerunt, in summa corporis attenuatione interdum curuantur. Quod membranas attinet, Cutis quæ sola inter eas conspicua est, cum corpus ambiendo æquale reddat, si subiectum illustratum, quo distenta manet, caro & pinguedo absumantur, flaccida & corrugata, vt dictum, fit, & rugarum umbras efficientium causâ, circa illas fusca & obscura. Et sub eâ venæ cutaneæ, ob absumptam quæ illas toto ductu ambire solet, pinguedinem, nudæ apparent.

Quod verò enarratæ partes consumantur vel contabescant, causâ est vel Nutrimenti illarum aut Humidi substantifici defectus, vel Temperamenti ipsarum mutatio.

Ob nutrimenti defectum si corpus emacietur vel contabescat, Atrophia appellatur. In qua partes succo ipsos nutriente ex sanguine singulis assimilato procedere solito, destitutæ marcescunt, cum in locum substantiæ deperditæ, nulla noua aut non sufficiens reponatur, imprimisque carneæ, cum ampliori vt sustententur nutrimento, eoque continuè opus habeant, & cum molliores sint, facilius absumi possint, duriores verò, vt ossa, cartilagine, membranæ, minime vel non apparenter, cum vel minimo refici queant, & ob duritiem stabiles & firmæ manent, nec ipsorum substantia vt in aliis cedat, vnde & post mortem ossa nihilominus diu perdurare videmus. Cæterum variis de causis nutrimenti ille defectus accidit, imprimisque quia vel non generatur, vel inutilis est, vel impeditus.

Quando non generatur sanguis sufficienter, tunc quia succus partes nutriendus, ab eo profectus deficit, & quia pinguedo non à pinguiore ipsius portione exudante, quæ quoq; continuè deperditur, restituitur, & sic perit, corpus absumitur. Penuria autem hæc sanguinis primæ interdum concoctionis,

Nutri-
menti de-
fectus.
quia
sanguis
non ge-
neratur
vel inu-
tilis est,
cuius
Atro-
phia
simplici-
vel illius
quæ cum
cachexia
aut hy-
dropse co-
pulari
est.

seu.

seu chylicationis, cum chylus illi materiâ præbeat, causâ accidit: Si ille deficiat, quod sit, vel ob cibi penuriam in sanis, quando in ediam patiuntur, vel in egris, quando ob appetitum deiectum, cibum respuunt, unde quoque non solum morbi causâ corpora, vti dictum, debilitando attenuantis vel etiam absumptis, sed quod diu cibo exiguo aut minus nutriente aliti fuerint, corpora ipsorum attenuantur. Quod & ab aliis ventriculi morbis euenire potest, vt concoctione per eos labefactatâ, chylus parcius vel imperfectus gignatur, corporaque eâ ratione emacientur, vti & in tympanite corporis eâ sedes, quæ non flatu intumuerunt, consumptæ sunt. Secundæ concoctionis seu sanguificationis læsæ causâ, sanguinis generatio deficit, corpusq; inde attenuatur, vel si omnino impedita sit, atrophiam consumitur. Quæ læsio à viscerum hepatis & lienis morbis diuersis proficiscitur, veluti tantâ imbecillitate, à qua horum viscerum actione non solum diminutâ, cachexia vel leucophlegmatia procedit, sed ferè abolitâ, ad eam vt proventus penè omnis sanguinis sit sublatus: Cuius magnæ imbecillitatis causæ eadem, quæ & minoris in cachexia expositæ, si validiores existant, esse possunt. Sed & alij hepatis & lienis morbi hydropem ascitem gignentes, atrophiam eâ ratione hydropi copulare possunt; In qua superior corporis regio, supra præcordia, quæ non distenta tumore existit, vti venter & pedes, penitus emaciata consumptaque apparet. Qui morbi in hydropis causis quoque descripti fuerunt.

Inutilis & corpori nutriendo minimè idoneus est sanguis, si vitiosus sit non crudus, unde cachexiam, & leucophlegmatiam nasci diximus, sed aliàs impurior, tunc enim marcorem vel atrophiam, cacoehymia iunctam procreat; Vel etiam si serosior sit, eum quia sciti copulatur, progignit. Quod vitium in primæ concoctionis labe, quam secunda non emendat, vel etiam secundæ, sanguis contrahit, à causis quoque in eiusmodi affectibus expositis.

Impeditus sanguis nonnunquam quò minus partibus comunicetur, Atrophiam particularem plerunque progignit, à causis ex-

ternis ferè deductâ, cum internæ prius enarratæ, sanguinis defectum procreantes, marcorem toti corpori cōmunem potius quam particularem producant. Impeditur autem eiusmodi sanguinis distributio, Venis per quas influere debebat, impeditis ex compressione, per luxationem aliquam interdū factam, alicuius articuli, vt coxendicis: Quæ diutius perseuerat atrophiam cruris frequenter sequitur, & stupor aliquis, si cum venis nerui simul premantur. Quod & in aliis luxationibus simili modo potest accidere: Vti & si membra diutius arctè vincta fuerint: Vel venæ à vicino aliquo tumore, callo, aut nudo vel ganglio circa iuncturas, vti frequentius sit, arctatæ, vel etiam abscissæ, præsertim si hoc circa maiores venas, vel in pluribus simul accadat, cum alioquin, si pauciores aut minores hoc pacto pressæ dissecatæ ve fuerint, pluribus per partes distributis, reliquæ intactæ, adhuc partem enutrire valeat. Idem si magnæ arteriæ, quæ in profundo latent, absecantur, euenire potest, unde tamen mortificatio potius quam marcor membri sequitur.

Ob humidi substantifici & per consequens *Humidi* caloris natiui, cuius est pabulum defectum, *substan-* corpus interdum consumitur, idque aliquādo ætatis causâ, sicuti enim eo per ætatem *tifici de-* iuuenilem abundante, corpora crescunt, & *fectus,* postea in ætate consistente, eo perseuerante, *causa* vigent, ita per senium vti illud, sic & corporis *Marco-* substantia, quæ eo sustentabatur, decrescit *ris &* absumiturque, adiuvante insuper siccitate *Tabu.* partium, quæ ratione temperamenti in siccius mutati, senibus aduenit, unde etiâ corpora ipsorum aridiora sunt.

Idem laborum & curarū, & in ægris morborum occasione euenire potest, quando ob illorum vehementiam & perseuerantiam, & morborum diuturnitatem vel peruicaciam, absumpto humido primigenio, caloreque natiuo debilitato, vt in senio, ætatis decursu accidit, sic extrahit, vi laborum, curarum vel morbi, citius quam par erat, hi tanquam senescentes, non solum imbecilliores sed & macilentiores fiunt, tandemq; marcescentes ad extremum vsque vitæ tempus sic permanent. Nisi fortè hæc calorem

natiuum nondum adeo debilitarint, quin reparari possit, tunc enim etsi admodum attenuati sint, tamen si à laboribus & curis desistant, & à morbo conualescant, pristinum corporis vigorem statumque recuperant.

Temperamenti insiti in calidius & siccus peruersio in febre hectica & colliquante, causa Marasmi & colliquationis corporis.

Ob temperamenti insiti in calidius & siccus stabilem permutatione, accidit, ut tunc singulis partibus eandem intemperiem adipiscantibus, & retinentibus, corpus non solum non amplius crescat, in iuuenibus, sed & in prouectæ ætatis, & senibus decrescat, sensimque exiccatum marcescat & contabescat. Sicuti in febribus hecticis euenit, in quibus ob febris ephemeræ vel alterius præcedentis calorem, cordis temperamento, & per consensum omnium partium, in calidius & siccus conuerso, corpus marasmo dicto, uti in febre hectica demonstratum, spacio temporis consumitur.

Quod uti non nisi sensim in hac hectica specie, ita subito & breui tempore hoc in illa accidit, quæ Colliquans dicitur, & ardentis febres seu causones sequitur, à quarum summo ardore non solum cordis temperamento, citò in calidius & siccus conuerso, sed & substantiâ illius colliquatâ, ut vocant, seu potius arefactâ & absumptâ, cum hoc idem in partibus solidis molitur, corpus inde statim consumitur, seu ut vocant, colliquatur, sicuti in febre colliquante id abunde ostensum fuit.

Temperamenti insiti in calidius & siccus peruersio, in febre hectica comitata, phthisis causa.

Quæ uti in febribus eiusmodi hecticis simplicibus seu solitariis accidunt, sic & in ea, quæ comitata est pulmonum affectu, atque ab hoc proficiscitur, similiter contingit, corpus sensim, ut in hectica simplici contabescere, unde & febris hæc hectica, cum morbo qui illi causam præbet, ob tabem hanc, phthisis nominatur. Quæ tabes à putredine in pulmonibus excitatâ, cor vicinum continuo laceffendo, calefaciendo, intemperatamque calidam & siccam, in eo uti & singulis partibus, febremque proin hecticam introducendo, oritur, uti aliæ hecticae ab aliis febribus originem trahunt, sicuti in eiusmodi febribus hecticis, in febribus descriptum fuit. Cuius putredinis, indeque natæ febris hecticae, & ab ea prodeuntis tabis causa prima, pulmonum est exulceratio, eousque pro-

gressa, ut putredo inde sequatur, quæ corruptos pulmones ex parte aliquâ, vel etiam penitus in vno latere, & in pus conuersos deprehendimus, vasis cordis, quæ illi cum pulmonibus sunt communia, similiter cum pulmone illius lateris deperditis, & circa cor veluti abscessis, & callo illic iuxta radices occlusis & obliteratedis: Tantamque sæpè corruptionem fuisse, ut & mediastinum pulmones diuidens, ipsumque pericardium cor obvoluens, eâ infecta fuerint.

Quibus sic se habentibus, pus in pulmonum hac exulceratione genitum, non solum asperæ arteriæ ramis illapsum expuitur, sed & tandem, quando ex corruptione pulmonum substantia diuiditur, in pectoris cavitatem influens, illicque sensim coaceruatum, atque interdum magnâ copiâ congestum, Suppurationem quam Empyema vocant, producit. Quod ab exulceratione hac in phthisicis, eo uti diximus modo potissimum prodire, uti sectio patefacit, per quam in corruptione pulmonum, puris semper aliquam saltem portionem, si non magnam, pectori adhærere, vel innatare deprehendimus, ita & hæc comprobare videntur, quod vix dum ex succingentis membranæ inflammationis suppuratione pus genitum, in pectus se, uti verò docent, exoneret, sed si hoc fiat, quod rarum est, per exteriora potius, uti in illa pleuritide quam succingentis vocauimus, demonstrauimus, emergat. Nisi forte abscessus quidam, succingenti aut intercepti membranæ, vel etiam pulmonum exteriori tunicæ adnatus, aliis quam ab inflammatione de causis ruptus, in pectus pus effundat: Vel aliunde extra thoracem pus in illud defluat: sicuti in anginâ suppuratâ hoc fieri posse docent, & à destuxione labentis pituitæ in pectus, idem fieri, quod tamen, cum nullus ductus qui à collo descendat & in pectus se aperiat, existat, & si hæc in asperam arteriam influant, nisi tussis iterum rejiciantur, in pulmones potius quam pectoris cauum delabantur, haud verisimile videtur, multoque minus à pituita defluente hoc euenire posse. Quod si tamen citra pulmonum exulcerationem empyema, eo uti dictum modo, nasceretur, retento in pectore pure, pul-

Pus in pectore coaceruatum, causa Empyematis.

pulmones etiam etiam tandem inficerentur, illorumq; exulceratio, mox etiam empyema tale sequeretur, quæ tamē (vt diximus,) plerumque si non semper, empyema solet præcedere.

*Soluta pulmonum coarctata-
sa Pulmonis exulcerationis.* Huius autem exulcerationis indeq; natæ putredinis causæ sunt, vel Inflammatio pulmonum, vel Ruptura vasculi alicuius in pulmonibus, vel Vulnus illius, vel Substantiæ exessio, ab humore aliquo acri vel putri vel venenato procedens.

Ab inflammatione pulmonum in peripneumonia & pleuritide, si non saltem sanguis maturatione & coctione in pus, quoddam postea excreatur, vt plerumque fit, sicut & in pleuritide ostensum fuit, conuertatur, sed & pulmonum substantia inflammata, alicubi simul suppuretur, exulceratio pulmonum quæ interdum eiusmodi inflammationes sequitur, gignitur, in qua pus maiori copiam tunc genitum, tussim propulsum, faucibus palato, & oris adhæret, magnaq; sæpe quantitate ab initio, sicuti crebro vidimus, expuitur. Quod pus nisi mors præueniat, pulmonum substantiam ulterius corrumpens, phthisim eam diuturnam, febre hæctica comitatam, in qua sensim corpus contabescit, procreat, cui, si vel in illius mox principio, vel postmodum pus in cauum pectoris defluens, illic coaceruetur, Empyema insuper accedit, vt & Hipp. pleuriticis, si quatuordecim diebus non purgentur, in suppurationem seu empyema transire docuit: quo eo modo, in pleuriticis vt & peripneumoniacis, è pulmonibus pure emanante potius, quam à succingente membrana, vt aliàs voluerunt, euenire, cum vera pleuritis æquè ac peripneumonia à pulmonum inflammatione, vt in ea declarauimus, procedat, comprobatur.

A ruptura vasculi pulmonum, vel quæ substantiam ipsorum vndiq; perreptat, sanguineq; repleta sunt, frequētius hoc fit, tuncque sanguine è vasculis in asperæ arteriæ ramos effuso, sanguinis excreatio per tussim primum se offert, quæ cum plerumque phthisim præcedere solet, à disrupta venâ eam frequētius nasci demonstrat, idq; hac ratione, quod per disruptam venam, vulnus in pulmonibus factum, ob continuam pulmonum

dilatationem & constrictionem, per quam illius labra indefinenter diducuntur, coalescere & consolidari nequit, sed diuturnitate in vlcus sordidum conuersum, vicinam pulmonum substantiam putredine afficiens & corrumpens, vt dictum, febrem hæcticam producendo, tibi occasionem hoc pacto præbeat. Cuius vasculi rupturæ causa, nimia & vehemens pulmonum dilatatio interdum existit, in vociferatione, sufflatione valida vel conatu intenso, in rebus gestandis vel voluendis, aut excernendis excrementis, aut foetu excludendo. Aliàs verò ruptura vasculi ab aliâ vi externâ prodit, vt ab ictu, casu, si pectus eousque vt pulmones simul lædantur, contadatur. Sicuti hæc in hæmoptoicæ passionis causis vberius explicata sunt.

A vulnere pulmonum à causis externis producto, ob contusionem pectoris iam dictam, non solum vasa disrumpentem, sed & substantiam ipsorum contudentem, vulnusq; contusum procreantem, vel vulnere punctum plerumque pectori inflicto, & ad pulmones vsq; penetrante, cum vel hac vel illa ratione illarum vulnus sordescit, vlcus in pulmonibus quoque gigni potest.

Ab humore falso vel alioquin acro à cerebro defluente, pulmonesque erodente vel exedente, eos exulcerari, eamque potissimam phthisis causam esse, plerique censent, quod tamen tam facile vix fieri posse, hoc comprobare videtur, quod innumeri, quibus eiusmodi defluxiones multis temporibus moleste sunt, tussimq; concitant, tamen minimè fiant phthisici, iuuenesq; frequētius quam senes, quibus defluxiones magis consuetæ sunt, in hoc malum incurrant. A defluxionibus tamē, tum quia tussim promouent, hæcque aliquando, vt dictum, venæ rupturam, tum quia multoties pulmonum interiora irritando, eos successu temporis lædere potest, phthisim interdum suboriri posse concedimus; defluxionesq; phthisicis facile suboriri, à quibus etsi læsio pulmonum, non primum genita sit, tamen ea ob tussim, quam de nouo huic, quæ ab vlcere alioquin iam prius progressa fuit, copulat, plurimum sic augeri potest. Frequētius tamen si ab humore pulmones vlcerate phthisis sit hoc eo in pul-

pulmonū substantia congesto, retento corruptoque, nec per tussim reiecto, vel sæpius se iterum congerente, procedere potius existimamus, cum in substantia pulmonum genitus, nec dum in asperæ arteriæ ramos se ingerens, tussim minus, quàm si à capite deflueret in asperam arteriam, mouendo, diutius subsistere, sicq; magis lædere possit.

A sanguine vel pure pulmones quoque vitiari, hocque pacto phthisim suboriri posse, docent; Et in hæmoptoica passione, quod sanguis non sufficienter per tussim excretus, retentus, putrescens pulmones lædat, phthisim sic produci. Verùm cum ob venam ruptam potius hoc, vti demonstrauiamus, fiat, si tunc quoque sanguis è vasis elapsus, alicubi subsistat, nec excernatur, & corrumpatur, duplicem ob causam, tunc pulmonum hæc læsio procedet. Quod si verò sanguis non à venâ ruptâ pulmonum, sed per asperam arteriam à superioribus in pulmones delabatur, nisi tussi rursus, vti ferè fit, eiiciatur, & ille infixus alicubi subsistat, quod vix tum fit, tunc etiam putrescens, eâ ratione pulmones potest lædere. In inflammationibus pulmonum in pleuritide & peripneumonia, sanguis similiter ab ea exudans, vel pus, quod ex eo suppurato nascitur, si per tussim non sufficienter expurgentur, sed in pulmonibus retenta eos inficiendo corrumpant, phthisim quæ nonnunquam pleuritidem vel peripneumoniâ non bene per tussim expurgatam sequitur, gignunt. Pus quoque in vlceratis & corruptis iam phthisicorum pulmonibus, tum quia continuo generant, tum quia quia infarcta portio illius manet, illos iam prius vlceratos, vt magis magisque corrumpantur, efficit.

A venenato humore vel qualitate pulmonibus infestâ, pulmones si exulcerentur, sicuti de lepore marino scribunt, illius esu pulmones vlcerari, siquidem verum est, id non nisi ab eiusmodi aduersâ pulmonibus vi, inde exurgente, proficisci potest.

Curatio.

A Commodabitur hæc consumptioni corporis primum huic quæ generalis est, totumque corpus occupat, postea parti-

culari, quæ certis duntaxat partibus accidit.

Generalis totius corporis consumptionis diuersorum generum curatio, primum prout hæc vel in sanis vel ægris accidit, distinguitur.

In sanis alioquin nec alio morbo detentis, si ob inedia diu passam, nutrimenti quæ inde profectum defectum, Atrophiam quandam corpus patiat; Vel ob labores curasque, absumpto humido substantiali consumatur, tunc si rursus decenter cibentur, à labore vehementi abstineant, curasque seponant, sponte hæc emendantur, nisi penitus ad extremam vsq; tabem corpus redactum sit, quæ egrè amplius cedit. Vti & ob senium ætatis causâ, absumpto humido substantifico, atque arefactis membris contracta macilentia, sicut nec senium ullo pacto amplius corrigi poterit.

In ægris si ob Appetentiam prostratam, quia cibos non sufficienter admittunt, vel morbi vim nutrimentum absumentem, nutrimentiq; inde profectum defectum, Atrophiam aliquam corpus patiat, ea postquam morbo cessante, ægri conualescentes cibum rursus appetunt, quoque desinit, corpusque pristinam habitudinem recuperat. Quod si verò ob morbi diuturnitatem, vel vim & acutiem, illius humidi substantifici defectus sequatur, marcorque quem senium ex morbo vocant, inducatur, is certè, vti nec humidum ipsum, aut senium, reparari amplius minimè poterit.

In morbis viscerum chylicationi & sanguificationi destinatorum, ventriculi preteritum, hepatis & lienis, quæ sequitur Atrophia ob nutrimenti defectum, qui à morbis illis procedit, vnde sanguis non sufficiens vel inutilis ad nutritionem generatur, curam potissimum eam exigit, quæ hisce morbis debetur, quibus sanatis mox corporis redit integritas, sin minus, ægrum cum morbo pessundat. Quam curationem horum morborum in aliis grauioribus accidentibus, ab eiusmodi morbis etiam profectis, descriptissimus: Veluti in Cachexia, cuius quoque speciem esse Atrophiam, illic ostendimus. Dein & in Hydrope aliisque nonnullis, à vi-

Atro-
phia &
Marcoris
curatio.

Atro-
phia cū
morbo
copulata
vis &
cachexia
& hydro-
pe cura-
tio.

à viscerum horū morbis prodeuntium symptomatibus, atrophiam quoque comitem nactis. In quibus omnibus, corporis huius consumptionis causā, si admodum hominem conficiat, Nutrimentis euchymis, beneque nutrientibus, sæpe sunt reficiendi: Eligendo exquisitiora ex illis, quæ in hēctica febre & phthisi copiosè descripta sunt, & à ventriculo, qui hīc plerunque debilitatus est, euinci queant: Huius quoque causā, si illorum appetitus omnino deiectus sit, adeo ut vix aliquid vel parcissimè saltem assument, iniectio per clysmata ad nutriendum, aliquid iuuare posse creditur. Qualis in febre hēctica ex lacte, iure capi & vitello oui concinnata exposita fuit: Quæ & ex decocto aliarum carniū & succo expresso, vel per decoctionem in formam congelati redacto, & aquis inde exstillatis; item cremore Hordei, addito & Vino parata conuenire.

Marasmus & Colliquatio in corpore curatio. Febris hēctica causā, ob temperamentum infirmi in calidius & siccis sensum conuersionem, si Marasmus sequatur, quo pacto procedendum, in cura febris Hēcticæ Marasmodis abundè declaratum fuit.

Vti & in causone febre ob eandem causam, sed violentiorem subito accidens colliquatio corporis, in cura febris colliquantis quid faciendum, expositum fuit.

A febre verò hēctica lentā ab exulceratione pulmonum profectā, temperamentum quoque peruertente, quæ sequitur Tabes seu Phthisis, quo pacto tractari debeat, & quid de eā prædicendum, cum in febribus obiter illius tantum meminerimus, hīc nunc exponendum.

Phthisis à Pulmonū exulceratione cura, & Empyema. Pulmonum continuas soluta, ob ruptū vas aliquod, vnde sanguinem spuant, ægrè iterum coalescit, & proin vix dum quod minus exulceratio sequatur, impediri potest. Quæ si iam, vel ob hāc, aliāve causam pulmonum substantiam inuaserit, purulentāq; & putrida exscreant, longè minus, immo difficillimè curatio succedet, desperataque omnino est salus, si pulmones corrumpi, atque ex parte aliquā vel magnā in pus conuerti atque putrescere, ac empyema in pectore excitare incipiant. Quam curationis difficultatem vel impossibilitatem, motus

continuus pulmonum ex parte parit, qui illorum continuitatem solutam nō finit amplius coalescere, vti & tussis comes, à purulenta illa materia, vel accedente defluxione, indefinenter molestans, pulmonesque magis magisque concitans. Dein & cum medicamenta ad pulmones vix minimā suā portione peruenire possint, illa quoq; in ruptura vasis, aut vlcere iam nato, cum parum operari queant, curam protrahunt, atque irritam sæpe faciunt: Vti & illud, quod pulmones corrupti reparari amplius nequeant, & quod de pure pectore illapso in Empyemate, si accedat, parum aut nihil per excreationem egeri possit. Et licet sectione factā è pectore educatur, tamen pulmonum remanet exulceratio, sine quā empyema vix gigni posse prius demonstrauimus. Quod & licet nullā præcedente exulceratione pulmonum, ab abscessu aliquo aliōve modo, vti dictum fuit, oriretur, nisi maturè illi exitus sectione patefiat, vnde fortè sanari posset æger, si ita rem se habere cognosceretur, vel æger apertionem concederet, retentum pulmones corrumpit, & in idem periculum inducit.

Curatio, cum nihil intentatum relinquere debeamus, suscipienda, prognostico tamè prius in deteriore potius quam meliorem partem inclinante, præmissio. Accommodaturq; hæc præcipuè morbo, veluti exulcerationi seu corruptioni pulmonum, & simul cum eo purulentæ huic excretioni cū tussi, quæ inde procedit, vti & puris collectioni in pectore in empyemate, si illi iungatur: Dein & alio morbo comiti febris hēcticæ, & simul consumptioni corporis, quæ ab ea potissimum exurgit: Postmodum & causæ, defluxioni nimirum, vlcus vel inducenti vel fouenti, tussimq; adaugenti. Quod aliam causam attinet, venæ scilicet rupturam, quæ per sanguinis expuitionem cognoscitur, quid illius causā faciendum, in hæmoptoica passione fuit expositum.

Exulcerationis pulmonum & corruptionis, indeque profectæ purulentæ per tussim excreationis & collectionis in pectore, causā, exhibentur quædam, quæ licet vix & minimā quātitate, ad eos per asperam arteriam

penetrare queant, tamē succēssivē vsurpata, aliquid quoq; possunt efficere. Danturq; vti in aliorum vlcērum curā fieri solet, abstergentia, quæ pulmones à pure, & pectoris interiora etiam, si & illi pus à pulmonibus inhæreat, repurgent, & ad excretionem, quæ per tussim fit, promoueat. Quæ & in empyemate si citra exulcerationē pulmonum illud fieret, vti docent, pus expectorando similiter proderunt. Dein & cōsolidantia exhibentur, quæ vi exsiccante non nihil & emplastica, pulmonum hanc diuisam substantiam, rursus quantum fieri potest, cōglutinent atq; vniant. Quod sequentia præstant.

Lac cum tenuiore serosioreque suā portione abstergat, & crassiore caseosā conglutinet, & vtroque modo sic agat, ad curationem vlcēris imprimis vsurpatur, cum & simul fauces leniendo, pingui suā butyrositate tussim inde natam quoque minuat: Facitque ea, tum sensim addito præsertim Saccharo aliisque conuenientibus linctum, vel bibitum, tum copiose potum, sicuti ad consumptionem corporis reparandam, illud hoc pacto assatim diuque bibi debere, mox demonstrabimus.

Potus Aquæ mulsæ, quæ ex Aquæ duodecuplā, ex Mellis vnā parte coquitur, loco potus ordinarij ad vlcēris absterfionē iuuat, vti & Aqua saccharata, vel Ptisana; Aquæ Chalybeatæ potum, vlcus siccando, iuuare dicitur.

Iulepus à quibusdam probatur, factus ex aquis exstillatis ē radic. Petroselinī, Foeniculi, Enulæ & Altheæ, mistis, coctisq; cum Saccharo, addito dum coquitur, gūmi Tragach. vel Arabici portiunculā, & succo Glycirrhizæ.

Syrupi ad vlcērum pulmonū curam propinantur: Atque ex vstratis syrups conueniunt Myrtinus vel Myrtillorum, lentorem cum vi siccante simul possidentes. Proderit & syrupus de Rosis rubris siccis & Cydoniorum.

Vel paretur sequens, rectius scopum adimplens: R. radic. Consolidæ & Glycirrhizæ ana 3.j. R. rad. Altheæ 3.j. radic. Acanthi vel Aristoloch. 3. R. herbarum Plantaginis, Veronicæ, Pulmonariæ, Brassicæ, Tussilaginis, Burse pastoris ana M.j, flor. Rosarū, Vio-

larum ana P.j. quatuor feminum frigidorum Maiorum 3.β. quatuor semin. frigidorū Minorum, seminum Lini torrefact. ana 3.j. seminis Nasturtij torrefacti 3.j. Cicerum rubr. P.j. baccarum Myrti vel Myrtillorum 3. ij. Iuiubarum, Sebesten ana paria vj. Passularum præpar. x. fiat decoctio, addendo Mellis vel Sacchari quart. j. β. coquantur in formam syrapi, de quo sensim & sæpè sumat. Botryos decoctum ad purulentas exscreationes commendatur.

Vel: R. succi radicum Cōsolidæ 3. iij. succi Tussilaginis, Rosarum rubrarum ana 3.j. succi Liquiritiæ & Hypocistidis exiccatorū dissolutorum in prædictis succis 3.j. β. gummi Arabic. Thuris cōtusi ana 3.j. Hydromelitis 3. iv. Sacchari Penidiar. Rosar. tabul. ana 3. ij. syrapi Iuiubarum & Myrtillorum ana 3.j. β. Potest & succus Scabiosæ addi, & ad consolidationem succus Plantaginis.

Eclegmata vel Linctus qui lambuntur, vel Elestuaria quæ sensim assumuntur, aut Tabulæ seu trochisci, qui in ore donec sponte dissoluantur, tenentur, pro vlcēribus pulmonum idonea, variis modis fiunt.

Ex vstratis quibusdam, vt Diatragachanto frigido, Diapenidio sine speciebus, plerunque tabulatis: Vti & Saccharo Rosar. tabulato, quod valde est vtile: Item ex consuētā Rosarum frequenter sumptā: Deinde & elestuar. Resumptiuo sine speciebus, & Looch de papauere, quod & tussim admodum sedat.

Ex illis qui in tussi describuntur, linctus aliqui, incrassantes præsertim, vi glutinandi aliquid ad vlcēris huius curationem cōferre possunt, veluti ille qui ex Mucilaginibus, dein alter ex Resinā laricēā compositus.

Præter quæ, inprimis ad pulmones vlcēratos vel corruptos, si fieri vilo modo potest, sanandos, proderunt sequētes pulueres; qui vel cum Sacchari ros. tabulat. aut penidiati permistione, per se, vel cum Lacte sumuntur. Vel cum Saccharo dissol. in aquis cōuenientibus, in tabulas prius rediguntur: Vel cum syrups instar eclegmatis componuntur, aut elestuariis aliis misti, eo pacto sumuntur.

Primus: R. radic. Consolid. maioris 3. ij. rad. Altheæ, Glycirrhizæ ana 3.j, Rosarum rubræ.

457

rubr. ʒ. ij. gummi Tragachant. & Arabici parum assi ana ʒ. ʒ. Amyli ʒ. j. fiat pulvis subtilissimus.

Alter: R. Cicerum rubr. seminis Lini & Cydon. parum torrefactorum ana ʒ. j. semin. Nasturtij torrefacti ʒ. j. semin. Plantagin. Altheæ, Maluæ, Portulacæ, Bombacis ana ʒ. ʒ. semin. Papau. albi ʒ. j. quatuor semin. frigid. Maiorum mundat. ʒ. ij. Balauft. ʒ. j. Thuris vel Mastiches, Succini ana ʒ. ʒ. fiat pulvis: Utatur per se, vel cum priore permisto.

Hisce & Spodij vel rectius Lapillorum oculorum cancri & Coralli rubri puluerum ana ʒ. j. commodè permisceri potest; Vel si amplius glutinandum, tantum Boli vel Terræ sigillatæ.

Efficaciores magisq; appropriati fieri creduntur, sed minùs grati erunt, addèdo Pulmonis vulpis cum trachæ illius arteriâ in furno exiccati ʒ. j. cineris Astacorum fluuatilium ʒ. ʒ. misce. Confert & pulvis cochlearum exiccatus, & Mustelarum pulmo. Si spurû sanguinis adhuc adsit, seminis Hyosquiami albi ʒ. j. vtiliter miscbitur.

Ad purulentas excreationes, rad. Personatæ, Æthiophim. fol. Betonicæ, sem. Irionis exhibet Diosc. Alij etiam fol. Vlmî, Veronicæ & Scabiosæ dant: Quæ prædictis pulueribus addi possunt.

Electuarium sequens efficax existit: R. Conseruæ radicum Symplyti mai ʒ. j. ʒ. conf. Rosarum rubr. ʒ. j. infus. gummi Tragach. factæ in aqua plantaginis ʒ. j. Coralli, Boli vel Terræ lemnis ana ʒ. j. Hypocistid. ʒ. ʒ. Croci ʒ. ʒ. fyrupi Myrtini vel Myrtillorum q. s. fiat electuarium. Potest huic addi de pulueribus præscriptis ad ʒ. j.

Morselli vel tabulæ sequentes gratæ sunt & viles: R. flos Rosarum exactè rubr. abfectis albis quibus innituntur vnguibus, exiccentur, fiat pulvis subtilis, Irroretur succo Limonum, & cum Saccharo cocto cum aqua Rosarum fiant morselli.

Vel: R. Sacchari q. s. dissolut. in Aqua Rosac. atque addito succo Rosarum rubr. fiant tabulæ.

Vel: R. Sacchari quartar. j. dissoluti cum succo Rosarum & coquatur, & circa finem adde specierum Diapapau. & Diatragach.

frigid. ana ʒ. j. Conseruæ radic. Symplyti ʒ. ʒ. fiant Tabulæ.

Trochisci ore tenendi, admodum conductentes: R. Resinæ laricæ, vel Terebinth. parum coctæ vt puluerisari queat, Thuris ana ʒ. ʒ. Myrrhæ, Sanguinis draconis vel Balauft. ana ʒ. j. Croci ʒ. ʒ. radicum Consolidæ ʒ. ij. Sacchari rosarû tabulat. ʒ. j. infus. gummi Tragach. factæ in aqu. Tussilag. q. s. fiant formulæ.

Sulphur dissolutum & fufum in aquam Plantaginis, Tussilaginis vel Rosarû, boni odoris causâ aliâve conuenientem; idque ter quaterve repetitum, puluerisatum, datû per se cum ouo sorbili aliôve modo, aliisve permistum, vti & Saccharo, hic quoq; vt in cæteris eiusmodi peccoris affectibus, probatur. Chymici magis elaborando, albumque reddendo, flores illius exhibent. Sulphureas quoque thermas bibitas opitulari putant.

Ad curationem exulcerationum pulmonum, præter exhibita, alia quoque administrantur. Conferetque si suffitus vel fumos, qui vlcera siccant, naribus atque ore excipiant, & cum inspiratione in pulmones attrahant, quò & rectius, quam quæ exhibentur, peruenire possunt.

Proderitque imprimis suffitus ex vapore decocti, quem calidum ore excipere debent, in tussi descriptus.

Amplius siccant fumî, probaturque præ omnibus ex radicibus & foliis Tussilaginis accensis excitatus fumus per inspirationem attractus: vt & caudæ equinæ.

Vel qui aliis quoque additis, vti & semine Hyosquiami, ex trochiscis in tussi ibidè declaratis paratur.

Aut alij qui cum foliis iisdem cæterisque, Sulphur quoque recipiunt, in Asthmate expositi.

Vel qui hoc pacto sunt: R. gummi Hedera ʒ. j. ʒ. Thuris ʒ. j. Myrrhæ ʒ. ʒ. Succini ʒ. j. Benzoini, Storacis ana ʒ. ʒ. Hypocistidis ʒ. ij. semin. Coriandri, rosarum Rubr. Santali rubr. ana ʒ. j. pulueriscentur, excipiantur infus. gummi Tragach. vel Resinæ laricæ, fiant trochisci: Potest & parum cortic. rad. Mandragoræ, vel semin. Hyosquiami addi; Auripigmenti tantillû non satis tutò aliqui

addunt, falsi fortè, quod cum Sandaracham legerent, gummi Vernicem dictum intelligentes auripigmentum sandaracham quoque vocatam esse putarunt.

Aër siccus, qui phtisicis magis quàm vds conuenit, si in eo potius versetur, & spirando eum attrahant, aliquid siccando vlcera, poterit efficere.

Inunctiones pectoris aliquid quoque opitulari possunt, ex relaxantibus vnguentis, vt facilius expuant purulentam materiam, qualia in tussi & asthmae fuere exposita. Quod si verò illa pauca sit, vel remittat, ad vlceris sanationem aliquo pacto iuuandam, leuiter adstringentia & consolidantia illis permiscenda, an fortè vis illorum ad pulmones vsque penetrans, aliquid possit efficere.

Veluti: R. olei Myrtillorum vel Rosacei, Mastichini ana ʒ. j. ʒ. mucilag. rad. Consolid. & seminis Altheae ana ʒ. j. farin. f. Lini vel Foenogr. ʒ. ij. Sarcocollae nutritae in lacte, Thuris vel Mastiches ana ʒ. ʒ. Myrrhae ʒ. j. Resinae Lariceae ʒ. j. Croci ʒ. j. Ceræ albæ parum, fiat Linimentum.

Ad cōcoctionem seu maturationem abscessus, quem alioqui in pectoris cauo genitum, empyema producere existimant, vt citius antequàm grauiore noxas adferat, rumatur, quaedam quæ illud efficiant, pectori applicant. Quæ nos eo nomine potissimum aliquid præstare putamus, quod excoquendo pus, vt facilius tussi postea excreetur, opirulentur.

Atque ita emplastrum Diachylon magnum, vel iracurum, similiaque admoueri poterunt.

Quod si maturantibus, ea quæ materiam euocant, metasyncritica dicta addantur, tunc quia præter puris elaborationem, illud ad superficiem trahendo, cutemque simul rarefaciendo, vt illic exitum quærens, tuberculum protrudatur, efficiunt, locumque vbi seatio fieri debet, illudque emitti debeat, demonstrant, hocque pacto præcipue iuuant.

Cuius rei grati sequens conueniet: R. rad. Altheae, Bryoniae, Iridis ana ʒ. ij. Ficuum p. x. Dactylorum num. vj. flor. Chamomil. Meliloti ana p. j. sem. Foenogr. Lini ana ʒ. j.

coquantur & contundantur, adde ol. Liliorum ʒ. ij. de Piperibus ʒ. j. sem. Sinapis ʒ. ij. Fermenti ʒ. j. fiat cataplasma.

Picatio supra pectus facta; si de puris collectione magnà constet, atque ex fluctuatione, & prominentiâ quadam in pectore cognoscatur, vt magis se tuberculum patefaciat, conuenire poterit.

Iniectiones in pectoris cavitatem factæ, in corruptâ pulmonum substantiâ aliquâ, vel in ambitu vlceratâ, si à vulnere pectori illato, pulmonibus simul læsis hæc sequantur, cum tunc via aperta sit, per quam hoc fieri possit, plurimum iuuant. Vidimusque horum vsu, propinatis interim quoque aliis, quæ in aliis exulcerationibus conuenire iam ostendimus, quendam, cui à cultro per pectus ad pulmones vsque adacto, vlceriq; inde nato, pulmonum portiones corruptæ, aliquoties è vulnere prodibant, & qui penitus contabuerat, nihilominus restitutum, multis annis postea vixisse: Alium quoque diu cruentam, saniosam & purulentam per vulnus pectoris excernentem materiam, iam longo tempore horum vsu, adhuc manere superstitè.

Fiuntq; hæ iniectiones primum ex abstergentibus, & postea vlcus siccantibus & consolidantibus, vsurpando quædam ex leuioribus, quibus in aliis vlceribus quoque vtimur, illicque descripta sunt, parata ex Aquâ mulla, Sero lactis aut ipso lacte; Aquâ Mellis vel Lariceæ: Vel vnguento de Apio, decocto Hordei aliarumve quarundam plantarum.

Vel abstergens hæc fiat iniectio: R. feri Lactis caprini ʒ. j. ʒ. Mellis rosac. ʒ. iv. Succorum Chelidoniae & Apij ʒ. j. ʒ. misce.

Ad sanationem interpolatis vicibus & tandem, vbi pus nullum amplius prodit, indies vtatur hac iniectione: R. Lactis Caprini, in qua radic. Consolidæ maioris coxerint ʒ. ij. succi Plantag. ʒ. j. ʒ. Sarcocollae nutritæ cum lacte, & dissolutæ in eodem ʒ. j. ʒ. Myrrhae ʒ. j. resinae Lariceæ dissol. in vitello Ovi ʒ. j. misce.

Sectione aperturam in pectore moliendo, si de collectione puris in Empyemate certi simus, atq; illud ex tuberculo in intervallis costarum prominente, & fluctuatione (vbi dictum) cognoscamus, pus omnino erit educen-

educendum, cum aliâ viâ inde euacuari tanta illius copia minimè possit, per quâ si empyema citra exulcerationem pulmonum fieret, curari posset; & licet si illa simul adsit, & sectione factâ cura non succedat, tamen cum sine eâ, empyema curari nequeat, satius erit in extremo morbo, extremum remedium, quod tamen sine periculo administrare potest, tentare, quàm ægrum deploratum relinquere, eoque magis, cum, etsi non conferrat; quia tamen, causam huius affectus, pus & pulmonum corruptionem fuisse, patefacimus, & quod sanari non potuerit, eâ ostendimus, nos à culpa omnis commissi erroris liberamus. Sed &, etsi de empyemate adhuc dubij essemus, dummodo de pulmonum corruptione constaret, si maturè sectio institueretur, fortè ad curationem non parum adferret vtilitatis, cum tunc per incisum hoc foramen, pus è corruptis pulmonibus atque thorace, si illi etiam adhæreret, quod alioquin per superiora tussis ægrè, nec dum sufficienter, excreari potest, facilius expurgaretur: & quod iniectione, vti prius dictum, per hoc vulnus, ad pulmones vsque, quo alioquin remedia assumpta vix perueniunt, penetrare, indeq; rursus è pectore refluxere possent. Quâ ratione quendâ, cui à vulnere inflicto pulmonû portio computruerat, sanatum fuisse, prius demonstraui.

Perficiturque hæc sectio, præmisso semper prognostico, si tuberculum promineat, illic nouaculam vel scalpellum in pectus vsque adigendo, subiectaque pelui pus excipiendo, nec tamen vnâ vice vniuersum, ne vires concidant, sed reiteratis vicibus illud emittendo. Quod si nil appareat, in humiliore thoracis sede, illic vbi nulli alij muscoli intercostalibus incumbunt, supra duodecimam costam per interuallum illud, sectio facienda, vt sic pus quod in pectus delapsum septo incûbit, quod duodecimæ costæ conuexitur, promptius effluere possit, tamque diu vulnus, donec omne penitus effluerit, apertum retinendum.

Visione pectus sic aperiri etiâ posse docet Hipp. Quæ cauterio actuali, cum potentiale in imâ pectoris vsque, viam vix patefacere possit, perficienda esset; Verum cum non fa-

tis tutum sit ferrum candens imprimere, sectione hoc tutius præstabitur.

Febris hectica, vlcerationem pulmonum comitantis, indeq; natæ extabescentiæ causâ, quæ potissimum vsurpatur remedia, substantiam corporis amissam reponere, atque intemperiem siccam partium corrigere debent; quæ si alia quoque commoda vlceri præstent, eò erunt conuenientiora.

Quæ substantiam corporis præcipuè restaurant, & ob hanc causam licet alias quoque vtilitates præstent, præcipuè vsurpantur, remedia alia exhibentur, alia foris administrantur, alia injiciuntur.

Exhibentur quæ nutrimenta vel tantum sunt, vel etiam medicamentosa existunt.

Quæ nutrimenta tantum sunt, ad refectionem corporis absumpti, illud alendo conducunt, & cum rorido succo, dum corporis substantiæ apponuntur, illud humectent, siccitatem à febre hectica illi inductam, simul corrigunt; quod vt facilius præstent, talia quæ facile concoquantur, bonumq; succum gignant, citoq; digerantur, corporiq; apponantur, esse debent. Inter quæ cum Lac non solum hoc præstet, & totâ suâ substantiâ corpus admodum alât, sed & simul temperie suâ & humiditate, puris humorumq; in pulmonibus coaceruatorum, vel humorum defluentium, si hi insuper accedant, acrimoniâ & salsedinem contemperet, atq; vlceri pulmonum simul ferocitate sua abstergendo, & caseositatem glutinâdo, vti prius dictum, proficit, pinguedineque illi insitâ leniendo, tussim sedet, cæteris omnibus ferè in phthisi vsurpari solitis, præfertur remediis.

Sumitur autè in hanc rem, lac tum quod vsitatum est, in cibis vaccinum, caprinum, ouinum, vel etiam quod non amplius consuevit, aliàs assumi, vt post infantiam, muliebri, & à bestia desumptum, asininum. In quib. omnibus, etsi vires eiusmodi nutriendi, leniendi, detergendi & glutinandi ob quadruplicem, ex qua quodlibet lac componitur, substantiam insint, tamen cum vnû lac in vno aut altero homine potèntius agat, nos prout operationem illius requirimus, hoc illudve, quod id quod cupimus potèntius præstare potest, eligimus.

Restaurantia substantiâ corporis, in phthisi remedia.

Ex vſtatis lactis generibus, quibus frequētius cūm ægris grata nec faſtidioſa ſint, vtimur, præfertur lac Caprinum, cūm magis ſeroſum, & proin vi abſtergente maiore præditum ſit, quam in purulentis hiſce phthiſicorum pulmonibus maxime requirimus. Propinaturque recentem emulſum & adhuc tepens vel recaleſactum, idque ieiuniis manē ab 3. iv. vel v. incipiendo, indiesq; illius menſuram augendo, donec ad 3. viij. vel xij. vſque peruentum ſit: Interdum & ſub vesp̄ram tempore ſomni repetendo, illiusque vſum ſic ad menſis ſpaciū vſque vel vlt̄rius continuando,

Huic vt magis abſtergat, Saccharum vel in ſenioribus Mellis tantillum miſceri poterit, quæ & lac à corruptione præſeruant. Vires illius detergendi aliquo pacto etiam intenduntur, & pulmonibus magis appropriatur; ſi capra herbis, qualitatē eiſmodi & proprietatē habentibus, paſcatur; vt ſol. Rubi, Salicis, Pulmonariæ, Tuſſilagine; Item Hordeo, Fabis, Lentibus contuſis, addito ſeminis Fœniculi & Salis modico, aliisve ſimilibus.

Non aded abſimile lacti caprino & Vaccinum exiſtit, quo & in illius penuriâ, vel in illis qui eo conſueuerunt, vt poſſumus, cūm & vim detergendi, licet non aded validam, vt putant, poſſideat, quam tamen additione ſacchari augere poſſumus. Et cūm viciffim vaccini plus lacte caprino exulceratos pulmones glutinare, craſſiore ſuâ parte videatur, non incommodè eo, poſtquam aliquandiu caprinum vel aliud detergens biberint, vlcusq; repurgatum fuerit, vtemur, & quod reliquum ſupererit, ad vſum lactis temporis, vaccini lactis exhibitione, eadem menſura & ordine, vt caprini, complebimus.

Cui quoque vt vlcus validius consolidari iterum poſſit, Saccharum roſatum tabulatum commodiſſimè admiſcebitur, ſicq; diu propinabitur. Sunt qui Silices vel Ferrum, aut Chalybem ignita in eo prius extinguit, vt ſic abſumptâ ſeroſitate illius, craſſius redditum magis glutinet. Vel illud cum aqua pluuiali, admiſtis roſis, prius decoquunt. Quod rectius ſi radices Conſolidæ in eo ebulliant, efficiet. Quæ tamen circa finem

vſus lactis aliquoties ſic vſurpata, magis conuenient, quàm ſi toto tempore eo modo vſurparentur. Vti & lac Ouinum circa finem aliquamdiu bibitum, glutinando ſimiliter iuuabit.

Sunt qui lactis eiſmodi genera in cibis conſueſta, nullo obſeruato ordine, potus ordinarij, vel aquæ, vel vini, vel alterius potioſis loco ebibere iubent.

Ex non conſueſtis alijs lactis generibus, & proin ægris minùs gratis & nauſeâ quandam parientibus, præcipuè extollitur lac Aſininum, cūm ob ſeroſitate admodum abſtergat, quod maxime in cura vlc̄erum pulmonum neceſſarium eſſe diximus. Et proin illud cūm haberi poteſt, atque ægri non reſpuunt, loco lactis caprini, quod & viribus hiſce hoc ſuperat, eodem modo & menſurâ propinari, & tamdiu, vti illic dictum, continuari debet.

Non minùs in phthiſicis etiam ſummo pere lac Mulieb̄re commendatur, quod iſdem viribus inſtructum, peculiariſter etiam præ cæteris ad nutritionem & reſectionem corporis tabidi, felicius operatur, vtpote quod naturæ noſtræ magis ſimile & familiare, in corporis ſubſtantiam citius & melius conuertitur. Quod à muliere ſanâ ægro ſic propinari debet, vt illud è mammis ipſius indies bis t̄rve bonâ menſurâ exſugat, ſicq; à nutrice tanquam infans longo tempore lactetur. Quâ ratione aliquos reſtitutos nouimus, aliquemq; conualuiſſe, non ſolum, ſed tantas etiam vires recepiſſe, vt ne lac ſibi in poſterum quoq; deficeret, nutricem de nouo imprægnarit.

Alia quoque alimenta in cibis vſurpari ſolita, euchyma & eupepta, ad corporis extenuationem nutriendū conferuat, qualia omnis generis paſſim, & præcipuè in febris hecticæ cura, vbi eundem vſum præſtant, deſcribuntur: vt ſunt ab animantibus petitiæ carnes quadrupedum, eſui deſtinatorū, iuniorum teneræ & ſucculentæ, gallinac̄ei item generis: in quo Capi & Perdices præcellunt. Dein & auium quarundam, inprimis nemoralium. Præterea cerebr̄a & teſtes, oua, à quibuſdam deſumpta. Quo & piſcium ſaxatiliū carnem referre poſſumus,

quæ etiam euchyma & plus humectare videtur. A plantis petita idem præstant, semina aliqua cerealia, vt Triticum, Hordeum, Oryza, Avena & fructus nucleati quidam, vt Amygdalæ, Pineæ, Pistacia, & ex pulposis, Passulæ, quæ singulari potentiâ impinguare corpus, aliqui docent.

Imprimis verò ad reparationem hanc, corporis substantiæ, & humectationem ariditatis ipsius, in phthisicis antefertur ceteris, caro testudinum Nemoralium & Cochlearum terrestrium: Vti & Astacorum caudarum & chelarum, Ranarumq; coxarum carnes.

Ex quibus enarratis, innumere præparationes pro cibo & potu in hosce vsus destinata fieri possunt. Vt caro prædictorum elixa vel assa in cibis potu integra vel incisa, vel contrusa aliterve præparata. Vel ius inde coctum, aut prius in congelati formam redactum propinatur, aut succus à carne assa expressus. Dein & ex fructibus cerealibus fit Panis laudatus & purus, vel Placentæ aut Pultes, cum Iure vel Lacte, ad quæ & referimus Amygdalatum, Pineatum, Hordeatum, Oryzatum, Auenatum, quod & Galenus phthisicis competere docet: Item emulsiones quas lac vocant, ex illis expressas; Passulæ & Vuæ pensiles per se comeduntur. Quod & Vinum referimus subdulce, quod cum plurimum reficiat, si aëgris prius consuetum fuerit, non temerè penitus subducendum. Quemadmodum in febris hæctica, curâ quoque demonstratum fuit, vbi & ciborum enarratorum præparationes aliquas, quæ phthisicis quoque conuenire possunt, descripsimus.

Inter quas Aquæ quoque à nutrimentis exstillatæ aliquæ illic recescentur simplices, quibus corpus quoque restaurari & humectari existimatur, & præter has Aqua ex capone destillata imprimis in vsu est, atque inter reliquas phthisicis hoc pacto præsertim competere aquam Cochlearum terrestrium autumant, quod & ex Testudinum, Cancrorum, Ranarum carne exstillatæ, vtpote huic affectui admodum appropriatæ, efficere poterunt.

Nutrimenta medicamentosa additione etiam aliorum, quæ febre hæctica amplius

adhuc resistent, & pulmonum læsioni simul opitulari nonnihil queant, fiunt: Qualia in formâ panis & tabellarum in febribus hæcticis proposita, hic quoq; possunt cōpetere.

Ad quorum imitationem multæ aliæ eiusmodi parari possunt, quibus non solum pectoralia, sed & vt simul vires deiectas restaurent, cordialia, vt Diamargaritum frigid. Electuarium de gemmis sine speciebus: Item Lapides preciosi, Margaritæ, Aurum limatum & foliatum, aliæque eiusmodi cum preciosa sint, etiam efficacia credita, interdum adduntur.

Fiunt & aquæ stillatitiæ ex nutrimentis, quibus & alia iam dicta pectori congruentia & vires rescipientia permiscuntur, elicita ad eosdem vsus, quas destillationes seu sublimationes, vti eas nominare solent, Instauratiua, quod corporis substantiam, instaurare nonnihil etiam nutriendo credantur, appellant. Cuiusmodi aqua composita ex Iure caponis cæterisque parata in febre hæctica annotata fuit, quæ hic quoque propinata proderit.

Vel potest tale Instauratiuum ex destillatione sequentium fieri: R. Carnis Capi vel Gallinæ musculosæ, quæ sternum ipsarum opplet, diligenter vndique abrasæ ad lb. j. Cui & Columbarum, Pullorum vel Perdium eadem caro addi poterit, Cochlearum terrestrium exemptarum è testis num. xij. caudarum Cancrorum abruptarum, vel coxarum Ranarum numer. xx. decoquantur omnia in Aquæ lb. vj. donec duæ absumantur, dein Ius residuum cum carne infundatur in alembicum, addendo simul Pultem factam ex Medullæ panis lb. β. Amygdal. quartar. j. nucleorum Pinearum ʒ. ij. seminum Melonum vel Peponum ʒ. j. β. seminis Papaueris albi ʒ. j. cōtusione & maceratione cum Lacte. Item Passular. Ficuū ana quartar. j. radic. Consolidæ maioris, Liquiritiæ an. ʒ. j. β. radic. Ireos, Enulæ ana ʒ. β. foliorum Vngulæ caballin. & Plantagin. rec. ana M. j. florum Cordialium ana P. j. gummi Tragachant. Thuris puluer. ana ʒ. ij. Succini ʒ. j. Boli purissim. vel alt. Terræ pinguis ʒ. ij. Spicæ nardi ʒ. j. Sacchari vel Mellis ʒ. ij. Eliciatur aqua ad vsum.

Quæ febris hæctica causâ, vt hanc illius intemperiem corrigant, propinantur medicamenta, eadem ferè conueniunt, quæ & in aliâ hæctica solitariâ describuntur, vt Iulepus: qui R. aquæ Violarum, &c. Vel qui R. succi Portulacæ, &c. vel Syrupus qui R. radicem Buglossi aut aquam Portulacæ, Scabiosæ, vel Tabula. Sacchari Rosati, aut Cōditum, quod R. conferuæ Rosarum, &c. Quæ tamen in hac febre lentâ, sic vsurpari debent, quemadmodum in curâ huius febris lentæ, in fine tractationis febrium meminimus, & quo pacto administrari debeant, docuimus.

Foris quædam & febris hæctica causâ & tabis inde progressæ nomine administrantur, vt Balnea atque Inunctiones spinæ post balneum, Frictionesque molles, eo modo vt in Febre hæctica solitaria hæc edocta fuerunt.

Vbi & iniectionum nutrientium, vt & prius in curâ atrophici meminimus, quæ tempore summæ necessitatis, tentari quoque poterunt, si cibum planè sumere vel non possint, aut omnino fastidiant, quod tamen rarè illis euenit, cum plerunque appetitus eorum vel nihilominus constet, aut non omnino sit defectus.

Phtisi cum catarrho copulata cura. Humores à capite defluentis potissimum causâ, vnde tussis iam prius eius affligens, amplius augetur, si catharrus phtisi copuletur, sequentia sunt.

Purgantia exhibentur interdum ad prouentum illius humoris nonnihil impediendum, tuncque solum, cum is admodum abundat, cum alioquin ratione vlcis, quia nihil è pectore educunt, nullam vtilitatem adferunt, & si corpus admodum emaciatum sit & debile, potius lædant, & quia alui fluxus in phtisicis exitialis, in periculum sæpe abducant.

Leuioribus proin purgantibus, sine necessitas aliquo pacto illud exoptulet, vt imur, qualia in asthma cui defluxio quoque accessit, descripta sunt, & Mannam, cum & illa simul expectoret, & Cassiam cum decocto Polypodij & fructuum, vel cū Iure galli decrepiti recipiunt. Vti & alia mitiora expurgantibus trochiscis, portionibus, infusionibus,

pilulis atque electuarijs illic similiter exposita. In tussi quoque à defluxione genitâ, purgantia eiusmodi, quæ blandius agunt, tum ea quæ catharrum simul sistunt, in eâ explicata, huc quoque accommodari poterunt.

Præparantia humorem tum defluentem ante purgationem, vt rectius expurgetur, tum eum qui iam defluxus est in pectus, vt inde expectoretur, etiam exhibentur, qui si tenuis sit, eum incrassando sistant, vel vt facilius excreentur, præparent, si crassus pulmonibusque infixus, eum nonnihil incidant, & si tenax, abstergant. Qualia quæ hoc illo modo id præstant, variis formis in tussi vti & asthma copiose fuerunt exposita, è quibus quæ detergendo potissimum operantur, cum & pus simul ab vlcis pulmonibus abstergant, & quæ incrassant, cum & ad vlcis glutinationem aliquid conferant, præ cæteris eligi atque hic vsurpari debent.

Sistentia defluxionem illam, si admodum virgeat, exhibentur quæ incrassando eam minus fluxilem reddant, quibus & adduntur quæ humoris acrimoniam leniendo, & faucium exquisitum sensum nonnihil obtundendo, tussim mitigant, tum à pure, tum defluente humore concitatam. In quam rem conueniunt, in tussi ob catharrum eo pacto conuenientia narcotica, tum eclegmata, aquæ & pilulæ imprimis ibidem declarata. Et in asthma expositæ Opiatæ & Formulæ.

Quibus & sequens addi poterit, quod admodum lenit & fluxum retinet: R. Mucilaginis. f. Psyllij ʒ. j. β. infus. gummi Tragach. vel Arabici ʒ. j. Amyli ʒ. ij. emulsionem f. Papauer. albi factæ in aqua Viol. ʒ. j. β. Syrupi de Papau. Saccha rosac. tabulati ana ʒ. j. misce: Capiat frequenter. Amplius leniet si cum exhibetur, portio illius, ol. Amygd. dulc. vel Butyri, recentium parum permisceatur.

Formulæ: R. Amyli, Sacchari candi illius quod in syrupo Violarum concrescere solet, loco illius Penidiati ana ʒ. ij. Boli arm. pinguis ʒ. j. Spicæ nardi ʒ. β. Hyosquiami albi ʒ. β. cum infus. gummi Tragach. fiant trochisci: In buccis tenendi.

Reuellentia & deriuantia humorem defluentem ad pectus aliò similiter vsurpantur: Vt sunt

Vt sunt Clysmata iniecta aliquoties repetita, quæ tutius quàm purgantia per aluum deiectiones moliendo, ad humoris diuersionem potius, quàm expurgationes operantur.

Capiti in hunc etiam vsum adhibentur quæ siccando, caputque firmando, defluxiones & sistant & absumant, vt sunt Pulueres qui pilis insperguntur: Vel Sacculis excepti illi adhibentur: Item Emplastræ eo nomine capiti admota: Lotiones capitis idem præstantes: Dein & fumi qui integumentis capitis, & puluinis excepti, capiti sic applicantur, naribusque excipiuntur. Qualia eiusmodi in defluxionibus cæteris passim describuntur: Vti & inde natis, tussis & asthmate.

Cucurbitulis item cum flamma sæpe scapulis seu colli lateribus admotis, defluens à capite humor à pectore auertitur. Item ligaturis, frictionibus, lotionibus extremitatum, sicuti in aliis quoque defluxionibus ostensum fuit.

Per vstionem in cute factam, defluxiones à capite si vrgeant, reuellere & deriuare, si non cessent, tandem necesse est. Idque vrendo cutem cauterio actuario potèralive, Reuulsionis gratiâ in brachio vel crure. Derivationis autem in vertice supra futuram coronalem impressis: qualia cauteria omnis generis in defluxionibus etiâ aliò delabentibus, & capitis antiquis doloribus, & abscessus curâ in doloribus descripta fuerunt. Item in tussis & asthmate, &c.

Alui fluxus si superueniat, citò cohibendus, nam mortem accelerat, cum vires statim prosterнат, & nihil de causa morbi educat. Augetur in hoc casu dosis adstringentium, quæ vlcæris causâ per os dantur, vt bolus, terra lemnia, rosæ. Aque eorum quæ extrinsecus ventri apponuntur, in diarrhœâ exponenda.

*Atrophia par
ticularis
Schwein
sicht cu
ratio.* Particularis corporis consumptionis cura accommodatur huic Atrophie, quæ certis membris musculosis in pedibus, brachiis ipsorumque, fulcris euenit, ob impeditam sanguinis ad partes, quæ nutritionis illarum causâ fieri debebat, distributionem. Quæ si à laxatione perficatur, aut à Ligaturis nimium

vel diutius membrum arstantibus, aut à tumore aliquo premente, hisce prius prospiciendum, atque os luxatum reponendum, fasciæ vel vincula relaxanda, tumores (si fieri potest) summouendi, idque per eam curam quæ in singulis hisce affectibus fuit exposita. Quod si ob abscessas venas aut arterias maiores vel plures hoc eueniat, interceptâ viâ per quam pars nutrirî debebat, desperatum fere est malum.

Interèa tamen omni studio sanguinem ad partem plus minusve absumptâ allicere conabimur, adhibitis quæ illum calore aliòve modo attrahant, vel dilatando viam aperiant.

Inunctiones hoc præstant calidæ actu, cû validâ seu durâ frictione adhibitæ, indiesque repetitæ, diuque donec membrum augeri videatur, continuatæ, quod cingulo circumdato coriaceo, vel rectis chartaceo, quia non vltra quàm alioquin existit, tracta charta se extendit, commodè exploramus.

Fiuntque ex calidis potentiâ & relaxantibus Vnguētis, quæ Schwin salb nostri chirurgi vocant. Qualia multa quæ in aliis affectibus, iisdem potentiis operatur, hic quoque adhiberi possunt.

Præcipue vero huic affectui hæc magis conuenire, vsu longo compertum: R. Summitat. Sabinæ & Iuniperi, foliorum Leuistici recent. ana M. ij. florum Chamomill. vel etiam herbæ à nobiliori Chamæmelo desumptæ p. ij. granorum Iuniperi viridum immatur. vel etiam nigrorum maturorum p. ij. Incidantur omnia & contundantur parum, adde olei Laurini & Liliorum q. s. vt omnia integantur, Axungie Porci vel Lardi separati à membranis, probaturque imprimis quod à rubro porco prouenit, Rosberger schmalz vocatum, quartarium j. Aquæ vitæ 3. ij. coquantur omnia, donec humiditas omnis consumpta sit, colentur & exprimantur, adde olei Spicæ vel de Baccis iuniperi exstillati, prout hoc illud de ob odorem expetit vel fastidit æger ad 3. ij. vel plus, adde pulueris seminis Sinapi 3. s. radicum Pyrethri 3. ij. Piperis rotundi vel longi, vel Zingib. 3. ij. Cere q. s. fiat Linimentum vel Vnguētum. Adduntur nonnunquam eiusmodi herbi

etiam Pini summitates, folia item Rutæ & Vrticæ: Item alia olea calida varia, vti & de Piperibus & Euphorbio, multæque aliæ Axungia, imprimis Equi, Rampschmalz/ Canis, Vrsi, Vulpis, Taxi: dein & Butyrum. Et si cum hisce Astaci aliquot nostrarum coquantur & Lumbrici, efficacius fieri docent. Maximeque si Euphorbij, vel Castorei 3. ij. cum cæteris pulueribus adjiciantur, vel folliculi Capsici pu'uerisati, quod valde vrit. Amianthi pulueré ad 3. 6. vel plus additum, quam plurimum proficere existimant. Vel Salis tantundem.

Ex enarratis herbis succus nonnunquam exprimitur, & cum oleis atque axungijs ad consumptionem coquitur, sicque additis aliis vnguentis concinnatur. Vel succi cum oleis misti citra actionem addita Resinâ lariceâ & pulueribus, in formam nutriti rediguntur, sicque illitio fit.

Emplastrum ex vnguentis eiusmodi fieri possunt, addita Resinâ liquidâ & durâ, sed purâ.

Sanguinem Vituli, addito puluere Piperis, alijsve, aliqui commendant.

Balnea ex decocto herbarum calidarum prædictarum, in vnguentis, additis quoque aliis calefacientibus, partibus præsertim appropriatis; Vt Saluiâ, &c. item relaxantibus quibusdam, vt Maluâ, facta similiter prodeunt, si membra cõsumpta sæpè illis immergantur, & postea inunguntur.

Dropaces adhibiti sæpèq; iterum decocti, sanguinè admodum alliciendo, iuuare quoque possunt. Vti & Sinapismi hisce validiùs adhuc operantes, & eousque vt pars ruborem concipiat, sanguinem attrahentes.

Exercere quoque membra consumpta, item ea Fricare sæpiùs, plurimum iuuabit.

Percussio itidem levis citra dolorem, vel saltem non magnum, sæpiùs iterata, idque tabellis tenuibus, vel virgis, si præsertim membrum tabidum nonnihil stupeat,

interdum si nihil aliud iuuat, fieri poterit.

LIBRI PRIMI FINIS.



DE VITIIS LIBER II.

EXCRETORVM VITIA TRACTANS.



EXCRETORVM siue Reiectionum è corpore vitia, Symptomata sunt tertij generis, quæ excrementis, hoc est illis quæ excernuntur, insunt; & proin æquè affectus præter naturam atque reliqua symptomata, aut morbi, illorumque causæ, de quibus iam egimus, existunt. Hæc autem vitia in excretis, quæ postquam è corpore prodierunt, primùm sub sensu cadunt, pleraque visu & tactu, aliqua etiam olfactu, gustu & auditu percipiuntur & cognoscuntur. Variantque hæc in excretis,

quòd illud quod excernitur, vitium contrahit, vel Substantiæ, si toto genere præter naturam sit: vel Qualitatis, si aliter se quam secundum naturam se habere debebat, habeat: vel Quantitatis, si abundantius vel frequentius quam par erat, excernatur; atque hac ratione præternaturale & vitiosum existat. Vel quòd ob illius excretionem, quia non per loca conuenientia fiat, tale, licet per se aliàs vitio careat, esse dicatur, cum si tunc quoque illud quod excernitur, vitio laboret, duplici nomine hæc vitiosæ excretionis præternaturalis erit.

Hæc autem excreta præternaturalia & vitiosa per se vel causâ excretionis vel vtriusque existentia, cum varia sint, nos primum hac ratione illa distinguemus. Quod eiusmodi excreta vel reiecta è corpore, sunt ex eorum numero, quæ vel corpus constituunt: vel in eo continentur: illicque vel nata sunt, vel aliunde in illud perueniunt.

Partium excretio. Constituentia corpus, Partes sunt ab ortu genitæ, è quibus corpus componitur. Vel illæ quæ postea in illo de nouo gignuntur, & corporis etiam humani partes existunt, corpusque fœtus constituunt. E' quibus fœtus præternaturaliter excernitur: in *Abortu* & *Superfetatione*; partes verò corpus constituentes; in *Partium ablatione*. Quæ omnia simul explicabuntur in PARTIVM EXCRETIONE, CAP. I.

Partium procedentia. Alias è partibus quæ corpus constituunt, aliquæ non penitus à corpore excretæ abcedunt, sed saltem aliquousque extra illud feruntur & procidunt: in *Procidentibus Intestinorum*, *Omenti*, *Vteri*, *Podicis*, *Oculi*, *Testium*: de quibus simul agemus in PARTIVM PROCIDENTIA, CAP. II.

Contenta in corpore in eoque nata varia existunt, quæ præternaturalem excretionem pariunt, veluti Spiritus & Flatus, Humores & Excrementa, Corporaque varia frequentia.

Efflatio. Spirituum & Flatuum excretio præternaturalis se offert: in *Efflatione præternaturali*, per *Exspirationem*, per *Vulnus*, & præter hæc in *Stertore Narium*, *Ructu*, *Crepitu ventris*, & *Rugitu*, *Fatore oris*, *Narium*: Quæ simul exponemus in EFFLATIONE, CAP. III.

Humorum & Excrementorum excretio præternaturalis occurrit, in variis frequentibus excretionibus. Quod Lactis excretionem attinet, etsi & illa copiosa sit, vel etiam sponte citra suctionem lac effluat, vix præternaturalis esse censetur. Et si lac ob copiam mamillas distendendo in tumorem attollat, ad tumores, in quibus de eo actum, pertinet.

Spermatica excretio. Seminis excretio præternaturalis se exhibet: in *Venere nimia*, *Gonorrhœa simplici* & *virulenta*, *Seminis imperfecti*, vel per viam alienam, aut nimis citâ effusione: de quibus age-

mus, in SPERMATICA EXCRETIONE, CAP. IV.

Sanguinis excretio præternaturalis occurrit: in *Narium hæmorrhagia*, *Mensium* & *hæmorrhoidum fluere immoderato*, & præter hæc in alia *Sanguinea excretionem* per *Oculos*, *Aures*, *Virgam virilem*, *Vrinarium meatum mulieris*, *Vteri sinum*, *Podicem*, in *Poros*, & per *Aperturas alias*: De quibus agemus in SANGVINEA EXCRETIONE, CAP. V.

Puris excretio præternaturalis fit: in *Purulentæ excretionem* per *Oculos*, *Aures*, *Nares*, *Vrinarium meatum*, *Vteri sinum*, *Aperturas*. Quæ simul proponemus in PURULENTA EXCRETIONE, CAP. VI.

Pituitæ & Seri excretio præternaturalis se offert: in *Lachrymis*, *Stillicidio narium*, *Coryza*, *Vterino fluore*, *Sudore nimio seu vitioso*: atque alia horum humorum *Aqueâ excretionem* per *Aures*, & *Aperturas alias*: de quibus simul tractabimus in AQVOSA EXCRETIONE, CAP. VII.

Sputi humorumque illi permistorum excretio præternaturalis occurrit: in *Ptyalismo*, aliaque *Pituitosa exspuitione*, *Hæmoptoica passione*, aliaque *Sanguinea exspuitione*, vti & *Purulentæ*, & *Vomica excreatione*: Quæ simul describemus in EXSPVITIONE, CAP. VIII.

Cibi humorumque atque excrementorum simul excretio præternaturalis se offert: in *Vomitu diuersimodè facto*, vti & *Pituitoso*, *Biliofo*, quod & *Cholera morbus* refertur: item *Sanguineo*: De quibus agemus in VOMITIONE, CAP. IX.

Vrinæ humorumque illi confusorum excretio præternaturalis se exhibet: in *Mictione Inuoluntaria*, *Immoderata*, sub qua & *Diabetes*: *Ardente*, sub qua & *Dysuria*, *Turbulenta*, *Purulenta*, *Lactea*, *Cruenta*, atque in *Vrinæ incontinentia* & per *Vulnus effluxu*, *Tinctaque vrina*: Quæ explicabuntur simul in MITIONE, CAP. X.

Fæcum alui diuersorumque cum illis excrementorum excretio præternaturalis occurrit: in *Dyarrhœa*, *Lienteriâ*, *Caliacâ passione*, *Dysenterîâ*, *Tenesmo*, *Hepatico fluxu*, *Deiectione*, per aluum *Sanguinis concreti*, *Purulentâ*, *Mucosâ* & *Pituitosâ*, *Pingui*, *Stercoris euomitione*, *Mictione*, per *Vteri sinum*, & per *Vul-*

nera excretionē: De quibus agemus in DEIECTIONE, CAP. XI.

Sordida excretio. Sordium diuersarum excretio præternaturalis fit: in excretionē sordium *Aurium, Narium, Oculorum, Oris angulorum, Vteri sinus, Cutis, Pedis digitorum interstitiorum, Dentium*: Quæ simul describemus in SORDIDA EXCRETIONE, CAP. XII.

Corpora diuersa in corpore nata, quæ toto genere præter naturam sunt, & præternaturaliter rejiciuntur, alia sunt animata: alia inanimata.

Animæ excretio. Ex animatis corporibus quæ excernuntur, alia & viuunt & mouentur: vt sunt *Lumbrici, Ascarides, Vermes prodeuntes è Naribus, Auribus, Tussi, Mictione, ex Vlceribus, è Vulnere, Dentium vermiculi, Umbilici vermis, Pediculi, Chyrones manuum*: De quibus omnibus agemus in ANIMALIVM EXCRETIONE, CAP. XIII.

Animæ excretio. Alia ex animatis quæ excernuntur, viuunt, sed nec sentiunt, nec mouentur; sunt quæ *Mola, Tenia, Cucurbitinus vermis*: Quæ simul describentur in ANIMATORVM EXCRETIONE, CAP. XIV.

Terrestris excretio. Inanimata corpora quæ excernuntur, sunt terrestria: *Arenula Mictione reiectæ, atque Oculorum, Calculi, Emitti, Emuncti, Exscreati, Deiecti, Lingua, Tonsillarum, Pororum, alijve, vti & Tophi Dentium, alijque*: De quibus agemus in TERRESTRIVM EXCRETIONE, CAP. XV.

Rei excretionis. Ex non natis in corpore, sed extrinsecus illud subeuntibus, indeque rursus præternaturaliter excretis, diuersa existunt: quæ alia occurrunt, in excretionē illorum per *Oculos, Aures, Nares, Exspuitionem, Vomitum, Deiectionem, Mictionem*: Vti & per *Papillam Corporis superficiem*, & à Cute: Sicuti hæc simul describentur, in RERVM EXTERNARVM CORPVSVS SUBEVTIVM EXCRETIONEB, CAP.

XVI.



DE PARTIVM EXCRETIONE.

CAPVT I.

Génera.



ARTIVM corporis humani excretio, quæ penitus à corpore abscedunt atq; auferuntur, quæ præternaturalis causâ huius excretionis, vel illius quod rejicitur, existit, dupliciter accidit; Primum, quando partes corporis post ortum genitæ, foetum formantes, seu foetus ipse rejicitur: Vel partes ab ortu natæ, corpus constituentes, à corpore prodeunt.

Fœtus per sinum vteri exclusio, Partus dicitur, qui naturalis & legitimus est, si foetus humanus maturus & viuus tempore vteri gestationis absoluto, quod tempus pariendi vocant, excernatur. Qui partus cum secundum naturam fiat, fortè inter affectus homini incommodantes referendus non esset. Verum cum & hic actus ob peccatum cum dolore perficiatur, curaque diligenti & regimine opus habeat, etiam hic obiter de illo agemus, vt quo pacto à præternaturali discernatur, illeque gubernari & regi debeat, cognoscatur.

Præternaturalis partus, & illegitimus: i. Abortus. Fœtus existit, si fiat intempestiue, hoc est ante terminum partui naturali destinatum, qui in decimum plerunque mensem cadit, licet & septimestrem partum legitimum esse posse doceant, diciturq; Abortus, quasi non repestiuius illius ortus. Per quem fœtus immaturus, hoc est nōdum ad iustam magnitudinem progressus, citius quàm par erat, plerunque mortuus, aliàs etiam viuus adhuc, sed qui mortem vix effugit, rejicitur. Qui interdum est aded parvus, vt dū membris suis adhuc complicatus, vti prodire solet, in globulum conuolutus est, vix vix bæccam amplitudine suâ exuperet, ægreque in eo brachia, crura, caput à trunculo discerni distinguique possint; qualem reiectum paucis à conceptu septimanis semel

iterumq; vidimus, & vt membra melius apparerent, stylo ab inuicem separauimus, atq; in capituli sede puncta duo nigra, oculos exprimētia, & circa dextrum latus leuem maculam, hepatis situm denotantem, in corpufculo hoc alioquin albo, obseruauimus. In aliis verò abortibus foetum digiti longitudinem adæquantem, omnibus membris, vti & illis quæ sexum demonſtrant, seſe patefacientibus, cum adnatis corpori etiā vnguib; eiectionem fuiſſe vidimus, atque ex eo ſceleton ſeſione formauiſmus. Quod & in aliis mediæ ſaltem vel paulò vltioris longitudinis, reiectis fecimus.

Dein & foetum imperfectum ſpithamæ longitudine, poſtquam paucis diebus ante, maturum alium foetum partu naturali pepererat, mulierem poſtea etiam abortiuiffe notauimus.

*Superſue
cauſo.*

Quod ſi plures foetus numerum ternarium vel quaternarium, quod etiam rarum, non tamen præternaturale, ſi maturi & abſoluti ſint, excedentes, vno partu vel diſtincto, diebus aliquot naſcantur, vti accidiffe aliqui teſtantur, alij etiam infinitos fuiſſe fabulantur, cum & hi ad iuſtam magnitudinem peruenire minimè potuerint, hic etiam ipſorum partus ad abortum referendus.

Eiuſmodi foetus per abortum reiecti, eſſi immaturi & parui adhuc plus minùſve exiſtant, tamen integri & bene habiti aliquando prodeunt; maximeque ſi adhuc viuunt, vel non diu ante, aut in ipſo abortu vitam primùm amiſerint. Aliàs verò macri & conſumpti, ſi diutiùs poſtquam extincti ſunt, in vtero hæſerint, tardiusque mulier eos abortiat, apparent, nonnunquam & ex parte corrupti putridi & ſœrentes. Interdum etiam alicuius morbi indicia in ipſis deprehendimus. Sicuti foetum, qui medio vteri geſtationis tempus in matre nondum ſuperauerat, reiectum, ex pedum tumore, ventris diſtentione, aquaq; quæ eum vti & venas maiores impleuerat, hydropicum in ipſo matris vtero fuiſſe, ſeſione cognouiſmus.

Præter hæc, ſi foetus maturus & abſolutus, in ipſo partu ob pariendi difficultatem moriatur, non huc, ſed ad partus defectum potius referri debet. Vti &, ſi eo tempore ex-

tinctus, nihilominus in vtero hæreat, nec excludatur: quemadmodum mulierem foetum maturum, in ipſo pariendi actu conatibusque vitâ priuatum, viginti ſeptimanarum ſpacio, poſt pariendi tempus, adhuc in vtero ad mortem vſque etiam retinuiſſe, vidimus, quem poſtea ſeſione factâ, putrem foetentemque ex vtero ſimiliter affecto, eximimus.

Si monſtroſum foetum, vel alioquin malè formatum mulier pariat, niſi per abortum fiat, aut ille extinctus ſit, ad partum præternaturalem non referendus, ſed ad malam conformationem pertinet, quæ homini abortu accidit, ſicuti in deformatione hoc expoſitum fuit.

Partium aliarum corpus cõſtituentium, *Partium corpus cõſtituentium ablatio.* ab eo omnimoda ablatio, eſſi ad numerum imminutum, ſi integrè ſecedant, vel magnitudinem diminutam, ſi portio aliqua ab illis tantummodo abſcedat, pertineat, vbi & illorum meminimus, tamen & ad excreta referri poteſt.

Qualis ſe offert, ſi ex oculorum ſedibus Oculus eruat: Vel potius ea, quæ in ipſo continentur, humores. ſcilicet, aqueus præfertim, nonnunquam & cryſtallinus & vitreus effluant; E naribus cerebri portio emergat; Ex ore dentes euellantur; Lingua amputetur vel præſcindatur; Pulmonum bronchiæ exſpuantur; Atq; inteſtina omnia per aluum effundantur; cuius, poena diuina potius, quàm cauſa naturalis exiſtit, vt Arrio accidiffe teſtantur. Vel quod frequentius euenit, ſi è vulnere inſiſto, cerebri, pulmonum, hepatis; lienis portio aliqua prodeat: Sicuti in harum omnium partium læſionibus hæc ſimiliter propoſita fuerunt.

Cauſa.

Foetus in vtero geniti, per partum reiectionis, tum aliarum partium corpus cõſtituentium exeretionis cauſæ, à ſolutione Contiguitatis vel Continuitatis, vti in vtriſque demonſtrabitur, dependent.

Partus naturalis quo foetus maturus & vi- *vaſorum cum vteri vno ſi conue-* uis in lucem editur, cum crescendo eoſq; adauctus eſt, vt iam à matre non amplius ſuſtentari poſſit, ſed aëre in ſuper ad vitam, ali-

paratio,
ob factus
in utero
talem,
causa
Partus
naturae
in.

mento ad nutritionem copiosiore opus habet, nec etiam si ulterius excreceret, per angustias illas prodire posset, tunc natura provida insurgens, facultate expultrice, eum loco mouens, venasque & arterias, quibus foetus inuolucrum, quod secundinam vocat, cum vtero copulatur, mutuisque osculis conascuntur, separans, citra laesionem plerumque, eodemque ferè modo, vti pediculi maturorum fructuum ab arbore, sine vi abscedunt, foetumque deorsum propellens, coadiuuante simul hunc naturae motum, etiam matre parturiente, conatu suo, tandem ex sinu materno in lucem profert, non sine dolore, labore, sudore & haemorrhagiâ, ob venas hasce, tam in vtero quam secundinâ resecratas, quae parturientibus omnibus, aliis tamen vehementius, aliis paulò mitius cotingunt.

Vasorum
fetus cum
vteri vasa
sunt connexa
separatio, seu
ad hunc
matris
vasa, causa
Partus
praeternaturalis.

In praeternaturali partu, per quem foetus immaturus rejicitur, à natura itidem hunc propellente, & connexum vasorum, vti in partu naturali, dirimente, hoc fieri potest, ut foetus per abortum prodeat, tuncque vix grauiora, quam in partu naturali sequuntur accidentia, vel etiam minora, si foetus exiguus sit. Quod si verò vi maiore per continui solutionem haec vasorum fiat disunctio, & veluti dilaceratio, naturaque hoc pacto ad partum expellendum sollicitata, eum ejiciat, grauiora tunc & quod dolorem attinet, & haemorrhagiam, aliaque symptomata superueniunt.

Horum autem & disunctionum vasorum, naturaeque stimuli ad foetum excludendum causae occurrunt variae, hoc vel illud, vel vtrunque efficiendo abortum procurantes.

Vasorum
fetus cum
vteri vasa
sunt connexa
separatio, ob
motum
corporis
vel animi,
causa
Abortus.

A motu nimio corporis, si foetus adeò concutiatur, ut vasa quibus ad vterum suspensus est, separentur, maximè cum iam ad iter veluti accinctus est, natura insurgens, eum excludere nititur. Sic autem per saltum potest deorsum pelli, quo psaltriam illam foetum studio excussisse, scribit Hippocrates. Ab aliis itidem commotionibus vehementioribus, partium praecipue infernarum, per equitationem, cursus, aliòve motu violento factis.

A compressione ventris hoc itidem euenire potest, si tanta sit, ut foetum quoque comprimendo deprimat. Talis autem ab exter-

nis iniuriis procedere potest. Vel etiam ob constrictionem validiorem musculorum abdominis, à conatu illo in tussi, vomitione, sternutatione, clamore, alui defectione, quo, vti in partu naturali foetus excretio iuuatur, sic & foetus ante tempus, si validus sit, potest loco moueri.

In conuulsione ob eandem compressionem à musculis factam, accedente insuper motu illo corporis violento, vti excrementa alui, sic & foetus quandoque propellitur. Quemadmodum quandam in ipso paroxysmo, sine omni sensu abortiuisse vidimus; & cum ad se rediret, de ventre, quidnam illo factum esset, vti illa loquebatur, conquerentem.

Ab animo admodum commoto, ob spirituum agitationem vehementem, natura excitata, molestiam hanc depulsura, vti alias excretionem, sic & hanc nonnunquam molitur. Sicuti ob terrorem, iram, aliamque affectionem aliquam grauem, aliquas abortiuisse constat. Maximè verò, si in deliquium animi incidant, cum tunc & foetus spiritui vitali, quamdiu hoc durat, vnà cum matre, à qua eum haurit, priuetur, tum ob subitam hanc percussione, tum quòd vitâ priuari potest, abortus quandoque sequitur.

Ab assumptis admotisve irritantibus naturam ad excretionem, illa insurgens, vti alias sic & hanc excretionem quandoque perficit. Veluti ab usu catharticorum magnâ vi facultatem expultricem stimulante, quandoque euenit, ut non solum alui excrementa, sed & foetus simul propellatur. Dein & usu illorum, quae sumpta vteròve admota, vias illic recludendo, vterumque ad excretionem stimulando, qualitate suâ & proprietate menses mouere, foetum expellere, abortumque promouere possunt: qualia in partu & mensium defectu descripta fuerunt.

Ab humoribus vterum grauantibus, illius facultas expultrix quoque ad excretionem tum eorum, tum foetus simul interdum compellitur. Idque maximè à sanguine, qui si nimia copia à foetus enutritionem ed feratur, nec à foetu absumatur, illicque circa venas vteri illiusque ceruicis, cumuletur, naturam grauas, dum eum excutere conatur,

vel

vel aliquando per menstruum fluorem, qui grauidis quandoque superuenit, illud molitur, foetui vt simul erumpat, viam sternit; ob quam causam, si grauidis menses superueniant, periculum de abortu imminet. Aut si ob pedis venam sectam menstruus fluor conciteretur, itidem contingere potest, & proin illis quæ vterum gerunt, eam aperire nefas esse ducunt. Sed & citius menses quoq; erumpent, si sanguis affluens, tenuis biliosus aut aliquin vitiatas & foetui nutriendo minimè sit idoneus.

A pituitoso vel seroso humore vteru irrigante, adeo vt relaxatus foetum continere nequeat, causam abortus præcipuam proficisci, plerique statuunt. Quod si fieret, extra illum hunc existere, illicque orificium quod vteri ceruicem spectat, & in grauidis exactè occlusum existit, humectare necesse esset, cum in vtero, cuius cavitatem foetus opplet, ille colligi nequeat, neque si illic coaceruaretur, eum adeo, cum nec à sero cui foetus innatat, hoc fiat, vt aperiretur, relaxaret. Vti reuera neque in ceruicem delatus, cum non illic subsistat diutius, hoc poterit efficere, maiorque causa, quarum plures recensuimus, quam hæc vt abortus fiat, requiratur.

Ob foetum emortuum abortus potissimum fit, cum tunc eum tanquam corpus præter naturam, quod illi oneri est, natura ex vtero excutere nitatur. Cuius extinctionis foetus causa, à variis procedit.

A vi extrinsecus ventri foetu tumenti illata, ictu vel contusione, foetus emori potest.

Ob alimenti quod à matre haurit defectum, foetus marcescere tandemq; extingui potest, non tamen facile, cum vix viuente matre, venæ adeo inaniri queant, vt foetui ad nutritionem nihil superfit: Dein etsi impurus & nonnihil vitiosus matris sit sanguis, puriorem & utiliorè tamè ab eo foetus plerunq; sibi allicit, vnde & mulieres phricas & cachecticas foetum nihilominus alere, & ad pariendi tempus vsque gestare, vndeque potius progignere, sæpè obseruamus. Non tamè potest, vt, si fluxus menstrualis grauius superueniat, immo

sequens reliquæ successivè exhauriantur, vt foetui sufficiens alimentum subtrahatur. Quod & tunc accidit, si ob dictas causas, viuentē adhuc foetu, separatio vasorum ipsius ab vteri vasis fiat, tunc enim non solum quia sanguine destituitur, diutius superuiuere nequit, sed & cum arteriis simul auulsis, vitali spiritu priuetur, subitò eum mori & cum aërem attrahere nequeat, vti mox cum in lucem editur, facit, suffocari necesse est.

Morbo aliquo, foetum adhuc vtero inclusum atque imperfectum ægrotare, matres ex quibusdam signis colligunt, qui & mori potest. Quos quales sint, difficile est iudicare, nec antequam in lucem prodeant, de illis aliquid cognoscere licet, quamuis nec tunc nisi manifesta aliqua se morbi alicuius prodant indicia, vti in hydropico diximus, de iis certi esse possumus. Non tamen dubium, quibusdam morbis vti adultos, ita & foetum posse affici: Veluti intemperie calidâ, quando mater febre diutinâ vel acutâ, laborans, eam vti omnibus partibus, sic & foetui imprimit. Vel alio morbo detenta, hunc illi communicat, aut aliàs prauis humoribus scatēs, hosce cum sanguine in nutritione in foetum transferendo, cacochymicum reddit. Vel lue aliquâ contagiosâ aut peste infecta, eandem foetui imprimit: Quod tamen non, nisi magna adsit causa, facile fit, cum vti diximus, foetus sibi maximè conuenientia plerunq; allicit, & licet mater ægra vel infecta fuerit, sæpè tamen liber à bilis morbo euadat, sicuti in peste correptis matribus, infantes quos lactabant, incolumes permanisse, cum reliqui plerique inficerentur, sæpius obseruauimus. Verum & malignam qualitatē foetui noxiam atque exitiosam, ab assumptis à matre, vel vtero exceptis suffitib⁹, ad foetū vsq; vires suas exere, foetuiq; exitium parere posse, creditur: qualia multa eiusmodi foetum enecantia appellata medicamēta & venena describuntur.

Alij quoque morbi organici, foetui à semine concepto innati, hos in ipso nunc conceptu nunc tardius producant, qui cum ante ortum pessundant: alias illi, cum emisso adhærent, ab ortu progignunt, in deformatione expositi.

Vasorum
foetus cum
cum vteru
v rasis
canexis
separa-
tio, ob fix-
tum mor-
tuum sa-
cta, cau-
sa Ab-
ortus.

*Vulnus
& Vlcus,
causa
Partium
corpus
constitu-
entium
ablatio
nis.*

In partium corpus constituentium excretionem, solutio continui, quæ eas separat, varijs modis accidit: Plerumque à vulnere, unde cerebri, pulmonum, hepatis, lienis substantiarum portio abscissa, per illud egreditur; dentes eruti, lingua amputata ex ore prodeunt; oculus eruitur, vel illius humores effluunt. Quod & ab ulcere oculorum fieri potest. A contusione omnimodâ capitis, cerebri pars à naribus quoque effluere potest. Sicuti hæc in partium harum vulnibus alijsque læsionibus alibi sunt exposita.

Curatio.

Partus naturalis & legitimus, in quo foetus ex femine concepto genitus, maturus tempore convenienti in lucem à matre emittitur, cum impediri nullo modo debeat, ut rectè gubernetur potius, & si difficulter procedat, promoueat, curam requirit, in qua quo pacto parturiens atque obfetrice se gerere debeant, & quid præterea agendum, in partus defectu fuit expositum.

*Puerpera
& foetus post
partum
regimen.*

Postquam verò partus iam peractus est, mulierque peperit, tunc & matri atque infanti cura adhibetur: Et in puerpera, ut dolores mitigentur, purgationes post partum fieri solitæ, rectè procedant, viresque instaurantur, hoc modo procedendo. Ex sella in lectum placide ne animo deficiat, quod sæpe fit, collocetur, exhibitis iusculis; vino odoribusque refocilletur, & cibo somnoque, uti decet, gubernetur, nec dum donec vires receperit, vterisque ad suum pristinum statum redierit, quod citius, si fasciâ ventri circumdata, leuiter ut subsideat stringatur, ambulando aut exeundo se nimium commoveat, ærivi intempestiuo se credat. Foetum quod attinet, ille more consueto, in balneo aquæ tepentis à sordibus adhærescentibus abluitur, pannisque mollibus leuiter abstergatur, lactis cremore vel butyro, oleo amygdali dulci recenti inungatur, postea fasciis inuoluatur, atque cunis inpositus, continuo donec dormiat, agitur, & ut lactare discat, vberibus matris adhibeatur.

In abortu, hoc est foetus intempestiuo partu, cum iam abortierit, non alia cura, quam quæ puerperæ debetur, illi adhibebi-

tur. Postea verò ne amplius hoc ei contingat, eoque magis, si iam aliquoties abortum passa fuerit, præcautio adhibenda. Quæ tum antequam grauida fit, tum quando iam grauida est, sequenti modo instituetur.

Antequam grauida est mulier, eamque concepisse constat, quod certò illa, si post puerperij tempus viro se nòdum còmiscuerit, cognoscet, diligenter ante omnia perpendendum, an aliqua causa in corpore illius latens, deprehendi queat, ob quam licet concipiat, foetusque ex conceptione formetur (nam si semen conceptum statim iterum effluat, conceptus non verus sed falsus existit, sterilitatisque, uti in ea dictum, causa) tamen eum non retineat. Quod fiet, obseruando ipsius constitutionem an plethorica vel cacohymica existat, & prout hic illè humor in ea exuperat, sanguinis detractio, purgationibus, sudorum prouocatione, & viuendi decenti regimine, corpus purum & mundum reddendum. Vel si affectu aliquo mulier laboret, aut vteri quodam vitio, quæ cum concepit abortui causam præbere possent, his emendandis studendum. Quod si horum nihil appareat, aut cognosci possit, tamen quæ vtero robur aliquod addant, eumque sic confirmant, ne facile foetus in eo contentus, rursum elaboratur, remedia alia usurpanda, atque ex illis qualia in sterilitate exposita sunt, exhibenda, & ad motis imprimisque balneis vtendum; quibus præcipuè malum hoc auertere mulieres contendunt, & proin thermas adeunt, illisque ad tempus insident.

Postquam verò iam grauida facta est mulier, eamque denuò concepisse vterumque gestare, certis indicijs innotescit, tunc ut foetus ad tempus vsque partus legitimus crescat viuendusque permaneat, cura adhibenda. Quod si verò eum iam extinctum, coniecturemus, nihil tale moliemur. Sed si de eo certi simus, quæ eum potius propellunt, administrabuntur, cum si remanserit ille, vel secundina eius, exitum matri adferant.

Ad foetum retinendum & conseruandum, causis prius omnibus, quæ eum loco mouere, aut illi nocere possent, summotis, varia administrabuntur.

Abortus præcautio ante conceptionem.

Abortus præcautio post conceptionem.

Sanguinis missio locum habebit interdum, si ex sanguinis circa vterum retenti maiore copiâ abortum, quem prius passa fuerit, puenisse, ex plethora, vel quod menses ante abortum, dum adhuc prægnans erat, fluxerint, certis indiciis cognoscamus, tuncq; si ex eo, quod iterum fluere incipiant idem suspicemur, sanguinẽ, per venam brachij non pedis, cum menses facillè commoueat, festam, detrahare conueniẽter & citra detrimentum possumus, nec aded vti veteres fecerunt, in grauidis plethoricis phlebotomia metuenda, cum ex illius vsu aliquas abortiuiffe, mihi non cõstet, etiam si eam bis terve repetierint: videamusque multas, etsi vulneratæ aliterve læsæ, plurimum sanguinis profuderint, tamẽ fœtui minimè nocuisse. Quod etsi se ita habeat, non tamen temerè & inconsideratè: nullis hunc illius nimis consuetû abusum concedemus: Neq; tamen, si phlebotomiam illis vtilem esse censeamus, illis eam denegabimus, sed vtparum pro vnâ vice sanguinis detrahant, & potius post mensem repetant, vel etiam tercio si necessitas exigat, imperabimus.

Purgationes per alui deiectionem, similiter non temerè erunt illis instituendæ, nisi fortè aded alius constipata sit, vt per iniecta clysmata, aut leuiora exhibita, aluû mouentia, eam lenire vel etiam nonnihil stimulare oporteat. Vel si corpus admodum impurum sit, etiâ ad paulò validiora cathartica transire oportebit, quæ tunc plus vtilitatis quàm damni adferent, cum & casu sæpè mulieres fœtum gestantes, & tamen se grauidas esse nescientes, si purgatione vtantur, aut aliàs vel hæ vel aliæ, quas fœtum gestare, nullum amplius dubium, diarrhœa largâ sæpeque diu persistente, infestentur, minimè tamen labem aliquam fœtui imprimant, aut abortiant.

Alterando operantia ad abortum præcauendum, ea vsurpantur, quæ vi adstrictoriâ prædita, vasa quibus fœtus vtero alligatur, firmant, vteroque robur fœtuique vigorem addit, & proprietate quadam per experientiam cognitâ, id agunt. Quæ variis modis & dantur & admouentur.

Dantur sæpius tempore vteri gestationis

assumenda quædam, eoque frequentius, si tempus quo prius abortiuit, immineat. Potissimumque conuenient hi pulueres, vt eos bibant cum Vino rubro, vel in Ouo sorbili: vel comedant addito Saccharo rosaceo, vel in tabulas cum Saccharo dissol. in Aqua rosacea vel Plantagin. redactos.

Parantur hoc pacto: R. Coralli rubri puluer. 3. ij. ras. Eboris 3. j. β. Mastiches vel Thuris 3. β. fiat puluis.

Vel: R. granorum Cocci infectorii siccati 3. j. Margaritar. vel Lapid. preciosorum 3. β. Panniculos auri aliqui miscent, fiat Puluis: Detur per se, maxime si fœtum non bene se habere mulier existimet. Vel misceatur priori pulueri, aut illius loco species Diamargi frigid.

Alius sic fit: R. radic. Bistortæ vel Tormentillæ 3. ij. ossium Dactylorum 3. j. β. sem. Plantag. 3. j. sem. Nasturtij parum assi 3. β. Succini 3. ij. fiat puluis.

Vel: R. Coaguli lepor. exicc. 3. ij. Aftacorum fluuiat. afforum 3. j. Spodij ex ebore 3. ij. sem. Coriandri præp. 3. β. Santali rubri 3. j. fiat puluis: Qui solus aut prædictis missus sumi poterit. Si Matrix leporis siccata & puluerisata addatur, appropriatus magis erit: Alij Priapum tauri addunt, rectius fortè Genitale cerui.

Mistura ex hisce talis poterit fieri: R. Conferu. Rosarum 3. j. β. cort. Citri, carniū Cydon. condit. an. 3. j. conf. florum Saluie vel Mentæ, quæ quoque vterum roborando, vtilia esse censent 3. vj. Myrobal. condit. pulpæ Dactylorum an. 3. β. Misce de prædictis pulueribus vnum vel duos ad 3. ij. & cum syrupo Conferu. cort. Citri, fiat electuarium.

Adhibentur extrinsecus ad abortum euitandum, quæ iisdem viribus, vti dictum, illud præstant, inunctiones & emplastra, vteri regioni tum anteriore sede supra pubem, tum posteriore circa lumbos, vel etiam supra eos circa renum sedem. Vsurpanturque cum de conceptu constat, ab initio paulatim, mox in progressu paulò frequentius, eoq; magis, si præludia quædam abortus appareant.

Inunctio pro locis prædictis sic fiat: R. olei Rosac. simpl. vel Omphac. Myrtini vel Myrtillorum, Mastichini, Cydoniorum ad 3. iij.

Acaciæ vel Hypocistidis, Bdellij dissoluti in aceto rosæ. vel Vino rubro ana ʒ.ʒ. Stryacis liquidæ ʒ.ij. Ceræ puræ q.s. fiat Vnguentum. Addi poterit olei de Mentha ʒ.ʒ. quæ vti aliis fluoribus vteri retinendis, ita & foetui apta censetur.

Alia vnguenta ex sequentibus pulueribus sic parari possunt: R̄. Thuris, Mastiches an. ʒ.ij. Sanguinis draconis ʒ.ʒ. Boli vel Terræ alterius, quas sigillare solent, ʒ.ʒ. Santalorum omnium ʒ.ʒ. Spicæ ʒ.ʒ. fiat puluis, excipiat Oleis vel Vnguento supradictis, autæque Cerâ fiat vnguentum.

Vel ex hoc puluere fiat vnguentum: R̄. Radic. Bistortæ vel Tormentillæ, Nucum cupress. capul. Glandium, vel Gallarum ana ʒ.ʒ. foliorum Myrti, Ros. rubr. Balaustiorum vel Psidiarum ana ʒ.ij. femin. Myrtillorum, Sumach. vel Berberis, Coriandri præpar. ana ʒ.ʒ. femin. Nasturtij vel Cimini in aceto macerat. ʒ.ʒ. Santalorum omnium, radic. Galangæ ana ʒ.ʒ. gûmi Arabic. vel Tragach. ʒ.ʒ. fiat puluis, excipiat vti prior pro vnguento.

Alter puluis ex appropriatis paratus pro vnguento: R̄. Coralli rubri ʒ.ij. rasur. Eboris ʒ.ʒ. cornu Capræ vel Cerui, Coaguli hœdi vel Leporis ana ʒ.ʒ. fiat puluis; Addi potest puluis Turturis in furno exiccatus, excipiant vti prædicti, vel permisceatur reliquis vnguentis portio illius pulueris.

Composita amplius vnguenta ex pulueribus enarratis, duobus vel omnibus tribus inuicem permixtis, atque oleis vel vnguento primo subactis fiunt.

Cerata & emplastra ex iisdem vel simplicioribus magisve compositis vnguentis fieri possunt, quæ supra corium rubrum vel sericum coccineum extensa, supra vterum posita, per horas aliquot retineant, quod commodius noctu dum recubant, sit, indiesque vel per interualla reperant. Redigunturque hæc in formam cerati, augendo Ceræ quantitatem; & vt hæreat, addedo Resinam abietinam vel lariceam: Vel in emplastrum consistentiam, miscendo Resinam siccam, picem puram, Naualem dictam, dissolutam prius in oleis supradictis; Vel etiam puluerem Colophonia, yni artis est.

Ex vñtatis horum loco adhiberi possunt, vnguentum Comitissæ, atque emplastrum Contra rupturam, adhiberi solitum.

Vel in forma vnguëti aut emplastri vsurpari poterit, applicatio illa, quam in mēsum nimio fluore sistendo, admotam, competere illic diximus & descripsimus. Atque sic incipit: R̄. Radic. Bistortæ vel Tormentill. &c.

Amuletis quibusdā aliquid tribuunt, imprimis lapidi quem Ætitem siue Aquilæ vocant, qui agitatus propter inclusam terram vel lapidem, sonum edit, si ille brachio sinistro alligetur, vt detectus tangatur, vel vt alij volunt, corio vitulino prius inuolutus: qui vt pedi alligatus partum promouere, sic si brachio, eundem impedire creditur, vti & si sub mammis collocetur.

Alij lapidem Iaspidem, & Lazuli, & Samium gestatos vel collo appensos, idem efficere docent; vel ex plantis Maluam, Parietariam, Tormentillam cum radicibus appensa, similiter operari.

Regimen vitæ quod prægnans mulier abortui obnoxia, studiosè obseruare debet, in eo consistit, vt in aëre quoad fieri potest, temperato versetur, vitet æstum & balnea. Cibit temperanter vtatur euchymis, temperatis. Vino diluto vel rubro, non potenti. Caueat ab omnibus acribus, aut corpus accendentibus oleribus aut aromatibus, vel etiam amaris, quæ & foetui nocere creduntur. Ab odore item vehementi prædictis, vti & croco, aliisque omnibus & alimentosis & medicamentosis, quæ menses mouere vel foetum expellere, vel noxam exitiumque illi adferre possunt, qualia in causis & in defectu mensium & partus fuerunt exposita. A motibus corporis & animi validiorib. sibi temperet. Quieta potius maneat, vel leuiter obambulando corpus exerceat. A congressu frequenti cum marito absteineat. Ne alius constipata sit, sed respondeat, procuret. Et ab omnibusque morbis quibusdam, foetui exitiosis, veluti sunt etiam conuulsiones, occasionis præbent, sibi caueat, eaque bonâ viuendi ratione auertat.

Partium corpus constituentium, ipsarumque portionum, si nobiliores sint, è corpore reiectio, lethalis plerumque existit: vt si cerebri

Partis
corp. vñt.
situa-
tione ab-

latioris
cure.

485

bri, pulmonum, hepatis, lienis prodeant. In reliquis facta, functiones, quas eæ partes obibant, abolet, & cum hæ partes à corpore penitus separatæ & ablatae amplius reponi aut agglutinari nequeant, cura quoque non alia, quam quæ huic solutæ continuitati, vulneri, contusioni aut ulceri debetur, instituitur: Qualis in eiusmodi partium functionum læsionibus fuit declarata.

DE PARTIVM PROCIDENTIA.

CAPVT II.

Genera.



Procidentia partium, licet in ea partes non penitus à corpore separentur, nihilominus tamen præternaturalis existit: cum per eam partes internæ aliquæ à sua sede, quam naturaliter possidebant, extrorsum in aliam, vel etiam extra corpus procidant atque prolabantur. Aliæ partium quarundam situs peruerfionis prominentiæ, veluti quæ in fracturis & luxationibus ossium, aliisve dislocationibus eueniunt, cum tunc partes non in aliam sedem, aut extra corpus procidant, sed saltem promineant, eoque nomine deformationem aliquam pariant, in vitiiis quæ ex deformatione nascuntur, descriptæ sunt.

*Intestino
rui proci-
dentia in
Entero-
cele, Om-
phalocel-
le.*
*Omenti
prociden-
tia in E-
piplocele.*

In corporis aliam aliquam sedem è propria, nondum tamen extra corpus pertingens partium procidentia, ea est, quam Intestinorum & Omenti procidentiam vocamus. Quæ cum tumore saltem se manifestet, nec procidentia harum partium aliter in conspectum veniat, nos in tumoribus describendis, diuersa quæ inde exsurgunt genera, atque Enterocelen ac Omphalocelen vocant, iam proposuimus.

Extra corpus procedens partium procidentia, in qua partes quæ prolabantur, apparent; est vel Vteri, vel Podicis, vel Testiui, vel Oculi, vel Linguae.

*Vteri p-
cidentia
seu exi-
tus.*

Vterus seu matrix, cum sua ceruice per pudendum mulieris aliquousque interdum elabatur, diciturque Vteri procidentia, seu

prolapsus vel exitus. Quod cum sit, tunc ceruix ipsius inuersa, crassa, rugosa, maiori ex parte albida, alicubi tantum rubens, conspiciua fit, eaque tumida pudendi rimam opplens, atque aliquando totam obturans, à qua succi instar nunc spithamæ longitudine, alias paulò minus dependet, vterusque illi inclusus saltem basi suâ in fundo huius sacci se manifestat, atque orificium illius subrubrum, & veluti cruentum labiis tumidis, illic in medio basis prominens, apparet, sicuti hoc diligenter consideras aliquoties obseruauimus.

Alias verò vterus deorsum prouolutus, *Vteri de-
sensu.* paulò supra pudendum, vel in eo subsistit, nec extra illud procidit, illicque tactu cognoscitur, vel saltem leuiter ex eo prominet, sensimque nisi succurratur, magis magisque effertur, tuncque Vteri descensus appellari potest.

Hunc affectum in mulieribus, nisi aliud accedat, veluti inflammatio aut corruptio, in vtero diutius foris remanente, nec rectè gubernato, non alia grauiora symptomata, facile concitari solent, præter turpitudinem illam, atque impedimentum, quod inter deambulandum adfert, & ponderis molestum sensum, à quo venter & lumbi deorsum trahi videtur. Cum alioquin nihilominus mulier, si illum iterum reponere queat, vti ferè fit, virum admittere, atque concipere, conceptumque & inde natum foetum, ad pariendi tempus vsque, citra ipsius, quamdiu mulier grauida est, prolapsum, retinere possit.

*Podicis
seu An-
proci-
dentia.*

Podex seu anus vel aluius, cuius pars exterior manifesta, ex cute perforatâ loculi; instar collectâ & occlusâ, formatur; interior verò latens, ex fine recti intestini musculis; illud ambientibus constituitur, si præter consuetam ipsius operationem atque inuerfionem prominentiamque, quam in excrementorum egestionem molitur, rursum in corpus reduci, vti verò oportebat, nequeat, sed foris aliquamdiu remaneat, vel etiam ulterius se cum portione recti intestini illi adnatâ, quam secum trahit, similiter inuersa exerat, Ani seu Podicis prominentia vel exitus appellatur.

Quæ procidentia alias citra alium affectum, tunc tantum, quando cū difficultate egerit,

se offert, & brevius vel longius durat, vel sponte in suam sedem redit, vel levi negotio intro pellitur.

Aliàs verò licet reponatur, mox iterum, & præsertim in deiectione alui relabitur: infantibus frequentius accidens vitium, aliquando tamen etiam adultis & senibus molestum.

Aliàs verò rectum intestinum elapsum intumescit, adeo ut reponi vel omnino nō, vel difficulter queat. Aliàs etiam inflammatur, rubet, nec pressionem ullam, immò vix contactum ut reponatur, ferre potest.

Ani-resolutio. Aliquando & involuntariè & sine sensu procidit, nec retrahi voluntariè amplius potest: diciturque ipsius Ani-resolutio.

Testium procidentia. Testes è scroto seu sacco, in quo inclusi suspensique sunt, aperto, prolapsos procul propendentes vidimus.

Oculi procidentia. Oculus ex sua orbitalongius prolabi vix potest, uti verò nonnihil prominere; sicuti in oculi prominentia in deformatione dictū fuit: Quod si ulterius feratur atque se exerat, Oculi quoque dicitur procidentia.

Lingua procidentia. Lingua ex ore nonnunquam aliquousque exerta remanet, illiusque hic progressus, Procidentia linguae dici potest.

Causæ.

OMnium procidentiarum enarratarum, tum intestinorum, omenti, uteri, podicis, oculi, linguae, causa dependet, vel ab apertione aliquā factā in peritonæo: aut dissolutione ceruicis uteri; vel inuersione podicis & recti intestini extrorsum versus; aut relaxatione connexus oculi vel linguae; aut vulnere scroti.

Ab apertione aliquā in peritonæi membrana, quæ intestina & omentum in ventre inclusa retinet factā, si intestina vel omentū ex abdomine per foramen elabantur, horū procidentia sequitur, quæ tumorum Celædictorum varia genera, sicuti ea ubi de tumoribus egimus, descripsimus, producit. Hæc autem apertio peritonæi, vel ab ipsius rupturā, vel dilatatione proficiscitur.

Peritonæi processus ruptus. Ob rupturam peritonæi procidentia illa exoritur, intestinorum vel omenti; quæ tumorem illum qui verius Hernia vel Ruptu-

ra dicitur, gignit, illiusque species diuersas pro diuersitate loci ubi ruptura fit, & partis quæ procidit variantes. Si enim in inguinis regione fiat ruptura, & in masculis processus peritonæi, qui testes cum seminariis vasis suspensos retinet & includit, initium scindatur, intestinis tunc per hanc aperturam in inguina sub cutem se insinuantibus, fit Enterocoele: & si illic subsistant, tumor in inguine prodit, si verò in sacco deorsum quoque prolabantur, illic tumorem excitant, eumque sæpè immensum, si magna intestinorum portio descenderit, vel illa flatibus distenta, aut excrementis referta sint, quæ si dura fuerint, tactu etiam deprehenduntur: si verò flatibus in illis contineantur, cum premuntur murmur edunt; & si illic hæreant intestina, nec reponi quia distenta vel conuoluta sunt possint, cum excrementorum ductus interclusus sit, ut illa minimè deiciantur, causam præbent, unde facibus coacervatis, sursumque regurgitantibus, illæ tandem euomuntur. Quod si verò omenti portio, per enarratam rupturam in inguen feratur, Epiplocele fit, tumore illic plerumque remanente, nec ulterius descendente, cum omentum ob breuitatem, longitudine suā os pubis vix superantem, tantopere descendere, uti intestina quæ longissima sunt, non possit, nisi fortè de illo portio abrupta, quod eadem vi quā peritonæū scinditur, fieri potest, eoque citius, si postquam egressum & retentū, attractum admodum & tensum est, vi hac illi illatā, ulterius feratur, & in scrotum tunc pars illius subsideat, quæ tamen amplius reponi minimè possit. Vidimus & in inguine, immensum, in quodam tumorem, quem ex omento eò prolapsio processisse, ex contactu adipis duriusculi, inæqualiter, uti in omento adnasci solet, se offerentis, diiudicare potuimus, quod disruptum fuisse, copia illius quæ huc prociderat, aliquo pacto innuere videbatur, vel maximā fuisse hic, sicuti mox ostendemus, relaxationem, cum dolorem alioquin nullum sentiret, unde neglectā curā, non diu postea superuixit.

In inguinis mulierum regione, si peritonæum illic disruptum, ubi vas quoddam ex utero per illud in inguina extrorsum fer-

mulieris causa Enterocelen vel Epiplocele in feminis.
 tur, tunc ut per processum in viris, sic in foemina per hanc viam prolabantibus quoque intestinis, Enterocelen quædam prodibit, in qua immensus tumor quandoque in inguine se offert: vel Epiplocele, si omentum procidat, quod cum longius in mulieribus quàm in viris existat, tumorem quoque eminentiorem in hisce quàm illis progignet.

Peritonæi rupturæ in abdomine, causa Omphalocelen vel Herniarum aliarum, illius loci.
 Quod si peritonæum in abdominis alia regione rumpatur, atque intestina vel omentum illic sub cutem prouoluatur, si in umbilici regione hoc fiat, Omphalocelen dicitur, aliter Exomphalocelen: si alibi circa eum, herniæ seu rupturæ generale nomen seruat. In quibus herniis, tactus sæpè an intestinum sit, quod pressum murmur, vel omentum, quod nullum edit, & quoddam illud maiorem, hoc minorem tumorem efficiat, discernet.

Rumpitur autem vel scinditur peritonæum illis in locis, vel ob casum aut ictum supra has sedes factum; Vel ab alia corporis concussione vehementi in saltu; Vel quando in ephippiū magno cum impetu insiliūt, unde aliquoties hoc pacto læsionem factam obseruavi. Dein & per conatū vehementem, pressio ventre à musculis abdominis, in partu & deiectionibus difficilibus illud accidit, uti & infantibus ob clamorem intensum. Præter quas causas, vulnerato etiam cæsim vel punctum peritonæo in abdomine alicubi, vulnereque in cute quidem sanato, interim eo quod in membrana eadem erat, aperto relicto, herniæ eiusmodi, eodem modo, ut si alia ex causâ scissum sit, quoque fiunt.

Peritonæi processus dilatatio, causa Enterocelen & Epiplocele.
 Ex dilatatione seu relaxatione solâ, processus peritonæi, per quem vasa seminaria, ex abdomine in scrotum descendunt, citra rupturam, intestini vel omenti portio etiam prolabi atque Enterocelen vel Epiplocele fieri potest. Quod cum fit, non subitaneâ vis quæ eum dirumpere potius solet, sed conatus saltem frequens & validus egerendi, sæpè repetitus in naturâ constipatis, in causa erit, unde & non subito, sed sensim nascitur; cum enim per eum intestina deorsum in inguina protrusa, ad huius processus initium propellatur, illius meatum sæpè impellendo, illique tandem insinuando, sicuti etiam rupto illo, per conatum fieri videmus, eum sensim dila-

tant, vel si maiori hoc fiat vi, quandoque dirumpunt. Quod sic fieri, illiusque processus exordium eousque dilatari, atque etiam citra rupturam admodum aperiri posse, præterquam quod hæc comprobant, quod & alij ductus angustiores & crassiores sic ampliari possint, veluti vretes, per quos calculus aliquoties descendit, sicuti in eo descripsimus; dein & quod citra prægressum dolorem sensim nec subito fiat, etiam ocularis demonstratio idem nobis patefecit. Siquidem in hernioso hydropico, secto post mortem, eiusmodi foramen per quod intestinum in scrotum descendens transmittitur, rotundo margine integrum, nec dum scissum vel ruptum vilo modo, deprehendimus. Per quod intestini tenuioris portio illa, quæ supra cæcum est, in scroti aquâ pleni infimam sedem usque ferebatur, totoque illo ductu huic processui peritonæi huius aquæ causâ, quæ tunicas has, uti mox ostendetur, erodendo, ut conglutinentur facit, firmiter accreuerat & adnatum erat; ægro interim dum vivebat, sanusque adhuc erat, nihilominus sine incommodo excrementa egerente, nec dum de dolore conquerente. Ferneliū qui processum hunc peritonæi in exteriorem & interiorem illius tunicam distinguit, in enterocelen & epiplocele tunicam interiorem necessario dirumpi, externam vero duntaxat laxari, scribit.

In foeminis à relaxatione solâ peritonæi in inguine, illic ubi vas quoddam peculiare ex eo emergere diximus facta, Enterocelen & Epiplocelen gigni, ille forte innuere voluit, qui tendinem quendam ab inguine in peritonæum emitti, illiusque robore peritonæum, atque hinc omentum & intestina confirmari, scribit, eoque relaxato hernias illic fieri docuit.

Verum cum vas illud non adeo, uti processus peritonæi; membranosum sed nerveum & durum existat, nec proin tam facile dilatur, vix illius relaxationis causâ, nisi peritonæum illic dirumpatur, intestinum vel omentum in inguen poterit descendere.

A relaxatione seu dilatatione peritonæi circa rupturam, Omphalocelen quoque prodire posse, vel hoc satis comprobatur, quod

Peritonæi dilatatio in umbilico

*hæc, cau-
sa ompha-
loceles.*

in conatibus magnis, maximeque in partus difficultate, vmbilicus aliquando in tumorem admodum attollitur, intestinis hoc conatu, in hanc potissimum sedem peritonæi, vbi processus brevis, vmbilico infertus, qui in foetu chordæ vmbilicali patuit, postea coaluit, impulsis illic; peritonæum distendentibus, & cessante conatu, atque inde profectâ dilatatione, tumor interdum omnis recedat, nec amplius redeat: quod, si à rupturâ progressus prodiret, minimè fieret. Ob quam causam, sicuti omphalocelen hanc non perseverantem fieri manifestè videmus, etiam illam quæ permanet, promanare posse faciliè licet colligere, peritonæo à causis prædictis aded relaxato, vt se recolligere nequeat. Quod in aliis peritonæi sedibus in abdomine, præter eam vbi se processus in inguine exerit, vti & hîc in vmbilici sede, vix citra rupturâ poterit accidere.

*Vteri cer-
uicis con-
nexus dis-
solutio,
causa V-
teri pro-
cidentia.*

A dissolutione vel diuisione ceruicis vteri, à partibus quibus adnectitur, Vteri procidentia exurgit. Cum enim vterus ab illius ceruice, cui innitur, & suâ basi se inserit, & in ambitu firmiter connascitur, potissimum sustentetur, reliquâ verò sede vt promptius in conceptu se dilatare augerique possit, ab omni connexu, præterquam quod in lateribus tantum vtrinque membranarum & vasorum beneficio, admodum tamen laxè peritonæo copuletur, liber existat, fieri minimè potest, vt ille in signum vsque toto corpore prolabatur, nisi collum illi adnatum atque ita continuatum, vt ab eo separari nequeat, simul sequatur. Quod cum citra diuisionem connexus fibrosi, quem ceruix cum vicinis sedibus constituit, fieri nequeat, vteri procidentia causa proxima hæc illius ceruicis connexus dissolutio erit. Quæ si in vtero vicino loco tantum fiat, vterus in sinu cum parte saltem aliquâ colli inuersâ adhuc permanebit: sin verò toto ductu collum à subiectis liberetur partibus, tunc & vterus cum collo inuerso, extra corpus prouolutus dependebit, vterusque in fundo ipsius non inuersus, vti collum, cum hoc fieri nequeat, sed eâ formâ, vti cum in ventre adhuc latebat, erat, suspensus & inclusus, basi & orificio illius in imo solum patente

hærebit, secum membranas illicque annexum peritonæum cum vasis & testibus aliquousque trahens. Quod & citra rupturam, ob laxitatem harum membranarum, quæ cedere & dilatari admodum possunt, vti peritonæum in ventre hydropicorum tumete, in immensum se extendere videmus, fieri potest, eaque vasa minimè abrumpi, etiam si vterus longo spacio è ventre recesserit, ex eo patet: quod eo in locum suum reposito, nihilominus mulieres possint concipere, quod si vasa hæc ab vtero separarentur, fieri nequiret.

Hanc autem separationem ceruicis vteri, à fibroso nexu, quo vicinis sedibus, alicubi saltem, nec ita firmiter adhæret, & proin citra grauiorem læsionem & hæmorrhagiam facilius abscedere potest, vterus ipse plerunque perficit, si ille per vim deorsum in sinum detrusus, aded impellatur, vt adnatam illic ceruicem simul trahendo, vel impetu quodam subito, vel sensim si minori vi sed frequenter illud fiat, à fibris primum vtero proximis auellat, & si ulterius procedat, reliquas quoque diuellendo, collumque inuertendo secum deorsum aliquousque, vel etiam extrorsum detrahat: vbi simul appensa, pondere suo, vt magis magisque tandem delabantur, efficiunt.

Pellitur autem hoc pacto vterus deorsum, in conatibus magnis sæpè iteratis, in deiectionibus difficilioribus vel exufflationibus, vnde & intestina & cum illis vterus deorsum validè premuntur. Maximeque ab eo conatu, quem in partu mulier adhibet: si præsertim is ob difficultatem parienti magnâ vi peragatur, vterusque cum foetu in sinum ceruicis nimium detrudatur: eoque citius, si & foetus cum difficultate per angustias illas transiens, ceruicem validè etiam impellat & sic quoque à connexu liberetur. Vel si secundina adhærens adhuc vtero, ab obstetrice ita trahatur, vt & vterus cum ea in sinum feratur, ceruixque simul detrahatur. Quorum causâ & frequentius post partum vteri procidentia solet contingere, illisq; mulieribus, quæ crebro pepererunt, atque eiusmodi vim sæpè passæ sunt, tandè hoc vitium vel mox vel iam senescitibus superuenire.

In saltu aliâve corporis cōcussione validâ vel sæpè iteratâ, hoc idem potest accidere, vt vterus sic in finum vltra quàm par erat impulsus, eo modo vt dictum, procidentiaë causam præbeat.

Cervicis vteri causâ, præter eam, quâ ab vtero tracta auellitur, etiam ob hanc, vteri prolapsus potest euenire. Si ille ob vim aliam à subiectis separetur, quod fortè ob coitum violentum vel multoties repetitum, in meretricibus per frictionem nimiam & sine fine continuatam, potest contingere. Vel propter corruptionem, & putredinem illic collum absumentem, vnde vterum quoque procidisse in quadam vidimus.

Ab aliis causis quàm hisce violentè agentibus, vix dum vteri procidentia potest oriri. Nam quod relaxationem ligamentorum, vel vt alij voluerunt, musculorum, quibus vterum suspensum retineri putabât, attinet, quàm à vi iam enarratâ, quâ vterum impelli diximus, vel humore copioso membranas hæc irrigate, proficisci, vteri q; procidentiam gignere docent, nos, cum musculi eiusmodi nulli sint, nam liberum esse, vterum vt dictum fuit, oportuit, & membrana ita comparatè, adeo q; laxè, vt & cum vterus procidit, eum subsequi possint, nec proin adstrictæ, vt esse eas, si vterum suspendere deberent, oportebat, ab harum relaxatione vteri procidentiam procedere, concedere non possumus. Licet enim vltra consuetam ipsis laxitatem, si amplius relaxentur, vterusque minùs firmus retineatur, tamen per finum ferri & prolabi, ob hanc remissionem solam minimè poterit, nisi colli cervicis, vnde præcipuè vterus sustentatur, modò exposita fuit separatio.

Vt neque membranarum disruptionem, quoque procidentiam vteri efficere aliqui scripserunt, eius causam esse posse, vel hoc ostendit, quod in muliere quadam, cui has membranas putredine penitus absumptas fuisse, sectio post mortem patefecit, diuque ante obitum hoc factum fuisse, effluxus præcedens saniei foetentis & putris comprobauit, vterus minimè à sua sede recesserit, sed firmus & stabilis permanferit.

Quod humorem pituitosum vel serosum

attinet, vnde procidentiam vteri euenire interdum asserunt, vt ligamenta vteri irrigando id efficere non posse, prius ostendimus, sic & hoc comprobat, quod hydropicis mulieribus, quibus vterus cum adnatis membranis, in qua sæpè longo tempore innatât, ille tamen nullo pacto ob eam causam probabatur. Fieri tamen potest, vt ceruice vteri continuò in fluore vterino humectatâ, atque ob id laxiore redditâ, vterus aliis de causis impulsus, faciliùs hæc subeat penetretque, ceruixque promptius secedat atq; inuertatur.

Præter hanc vteri fundi loci mutationem, & motum quem suo collo per finum ipsius molitur, eum quoq; non deorsum tantum hoc pacto, sed & in abdomine adhuc persistentem ad latera moueri, illisq; se insinuarè, nonnunquam & ad ventriculum vsque ascendere, docent. Verû cum ille ceruici suæ adnatus atq; intestinis vndique circumdatus, in medio plerunque subsistat, non facile in alia loca iam prius occupata declinabit, sed potius si loco mouetur, deorsum quàm sursum motu naturali feretur. Nisi fortè adeò ille increseat, vt plus spacij in abdomine, quàm dum paruus adhuc esset, occupet, vt in prægnante muliere accidere videmus; quamuis & tunc eum potius suo pondere deorsum vergere, ventris tumor circa inferiora magis prominens, & quòd durities illic tactu potius deprehenditur, ostendere videntur. Quibus moti & hysterica accidentia, in vteri suffocatione se offerentia, ab alia causa quàm vteri ascensu, à vaporib; nimirum inde eleuatis prodire, in vteri strangulatus causis ostendimus.

Ab inuersione podicis & recti intestini extrorsum versus, podicis procidentia nascitur, tunc enim sic inuersa, foras protuberât. Quemadmodum enim in alui deiectione, *Podicis & recti intestini inuersione à conatibus mægnis, causa illius Procidentie.* podex vi & impulsu excrementorum patefactus, & vt elabi queant inuersus, donec rursus retrahatur, prominet: Ita si ob conatum & impetum vehementiorem durorum excrementorum, adeò propellantur, vt portionem recti intestini simul trahens, inuersam vnâ exerat, tunc vt hæc aliquandiu foris permaneant, causa existit: Ab aliis

aliis conatibus, in quibus deorsum aliquid pellitur, hoc idem potest accidere: ut in partu, quando fœtus cum difficultate excluditur, alius quandoq; etiam procidit. Dein & ob irritationem magnam factam in podice, vel iuxta eum, conatus commoti eum propellant: veluti in tenesmo & dysenteria nonnunquam contingit. Et incisione factâ in peritonæo iuxta anũ pro vesicæ calculi extractione, ob cruciatum illum, magno conatu & podicem admodum propulsum fuisse, & virgam simul, etiamsi exigua adhuc esset, in infantibus multum intumuisse, seque erexisse, vidimus.

Quod si à conatib' illis validis adeò podex extrorsum trudatur, ut rectum intestinũ secum trahendo à membrana mesenterij, à qua intestina suspensa retinentur, non nihil auellatur, tunc extrorsum hæc simul delata & propendentia, nõ amplius remeare possunt, & reposita longius subsistere nequeunt. Licet enim muscoli ut anum leuiter exeuntem retrahant, illi apppositi sint: tamen si tantopere elabatur, nec alijs ligamentis sustineatur, illud soli efficere nequeunt, eoq; minùs, cum & tunc, si procul exeat, vnà cum podice in uerso prolapsus, è corpore prodeant.

Podicis musculorum reflexio, causa quo minus prolapsus retrahi queat.
A musculorum tamen horum, qui podicem in egestionem excrementorũ propulsum, post eam factam sursum iterum trahunt & contringunt, imbecillitate fieri potest, ut cum tunc functio ipsorum debilitetur, podex inter excernendum propulsus & dilatatus, nõ sufficienter aut difficulter in suam sedem reduci queat, aut se possit contringere. Ob quam rem anus foris quidem remanere potest, non tamen, nisi per conatum præcedentem extrudatur, prolabi: cum hisce musculis exiguis non ita suspensus retineatur, ut actione ipsorum remittente, statim eum citra maiorem vim è corpore, in quo inclusus retinetur membranisque nequitur, excidere necesse sit. Hæc autem imbecillitas, quæ hosce musculos impotētes ad reductionem ani, in fœcum egestionem exeuntis reddit, illis, vel quia sæpè ani procidentiam, vel podicis diuturnam emanetiam pasci sunt, tandem euenit. Vel etiam à refrigeratione nimia huius sedis, summè sensibilis, obsessio-

nem supra faxum frigidum simileve quid, aut moram in aquâ aëreue frigidis, anum præcipuè tangentibus & refrigerantibus, potest accidere.

A resolutione eorundem musculorum, à defluxione in neruos illorum delapsa, ani procidentiam eam gigni, quam Ani paralytici, causam, eamque particularem vocant, plerique censent. Verum ut particularis hæc illius tantum partis, nec aliarum simul paralytis à defluxione gignatur, haud verisimile, nec eam, quam copiosè ab alto, ut paralytim efficiat, defluere necesse est, tãtũ in imam ossis sacri sedē, vbi exiles hi nerui hisce musculis communicati emergunt, se insinuare, & non totius potiùs ossis sacri ciuitatē, vnde propter neruorũ durorum exortum, etiam illorũ sequeretur resolutio, opplere, probabile. Vnde si resolutio fieret ani musculorũ, non solum ano peculiaris sed & illi cum toto corpore vel certis inferioribus partibus communis paralytis sequeretur: quod tamen etsi extrema omnium partium in apoplexia sequatur resolutio, minimè fieri nec anum procidere videmus, vti nec in alia paralyti, in qua partes infernæ alioquin omnes resolutæ sunt, cum eâ laborantes nihilominus fæces alui deicere, podicemque sponte retrahere possint, & licet quandoque inualidiùs propter hunc morbum id fiat, tamen minimè prolabi. Quibus moti, si neruorum causâ talis ani sequatur non procidentia, sed reducendi difficultas, cum & hæc rariùs in paralyti à defluxione nata fiat, eam potiùs à compressione neruorum ob contusionem aliquam ex casu vel ictu, circa ossis sacri aut coccygis infimam sedem factam, aut insignem aliquam refrigerationem harum sedium, nõ solum musculos hosce, sed & neruulos afficientem, procedere, non sine ratione opinabimur.

A relaxatione oculi connexus cum sua orbita, illius Procidentia procedit. Quæ non nisi à causa violenta summè impellente proficisci potest, cum membranis suis & musculis adeò firmiter orbitæ suæ sit connexus, ut etiam vix & non nisi magno labore in mensa apppositi cocti erui, sectioneque connexus ille dissolui queat.

Ob con-

Ob contusionem tamen magnam capitis, casu vel ictu oculi impulsus, ex suâ sede aliquantisper procidunt.

A' vi aliâ vix dum hoc potest accidere, licet enim per conatum magnum, in excretionem alui difficili aut partu, aut vociferatione, oculi non nihil extrorsum vergere, atque ob id maiores apparere videantur, non tamen perseverans ipsorum est prolapsus, sed saltem prominentia, de qua in deformatione actum, cum ex spiritus hoc impulsu, in conatu eo, minimè impleri aut distendi, sed saltem aliquousque musculis ipsorum tunc quoque veluti agentibus, impelli queant.

A' distentione oculi globi à flatibus & humiditate aliquâ, in eius interiore sede collectis, eum adèd impleri & distendi posse, aliqui existimarunt, ut procidentia illius aliqua inde sequatur. Verùm cum nulla cavitas in oculo vacua inueniatur, sed vndique oculus impletus suis humoribus distentis, que sit, nec via detur, quâ hæc eum subire possint, nec hæc in oculo congeri, nec aliunde eò corruari possint, hoc concedere minimè possumus, sicuti in dolorum oculorum causis, quos à flatibus & suffusionis causis, quam ab influxu aque dependere putarunt, quoq; hoc fieri non posse demonstraui.

Lingua connexus relaxatione, causa illius Procidentia.
A' linguae connexus relaxatione seu remissione, illius Procidentia euenire potest, vix tamen nisi summa vis hanc pariat, cum connexus illius per musculos, tunicam succingentem & ligamentum factus adèd firmus existat. Accidit tamen in contusione colli vel pectoris vehementi, qualis est ea, quâ valido rotæ ictu latronibus membra & pectus franguntur, ut lingua procul ex ore in mortuis exeratur, quod & ex casu potest accidere.

Scroti diffectio, causa Testium procidentia.
A' vulnere ex dissecto cum forpice per iocum scroto, testis procidentia in eo quem vidimus, accidit.

Curatio.

In testinorum vel Omenti procidentia exruptura vel dilatatione peritonæi profecta, tumorem Celen appellatum producat, si in inguine enterocelen & epiplocelen gignat, illicque tumor persistat, leuiterque sal-

tem promineat, nec dolorem grauiorem inferat, sæpè negligitur, vel leuiore negotio coërcetur, & curationem si maturè adhibeatur, citius admittit. Vti & in omphalocèle, in qua vmbilicum aliquousque prominentem, pressioneque refugientem, per totam vitam gerunt; vel alterius ventris regionis cele, si simili modo se offerat. Sed & omphalocèle aliqua, vti dictum, non est perseverans, sed sponte iterum euanescit. Quod si verò in scrotum vsque tumor hic descendat, in enterocèle maior curandi difficultas exoritur, vel etiam periculum tunc interdum exurgit: nam si inde remeare non possit, nullaque arte propelli, doloremque inferat & omnimodam constipationem alui, mortem accersit, quam vomitus alui sæcum præcedere, & instantem indicare solet.

Quod & in omphalocèle vel alia ventris cele si eueniat, ut reponi nequeat, eademque accidentia proferat, mortale existit. In epiplocèle verò si quoque tumor in scroto factus, induratus, vti iam dictum, subsistat, quod etiam est rarissimū, aliquando tamen accidisse diximus, licet non ea symptomata producat, tamen eum quoque neglectum, mortem attulisse in quodam, ostendimus. In aliis verò enterocèles, tam in scroto quâ ventris aliis sedibus se exerentibus, speciebus, si tumor cedere possit, ad eum penitus auertendum, ne amplius redeat, atque integrè sanandum, medicamentis, etiam si recens malum sit, hoc perficere, præsertim cum ut ea operentur, diu continuari, & æger interim quiescere, & vinculis astringi debeat, quod ægrè perferunt, est difficile, si verò inueteratum sit, impossibile, nisi manuali opera, aliquid, vti mox dicetur, præstetur, quod tamen non sine labore, & periculo mortis, si sectione (viti plerunque fieri solet,) hoc fiat, & amissione illius loci testis si in inguine sectio instituatur, peragitur. Quam si ægri idèd vitare velint, cura erit, eiusmodi tumores quos auertere penitus nequimus saltem reprimere; & ne excrescant, retinere. Quæ omnia quâ ratione fieri debeant, & per medicamenta, assumptâ admotâve, vel manuali operatione administrari, tunc demonstrabitur. Primum quo pacto hæc cau-

ſæ, hoc eſt parti prolapſæ, dein quomodo morbo ipſi, hoc eſt ſolutioni huic continui, in rupturâ, vel contiguitatis, in relaxatione peritonæi, accommodari debeant.

Partis quæ vel inteſtinum aut omentum eſt, prolapſæ extra peritonæi cavitatem, tumoremq; vel in ſcroto vel inguine, aut in aliâ ventris ſede excitantis cauſâ, ea adminiſtramus, quæ eam reponere, repositam retinere, & ne relabatur, impedire poſſunt.

Reponimus digitis & manû, ſenſim tumorem in ſcroto vel inguine, vel vêtre prominentem premendo, & huc illucq; impellendo, verſus foramē vnde prociderat, quod digito eò deducto aliquândo deprehenditur. Fieri q; hoc debet reſupinato egro, & ſic collocato, ſi in inferioribus ſit, vt diductis cruribus pedes reliquo corpore elatiores ſint, quo & ſolo ſitu inteſtinum ſuſpenſum ſponte quandoque ſenſim relabatur.

Quòd ſi verò per hanc operationem non ſuccedat, vti inteſtino præſertim egreſſo frequentius euenit, quando illud ob ſtutus diſtentum aut contortū, aut ſciuaſon induratū aded intumuit, vt anguſtam viam ruſum ſubire nequeat, tūc ante omnia hiſce occurrendum, ne excrementorum tranſitu impedito, illa ad ſuperiora regurgitantia, aut inflammatio ſuperueniens, ægrum enecent.

Proinde in eiufmodi caſibus, ſi dolor & calor metusque inflammationis adſint, anodyna, in phlegmone deſcripta, applicanda erunt.

Inprimis autem hoc cataplaſma, quod & ſimul vias relaxat & duras ſæces emollit, ſtutusq; leuiter diſcutit: R. rad. Altheæ ʒ.ij. Liliorum ʒ.j. herbarum Maluæ, Violariæ, Brancæ vrſinæ, Parietariæ an. M. j. flor. Roſarum, Violarum, Chamomillæ vel Meliloti, Anethi, Furfuris an. P. j. fiat decoctio in Aqua & Laſte, ſi magnus dolor adſit, contūdantur & per cribrum fricentur, addendo illi quod tranſmiſſum eſt, farinæ Hordei, Fabarū an. ʒ.iiij. farinæ ſeminis Lini, Fœnogr. an. ʒ. j. ſ. ſeminis Pſyllij ʒ. j. Vermiu terreſtrium puluer. ʒ. j. olei Roſacei ʒ.iiij. axungię Anatis vel Gallinæ ʒ. j. fiat Cataplaſma.

Quando calor non impedit, & maiori emolliſſione & diſcuſſione flatuum opus eſt,

addimus huic decocto, rad. Iridis, Bryoniæ vel Cucum. aggregatiſ an. ʒ. j. herbarum Abſynthij, Calamentæ vel Origani an. M. j. florū Sambuci, Roſmar. Centaur. min. an. P. j. ſem. Viticis ʒ. j. & omiſſo laſte, in decocto addimus parū Vini, & cum farinis prædictis, vel Orobi, Lupini an. ʒ. j. baccarum Lauri ʒ. ʒ. & cum olei Irini, Rutacei an. ʒ. j. facimus cataplaſma.

Vel in magna flatuum copia: R. ſem. Carui ʒ. j. ſeminis Cimini ʒ. ʒ. farinæ Fabaceæ ʒ.iiij. olei Rutacei ʒ. j. Oxy mellitis ſimpl. q. ſ. fiat Cataplaſma.

Ruta fixa cum oleo ſuperpoſita valde iuuat.

Fotus in eandem rem ſunt, ex decocto, ex cuius reſidetiâ cataplaſma fieri diximus, vel prioris, ſi calor adſit, vel poſterioris, ſi magis diſcutiendum, additis illis etiam oleis illic enarratis.

Ex oleo Roſaceo, Anethino, Liliorum, Chamomelino, Meliloti, Irino, Sambucino, Rutaceo, inunctiones & fotus ſimiliter fieri poterunt.

Sacculi, cū diſcutiendum eſt, adhiberi poſſunt, ex Plantis aridis & ſeminibus Milij, cæterisq; Calidis maioribus dictis & Sale parati.

Præter hæc aliis quoque tam aſſumptis, quàm ventriculo aut ventri admotis, non ſolum flatibus inteſtinū prolapſum impletibus, ſed & ne iterum vbi repositum eſt, ſi flatuum adſit copia, illud propellant, illi præcauendi aut diſſipandi: ſicuti in Ventriculi inflatione & colicis doloribus à flatibus, hæc copioſe præſcribuntur.

In omenti exitu, cū illud in inguine plerunque ſubiſtat, & vel decubitu ſolo, aut ſimul adhibitâ manu intro remeet, eiufmodi externis applicationibus minimè opus eſt, niſi & illud in ſcroto vſque delapſum, vti aliquando eueniſſe, in cauſis illius oſtendimus, inde cedere nolit, tunc enim & prædictis relaxantibus quoque tumor foueri emplaſtrarique debet, flatuum hîc non aded habitâ ratione, niſi & hi in ſcroto per eandem aperturam, quæ omento fecit viam, eruperint.

Sectione factâ, cogimur interdum, ſi in-

testina omnino reduci nequeant, & necessitas exigat, opitulari, ut ita si fieri possit, cute aperta, denudatis tunc intestinis & parentibus, foramineq; per quod egressa sunt manifestato, rectius illa reponi queant. Quod in inguine tentare, si intestina hic egressa, illic & in scroto hæreant, valde periculosum, cum sectione cutis, quæ tumori incumbit, facile etiam intestina distenta, cutique firmiter hærentia, vulnerentur, uti accidisse aliquando vidimus. Dein etsi ob diligentem sectionis administrationem, nulla sequatur illorum læsio, tamen cum & sic intestina nuda ob dolorem vulneris, minus commodè, quam cum cute adhuc obsecta erant, tractari possint, hac operatione in inguine factâ, etiam plerunque vel nihil efficiamus, vel morti, quæ alioquin si intestina foris maneat, subsequi solet, nos occasionem eâ sectione præbuisse, in suspicionem venimus. In abdominis vero aliis sedibus peritonæo rupto, si intestina nullâ arte aliâ reponi potuerunt, sectione cautè illic administratâ, hoc successisse observauimus, cum tumore tunc ferè non adeò distento, citra intestinorum læsionem, tutius hæc perfici, & foramen peritonæi melius inueniri, digitoque admoto & nonnihil dilatato, intestina illic ubi huic proxima sunt apprehensa, sensim per illud introrsum rursus adigi, sicque torus illorum ductus qui exciderat, reponi possit.

Retinemus intestinum aut omentum ne prolabantur, tumoremque sic ne redeat, auertimus variis modis, nempe collocando corpus situ conuenienti, & comprimendo tumorem manu vel instrumentis.

Situ idoneo collocandum corpus, ut intestina cum omento introrsum potius quam extrorsum vergant, sicque ea quò minus elabantur, retineantur. Quod decubitu supino perficitur, quali & noctu, hæc minime quam diu iacent, exeunt, ideoq; cum cura instituitur, ut ea perfici possit, tamdiu nisi aliis artibus retineantur, lecto eo decubitus modo se continere iubentur.

Manus adhibita tumori eumq; premens, non solum illum repellit, sed & quamdiu illic retinetur, ne redeat, cohibet. Verum licet hoc continuò fieri nequeat, tamen ali-


quando manus appressa loco iunabit, maxime quando per tussim, aut conatum egerendi alitumve, intestina ab abdomine pressa, per hanc viam egredi nituntur, sic contra nitendo premendoq; manu, exitus illorum impediatur. Quod si tumor herniosus nondum adeò increuerit, & in eiusmodi conatibus consuescant, manu extuberantiam premere, ne ille augeatur, malumque augmentum sumat, prohiberi potest.

Instrumentis certis, quæ retinacula ob usum appellare possumus, adhibitis, intestina vel omentum, ne procidant, cohibemus: quæ & proin quamdiu erecti ægri manent, gestare debent, & non nisi noctu cum decumbunt, si tunc admodum impediunt, deponi: vel si interdum necessitatis causâ ea amouere necesse sit, tamdiu donec reponantur, manu vices ipsorum supplendæ: Hæc autem ex puluino vel scuto, quæ tumori hernioso imposita, eum premendo intropellant, illicque subsistentia illius recursum impediunt, parantur. Quæ ne inde declinent, sed valide illic retineantur, variis fasciis, nunc corpori cinguli instar circumductis, nunc ab humeris pendentibus, aliisque ligamentis ab illis subtrus subligaculi modo reductis, aliisque interdum simul additis vinculis, mutuo conexis, vel ligulis colligatis, aut loris per fibulam transeuntibus, spinthere costrictis, coërentur, & prout vel in inguine, vel aliâ ventris regione tumor se offert, maximeq; ut æger commodius minori; molestiâ hæc perferre & gestare possit, formæ horum effinguntur, è quibus sequentes accommodatissimæ à nobis deprehensæ fuerunt.

Inter ea quæ inguinum regioni adaptantur instrumenta seu retinacula, primum & simplicius illud est, quod ex puluino sit illius longitudinis & latitudinis, ut totum spaciū inguinis impleat, & ut protuberet, lanâ duorum digitorum altitudine infarctus, & ne continuo vsu cutem excoriet, pannio molli vel xylino aut corio leni sit obductus. Qui puluillus ut firmiter hæreat, nec loco facile moueatur, cingulo lato ex eadem materiâ parato, per lumborum regionem cincto, & uti diximus, costricto, anteriore sede inguini adnexus esse debet, & subligaculo xylino

in modum fasciæ latiusculo, quod posteriori sede cingulo enarrato innexum deorsumq; ductum, sub crurum diuisione sursum denud reflexum, per puluini mediū transcens, & pronexum illi affixum, ne ab eo declinet, permeans, cingulo illic rursus adstricto, comprimi, & vt se bene applicet, adstringi debet. Sicuti figurâ sequenti exprimitur.

1. Instrumentum expansum.



A Puluinus.

B Cingulum.

C Subligaculum.


D D Lorum cinguli & subligaculi.

E E Fibulae, quas vtrumq; lorum peruadit.


F Pronexus puluini, quem subligaculum peruadit.

Alterum instrumentum pro hernia inguinali, ex puluino & cingulo, vt de primo dictum, formatur, subligaculū verò in hoc, anteriore regione cingulo affixum, per pronexum puluini transiens, in duas fascias diuiditur, quæ sub crure reflexæ, duobus in locis cingulo alligantur, vt sic arctius latiusq; quàm vnica tantum fascia, premendo, validius subsistentes, puluinum rectius in sua sede contineant. Vti figurâ hac, tam expansum, quàm quo pacto corpori alligatur, instrumentum ostenditur.

II. Instrumentum expansum.



Idem Instrumentum clausum, quo pacto corpori adligatur.



AA Puluinus.

BB Cingulum.

CC Subligaculum.

DD DD Fasciæ bina, in quas subligaculum diuiditur.


EE Pronexus puluini, sub quo subligaculum.

FFFF Ligula, quibus cingulum simul, & subligaculum vtrinq; nequitur.


Tertium instrumentū inguini adaptandum, admodumq; firmum, ideò & infantibus, cum inquieti sint, nec sibi vti adulti cauere possint, accommodum, ex subligaculo fit, quod cingulo supra inguina adneditur, latumq; & amplum supra vtrumq; inguen & scrotum expanditur, atque vtrinq; vbi inguina premere debet, puluinorum duorum instar, lanâ infarcitur, in medio verò, foramine peruium penem transmittit, & subtus saccum efformat, in quo testes inclusi suspensi retinentur, non tamen arctantur: inde-

indeque in duas fascias definit, quæ sub cruribus retrorsum ductæ, cingulo ex vtraque parte adnexæ, subligaculum attrahunt, & præter has alias duas fascias, posticâ sede cingulo vtrinque adnexas continet, quæ sub cruribus antrorsum reflexæ, & per puluinorum duorum ac cinguli eas sustentantis pronexus vtrinque transeuntes attrahunt, subligaculum illique innexos puluinos ampliùs firmant: quemadmodum sequens figura denotat.

III. Instrumentum expansum.



Idem Instrumentum clausum, quomodo corpori accommodatur.



AAA Cingulum.
B Subligaculum.
CC Idem expansum.

DD Foramen subligaculi.

EE Saccus subligaculi.

FFFF Fascia duæ subligaculi.

GGGG Fascia duæ cinguli.

HHHH Pronexus in subligaculo expanso & cingulo.


IIII Ligulæ, cingulum simul, & subligaculum illi neccentes.

Interdum quoque prædicta tria subligaculorum genera, quæ cingulis suspenduntur, vt minùs deorsum subsideant, magisq; adstricta maneant, aliis fasciis duabus cingulo posteriùs adnexis, & per vtrumque humerum ductis, rursusque deorsum anteriori sede ligulis cingulo vtrinque adligatis, sustentantur.

Quartum accommodatissimum, in inguinis rupturâ, ex duobus fit separatis subligaculis latis & xylinis, quibus singulis puluinus adnexus est, quæ posteriore sede thoraci seu pectorali vtrinque adligantur, & sub cruribus reflexa, sursum ad vtrumque inguen feruntur, illicque puluinaribus illi adnexis, vtrique inguini tam sano quàm rupto incumbunt, & pectorali denuò ligulis validè adstringuntur, & vt firmi maneant puluini, cingulo coriaceo, per vtriusque puluini pronexus anteriùs quoque per duos alios subligaculis appositos, transeunte stringuntur, sic enim firmissimè etiam in validis corporis motibus nihilominus subsistunt, & puluinus in loco sano positus, etiam si illic nullus tumor sit, tamen cùm vicinum puluinum loco ægro incumbentem, ne in latus inclinet, sustineat, ita quoque opitulatur.

Hoc autem sequens figura exprimit.

IV. Instrumentum diductum.




- AA Pulvini duo.
 BB Subligacula duo.
 C Cingulum coriaceum.
 DD Pronexus vtriusq; pulvini.
 EE Alj, vtriusq; subligaculi.
 FFFF Foramina vtriusq; subligaculi, expulvini, per quæ, ligula pectorali infixa transeunt, hæc illi astringunt.


Quintum retinaculum ex scuto fit ligneo, duos digitos crasso, deorsum versus attenuato & rotundo, quod in medio vbi penem respicit, exectum spacium efficit, ne radicem illius premat, vtrinque verò extuberantiis duabus introrsum spectantibus, vtrumque inguen comprimit. Hoc cingulo ex ferrea lamina, tenui sed firmâ, vt non nihil cedere possit, concinnato, corioque vndique inuestito, superiore suâ sede clavis vel gyris affigitur, illicque cinguli extremitatis portione, quæ ab alio separata est, vt claudi cingulus rursusque aperiri possit, & corio quo circulus inuoluitur, tantum adhæret supra alterius extremitatem circuli, quæ scuto affixa est, fertur, illicque cingulum attrahit necitque, scutumque sic firmiter in sua sede retinet: Sicuti gemina hæc figura, hoc retinaculum tam clausum quam apertum demonstrat.

(*)

V. Instrumentum apertum.




Idem Instrumentum, clausum uti corpori applicatur.



- AAAA Scutum ligneum.
 BBBB Cingulum ferreum corio in prima figura obductum, in secunda nudum.
 C Extremitas cinguli ferrei nuda, scuto clavis & gyris affixa.
 DD Hami duo illius sedis.
 E Extremitas altera cinguli ferrei nuda, pro hamis excipiendis permissa.
 FF Cingulum ferreum, illic abruptum; in prima figura corio solum coherens.
 G Claustum quod ex cinguli extremitatibus mutuo iunctis hamisq; affixis perficitur, corioq; obtegatur.

Sextum instrumentum ex scuto quoque ligneo fit, sed lato admodum, quò vtrumque inguen integat, introrsumque inclinans, simul scrotum sustineat, cingulo ferreo priori simili affixo retentoque. Sub quo scuto vbi inguen ruptum respicit, pannus conuolutus vel pulvini inferus tumorem illic pre-mendo, ne protuberet, cauent.
 Cuius scuti figura talis esse debet.


VI. Instrumentum ex scuto lato fabricatum, quod cingulo ferreo, uti scutum quinta figura, affigitur.



- A Scutum ligneum latum.
B Cinguli ferrei extremitas scuto affixa.
C Cingulum illic abruptum.

Septimum instrumentum ex ferreo scuto fit, quod affectum tantum inguen occupat, cinguloque ferreo, uti priora duo scuto affixo, illius extremitate clauditur & adstringitur. Quod scutum ex lamina spissa & lata fit ferrea, cuius posteriori sede cochleare ferreum eiusdem ferè latitudinis, articulo ut moveri queat, iunctum est, ea sede quâ inguen tangit corio munitum & nonnihil suffultum, quod à cochlea ferrea, laminis exterioris medio infertâ, dum circumvertitur, versus inguen eoque quoad sufficit, pellitur, illicque fixum retinetur. Vti hoc ex figura sequenti patefit.

VII. Instrumentum apertum.



- A Scutum ferreum.
B Cochleare ferreum.
C Connexum cochlearis, corio obductum.
D Cochlea ferrea, quâ circumductâ, cochleare introrsum pellitur.
E Foraminula, per qua corium scuto obductum fuitur.
F Cingulum ferreum, quale & quinta figura.

In aliarum ventris regionum, uti vmbilici vicinorumque; locorum tumoribus herniosis, quæ adhibentur instrumenta, ex cingulo vel xylino vel ferreo, uti de prioribus dictum, paratur, quod ventris sedem illic ubi tumor erumpere solet, ambiat, puluinoque illi adnexo, vel scuto ligneo aut ferreo, premat, sicuti artificiosè hæc excogitari possunt; quod cingulum ne propendeat, quoque adnexis fasciis humeris sustentari, vel pectorali ad illud parato, alligari poterit.

Impedimus quoque aliâ ratione, ne facile intestina prolabantur, causam quæ illa ut citius excidant, impellit, subtrahendo. Veluti cibi & potus copiam, eorumque quæ multa excrementa flatusque gignunt, usum, cum hisce intestina repleta distentaque facilius procident.

Ob quam & causam ad ipsorum proveniunt impediendum, & si redundet, ad ea expurganda, purgantia interdum exhibentur. Qualia in ventriculi affectibus & colicis doloribus, alibique descripta sunt. Quibus si simul constringendo aliquid rupturæ causâ opitulari volumus, rhubarbarum, myrobalanos, aliaque in dysenteria dicta purgantia eiusmodi addimus, vel illis solum utimur; vel alia quæ rupturarum causâ propinantur, hisce permiscemus, ex decoctis præsertim, mox describendis parata.

Clysmata verò in enterocoele minimè injicienda, nam si intestina egressa illic subsistant, ea implendo tumoremque augendo, ut minus comode reponi possent, impedirent, & licet tenuia essent, quod clysmata facile non perueniunt, cum tamen ægrè liceat id cognoscere, interdumque eo penetrare quoque possint, satius est ea omittere, nisi postquam reposita sunt, summa constipatio virgeat, ut illis utamur. In epiplocele verò omento procidente, cum eo non ferantur, si flatibus aut

aut excrementis retentis, venter distendatur, commodè illis vti possumus.

Frigus quoq; constringendo, exitum intestinorum aliquâ ratione promouet; Maxime verò si hæc iam prolapsa sint, cum ex frigore intumescant & lædantur, nocet, ob quâ causam à frigore prohibeantur ægri.

Motus nimij præsertim cauèdi, vt qui per exercitia violèta corporis & conatus nixusque validos in excretionibus, vociferandoq; obeuntur, cum perea abdomen constrictum intestina propèllat. Venus quoque commotione nimia exercita hac ratione incommodat. Quies conuenientissima, non solum præcautionis illius gratiâ, sed & ad curationem, vti dicitur, summè necessaria.

Rupturæ peritonæi, vel relaxationis processus illi in inguine vel aperturæ illius circa umbilicū, causâ, vt hæc curentur, varia & exhibentur atq; admouentur, vel si hæc minime proficere possunt, sectione perficiuntur.

Exhibetur in hanc rem consimilia non nihil illis, quæ assumpta, vulnerū conglutinationē iuuare, in curatione ipsorū docuimus. Quæ & hic si à relaxato peritonæo procedant, vi siccante & constringente aliquid præstare possunt; sicuti & in ruptura vi cōsolidante, si modò in ea vulneris labia nondum admodū retracta sint, necdum vetustate callosa facta, tunc enim nisi carnem illic nouam circumfundendo, viam hanc occludant, aliâ ratione prodesse non poterunt. Sunt autem diu hæc continuanda, & septimanis aliquot successiue, vt virtus illorum tandem ad hæc quoq; loca pertingat, assumenda.

Ad hanc itaque rem decocta eadem vulneraria, in vulnere cura descripta, vsurpari possunt.

Vel alia, ex his vel aliis rupturis sanandis accommodatis plantis, recentibus vel aridis paratis, & in vino aliòve liquore decoctis, aut cum melle vel saccharo in formam syrapi redactis, eodem modo vti traumatica decocta fieri ostendimus.

Simplex decoctum Polygoni minoris speciei, quæ Herniaria ob singularem in herniis vsus nominatur: Vel Saniculæ, aut Filicis speciei quam Osmundam vocant, in Vinum factum, valde probatur.

Compositum ex tribus hisce plantis simul decoctis, admodum efficax.

Vel insuper addendo Violam tricolorem Trinitatis, aliàs Iaceam dictam, Alchimillam, Arthemisiâ, Betonicam, Agrimoniâ, Equisetum, Pimpinellam, Pilosellam, Perfoliatum, Cruciatam, ad M. aliquot. Et radic. Consolid. maior. 3. j. β. radic. Rubiæ, Bistortæ ana 3. j. radic. Aristoloch. 3. β. florum Verbasci, Hyperici ana p. j. Nucum cupressi 3. β. seminis Abrotoni & Nasturtij ana 3. j. seminis Anisi 3. ij. faciendo decoctum in Vino & Aqua, ad consumptionem tertiæ partis, vt remaneant lb. iij. Sicque bibendo, vel addito Melle aut Saccharo, in syrapi consistentiam aliquam coquendo, sicque successiue de eo sumendo.

Sunt & alia idem præstantia, quorū aliqua prædictis mista, in decoctis conuenient: Veluti radix Narcissi, Gariophyllatæ, Acanthi, Leucacanthi, Baccharis, Libanotidis: Item ex herbis, Consolida media & minor & Sarracenicæ, Virga aurea, Sanamunda, Plantago, Ophioglossum, Fragaria, Verbascum, Primula, Auricula vrsi, Crassula, Millefoliū, Tanacetum, Cannabis, Saluia, Calamintha, cæteræ in traumaticis exposita.

Capitis Caprini cum pilis decoctum probant Arabes: alij pilorum Leporis.

Vina per infusionem ex selectioribus aridis in dolio facta, minori fastidio diu vsurpari possunt, & nihilominus idem operari.

Succi aliqui propinati idem præstant, per se 3. j. pondere vel maiori sumpti, vel Vino aliòve liquore addito, vel inspissati prius coctione, in formam Rob seu extracti 3. j. aut circiter, quantitate exhibiti, vel addito Saccharo aut Melle in forma syrapi: Et sic ad 3. j. β. datur.

Inprimis Herniariæ cōmendatur succus; Dein & Violæ trinitatis, Filicis item quam Osmundam vocat & Symphiti maioris, rad. Gentianæ succi 3. j. exhibet Diosc. Alij Rusci etiam succum: Possunt & aliarum plantarū, quarum decoctum conuenire diximus, succi similiter vsurpari. Laferpitij liquorem cum Lixiuio aliqui propinant.

Aquæ stillatitiæ Alchimillæ, Consolid. maioris, Equiseti, Plantaginis, Peculi rofarum, alia-

aliarumq; in decocto dictarum plantarum, exhibentur in eundem vsum, per se vel cum aliis remediis.

Potiones aliæ in hanc rem sunt, ex puluerum quorundam 3.j. vel plus, mistorum cum Vino rubro austero, vel decocto aut Aqua stillatitiâ cōuenientibus, aut etiam cum Aqua vel Lacte in pueris, aut Ouo sorbili, aliōve modo; Sicque propinantur, addito si velint, Saccharo vel Melle, aut Syrupo.

Hoc pacto dantur pulueres simplices vel inuicem permisti, sequentes; Inter quos primas tenent, puluis Herniariæ, Hippoglossi radic. & foliorum Ophioglossi, radic. Gladioli, Xiphij, Violæ tricoloris.

Conueniunt & pulueres Equiseti, Bursæ pastoris, Alchimillæ, Perfoliatæ: Item radic. Symphiti, Valerianæ, Aristolochiæ, Bistortæ, Tormentillæ, Pentaphylli, Bryoniæ.

Præter hæc commendantur & à Diosc. aliisque, aliarum quoque plantarum pulueres sic bibiti: Veluti Betonicæ, Hepaticæ, Panis cuculi, Balsaminæ, Periclymeni, Polycnemi, Helycrisi, Symphiti petræi, radic. Bardanæ, Helenij, Smyrniij, seminis Nasturtij & Thlaspi, aliarumq; plantarum quarundam efficaciam in decocto enarratarum.

Laudatur & puluis Lumbricorum, Blattæ Byfantia, Limatur. Chalybis, Lapidis Hæmatitis, Amianthi & Osteocolli, quem & rupta ossa consolidare docent. Terræ item pingues, quas Sigillatas, ob impressum sigillum vocant, aliæve terrena siccantia.

Ex vñtatis sic quoque exhiberi possunt, pulu. Trochiscorum de Charabe, de Spodio & de Bolo; Item puluis Diacydonites sine speciebus, cum liquore aliquo.

In forma puluerum hæc eadem sumi possunt, permiscendo Saccharum ad gratiam, vel cum eodem cocto in aquis cōuenientibus in tabulas redigi, sicque sumi, addendo insuper grata, & ventriculo cōuenientia, ne ab illorum continuo vsu lædatur, & quæ flatu abigunt, cum & hi intestina replendo, tumorem in herniis augeant.

Veluti: R. seminis Coriandri præpar. 3.j. seminum Carui vel Cimini, Nasturtij ana 3.ß. Herniariæ 3.j.ß. Hippoglossi vel Ophioglossi aut Caudæ equinæ 3.j. radic. Consoli-

dæ, cortic. Granatorum ana 3.ß. Boli 3.j. Coralli rubr. 3.ß. Sanguinis draconis, cineris Priapi tauri vel cerui 3.j. Cinamomi 3.j. Sacchari ros. tabul. ad pondus omnium, fiat puluis, vel auctâ dosi Sacchari, dissol. in aqua Equiseti & Ros. fiant tabulæ.

Electuaria ex iisdem pulueribus fieri possunt, excipiendo eos, conferuis, condituris, syrupis vel rob. cōuenientibus 3.ij. aut circiter dando, aquasque superbibendo.

Vel hoc modo: R. conferuæ vel condituræ radic. Symphiti maior. & Narcissi radic. ana 3.j.ß. conferuæ Herniariæ, more consueto paratæ 3.j. conf. Ros. antiquæ, conferuæ Acori palustris ana 3.vj. conferuæ Saluiæ, vel Stechados 3.ß. seminis Coriandri præpar. & Foeniculi ana 3.ß. Succini, Mastiches vel Thuris ana 3.ij. lapid. Hæmatitis 3.ß. Cinamomi 3.j.ß. cum syrupo Myrtillorum fiat electuarium: Cui & alij ex pulueribus supradictis, nisi fastidiant, efficaciores præferunt, addi possunt.

Mixtura ex variis pulueribus enarratis inuicem in massam coactis parari potest, de qua 3.ß. vel 3.ij. in forma boli vel pilularum, cōtinuis multis diebus commodius deglutiuntur, quàm alio modo cum ingrata sint, sumuntur.

Hoc pacto: R. radic. Consolidæ maioris, Rubiæ mai. Tormentillæ, Aristolochiæ, Rhabarbari, Bryoniæ ana 3.j.ß. herbarum Herniariæ, Violæ tricoloris, Hippoglossi, Ophioglossi, Bursæ pastoris, Alchimillæ, Equiseti, seminis Nasturtij, Mumia, Blattæ Byfantia, Boli, Coralli ana 3.j. gummi Arabic. Sarcocollæ, Mastiches vel Thuris, Succini ana 3.ß. fiat puluis, excipiat syrupo Myrtillorū & infus. gummi Tragach. fiat pasta.

Additis aliis quamplurimis vel omnibus pulueribus supradictis, polychrestum remedium sic parari poterit.

Pilulæ ex aliis quoque præparatæ dantur: Veluti ex vñtatis, pilulæ de Bdelio.

Vel illorum loco his vti possumus: R. Asphalti sive Mumia 3.ij. Bdelij, Galbani vel Sagapeni, Myrrhæ dissolutæ in aceto an. 3.ß. Limaturæ chalybis præparat. 3.j. Stercoris leporis sicci 3.ß. pulu. Lumbricorū 3.j. cum succo Violæ tricoloris vel Herniariæ cocto,

cum Melle in formam syrapi, fiat massa. Capiat ʒ. ij. vel ʒ. iij. pro vice.

Aliæ ex Stercore leporis siccato, & Pills eiusdem minutim incis, cum Melle cocto subactis factæ, ad ʒ. j. aliquandiu deglutitæ, commendantur.

Admouentur loco affecto illic vbi tumor sese exhibere solet, & peritonæum ruptum vel relaxatum est, vel in inguine, aut vmbilici aut alia ventris sede, variæ applicationes, quæ valide adstringendo, relaxatione hanc, si in inguine sit, restringant, vel in ruptura, siue illic siue alibi sit, scissuræ labia diuisa rursus non nihil iungant, additis simul consolidantibus, per quæ, etsi peritonæum ægre possit amplius coalescere, tamē quia horum continuo vsu, caro de nouo parti læsæ, si recens præsertim hæc læsio fuerit, accrescere potest, eâ ratione aperturam hanc obturando, vti adstringentia angustiolem reddēdo, affectum hunc, sicuti ea quæ exhibere iussimus, sanare poterunt. Quod vt rectius præstent, omni studio intestina interim continenda sunt, ne villo pacto ad locum affectum rursus impulsæ, exitumq; quærētia, aut etiâ prolabantia, illud quod vel adstringi vel iungi inceperat, iterum diuidēdo separetur, donec integrè & perfectè hæc rursus fuerint curata. Ob quam causam quamdiu hæc cura perficitur, ad mensis spacium vel vltra, vel in lecto supini recumbere, vel subligacula continuè gestare, aliisque modis intestina retinere debet, omniaq; quæ hæc impellunt, illis quæ prius explicata fuerunt, impedire.

Fiunt autem eiusmodi applicationes plerumque per emplastra, cum diu ad cōtinuum illorum vsū asseruari possint, quæ & elapsis quibusdam diebus renouari debent.

Quale sequens ex pluribus paucioribusve sic parari poterit: ʒ. radic. Consolidæ, Bistortæ an. ʒ. iij. radic. Aristolochiæ ʒ. ij. Gallarum, Nucum cupressi, cortic. Granatorum an. ʒ. ij. foliorū Visci querni, Balaustior. Ros. rubr. an. ʒ. j. Aloës, Sanguinis draconis, Hypocistidis vel Acaciæ ana ʒ. j. ʒ. Lumbricorū terrestr. exiccat. ʒ. j. Thuris, Mastiches, Myrrhæ, Sarcocollæ, Mumie, an. ʒ. ij. Picis naualis, Colophonie an. ʒ. ʒ. Boli, Lithargyrii, Hemeritis ana ʒ. ʒ. Gypsi vsti ʒ. iij. Resinæ

abietinæ vel lariceæ, vel pini q. s. puluerisfata pulueriscentur, & gummi in aceto forti dissoluatur, fiat emplastrum secundum artem; Vel subigatur omnia oleo Cydoniorum vel Lentiscino aut Myrtillorum, additaque Cerâ rubrâ fiat Ceratum.

Istis & alia addi possunt, veluti radices Narcissi, Asphodeli, Plantag. Nenuph. fol. Herniariæ, Glandium capulæ, semen Myrtilli, gummi Ammon. Bdellium, Galbanū, Serapinum, Tragach. Arabicum, Succinū, lap. Magnes, Chalybis limatura, Scoria ferri, Alumen, Vitreolum; Item pulueres Musci querc. Tuberum terræ vel cineres, Limacum rubrorum, Erinacei pellis, Pilorum leporis, Blattæ Byzantiæ, puluerisfatus item Sanguis humanus exiccat, Colla vel Mucago, quæ ex pellis arietis cum pilis, decoctione elicitur. Quæ omnia vel ex parte, cū supradictis in formam emplastri, vel cum oleis prædictis, aut aliis in quibus Bursa pastoris aliave adstringentia, vel succus Plantag. & Acetum cocta sint, & Cerâ, in Ceratum redigi possunt.

Alia emplastra sine vnctuosus parata, quæ admota mox siccantur, & firmiter hærent, non solum potentiâ constringendo, sed & actu locum premendo arctandoq; melius operantur, sicq; parari possunt: ʒ. Thuris vel Mastiches ʒ. iij. Boli, Gypsi vsti an. ʒ. ij. Aloës, Sanguinis draconis an. ʒ. j. ʒ. Gallarum vel cort. Granatorum, Nucum cupressi, rad. Aristoloch. vel Bistortæ ana ʒ. j. Vermium terrestrium vstorum, Pilorum leporis vstorum ana ʒ. ʒ. fiat puluis subtilissimus, qui excipiat Albumine oui & Aceto vel Collâ pisciū, vel contund. emollita vel dissoluta in Aceto forti; Et cum Bombace intincto applicentur, renouando bis tēve in septimanâ.

Picatio seu Dropax ex Pice dissolutâ, additâ Resinâ, supra partem fieri potest, diuque retineri; & quando pruritus mouet seu decidit, de nouo mutari: Cui & alij pulueres stiptici misceri possunt.

Ex vstitatis emplastris Ceratum de pelle arietinâ, vel contra rupturam appellatum, Arnoldi Villanouani, admodum in vsu est, fitque ex lithargyrio, lapide hæmatite, bolo, gummi, thure, mastiche, ammoniaco, galbæ

galbano, myrrhâ, pice nauali, græcâ, cerâ albâ & rubrâ, terebinthinâ, succis, aloë, sanguine draconis, hypocistide, opiø, radicibus consolid. maioris & minoris, aristoloch. costî, floribus ros. rubr. balaust. visco quercino, gallis, lumbricis, sanguine humano, pelle arietis.

Emplastrum Mastichinû conuenire quoque potest, præsertim si flatibus simul occurrere velimus, descriptum in ventriculi imbecillitate.

Vnguentum Comitîs vel Comitissæ dictum adstringens, hic quoque conferre poterit, applicatum.

Aliæ quoque applicationes ex plantis in Vino rubro austero coctis fieri possunt, & vnâ cum cæteris admoueri, veluti;

Herniaria cocta cum radice Symphiti.

Filix osmunda sic cocta prodest. Cui & Equisetum addi potest & Bursa pastoris: item Herniaria, Galles, Nux cupressi & Malicoriû.

Visci quercini seu in illius defectu, pyri folia recentia cum seminibus visci glutinosis, si adsint, vnâ cum radice Consolidæ, Hyperico, Saniculâ & Betonicâ, cocta & contusa apposita, probantur.

Præter hæc, Cicutæ exiccatae puluerem aliqui adhibitum commendant, qui Albumine oui excipi, sicque applicari potest.

Bdellium Saliuâ ieiunii hominis, vel Vino austero aut Aceto emollitum, admotum, etiam laudatur.

Lupini cum panno linteo combusti, cum Vino in omphacele vmbilico applicant.

Forus constringentes cum spongiâ vel panno immerso in decocto sæpè repetiti, actu calidissimi apponuntur, suntque ex decocto facto in Vino adstringente, vel admisso insuper Aceto, vel Lixiuo, aut Aquâ extinctionis ferri, simplicium sequentium.

Ex radice Bistorræ, Tormentillæ, Pentaphylli, Rubiæ maioris, Narcissi, ex herbis Herniariæ, Caudæ equinæ, Plantaginis, Hyperici, Tapsi barbati, Symphyti petræi, fol. Quercus, Berberis, Sumach, aliarumve herbarum adstringentium. Vti & cortice Granatorum, Cupressi nucibus, flor. Rosarum sicc. semine Coriandri, Nasturtij torrefacti.

Quibus & flatibus absumentia, ne intestina

implendo propellant, commiscuntur: Veluti Ruta, præsertim agrestis, Centaurij minoris summitat. & Rosmarini, flores Stæchados vel Lauandulæ, semina Cimini, Carui, Fœniculi.

Hiscæ omnibus si Aluminis & Vitreoli ana ʒ. j. vel plus addatur, vires fortius admodum augebit. Ex quibus solis in liquoribus superdictis pro fotu dissolutis fomentatio facta, efficacissima est, admisso nonnunquam & Bolo vel Gypso vsto.

Liquorem qui in Vlmi folliculis inuenitur, inunctum aliqui commendant.

Sectio postremum est remedium, quod in ruptura & relaxatione peritonæi sananda locum habet, cum per eam cute apertâ, peritonæum apprehendi, constringi & vinciri, cuius nomine sectio fit, possit; quæ tamen, quia cum maximo ægrotantis dolore & periculo fit, non nisi omnia prius tentata irritaque fuerint, tentanda; sed nec tunc quoque temerè, nisi eiusmodi herniosi tumores supra modum incommodent, & facile procedentes, magnum cruciatum sæpè ægro pariant, & metum ne fortè extra subsistentia, reponi nequeant, alioquin satius subligaculis, vti dictum, eiusmodi protuberantias auertere, leuiori que hac molestiâ, dolores atrociores & vitæ discrimen declinare. Talis autem sectio, rupturas eiusmodi & relaxationes idcirco auertere potest, & sanare dicitur, quod per eam cute apertâ, præsertim si in inguine fiat, processus peritonæi ruptus aut dilatatus vinciri possit, & sic via hæc intercludi, & in vulneris consolidatione carne accrescente, ne vinculo soluto membrana, quæ aliàs difficulter coalescit, vt superius dictum, rursus diducatur, hoc veluti glutine iuncta contineri. Quæ & sectio in aliis abdominis rupturis, si illic fiat, licet peritonæum scissum tunc non facile colligi ligari que possit, tamè ob adnascentem carnem, obturantemque foramen, hoc pacto eas curare potest.

Vt hæc autem decenter administretur in inguine, vbi præsertim fieri solet, præmissâ inuocatione diuini auxilij, cum res sit periculi plena, æger supinus ita in assere collocandus, vinculisque adstringendus est, vt caput declinius sit reliquo suo corpore,

pedesque altiores, dein si intestina adhuc scrotum inguenque occupent, illa prius reponenda, tumorque omnis premendo abigendus; postmodum cutis apprehensa, attractaque, secundum inguinis longitudinem acutâ nouacula, sectione cutē tota diuidente aliquousque incidenda, indeque processus peritonæi ab eo in scrotum descendens, vasaque seminaria in se inclusa continens, apprehendendus, & ad exortum illius usque; à subiectis, quibus adhæret, vel solâ attractione, vel adhibito sectionis adminiculo, liberandus, atque iuxta principium illius, vinculo forti & crasso, ex filo cannabeo contexto excipiendus, valideque vinciendus, relictis vinculi extremitatibus extra corpus protendentibus, demum processus ille infra hanc ligaturam amputandus, & cum vasis seminariis adnatoque teste euellendus auferendusque. Quibus factis, æger in lectum collocandus; & quies decubitu supino, donec vulnus sanatum fuerit, retinendus, quod & vti reliqua vulnera, adhibitis quæ conueniunt, vel solâ ablutione, sæpè sanatur, & vinculis tandem recedentibus consolidatur.

Quod si rei Anatomicae peritus Chirurgus, ita processum dictum prius diuisum, & à vasis seminariis separatam, vincire possit, vinculo solum processum, nec simul vasa seminaria comprehenderet, tunc illis remanentibus, vti & teste, citra illius castrationem, quod maxime omnes optant, hæc sectio posset perfici.

Per puncturam citra sectionem aliqui hoc efficere tentarunt, qui acu longo scroti superiorem regionem perforantes, eamque per processum enarratum adigentes, filumque illi insertum trahentes, sic ligando per scrotum processum illum claudere se posse narrant, ut liberis quoque vasis seminariis, & remanente teste, sanentur.

Citra sectionem hernias curari posse, sæpius ante hæc audiui, sed dum hæc scribo, opportunè chirurgus quidam Gallus ad nos appulit, cui feliciter taliter medicanti spectator fui. Quæ ratio cum sine dolore aut saltem exiguo fiat, citraque hæmorrhagiam, est commodissima & tutissima, siquidem vasa sanguine neutiquam tinguntur, ideoque

meliùs conspici & tractari queunt; eoque magis optanda in masculis, quod citra testiculi ablationem & castrationem perficiatur, hoc modo.

Cauterium potentiale paulò supra testiculi regionem lateris rupti, vbi peritonæi processus saccum subit, collocauit, eâ quantitate, ut semî digiti longitudine & amplitudine cutem mortificando, escaram inuollerit, quâ mox discissa, aliud cauterium imposuit, donec cute integrè ablata, pinguedo apparuit, quam forpice discidit eousque, ut processus vasa seminaria deferens pateret. Quibus biduo peractis, vasa illa digitis à processu artificiosè separauit, & acu curuatâ filum subduxit, processum leuiter strinxit, nullum planè dolorem tunc inferendo. Filo postmodum successu temporis sponte elapso, admotis vnguentis sarcoticis, carnem calli instar sensim illic produxit, quæ eò faciliùs huic processui, cum tunica illa elithrois rubra carnosa musculosaque sit, accreuit, & sic premendo ac opplendo locum perditæ substantiæ, viam prolapsuris visceribus oclusit, sicque curam integrè & feliciter citra castrationem absoluit. Quâ ratione eum multos alios sanasse, ex literis testimonialibus, quas mihi obtulit, didici.

In aliis ventris rupturis, operatio hæc per sectionem aut cauterij applicationem, non aded, ut si in inguine fiat, faciliè institui debet, sicuti verò illa ad intestinorum repositionem aliquando, vti superius dictum, necessitate urgente tentatur, cum peritonæi diuisionis latera vix dum ita apprehendi & colligi vinciri que possint. Aliquando tamen & hac ratione, & præsertim quod caro luxurians faciliùs, vti dictum, dum vulnus coalescit, nascatur, iuuare potest. Quæ resupinato ægro, illicque vbi tumor eminebat, vulnere inducto, vel cauterio admoto, illiusque curatione decenti, quoque perficitur.

Vterus quando extra corpus cum sua ceruice prolabitur, cum hoc, quia connexus colli vteri dissoluitur, vti ostendimus, fiat, illeque connexus ægrè ampliùs reparari possit, curâ admodum erit difficilis; & si malum inueteratum fuerit, quia partes ab inuicem dissociatæ iam callo obductæ, consolidari ampliùs

Vteri p-
cidentia
curatio.

amplius nequeunt, impossibilis. Maior spes sanationis, si vterus nondum prodierit, sed in sinu inclusus persistat, maximeque si in profundo adhuc lateat, cum minor tunc facta sit fibrarum separatio. Cæterum ad curationem hanc perficiendam, tum perfectam, quâ partes hæ disjunctæ vniuntur, vel imperfectam, si hoc fieri nequeat, ut saltem prolapsus ille vitetur, primam illa causæ, dein morbo accommodanda.

Causæ quæ vterum propellit, ratione cura instituitur, si illa ante omnia auertatur. Quod fiet si quietæ maneant, aut leuiora saltem munia obeant: A coitu immoderato sibi temperent: Occasiones quæ eas ad sternutandum, tussendum & vociferandum adigunt, vitent: Et si gravidæ sint, quæ partum faciliunt, cum tempus instat, vsurpent. Dein & omni tempore, ut alius sine magno conatu respondeat, & victu & medicamentis eum soluentibus, procurent. Quo nomine potius purgationib. hisce utemur, quàm ut hæc humiditatibus illis, à quibus ligamentis vteri irrigatis, laxioribusque inde redditis, procidentiam nasci posse, voluerunt, expurgandis accommodemus: Nisi forte si mulier hisce in sinu abundet, aut fluore vterino simul laboret, ad lubricitatem huius viæ, quæ ut promptius vterus exeat, causam præbet emendandam, catharticis etiam fortioribus uti necesse sit. Qualia quæ non solum purgando, sed & validè siccando illud præstant, in fluxus vterini curâ abundè descripta fuerunt. Aliàs enim nisi ob hanc causam, ut corpus mundum & purum redditum rectius tractari queat, minusque curatio illuvis excrementorum impediatur, in causâ procidentiae tollendâ, euacuationes hæ per purgationes aut sanguinis missionem, aliòve modo factæ, paràm prodesse queunt.

Morbo qui duplex hic occurrit, nimirum vteri ipsiusque cervicis situs dislocatio, atque continuitatis seu connexibus cum partibus vicinis dissolutio, accommodabitur cura, si hæc prolapsa in pristinum locum reponantur, repositaque illic retineantur; & ut rursum cum illis à quibus auulsa sunt, vniantur, efficiatur.

Reponi debent ante omnia in sinum vteri, ea quæ ex eo exciderunt, & quoad fieri potest, rursum vterus sursum adigi. Quod ut facilius fiat, alui fæces atque vrina prius exoneranda erunt, ne hæc cum cervix vteri recto intestino incumbat, sibi que incumben-tem habeat vesicam, hæc sedes implendo, sicque viam hanc angustio-rem reddendo, vteri repositionem impedian-ter.

Quo facto, mulier in dorsum supina recumbens, cruribus distentis genibusque sursum attractis, manibus basin sacci prouoluti introrsum premat, sursumque in cervicem trudendo, sicque inuertendo, donec in sinum usque omnia remearint, adigat. Vel si ægrè succedat, obstetricis operâ hoc peragat, vel bacillo crassiore obtuso, panis inuoluto hoc faciat; quo & in sinum profundius quàm solis manibus, potest repelli. Aut ut minus lædatur dolorque inferatur, petacium ex panno linteo sæpius conuoluto, filoque strictè ligato paretur, & huic vsui accommodetur: quâ ratione toto biennio vterum propendentem, qui reponi aliis artibus minimè poterat, sursum pellendo, cervice sic ut lanij bacillo intestina solent, inuersâ, cuidam reposui, quæ adhuc viuit, & nihilominus aliquoties interea peperit.

Quod si verò quod minus vterus sinum de- nuò subire possit, tumor in hac propendentia subortus impediat, hic ante omnia erit tollendus; si inflammatio sit, hæc quæ huic sanandæ competunt, si alia inflatio, quæ eam discutiant, vsurpanda; qualia in tumore hernioso, si ille ob eandem causam reponi nequeat, conuenire diximus.

Ut promptius introrrumi queat, butyro, oleo & pinguib. inungatur. Quod si verò necessitas nõ exigat, satius erit ab illis abstinere, ne vnta citius rursum excidant, ad quod præcauendum, potius astringentibus, quæ asperiora hæc loca reddendo, ut firmius hæreant, efficiant, etiam antequam reponantur, vtendum: sicuti ea postea explicabuntur.

Ad retinendum vterum cum suo collo in suo situ, tum quâdo reposita sunt, tum etiam antequam exciderunt, sed easum minari videntur: utque etiam cum partibus vicinis

coalescant, variis medendi modis vtimur: quorum alij astringendo, siccadoque & glutinando, vtrumque præstant, vnde perfecta cura sequitur; alia verò tantum hæc retinent, curamque imperfectam atque vti vocant, palliativam solum post se relinquunt. Perficiunturque hæc tum illis quæ per os exhibentur, tum hisce quæ extrinsecus vteri regioni applicantur, vel collo cum vtero dum adhuc foris sunt, apponuntur, vel per ea quæ sinum vteri subeunt, aut etiam olfaciendâ, proponuntur.

Exhibita quædam, vti in herniis ad relaxationem vel rupturam peritonæi sanandam, & in vulneribus ad ea consolidanda, assumpta quæ iuvant, an hic quoque in hac dissolutione continuitatis aliquid præstent, tentare licet.

Præter quæ & hic pulvis sæpè sumptus, huic affectui præcipue accommodatur: R. radic. Tapfi barbari 3. ij. foliorum Myrti, femin. Pastinacæ domesticæ ana 3. j. rasur. Cornu cerui 3. β. Cineris ostraceorum vel Concharum 3. j. Coralli rubri 3. ij. fiat pulvis.

Extrinsecus vteri regioni, dum adhuc in suo loco est, antè, retrò & subtus, varia adhibentur, quæ astringendo vterum, ne facile labatur, contineant, & siccando an fortè collium diuulsum rursum sic coalescere queat, aliquid præstent, addendo quæ vtero appropriata illi robur addunt.

Quod sonèdo frequenter hæc sedes, vel balneo immergendo supra lumbos vsque, & cōtinuando per multos dies, effacere studebimus. Quæ ex decocto sequentium fieri possunt, factio in aqua Cisternæ, vel Fabrorum extinctionionis ferri, addito si præsertim pro foru eo vti velimus, etiam Vino, nonnunquam & Aceto. Sumimusque pro hoc decocto coquendo, rad. Bistortæ, Tormentillæ, Pentaphylli, summitates vel teneriora Quercus, Pyri & Pruni sylvestris, Mespilorum, Rubi, Myrti, Lentisci, Cisti, folia Pini, Cupressi, Lauri, herbas Bursæ pastoris, Verberacæ, Verbasci, Millefolij, Sanguinariæ, Hedera, Polygoni, Herniariæ, Absynthij, Centaurij, Artemisiæ, Matricariæ, Rutæ, Betonicæ, Ladi, dulæ quam Casia nomine Diosc. in hoc casu commendare putant.

Item cortic. Granatorum, capularum Glandium, Gallas, Spongiam bedeguar, nuces Cupressi, Lentesc. Cineres rubr. baccas Myrtillorum, Rhoeis obsoniorum, Lauri, flores Rosarum rubr. Balauftia, Psylidia, flor. Stœchados vtriusq; Saluæ & Rosmarini, Muscum ite pulzonarium, quem Vsnæam vocant. Horum plurimum pauciorumve decocto, si efficacius operari velimus, Alumē vel Sal addim⁹, aut parum Chalcathi; Vel Bolū aut Gypsum incoquimus, vel Scoriam ferri.

Aquæ naturales thermarum atramento, sæ, aluminosæ, salis, vel in quarum stillicidio tophi multi gignuntur, cumque decoquantur multum calcis vasis adhæret, ad mensem vel ultra, vt solent, cōtinuatæ, plurimum sæpè profunt: cum licet madore suo humectare videantur, tamen non solum potentiâ, sed & sudores mouendo, humoresq; absorbendo, exiccare eas tandem & astringere effectus doceat, atque corrugatio cutis & asperitas, quæ inde sequuntur, satis ostendant.

Vngueta vel emplastra vteri regioni, circa pubem aut lumbos applicada, ex sequentibus fiunt: R. rad. Bistortæ 3. ij. rad. Cyperi, Herniariæ, Vsnææ ana 3. j. flor. Rosarum rub. Balauft. ana 3. β. Gallarum vel corticū Granatorum vel capul. Glandium 3. ij. nucum Cupressi, ossium Dactylorum vel Myrobal. vstarum ana 3. j. sem. Myrtillorum 3. β. Thuris vel Mastiches, Acaciæ vel Hypocistidis ana 3. j. Spicæ 3. β. Coralli rub 3. j. fiat pulvis subtilissimus, qui excipiat oleo Myrtill. vel Myrtino, aut Masticino, addendo tertiâ partem olei Laurini, Resinæ liquidæ Alicuius & Cerae q. s. fiat vnguentum: Vel additâ Resinâ siccâ, Pice & Colophonîâ fiat emplastrum.

Alia inunctio quæ ad abortū prohibendū vteri sedi illinitur, atque R. olei Rosac. simplic. vel Omphacini, &c. Item quæ sequuntur vnguenta duo ex puluerib. concinnata, hic quoq; inuncta, vel in formam emplastri redacta, & apposita idem præstabunt.

Visitata vngueta & emplastra ad alias fluxiones matricis, etiam ad vteri prolapsum cohibendum iuvant. Veluti vnguentum Comitissæ, emplastrum de Mastiche, contra Rupturam & similia.

Cataplasmata ex residentiâ decocti con-
tusâ, additis iam dictis oleis, apposita simili-
ter iuuabunt.

Vrticam admotam probat Dioscor. Quæ
recens contusa applicabitur.

Sacculi, prædictis pro foru remanentiis
impleri possunt, & hoc modo vsurpari.

Cucurbitæ maioris ventosæ dictæ, vel si
minores sint, trium vel quatuor, affixio sub
umbilico in hypogastrio, sæpè repetita, ad
retinendum vterum in suo loco, aliquid ad-
jumenti adferre fortè poterit.

Foràs propendèti vteri basi cum suo col-
lo, quædam applicantur, quæ postquam hæc
reducta & in suam sedem reposita sunt, in-
ter ipsa & partem vnde diuulsa fuerant, in-
teruenientia, hæc loca vtrinq; adstringen-
do & corrugando, vt minus promptè rela-
bantur, efficiunt, præcipuè verò si hæc simul
vi siccantè & glutinâtè prædita sint, in con-
solidandâ iterum, hac diuisione, plus quàm
vlla alia, cum glutinis instar hisce sint in-
terposita, præstabunt.

Fouendo procidentiam illam antequàm re-
ponatur, hoc possumus efficere, cum deco-
cto forus, quo vteri regionem foueri debere,
vel immergi, diximus. Cui ad consolidan-
dum, radicem Consolidæ maioris Narcissi,
aliaque in vulnere consolidatione exposi-
ta, addere possumus: Vel ex hisce solis, co-
quendo simul & Thus, Mastichen aliaque
gummosa, forum parare.

Cum magis adstringere volumus, nullâ
que spes cõglutinationis ob inueteratû ma-
lû; Spongiâ in Aceto rubro, aut Lixiuio vel
Aquâ falsâ, aut fluminosâ intinâta fouemus.

Vel linteolum in aqua Nucum aut cono-
rum Pini syluestris exstillatâ immersum
madefactumque applicamus.

Pulueres sacco huic propendenti, prius
madefacto, vel inuncto mucagine radicis
Consolidæ, vel in fus. Gummi tragach. vel
glutine ex Farinâ cocto, asperguntur, qui as-
peritatem nullam, ne cum collo posito,
sub eo hæreant, eum lædant, habere debent,
& proin vi glutinâdi potius quàm astringen-
dis præqualere. Qualis hic est puluis: R. Thu-
ris vel Mastiches 3j. S. Sarcocollæ nutritæ in
Lactē 3j. Mumia, Gummi Arabici, Acaciæ

vel Hypocistidis ana 3. S. redigantur in pol-
linem tenuissimum.

Inungi poterit hic puluis exceptus præ-
dictis mucilaginis, vel semin. Cydonio-
rum, vel etiam oleo Hypericonis, aliòve lo-
ca diuulsa consolidante, in vulnere cura
expositis.

In sinum vteri induntur, injiciuntur, &
intromittuntur sequentia, quæ iisdem viri-
bus prædita, & adstringendo hasq; vias ar-
ctando, prolapsum impediunt, & siccando
consolidandoq; aliquid insuper præstent.

Induntur Pessi, qui se adeò longi & crassi
formantur, & vinculis, fasciis aut subligacu-
lis adeò stringantur, vt nō solum noctu sed &
interdiu inter deambuladû retineri possint,
vterumq; sustinèdo, illius descensum non so-
lum illorum efficaciam, sed & hoc modo, vti &
globum inmissum idem facere ostendimus,
prohibebunt.

Præparantur hi ex vngueto prædicto, ad-
ditâ Pice, in emplastri durioris formâ reda-
cto, atq; ex eo formâdo magdaleonè, eâ figu-
râ quæ linû vteri impleat, illiusq; fundum at-
tingat. Cui & alia gummosa in Aceto dis-
soluta permiscuntur, vt Galbanum, Bdelliû,
Sarcocolla; dein & Oppopanax, ad 3. S. Qui-
bus & deterrimi odoris Assam foetidâ, vt vte-
rus, sicuti putant, retrocedat, miscent: quod
tamè non adeò, ne inuisa fiat mulier, vitium-
que hoc odore prodatur, necesse est.

Ex emplastris, quibus admotis perito-
neum ruptum, interdum carnè nouâ accre-
scente, consolidari posse ostendimus, idem
fortè in hac fibrosæ continuitatis solutione,
simili modo operabuntur magdaleones hoc
pacto formati, ideoque non sine successu, si
quid spei subest, gestari possunt.

Possunt & alij pessi eiusmodi, ex pulueri-
bus prædicti vnguenti parari, si prius Albu-
mine oui, vel infusione Gummi tragachan-
ti, aut mucagine radicis Consolid. aut Cy-
don. incorporati, sacculo in farci, sic immit-
tantur, & diu retineantur.

Quod si eiusmodi pessi molestiam exhi-
beant, & minus commode diutius possint
retineri, alij minores digiti crassitie & lon-
gitudine, more cõsueti, qui noctu retinean-
tur, ex prædictis parentur.

Vel horum

Vel horum loco Lana madefacta in Albumine oui & Aceto, pulueribus conspersa inditur.

Aliud pessarium, in fluore vterino albo descriptum, quod R̄. Gallarum vel capul. Glandium, &c. & hic poterit competere.

Ex Ovo cui Gallina diebus aliquot incubuit, confraeto, Vitellum cum Albumine exemptum, mistum, Lanaque exceptum, atque inditum, aliqui probant.

Globo seu Pilâ rotundâ in sinu vteri gestatâ, mulieres quò minùs vterus exeat, communiter solent prohibere. Quæ huius magnitudinis esse debet, vt sinum adimpleat, & tamen orificium ipsius externû subire possit, ac citra vim maiorem intrudi. Item levis & lubrica seu polita, ne asperitate suâ aut pondere, tenera hæc loca lædat vel grauet, sed dura interim, vt vterum melius sustineat, & sicca, ne si mollis esset, vel diffunderet, aut si humorê conciperet, minimè subsisteret, sed facillè iterû elaberetur. Paraturq; hoc modo ex cortice leuissimo Suberis vel Betulæ, duo segmenta si vnû non sit satis crassum, conglutinâdo, & in formam globi torquendo. Vel sumendus glomer, qui ex filo conuoluto formari solet. Talisq; globus corticeus vel filarius in Cerâ dissolutâ tamdiu volutetur, donec planus & æqualis fiat, ceraque aliquousq; obducatur. Quem appenso ligamento vt rursus eximiqueat, mulier sinui vteri indat, eumque interdum quamdiu erecta manet, vel etiam noctu decumbens, ne opus sit sæpiùs factum iterare, gesserit: & ne vterus prolabatur, retineat, nec facillè nisi cum se viro coniungere vult, eximat, quod tracto ligamento promptè fiet. Quæ ratio vterum cohibendi, etsi molesta nonnihil sit, minùs tamen impedimentum quàm si vterus prolabatur, adfert.

Injiciuntur in sinum cervicis vteri per syringam, quæ idem præstent: potestque sumi Decoctum prædictum pro fotu descriptum, aliquotiesque repeti, quod sic iniectum, potentius, quàm si foris tantum adhibeatur, operabitur.

Efficax iniectio ex paucioribus sic fit: R̄. Gallarum ʒ. iij. Vîneæ ʒ. ij. rad. Consolidæ ʒ. j. Herniarie siccae ʒ. ij. Absynthij ʒ. j. Boli ru-

bri ʒ. j. cinerum Sarmentorum ʒ. ij. coquantur in Aqua ferrata, & tertiâ parte Vini rubri, ad mensuram j. Pro injectione.

Intrōmittuntur in eundem sinum, eoque excipiuntur, Suffitus, ab eodem decocto profotu dum adhuc fouet, exhalantes, qui cum penitus subeant, atque vndiq; se insinuent, multum proderunt.

Vti & illi qui à decocto rad. Consolidæ, Bistortæ, Caulium stipitibus, summitat. Buxi cum foliis, exhalant.

Fumi admissi potentius adhuc siccando & fuligine quæ se affigit, operantur, excitati à Thure, Mastiche, Succino, Ladano, Asphaltheo seu bitumine natiuo, Pice, Colophonîâ. Quibus & foetida, quorum odore vterum refugere existimant, miscent: Veluti Galbanum, Castorium nonnunquam, & abominabili odore præditam Assam foetidam. Quibus & alia ex astringentibus pulueribus addi possunt, & Resinâ aliquâ in trochiscos redigi.

Sandaracham Græcorum quam Auri pigmentum vocant, aliqui miscent, quæ potenter siccet. Verum cum noxius illis sit fumus, tutius Sandarachâ Arabum, quæ Gummi est, quod Vernicem vocant, vtremur.

In fluore vterino descriptus fumus, qui R̄. Mastiches ʒ. ij. Thuris, &c. hic quoque conuenire poterit.

A stercore bubulo aut bouino exiccato, carbonibusque iniecto, fumum suscitatum exceptumque, multum efficere, experientiâ compertum.

Et si exuperans in Vngula mulæ tuber vtatur, illiusque fumus admittatur, mira præstare aiunt.

Multa præter enarrata remedia etiam ea quæ sanguinem menstruum immodicum sistunt, extrinsecus admota, vel indita aut iniecta, hic quoque adstringendo ad vteri retentionem opitulari possunt. Verum cum si mulier adhuc statuto tēpore sua habet menstrua, hunc fluxum suppressere possent, satius ab illis erit abstinere, atque iam dictis huic affectui dicatis potius vti, nisi fortè cum tempus menstruorum iam præterit, aliqua quoque ex illis adhibere placeat.

Odoribus vterum allici iucundis & suauibus

uibus, pelli verò tetrīs & fœtidis existimant, eoq̃ue nomine illa naribus, hæc pudendo admota, vterum vt minùs descendat, magisq̃ue fursum vergat, aliquid adiuuenti adferre credunt.

Vomitu vterum fursum trahi existimant, verùm cum & ille magno conatu perficiatur, non minùs atq̃ue sternutatio, premendo eum cum intestinis potiùs propellet.

Decubitu vterus quò minùs procidat, retinetur: & quamdiu decumbit mulier, maxime si corpus nò admodum erigat, vterus in corpore manet.

Postremò per conceptum, vteri procidentia etiam cauetur, quamdiu enim vterum mulier gestat, tamdiu ille prolabi nequit; cum enim ille statim post conceptum vnà cum fœtu augeatur atq̃ue increascat, nec tum quidem, multò minùs quando in molem iam excreuit, ventremq̃ue opplet, poterit in finem delabi, aut vterius descendere, sed tamdiu subsistit, donec fœtu excluso vteròq̃; iterum subsidente, pristinam paruitatem adeptus, denuò vt priùs in colli finem se inferere possit.

Podici
procidentia
cursatio.

Podex ob conatum validum inuersus, & vltra quàm par erat, vnà cum portione recti intestini similiter inuersà expressus, atq̃ue aliquandiu emanens, sponte interdum rursus in suum locum reducitur, vel si hoc nò fiat, faciliè reponitur. Si verò sæpè hoc accidat, & quotiescunq̃; dejicit, aluus procidat, nec vel ob imbecillitatem, aut resolutionem muscutorum, retineri possit, difficiliùs curatur, omniumq̃ue ægerrimè vel nunquam, si ob auulsionem à membranis, quibus suspensus retinetur, procedat: In curatione causa primùm erit auertenda, postea morbo, hoc est huic ani situs permutationi seu procidentia accommodanda.

Causa vt declinetur, si conatus vehemēs, ob deiectionis difficultatem, prolapsus ani procreet, vt aluus liberè respondeat, atq̃ue fæces molliores & dilutæ sint, ne tanto conatu interegerendum opus sit, procurandū, illorumq̃ue nimia congestio impedienda; quod exhibitis iniectisque, victusque ratione idonea perficitur. Si ob partus difficultatem aut dolorem intensum in sectione lapi-

dis hoc accidit, hisce cessantibus etiam remittit.

Procidentia podicis quæ debetur cura, in eo versatur, vt prolapsus reponamus, & repositum retineamus, quæ variis modis perficiuntur.

Reponitur aluus intra corpus, manuali operâ ipsius ægri, vel chirurgi, premendo eum digitis, vel panno ad id formato.

Quòd si intumescencia quædam suborta vel inflammatio, hanc repositionem impediat, hisce primùm abigendis cura adhibebitur, eo modo sicuti in vteri procidentia, si hi humores quòq̃; superueniant, expositus fuit.

Retinemus aluum ne prolabatur variis remediis, quæ illud præstant, vel quia vias illas astringunt, vel separationem factam rursus vniunt, vel si ob muscutorum podicis refrigerationem nimiam vel imbecillitatem aliam aut resolutionem, retineri nequeat, quæ ea corrigant; quod exhibitis, extrinsecus admotis, podicique applicatis, in eumq̃; intromissis, perficitur.

Exhiberi possunt, si à soluta continuitate alui exitus dependeat, quædam ex illis; quæ in eadem causa in vteri procidentia exhibitæ, aliquid consolidando efficere posse, illic ostendimus, abstinendum tamen à nimium astringentibus, ne hisce aluum difficiliorem reddendo, & proin conatum maiorem excitando, illius prolapsus potiùs promoueamus, quàm impediamus. Dein & si à resolutione ab humore defluente progressa, ani exitus, vti putant, procederet, illius causâ & purgantia & alterantia in paraly si descripta, etiam propinari possent.

Prominenti podici & cum portione recti intestini inuerso, eadem quæ in vteri procidentia fomenta applicata, & pulueres iidem aspersi, hîc quoq̃; simili modo usurpata conueniunt, eundemque effectum, podicem retinendo, firmandoq̃ue, præstare possunt.

Præter quæ etiam alij pulueres, quales in vteri simili affectu còmodius sinui illius, formâ pessarij indi, quàm foris propendenti apponi debere diximus, hîc ano suppositoriij instar suppositi, quia eum stimulando, mox ærum excernerentur, illi antequam reponatur, priùs inuncto vel aliquo hu-

medtato, vti in vteri exitu dictum, aspergi debent.

Veluti hunc puluerem: R̄. Gallarum 3.ij. Balauft. 3.j.β. Mastiches, Thuris ana 3.j. Succini, Sanguinis draconis ana 3.β. Cornu cerui vsti, Antimonij ana 3.j. fiat puluis subtilissimus.

Huic etiam addi potest Bitumen, Pix; Itē Cochlearum putamina, Pisces salsi, Fimus caninus, Seta porcina, & similia prius vsta.

Aut etiam de pulueribus in Vngueto pro vteri procidentia descripto quædam sumi.

Vel etiam ipsum vnguentum podici adhuc exerto inungi.

Intromissi in podicis & recti intestini interiora, suffitus, fumi imprimis, hic, cum anus alia crassiora immissa, vel liquidiora iniecta, non retineat, præ cæteris conuenient. Poteritque & suffitus in vteri exitu descriptus, hic quoque vsurpari: Vel ab aliis & imprimis à decocto Tapsi barbati in Aceto facto fuscitari: Vel vapor qui ab Aceto supra lapidem Molarem candentem fuso exsurgit, podici excipi.

Fumi item ex gummosis & resinosis, illic nominatis accensis excitati, admisti multum proderunt, omisis hic summè sceleratibus, Afsa scilicet & Castorio, addendo tamen & Bdellium, interdum & Acaciam, Hypocistidem, aliaque quædam ex astringentibus: vti & ex aromaticis, Galangam, Cyperum, Gariophyllos, Macerem, Nucem mosch. flores item Rosarum, & Verbasci, similiaque.

Extrinsècâ fouetur vel balneo immergitur inferior corporis sedes subtus circa anum, & lumborum regionem, hisce quæ adstringendo anum retineant, & consolidando, si connexus illius solutus sit, eum rursus vniant; dein & quæ, si musculorum adfit imbecillitas, vel refrigeratio, calorem naturum fouendo & calefaciendo, frigidâ conceptam intemperiem corrigant, deniq; proprietate quadam cum neruoso genere, maxime si à resolutione procedat, robur hisce addant.

Fiuntque hæc ex decoctis plantarum adstringentium & consolidantium quarundâ, in vteri procidentia descriptarum, plura

pauciorave ex illis sumendo, atque in liquore aliquo, vt illic quoque ostensum, coquendo, addendo hisce etiam ex calefacientibus illic recensitis quædam, imprimisque ea, quæ (vt diximus) neruis appropriata sint, vt Chamæpythim, Saluiam, Primulam veris, Absynthium, Marrubium, Betonicam, Pulegium vtrumque, flores Chamom. Anthos, Stœchados & similia.

Aquæ thermarum in vteri procidentia conuenientes, hic similiter congruunt, illarumq; vsus continuatus nonnunquam iuuat.

Vnguenta & emplastra illic descripta, hic quoq; possunt competere, lumbis vel etiam podici admotâ, quibus musculorû & neruorum causâ, si hæc labefactata sint, etiam calida admiscantur olea: Veluti Costinum, Nardinum, Laurinum, Vulpinum, de Castoreo & similia: Item pulueres Costi, Galangæ, Cyperi & quorundam aromatum: Et præter emplastra vsitata illic nominata, etiam Oxycroceum & Ceroneum.

Cataplasmata similiter ex resistentia decocti supradicti fieri possunt, vel ita parari: R̄. Herniariæ, Vlnæ sicc. ana 3.β. Gallarum 3.j. farin. Orobi vel Lentium, vel Cicerum rubr. 3.ij. radic. Cyclaminis 3.β. Chamæpythid. 3.j. Stercoris capræ vel columbæ vel hirundinum aut etiam lacertarum ad 3.j. olei Myrrill. vel alterius & succi Herbæ conuenientis ana q.f. Pro cataplasmate.

Torpedinem marinam admotam iuuare docet Dioscor.

Sacculos, vti in vteri prolapsu similiter ad mouere possumus, qui si podici apponantur, vti & alij Puluini duriusculi, eum sustentando premendoque simul cohibere possunt, quod fieri illis insidendo, vel firmiter podici subligaculis aliisve pro cuiuslibet industria excogitatis, eos alligando stringendoque.

Linguae procidentia cum vix nisi à mortali læsione proueniat, lethalis plerumq; est, quod si superuiuant, aliis potius accidentibus grauioribus quàm huic cura adhibetur.

Testium procidentia à dissecro scroto eueniens, facili negotio curatur, si reponantur illicque contineantur, curaq; vulnere etiam citra suitionem, adhibeatur.

Lingua
procidentia
cura.

Testium
procidentia
cura.

Oculorū
p̄ciden-
tia cura.

Oculorum proidentiam, quæ vix nisi ab extremâ vi capiti aut oculis illatâ procedit, cum mors plerunq; sequatur, non est quodd in illius curâ laboremus; eoque minùs, cum etſi viui manerent, hæc diſſolutio ex parte facta, reparari minimè poſſet, oculusque vt in priſtino ſtatu permaneret, firmari, aſtringentiaque in hoc caſu applicanda, potiùs oculum corrugando, cecitatem inducerent, quàm vt in ſua ſede diutiùs remaneret, eſſicerent.

~~~~~

## DE EFFLATIONE.

### CAPVT III.

#### Genera.



EFFLATIONEM vocamus eam excretionem, per quam non ſolùm flatus efflatur, vnde nomen accepit, ſed & ſpiritus vel aer exſpiratur, quæ etiam efflari dicuntur. Efflatio verò eiufmodi ſpiritus ſeu exſpirationis quæ per nares & os fit, dicitur Exſpiratio vel Exfuſſatio; flatuum verò efflatio ſeu emiſſio per os, Ruſtus vel Crepitus oris: per podicem verò Crepitus ventris vel ani appellatur. Tales autem efflationes præternaturales exiſtunt, ſi deprauata hæc ſpiritus fiat exſpiratio aut flatuum emiſſio; vel vitioſa, ob vitium quod vel ſpiritus vel flatus cōtraxerunt; vel ſi hæc per viam non competentem erumpant.

Efflatio  
præ-  
natu-  
ra-  
li.

Deprauata exſpiratio exiſtit, ſi illa interrupta, vel nimium vehemens, vel diutiùs continuata exfuſſetur, interdum cum ſono alieno, aliàs & cum excretionē aliquâ, non ſolùm obſcurâ aeris, ſed materiæ alicuius manifeſtâ, in cita reſpiratione, ſuſpirio, oſcillatione, ſingultu, ſternutatione, tuſſi, emunſtione, exſpitione, ſcreatu, vomitione; ſicuti in deprauatâ reſpiratione, quò hæc etiam pertinent, hæc fuerunt expoſita.

Stertor  
naturum.

Ad deprauatam hanc reſpirationē, etiam Stertor pertinet, in quo ſonus admodum diſſonans ſe offert. Qualis dormientibus plerunque aliquibus accidit, qui dum noctu ſterunt, alios non ſinunt dormire, vel dor-

mientes excitant: Vitium quod & vigilantibus quibuſdam contingit, & affectuum quorundam comes, vt apoplexiæ, epileptiæ, plerunque etiam dyſpnœæ, ſicuti in enarratis affectibus illius quoque meminimus.

Emiſſio flatuum per os in ruſtu edendo, vel per aluum in crepitu emittēdo, quocunque modo fiat, ob ſonum alienum, quem crepando edit, nonnunquam & ſœtorem, deprauata eſſe cenſetur, eoque magis, quòd cum eiufmodi flatus cohiberi poſſent, tamē emittātur: vnde & magis indecentes hi crepitus, quàm alij ſonus, qui in reſpiratione deprauata, vt dictum, eduntur, etſi cum clamore, vt in ruſſi & ſternutatione ſiant, cenſentur, quòd hanc efflationē reprimere nullo pacto queamus.

Ad præternaturales eiufmodi ſonos, qui in flatibus hiſce emittēdis ſe exerunt, etiam eos referre poſſumus, qui licet non ſtatim cum flatibus, à quibus proficiſcuntur, è corpore prodeant, ſed corpori incluſi audiantur, tandem tamen per ruſtum aut crepitum erumpunt. Quales ſub hypochondrio vtroque, ſiniſtro tamen frequentius ſe offerunt; qui ſi aquæ fluctuantis ſonum exprimant, Fluctuationes; ſi murmur, Murmura; ſi rugitus, Rugitus appellantur: aliàs verò alios ſonos repræſentant, vt ranarum vel aliorum animalium, vnde poſtea hæc reuera in ſeſiſ contenta, eiufmodi ſonos edere, ſibi imaginantur. Eiufmodi ſoni virginibus ſunt frequentes, & aliis quibuſdam, atque morborum quorundam, ventriculi & inteſtinorum ſcilicet, ſunt ſymptomata. Alibi etiam in vêtre, imprimis in vmbilici circuitu, eiufmodi ſoni cum ſtrepitu audiuntur, & extuberantiâ quadam vagante, nec in eodem loco perſiſtente: Quod frequenter etiam in ſanis, ante excrementorum excluſionem & crepitus euenire ſolet, aliis alio tempore. Et in colicis doloribus familiare quoq; exiſtit, vt in eo indicatum fuit.

Alij præter hoſce varij ſoni qui audiuntur, veluti in ventre hydropicorum fluctuans ſonus, in pectore ſtertor, ſibilus: Item pulſatio, in cordis palpitatione, quæ non ſolùm tactu deprehenditur, ſed & quandoq; auditur: Vti & illi quos æger tantum auditu perci-

Ruſtus  
ſeu crepi-  
tus oris.  
Crepitus  
ventris.

Fluctua-  
tiones,  
Murmura,  
Rugitus  
vtrius.

pit, aurium diuersi soni, cum hi non è corpore cum spiritu aut flatu erumpant, sed occlusi maneant, ad hæc efflationes minimè pertinent, sed ad alios affectus, in quibus se manifestant, vbi & describuntur.

Vitiosa exspiratio se offert, si spiritus qui efflatur, graui odore sit præditus, aut foeteat.

*Fætor oris seu anhelitus.*

Qualis per os dum expiratur in Fætores anhelitus, vel halitus aut oris, cum inde prodeat, nominato, exhalat, nunc stercoreosum, nunc cadauerosum, aut putrem casei aliorumve odorem redolens. Qui admodum molestus est, & ab astantibus facilius, quam ipso ægro percipitur. Et in quibusdam dum ieiuni sunt, vel saltem, vel magis se exierit. Aliàs nec postea cessat, sed omni ferè tempore perseverat; Aliquãdo post certorum duntaxat ciborum comestionem aut ebrietatem oritur, atque aliquandiu durat, & postea remittit. Interdum morborum quorundam est symptoma, & vel eos præire vel præfigere solet, quando citra aliam manifestam causam hoc vitium quod Stencheten / ac si dicas ægroturire, nominatur, in illis deprehenditur.

*Fætor narium.*

Per nares spiritus in expiratione efflatus, simili labe & odore tetro foetidoque imbutus, Exhalationem è naribus foetidam, quam Fætores narium appellant, gignit. Qui astantibus eumque odorantibus admodum grauis, sæpè & intolerabilis, diu sæpè eos qui hoc vitio laborant, aliis inuisos reddens.

*Fætor eruptionis seu narium.*

Emissio flatuum vitiosa in eruptione occurrit, in qua flatus nunc nidorosus quid, nunc foetidus, nunc aliud graueolens redolet: Vel in crepitu ventris, in quo plerumque foetidus odor excrementorum ventris expirat, grauiusque quam alia omnia, nares astantium ferit atque offendit.

*Efflatio è vulnere procedens.*

Per viam non competentè spiritus quandoque erumpunt, si non per nares & os, sed vulnus aliquod in collo vel pectore, quoties exspiratio fit, effletur, quod flammam admotam, si inde agitur, vti & tactu deprehenditur.

Flatus itidem non per interualla vti spiritus, sed confertim & simul per vulnus, in ventriculi aut ventris regione aliquando prorumpunt.

*Causa.*

Omnis efflationis præternaturalis, quæ in deprauata vel vitiosa expiratione vel emissionem flatuum oboritur causa, à spirituum vel flatuum eruptione incoeuiente vel infectione procedit.

A' spiritus seu aeris eruptione inconueniente, per asperam arteriam in fauces & nares, quo pacto exspiratio deprauata procedat, atque si alicubi impingat, sonus inde edatur, in deprauatæ respirationis causis fuit expositum.

*Spiritus exspiratio in nares impellens, causa Efflationis præternaturalis, Spiritus in nares impellens, causa Stertoris.*

A' cuius spiritus, per inspirationem naribus attracti rursusque expirati impulsu, Stertor dictus quoque enascitur: In illis maxime, qui resimas habent nares, vel in quibus alioquin illarum amplitudo à natura angustior est, aut aliis de causis collapsa, vel ex parte muco aut pituita infarcta aut obturata, tunc in angustis illis refractus sonum illum in stertore dicto profert. Idque inter dormiendum potius, cum tunc ore clauso per nares saltem aerem haurientes, validius eum attrahant: præsertimque si supini iaceant, pituita tunc facilius eò delabente illicque hærente. Quæ & in morbis quibusdam, si ad nares perueniat, illicque subsistat, stertorem in illis excitat, vti in epilepticis, apoplecticis, caro, symptoma hoc illis confuetum existit, à causis illis in locis explicatis profectum.

Per vulnus aliquod asperæ arteriæ vel pectori inflictum, spiritus per viam incompetentem sequitur efflatio. Quæ vulnera quandoque studio, aperturam factam pectori in empyemate, vel asperæ arteriæ in angina, sicuti illic fuit ostensum, infliguntur, aliàs casu accidunt.

*Spiritus & flatus è vulnere eruptio, causa Efflationis præternaturalis.*

Flatuum quoque è ventriculi vel ventris sede eruptio, si illa loca vulnerentur, sequitur; In sectione hydropicorum, vel casu contingentibus vulneribus.

A' flatibus à ventriculo sursum per cesophagum & fauces erumpentibus, ructus, & ab illis qui per intestina deorsum per rectum intestinum & anum exeunt, crepitus ventris procedunt, sonum & bombum eò maiorem edentes, quo maiori erumpunt impetu.

*Flatus à ventriculo per os erumpentes, causa Ructus.*

Qui



*Flat<sup>us</sup> ab intestinis per podicem erumpentes, causa Crepitus ventris.*  
 Qui flatus si ventriculo intestinisve inclusi retineantur, nec exitum inueniant, discurrendo per horum cavitates & ductus, murmura rugitusque in abdomine edunt, circa sinistram maximè hypochondrium, si in ventriculo vel illi substrato & annexo intestino colo coërceantur, cum hæ partes hanc sedem potissimum occupent, (quod tamèn causâ lienis, qui flatibus impleri nequit, communiter putant accidere) vel etiam in aliâ ventris regione hi rugitus audiuntur, si alibi intestinis inclusi sint, maximeque circa umbilicum, propter tenuium illic intestinorum conuolutionem. Quorum flatuum causas, in variis ventris & intestinorum affectibus exposuimus. Inter quas & coarctatio hypochondriorum in virginibus, quam vestibus arctè strictis quòd graciles appareant, sibi conciliant, existit; sic namque flatus coacti murmura illic edunt, & ut turpiter se sapè dent, occasionem frequenter præbent.

*Flat<sup>us</sup> in ventriculo & intestinis humori per mixtus, causa Fluctuationis in ventre.*  
 Sed & præter hosce flatus simplices, si flatus alius humori in ventriculo aut intestinis contento permixtus fluctuet, tunc fluctuans sonus cum rugitu se offeret: vel si humor solum agitated hunc sonum edat, fluctuans tantum emerget. Quod ut à variis sit causis, in ventriculi affectibus expositis, sic & frequenter aquâ assatim bibitâ, aliòve liquore, si tunc corpus agitetur, ventriculusque comprimatur, fieri obseruamus.

*Spiritus infectio ab assumptis prioribus a lano oio re profecta, causa Anhelitus terti vel secundi.*  
 Ob infectionem spiritus ab illis quæ tetrum odorem exspirant, factam, Halitus foetor, uti & Narium & Oris exsurgit. Atque si flatus hoc pacto odorem ab illis concipiant, Ructus graueolètes vel Crepitus foetidi prodèunt. Qui foetor à variis assumptis vel excrementis dependet.

Assumpta quædam si alieno odore prædita sint, eo anhelitum inquinantia, ut illa aliquamdiu redoleat, efficiunt; eoque magis, si in ore aut dentium interstitiis diutius hæreant; in ventriculum quoque delata, odor ipsorum teter per os exhalatur: veluti ab esu allij, casei putris similiumque accidit: Et ab aliis, quorum odor etsi non adeò grauis, tamen astantibus nauseosus & ingratus: ut à vino in ebriis, vel ab aliis pinguibus cibus halitus vel ructus. Multa quo-

que non per se odore graui prædita, sed putredine vel corruptione demum illum adipiscuntia, halitus vel ructus eodem insciunt: veluti in ore caro, si dentium intervallis, & maximè in dentibus erosus vel cauis hæreat, ob moram & locum quoque, si ille similiter corruptus sit, putrescens, pessimum odorem acquirens, oris foetorem parit. Quæ & in ventriculo corrupta idem potest efficere, quod & facile in quibusdam hominibus & animantibus euenit, è quibus illa ferè sola, quæ carnibus vescuntur, anhelitus foetorem aliquando concipiunt. Dein & alia multa, per se alioquin non ingrati odoris, in ventriculo corrupta (quod facillimè fit) ut raphanus comestus, qui ructu pessimi odoris efficit, tetrum anhelitum pariunt.

Excrementa foetida vel alioquin graueolentia, intrinsecus in intestinis ventriculo aliisve cavitatibus, ad exteriora pertingentibus, latentia, odores ipsorum tetros inde, vel exhalatione aut cum flatu emittunt: vel si extrinsecus sint, ab illis locis exspirant.

In intestinis excrementa contenta, cum suâ naturâ foeteant, eoque magis si biliosa vel aliis prauis humoribus commista sint, foetor ille non tantum cum excrementis inter deiciendum se profert, sed & cum flatibus, qui in intestinis facile colliguntur, & ab excrementis foedum hunc odorem concipiunt, per podicem erumpentibus, crepitu, (ut dictum est) se prodit, excrementorumque odorem prauum, à quibus exspirauit, refert.

Sed & oris foetidus anhelitus, ab intestinorum excrementis prodire solet, quando ob nimiam laxitatem & dilatationem ventriculi, illiusque præsertim orificij, pylori dicti, quæ in intestina se aperit, is nimium patet, vixque exactè amplius constringi occludique potest, sicuti naturaliter fieri debet, tunc foeda excrementorum exhalatio, sursum per intestina expirans, per apertas hasce & laxas vias, in ventriculum, indeque ad os vsque delata, anhelitum foetore suo inscit. Quam nos præcipuam causam illius oris foetoris, qui stercoreosum odorem exprimit, esse, diligenti inquisitione deprehendimus; ob id adeò perseverantem & perti-

*Ventriculi atque intestinum excrementorum odor teter vel foetidus, causa Anhelitus, Ructus, Crepitus graueolentis vel foetenti.*

nacem, cum ab organi vitio procedat, quod ægrè reparari potest. Cui occasionem crapula diu continuata præbere solet, ex qua tandem venterculus aded laxus redditur, vel alia illius imbecillitas sequitur; sicuti in ventriculi imbecillitate id expositum fuit.

In ventriculo excrementa quædam alieno odore prædita, vel fœtentia, illic genita, vel eò delata, eundem odorem per œsophagum interdum eructant, vel sursum exhalantia anhelitum inficiunt: sicuti in multis morbis, illisque præsertim, in quibus excrementa circa ventriculum in venis meseraicis retenta, putrescunt, in eumque deferuntur, hic oris fœtor, quem *Sicthelen* vocari diximus, eos præcedere & postea comitari solet.

*Oris odor fœtidus vel fœtor, causæ Anhelitus fœtoris.*

In ore & faucibus non solum ex comestione graueolentium, & corruptione facta in dentibus, vti dictum, os fœtidum redditur; Sed & à salivâ vel aliâ oris humiditate, hoc interdum quoque accidere solet, quando fœtidis humoribus inquinatur, sicuti in lue venerea à pravis humoribus ex inundatione hydrargyri, ad os vt expuantur compulsi, oris fœtorem, aliis tunc oris accidentibus iungi videmus. Limus quoque dentibus adnatus, si exuperet alicubi, vbi inter masticandum non aufertur, odore aliquo ingrato tandem etiam os imbut. In vlcerebus faucium & oris partium putredo nata, fœtori oris quoque occasionem præbet, cum pus aliquin naturale minime fœteat: vti & in vlcerebus pulmonum, nisi putredo adsit, ratione puris vix fœtor aliquis, vti creditur, oboritur.

*Narium odor fœtidus vel fœtor, causæ inde progressæ Expirationis fœtore.*

In narium profundo, circa ossa spongiosa, & in antris cavis maxillæ superioris ossium, pituita, mucus, diutius retenta, nauseosum, vel si putrescant, fœtidum odorem reddentia, narium fœtorem dictum inducunt. Quod tum ob mucum illius tenacitatem, & commixtionem cum pravis aliis humoribus, tum etiam ob angustias harum cavitatum, vbi hæ sordes colligi, atque donec emungantur vel effluant, retineri solent, euenire potest, ab ortu sic constitutas, vel casu coarctatas, tunc ferè nasus naturâ, vel vi aliquâ externâ depressus apparet. Ab vlcere

ribus in abdito narium vel illius amplitudine aliquâ latentibus, hoc idem accidit, fœtorque ab illis pro ratione vlcis putrescentis teter exspiratur, sicuti in narium vlcerebus hoc fuit declaratum. Ab humoribus intra calvariam circa organa olfactus, vel etiâ in ipsis cerebri ventriculis putrescentibus, idem fieri scribunt; sed veritati haud consonum esse videtur, tantam putredinem in cerebro gigni, quin longè grauiora accidentia, & mors interdum ipsa sequatur.

### Curatio.

**E**fflationis præternaturalis, quæ à deprauata expiratione dependet, cura, in deprauata respiratione fuit exposita.

*Efflatio præternaturalis curatio. Stertoris narium curatio.*

Nec alia curatio stertori huic, qui narium angustia causâ sit, quam ea, quæ respirationi impeditæ, ob narium obstructionem vel coarctationem debetur, & illic quoque fuit declarata; vbi ostensum, quomodo nares ab adhærente muco, & pituita expurgari debeant: quod vitium tamen, si instrumenti sit, ob nares resimas vel alioquin angustas, vix penitus auferri potest; emendari tamen nonnihil, si decubitu erecto nec supino, sed in latere dormiant. In equis hic stertor, naribus sectione patefactis, emendatur.

Crepitus oris & ventris, etsi vtilis, in decori tamen cum sint, honestatis causâ potius retinendi sunt, vel in secensu ab hominibus seorsim emittendi. Quod si aded vrageant, vt ægrè & cum damno impediuntur, flatuum proventus erit amoliendus. Quâ ratione & murmura, & rugitus ventris impediuntur: Cruditatem arcendo, & foris ad motus introque exhibitis, flatus discutiendo, quorum formulæ in imbecillitate ventriculi propositæ fuerunt. Quibus plerunque lieni appropriata, in rugitu hypochondriorum virginibus familiari, permiscere solent, quod quidem si prodest, non quod à liene hi flatus prodeant, aut illic contineantur, vel inde proficiantur, vti crediderunt, sed quod externorum quæ sinistro lateri applicantur remedium vires, ad lienem quoque pertingant, idcirco aliquo

*Crepitus oris & ventris curatio.*

*Ventris murmuris, rugitus & flatuum curatio.*

quo pacto huic accommodari debent. Vt cum sacculis ex Cumino aliisque flatus discurientibus paratis, semen Viticis, Rutæ, Ceterach, similiaque permiscemus, Acetoque pulveres fricamus, vel olea splenetica inunctionibus quæ flatus pellunt, addimus.

*Fætoris anhelitus* Halitus seu anhelitus fætidus ex ore prodiens atque Oris fætor ob id vocatus, si ab assumptis proueniat, eaque vel in ore grauem odorem expirent, vt allium, vel eruant, vt raphanus, sponte breui post tempore cessat, quo à colloquio cum hominibus propinquiore abstinere, vel si necessitas exigat, odoratis, vti dicetur, anhelitum corrigere possunt. Si verò quia dentes immundi sunt, vel ipsorum interstitiis angustis, vel cavitatibus quando erosi sunt, cibus inhærens putrescit, vel ob alias sordes in ore collectas, hoc fit, cauendum ne quid dentibus inhæreat, atque os diligenter expurgandum, dentes erosi & vitiati euellendi.

Si causâ ventriculi eueniat, ille erit repurgandus atque castigandus, si in morbis quibusdam accidat, vti & in lue venereâ, hisce morbis sanandis opera dabitur, quibus sublatis iterum remittit; si ob ventriculi laxitatem hoc fiat, fætores ab intestinis ad os pertingente, immedicabile ferè est malum organicum. Interim tamen ventriculus roborandus constringendusque, & in omnibus hisce causis, odoratis in ore retetis, mastificatis, illisque os colluendo, gargariando, eaque deuorando, fætores corrigimus. Quæ omnia sequentibus modis administrantur.

Exhibentur purgantia, si in ventriculo causa lateat, quæ accommodatur excrementis fætores excitantibus, vel humiditatem relaxanti. Inter quæ pilulæ ex Aloë paratæ, cum ventriculum egregiè abstergant, & putredini resistent, valde sunt accommodatæ. Vel Vinum purgans Absynthio addito, quod idem facit quod aloë, & simul est odoratum. Sicuti & aliæ multæ purgantium formæ, quæ in ventriculi imbecillitate fuerunt expositæ, & recipiunt purgantia, inter quæ & myrobalani & rhabarbarum in hoc casu commendantur. Hic ta-

mèn multa odorata illis permiscenda, quæ fætores corrigunt, tam plantæ quàm aromata, vnde & pilulæ Alephanginæ, de aromaticis dictæ & paratæ, sæpè sumptæ profunt. Et vino purganti radicem Angelicæ similiaque multa boni odoris, mox explicanda, addimus.

Alterantia propinata ventriculum roborare debent, excrementorum prouentum impedire; quod in victus ratione præstatur, dandò cibum paucum, minimè excrementitium, ad siccitatem tendentem. In carnis esu, cum facili, vti dictum putrescat, sint temperantes, eamque aromatibus, aceto, aliisque succis acetosis, Citri, Limonum, Arantiorum, antequam comedatur, condiant; Vti & alios cibos. Pani semen Carui, Fœniculi, vti solent, permisceatur. In fine mensæ, Cydonia, Pyra, aliæve adstringentia in laxo præsertim ventriculo; Condituras item feminum Anisi, Fœniculi, Coriandri comedat, vel aliis pulueribus Post pastum appellatis, prandium claudant. Ieiuni manè pulueribus, tabulis, electuariis, conditis conseruis, in ventriculo humido & laxo vtilibus, in imbecillitate ventriculi descriptis, vtantur, ea ex illis quæ odoratiora sunt, eligendo, veluti Aromatic. rosarum, muscæ, Diamoschum, Diambam similiaque. Trypheram magnam, quod delicatos & colore & suauis halitu reddat homines, sic appellari creditam, probant: Mastiche sæpè deglutita, vitium hoc corrigere traditur.

In ore odorata, quæ suauis & amico odore os imbuant, quædam retinenda, alia etiam mastica, nonnunquam & deglutienda, sequentia.

Ex simplicibus, Angelicæ radix præ cæteris odorata sed amara; dein & Imperatoria, Zedoariæ, Nux moschata, Gariophylli communiter vsurpantur.

Moschus & Ambra in diuitibus ob insignem odorem anhelitus, hoc vitium egregiè corrigunt, mista cum saccharo, & in orbiculos vel trochiscos, cum infusione gummi Tragachant. factâ, in Aqua rosarum vel florum Arantiorum, aliæve odoratâ, redacta, eoque retenta, in quo dissoluta, vel etiam sensim deglutita, è faucibus odorem gratum

gratum spirant. Quibus & Lignum aloës, Santalum, Angelicæ radix addi possunt, quæ & ventriculo debiliori conueniunt: Vti & Benzoini portiuncula.

Præter hæc multa alia odorata sic masticari possunt, veluti radix Iridis, Acori, Cyperi, Enulæ, cortic. Arantiorū, Citrij, folia Rosmarini, Lauri, Serpilli, Apij veri petroselini vulgò dicti herbæ recentis masticatio, post allium aliavæ graueolentia comesta, tollit eorum foetorem, aliumque ex ore prodeuntem occultat. Idem præstare dicuntur folia Anethi & Anisi, Sonchi itidem, Myrrham & Resinam lentiscinam probat Dioscorides. Aurum in ore contentum commendat Matthiolus.

Ex compositis: Vinum conuenit pro oris collutione, vel etiam bibitum, in quo macerata sint radix & semen Angelicæ, Maioranæ, Salvia, Semen Coriandri, aliæque odoratæ dictæ herbæ, vti & aromata.

Acetum rosaceum, Ribes, Rubi Idæi, Fragorum, mirè efficax, cæteris collutionibus mistum, vel solum hoc & simplex ore retentum, vel deglutitum, odorem foedum ab assumptis mox emendat.

Vino rubro odorato, Aceto, addito Sale vel Alumine, os continuò abluant.

Decoctum Myrthi foliorum recentium in Vino valde prodest, pro collutione: item decoctum Citri aliorumve.

Aliud fit ex decocto radicum Cyperi, cortic. Citri, Rosæ, Santalo odorato, Gariophyllis, Cinamomo, decoctis in aquâ Cylternæ addito vino.

Aquæ stillatitiæ variæ odoratæ, sic quoque vsurpantur, veluti aqua Rosarum, Moschata, vel additis Gariophyllis, aliisque aromatibus, Sale, aquâ florum Arantiorum, quam Nasse vocant: Item Aquâ vitæ cum infusione Cinamomi & Aromatum.

Olea destillata Cinamomi vel aliorum odoratorum, mirè efficacia sunt, mista aliis, vel sola, si minima guttula eorum ore retineatur.

Fricandi insuper dentes, præsertim si immundi simul sint, odoratis abstergentibus & à putredine arcentibus.

Veluti: R. radicum Ireos 3. ij. Angelicæ 3. β. Santali odorati vel ligni Aloës vel ligni

Sabinæ bacciferæ aut Iuniperini 3. j. Galliæ moschatae 3. β. vel parum Moschi, Salis alkali 3. ij. Addunt os Sepiæ, Cornu cerui, Alumen vstum in dentium putredine, sicuti illic dicitur.

Vel Moschi tantillum adde cum Sale, vel Cornu cerui, vel aliis.

Exhalatio foetida è naribus, quam Nariū foetorem vocant, si ab vlcere exsurgat, eo curato, cessat, cuius curationem in narium vlceribus iam exposuimus. Si verò à morbo narium organico proficiscatur, ob illarum angustiam, vitium est ferè inemendabile, nisi præcaueatur, ne excrementa cerebri maiori copiâ vel planè nulla, eò defluant.

Quod si alioquin causâ fordium, quæ ob copiam vel prauitatem facile corrumpuntur vel putrescunt, foetor hic, quando hæc redundant, aut retinentur, exurgat, tunc curatio aggredienda hoc pacto.

Purgamus corpus decenter, & pro ratione humorum redundantium, medicamenta exhibemus, capitiq; imprimis ea accomodamus, passim in cerebri excrementitiis affectibus exposita.

Naribus attrahuntur errhina, vel eæ illinantur vnguentis, quæ abstergendo & irritando sordes promouent, odoreq; suauis sedes imbuunt. In quem vsu varia eiusmodi caputpurgia dicta, in cerebri præsertim affectibus phlegmaticis, fuerunt descripta, quibus odorata hic iam dicenda, admisceri possunt.

Succus Iridis attractus vel illitus naribus, valde efficax est & boni odoris.

Vel sic: R. succi Iridis 3. j. β. succi Maioranæ 3. j. Vini odorati vel Maluatici 3. β. misce. Cui & succus Betæ ad maiorem stimulationem addi potest.

Vel cum magna adest putredo, adde huic errhino, succi Centaurij, Absynthij ana 3. j. Aceti rosac. vel Squillitici 3. β. Myrrhæ 3. j. misce.

Succus foliorum Lauri & Myrthi, aliique odorati addi possunt.

Inspissantur hæc quandoque vt melius hæreant, & illini possint, hoc pacto: R. prædictæ alicuius compositionis 3. j. β. adde Ladani, Storacis calamit. ana 3. β. Mel-  
lis vel

Foetoris  
narium  
curatio.



lis vel infusum gummi Trag. factæ in aqua aliqua Odorata q. s. ad formandum linimentum.

Ad odorem suauem conciliandum, odoratis, quæ attrahenda vel naribus etiam infundenda, utimur: ut Vini generoso vel maluatico, in quo folia Ocymi, Maioranæ, Calamentihæ, Lauri, flores Lauandulæ, Cinam. Gariophylli infusa macerataque sint.

Vela aqua stillatitia fl. Arantiorum, Rosarum, foliorum Limonum vel prædictarum quæ in Vino macerari diximus plantarum, vsurpada.

Vel aliæ suavis odoris, compositæ variis modis ex odoratis plâtis, seminibus, & aromatibus. Quibus tam simplicibus quàm compositis, si moschus vel ambra addantur, maiorem habebunt gratiam.

Inunctiones similiter odoratæ sunt ex Moscho, Ambra, dissolutis in oleo Been vel aliis, quæ tamen horum odorem non plane infringant, ut ferè fit, si hæc aliis compositionibus, ut multi docent, addantur: Ciueta per se inungi potest.

Olea stillatitia Cinamomi, Gariophyllorum, Maioranæ, aliæve odorata, cerâ albâ excepta, si naribus indatur, odorem vehementem & diu perseverantem, expirant.

*Efflatio*  
*nu è vul-*  
*nere em-*  
*ratio.* Spiritus efflatio per vulnus inflatum, si in aspera arteria hoc fit, plerumque lethalis, cum vulnus in hac sede ægrè sanari queat, existit. Quod si in pectore vulnus sit, & partes internæ læsæ sint, plerumque idem euenit, licet pulmonibus læsis, aliquem euasisse, sicuti in pulmonum affectu demonstratum fuerit viderim. Alia pectoris vulnera citra viscerum interiorum læsionem, ut vulnera tractari curarique debent.

Flatuum eruptio è vulnere, cum ventriculo & intestina læsa demonstrat, plerumque immedicabilis, alias tamen intestinis inflatum vulnus quoque sanatum fuit.

## DE SPERMATICA EXCRETIONE.

### CAPVT IV.

#### Genera.

**S**PERMATICA excretio, est effusio seminis in viro per virgam, in muliere in sinu vteri naturaliter fieri solita, & præter-

naturalis existit, cum nimia est, vel citius quàm debebat euenit, eoquē magis, si vitiosum insuper sit, vel per non decentem viam egrediatur.

Nimia seminis profusio, admodum, uti vocant, eneruat, hoc est languidum atque imbecille corpus ad omnes functiones edendas, discoloratumque reddit, ac Senium uti & mortem accelerat. Fitque hoc vel cum actu venereo, alias sine eo.

Cum actu venereo seu congressu, nimia seminis fit effusio, si nimum eum exerceat, cui intemperantiæ indulgentes, luxuriosi mares se ipsos perdunt, seminaeque prius vegetæ, fiunt inualidæ: Et præter hæc viri ad procreationem, mulieres ad conceptionem ineptæ. Ita ut quod in masculis tantum obseruatur, tandē in coitu vix guttam vnam aut alteram illius effundant: Vel alioquin non satis excoctum, & crudum, nec non, in quibusdam adhuc suberuentum potius, quàm uti aliqui voluerunt, sanguinem purum loco seminis ejciant.

Sine venereo actu semen inuoluntariè si excidat, Gonorrhæa appellatur. Quæ si cum sensu voluptatis fiat, quia dormientibus & somniantibus noctu plerumque euenit, Nocturna pollutio vocatur. Et si sæpè contingat, quia tunc æquè ac si cum actu venereo hæc emissio fieret, debilitat, præternaturalis est: Illaque longè magis, si nullo sensu voluptatis aut valde exiguo tam dormientibus quàm vigilantibus accidat, & tunc crudum & aqueum ferè effluit, quod si perseveret, vires admodum prostermit.

Vitiosum semen inuoluntariè, & sine sensu delectationis aliquando effunditur, quod non formam naturalem seminis, sed virus quoddam album vel flauescens refert, quem fluxum purulentum per penem excretio puris, ardorque inter mingendum sequitur: sicuti in purulenta excretionem demonstrabitur, diciturque hic affectus, Gonorrhæa virulenta, symptoma plerumque Luis venereæ, sicuti illic declaratum fuit, alias etiam extra eam quibusdam, & præsertim meretricibus impuris accidens, quæ alij qui cum illis rem habent, insciuntur, luemque dictam, vel saltem similem labem aut aliam contrahunt.

*Seminis  
in consue-  
tione  
excretio.*

Huc quoque referri potest, inuoluntaria feminis profusio, quæ in Epilepticis vel Convulsis interdum superuenit, cum licet nulum inde detrimentum accedat, præternaturalis tamen sit hæc illius excretio.

*Seminis  
per alie-  
num fo-  
ramen  
effusio.*

Per aliam viam, quam semini dicatam, semen aliquando præternaturaliter effluxisse, nimirum per foramen quoddam ab ortu, vel fistulâ natâ, & in virgæ virilis canalibus ductu, subitus factum, in conceptus defectu, cuius etiam causa existit, ubi & quo pacto fiat, & quid in eo agendum, fuit ostensum.

*Seminis  
cita ni-  
mis pro-  
fusio.*

Citius si semen ejiciant, quam par erat, nec eodem temporis momento & una conueniant coniuges, sed vnus altero id citius profundat, præsertimque si statim initio congressus hoc fiat, aut etiam paulo ante eum, in ipsa præparatione, mox semen eiacularitur, cum hoc actui venereo, quod vel non, vel diminutiue nec absolute fiat, defectum pariat, præternaturale quoque habetur.

Huc & refertur ea à semine procedens excretio, in qua semen non sufficienter, sed portiunculam duntaxat illius & veluti spumam dum vehementi stimulo venerem exercendi irritantur, sine sensu aut expletione voluptatis egerunt, unde & licet non debilitentur, vt tamen actus postea perfecte minimè queat perfici, efficit. A cerebro defluentem materiâ per penem quoque expurgari, aliqui docuerunt, quod tamen, cum in communem hunc ductum seminis & vrine via non pateat, haud verisimile videtur.

### *Causa.*

**S**eminis enarratarum præternaturalium effluxuum causa, vel ab irritatione, aut imbecillitate, vel anastomosi, aut ab affectu per consensum dependet.

*Vasorum  
spermati-  
corum ir-  
ritatio,  
causa Ve-  
neris ni-  
mis ci-  
taque, Gon-  
orrhææ  
simplicis  
& viru-  
lente.*

Ab irritatione vasorum spermaticorum, quæ semen inclusum continent, faculatam ipsorum expultricem stimulantem, seminis excretio nimia vel nimis cita, aut etiam inuoluntaria in utroque sexu sequitur.

Ob copiam seminis si vasa turgeant, quia cum voluptatis sensu exit, vt veneri nimiam aliqui indulgeant, ei occasionem præbendo, causa nimis illius profusionis & quæ inde sequitur debilitatis existit, nisi hoc ob laci-

uiæ æstus fiat, vt se strenuos in eo actu demonstrent, aut quæstus causâ, vt meretrices faciunt. Quod & irritando facit, si caliditatem maiorem & acrimoniam, quam alioquin obtinet conceperit, sicuti in causis salacitatis, quæ inde quoque prouenit, ostensum est.

Eiusmodi semen etiam stimulando, imaginatione solâ illius actus, quæ in somniantibus frequentius, nonnunquam & alias de eo cogitantibus excitatur, commotum excretumque, Pollutiones in dormientibus, interdum & vigilantibus parit.

A feminis quoque hoc seruire accidit, vt citius in ipso actu quam oportebat, ejiciatur, vel portio illius etiam citra actum emergat.

Atque vt cum ardore quodam eoque veluti vrente aliquando progrediatur,

Quod si acrimonia insignis, semini ab infestâ qualitate illius aut corruptione aliqua accedat, Gonorrhæa illa virulenta, per quam semen vitiosum emanat, sequitur, à luis venereæ plerumque malignâ vi procedens, seminique communicata. Quod & in illis, qui nondum hac lue infecti sunt, ab aliâ noxiâ qualitate potest procedere, quam semen per contagium in congressu, ab alterius semine infecto, concipit, indeque corruptum, acrem illam vim adipiscitur, à qua inuoluntaria vitiosa hæc excretio, non solum à stimulante illius vi procedet, sed & si adeo inualeat illius acrimonia, vt & simul erodat atque exulceret, purulenta quoque accedit mixtio.

Ab imbecillitate vasorum spermaticorum, seminis inuoluntarius effluxus, in gonorrhæa dicta suboritur: Cum aquosius semen, nec sufficienter lactis similitudine excoctum, sed feri instar dilutum crudumque redditur; tunc enim facile è suis receptaculis, utpote tenuè & fluidum excidit, & sine sensu vel leuissimo elabitur, etiam nullâ aliâ præcedente causâ, vel exiguâ saltem aliquâ irritatione, non solum in genitalibus factâ, sed & sicuti obseruatum est, in vicino podice, dum dura excrementa egeruntur, aut, vt Fernel. alicui accidisse refert, canalibus ad clystma injiciendû in anum intruditur. Quæ imbecillitas ab intemperie maximeque à refrigeratione vel caloris natui labe, in hisce

sedibus, aut etiam aliis simul, nonnunquam & toto corpore, à morbis vel ætate inducta, proficiscitur, quæ uti diximus, ut aquosius semen fiat, occasionem præbet. Nam quod hæc aquositas feminis ab excrementis pituitosis aut serosis proueniat, haud verisimile, cum illud ex sanguine generetur, qui licet ille crudus ac pituitosus ut vocant, existat, ad feminis tamen generationem, etiam in corporibus, crudo sanguine, vel aliis eiusmodi excrementis abundantibus, semper puriorem adhuc restantem sanguinis portionem, testes, ut mammillas ad lactis procreationem, abripere, ex eo quod & cachectici interdum procreent, & mulieres simili affectu laborantes nihilominus infantes lactando nutrant, conjicimus.

A laxitate nimia vasorum feminalium profecta imbecillitas, gonorrhœam quandoque producit: Quando folliculi semen continentes in suis gyris, vasaque illud deferentia nimium ampliata laxataque, ut facile vel sponte vel leui occasione, ab illis excidat, viasque pertranseat, causam præbent. Quæ laxitas, à multoties breui tempore peracto coitu, sæpè subitò, aliàs tardius, in iis qui longo tempore luxurie fuerunt dediti, oritur, per quam vesiculæ feminis toties inanitæ, rursusque repletæ viæque irrigatæ, tandem eam laxitatem, atque interdum ob spirituum simul profusionem, imbecillitatem acquirunt, quæ semen crudum fluidiusque redditur, geminis tunc causis gonorrhœam producentibus.

*Vasorum spermaticorum osculorum apertio, causa feminis imperfecti aut subcreti excretionis.*  
Per apertionem osculorum venarum spermaticarum, quæ semen ex sanguine elaborant, semen illud subcreutum, vel sanguis loco feminis, uti voluerunt, in coitu procedit, quando ob eum sæpè breuique spacio repetitur, adeo vasa semen elaboratum continentia exhauriuntur, ut per venarum spermaticarum oscula, suctione hac dilatata, semen ex illis adhuc imperfectum & sanguinolentum, vel sanguinem ipsum rapiant, & in congressu profundant.

*Vasorum spermaticorum* Ab affectu aliarum partium quarundam, per consensum vasis spermaticis affectis,

feminis inuoluntaria sequitur profusio. Veluti neruorum in conuulsione, in qua ob conuulsione validam, quæ vniuersum corpus exagitur, vasa spermatica simul concussa, semen interdum si præsertim redundet, excutunt, uti & ob eandem violentiam, accedente insuper constrictione muscutorum abdominis, etiam vesica pressa vrinam profundit. Quod hac potius ratione, ut semen conuulsis interdum promanet, accidere videtur, quàm muscutorum occasione, qui vasis spermaticis præficiuntur, licet & hi in generali conuulsione conuellantur. Nam etsi in ipso actu venereo, leuiter vasa deferentia dilatando, plenior ipsius excretionem adiuent, hoc tamen non prius, donec semen iam è suis vesiculis excidens, per hosce ductus feratur, faciunt, ob quam & causam conuulsi, ad excretionem hanc nihil efficiunt, sed motus ille inordinatus, illud è suis receptaculis propellit. Vti nec resolutio horum muscutorum, in apoplecticis effluxum feminis, sicuti verò vrinæ parit, cum hi muscoli, non uti sphyncter ad retentionem sint comparati.

### Curatio.

*Gonorrhœa curatio.*  
Seminis in utroque sexu inuoluntarius effluxus, in Gonorrhœa dicta, si sit nocturna illa pollutio, ob copiam feminis eueniens, cum non nisi eo redundante accadat, & proin tantopere non noceat, ferè negligitur, vel matrimonium, huic illius nimie collectioni, indeque natæ inuoluntariæ profusioni, medetur; in cœlibatu verò viuientibus, ab illis quæ prouentū illius gignunt, illudque facile commouent, abstinendum. Sin ob semen feruidius aut acrius, etsi parua illius sit quantitas, gonorrhœa frequenter infestet, semen corrigendum, atque ad mediocritatem erit reducendum. Si verò ob imbecillitatem vasorum spermaticorum aquosius redditum, facile effluat, vel etiam ob laxitatem à nimio veneris usu contractā, semen qualecunque fuerit, diutius contineri nequeat, quia tunc hæc gonorrhœa admodum debilitat, illi, vasa hæc roborando, semenque crassando, prospiciendum. Quæ omnia sequen-

tibus præfidiis, causis gonorrhœæ accommodatis, perficiuntur.

Exhibemus purgantia interdum, si à biliosiore vel crudiore aut serosiore sanguine, semen acrius aut aquosius generetur, ut ab hisce repurgetur mundusque fiat sanguis, laudatamque semini materiam præbeat. Quæ purgantia, prout corpus excrementis his illisve refertum est, hisce educendis accommodantur. Qualia passim cum exponantur, non opus est hic ea repetere.

Quæ alterando asistendum hunc fluxum propinatur, pro diuersitate causæ instituuntur. Et si ob seminis copiam fiat, exiccantibus & quæ proprietate quadam illud absumunt, illud minuiamus; si ob feruorem aut acredinem, refrigerantibus & lenientibus contemperamus. Quod si semen aquosius aut fluidius sit, illud incrassamus; si vasa semen continentia imbecilliora aut laxiora sint, illis, adstringentibus, calefacientibus & appropriatis, robur addimus. Quæ omnia partim remediis in Salacitate expositis, maxime si ob seminis copiam aut effluuescentiam, gonorrhœa fiat, cum & inde salacitas procedat, partim sequentibus, quæ gonorrhœæ omnibus causis accommodantur, perficiuntur.

Puluis exiccans, constringens & proprietate agens: R. rad. Iridis, seminis Agnicasti, Coriandri præpar. an. 3 j. seminis Plantag. femin. Rosarum, Rutæ, Alkekengi, fol. Mentæ an. 3. S. Succini, Coralli rubr. an. 3 j. Thuris vel Mastiches 3. S. fiat puluis subtilissimus: Detur illius 3 j. per se, vel cum Saccharo ros. aut Liqueore aliquo dissolutus.

Cum amplius sicandum & adstringendum, prædictis, ex sequentibus quædam addi possunt, ut semina Myrthi, Berberis, folia Sumachi, Millefolij, Agnicasti, Rutæ, lanugo fructus Rosarum & folia Asplenij, Glandes, Balauſtia, cineres Intestinorum & pellicularum stomachi gallinæ, Priapi cerui vel tauri, Pili leporum viti, rasura Eboris, Bolus, Hamatites, Cryſtallus.

Ad feruorem & acrimoniam seminis contemperandam: R. semen quatuor frigid. Maiorum mund. 3. ij. quatuor frigid. Minorum, imprimis Portulacæ, Lactucæ veteriam

Acetosæ an. 3 j. rad. Nenuphar. vel florum, & Rosarum florum an. 3 j. S. gummi Tragachanti vel Arabici toſti 3 j. fiat puluis. Cui de supradicto puluere tertia vel quarta pars ad si poterit. Camphoram plerique addunt, refrigerationis gratiâ, vel quod occultâ vi semen extinguat.

Decoctum sistens fluxum & caliditatem & acrimoniam seminis extinguens: R. rad. Iridis, Nenuphar. an. 3 j. herbar. recentium vel aridarum Agnicasti, Coriandri, Asplenij, Millefolij, Sumach, Plantagin. & Portulacæ, Lactucæ ana. M. j. Mentæ, Rutæ ana. M. S. florum Rosarum, Nenuphar. an. P. j. femin. quatuor frigid. Maior 3. S. Minorum 3. ij. seminis Plantagin. & Portulacæ an. 3 j. Myrtillorum 3. ij. femin. Alkekengi 3. S. fiat decoctio in Aquâ & poculo Vini rubri, & in colaturâ 1b. iij. dissolue syrupi Cydoniorum 3. ij. Sacchari q. s. decoquantur ad mediam consistentiam. Utatur frequenter.

Syrupi comperunt Portulacæ, Plantagin. aliive ex prædictis quibusdam plantis illarumve succis decocti, aliisve acidis ut Citri, Granator. vel austeris, ut Myrtillorum syrupus.

Succi item ab enarratis plantis expressi per se vsurpati, vel Aquæ elicite.

Conseruæ itidem & conditura eiusmodi, simpliciter vel cum admittance puluerum prædictorum & syruporum, in formam misturæ redactæ sumptæ.

Lac ouillum vel chalybeatum sæpe bibitum, seminis contemperat acrem vim. Vti & emulſio seminum frigid. & Amygdal. & sem. Papau. albi: Aliaq; multa quæ ardorem vrinæ in mictione ardete restinguere diximus.

Injiciuntur clysmata in hoc casu quadoq; ut tanquam topica remedia, parti affectæ adhibeantur, cum vires ipsorum ab intestinis ad vasa seminaria vsq; etiâ possint pertingere. Paranturque proin pro causæ ratione, ex decocto illorum quæ refrigerant, si caliditas in causa sit, additis etiam huius floris seminis causâ, siccantibus & adstringentibus, qualia in decocto quod exhibetur, descripta sunt, aliisq; validius adhuc constriquentibus, ut fol. Quercus, Lentisci, Cupressi, floribus Granatorum similibusque, eaque coquen-



coquendo in Aqua & Vini rubri vel etiam Aceti portione.

Sunt qui iniectiones siccantes, ex Tuthia similibusque paratas, in feminis & vrinæ communem canalem, in viris infusas, plurimum iuuare doceant.

Extrinsecus vsurpantur balnea, fatus, inunctiones, quæ salacitatem reprimunt, hic quoque in simili causâ competentia: vti & in aliis causis. Balneum vel fatus perinæ & testis ex rad. Cynoglossi, vel decocto herbarum, quarum & decoctum vel pulueres assumptos prodesse diximus, parata, conuenient.

Ad roboranda vasa semen continentia & deferentia, debilitata aut laxiora facta, in illis qui gonorrhœam diu sunt passi, vel ad recidiam eius sunt procliuēs; Thermae naturales calidæ adstringentes, more consueti ad tempus aliquod vsque continuatæ, prouiderunt. Vel alia Balnea artificialia, ex illis quæ hoc præstant concinnata, quibus & calida, ad calorem natium harum sedium fouendum, adduntur, vt Rosmarinus, Maiorana, Stœchas, Lauandula, similiaque.

Inunctiones insuper idem refrigerando, sicando, adstringendo, proprietate operantes, renibus si calor ipso in causa quoque sit, vel perinæ & testibus adhibentur. Inter quas tale Vnguentum proderit: R. olei Myrtillorum, Lentiscini, Mastichini, Cydoniorum ad 3. iij. olei Ilini 3. ij. succi Plantag. Portulacæ, Eactucæ, Mentæ, Aceri an. 3. j. si coquantur ad succorum consumptionem, addidit Nucum cupressi vel Gallarum, rad. Iridis, feminis Viticis an. 3. j. Acaciæ vel Hypocist. 3. ij. Spicæ 3. j. Cera q. s. fiat inunctio.

Oleum Camphoræ perinæ & testibus illi commendatur.

Laminâ plumbeam tenuissimam renibus impositam per noctem, vti salacitatem reprimere, sic gonorrhœam emendare scribitur.

Lectulus vel puluinus lumbis inter decumbendum suppositus, Lanâ potius quam plumis repletus, cui Agnus castus & Ruta misceantur, aliquid iuuare possent.

Sectio venæ si gonorrhœa à feminis vberitate proueniat, quandoque competit, in plethoricis præsertim, ad materiam semini, unde generatur, non nihil subrahendam.

In vitæ regimine, sicuti in Salacitate dictum, si ab eadem causâ gonorrhœa fiat, se gerant: Imprimisq; pro condimento Aceto frequenter vtantur, quod mirè & caliditatem & acrimoniam ciborum vti & feminis compescit. Et si semen nimis tenue & fluidum sit, cibis crassioribus vescantur: Inter quos Lentesc, Fabæ frixæ cum Aceto probantur: Item Pineæ, Amygdalæ, Oryza comesta: Caro item testudinis & radices Pastinacæ.

Gonorrhœa virulenta dicta, à semine corrupto & vitiatum profecta, non eam, quæ retineatur & fluxus illius sistatur, vti in alia gonorrhœa, rationem curandi exigit, cum noxium retentum, loca illa exedendo exulceraret, sed potius ne in locum illius quod natura euacuat, tale quid ex infectione renascatur, prouidendum, quod per curam, quæ generatim toti lvi Venereæ, indeq; natis etiam aliis vitis debetur, si in hac lue hæc quoque se offerat, integrè interdum perficitur; quod si verò post eam, exulceratione quadam in penis ductu, ob exesam eam sedem, relicta, puris effluxus sequatur, tunc cura quæ in purulenta excretionem præscripta fuit, hic quoque locum habebit.

Vti & si citra lviem hanc, ab alio impuro congressu gonorrhœa hæc maligna sequatur, cum & illa in purulentam conuertatur, cura eadem competit.

Alia feminis inuoluntaria excretio, quæ in Epilepticis & conuulsis accidit, cum inde nihil detrimenti sequatur, nec ab ægris nec plerumque ab astantibus obseruetur, negligitur.

Nimia feminis profusio per actum venereum, unde corporis languor sequitur, non aliam curam, quam vt à Venere abstinenceatur, vel ab immodico eius vsu temperetur, requirit; & si ad eam incitentur, in salacitate expositis remediis, feruor hic restinguitur. Denique vt corpus per victus rationem admodum nutrientem & reficientem, rursus restauretur. Sicuti etiam in inuoluntaria feminis excretionem, idem fieri debere, diximus.

Citra nimis per exercitium venereum feminis effusio, hoc est quando citius quam oportebat, semen mox in ipso principio con-

Gonorrhœa virulenta curatio.

Seminis in conuulsis excretionis cura.

Veneris nimia cura.

Seminis citra nimium profusio curatio.

gressus vel præparatione ad eum, profunditur, vnde imperfectus actus hic vel inutilis ad conceptionem redditur, quia hoc ab eo nimis feruido, aut etiam fluido proficiscitur, pro emendatione huius incommodi, eadem quoque quæ in gonorrhœâ hæc de causis excitatâ, fieri debere docuimus, hic quoque usurpabuntur, vnde hæc anticipans seminis excretio facilius leuioribusque remediis, quàm illa inuoluntaria, si modò ea, & præcipuè quæ victus rationem concernunt, continuantur, corrigetur.

~~~~~

DE SANGVINEÆ EXCRETIONE.

CAPVT V.

Genera.



SANGVINEÆ vel cruenta excretio illa, quæ etiam secundum naturam, in mensium fluore per sinum vteri, interdum & in hæmorrhagiâ narium per nares, vel hæmorrhoidum fluxu è podice, procedit, præternaturalis fit, si per loca huic excretioni minimè competentia, sanguis effluat: Vel si sanguis siue per loca illi destinata aut alia emanet, quantitate quodd nimium effluat, vel qualitate quod vitiosus existat, peccet. Sicuti quo pacto hoc fiat, per quæcunque loca effluat, in singulis demonstrabimus. Quod si sanguis aliis confusus vel expuatur vel vomatur, mingatur aut deiciatur, in illis excretionibus describetur.

Oculorū
sanguis
excretio.

Ex oculis si sanguis parciſſimè etiam prodeat, quod rariùs accidit, præternaturale quoque est.

Aurium
sanguis
excretio.

Vti & si ex auribus effluat, vnde nunc purus nunc sanioſus emanat. Vidimus & cuidam, qui narium hæmorrhagiâ frequenter infestabatur, accedente capitis dolore pulsante, ruboreque faciei, non solum è naribus, sed & auribus simul sanguinem satis largiter effluxisse.

Narium
hæmorrhagia.

E' naribus frequenter sanguis interdumque copiosè exſtillat, Nariumque hæmorrhagia appellatur. Quæ cum consueta quibusdam & naturalis sit, tunc primum præternaturalis

fit, si immoderatè tantaque copiâ sanguis profundatur, vt vires labascant, vel etiam penitus cum vita extinguat. Vti in iis qui priùs sani erant, vel morbo aliquo tenentur, euenire aliquando solet. Leuiter etiam sanguis quandoque & saltem muco permixtus in affectu aliquo narium se manifestat.

E' virga virili citra mictionem, purus sanguis rariùs profluit, quod tamen si fit, præternaturale existit, & dolor aliquis plerumque in ea sentitur. In congressu sanguinem loco seminis ejici quandoque perhibent: qui tamen, vti in seminis excretionem dictum, potius semen imperfectum existit.

Ex meatu vrinario in scemineo sexu, sanguinis effluxus præternaturalis, citra mictionem magno cum cruciatu, in lapidis è vesica extractione, se manifestat.

E' sinu vteri effluens menstruus fluxus naturalis, præternaturalis fit, si tempore quo alioquin menses fluere solent, diutius maiorive quantitate effluat, Mensiumque fluor immodicus appellatur. Vel si hoc alio tempore intermedio, quo nondum fluere debebant, nec dum tempus fluxus instabat, intempestiuè & inordinatè eueniat, præsertim si priùs suppressis diu menstruis, per menses aliquot, virginibus aut mulieribus, quas proinde grauidas esse suspicantur, hoc accadat: Vel si mulieribus quibus menstrua diu subſtiterunt, venterque grauidarum instar intumuit, sicuti de hac intumescencia in tumoribus egimus, diu se grauidas esse opinatis, tandem inopinatè ante vel post pariendi tempus, hæmorrhagia eiusmodi superueniat, per quam sanguinis magna quantitas interdum effunditur, venterque iterum subſidet, non sine virium iacturâ magnoque vitæ periculo. Imprimis verò alienus & è fluxu menstruo differens, si tempore quo menses desierunt, iam senescentibus vti ferè fit, contingat mulieribus, cum nullo ordine aliàs copiosius aliàs parcius accadat, sæpè quàm diuſimè durans, vnde hunc fluxum menstruum, vti aliàs faciunt, minimè, sed Hæmorrhagiam per vterum immoderatam potius appellamus. Hæc menstruas aliàsve præternaturales, sanguinis nunc puri nunc impuri per vterum pur-

gatio-

Penis
sanguis
excretio.

Vrinarij
meatus
sanguis
excretio.

Mensium
fluor immodicus.

Vteri
sinus
fluxus
sanguis
menstruus
differs
a
mensibus
in
tempore
et
quantitate.

gationes, languor corporis, pallor, cachexia, interdum & hydrops sequuntur. Et subito magna fiat sanguinis profusio, sicuti post diu suppressos prius menses, nonnunquam accidit, vires admodum prosteruntur, & nonnunquam penitus extinguuntur.

Alias per hæc loca præternaturalem eam purgationem sanguineam, quæ post partum fieri consuevit, etiam illa immoderata accidit, adeo ut summè ob largum illum fluxum aliquando puerperæ debilitentur. Quod uti in naturali partu quandoque euenit, sic & in præternaturali partu & abortu frequentius cum magno sæpè vitæ discrimine contingit.

Ex sinu vteri alius sanguinis effluxus quoque fit, post primam ferè coitionem sæminæ cum mare, in deuirginatione, ut vocant, superueniente tunc sanguinis aliqua apparentia, vel potius, sicuti compertum est, fluore simili qualis menstruatim illis alioquin solet accidere, qui fluxus cum virginitatis certa nota esse, & proin subsequi debere censeatur, pro præternaturali vel saltem noxio minimè habetur.

Uti verò illa cruenta excretio ex vteri sinu, quæ in congressu siue primo aut sequentibus, cum dolore magno facta, interdum superuenit.

Ex podice sanguinis effluxus prætereos quos cum sæculenta deiectione in dysenteria, teneismo, fluxu hepatico, prodire illic ostendimus, alius occurrit, utriusque sexui communis, Hæmorrhoids peculiari nomine, et si reliquæ quoque hæmorrhagiæ sic dici possent, appellata. Quæ alioquin peculiaris cuiusdam temperamenti hominibus, maximè masculis nonnunquam & sæminis, adultis potissimam & senibus consueta atque utilis, & per intervalla mensium, non tamen eo ordine ut menses in mulieribus, vel singulis annis semel atque iterum, vel duobus saltem aut tribus, eueniens, tunc præternaturalis fit, quando immoderatus, hoc est maiore quantitate, vel diutius quam par erat, fluit, aut frequentius quam decebat redit, unde tadem lassitudo, virium defectus, pallor, cachexia & hydrops, uti in aliis eiusmodi præternaturalibus hæmorrhagiis accidere

diximus, quoque superueniunt. In hac hæmorrhoidæ sanguis separatus à reliquis excrementis effluit, isque ferè purus & sincerus, & reuera non adeo nec amplius quam & aliunde effluens aut emissus sanguis, uti verò eum depingunt, ater. Et si aliter coloratus aut impurus sit, potius rubore exacto tinctus vel flauescens bileque flaua permixtus, quam aliter se habens, sicuti obseruantibus patebit, apparet.

In morbis quibusdam, superueniens eiusmodi hæmorrhoids, si non, ut cum decenter sit, profit, & morbum soluat, sed potius ob immoderationem noceat, viresque prosterнат, ad præternaturalem refertur.

Uti & illa, quæ non consuetis, naturæ operæ, sed à causa alia violenta, uti dicitur, & proin sine commodo ac inutiliter accidit, maximè si dolor simul adsit, & noxa aliqua inde sequatur.

Præter hunc sanguinis fluxum, hæmorrhoidalem dictum, alij præternaturales ex podice prodeuntes se exhibent: Veluti ille est, in quo paucus saltem cruor apparet, à causa quoque violenta, cum pruritu & dolore podicis procedens.

Huc & refertur sanguinis illa excretio, per quam sanguis menstruus in sæminis non solum per sinum vteri, sed & per podicem emanat, rara quidem, sed quæ tamen aliquando, cum exulcerationis illorum locorum notis, sese obtulit.

Per poros cutis eadem illa ut sanguis transudet, vix nisi miraculosè, uti in Salvatore nostro, fieri potest. Vidimus tamen aliquando, in puero hydropico poros plerosque corporis cruore notatos, ac si corpus guttis sanguineis conspersum esset, sanguine tamen inde minimè emanante, nec linteamina conspurcante.

Per aperturas alias quam orificia naturaliter patentia, & præcipuè per vulnera nunc parua nunc magna, vel studio ad sanguinem per ea emittendum facta, vel casu contingentia, sanguinis fluore corporis diuersis locis, non naturali modo, tamen frequentissimè prodire solet: Quemadmodum nunc explicabitur, atque in vulneribus aliisque cutis diuisionibus morbisque, in quibus eius-

Podice
rhomdale
dictum, alij
præternaturales
ex
podice
prodeuntes
se exhibent:
Veluti ille
est, in quo
paucus saltem
cruor apparet,
à
causa
quoque
violenta, cum
pruritu & dolore
podicis
procedens.

Cutis
poros
transudet,
vix nisi
miraculosè,
vix in
Salvatore
nostro,
fieri potest.
Vidimus
tamen
aliquando,
in puero
hydropico
poros
plerosque
corporis
cruore
notatos,
ac si corpus
guttis
sanguineis
conspersum
esset,
sanguine
tamen
inde
minimè
emanante,
nec
linteamina
conspurcante.

Sanguine
ex
cretio
per
vulnera
aut
aperturas.

Parti
sub
quent
ex
cretio
cruenta.

Vteri
sinu
sanguinis
effluxus
excretio
in deuirginatione
et co
gressu.

Hæmorrhoidum
fluxus
immoderatus.

eiusmodi sanguinis fluor se offert, huius quoque facta est mentio.

A superficie corporis è cute sanguis leuiter tantu emanat, in attritione ipsius & vulneribus cutem saltem diuidentibus, nullam aliquin noxam inferens.

Profluit copiosius & cum saltu ferè in phlebotomia, quæ vires debilitando noxia euadit, si immoderata sit: Vti & si non necessariò sed inconsiderate fiat, sæpeque ex consuetudine quadam praua repetatur, vnde multi languidi euaserunt, atque ante tempus consenuerunt.

Cum interrupto nonnihil saltu, sanguis feruidior exilit in artherotomia, eadem, si diutius perseueret, adferens in virium iacturâ accidentia; & nonnunquam etiam grauiora. Vti in quodam aneurismate dilecto accidit, vniuerso arteriarum sanguine exhausto, in quo non solum subita virium defectio, sed & mors ilico subsequuta fuit.

Aliquando & è vena sponte se in cute aperiente, sicuti in plebotomia, sanguinem in pedibus erupisse vidimus, magnamq; illius profusionem in tibialia antequam id animaduernerent, factam: Aliàs quoque in varicibus crurum idem euenisse obseruauimus. Quod & in aliis corporis locis quibusdam accidisse, in brachiis, facie, thorace, hypochondriis, aliqui testantur: Vnde etiam si inter dormiendum hoc eueniret, aut aliàs lateret, neò ob id maturè ei occurreretur, noxa non minùs magna quàm à venæ nimio fluore posset subsequi. Hoc tamen rarissimum in homine, in equis verò aliquibus non infrequens, quibus dum vehementer calent, hoc interdum solet, sed citra incommodum, euenire.

Ex habitu corporis aliàs sanguis nunc pari impetu profluit, nunc minori emanat, copiosius partiusve in vulneratis membris aut amputatis, vnde magnum sæpe sanguinis sequitur profluuium, imbecillitatem proin citius, nisi mox cohibeatur, eamque summam interdum adferens.

E cavitatibus internis vt abdominis, thoracis, capitis, & c. in vulneribus eò pertinentibus, sanguis copiosè aliàs, aliàs partiùs effluit, vel in cavitates influit: Vires quo-

que si immodicè hoc fiat prosternens, & si in cavitatibus retineatur concrescens & putrescens, grauiora simul profert, præter ea quæ à vulnere procedunt, symptomata.

Causæ.

OMnium sanguinis excretionum enarratarum generum, è diuersis corporis sedibus prodeuntium, causa procedit, vel à solutione contiguitatis per apertionem venarum osculorum, vel continuitatis à læsione aliqua tum venarum tum partium substratarum.

Per apertionem osculorum venarum seu anastomosi, aliquæ hæmorrhagiæ subiunguntur eaq; pro venarum, quæ aperiuntur diuersitate.

Venarum osculorum apertio seu anastomosis in Arteribus Nariibus, Vteri cervice, Recto intestino, Cerebro, causa sanguinis excretionum ex illis oculis.

Aurium interiores venæ, per anastomosi apertæ, largam sanguinis copiâ aliquando profundunt; Fitq; hoc ob sanguinis in capite redundantis copiam vel tenuitatem, sed rarissimè, cum tunc per narium venas vt dicetur referatas, natura potius eum euacuet, nisi eò quoque illius portionem ablegget, sicuti in eo, cui & ex naribus & auribus eum effluxisse simul diximus, ob nimiam illius quantitatem vel calorem quo caput æstuabat, non solum narium sed & aurium venis patefactis, accidit.

Narium interiores venæ, à iugulari per fauces sursum ad cerebrum ascendente profectæ, si per anastomosi referantur, Narium hæmorrhagia sequitur. Cuius anastomosis causa est, sanguinis interdum copia, naturâ tunc illius redundantiam exonerante, per has venas teneriores existentes, ob loci cui implantantur teneritatem, & quæ proin facilius dilatantur & aperiuntur, in virili quidem sexu, cum in illis non alia commodior ad hanc expurgationem detur via: nam quæ in ipsis per podicis venas hæmorrhoidales fit sanguinis expurgatio, quod tamen raro & in quibusdam tantum accidit, saltem illius qui in venæ portæ ramis consistit, existit. In mulieribus verò si adeò sanguine abundant, vt per venas vteri menstruas exhauriri sufficienter nequeat, vel fluxus ille sublestat, sæpiùs natura eundem per venas narium etiâ expurgare cõsuevit. Quæ hæmor-

rhagia inde subsequens proin, et si non semper consueta, tamen adhuc naturalis est, nisi modum excedens præternaturalis fiat. Calidior quoque & feruidior sanguis calore suo venas dilatando & aperiendo, hæmorrhagias narium mouet, tum si naturâ suâ talis existat, vel per motus corporis, insolationes, & æstuararia calefiat: Aut si in morbis calidis capitis & febribus accendatur, in quibus vel mox ab initio vel in statu morborum & per crisiſim interdum erumpit. Tenuior itidem sanguis, magisque dilutus sero & fluidior factus, & bilis permistione citius vasorum oscula penetrans, narium hæmorrhagias efficit. Vnde & cachecticis, hydropicis, ictericis, et si sanguis non redundet, fluxus ille sæpius nihilominus superuenit. Quod si quoque causæ plures ex illis concurrant, tantò maior sanguinis fiet effluxus. Qui facilius repetit aut profusior est, si simul venarum accedat laxitas, talis oborta suâ naturâ, vel quia frequenter hoc passæ & dilatatæ ac referatæ fuerunt. Per vim, vt emunctionem validam sæpeque repetitam, sanguine impulsio, venæ aperiuntur, sanguisque inde fluit, vel iam fluentis fluxus augetur.

Vteri ceruicis venæ à caua progressæ, si per anastomosis aperiuntur, sanguinis inde effusiones frequenter prodeunt. Sicut enim hisce statuto tēpore se aperiuntibus, sanguinemque profundentibus, naturalis foemineo sexui fluxus menstruus oritur, ita & præternaturalis immodicus hic fluxus menstruus, vel alij eiusmodi, extra tempus menstruum se offerentes, mensuris tamen nonnihil correspondentes, in generibus expositi, inde nascuntur: Quando ob copiam sanguinis eò à natura propulsi, in plethoricis, oscula hæc patefacta, citius & frequentius, & proin in tempestiue, vel ipso menstruorum tempore, sed immoderate sanguinem profundunt: Vel cum sanguis ob tenuitatē aut feruorem, eò delatus, oscula permeans, inordinatas vel immodicas eiusmodi fluxiones parit: Aut quando natura superfluitates corporis, per hanc viam cum sanguine, vel cōsuetu menstruorum tempore vel alio, euacuans, inconſuetas aut profusas illas hæmorrhagias prodignit. In quibus sanguis nunc serosus ad-

modum, vel alioquin vitiosus & impurus emanat. Profusissimè autē hic fluxus serè accidit, si magna sanguinis vel puri aut impuri quantitas circa vteri venas, ob suppressa diu menstrua congesta, subito venas aperiens, magnâ vi erumpat, osculaque hoc illius impetu adeò diducat, vt eum se tam citò recolligere huicque impetui resistere, nequeant, non solum sanguinis ex vteri, sed & aliis maioribus vasis, in locum illius exhausti, succedentis sequatur effusio, corpusque veluti exanguē reddatur.

Quod vt in venis vtericeruicem implicatibus fieri plerumque solet, sic & in illis, quæ vteri fundum subeunt, si & illæ in mulieribus, quibus venter ob menstruorum diutina retentionē, sanguine in vterum se tunc ingerente, eumque vt in molem excrescat, ventremque in tumorem attollat, infarciere; sicuti in tumoris eiusmodi ventris in mulieribus, quæ se grauidas esse falsò putant, causis expositum fuit, se eo modo, vt de ceruicis vteri venis dictum, aperiunt, hæmorrhagia illa periculosa sæpe & vitiosa sequitur.

Aliàs etiam à vi aliquâ, per quam vteri ceruicis oscula solum aperiuntur, nec dum continuū vteri alio modo soluitur, hæmorrhagia suboritur; Idque frequentius & serè consuetim, in prima coitione, seu deuirginatione, non ob hymen, vt vulgò creditur disruptum, cum membrana sit exanguis, & si inde eueniret, potius quia auellitur, accideret: Sed quod verisimilius est, quia per subitam illam & validam orificij vteri dilatationem, vel confricationem illam insuetam ceruicis vteri, venarum menstrualium oscula nonnihil referantur, mensuris fluxus instat sanguinem profundit, vel saltem cruoris aliquas notas proferunt.

A medicamentorum oscula venarum aperiendo, fluxum menstruum concitantium vsu, maxime si violenta sint, atque ex illis præcipue, quæ vteri sinui induntur pessaria, hæmorrhagia copiosior quoque excitari potest.

Ab iisdem causis, à quibus menstruum immoderatum fluxum euenire ostendimus, etiam expurgatio illa sanguinis post partum fieri consueta, immoderata fit: sicuti enim

naturaliter hoc, in partu diductis & separat-
tis ab inuicem osculis, vasorum secundinæ
cum vteri, apertisq; & sanguinem profun-
dentibus, accidit; ita & præternaturaliter
ob nimiam eius quantitatem vel tenuita-
tem, nimia illius sit euacuatio.

Recti intestini venis, à venæ portæ ramis
deductis, hæmorrhoidalibus appellatis, per
anastomosi apertis, vti naturaliter hæmor-
rhoides, non tamen ordinariè, sicuti men-
strua, per quæ sanguinem in vena caua, sin-
gulis mensibus pro fœtus enutritio, in fœ-
minis dum ad conceptum habiles sunt, coa-
ceruatû, cum nondum conceperunt, expur-
gari necessum erat, erumpunt, sed tunc so-
lûm, quando sanguis in venis meseraicis ni-
mîum abundans, vel feruidior aut biliosior
redditus (sicuti bilem præ cæteris humori-
bus frequentius in eo coaceruari, in febriû
intermittentium causis inde quoque pro-
gressis demonstrauimus) illic coaceruatus,
& subsistens, nec in venam cauam sufficien-
ter translatus, aut à vesicula bilis repûrga-
tus, à natura per hanc viam vicinam, excre-
tionibusq; aliis etiam destinatum podicem,
vti menstrua per vterum, euacuatur. Sic &
in nimium ampliatis aut diutius reſeratis,
aut tempore non conuenienti, osculis illa-
rum venarum, ob maximam huius sangui-
nis retenti copiam, vel efferuescentiam, aut
bilis permissionem, à quibus morbi graues
sequi possunt, vel iam sunt geniti, natura
irritata, hæmorroides immoderatas & co-
piosam illam sanguinis profusionem moli-
tur, eoq; magis, si oscula venarum ultra
modum apertæ diductæque se amplius re-
colligere nequeant.

Quod si quoque nec ob repletionem aut
impuritatem huius sanguinis, sed aliis de cau-
sis mota natura, nullâ necessitate per hæ-
morroides sanguinem venarû meseraica-
rum vilem excernat, præternaturales hæ-
morroides non consuetæ nec vtilis ex-
furgunt.

Per anastomosi cutis venarum, sanguis
per cutem illiusve poros emanare minimè
potest, neque per rarefactionem seu diape-
desin cuticulæ, sanguis vti verò serum tran-
sudare, cum crassior sero sit, nec possit per

hasce minutissimas cutis aperturas pene-
trare, nec per eam, nisi illius cõtinuitas diui-
datur, effluere, sed si cum eo sub cutè diffun-
ditur, illic persistit, & hypochyma, vt in eo
dictum, producit. Licet autem in puero hy-
dropico hinc inde in poris apparuerit, cum
tamen inde minimè emanarit, sed à cuticu-
la quoq; prohibitus fuerit, poris quidem se
insinuasse, quod rarissimum est, sed eos ta-
men minimè peruasisse, patet.

A solutione cõtinuitatis ob varias par-
tium & venarum læsiones, plura sanguinis
eruptionis genera procedunt, variantia pro
venarum quæ læduntur varietate.

In oculis venæ adnatæ tunicæ, si ob frictio-
nem, cum pruriit, vehemètem, quod tamen
vix fit, vel contusionem aut sectionem quæ
in panniculo oculi detrahendo instituitur,
lædantur, cruor ex illis, sed paucus, cum ve-
næ exiguæ tantum sint, exit.

In auribus interiores venæ si lædantur,
ab immisis in aures, paucus sanguis pro-
dit: aliàs copiosior, ex casu aut ictu, capite a-
dèd conquassato, vt venæ illic disrumpâtur.

In narium interioribus venæ si lædantur,
sanguis ex illis exstillat. Quæ læsio ab vn-
guibus nonnûquâ, dum digitis naribus im-
missis, illæ purgantur, loca hæc vulneranti-
bus accidit: aliàs ab aliis in nares intrusis,
eas polientibus, vel erodentibus: quibus stu-
dio sibi aliqui hûc fluxû accersunt: alij dum
sterutacione ciere hisce volût, sanguinem
simul concitant. Ex contusione nasi à vi ex-
terna hoc idem euenire potest, interdum &
ab humore acri nares summo opere vellicâte:
In Grauedine itidem contingit, vt nares san-
guinem exstillèt, iuuante etiam illarum fre-
quenti pressione, in emunitione, ad quam
continuo cõpelluntur. Ab vlcerere refricato,
vel à quo crusta detrahitur, sanguis quoq;
exudans, emunitionem cruentam parit.

Virgæ virilis interior canalis, si à cathete-
tere in eum profundè adactò, lædatur, non
solum cruor cum mictione, vti in ea dictum
est, sed etiâ sine eâ excernitur: Quod & ab
alia læsione potest contingere, à calculo ni-
mirum vesicæ, per vim hæc loca permeante.

In vteri ceruice venæ læsæ sanguinis ex
ea effluxû etiam concitant: veluti in partu
difficili

Venarum
solida cõ-
tinuitas
in Oculis,
Auri-
bus, Na-
ribus, Vir-
gæ virili,
Vteri cer-
uice, Re-
cto inte-
stino, &
Podice,
Cuticæ,
causa São
guinearû
excretio-
num ex
illis locis.

difficili frequentius accidit, si ob secundinæ ab vtero post partum attractione, aut alia vi auulsam, osculis venarum diuulsis aut scissis, sanguis immoderatus profuat: Vel etiâ ob foetum, dum per hæc angustias transit, continuum soluentem, hoc eueniat: Vel per abortum, vasis foetus, vteri vasis connatis, nec sponte secedentibus, vti in foetu iam maturo in partu accidit, sed impetu hoc violento abruptis contingat.

Aut in coitu difficili mox ab initio, vel postmodum vi peracto, si læsio tanta fiat, vt sanguis inde emanet.

A' ceruicis vesicæ distentione nimia, vel etiam dilaceratione, ab instrumento dilatatorio, illi vt lapis vesicæ eximi possit, inserto, dum eam violenter ampliat, sanguinis magna sæpè profusio subsequitur.

A' recti intestini & podicis venarum læsione aliquâ, sanguinis per eum excretio etiâ prodit: quæ venæ cum non sint vnus sed duorum generum, & in interioribus venis, à meseraicis profectis, si hoc fiat, fluxus hæmorrhoidalis minimè naturalis inde subsequitur, nullius proin vsus, sed potius si præsertim vltra modum fiat, noxius. Si verò in exterioribus venis podicis extremum implicantibus, à vena caua prodeuntibus, læsio hæc fiat, sanguinis exiguus ille & nullius ferè momenti progressus accidit.

Cuius læsionis & solutæ cōtinuitatis causa, ab excretis per podicem frequentius procedit, vt à duris excrementis seu scialis magnis aluum nimium distendentibus; aut asperis quibusdam assumptis, podicem in transitu admodum vellicantibus: Vel ab excretionem per sinum vteri factâ, non solum eum sed & vicinum podicem nimio impulsu lædente: vt in partu difficili accidit. Quod & ab intrusis in anum suppositoriis acribus, & canali fistulæ vel sacci enematum, euenire potest.

Ab vicere sinuoso, à ceruice vteri rectum intestinum permeante, sanguinis menstrui fluxus per podicem progredi, præternaturalisq; omnino hæc illius excretio fieri potest. Nam quod citra illud, sanguinem menstruum suppressum, quò minus per vteri sinum possit effluere, natura per vicinum podicem ex-

pellat, illicque sibi viam faciat, vti aliqui docent, haud credibile: Cum nulla continuatio venarum menstrualium, quæ à vena caua, & hæmorrhoidalium, quæ à vena portæ descendunt, illic appareat, & proin sanguis eò minimè, nisi per apertam viam vlcus scilicet aut vulnus, possit transmeare.

In corporis exterioribus sedibus solutio continui à causis externis internisve profecta, omnium sanguinis florum, qui per aperturas præternaturales harum sedium procedunt, causa existit, sicuti nunc demonstrabitur: Licet & in illis morbis, quos excretiones hæ comitantur, causæ harum pleræque similiter fuerint expositæ. Quæ causæ potissimum quatenus huius illiusve partis continuitas soluitur, variant.

In cuticula si continuitas soluatur per abrasionem aliquam illius, à frictione ob pruritum factâ, vel aliâ aliquâ illius attritione procedente, sanguis obiter se tantum, si cutis simul radatur, manifestat.

Cute verâ illiusq; venis exilioribus simul dissectis, nisi vterius sectio pertingat, vix magna hæmorrhagia sequitur. Quæ illius sectio varicum vel tumorum detergendorum causâ instituitur, nec ab ea multus sanguis, donec illa etiam aperiantur, profunditur.

Venæ alicuius insignioris sub cute proximè latentis, si continuitas soluatur, sanguinis sequitur profusio. Quòd si secetur potissimum euenit; idque frequentissime in phlebotomia, quæ ad præcautionem & curationem morborum adeo est vtitata; In qua magna sanguinis fit profusio, si nō tempore conuenienti iterum supprimatur: Vel vena aliqua maxima cutanea temerè, vt iugularis, incidatur: Nonnunquā & in sectione venarum varicosarum, magna sanguinis copia ex illis exhauritur. Sed & casu nonnunquam euenit in sectionibus, cum aliis de causis cutis aperitur, vt ob hernias vel tumores præter naturam, vt tunc venæ hæ tactæ, vel alioquin à vulnere fortuito cutem scindente, simul vulneratæ, multum sanguinis emittant.

Nec solum à vulnere extrinsecus venæ inflato hoc accidit, sed & à sponte se aperiente venâ cutaneâ, perinde ac si secta esset, san-

Vena sectio seu phlebotomia, causa illius sanguinis effluxus.

Vena osculi aperta

Ponta-
nea, cau-
sa illius
Sanguis
nisi, flu-
at.

guinis illa spontanea profusio, citra illius sectionem procedit. Quam apertionem illius sanguinis plethora, aut feruor molitur, quæ licet eam sanguinis excretionem frequenter pariant, quæ per anastomofin apertis venarum osculis contingit, tamen ut venarum, ac si sectæ essent, continuitas ab hisce causis soluatur, cum vix euenire possit, rarissime illud accidit, nisi summa à sanguine fiat diffusio venarum, ut in varicosis fieri potest: Vel si etiam natura crebris in certa aliqua sede venæ sectionibus assueta, iis aliquandiu omisissis, sanguinem eò impetuosè impellendo, exitum venæ cutis vellicatione aperiat, quod eò facilius fit, si tenuis illic sit cutis, venæque solito, ob sæpè factam illic sectionem, amplior & proin tenuior, ut & in aliis locis in simili venâ, ab aliis causis attenuatâ, sanguis itidem profunditur.

Arter-
ia sectio
sive Ar-
teroto-
mia, cau-
sa illius
Sanguis
nisi efflu-
at.

Arteriæ apertio in Arterotomia, vel si alioquin vulneretur, sanguinis arteriosi validam illam effusionem parit. Ab arteriolæ denti substratæ dilaceratione, vehemens quoque & diuturna illa inde nata hæmorrhagia euenire potest: Nam si gingivæ tantum lædatur, quæ inde sequitur, nullius ferè momenti est. Si arteriæ quoque quæ sanguinem sub cutem fundendo aneurisma peperit, per sectionem cutis illi obducæ, via aperiat, periculosa illa sanguinis, ut dictum, sequitur profusio.

Partium
vulnus,
causa
Hæmor-
rhagiæ
typus.

Partes ex enarratis si plures simul vulnerentur, hæmorrhagiæ variæ inde oriuntur. Quæ vulnera aliàs in morbis necessitate urgente, ad abscessus profundiores aperiendos, tumores exsecandos, ut & calculos evellendos, vel rupturas curandas, insurgunt: aliàs casu accidunt. In quibus si venæ maiores aut plures vel etiam arteriæ una vulnerentur, hæmorrhagiæ abundantiores inde sequuntur. Quæ vasa maiora cum natura, ut securiora essent, in cruribus & brachiis posteriore ipsorum loco musculis immersa collocarit, vulnera quoque illic inflata, hæmorrhagias copiosiores proferent. Quæ ut in magnis vasculis ita se habent, sic si exiliiores tantum vulnerentur venæ, vel in carnosas magis sedes vulnus pertingat, hæmorrhagiæ minores subsequuntur.

Quod si quoque maioribus vasculis læsis, sanguis in cavitates internas, ut abdominis & pectoris præsertim influat, non magna illius per vulnus externum fiet profusio. Per eiusmodi vulnera studio facta, non solum sanguis, sed & res ipsa, quam auferre cupimus, e corpore cum sanguine excernitur, aliàs etiam ea quæ minimè prodire cupiebamus, si error committatur, vel casu vulnus inflatum sit: Sicuti in horum humorum aut partium excretis explicabitur.

Imprimis amputatis vel mutilatis membris quibusdam, largissimæ sequuntur hæmorrhagiæ: Cum id necessario agendum est, ob illorum vitia inemendabilia, aut corruptionem, ut brachiorum aut pedum, quorū portio alicubi in carnosâ sede, sectione prius factâ, postea ferâ esse dissecto aufertur: Vel quando digiti carne circumsectâ, forcipe auelluntur: Vel partes aliæ prominentiores ossibus destitutæ, ut nasus, aures, labia, cultri acie resecantur: Vel casu per vulnera fortuita hæ partes mutilantur.

Curatio.

PER anastomofin hoc est venarum osculorum apertionem, Hæmorrhagiæ procedentes, cum largiter plerunque sanguinem profundant, illæ primum explicandæ, præsertim cum cura harum in aliis morbis, quorum symptomata interdum sunt, non fuerit exposita.

Aurium hæmorrhagia copiosa, ab anastomosi venarum profecta, cum raro accidat, nec nisi ob magnam plethoram contingat, curam priuatam minimè exigit, si narium hæmorrhagiæ copuletur, huic potius cura debetur.

Aurium
hæmor-
rhagiæ
curatio.

Narium hæmorrhagia, si commodum adferat, veluti illa quæ plethoram minuit aut tollit, in sanguinis redundantiâ, vel ipsius impuritatē aufert, morbumque sistit in crisis, sisti aut impediri minimè debet, nisi toties repetat, aut tamdiu persistat, ut vires inde labantur. Nō necessaria nec utilis, aliis de causis eueniens, ob sanguinis feruorem, tenuitatem, fluxionem aut vim læsionemque indutam, si immoderata sit, eò citius cōpesci debet: si moderata aut pauca exstiterit, vel sal-

Narium
hæmor-
rhagiæ
curatio.

tem.

tem obiter mucro permistus pdeat sanguis, negligitur, & si ab vlcere alioq; morbo proueniat, hūc potius cura adhibenda.

Methodus curandi est, vt causæ occurramus, si præsertim hic affectus, quòd frequentius infestet, noceat, tunc eo potissimum tempore, quo aliquas dat inducias, si ob plethoram accidat, prouentū sanguinis impedire debemus, copiamque illius minuere, si ob feruorem vel tenuitatem, eum contemperare & incrassare. Vrgente verò iam hoc malo, dum sanguis effluit, illum ad nares imperū fluentem, ab iisdem retrahere studdebimus, viasque intercludere, indeq; eum repellere. Quæ omnia sequentibus mediis perficiuntur.

Sectio venæ brachij illius lateris, è cuius nare sanguis emanat, cum vt sanguis in locum illius qui effluit, sequatur, & deorsum à capite subsideat, efficiat, sic reuellendo eum à naribus, proderit, per quam tamen nō larga illius copia, cum alioquin propter hæmorrhagiam narium deficiat, emittenda, sed saltem vbi sanguis obiter saliendo fluxum eò cōuerterit, rursus venā clausā supprimendus, & si opus sit, venā denuò per interuallum aliquod reclusā, portio illius saltu vno aut altero saltem depromenda, quod sic repetitis vicibus factum, & egregiè cursum sanguinis eò diriget, nec tum exigua hæc quantitas, in plures vices diuisa, corpus admodum exhauriet.

Scarificatio quā ad motis cucurbitulis, sanguis & attrahitur & elicitur, eodem modo vt venæ sectio operatur, nisi quòd non tanto impetu, tunc per capillares venas cutis prodiens, vt si per venam aliquam manifestam apertam fluere, feratur. Talis autem scarificatio in scapulis & colli lateribus commodissime instituitur: Aliàs etiam in distantioribus locis, vt in carpo factam aliqui peculiariter probant.

Sanguisugis post aures ad motis, sanguis exuctus, è naribus fluentem quoq; reuellit.

Cucurbitulæ cum multa flamma sedibus capiti vicinis affixæ sæpeq; repetitæ, admodū sanguinem alliciēdo, deriuant; vt si colli lateribus, supra vasa ascendētia, item homoplatis & scapulis apponantur: Reuellantur

quoque mammis in mulieribus admotæ: Imprimisque si hypochondriis magna cucurbita, Ventosa dicta, apponatur, atque vt volunt dextro, si è nare dextrā, sinistro si à sinistra sanguis profluat.

Ligaturæ vinculis fasciis vel chordis factæ, quibus brachia vel pedes validè stringuntur, sanguinis impetum per totum corpus concitatum, & nimium illius per nares fluorem, nonnihil cohibēdo, vel etiam eundem à capite retrahendo, vel reuellendo aliquid operantur, si eousque vt rubor inde contrahatur, vel amplius vt dolor inde sequatur, nexus stringatur; quod reatius in digitis manuum aut pedum, vbi minus periculi, moliendum, siquidem in testibus, vt docent, id peragentes, res est periculi plena.

Frictiones extremitatum vehementes adeo vt partes inderubeāt, sanguinem quoque deorsum reuellunt.

Exhibitis purgantibus, si sanguis biliosior aut serosior sit, quia ille irritando fluxū mouet, hic tenuitate suā ad fluendum habilis, bilem & serosos humores ab eo expurgando, vt minus profluat, efficimus: Hacque sanguinis mundificatione, in eiusmodi hæmorrhagia diu aliquos molestante curandā, plurimum sæpe præstitimus.

Vtimurq; in eum finem mitioribus, ne calidioribus catharticis & acribus sanguine magis accendamus, ægrumq; debilem: dein & illis quæ adstrictione quadam simul prædita, fluxum nonnihil cohibent; Vt Rhubarbaro, Myrobalan. succo & syrupo Rosarum, Sennâ similibusque ex hūc compositis: Vel etiam in biliosi serosiq; humoris copiā, fortius eos expurgantibus, passim in aliis eiusmodi affectibus descriptis.

Alterantia exhibemus, quæ vi refrigerante & astringente prædita, sanguinem incrassando, vel aliā proprietate quadā hunc fluxum sistant, eaque variis formis.

Decoctū probetur imprimis Pentaphylli, Plantaginis, Burse pastoris, Polygoni, Myrti vel Myrtillorum, Consolidæ maioris mediæ & minoris, Equiseti, Pilosellæ, Pyrolæ, Saniculæ aliarumve plantarum, quæ in vulneribus propinantur, ad ea sananda, ad-

ditis Lactuca, Nymphaea, Acetosâ & floribus Rosarum.

Syrupi ex harum plantarum decocto parari possunt, vel vſitati ſumi, in hæmoptoica paſſione nominati, & præter hos acidus vt ſyrupus Acetofus, Limonum, Granatorum, Cydoniorum & refrigerans, vt Nymphaea.

Succi itidem enarratarum plantarum, & qui in hæmoptoica paſſione deſcribuntur, eo modo, vt illic dictum, propinati conueniunt: Et cum illis acidi quoq; ſucci, ex quibus ſyrupi parantur: Vti & vinum Granatorum, Omphacium atque Acetum, hiſce permisceri, vel in condimentis ſumi poſſunt.

Aquæ deſtillatæ ex eiusmodi plantis, ſimiliter poſſunt exhiberi, ſicuti in hæmoptoicâ paſſione declaratum; vt & Acetofæ, Nenupharis & Rosarum.

Pulueres trochiſcorum in hæmoptoica paſſione expoſitorum hîc quoque competunt, vel etiam ex aliis validius quàm in peſtoris affectibus neceſſe ſit, adſtringentibus parantur, Vt: R̄. Boli vel Terræ ſigill. 3. ij. lapidis Hæmatit. Coralli rubri an. 3. j. Cornu tauri vel Cerui vſti 3. ſ. Balauſt. ſemin. Plantag. an. 3. j. fiat puluis.

Conſeruæ vtilis florum Rosarum antiqua, Violarum, Nymphaeæ, Cichorij, foliorû Acetofæ, conditura radicis Symphiti, &c.

Miſturæ ſeu electuaria, ex conſeruſ pulueribus & ſyrupis hiſce fiunt; Vel vtimur hoc quod in hæmoptoica paſſione: R̄. conſeru. Rosarum antiqui. & conſeru. Violarû, &c.

Potiones itidem ex ſyruporum, ſuccorum, aquarum & puluerum commiſſione fiunt: Vel dantur quæ in hæmoptoica paſſione propoſitæ fuerunt.

Aliâ vinimirum ad naturæ facultatem expultricem hanc commotam compescendâ, exhibetur Narcotica, quæ vt in hæmoptoica paſſione oſenſum, eam ob cauſam hîc quoque proſunt. Poſſuntq; eadem Opiatæ illic expoſitæ vſurpari, vel pilulæ Cynogloſæ, ſyrupus de Papauere; Vel etiam puluis illic recensitus; Abiæ in doloribus colicis præſertim expoſita, eligendo ex illis quæ minùs calida recipiunt, quibus ea contemperari, cum per ſe calida ſint narcotica, malè putant.

Induntur naribus quæ vi ſiccâtæ & adſtringente, venas apertas cōſtringendo claudât, vel nonnihil adurentem cruſtam obducendo, eas ſic obducant, vel emplaſticâ ſuâ ſubſtantiâ ſe illis adglutinâtia, ſanguinis effluxum cohibeant. Talia autem vel in forma errhini naribus attrahuntur, vel vnguenti tenuioris ſpiſſorisve cum penicillo aut digito imponuntur, vel linteo ſpongiolâ exceptâ introtruduntur, aut pulueriſata inſuflantur: Fiuntq; ex ſequentibus.

Plantæ aliquæ parum conquaſſatæ indi poſſunt, veluti Plantago, Equiſetum, illiûsve radix, Burſa paſtoris, Millefolium, Lyſimachia aliæve adſtringentes: Probatum & Porrum, Ocymum, Vrtica, Betonica & Ruta à Dioſcor.

Succi item harum plantarum attracti vel illiti.

Puluis qui naribus inſuflatur, vel albumine. Oui addito interdum & Aceto exceptus inditur, ſequens conuenit:

R̄. Thuris part. ij. Aloës part. j. fiat puluis ſubtiliſſimus, qui naribus inſuflatur vel excipiat Albumine oui, addendo interdum parum Aceti, & ſic penicillo vel linteo molli aut bombace, excepta indantur. Teſæ araneæ vtiliter permiscantur, vel fungus quem Crepitem lupi vocant. Pilos leporis minutim incisos communiter permiscant, verum cum adeo minutim incidi, aut conterî nequeant, quin nares pungendo a ſternutationem faciliè compellant, ſatiùs eſt eos omittere.

Alter ſimili modo vſurpandus: R̄. Gallarum 3. j. Acaciæ, vel Hypociſtid. Sanguinis draconis, Mumie an. 3. ſ. Vernicis 3. j. miſce, fiat puluis.

Huic pulueri etiam de priore puluere aliquid miſceri poterit, ſicq; vſurpari.

Tertius valde efficax: R̄. Boli, Gypſi ana. 3. j. Chalcanti, & Aluminis vſtorum an. 3. ſ. fiat puluis.

Trochiſcorum de Succino puluere ſimiliter vt poſſumus.

Stercus aſininum valde probatur, tum aſrefactum, tum recēs vel ſuccus inde expreſſus Aceto dilutus: Addendo quandoque & de prædictis pulueribus vel ſuccis parum.

Ster-

Stercus suillum similiter in illius penuriâ vsurpari potest.

Cineres item combustarum Chartarum, Panni lintei & Lanei, Pilorû leporis, Bombacis, Spongiæ, Testarum ouorum per se vel cum Vitello vstarum, item Cochlearum & imprimis Ranarum : Fuligo camino adhærens etiam utilis.

Sanguis qui è naribus fluit, si compressâ vel obturatâ nare, è qua manat, tamdiu retineatur, donec concrescat, vasa obliterando, vt fluxus illius cohibeatur, efficit. Idem facit, si portio illius qui effluxit, per se vel cum vitello ouorum mista, tosta & vsta, vt puluerisari queat, indatur.

Telæ aranearû tum solæ, tum farinâ quæ in molendino dispergitur imbutæ : Fungorum item quos crepitus lupi vocant, siccatorum molissima & leuissima substantia lanuginosa : Pappi item florum Salicum aliarumq; plantarum, vti & Populi albi illiusq; foliis adhærens lanugo, prius in Aceto macerata siccataque, si naribus intrusa, venam quæ sanguinem profundit, tangât, citò eam obturant, opitulante simul sanguine, qui còcretus illis adhærescit.

Panni lintei vel sericei aut Bombacis, scriptoriis immergi in illisq; retineri ad scribendi vsum solitorum exempta aliqua portio, si siccetur naribusque intrudatur ; Vti & in puluerem redacta ac immissa, valde iuuat :

Chalcidis & Auripigmentum subactum cum Stercore asini, additis & succis.

Odor Aceti acerrimi iuuat, cui & Camphoram aliqui prius addunt.

In ore contineat Aquam frigidissimam, sapè eam vbi tepuerit renouando.

Applicantur extrinsecus variis corporis sedibus, ad hæmorrhagiam narium sistendâ, tum quæ manifestâ qualitate tum occultâ vi operantur.

Manifestâ qualitate illud agentia, sunt quæ actuali frigiditate, aliàs etiam potentiâ, sanguinis caliditatem feruoremque retundendo, eumque quasi nonnihil coagulando, minus fluxilem reddunt, atq; vi astrictoriâ vias per quas sanguis labitur, constringendo, cursum ipsius interceptant. Quæ sequentibus locis apponuntur.

Colli lateribus, per quæ iugulares venæ & arteriæ ascendentes ad caput, in interiora narium quoque ramos transmittunt, commodissimè applicantur, vt sic scaturiginem huius sanguinis inde prodeuntem aliquo modo intercludant. Quæ & temporibus & fronti apposita illic sanguinem quoque refrigerando & condensando iuuant ; Paranturque ex sequentibus.

Epithemata sunt ex Aquâ & Aceto, ea separatim vel mista cum panno linteo intincto, frigidissima dictis sedibus applicando, quibus & reliqua facies madefieri poterit.

Addi poterit & succus Plantag. & vt melius se affigat liquor hæreatque, Albumen oui conuassatum vel Farina volatilis molendini, & loco aquæ communis, aqua Plantaginis, Bursæ pastoris aliæ ve adstringentiû plantarum, & in delicatioribus aqua florum vel peculi Rosarum sumi : Succus Vrticæ temporibus illitus, admodum sanguinem fluentem sistere dicitur.

Applicationes aliæ spissiores diutius hærentes sic sunt : R. succi Plantag. ʒ. iij. Aceti rubri vel rosarû ʒ. ij. Omphacij ʒ. j. Boli ʒ. vj. Sanguinis draconis ʒ. ʒ. Cortic. mali granati aut Balaustior. ʒ. ij. farinæ Tritici vel Amyli ʒ. j. Albuminis oui conuassati numero iij. misceantur : Et sic bombace vel panno excepta applicantur.

Alia : R. Gallarû ʒ. j. Thuris vel Mastiches, Vernicis an. ʒ. ʒ. Acaciæ vel Hypocistidis loco Licij ʒ. ij. Lapidis hæmatitis ʒ. j, fiat puluis, excipiat succo conuenienti, vt Plantagin. vel Bursæ pastoris vel Polygoni, vel Lapatij sanguinei aliarumve plantarû stipticarum : Item Aceto & Albumine oui, vel infus. gummi Tragachanti : Pro applicatione.

Hiscæ applicationibus & alijs pulueres adstringentes addi possunt, vt Terræ sigillari solitæ, Cimoleæ, Argillæ, Coralli rubr. Spodij, Stercoris asinini vel Suilli, rad. Bistortæ, Nucum cupressi, seminis Myrtillorum.

Emplastra sanguinis fluentis impetum in oculum compescencia, in ophthalmiæ cura descripta, hic quoque possunt competere. Quale illud est quod valde adstringit, & aliud quod operosum magis esse illic diximus, fronti & temporib⁹ apposita. Item De-

sensuum commune ex bolo ibidem descriptum, quod valde proderit, si ex eo duo emplastra fiant, & colli lateribus vtrunque, supra venas iugulares admoueantur.

Vnguenta etsi inualidiora sint, hisce sedibus quoque inungi possunt, ex oleis astringentibus, vt Rosarum, Omphacino, Myrtillorum, Lentiscino, additis Succis prædictis & Aceto, pulueribusque adstringentibus.

Vel hoc vsurpari, quod post defensuum prædictum in ophthalmia expositum est.

Cataplasmata ex herbis adstringentibus, quarum succum conuenire diximus, contusis similiter prodesse possunt, sedibus prædictis admota, quibus & alia ex prædictis adde-
dere licet.

Testibus, cum multa vasa sanguinem deferentia admittant, & consensum magnum cum vniuerso corpore habeant, (vti ex mutatione temperamenti, si castrentur apparet) refrigerantia admota, admodum narium hæmorrhagiam compescunt.

Vt si foueantur testes, Panno vel Spongiâ madefactâ, vel imbutâ Aquâ frigidissimâ per se existente, vel refrigeratâ niue aliòve modo, cum hic minus quam si circum caput hæc apponeretur, sit periculum. Item Aceto aliisve epithematibus, quæ & collo, temporibus & fronti applicari docuimus. Vel etiâ aliæ illic descriptæ applicationes adhibeantur.

Mamillis eadem applicita, cum & illic venarum sit copia, similiter operari possunt.

Manuum & pedum refrigeratio iterata sæpè pariter iuuat. Quæ sit lotione harum partium cum Aquâ vel Aceto intense frigidis, vel madefaciendo præcipuè volas, & plantas aut carpi regionem, vbi arteriæ pulsant, hac ratione. Vel Silices, Ferrum aliæve dura corpora frigida, manibus tenenda: Vel pedibus eorum latæ Laminæ ex lapidibus sectæ, vel Plumbo conuassatæ, substernendæ.

Axillis hæc supposita, cum & illic venarum sit concursus, multum prestare possunt.

Corpus vniuersum capite dempto, aquæ frigidæ si immergatur, sanguine vti dictum refrigerato, fluxus illius hac arte quandoque compescitur, & in robustioribus calidiori-

busque, annique tempore feruidiore, vsurpari potest, in debilitatis verò iam ex fluxu, omitti.

Hepatis regioni cum sit sanguinis officina, vt statim sanguis in prima illius generatione temperatio minusque feruidus gignatur, quæ illud non nihil potest potius quam actu refrigerant maximeque si calidius sit, illius intemperiem hanc castigent, adhibeantur.

Vtpote epithemata, qualia in curatione hepatis inflammationis, & febrium continuarum putridarum inueniuntur: item in iunctiones & sacculi in cura eorundem affectuum descripta.

Occultâ vi & incognitâ, narium hæmorrhagiam compescere solo contactu, creduntur Amuleta quædam sequentia, si collo appensa, vel circumligata vel manib. gestata versatæque corpus nudum attingant.

Ex gemmis parati globuli sicut traiectione, vel aliter formati sic vsurpantur: Conuenitque imprimis Iaspis, Sarda Carniola aliàs dicta, Onyx Chalcedonius dictus, Coralliū item. Quæ & si actu frigida collo circumdata, iugulares & soporales illic arterias ascendentes, tangant, frigiditate simul sanguinis fluorem compescunt.

A plantis gestata tactæque profunt, Clematis, Bursa pastoris, radix Bistortæ, Mucus qui cranio humano accrescit, & buxo adnascitur.

In ore retentum lapidem Cyprinū prius refrigeratum, citissimè narium hunc fluxum compescere docent. Quem aliqui esse putant cartilaginem quadratam, capitis & primæ vertebræ articulo interpositam, partim cartilaginofam, partim osseam, & pro iam eum in palato vel faucibus inueniri docent. Verum cum alius lapis in cerebro carpionis inueniatur, propè oculi illius superficiem, qui semilunaris est, duriorque & in reliquis piscibus lapilli ibidem formâ similes quoqueprehendantur, vt in perca cæterisque, hunc potius pro vero haberem. De gemmis prædictis globuli ori quoque indiri, in aqua frigida, vbi incaluerint rursus refrigerati, si extrinsecus admoti, fluorem hunc compescunt, longè efficacius sic adhibiti id præ-

fic adhibiti id præstabunt. Peruincæ radix, linguæ supposita idem efficere scribitur, & radix Dentis leonis, ore contenta.

Capiti si folia Vrticæ insternantur, atque integumêto ipsius substernantur, sanguinis fluorem è naribus compescere aiunt: vti & si Frons succo Vrticæ admodum madesiat.

Cùm imaginatio faciat casum, non reticendum, quod multi certissimum remediũ esse affirmant, si cum sanguine qui è naribus effluxit, scribatur in fronte patientis, Consummatum est. Reliqua supersticiosa, præsertim impia, lubens prætereo.

In Vitæ regimine cùm quædam vsurpata iuuare possint, alia nocere, illud sic instituendum.

In aëre versetur frigidus potius quàm calido, eoque obscuro, vel saltem non luce nimia, radiisquæ solaribus illustrato, cùm talis nares irritando, facultatem illius expultricem ad sternutationem vsq; facile commoueat. Vti & si odore vehementi imbutus naribus trahatur, ob quam rem odorata nimium viciet. Intuitum ipsius sanguinis aut rerũ rubrarum eundem commouere vulgò putatur. Quod ab imaginatione fortè procedit.

Cibis vtatur qui huic malo obnoxij sunt, qui sanguinem gignendo, eum minus fluxilem reddant. Vti crassus & glutinosus Pedibus iuniorum animalium bene coctis, similibusque; Caseo recenti leuiter salito, Oryzatis, Hordeatis, Amylatis: Dein & astringentibus fructibus, Cydoniis, Pyris; Et refrigerantibus oleribus, Intybo, Lactucâ, Portulacâ coctis vel crudis actuque frigidis, in acetariis. Ab aromatibus & salis caueant.

Potu vtantur Aquæ, & à Vino abstineant, dum hoc affectu premuntur, nisi virium causâ illius concedatur. Et qui facile in hunc casum incidunt, si à Vino sibi temperare nequeant, ebrietatem tamen vitent: Vinumq; non potens vel dilutum, vel rubrum, & non nihil austerum bibant.

Quies corporis iuuat, cùm nimius illius motus hunc fluxum concitet. Ideò partes, præsertim loco affecto vicinæ, non nimio motu commoueantur. A' sermone vel longiore vel altiore abstineant. Et inter masti-

candum nullam violentiam adhibeant, sed moderati sint.

Decubitus supinus, capite declinui, cùm sanguis tunc retrocedat, aliquid adiuuenti adferre poterit, si modò non ob hunc situm capitis sanguine in fauces delabente, per os exeat, vel vltèrius inde descendens, maiorem noxam adferat.

Animi subita commotio per terrorem, sanguinem extra fluentem, ad interiora subito propellendo, sistit. Quæ perterrefaciendo ægrum, si vires ferant, induci poterit. Defectio omnimoda animi in illius deliquio, illud adhuc amplius molitur, & citissimè fluorem sanguinis suppressit. Quam datâ operâ, cùm citra periculũ non possit fieri, vix conciliare debemus. Spontè tamen ea ex nimia hac per nares profusione superueniente, hunc fluore, qui prius nullis remediis compesci potuit, cessasse, sæpè obseruauimus.

Per sinum vteri factæ hæmorrhagiæ, in *Menstruâ præternaturali fluxu vti reliquarum per vteri sinu sanguinea excretionum curatio.* foemineo sexu naturales, etsi paulò à mediocritate recedere videantur, sicuti pro naturarum varietate, plus minúsve fluere solent, nondum tamen grauiore affectus inducentes, nõ temerè aut per vim erunt suppressendæ. Quod si verò noxæ grauiore, inter quas & hydrops existit, metuantur, aut iam insistent, tunc maturè succurrendum. Veluti si menstrua purgatio consueta immoderatiùs vel frequentius quàm par erat, eueniat: Vel diu prius suppressis menstruis, cum tumore ventris vel sine eo, tandem hæc cum magna sanguinis profusione, summoque virium & vitæ discrimine erumpant. Vel si purgatio sanguinea post partum fieri solita, modum excedat, maximè illa quæ est in abortu, copiosissimè sæpè accidit, atque vti & partus præternaturalis est, nec minús quàm aliæ interdum periculosa. Quæ præternaturalis omnino ex vteri sinu procedens est hæmorrhagia, qualis illa est, quæ tempore quo menses amplius fluere minimè debebant, senescentibus mulieribus euenit, cùm citra læsionem diutius perseuerare nequeat, cura huic similiter debetur, eoque magis, si & hæc immodicè vel sæpè contingat, vel diu duret. A' vi externâ, maximèq; ob congressum, quæ sequitur sanguinis excretio, si in

devirginatione accidat, cum adeo copiosa non sit, nec ita noceat, & pro bono signo, vti dictum, habeatur, negligitur, præcipue si menses maturius ob hanc refractionem fluant: Si vero ob læsionem graviolem, vel primum hunc aut alios congressus, immoderata sequitur hæmorrhagia, & huic si perseveret, sistendæ cura adhibebitur.

Quæ in extractione lapidis è vesica mulieris, per dilacerationem cervicis illius, hæmorrhagia oritur, non aliam quam quæ in aliis vulneribus adhibetur, curam exigit.

Curatio autem in omnibus eiusmodi & menstruis & aliis per vterum factis hæmorrhagiis, instituitur per ea, quæ sanguinem euacuant, & ab vtero aliò retrahunt & derivant: quæ eum puriorem, crassiorè minusq; fluxilem reddunt, & vias per quas eò deferretur, intercipiunt, vel proprietate quadam incognita agunt: Vno ex his mediis sequentibus exhibitis a motisve, vel pluribus simul pro ratione causæ in cura procedendo, causasque ante omnia, quæ hisce fluxionibus occasionem præbuerunt, quales sunt, vis adhibita, ciborum calidiorum & acriorum usus, motus corporis vel animi nimius, aliasque tollendo.

Venæ sectio, antequam hæmorrhagiæ eiusmodi superveniant, in illis quæ ob plethora hæc obnoxia sunt, euacuationis gratia in brachio instituenda, quæ & in gravidis, si in partu prius illas passæ fuerint, concedenda, cum cõstet, eam tunc non semel saltem factam, sed & repetitam, in hoc aliòve à plethora nato casu, plurimùm contulisse, neque fœtui alimoniam, vti putabatur, subtraxisse.

In ipso etiã paroxysmo, ad sanguinis fluxum hunc, per illius hanc emissionem reuellendo, sistendum, vena in brachio vel manu aliòve in superioribus loco aperta, competit, non autem inferioribus, cum in pedibus facta, menstrua, vt alibi dictum, prouocet. Exigua autem, vt ritè fiat, illius quantitas emittenda erit, & successiue per vices hoc potius faciendum, quam vnâ vice multum sanguinis emittendum, cum aliquin corpus per hæmorrhagiam exhauriatur.

Cucurbitula magna vel plures parvæ, sub mammis appositæ, admodum reuellendo

profunt, cum venæ harum; cum vteri venis magnum consensum habeant. Quæ & dextro hypochondrio, scapulis item affigi possunt. Ligaturæ, Frictiones in extremitatibus factæ, vt in cæteris hæmorrhagiis, sic & istis reuellendo profunt.

Sudorem frequenter mouere balneo sicco, aliisve, serum exhauriendo, si illud in sanguine redundans, nimio huic fluiori occasionem præbeat, plurimum ad præcautionem iuuabit, cum dum hoc affectu laborant, eos ad sudores adigere, & sic corpus accendere, humoresque commouere, noxium ipsis potius quam vtile esset.

Purgantia exhibentur, si sanguis quia ferro nimium abundat vel bile perfusus est, hunc fluxum concitet, ad eum ab hisce repurgandum. Quod commodius ad præcauendum, antequam ille fluor oboriat, perficitur, cum tunc etiã paulò fortioribus vti, eaque aliquandiu continuare liceat. Quod hæmorrhagiã iam virgère, tunc facere minimè possumus, cum tunc non solum vires non nihil dejectas amplius prosternerent, sed & corpus accendendo, irritando & commouendo, fluxionem augerent.

Itaq; si tunc alui quædam lenitio aut purgatio, ob constipationem aut illuviem in primis viis potissimum collectam requiratur, leuioribus laxantibus id molendum, illisq; quæ astrictione aliquam post se relinquunt, vt rhabarbaro, myrobalanis, similibusq; in dysenteria expositis, è quibus multa hæc quoque possunt competere.

Vt & sequens potio: quæ R. Tamarind. Prunor. acidulorū ossibus exemptis an. ʒ. vi. corticum Myrobalan. citrinarum ʒ. ʒ. fiat decoctio in Aqua & tertiã parte Vini rubri, & in colatura infundè Rhabbari ʒ. ʒ. Spice ʒ. j. fiat expressio, adde syrupi Rosarū rubr. siccarū ʒ. j. Capiat vna vice: Si folia Senæ in decocto addantur, efficacius operabitur, nec dū adeo naturam irritabūt, cum succus horum, decoctione elicitus, cum succo rhabbari & colore croceo, & odore aduerso magnam habeat similitudinem, ex quo & viribus non adeo dissentire, colligimus, vt & ex eo, quod tantopere in variis affectibus vti & biliosis æquè ac rhabbarum vsurpentur.

Poteſt & talis hauſtus exhiberi: R. cortic. Myrobalan. citrin. puluer. ʒ. ij. inſundantur in Vino rubro, addendo & Spicæ ʒ. ij. fiat expreſſio, adde ſyrupi Roſarum ſolut. ſimplic. ʒ. j. Rhabarbari ſubtiliſs. puluerizati & diligēter permixti ʒ. ij. vel ʒ. j. Sumat vno hauſtu.

Tryphera Perſica ad ʒ. ʒ. ſumpta, cum aſtringentia multa & feruorē ſanguinis contemperantia recipiat, idem præſtabit.

Compoſitiones alias calidas acres, ſcamoneā vel agaricum, turbith, &c. recipientes exhibere, in largo ſanguinis fluxu, nō eſt tutum, cum ſtimulando menſes euocent.

Alterantia exhibemus quæ in craſſando ſanguinem, illiusque feruorem contemperando, viasque aſtringendo, ſanguinem fiſunt, ſequentibus formis. Qualia multa in aliis hæmorrhagiis expoſita, & præcipuē narium & hæmoptoica paſſione, hīc quoque poſſunt cōpetere. Imprimis verò in hiſce vteri fluoribus ſequentia cōmodē exhibētur.

Cibentur craſſiorem ſanguinem gignentibus, ex farinis cerealium fructuum & leguminibus vſitatis paratis. Et Carne glutinoſā, Caſeo recenti. Quibus & Lac acetofum addunt; Ovis itidem & ſimilibus, in aliis hæmorrhagiis, vti & miſtionis immoderate cura expoſitis.

Fructibus vtantur aſtringentibus, crudis vel coctis, vel condimētis variis ex hiſce paratis, vt Cydoniis, Pyris auſteris, Cornis, Sorbis, Meſpilis, Moris, Rubo, Rubo Idæo, Prunis ſylu. Fragis, Berberis, Ribes, Myrtillis.

Ex oleribus conueniunt Portulaca, Laſuca, Endiuia, Cichorea, Acetoſa, Plantago cocta in iuſculis, vel cruda in Acetariis; Quibus & aliæ plantæ, in decoctis expoſitæ, quæ minùs ſapore medicamentoſo nauſeam pariunt, addi poſſunt.

Decocta vel vnā vel pluribus vicibus bibant, quæ ſi diutiùs aſſeruari debent, in formam ſyrupi priùs rediguntur.

E quibus ſyrupis vſitatis confert imprimis Myrteus vel Myrtillorum, de Roſis rubris ſiccis paratus.

Vel fiat tale decoctum: R. radic. Conſolidæ ʒ. j. herb. Plantag. cum radic. Burſæ paſtoris, Millefolij ana M. j. flor. Roſar. rubr. P. j. Balauſt. ʒ. ij. ſem. Myrtillorum, Plantag. ana

ʒ. j. fiat decoctio in Aqua pluuiali vel ferrata aut chalybeata, adde colaturæ Sacchari q. ſ. fiat potio pro tribus vicibus, vel cū Saccharo coquatur in formam ſyrupi ad vſum.

Ex aliis etiam variis decocta fieri poſſunt, in hanc rem idonea, è quibus multa in aliis quoque hæmorrhagiis fuerunt expoſita. Veluti ex decocto herbarum, ex quibus & vulnerariæ diſtæ parantur potiones, vt ex Pyrolā, Agrimoniā, Caudā equinā, Saniculā, Potentillā, Piſoſellā, Conſolidis, Polygono, Fragariā, Auriculā vrſi, Sumach, Virgā paſtoris, Pulmonariā, Lapath. ſanguinario, Sanguiforbā, Acetoſā, Portulacā, Lunariā, Ocy-maſtro, Menthā, Perſicariā maior. Phœnice, Symphyto petræo, Flore ſolis cum radic. ſolis Myrti, Lentifci, Oleæ, Quercus, Rubi: Item ex rad. Gariophyllat. Rubi Idææ, Nymphææ & floribus Medij, Peucedani: Ex ligno Sārali rubri, Braſilij, Lori arbor. cortic. Oleæ, nucleis Granatorum, Roſarum. Vuarum.

Ex ſpica Milij Indici, Amaranthi purpur.

Succi aliqui propinantur, vel crudi vel cocti in formam ſyrupi aut rob. Veluti ſunt ex vſitatis ſuccis fructuum acidorum & aſterorum, Cydon. Granat. Ribes, Berberis. Qui & ſucci citra coctionē ſi addito ſaccharo in ſole efferueſcant, vinoſum ſaporem & odorem adipiſcentes, gratiores fiunt. In tabulas quoque eiufmodi ſucci cum ſaccharo cocti rediguntur, valde ſuaues & elegātes, addendo inſuper aquam Roſarum, Plantag. aliæve. Sed & horum ſuccorū loco alij quoque acidi, vt Citri, &c. in has formas reſacti, vſurpari poſſunt.

Plantarum quarundam ſucci ſimiliter exhiberi poſſunt, per ſe, vel cocti, veluti ex vſitatis ſucci Plantagin. Acetoſæ, Portulacæ, in ſyrupos reſacti. Quā ratione alij, vt Burſæ paſtoris, Millefolij, aut ab enarratis in decocto plantis expreſſi dari poſſunt. Et vt docet Dioſcorid. ſucci Clymeni & Barbæ hirci ac Perſicariæ.

Aquæ quæ bibuntur vel cum aliis miſtæ ſumuntur, Plantaginis, Roſarum rubr. illarumque cuſpidum, Burſæ paſtoris, Portulacæ, Acetoſæ, aliarumq; ſupradictarum plantarum: Aliqui Limacum etiam probant: Aqua itidem extinctionis ſerri conuenit.

Mucilaginosà à quibusdam exhibita probantur, vt Albumen oui, mucago sem. Cydon. infus. Gummi tragach. &c.

Conserua Rosarum antiqua, & Morfelli ex Rosar. rubr. puluere cum Saccharo cocto paratæ competunt. Item conditum vel conserua radic. Consolidæ. Efficax est & conserua ex floribus Mali punicæ parata: Vel aliæ ex Acetosâ aliisve plantis supradictis quibusdam ipsarumve radicibus aut floribus paratæ conseruæ & condituræ.

Pulueres qui per se vel cū additione Sacchari rosac. sumuntur, vel cum Vino aut Aquis bibuntur, aut electuariis vel potionibus miscetur, ex vſitatis sunt, trochiscorum quorundam sequentium pulueres.

De Charabe vel succino distorum, qui ꝛ. fuccinum, gūmi arabic. tragach. mastichem, thus, laccam, acaciam, hypocistidem, cornu cerui vſtum, corallia, balaustia, sem. papau. nigri, crocum, mucilagin. psyllij.

De Terra lemnia trochisci: ꝛ. terram lemniam, bolum, hæmatitem, corallia, margaritas, cornu cerui vſtum, spodium ex ebore, fuccinum, gummi arabic. tragach. thus, acaciam, hypocistidem, sanguinem draconis, rosas, balaustia, semen portulacæ, rosarum, papau. nigri, gallas, amyllum assum, aquam plantag.

De Spodio trochisci ꝛ. spodium, gummi arabic. semen acetosæ, portulacæ, coriandri, gran. sumach, berberis, amyllum torrefactū, omphacium.

Horum loco sequentes fieri possunt pulueres, quorum hic à plantis concinnatus sequentibus vel paucioribus etiam: ꝛ. foliorum Plantag. vel Agrimonie vel Equiseti, Myrti vel Quercus, florum Rosarum, Balaust. ana 3.j. femin. Plantag. Acetosæ vel Lapatij, Portulacæ, Coriandri præpar. Cimini torrefact. ana 3.ß. Nucis cupressi vel gallarū, granorum Myrti vel Myrtillorum, Berberis vel Oxyachanthæ, Sumach, nucleorum Rosarum vel Granatorum, Vuarū ana 3.j. cortic. inter. rubri Auellan. Castanearum vel Glandium ana 3.j. Santali rubri, Nucis cupress. ana 3.ß. Spicæ 3.ß. Acaciæ vel Hypocistidis, Gummi arabic. Thuris vel Mastiches, Sanguinis draconis ana 3.j. fiat puluis, qui

exceptus infusione gummi Tragachanti factâ in aqua Rosarum vel Plantag. in trochiscos singatur, si asseruari diutius debet.

Alius ex aliis sic fit: ꝛ. Succini, Coralli rubr. Boli vel Terræ lemnie ana 3.j.ß. lapid. Hæmatitis 3.ß. Margaritar. 3.j. Cornu cerui vſti, Spodij ex ebore ana 3.j. Ofsis sepiæ 3.ß. cinerum rest. Ouorum 3.j. fiat puluis ad vsum vti prior.

Ex commistione horum efficacior redditur, vel permissione etiam sequentium, ex quibus & alij formari possunt. Veluti ex cortice Suberis, Granat. inuolucro Palmularū, lanugine in fructibus Rosarum, Bedeguar in rubis, Glandibus, Castaneis tostis, baccis Virgæ sanguineæ, testis Nucum, ofsibus Datylorum vſtis, cineribus Vrticæ mortuæ, fructibus siccatis cum nucleis Mororum, Sorborum, Cornorum, Mespilorum, seminibus Limonij, Iunci marin. Nymphæ, Pæoniæ, Tragij ricinis, Mumia, Coagulo hædi, leporis, aliõve, pelle Anguillæ, lapidibus Pretiosis, Iaspide & Conchaceis vſtis. Alij in super Scoriam ferri addunt.

Misturæ diuersimodè ex prædictis fiunt, vt Iulepi, aquas cum syrupis commiscendo: Vel aliæ potiones ex illis vel decoctis & pulueribus: Vel electuaria ex conseruis, syrupis, pulueribus.

Pilulæ ex supradictis ingratis præcipuè fieri possunt pulueribus, vt minori molestiâ assumantur. Vel fiunt ex Scoria ferri prius in Aceto dum ignita est, extinctâ, vel Ferri limaturâ, hoc pacto potius quàm cum aqua forti in crocum Martis dictum redactâ, quâ tamen exhibitam mulieres steriles reddere aliqui docent: Item ex Stercore caprarum sicco, quod alij probant. Quibus & alia addi possunt, & cum syrupo conuenienti in pilulas formari.

Murium maiorum stercore nouem deglutita, aliquæ mulieres pro singulari & pro experimento habent.

In hæmorrhoidum nimio fluxu descripta quædam vſitata, etiam hic competere possunt. Veluti pilulæ de Bdellio, Miclera, electuar. de baccis Myrthi, & confectio Rhazis, de scoria seu stercore Ferri.

Narcotica vti alias multas hæmorrhagias,

gias, sic & mensum hisq; similes remoran-
tur, & quia somnum inducunt, illeq; omnes
excretionēs sistit præter sudores, eo nomine
quoque conueniunt. Dando eas composi-
tiones, quæ præter ea quæ sanguinem si-
stunt, etiam opium recipiunt, in aliis etiam
hæmorrhagiis expositas. Veluti trochisc. de
Terra sigillata, de Succino cum opio para-
tos; & Diacorallium Galeni, Philoniū Per-
ficum, aliæ quæ Terram Samiam vel Le-
mniam, Bolum, Corallia, Amylum, Hypo-
cistid. Balauſtia, succum Plantaginis, atque
ex narcoticis semen Hyosquiami & Opium
continent: Præter quæ & aliis narcoticis, vt
syrupo de Papauere, decocto capitum Papa-
ueris, aliisve in doloribus colicis potissi-
mum descriptis, si ea quæ fluxum sistunt, vt
syrupum Myrtillorum, Bolum, Acaciam si-
miliaque addas, accommodata quoque sic
reddes. Imprimisque conducet, si seminis
Hyosquiami 3j. cum enarratorum portiu-
culâ misceas, sicque exhibeas. Veleo modo
sicuti in hæmoptoica passione conuenire di-
ximus. Cuius loco & semen Papau. nigri al-
lij exhibent.

Extrinsecus inunctiones & applicationes
aliæ sunt, circa lumborum renum & pubis
regionem, quæ idem vti ea quæ exhibentur,
præstando, sanguinem sistant.

Olea inunguntur hisce sedibus ex vſita-
tis Rosaceum simplex vel Omphacinum,
Myrtillorum vel Myrtinum, Cydoniorum,
Mastichinum.

Vel Oleum in quo fructus austeri nō ple-
nè maturi siccati, vel recentes aut succi ipso-
rum cocti fuerint: Veluti Pyrorum, Pruno-
rum sylv. Mespilorum, Cornorum, Sorbo-
rum: Vel succi Plantagin. Bursæ pastoris,
Polygoni, fol. Rubi, Quercus similiumque,
addendo & Acetum rubrum pari cum oleo
mensurâ, & decoquendo ad succorum con-
sumptionem vsque.

Stupefaciendi vim aliquam habentia o-
lea, circa vteri regionem inuncta, etiam pro-
desse putant: quæ hisce viribus, quibus sen-
sum minuunt, vti cum afficiuntur narcoti-
ca, hac ratione quoque fluxum sistere dixi-
mus potius quam refrigerando. vti putant,
illud præstare, quod opium & Hyosquia-

mi vel aliud in quo opium dissolutum, vel
cortex Mandragoræ aliæve narcotica cocta
fuerint, inungitur.

Vnguenta inunguntur, ex vſitatis præci-
puè illud quod Comitissæ vocant, & præ cæ-
teris efficax est. Quod fit ex sequentibus de-
coctis in aqua plantag. vt cortic. med. glandi-
um, quercus, castanearum, cortic. faba-
rum, radic. chelidonij vel potiùs bistortæ aut
tormentillæ, fol. caudæ equinæ, capparum,
prunorum sylv. fructibus sicc. mespilorum,
sorborum, capul. glandium, gallarum, bacc.
cis myrti, vuarum acinis; miscendo hisce
pulueres cortic. medior. prædictor. & galla-
rum, bacc. myrti, vuarum acinor. sorbo-
rum, hypocist. cineres ossium cruris bubuli,
trochiscos de charabe, oleum myrtillorum
& ceram.

Alia ex vſitatis vnguenta sunt Rosaceum,
Refrigerans renes. Quæ renibus potiùs, vt
refrigerando si calidiores sint, illorum calo-
rem retundendo, & sanguinis, qui ab emul-
gentibus copiosè illis infunditur, feruorem
impetumque compescendo, sic minùs fluxi-
lem reddant, inunguntur.

Dein & emplastrum pro Ruptura vteri
regioni ante retròve admotum, admodum
adstringendo, hunc fluxum cohibet.

Vel horum loco sequens paretur vnguen-
tum: Quod R. radic. Bistortæ vel Tormen-
tillæ, Gallarum vel capul. Glandium vel nu-
cum Cupressi, cortic. Granat. ana 3. j. ʒ. Ba-
lauſt. vel Psidiorum, bacc. Myrtillorum vel
Myrti, acinorum vuarum nigr. Acaciæ vel
Hypocistid. ana 3. j. Sangu. draconis 3. ʒ. Bo-
li puri 3. j. ʒ. Corall. rubr. 3. j. Mastiches vel
Thuris 3. ij. olei Rosacei vel alterius ex su-
pradiſtis vſitatis, in quo & Acetum ad con-
sumpt. priùs coctum fuerit, vel Compositi q.
f. ad excipienda hæc, & redigenda cum ad-
ditâ Cerâ in formam vnguenti: Vel adden-
do insuper Resinam & Picem q. f. ad empla-
strum formandum; Conuenientq; hæc am-
plius si vtrinque anteriùs posteriusque hæc
simul applicentur. Quæ & plantis pedum
admota iuuare creduntur.

Multa alia quæ hisce adduntur astringen-
tia & refrigerantia, cum inualidiora sint ex-
trinsecus admota, studio omittimus. Vti &

trochiscos de charabe, de terra sigillata, ramich similesque, qui dū assumuntur rectius, quàm cū foris admouentur, operantur.

Fotus supra pubis sedem, vel etiam supra ipsa pudenda simul adhibendi, vel Infectiones ad hæc loca vsque pertingentes, ex decocto sunt sequentium, nimirum radic. Bistortæ, Tormentillæ, Pentaphylli, Acori palustr. Symphyti maioris cum foliis, cortic. Granatorum, herb. Plantagin. cum radic. Bursæ pastoris, Polygoni, Rûbi, Equiseti, Sumach, Verbasci, Tamaricis. Quibus & Salniam & Mentam, quam menstrua sistere docet Diosc. addunt, & flor. Rosar. rubr. Balauft. ac Psidiarum: Item Gallas, capul. Glandium, Nuces cupressi, grana Myrtill. Sumach, Pruna sylu. aliôsve austeros fructus, Acaciam & Hypocistidem aliôsve: addendo si validius reddere velimus, in decoctione Gypsum vstum, Bolum: vel Alumen aut Vitreolū, & decoquendo in aquâ ferratâ & Vinô rubro stiptico, vel etiam addito pauco aceto.

Epithema iisdem sedibus adhibitum, ex aquâ Plantag. & Bursæ pastor. part. duabus & vnâ aceti, vtile est. Quod & plâtis pedum admodum cum Spongia competit.

Vti &, si ex aceto in quo Alumen decoctum fuerit, hoc fiat.

Cataplasma hoc hisce sedibus quibus foris apponi potest, admoueat: R. Plantag. Bursæ pastor. Herniariæ, Mentæ ana M. j. coquantur in Vinô rubr. contundantur, adde farin. Lentium lb. β. Stercoris capræ, asini vel porci in furno exiccati 3. ij. Acaciæ vel Hypocistid. 3. β. Sanguinis draconis, Thuris ana 3. ij. Gypsi vsti, Boli ana 3. j. misceantur omnia, & portio illius excipiat Albumine oui & aceto, & sic vteri sedi appositū donec siccetur, retineatur. Vel miscendo ol. Rosaceum, Myrtillorum aliudve, sic applicetur.

In sinum uteri ceruicis indita vel iniecta, cū venarum menstrualium illic pateant oscula, ea occludendo vi astrictoriâ aut emplasticâ, multum in fluxu hoc sistendo possunt efficere, vti & alio, si è fundo vteri sanguis profluat, nâ etsi iniectiones eū minimè subintrent, tamen vires eousq; extendunt.

Iniectiones sic competent factæ ex decocto, pro fotu enarrato: Vel fiant ex succis il-

larum herbarum, imprimis Plantag. Bursæ pastor. Millefolij, Caudæ equinæ, Polygoni. Quibus vtrisque misceri etiam illa possunt, quæ in fotu eodem fuerunt exposita.

Vel fiat talis: R. Decocti vel succi ex iam dictis plantis lb. j. misce Acaciæ vel Hypocistidis vel Omphacij 3. vj. Sanguinis draconis 3. ij. Boli 3. β. Succu rubri qui à lapid. Hematite p attritionē elicitur 3. β. Stercoris asini vel porci 3. ij. misce: Pro iniectione: Magis astringet si parū Vitreoli aut Chalcitidis misceas.

Aliarum quarundam herb. decoctum vel succi similiter injici possunt: Vel iam dictis admisceri: Vt Lyfimachiæ, Barbæ capræ, Coriandri, Achileiæ, Moly, Semperuiui.

Pessaria diuersimodè concinnata immittenda, fierique possunt ex Vnguento comitissæ, vel illo quod descripsimus, Petiâ vel Lanâ exceptis, sicque immixtis.

Vel ex herbis cōtusis prædictar. plantarū, sacculo ritè formato impositis sicq; intrusis.

Aut hoc pacto: R. Gallarum 3. j. β. capul. Glandiū 3. j. Amydi, radic. Bistortæ vel Tormentill. ana 3. β. Balauft. femin. Myrtill. ana 3. ij. Thuris 3. iij. Acaciæ, Sanguinis draconis an. 3. ij. lapid. Hæmatit. 3. j. pulueris entur subtilissimè, excipiantur Albumine oui, succo Plantagin. & pauco aceto, fiant pessaria.

Vel: R. cortic. Granatorum 3. j. β. Nucum cupress. 3. j. farin. Lentium, radic. Lapatij ana 3. β. Rosarum rubr. granorum Sumach ana 3. ij. Mastiches 3. iij. Mumie. Hypocistid. ana 3. j. β. gummi Arabic. 3. j. Boli vel Rubricæ fabril. 3. β. Aluminis vel Vitreoli 3. j. Stercoris caprini sicci 3. ij. excipiantur puluer. infus. gummi Tragach. add. Omphacium, vel Vini facem: Pro pessariis.

Hisce & alia addi possunt: veluti pulueres aliarum radicum & herbarum astringentium siccatarum: Item cineres de Quercu, Pappi florum salicum aliorumq; in pappos abeuntium, Crepitus lupi dicti siccati leuissima pulpa, Telegariæ earum, Stercus leporinum, Rubigo ferri secundum Dioscor. & Morochthus lapis, corallia: Dein & Trochisci de charabe, de Terra sigillata: Micletam aliq addunt.

Ex cineribus calidis, cū Vinô rubro calido vel succo Plantag. & Album. oui subactis formatum pessarium, experimentum est

quarundam mulierum, quibus tamen nimium feruidis impositis, quædam vterum admodum corrumpit.

Suffitum à decocto feruido exsurgentem in vteri sinum admittat; Vel hunc fumum excipiat fœmina: R. Thuris Mastiches ana 3.ij. Ladani 3. j. Succini, Nucis cupressi, Rosarum rubr. Balaustior. ana 3.ß. Spicæ 3. j. cum infus. gummi Tragach. factâ in aqua Rosarum, fiant trochisci: Pro fumo.

Ex Vngula asini vel equi, Pelle anguillæ exiccata, Soleis, veterib. & cornu cerui vstis, fumus exceptus probatur. Quibus & boni odoris gratiâ, Thus & Mastiche addatur.

Aceti fusi supra scoriam aut laminam ferri, fumus admissus.

Hepatis sedi in dextro hypochondrio, præsertim si calidius sit hepar & imbecillius, ephithemata, vnguenta, cerata, refrigerantia vicusque hoc roborantia, ad sanguinis fluxum nonnihil moderandum, etiam aliquid adiumenti adferent: Vti & in narium hæmorrhagia ea competere diximus, eorumque illic meminimus, & in inflammatione hepatis descripsimus, quæ & hic conueniunt, vti & vstiatum illud Ceratum fantali.

Amuleta ad sanguinem sistendum, corpori appensa, aut manibus retenta esse creduntur, Lapis hæmatites, Corallia rubra, Carniola, Onyx, Iaspis: Item Chelidonium maius, Potentilla, Phœnix, Acetosa, Clematis peruinca dicta, cruribus aut fœmoribus alligata: Oua conquassata cum bombace intincto, plantis pedum apposita, & cum fiantur, denudò repetita.

Per podicem erumpens Hæmorrhoidum fluxus, etiam si non sit consuetus vti menstruus, ac proin illis, quos primùm inuadit molestus & fastidiosus, impediri tamen nec suprimi vllò modo debet, cum natura per eum, vti dictum, vtilis & necessarias euacuationes moliendo, morbos imminentes sæpè auertat, præsentēsque curet.

Quod sitamen vel quia nimia copiâ fluxum, aut diutius durant, vel frequentius redeunt, vires inde labefactentur, tunc hisce moderandis vel sistendis animus adhibebitur, curaque tunc eodem ferè modo, vti & in mensium fluore immoderato ostensum,

per euacuantia atque alterantia perficietur.

Euacuationes variæ instituuntur, inter quas Sanguinis missio per venâ sectam tunc competet, si ob illius redundantiam in venis meseraicis fluor nimius ille hæmorrhoidum proueniat, licet enim tunc sanguis ab illis per venam apertâ minimè effluat, cum nullibi hæ venæ cutem attingant, quia tamen vena caua per eam aliquo pacto à sanguine exhausta, à meseraicis sanguinem rapit, eo pacto per reuulsionem aliqua fit illius inde quoque euacuatio. Præsertimque per largam aliquam, è vena patente in brachio aut manu sectâ factam sanguinis detractionem: Vel etiam alicuius in crure aut pede apparentis & manifestæ venæ sectionem, è qua sanguis extractus, non hæmorrhoidū vti menstrui fluxum concitat, cum hæ venæ cum hæmorrhoidalibus minimè, vti verò cum iis è quibus mēstrua prodeūt, cōtinuentur, & proin non attrahēdo, sed vti dictū, reuellendo, per sanguinis hanc emissionē hæmorrhoides potius sistantur quàm commoueantur.

Scarificationes, Cucurbitulæ Ligaturæ, Frictiones, licet reuellendo in hæmorrhagiis aliis, in quib. è venæ cauæ ramis sanguis promanat, competant, hinc tamen cum neque sanguinem è vena caua exhaurire, aut à meseraicis aliò eum deriuare queant, parum proderunt.

Per aluum deiectiones promouētur, tum si illa constipata sit, aut excremēta dura sint, ne ob conatum, vel impulsū, hæmorrhoides aperiantur, vel iam fluentes amplius impellantur. Idque laxantibus aluum & fæces emollientibus exhibitis, in deiectionis defectu, aliisque in locis descriptis. Quæ humores purgant, quoque propinantur, si ob bilis in sanguine venarum meseraicarum, aut alterius illuuii nimiam copiam, hæmorrhoides immoderatiū fluant, ad præcautionem, antequam hæ superueniant, in illis qui hisce obnoxij sunt, frequenter & decenter purgando, prouentum horum excremētorum, & ne illa congerantur impediendo, idque medicamentis bili ram flauæ quàm atræ, quam ex flaua in eam degenerante potius quàm fæce sanguinis nasci putamus, expurgandæ dicatis passimque expositis, quod

Hæmorrhoidum fluxus præternaturalis curatio.

ed tutius antequam illæ fluere incipiant, perficietur, maioreque successu, cum humores illi excrementitij, in primis hisce viis latentes; citius purgantibus administratis, à natura ad intestina propellantur.

Verùm nec cum iam fluunt hæmorrhoides, ob eandem causam, purgationes erunt negligendæ, sed vt eiusmodi excrementa ad intestina diuertantur, sicque ne hæmorrhoidum illum fluxum nimium concitent impediatur, instituendæ. Quod exhibitis illis præstabimus, quæ etsi naturâ ad deiectionem, per aluum sollicitant, tamen non adeo irritant, vt fluxus ille hæmorrhoidalis amplius per ea commoueat. Eoque nomine non validis & calidis acribusve illud moliemur catharticis, sed leuioribus & astrictione aliquâ præditis purgantibus. Qualia & in aliis hæmorrhagiis, & imprimis in mensium nimio fluore competere diximus, illicque descripta sunt, ex Rhabarbaro, Myrobalanis, syrupo Rosarum solutio similibusque præparata: Vti & Trypherâ perficâ.

Alterantibus, ad hæmorrhoides, eodem modo, vt & menses immoderatos sistendos, per ea quæ sanguinem incrassant, continent, viasque adstringunt procedimus.

Exhibitaque hoc præstant pleraque ex illis, quæ menses sistere diximus, vt Cibi illic expositi, crassiore sanguinem, eumque minus feruidum & biliosum gignentes, vnde postea sanguis in venis meseraicis, temperatior redditus, minus sit fluxilis.

Ex medicamentis in mensium fluore enarratis, hic quoque competet præcipue, Decocta, Syrupi, Succis, Conseruæ, Pulueres, Misturæ, illic descripta: quorum vis cum per intestina ad venas meseraicas vt & hæmorrhoidales, proximè intestinis adnexas, mox perueniat, citius etiam in hac quàm aliâ hæmorrhagiâ operabuntur.

Præter hæc ad hæmorrhoides sistendas ex vñtatis Micleta dicta etiam cōuenit, ex myrobalan. quinq; generibus tostis, balaustis, femin. nasturtij, cumini, anisi, fœniculi, ameos, carui, in aceto maceratis, antispodio, mastiche, gummi arabico, puluere rhois, syrupo myrtilorum concinnata.

Item electuar. de baccis Myrti ex semine

isto, myrobalan. femin. anisi, cumini, apij, in aceto macerat. syrupo cydon. paratum.

Dein & Confectio de stercore ferri seu scoria Rhazis, ex myrobalan. squænantho, cypero, zingib. pipere, ammi, thure, stercore ferri, præparata.

Imprimisq; pilulæ de Bdelio dictæ, in hoc casu maximè commendantur, quæ myrobalanorum quatuor genera, bdelium, succinum, concham veneream, semen ameos, & succum porri recipiunt. Sunt & minores dictæ, ex myrobalanis solis & bdelio concinnatæ. Quibus & scoriâ ferri aliqui addunt.

Narcotica in mensium floris curâ enarrata exposita, si necessitas exigat, visque expultrix admodum sit excitata, ad eam consopendam, plurimum iuuabunt.

Extrinsecus ad venas hæmorrhoidales apertas, occludendas stringendasque, loco illis proximo, podici scilicet, sequentia adhibentur.

Fouendus per fomenta admota, vel infusus actu frigidos vel saltem temperatos, ex decoctione Verbasci quem Tapsum barbatum vocant, qui peculiariter hæmorrhoidi fluori & dolori appropriatus est, facta in Vino rubro aut Aquâ extinctionis ferri.

Cui & alia in decocto addi possunt, vel etiam permisceri, in fotu menstruorum nimio fluori conuenienti exposita.

Cataplasma ibidem descriptum, similiter ano impositum vtile erit: Vel ex residentia illic quoque enarrati fatus paratum; Cui & Libanotis & Clematis addi poterunt; Oleaque illic enarrata.

Vel sequens paratu facilè: R. Tapsi barbati, Plantag. cum radicibus, fol. Quercus ana M. j. Semperuiui maior. vel Solani P. j. Gallarum ʒ. j. Aluminis vel Vitreoli ʒ. ij. fiat decoctio in Vino rubro & Aquâ ferratâ, residentia contundatur, addendo olei Myrtilorum ʒ. j. ʒ. fiat Cataplasma.

Hiscæ & pulpa Cydon. Mespilorum aliorumque fructuum adstringentium permisceri poterit.

Vnguenta podici & in ambitu illius inunguntur, vel cerata, emplastra, illis locis apponuntur: Veluti ex vñtatis vnguentum Comitissæ, emplastrum pro Ruptura.

Vel sequenti modo parentur: R. radic. Bistortæ 3.ij. Gallarum 3.ß. Thuris 3.ij. Acaciæ vel Sangu. draconis 3.ij.ß. Boli 3.ß. Scoriæ ferri 3.ij. fiat pulvis tenuissimus, subigatur oleo Rosarum omphacino vel Myrtillorû, vel in quo succi Tapfi barbari, Plantag. Bursæ pastoris, Linguae passerinæ, vel Rubi vel Ocymi, æquali cum oleis pondere, addito etiam parum aceti rubri ad consumptionem vsque decocti sint, atque additâ Cerâ fiat vnguētum vel ceratum, aut Resinâ, & fiat emplastrum.

Aliud vnguētum vel emplastrum in mensium hæmorrhagiâ sistendâ expositum, podici admotum hic quoq; competet. Pinguedo Anguillæ quæ dum torretur exsudat, hisce addita, proprietate quadam agens, ipsa efficaciora reddit.

Efficacius hoc emplastrum operabitur, si omisso oleo, pulveres horum emplastrorum Succis, & Albumin. oui excepti, aut Mucilage seminis Psyllij vel infus. gummi Traga-chanti, factis in aquâ Plantag. hoc pacto emplastri instar supra anum apponantur. Et antequâ penitus siccantur, tunc enim non sine labore & dolore in adultis auelluntur, rursus detrahantur, iterumq; reiterentur. Vel ne arescat, loco glutinis syrupo Myrtillorû vel alio astringente in formam emplastri redigantur, quod tunc diutius retineri poterit.

Hisce & alij pulveres permisceri possunt; Veluti osium Myrobalan. & Dactylorum vstorum, Spongiarum rubi, Echinorum castaneorum, Lagopi pâniculorum cinis, Mumiæ, Succini, Mastiches, Cornu cæri vsti, Ovi cum testa assi, Cerussæ, Antimonij, Lithargyrij, Lapid. hæmatitis, &c. Fuligo furni si nigredo non metuatur, addita conuenit.

Hoc quoq; emplastrum egregiè hunc fluxum sistit: quod R. Aloës, Thuris, Boli vel Gypsi ana 3.ß. Sanguinis draconis vel Acaciæ aut Hypocistidis 3.ij. puluerisata excipiatur glutine supradicto, vel syrupis, & applicetur, sæpeq; ne validius hæreat, repetatur.

Induntur in interiora podicis, quæ oscula venarum referata iterum coarctent vel obliterent: Veluti de enarratis vnguētis & emplastris. portio, quæ bōbace vel linteolo molli aut spēgiola excepta, in anum induitur,

Vel de pessariis, quæ vteri sinui in mensium fluore compescendo indi diximus, hic ano si ea ferre possint, supponuntur.

Quod si hisce podex ad defectionem motus, ea rursus excutiat, ea quæ minùs irritant, supponenda. Qualia hæc sunt suppositoria: R. Colophoniæ, Thuris ana 3.ij.ß. Boli 3.ß. Cerussæ, Plumbi vsti ana 3.ij. Acaciæ 3.ß. subtilissimè trita excipiantur Albumine oui, vel alio glutine & Cerâ pro formandis suppositoriis.

Fungus qui Crepitus lupi nominatur, siccatus leuissimus & subtilissimus in podicē insertus, admodum fluorem sistit. Vti & Telæ aranearum, & Leporis pili subtilissimi.

Iniectiones per syringam in anum fiunt, ex succo Plantag. aliisve supradictis. Vel etiâ illæ iniectiones, quæ vt in mensium fluore vtero, ita hic in podicem injiciendæ. Sanguis humanus vel aliorum animalium feruidus adhuc iniectus, mirabiliter aluū fluentem cohibet. Pulmo arietis modò exemptus, repens adhuc & cruentus, podici subiectus, magnam in sanguine sistendo habet efficaciam.

Suffitus ex decoctis supradictis pro foru, ano excepti competunt, vti & alij in mensium fluore expositi: Atque in dysenteria expositæ suffumigationes & fumi: Bdellij item accensi.

Venæ hæmorrhoidali fluenti, quædam etiam adhibentur, si illa appareat: quod fiet si æger per conatum validum podicē eousq; exprimat, donec conspicua fiat, adhibito insuper si necesse sit, instrumēto, ad eum nonnihil inuertendum, tuncquæ venæ validissimè siccantia, Bolus, lapis Amianthus, Alumen vltum, pulvis vitreoli & similia; vel etiâ necessitate urgente, nonnihil venarum adurētia; sed cautè, ne rectum intestinum quod summè sensile est, lædant, admouenda: Vt sunt pulvis radic. Caulium, Stercoris canini, Fæx vini vsta. Quibus & Chalcanthum addere possumus. Oleo vitreoli venam tangere, efficax est remedium, vel in extremo periculo, Aquâ forti appellatâ.

Cauteriis aliis potentialibus vti, cum diu subsistere nequeant, incommōdum & periculosum. Actuale tamen, cum solo contactu

mox operetur, extremum erit remedium.

Vti & si vena vossellâ apprehensa atq; elevata, & filo sericeo vel setâ cum acu subducto ea vinciri possit.

Hepatis regioni vti & lienis, cum venæ meseraicæ, visceribus hisce inferantur, proximæq; sint, præsertim si hæc calidiora sint, aut debiliora, non inutiliter epithemata atque vnguenta refrigerantia, visceraque hæc roborantia applicantur. Qualia in horum viscerum intemperie calida & inflammatio-
ne descripta sunt.

Sanguinearum excretionum nūc est vti orificiis, ob solutionem continuam factam, curatio.

A solutione continui variæ læsiones partium, illarumq; venarum prosectorum sanguinis excretionum cura, secundum loca è quibus procedunt, distinguitur.

Ex oculis si sanguis ob adnatæ tunicæ attritionem, vel læsionem ex contusione aut vulnere inflicto, effluat, cura in oculorū eiusmodi læsionibus, in doloribus exposita fuit.

Ex auribus si sanguis excernatur, ob læsionem ab immisis, ea quæ in vulnere aurium exposita fuerunt, hic quoq; locum habebunt. Si ex capitis violenta contusione, huic potius cura accommodabitur, cum in fluxu hoc vti in illa, non tantum sit periculi, illæque aliàs non diu perseverare soleat.

E virgæ virilis ductu si sanguis promanet, ob catheterem intrusum, vel calculus cum difficultate has angustias pertranseuntem, cum nullius ferè sit momenti, vix illius causâ aliquid moliendum, vti verò si ardor inde vrinæ subsequatur, aut exulceratio metuat, hisce maxime prospiciendum, tuncque cura (vt in illis locis dictum) iis accommodanda.

Ex meatu cervicis vteri profluens sanguis, ob dilacerationem illic factam in vesicæ calculi extractione, cum sponte iterum remittat, non aliam curam, quam quæ vulneri & dolori debetur, requirit.

Ex vteri sinu læso ob partum difficilem, vel congressum impetuosum, si hæmorrhagia proficiatur, cura non alia quam illa quæ aliis per hanc viam hæmorrhagiis ab anastomosi natis, huic debetur.

E podice ab excretis per eum, vel intrusis in eum, læso, si hæmorrhoidalis fluxus sequatur, cura eadem quæ in alio immodera-

to exposita fuit, hic quoque instituenda. Si verò paucus tantum sanguis exeat, cura læsioni potius quam huic fluori accommodabitur. Quod si ex fistuloso vlcere, rectum intestinum penetrante, fluxus menstruus per podicem quoque erumpat, ad fistulam curandam cura tunc tota dirigenda erit.

Per aperturas alias nec per orificia iam enarrata, sed vulnera in corporis exterioribus locis inflicta, emanantium sanguinis excretionū cura pro partiū diuersitate, cuius cōtinuitas soluitur, sequenti modo instituitur.

Sanguis è cute abrasa prodiens, cum nullius sit momēti, illius causâ nihil adhibetur, sed cura omnis abrasioni cutis accommodatur, sicuti in ea fuit expositum. Ille quoq; qui à cute incisa emanat, spōte iterum cessat, vel leui negotio cohibetur. E vena secta profusientem facile quoq; cum tempus est, denuò compescimus. Vti & eum qui à sponte se aperiente vena, quod rarum est, profluit. Non tamen sine labore, si magna aliqua vena incisa fuerit, sanguinis impetuosus ille fluxus sistitur, multoq; minus, si arteria secta fuerit, non solum magna, sed & parua interdum, quemadmodum in dentis extractione, arteriola dilacerata, vidimus hæmorrhagiam inde natam, compesci nullo modo potuisse, ab eaq; quendâ è medio sublatam, cui difficultati in cura non paruam occasionem, quod remedia ad arteriolam profundè latentem peruenire vix potuerint, præbuit. Quam etiā ob rem in vulneribus, quibus interna viscera læduntur, cum medicamenta indere atq; infundere, cavitatesque illis replere periculosum sit, in quibus alioquin sanguis qui effluere debebatur, retinet, noxasq; parit, hæmorrhagiam inde natam compescere perdifficile aut etiam impossibile. In aliis autē vulneribus licet magnis, vti & illis per quæ membra mutilantur, etsi maxima sanguinis fiat profusio, quia tamen topica illis proximè admoueri possunt, hæmorrhagia etiam sisti potest: In istis autem omnibus sistendis sequenti modo procedendum.

Reuellimus seu retrahimus sanguinem, à parte vnde fluit, aliòq; eum deriuamus, sicq; imperum ipsius ad eam cohibemus: Idq; sectione Venæ, Scarificatione, Cucurbitula-

Sanguinis excretionum, & hæmorrhagiarū à vulneribus prosectorum curatio.

rum affixione, Ligaturis, Frictionibus, vti in aliis hæmorrhagiis, perficimus. Eaqu; in parte ab ea vnde sanguis emanat, remotâ, si reuulsionis, vel vicinâ, si deriuationis gratiâ fieri debeat, administramus.

Impedimus affluxum sanguinis ad locum vnde profluit, vt & sic effluxum illius non nihil coërceamus, applicando supra venarum ductum eò tendentem, non procul à vulnere, epithemata, vngueta, emplastra, quæ vias hæc validè constringant, sanguinemqu; insuper refrigerando, simul repellant, & veluti coagulando minùs fluxilem reddant. Quælia quæ illud præstant, in aliis etiam hæmorrhagiis, & imprimis narium in eundem vsum colli lateribus aliisque sedibus, & in oculorum fluxione temporibus & fronti ad eas retinendas, apponi debere, illic docuimus, hic quoque adhiberi poterunt.

Ad idem efficiendum vena transuersim, per quam sanguis fluit, abscinditur; priùs in superiore & distantiore ab eo vbi effluit loco, aliquousque cute per leuem sectionem illic apertâ, venaque detectâ, eam vinciendo vtrinque retrorsum ne cedat, sicque via occludatur, quod tamen nisi reliqua iuuent, non temerè faciendum.

Vel detecta sic vena, funiculo illi subiecto & circumducto excipitur, & eousque donec transitus impediatur, ligando stringitur.

Occludimus vasa aperta sanguinem profundentia, in vulneratis locis, hæc quæ obturando, & adstringendo illa, vel etiâ vrendo id præstant. Quæ variis modis administrantur tum admotis tum adhibitis, tunc appensis.

Ligaturis adhibitis, non solum ea quæ vulneribus applicantur, retinemus; & vt firmiter illis adhæreant stringimus, sed & cum premendo vasa occludat, sanguinis fluxum sic quoque impedimus. Quæ ligaturæ eâ ratione, sicuti in vulnerum curatione edoctum fuit, erunt faciendæ.

Solâ etiam ligaturâ interpositoqu; tantum bombace supra vulnus, vt melius illic prematur, chirurgi sanguinem è vena secta profluentem, cum tempus est, iterum subsistunt.

Comprimendo cum digito os vulneris, si angustum sit, fluës sanguis cohibetur, hocqu; solo interdum sistitur, cum retentus circa

venarum orificium sanguis conicrescens, illius qui sequitur & fluidus adhuc est, effluxum impediat.

Retinendo partem vulneratam hoc fitu, vt vulnus in elatiore illius sede sursum spectet, vt minùs impetuosè fluat & citiùs compescatur, efficimus.

Infarciendo diuisionem vulneris, atque opplendo cauitatem illius, si profundum sit, adeo vt sanguini non pateat exitus, eum alias penitùs, aliàs aliquo pacto cohibemus. Quod re molli quæ se vndique applicet, perficitur; quæ si aliis insuper viribus instructa sit, quibus sanguis etiam sistitur, vel talia illi permisceantur, eò efficacius operabitur. Quod sequentia præstant.

Telæ araneorum leuib; cutis dissectionibus inditæ, cum propter leuitatem & subtilitatem se illis vndique insinuent, non tam vi siccante, quàm & opplendo atque obturando eas, labiaque veluti conglutinando, adiuuante ad hoc simul sanguine, qui illis accrescens siccus & durus euadit, sanguinè hoc modo sistunt. Quæ telæ araneorum, si è molendino farinâ volatili conspersæ sumantur, maiorem emplastice vim habebunt.

Lanugines florum, papposorum & fructuum, inter quas & bombax, item lana quæ à panno veteri abraditur, quibus & pilos leporis subtilissimos addere possumus, non solum emplastris sanguinem sistetibus permista, sed & sine illis bene priùs mundata, leuioribus vulneribus imposita, vti telæ araneorum, sanguinem aliquomodo retinere possunt.

Fungus ille orbicularis, quem Crepitem lupi, Pluimacellum Chirurgi vocant, leuissimus præ cæteris illud præstat, qui & venæ è qua sanguis salit, impositus, aut vulnere etiâ ampliori vel profundiori intrusus, cum pertinaciter mox illis adhæreat, inde quoque emanantem cruorem retinet, eoque magis, si vnâ cum pulueribus, vti in emplastris dictum, adhibeatur.

Corium leue & fungosum latum, quod in annosarum arborum caudicibus, inter corticè & lignum inuenitur, Vel à fungis detrahitur, quo scintillas è silice excussas, ad ignè excitandum excipiunt, suppositum vul-

neribus leuioribus, aliquid quoque in sanguine compescendo, præstabit.

Spongia idem præstat imposita vel intrusa, maxime si vulnus amplum sit, cum priori materia non adeo oppleri possit: Vnde & si arteria dilatata in aneurismate aperto, sanguinem profundat, cum copiosam tunc materiam requirat quam spongia subministrare potest, conueniet. A qua tamen, vti & panno linteo, aneurismati cuiusdam abundanter intruso, fluxus cum apertura per vulnus inflatum adeo ampla fuerit, cohiberi minimè potuit, nec patiens quin ob nimiam sanguinis profusionem extingueretur, liberari.

Applicationes variæ, supra partem affectam, ad eum sistendum sunt: Primum eæ quæ vi siccante astringente, & emplasticâ id agunt: Vt sunt pulueres, qui vel per se vulneribus insperguntur, vel cum bombace, aut aliâ re molli iam expositâ, quâ vulnera obturamus, illis indûtur, vel glutine aliquo excepti, in formam emplastri redacti, supra venam aut arteriam, quæ sanguinem profundit, vel supra vulnus, amplo angustiorëve, prout illud fuerit spacio, imponuntur, aut si profundum sit, etiam ei induntur, fasciisq; circumductis adligantur, & donec nullus ampliùs hæmorrhagiæ sit metus, ad dies aliquot relinquuntur, ac tunc demum sed emollitapriùs si pertinaciter hæreant, blandè detrahuntur. Quæ & emplastra nonnunquam, si profundiora sint vulnera, intrò adiguantur. Et cum ob amputationem pedum vel brachiorû, hæmorrhagia sisti debet, pulueres prædicti per se vel vti dictum excepti, porci taurive vesicæ impositi, statim vbi membrum mutilatum fuerit, vulnere sic cum vesica obducuntur, vesicæque in ambitu partis exactè ligatur, sic enim & hæc larga hæmorrhagia commodè sistitur.

Eiusmodi autè emplastra quæ illud præstant, in vulnerum curatione descripta fuerunt, atque à principio mox dum è recenti vulnere sanguis adhuc profluit, vulnere sanandi causâ, tum vt simul sanguinem sistât, apponenda esse, illic docuimus. Veluti inter ea quæ glutinandis inuicem labiis vulnerum præcipuè accommodantur, illud quod

fit ex Boli partibus iij. & Thuris, &c. Atque ex illis quæ vulnere labia simul consolidant, hoc quod R. Thuris, Myrrhæ, &c. cuius loco Galen. emplastro, quod R. Thuris part. ij. Aloës part. j. Albumen oui & Pilos leporis, vti possumus. Sicuti & aliis consolidantibus & sanguinem simul sistètibz emplastris ibidem descriptis, vt quod R. Boli vel Gypsi, &c. & quod R. Gallarum, &c. & quod R. Colophoniar, &c. Quædam quoque ex emplastris oculorum fluxionibus impediendis accommodata, ad hæmorrhagias hæc vulnerum vsurpari similiter possunt. Quale est, quod R. Mastiches, Thuris, &c. Vel quod R. Boli armen. 3. 8. Sanguin. dracon. &c. Item R. Boli armen. Gypsi, &c. omissio tunc oleo rosaceo, illic addito.

Quibus emplastris alia insuper sanguinè supprimentia addi poterunt. Veluti Pulueres ex combustis, carbones seu cineres Ranarum, Lumbricorum, Stercorum asini vel equi, Testarum ouorum, Spongiæ, Pâni linnei, Bombacis, Papyri, Vrticæ: Item Fuligo furni, Sanguis torrefactus, Resina quæuis eousque cocta & frixa vt puluerisari queat. Gummi arabicum, tragachatum, rosta: Item Lapis hæmatites, Stibium, Plumbum vstû. Dein & Terræ aliæ aliquæ pingues præter Bolum. Addendo etiam præter lanugines illic expositas, ab aliis floribus papposis desumptas, vel à quibusdâ fructibus, vti etiam quæ sub cortice Castanearum inuenitur, atque in fructu Anémones, quod bōbicinum ob hanc lanuginem bombaci persimilem, appellauimus. Dein & pilulæ Platani: Ad hæc & eam quæ à panno veteri Linteo per abrasionem colligitur. Quæ omnia prædictorum emplastrorum pulueribus quibusdâ permista, glutineque eodem quo & reliqua emplastra excepta, vel etiam mucilaginis aliis quibusdam incorporata, in emplastra redacta, apponuntur. Alias etiam pulueres cum succis plantarum, vt Plantaginis, Polygoni, Bursæ pastoris, vel etiam cum sanguine in pastam redacti, addito simul aliquo ex glutine prædicto, vel Resinâ vt promptius hæreat, eo modo applicantur.

Aliæ applicationes præter hæc emplastra aliâ formâ ad vulnere hæmorrhagias etiâ fiunt.

sunt. Qualis illa est, quâ in vtraque manu latronis cuiusdam amputatâ, sanguinem subito substituisse vidimus: quod hoc modo factû; carnificis vxor gallinaceo pullo iuxta podicem eo in loco vbi galli castrari solent, amplo foramine sectione aperto, brachium iuxta carpum absectum hiatui ampliato introtrudebat, & corpus gallinæ cum plumis, fune brachij sedi vulnere propinque circumducto fortiter adligabat: atq; sic citra magnâ effusionem sanguinis eousque, donec in locum supplicij ductus, interficeretur, superuixit. Quo remedij genere postea in absectis digitis, cum successu feliciter vsus sum.

In aliis locis depressis nec ita exertis propter abscissionem vel exsectionem partis alicuius, hoc idem remedij genus tentari poterit, alligando illis firmiter, vt partem insuper premat, pullum gallinaceum per medium sectum vel columbinum, vel pulmonem arietis cruentum, recenter exectum, aut alia cruenta ab animalibus sumpta: qualia in phrenitidis curâ capiti applicata prodesset ostendimus, illicque nominauimus.

Fortè & Sanguis humanus aut alterius animalis, calidus adhuc illitus vel prius farina in pastam subactus & appositus, aliquid quoque eadem vi poterit efficere.

Pannum linteum crassum ter quaterve foeturâ ranarum probè madefactû rursusque siccatum, si vulnere imponatur, sanguinem certò cohibere docent: sicque eo tempore cum foetura ranarum inuenitur, præparatum ad hunc vsum seruant.

Caustica si alia nō proficiant, tandem adhibere cogimur, quæ vrendo nonnihil vasa eaque sic arctando, crustamque ipsis inducendo, sanguinem ex iis fluentem cohibeant. Vsurpanturque in hanc rem imprimis Chalcanthum, seu Atramentum sutorium, in genere, cuiuscunque sit coloris, sic dictum, quod alias album, alias colore pellucido vitreo vel viridi aut cœruleo colore præditum Vitreolum, alias flauo Myfi, alias rubro Chalcitis appellatur. Quod supra laminam ferream candentem vsum, aliter calcinatum ad rubedinem vsque, & Colcotar Chymicis dictum, in puluerem redactum, huic sedi vnde sanguis profluit, imponitur: Miscendo, &

Alumen vsum interdum aut Vini sacæ crematam: Vel si amplius hoc vrere velimus, parum Arsenici, vel tantillum Mercurij sublimati: Quæ & Albumine incorporata, exceptaque bombace, sic applicari possunt.

Calce viuâ puluerisatâ, eodemque modo exceptâ, idem efficiemus: Cui & si de modo dictis quædam addamus, operationem illius intendemus.

Plerumque hisce etiam alij pulueres astringentes de supradictis adduntur, qui eorum violentiam nonnihil contemperent, atque interim coarctando sanguinem quoque fiant. Qualis est ex pulueribus pro emplastris consolidantibus vulnera, ille; Qui R. Ossa combusta, &c. & simul Vitreolum & Alumen vsum: Dein & ex illis qui in Ulcere excrecente ad carnem absumendam vsurpantur, qui R. Aluminis vsti 3. iij. Balauft. &c. Vel qui R. Vitreoli 3. β. Aluminis, &c. maximè puluis erodens ibidem expositus.

Liquor Vitreoli, quem oleum illius vocant, cum bombace intincto admotus veng, egregiè eam constringit, & nonnihil vrit. Quæ si profundè lateat, eousque intrudi debet, vt & in dentis euulsi spacium.

Validius hoc Aqua fortis appellata, eodem modo vsurpata, facit magisque vrit. Quâ afusâ supra Ferri limaturam, si illa comburatur, & in Crocum Martis, ob croceum colorem sic dictum conuertatur, ille quoque non lotus, cum causticam vim aliquam retineat, admotus, aliquid ea vi in sanguine sistendo, efficit.

Cauterium actuale, extremum est remedium, quod subito vrendo, si venas vel arterias per quæ sanguis emanat tangere possit, eum sistit. Firque hoc ferro candenti, pro ratione vulneris fabricato, & vel extremitate suâ quâ vrere debet in acutiem, si in angustū locum immitti debeat, vt dentis euulsi spacium, vel globulum rotundum maiore minoremve desinente, vel latâ superficiei in amplis vulneribus prædito. Qua ratione in mēbris absectis vulnus laminâ vel palâ ferreâ ardente adurere solent. Quod tamē, paruo interdum successu, præsertim si in ipsâ partis carnosâ sede sectio facta sit, perficitur, cum venarum amputatarū & retractarum

orificia minimè vstio hæc, sed solum fere carnem tangat, & in mora hac, antequam emplastra apponantur, magna fiat sanguinis profusio, dolorque insuper nouus huic quem ex sectione patiuntur, accedens, ægrum summè debilitet.

In picem liquefactam, si digiti abscissi remanens pars aliquousq; intrudatur, moxq; iterum extrahatur, non solum quod vulnus vritur, sed & quia pix adhærens indurata, veluti operculo vulneri imposito venarum exitum occludit, sanguis sistitur. Quod & in aliis membris mutilatis, si nihil alioquin iuuat, tentari possit.

Bombax si vulneri imponatur atque accendatur, & donec comburatur, retineri possit, quia flamma se vndique egregiè insinuat, vrendo admodum operatur.

Exhibitis potionibus quibus ad vulnerrum sanationem vtimur, etiam hæmorrhagiæ inde pronatæ aliquomodo cõpesci possunt, cum vi ficcante, quâ vlcera consolidare creduntur, etiam sanguinem incrassando viasque astringendo fluxum illius nonnihil impedire queant, præsertim si illis ea quæ sanguini sistendo dicata sunt, permisceantur. Qualis est potio illa in vulnere ex conuulsione facta, ad sanguinem coagulatum dissoluendum præcipue accomodata. Quæ & Mumia, &c. cui in hæmorrhagiæ metu Bolum, Terram sigillatam, Sanguinem draconis, Sperma ceti, &c. admiscere illic insimus: Vel etiam alios pulueres qui mox subiunguntur.

Multa alia in aliis hæmorrhagiis quæ per nares & vterum fluunt exhiberi solita, hic quoque in perseuerante, propinari possunt. Quæ tunc maximè conuenient, si vulnera ad interiores cauitates illicque latentia viscera pertingant.

Cerebrum gallinarum in potu datum, cum sanguis è cerebro erumpit, prodesse docet Dioscorides.

Appensis amuletis vel gestatis, multum quoque tribuunt, & vti in aliis hæmorrhagiis, sic & in illis sanguinem iis posse sisti asserunt. Qualia in illis exposita hic quoque usurpari possunt.

DE PURVLENTA EXCRETIONE.

CAPVT VI.

Genera.



PURVLENTA excretio illa est, in qua materia liquida excernitur, quæ ex alio humore aliquo, suppuratione seu maturatione, in materiam albam veluti excoctam pultaceam conuertitur, pro humoris ratione variantem, nunc excoctam, nunc crudam & renacem, & si putredo accedat, putridam; quæ omnia puris nomine comprehendimus. Quæ tum ratione excretionis, tum vitij ipsius quod pus in se continet, præternaturalis est, atq; è variis corporis sedibus procedit. De ea verò puris excretionem, quæ in exspuitione, vomitu, mictione, alui deiectione, fieri solet, in illis excretionibus agemus.

In oculo pus aliàs citra alium affectum, ipsius angulis inhærere, vel oculi globo obduci, & si ante pupillam id fiat, visum obscurare, frequenter apparet, indeq; postea sponte prodire vel eximi, vel noctu ciliis clausis illis se insinuare, eaque conglutinare. Aliàs in oculis accensis, rubris, inflammatis, pus se manifestat: Interdum ab vlcerebus illius loci, pus nunc album & coctum, nunc aqueum & crudum, ex oculi angulis manat, vel in nares descendens per eas effluit, graueolens aliquando. Illud sub palpebra inferiore viam sibi apparuisse, indeque profuixisse etiam vidimus.

Ex auribus pus frequenter, diuque sæpe certis temporibus emanat, præcipue cum regio vicina premitur; idque interdum sine dolore, aliàs cum eo, sicuti in aurium dolore declaratum fuit.

È naribus purulenta materia nonnunquam emungitur, in coryza, maximè circa finem, inodora & alba, prægresso prius tenuis & mucosæ pituitæ effluxu.

Aliàs in vlceroso narium dolore, pus cum muco emungitur, nonnunquâ & cum sanie, sicuti in narium exulcerationib. ostendimus.

Vidi.

Oculorū
purulen-
ta excre-
tio.

Aurib.
purulen-
ta excre-
tio.

Narib.
purulen-
ta excre-
tio.

Vidimus & lactis crassioris instar purulentam materiam, copiosissimè per nares etiam sponte profiliisse, in puerulo quodam, paulò ante illius obitum, conuulsionibus mox extincto.

Urinary meatus pene, aut collum vesicæ in fœminis, Purulentæ & Mucosæ citra mictionem excretio.

E' virga virili, & meatu vrinario fœmineo, pus nunc album nunc flauum sponte emanat, indusumque interdum, aut lintheamina noctu, inficit & commaculat. Quem affectum midio ardens, & dolor in virga, vel meatu vrinae in fœminis, cum vrina redditur, plerumque comitatur, aliàs etiam citra ferè sensum effluës, minùs molestat: diciturque à causa in viris Penis, in mulieribus, Cervicis vesicæ exulceratio. Hunc affectu in masculis præcedit plerumque coitus cum impuris mulieribus; aliquando etiam, sed rariùs, ut dictum est, gonorrhœa virulenta. Desinit quandoque & hic affectus in vlcera sinuosa, quæ aliquando circa penis inferiorè ductum vel perinæi sedem, se vno loco vel pluribus aperiunt, & pus & vrinam illic profundunt.

Obseruauimus & in quodâ, è pene quando comprimebatur, magnam copiam puris educi, & veluti ex eo emulgeri, à quo priùs vrinae permistum, longo tempore emistum fuerat, postea verò purum & è pene, & podice quoque, maximè eo tempore, quando canalis pro enematibus infundèdis, illi intrudebatur, copiosè effluere, dolore circa ossis sacri & coccygis infimam sedem admodum molestante, & postea etiam subsequente inflammatione in clunibus vtrinque, ex abcessuque illic aperto, pus per hanc viam maximâ copiâ emanare, remittente tunc eo, qui è pene & podice priùs prodibat.

Ad purulentam illam excretionem è pene & meatu vrinario fœmineo procedentè, referre possumus, Mucosæ illius & glutinosæ tenacissimæque materiei excretionem, qualem cum mictione quoque excerni diximus, quæ & sine vrina è virga quandoque prodit, vel post mictionem illic hæret, foramenque glandis obstruit, & non nisi sensim & cum labore procedit, aliàs etiam minimè, nisi trahatur, chordæ alicuius longæ dependens: comitaturque hic affectus, Vlcus vesicæ, aliàs & Calculum, sicuti in causis explicabitur.

Ex sinu vteri pus quandoque emergit, dolorque lancinans tunc in ea sentitur.

Per aperturas alias ex morbo vel sectione procedentes, pus variis è locis diuersimodè progreditur: Nunc è superficiei corporis viceribus; Aliàs è profundo per habitum corporis; Aliàs ex internis cavitatibus. E' quibus sedibus pus nunc abundantius, nunc parcius, hoc illòve modo coloratum emanat. Interdumque sanies, ichor foedus, aliave putrida materia cum eo prodit. Sicuti hæc in aliis accidentibus describendis, quæ tunc simul concurrunt, fuerunt exposita.

Causa.

Omnium puris excretionum, è variis corporis sedibus prodeuntiu causa, prout vel cum vlcere eiusmodi excretio iungitur, vel sine eo procedit, variat.

Cum vlcere si excretio puris se offerat, à sanguinis nonnunquam & carnis simul supuratione, seu in pus conuersione procedit, vnde abcessu eoque disrupto vlcere genito, puris eiusmodi excretiones succedunt, in diuersis corporis sedibus vlceratis contingentes.

Ab oculi vlcere, alicubi in oculorum sedibus nato, puris ex oculo excretio proficiscitur: Frequentiusque ab eo, quod in interno oculi angulo fit, è qua sede & emanat, vel finum sibi faciens, si ille in nares descèdat, inde prodit, si in aliam vicinam sedem, quod rarum est, cutemque illic exeat, eo loco effluit. Sicuti in vlceribus oculorum & fistulâ lachrymali hæc fuerunt explicata.

Ab aurium vlcere puris ex auribus excretio exurgit. Tale autem vlcus pus proferens si in alto lateat, cum auris premitur pus profundit, si elatius existat, sponte inde pus emanat, & si ad tympanum vsque vergat illudque exeat, auditui officit, si minùs, & extra illud in meatu externo existat, nullam dum noxam auditui parit.

In narium vlceribus, à causa quæ in illis fuit exposita, prognatis, puris emunctio procedit.

A penis interioris canalis, qui cõmunis est & vrinae & semini, exulceratione, puris è virgæ fluxus, quem à causa hac Penis exulcerationem

Vteri sinu purulentæ excretio.

Purulentæ excretio per aperturas in corpore resectas.

Oculi vlcus, causa purulentæ inde excretionis.

Aurium vlcus, causa purulentæ excretionis.

Narium vlcus, causa purulentæ inde excretionis.

Penis exulceratio interna, causa Purulenta excretionis.

cerationem vocant, prouenit. Quæ exulceratio à læsione aliquâ, sed maiore, quàm quæ sanguinem elicit, ob catheterem immissum, interdum accidit; aliàs etiam à semine virulento, quod gonorrhœam virulentam, sicuti in ea dictum, procreat, atque etiam hæc loca cum pertransit, aliquando exulcerat: Quod & à semine non corrupto, loco moto, si illic subsistat, enenire potest, ut non solum irritando ardentem dolorem, uti in eo ostendimus, sed & vlcus, si acre admodum sit, pariat.

Vesicae ceruicis exulceratio, causa Purulenta excretionis & Mucosæ excretionem.

A vesicæ ceruicis in utroque sexu exulceratione, non solum purulenta mictio, uti in ea descriptum fuit, proficiscitur, sed & interdum puris aliqua citra mictionem excretio, præsertimque si in ceruicis vesicæ anteriori parte vlcus resideat, è quo si fordidum fiat, magna sæpè puris copia emergit.

Atque in eodem colli vesicæ vlcere, mucosa illa materia, quam cum vrina permistam excerni diximus, etiam sine ea aliquando profluens, huic Mucosæ è penne excretioni, quam in generibus descripsimus, causam quoque præbet.

Vteri ceruicis exulceratio, causa Purulenta excretionis.

Ab vteri ceruicis exulceratione, purulenta quæ ex eo loco procedit, oritur excretio. Cuius causa in vteri vlcere declarata fuit.

Ab externis vlceribus in cute & carne, per superficiem corporis dispersis, sponte disruptis vel apertis, puris excretio prouenit. Vt & ab internis, in habitu corporis latentibus abscessibus sectione apertis, pus è profundo emanat. E quibus locis, si diu pus illic coaceruarum fuerit, affatim exilit, idque vel maturatum saltem, vel etiam putrescens, purum vel virosum, aut putri materia permistum. Quarum omnium exulcerationum causæ, cum de vlceribus & abscessibus, illis in læsionibus quibus præcipue incommodant, egimus, descriptæ fuerunt.

Ab externis vlceribus in cute & carne, per superficiem corporis dispersis, sponte disruptis vel apertis, puris excretio prouenit. Vt & ab internis, in habitu corporis latentibus abscessibus sectione apertis, pus è profundo emanat. E quibus locis, si diu pus illic coaceruarum fuerit, affatim exilit, idque vel maturatum saltem, vel etiam putrescens, purum vel virosum, aut putri materia permistum. Quarum omnium exulcerationum causæ, cum de vlceribus & abscessibus, illis in læsionibus quibus præcipue incommodant, egimus, descriptæ fuerunt.

E pectoris cauo, ab exulceratione corruptioneque pulmonum congestum pus, per sectionem Empyematis tantâ sæpè copiâ, quâ pelues adimplentur, promanat: cuius causam in eo affectu exposuimus.

In Ventre ab abscessu viscerum illic contentorum, veluti hæpatis & lienis, sicuti descriptum fuit, pus genitum, vix per apertu-

ram in abdomine factam, excernitur. Licet enim ab abscessibus eiusmodi sponte disruptis, pus in abdomine coaceruari possit, quia tamè hoc rarum est, neque tumore aliquo inde nato, cum tanta illius copia colligi nequeat, se prodit, & proin difficulter apprehenditur, non temerè etiâ via illi per quam effluat, erit aperienda. Quod & si intra cranium pus alicubi cumuletur, obseruandum: cum enim an pus illic collectum sit, non certò possit cognosci, non nisi necessitate urgente, & pus ibi contineri certi simus, cum ægri periculo, caluariam perforando, exitum illi molimur, eoque minùs, cum natura nisi mors præueniat, per foramina pituitæ expurgandæ dicata, in nares illud tandem excuiat.

Sine vlcere purulenta excretio quæ se exhibet, plerunque ex sedibus externis humilioribus procedit, veluti oculorû & narium, quæ perpetuò humore quodam madent, è quo talis materia gigni potest.

In oculis hæc ex humiditate illa, quæ oculi sedem alluit, interdum gignitur, si illa crassior tenaciorque reddita, & excocta maturataque, veluti in pus redigatur.

Quod ob calorem, quæ oculi cum palpebris concipiunt, euenire solet, à quo humor siccatus tenacitatem acquirit coquiturque, sicuti in oculis rubetibus talem materiâ nasci videmus, eademque si à causis externis tantum oculis incaluerit, calore & rubore cessante, iterum remittere, quâdo verò hæc perseuerant, accedente lachrymarum continuo affluxu in Epiphorâ, oculos pure continuo fordidos apparere. Sicuti in hoc oculi affectu ostensum fuit.

A pituitâ mucosâ, diutius in antris nasi retentâ maturataque, & in purulentam materiam excoctâ, emunctio purulentæ huius materiei, circa sinem coryzæ ferè succedit, sicuti in ea ostensum fuit.

Quod verò magna copia puris lactis instar, in puello quodam per nares effluxerit, illud à cerebro quoque edeffluxisse, illicque genitum, atque ex sanguine & pituita excoctum fuisse, hoc comprobare videtur, quod cerebrum inde affectu fuerit, aded ut cõuulsiones, aliisque continuatis, mors subsequuta sit.

Oculorû humiditas in pus conuersa, causa Purulenta excretionis.

Narium pituita in pus conuersa, causa Purulenta excretionis, & nonnquam Lactis.

Curatio.

Oculorū
Purulentæ
excretionis
curatio.

EX oculorum sedibus pus emanans, si ab vlcere procedat, non aliam quàm quæ vlcerebus oculorum debetur, curam requirit. Si citra vlcus, purulenti in epiphora sint oculi, cura illi accommodata, etiam huic vitio competit. Si sine hisce morbis oculorum, purulenta materia in supercalesfactis nonnihil oculis nascatur, calore cessante, puris collectio rursus quoque definit. A quacunque causâ, si pus oculis inhærens, pupillamque obtegens, visui impedimentum adferat, fricando palpebram leuiter versus angulos, eò adigitur, indeque postea exit, vel turundâ ex panno vel linteo formatâ, eximitur.

Auribus
Purulentæ
excretionis
curatio.

Auribus inhærens pus indeque emanans, quo pacto abstergi debeat, in vlcere auris, vnde hoc pus prodit, declaratum fuit.

Narium
Purulentæ
excretionis
curatio.

E' naribus purulentæ materiæ effluxus, si à pituitâ sic excoctâ proficiscatur, cum defluxionē quæ prius ferè tenuis erat, in coryza cessaturam significet, minimè sisti, sed potius promoueri debet, errhinis immixtis aliisque in narium obstructionibus expositis. Vti &, si lactea illa materia copiose à cerebro per nares profundatur, nec illa impediri sed potius promoueri debet, quam tamen mors plerumque excipit. Quod si ab vlcere narium pus prodeat, cura in exulceratione fuit exposita.

Penis ex
ulcerationis
indeque
prouenientis
Purulentæ
excretionis
curatio.

Per penem puris excretio in masculis, illa perquam pus etiam si non mingant, sponte emanat, atque inter mingendum ardor accedit, ab vlcere in penis canali, per quem vrina redditur, profecta, minus est quàm purulenta mictio, à vesicæ illiusve ceruicis vlcere procedens, periculosa, cum in parte ignobiliore vlcus hoc existat, &, si non adeò inualuerit, aut profundè lateat, facilius curatur, difficilius verò, quò magis abditum est & sordidum factum, cuius curatio sæpè in longissimū tempus protrahitur, aliàs quoque vicinas sedes excavans, extrinsecus circa perinæum se apperit, & vrinæ viam patefacit.

In fœminis excretio hæc puris citra mictionem, per meatum vrinæ destinatū, cum

ab vlcere ceruicis vesicæ prodeat, & nunc cum vrina nunc sine ea se offerat, æquè atque mictio purulenta, inde quoque proueniens, curatu est difficilis.

Curatio autem penis exulcerationis, indeque nati mingendi ardoris, eodem ferè modo sicuti in vesicæ illiusque ceruicis exulceratione instituitur, & pleraque illic exposita, tam ad vlcus sanandum quàm ardorem mitigandū, hîc quoque possunt competere, cum hoc vlcus penis in eadē via quæ ceruicis, vesicæ continuatur, sit positum, ibique etiam ea fiat irritatio, quæ ardorem mingendi parit.

In mulieribus quoque non aliam curam hæc excretio purulenta quàm eam, quæ in mictione purulenta, cum ambæ à ceruicis vesicæ vlcere procedant, instituitur, illicque descripta fuit, requirit. Nam si ab vteri colli aut pudendi vlcere pus hoc emanat, cura in eiusmodi vlcerebus, in doloribus illius loci, fuit exposita.

Itaque in utroque sexu, vti in cura vlcerebus vesicæ, ardoris causâ qui hæc comitatur, sic & in hisce, eiusdem causâ, exhibitis vel iniectis enematibus, aluum interdum laxabimus, excrementaque si dura sint, vt facilius prodeat, emolliemus, iisdem illic expositis, similibusque remediis.

Ad vlcus sanandum detergentia si sordidum sit, & siccantia illud glutinantiaque, eadem quæ illic descripta, exhibita, hîc quoque aliquid præstare possunt, cum hoc vlcus vesicæ ceruici vel sit proximum, vel saltem non procul ab eo dissitum, in eodemque ductu positum, adeò vt medicamenta, quæ vires suas ad ceruicem vesicæ vsque possunt proferre, eas etiam vterius huc vsque possint extendere. Quas cum in locis illis distantioribus non adeò validè exerant, idcirco per exhibita sola vix dum curatio exulcerationum, tum in vesicæ tum penis ductu existentium, perficitur, nisi vsus horum sit frequens & continuus.

Propinarique possunt in eum finem, decocta in vlcere vesicæ cura descripta, tum Primum, quod vlceri & ardori coniuncto simul competit, tum illud quod Gaïacum cum cæteris quæ vlcus sanant, recipit.

Aliæ item portiones Vulnerariæ dictæ, vti

non solum ad vulnera, sed & vlcera quedam externa internaq; sananda exhiberi solent, sic & ad illud quod in penis ductu existit curandum, aliquando propinantur, à chirurgis in hanc rem potissimum præparari solitæ. Possunt q; præcipuè illæ quæ in vlcere generali cura describuntur, hinc quoque vsurpari, vt Vina illa & Aquæ extillatæ, quàm Decoctum quod R. radic. Consolidæ maior. Fœniculi, &c.

Succi, Aquæ, Lac, Resinæ, vti in vlcere vesicæ ea exhibere docuimus, sic hinc quoque assumi poterunt.

Pulueresq; imprimis compositi, tum vsitati, tum tres illic descripti, quorum duo & mictioni ardenti & vlceri simul, tertius vlceri præcipuè, accommodantur.

Ex simplicioribus, puluis Glandium quercus, folior. Equiseti, Vincæ peruinçæ, sæpè exhibiti, probantur, aliique similes.

Ad dolorem si acriter, vti aliquando solet, vrgeat, non solum Narcotica cæteris iam expositis permixta competunt, sed & per se quoque exhibentur, in ardentis mictionis curâ declarata.

Iniectiones in virgam factæ, cum citius & facilius ad locum affectum, quàm si in vesica illiusque collo latitaret vlcus, perueniant, in curatione huius vlceris, præcipuas partes tenent. Conueniuntque similiter in vesicæ vlcerebus propositæ iniectiones, quæ primum abstergant, mox siccando vlcus sanent. Possuntque sic Lac, Decocta, Succo, Aquæ Mistræque aliæ & Collyria illic declarata, injici, atque vnguentum Ægyptiacum, si sorditiem magnam aut putredinem acquirant, permisceri.

Præter quas iniectiones in penis exulceratione, cum deterfione opus est, talis fieri poterit: R. radicis Liquirit. 3.j.β. cort. Fabarum 3.vj. Cicerum rubr. vel Pisorum p.j. fiat decoctio in Sero caprino, addendo parū Lixiuij, prout ferre poterit, & ne nimium mordicet, dissolu. Mel, Saccharum & parū Laricæ dissolu. cum Melle & Vitello oui.

Ad sanandum & consolidandum alia iniectio: R. rad. Consolidæ 3.j.β. Equiseti, Plantaginis an. m.j. Lithargyrij 3.vj. decoquantur in Aqua ferrata, & in tñ.j. dissolu. Mellis ros.

vel Sacchari rosac. tabul. 3.ij. Resinæ laricæ 3.j. dissolu. in Vitello oui, fiat iniectio.

Vel sic: R. Trochiscorum alborum Rhazis 3.β. lapid. Calam. Tuthiæ, Plumbi vsti, Boli, an. 3.j. dissolu. cum Aqua conuenienti vel Lacte vel &c.

Alia: R. Cerussæ 3.β. Lithargyrij 3.ij. Tuthiæ præpar. 3.iiij. Amyli 3.j. fiat puluis subtilissimus, qui dissolutus cum liquore, injiciatur: Vel instilletur in glandem.

Aqua pro iniectione efficax: R. rad. Consolidæ tñ.β. radic. Bistortæ, Tormentillæ an. 3.ij. Narcissi bulbos numero x. foliorum Equiseti, Plantag. recent. an. m.ij. summit. Hypericonis cum florib. rec. p.ij. Aluminis 3.j. Mellis rosac. q.f. Oua contracta numer. xij. si aridæ sint herbe, irrorentur prius aquâ Plantaginis, destillentur.

Instillatæ in glandem iniectiones eiusmodi, si ad vlcus penetrare queant, quod citius fiet, si minus in profundo sit, conducent. Quâ ratione & succi indi possunt.

Induntur & vnguenta alia quæ vlcera sanare possunt, vt & Pompholygos dictum, in virgam, & ad vlcus vsque adiguntur, cerea tereti candelâ inunctâ, illiusque anteriori sedi appositâ, sicque intrusâ, quod commodius minori que negotio & dolore, quàm aliis sit instrumentis, cum candela eiusmodi mollis & leuis sit, sequæ ad curuum ductum, possit, dum sensim intruditur, flectere, sicque accommodare. Oleum ex semine Hyosquiami expressum, instillarum admodum dolorem compescit.

Inunctio lineæ quam futuram vocant, ab humiliori virgæ sede per perinæum ad anū vsque ductæ, conuenire aliquo pacto potest, vti & fomentationes illius loci, cum refrigerandum in ardore, qui eo in loco intrinsecus perferuntur, vel relaxandæ viæ illæ si constrictæ sint; quod iisdem quæ in vlcere vesicæ colli exposita, quibus & Opium, si dolor acerbus illud exigat, miscere possumus, perficitur: Ad sanationem vlceris vnguenta quæ illud sanant, illic quoque inuncta, aliquid perficere autumant, ibidem quoque descripta.

Vitæ regimine eodem, quod in vlceris vesicæ curâ præscriptum, vtantur.

Vesicæ
vici ex-
ulceratio
ma, inde
que profe-
cta Alu-
go se ex-
cretionis
cura.

Mucosa excretio glutinosæ materie, ci-
tra ferè mictionem, è pene, aliquando & in
fœminis per meatum vesicæ, cum vlceri &
calculo vesicæ copuletur, non aliam quoque
curam, quàm quæ excretioni purulentæ &
calculosæ debetur, requirit: Iniectionesque
præsertim, quæ pus illud viscosum abluant
& abstergant. Quod nisi cedat, vti in virga
interdum pertinaciter hæret, sensim non-
nunquam illud trahendo, eximitur: Vel si
virga Raphano excauato imponatur, in eoq;
aliquandiu retineatur, pus sic attrahi eua-
cuanque docent.

Vteri si-
nus exu-
lceratio
nis inde
que pro-
fecta pu-
ulenta
excretio-
nis cura.
Purulen-
ta excre-
tionis ex
vlceribus
superfi-
ciei cor-
poris
et habi-
tus pro-
manantis
curatio.

Ex vteri sinu promanans pus, non aliam
quàm quæ vlceri huius loci conuenit, curam
exposcit, in vteri exulceratione declaratam.

Per aperturas alias puris excretio, si ab vl-
ceribus externis sordidis cuiuscunque ge-
neris, vel in profundo corporis habitus la-
tentibus abscessibus, sponte vel sectione a-
pertis proueniat; quo pacto pus abstergi at-
que elui, vlcus vel vulnus postea sanari de-
beant, in vlcerum, abscessuum & vulnorum
cura fuit edoctum. E pectore quoq; fluens
pus post sectionem in Suppuratis, quo pacto
tractari debeat, in cura Empyematis fuit ex-
positum.

alui deiectione, perficitur, de qua in illis ex-
cretionibus tractabitur, è variis corporis se-
dibus procedit.

Ex oculorum sedibus frequenter hæc *Lachry-*
prouenit in Lachrymis appellatis, quæ ocu- *ma.*
lum madore perfundunt, atque ex eo exstil-
lant. Hæ nunc serum pituitamve aqueam
referentes, in sanis etiam, maximeque in in-
fantibus & senibus iamque repuerascenti-
bus, leui causâ, atq; aliis etiam in animi ma-
gnis commotionibus, sæpè erumpunt; nec
proin præternaturales censentur. In oculo-
rum verò vel capitis morbis quibusdam,
molestiam parientes, diuque sæpè perseue-
rantes, inter symptomata horum morbo-
rum referuntur. Suntque interdum hæ la-
chrymæ calidæ & acres, quas Calidas ob id
appellant; aliàs verò minimè, quas Frigidas
nominant.

E naribus aquea excretio sæpius se of- *Stilli-*
fert, quæ naturalis, cum per viam excremen- *diu-*
to huic repurgato destinata fiat, existit, *narium.*
sed tunc præternaturalis, si nimia sit, eua-
dit. Vti quibusdam hoc accidit, è quo-
rum naribus aquosus humor lachrymarum
instar exstillat, guttaque illius à nasi apice,
dependet. Vel aliàs mucosam pituitam re-
fert, quod cum familiare sit infantibus, mi-
nus in illis, quàm adultis turpe & vitiosum
esse censetur.

In catarrhi specie quæ Coryza seu Graue- *Coryza,*
do dicitur, hoc idem accidit, vt è naribus ab *Graue-*
initio tenuis & aquosus humor continuò *do.*
exstillat, & copiosè effluit, actu frigidus, nō-
nunquam & calidus, interdum & acris, na-
res vellicans, sternutationem mouens, la-
chrymas eliciens, alas narium & superius
labium vicinum inflāmans & exulcerans:
accedente interdum & copiosâ exspuitione
cum sreatu & tussi; Qui humor tandem
circa finem mucosus nunc albus, nunc alio
quoque colore imbutus emungitur.

In aliis morbis capitis quibusdam & de-
fluxionibus, hoc idem accidit, sicut in illis
fuit declaratum.

Ex auribus præter humiditatem, quā au- *Aurium*
res intrinsecus aliquando madent, aquosus *agnosus*
humor, nunc tenuis, nunc renacior, sed raro *effluxus.*
ex illis effluit, constatque è cuiusdam puel-

DE AQVOSA EXCRETIONE.

CAPVT VII.

Genera.



AQVOSAM excretionem eam
nominamus, in qua humor fluidus,
aquam referens, nunc tenuior
nunc crassior, & tenacior
effluit, ex pituita excrementitia, vel cruda
naturali & sero inuicem permixtis & confu-
sis, in qua mictione nunc pituita nunc serum
exuperat, conflatus: cuius excretio, quæ a-
liàs non ita omnino præter naturam existit,
tunc maximè præternaturalis euadit, si ab-
undantiùs aut frequentiùs contingat, ma-
iusque in se vitium hi humores contineant,
vel per loca non conuenientia excernantur.
Eiusmodi autem aquosa excretio, exceptâ
eâ, quæ exspuitione, vomitione, mictione, &

læ aure, mensuras aliquot illius diu pervices, citra ullam aliam læsionem profluxisse.

*Vterinus
seu mu-
liebris
fluor.*

Ex vteri sinu pituitosa hæc excretio in foemineo sexu admodum est frequens, eamq; Fluorem muliebrem seu vterinum, vel Purgationem vteri vocant, & quia eiusmodi fluores mulieribus, postquam menstrua cessarunt, plerumque superuenire solent, & ad aliquot quoque dies perseverare, Menstrua quoque sed alba, ad differentiam sanguineorum rubrorum, appellatur. Verum non eo ordine, sed inordinatè, mulieribus menstrua habentibus, contingere, & sæpè diu, aliàs brevius perdurare solent: Atque etiam eas, quibus menstrua suppressa sunt aliquando infestare: Vti & illas quibus menstruorum tempus præterit, & ne vetulis quidem parcut. In virginibus hic fluxus, etsi rarior sit, aliquando tamen & eas inuadit; Grauidasque mulieres hunc quoque fluxum passas, sæpè obseruauimus.

In hoc fluore humor interdum serosus aqueus effluit, copioseque plerumque, nunc limpidus sine morfu, nunc acris vel salsus, aliàs flauescens, virescens aut nigricans nonnihil, aliquando & saniosus, interdum inodorus, aliàs foetidus, ei copulatur.

Huic pituitosus etiam miscetur, aliquantum glutinosus, inodorus & frigidus, pauciore vel eadem aut etiam maiore quam serum quantitate.

Huic fluori si moderatè se habeat, nulla aliàs superueniunt graniora accidentia, & sine noxa tam mulieres quam virgines hunc incolumes. alioquin, sæpè multis mensibus, vel etiam annis, ferunt. Aliàs verò si immoderatus sit, malus corporis habitus, seu cachexia eum comitatur: item languor corporis atque functionum quarundam imbecillitas: Sterilitas item in quibusdam mulieribus, licet in aliquibus in conceptum nullum impedimentum adferat. Pruritus mordicatio & ardor in pudendo & circa illud, si vitiosa sit materia, eas diuexat. Atque in primis ipsis, si hæc excrementa foeteat, turpitudò hæc molestiam, & maritis tale fastidium, vt ab ipsarum consortio abstineant, parit.

E^o cutis poris frequentius serum exudat, illiusque hæc excretio Sudor nominatur,

naturalis & communis cuiusuis complexionis hominibus; qui tunc præternaturalis euadit, si nimius aut vitiosus existat, qualis & in morbis atque extra hos nonnunquam se offert.

Extra morbos nimius sudor contingit, quando frequentius quam par erat, concitatur, aut diutius continuatur, adeò vt animo deficiant, & si sæpè hoc fiat, languorem corporis inde contrahant.

Vitiosus sudor si foetidus sit, existit. Qualis nonnunquam è toto corpore, vel certis inde locis, vt pedibus, sicuti hoc in fetore pedum ostensum, exfudat. Frigidus itidem & tenax, non calens, aqueus & fluidus, qualis esse debebat, præternaturalis censetur: Vti & qui colore aliquo plerumque croceo, lintea imbuunt & tingit.

Indecens quoque sudor ille censetur, quo manus & plantæ pedum continuò ferè, vel nullam aut leuem ob causam madent; aliquibus etiam consuetus.

In morbis si sudor non cõueniat & erumpat, vel tempore non decenti, vt in febribus extra crism, aut nimia illius sit profusio, vt in sudore Anglico, in febribus accidere diximus, præternaturalis existit, cum per hosce non alleuiantur ægri, aut melius, sed deterius se habeant, imbecillioresque amplius adhuc reddantur. Vitiosus quoque & noxius habetur, si non æqualiter è corpore, sed certis tantum è locis exfudet: & si frigidus, aut tenax existat; Foetidus autem & qui colorat, cum iuuat, non malus esse iudicatur. Sicuti hæc omnia copiosius in febribus aliisque quibusdam morbis, in quibus sudores consueti sunt, recensita fuerunt.

Ex aperturis in abdomine factis, in hydropse ascite, serum magnâ copiâ profunditur: & si in cruribus fiant, serum guttatim, diuque exstillat. Ex scroto quoque aperto in hydrocele affatim effluit. Atque ex vesiculis, pustulis, & tumoribus aquosis apertis, serum parcius copiosiusve emanat. Denique ex ulceribus quibusdã ichor serosus aquam referens, quem Germani *Glutwasser* vocant. Sicuti in eiusmodi affectibus hæc omnia iam prius demonstrata sunt.

*Sudor
præter-
naturæ
læ.*

*Seri ex
aperturis
in corpo-
re factis
effluxu.*

Causa.

A Quosus enarratus humor, qui per oculos, nares, aures, sinum vteri, poros cutis & aperturas effluens, aqueas illas excretiones parit, prouenit vel à cerebro vel aliunde à corpore.

Oculorū sedem subiens aquosus humor à cerebro defluens, causa Lachrymarum.

E' cerebro à defluxione pituitæ aqueæ, & feri in oculos, lachrymas procedere, hoc demonstrat, quòd aliàs sine acrimonia & calore se offerant, aquæ instar lentorem tamen quandam habentis, qualis est pituita, aquea ob id dicta; aliàs verò tenuiores limpidioresque sint, vti serum, & quandoque acres salis, biliosæ & calidæ, quæ à sero potius quàm à pituita dependent; Quos humores oculorum sedem irrigantes, à cerebro defluere, hoc abundè & sufficienter demonstrat, quòd tam citò lachrymæ, quæ prius aberant, erumpere possint, tantaque interdum copiâ. Et si enim humiditas illa, quæ oculus palpebræque naturaliter, vt ad motum promptiores essent, humectantur, à sero è venis oculorum exsudante, vti in cæteris quoque partibus fieri alibi ostendimus, proficiscatur, tamen tanta illius copiâ, quæ lachrymarum stillicidium efficeret, in venis sedis oculorum exilibus, minimè contineri, nec tam subitò prodire posset. Defluxus autem ille pituitæ aqueæ, in oculorum sedem ad lachrymas procreandas, eò facilius & citius fit, quòd alioquin illius consuetus à cerebro descensus ad nares, per quas naturaliter euacuatur, iuxta oculorum radices, per foramen priuatum illic, atque aliud quoque, quod in oculorum interno angulo, in hunc vsu in insculptum fuit, fiat, ob quam causam vel leuiter cômota, oculi sedem adimplens, lachrymarum fluxum sic parit. Sed & serosus excrementitius humor pituitæ plerumque permixtus; in cerebro coaceruatus, quemadmodum eum quoque illic ab excrementis congeri, indeque defluere, multisque defluxionibus occasionem præbere, cum de illis quæ habitum corporis cum dolore infestant, ageremus, ostendimus, ita per eandem viam per quam pituita ad oculos deferri diximus, descendens ad nares, in oculos quoque profusus, lachrymis naturam illius referen-

tibus, causam præbet. Alio modo per venas externas internasve lachrymas eò defluere, vti putarunt, cum hæ sanguinem deferant, nec pituita per has descendat, aut serû à sanguine tam subitò segregari valeat, concedere minimè possumus, sed ex caluaria per destinatos illis ductus, vti dictum, eò peruenire: Et si fortè extra caluariam humores excrementitij eiusmodi ad oculos defluant, sub cute in palpebris subsistere easque in tumorem potius attollere, quàm copiosas lachrymas efficere, existimamus.

Quod autem eiusmodi pituita aquea serumque in oculos deferatur, lachrymasque in sanis pituitosæ, in ægris serosæ magis ferè occurrunt, diurnas & perseuerantes gignant, causa est humorum istorum excrementitiorum in capite nimia redundantia, ob quam causam, non solum defluentes in narium amplitudinem, vti decebat, se exonerant, sed & oculorum sedem quam peruadunt, continuò madefaciunt atque opplent, eoque magis, si oculorum dispositio tum ob frequetem hanc illorum irrigationem, tum ob morbos illorum, imbecillis & laxa reddita, ad suscipiendum apta reddatur. Quæ inde natæ lachrymæ, præter madorem, molestiam vix aliam maiorem adferunt, si à pituitoso humore potissimum proficiscantur: Si verò à seroso humore exuperante, eoque salso vel acri & calido prodeant, cum pruritu & rubore palpebrarum, in Epiphora dicta, se offerunt. Ab vlcere quoque oculorum interioris maximè anguli, consumptaque præsertim illâ, quæ foramini præerat carunculâ, foramineque ampliato, per quod maioris oculi aliqua portio ex oculo in nares delabitur, fistulaque illic genitâ, cum tunc eò potius defluxus humoris, qui per posterius & in alto oculi sedis situm foramen defluere debebat, dirigatur, omnisque eò deferatur, non solum per fistulam lachrymalem proin dictam in nares descendens, sed & oculi orbitam illic adimplens, lachrymis perseueranter occasionem præbet. Sicuti hæc omnia in eiusmodi oculorum morbis, vti Epiphora & Fistula lachrymali declarata fuere.

Irritatione oculi sedium, aut vicinarum

partium illi consentientium, facultas expultrix suscitata, humores hosce in oculum subito propellēs, lachrymis sed non diu perseuerantibus occasionem præbet. Qualis est quæ à splendore solis, fumo spisso, odore & vapore vellicante, vt ceparum, sinapis, & similia, aliisque oculo illapsis, proficiscitur, lachrymas commouens. Quod & dolor propinquarum partium, vt dentium aliūve potest efficere.

A commotione nimia humorum ob conatum magnum, lachrymæ frequenter erumpunt, vti per animi perturbationes accidit, in quibus ob miram illam veluti conuulsionem, muscutorum buccarum, labiorum, oculorumque, quam in ploratu lachrymas præcedere obseruamus, aquei hi humores oculis vicini, & iuxta eos, vti dictum, defluentes, commoti, in oculorum sedem se insinuant, lachrymasque efficiunt. Quod & in risu valido, ore quoque distorto, gaudioq; nimio accidit, vt & tunc lachrymæ excidat. In alio quoque conatu magno, in alui excretionibus, vti & in partu, in tussi, sternutatione, eandem ob causam lachrymas elici videmus.

Nares
petens a-
quem
humor à
cerebro
defluens,
causa
Stillicidi-
um na. iū
& Cory-
za.

In nares pituitæ à cerebro expurgationi dicatas, aquosus humor enarratus à cerebro defluens, Stillicidium narium vocatum parit. In quo fluxus ille eò abundantior est, quò maiori copia in cerebro coaceruatur. Exstillatque tenuis humor aquæ instar, si recta à cerebro ille eò descendat: cum talis ferè in cerebro congeratur aquea dicta pituita, atque si antris ossium diutius retineatur, primum crassescat mucosaq; fiat. Cæterum & serofus humor excrementitius, qualem in cerebro quoq; congeri, in aliis defluxionibus ostendimus, inde quoque pituitæ plerumque permixtus, defluens ad nares, fluorem hunc aqueum ex illis emanantem parit vel auget, qui tunc & tenuior acrior calidiorque plerumq; existit, & vellicando pruritum, & sternutationem commouet, coryzamque dictam gignit. Quam defluxionem horum humorum à cerebro, illorum nimia illic collectio efficit, atque ea quæ facultatem expultricem excitant, premouent: sic ut in aliorum affectuum à defluxionibus

dependentium causis, & tussis præsertim, hæc vberius fuerunt exposita.

Aliunde quàm à cerebro pituita illa vel aqueus humor, qui ex auribus effluit, promanat, cum ab eo non alia via ad auditus cameram, quàm per foramen neruo auditorio paratum, existat, per quod si illa intraret, interiori tantum cameram subire, atque, ad exteriorem meatum penetrare, minimè posset nisi tympanum peruaderet, quod tamen citra illius læsionem & auditus defectum inde profectum, non faceret. Sed cum citra auditus abolitionem hic fluxus ex auribus contingat, atq; ab externo auris meatu prodeat, in eum pituitam hanc deferri satis patet. In quam externam sedem, vti serum exudans eam madore suo humectare solet; ita si aquosus ille humor copiose illic coaceruatus, redundet, è venis meatum hunc implicantibus, prodicens, effluxum hunc illius efficit: quod tamen rariùs, cum longè conuenientiores viæ feri expurgationi destinatæ sint, accidit, aliquando tamen præsertim in nimium laxatis hisce ductibus, illud potest euenire. Sicuti in fluore vterino pituitosam quoq; materiam è venis copiose egeri posse, iam demonstrabimus.

A ceruicis vteri venis sicuti menstruum fluorem oriri ostendimus, ita & fluor vterinus ab iisdem procedit, neque enim ex vteri fundi cavitatē vti vulgò putant, in collum illius effluit, indeque postea expurgatur, cum tam angustus in vtero sinus, tantam copiam humoris, quantam plerumque emanare videmus, capere minimè posset, nec in eo congeri, multò minùs per venas quæ exiles sunt, nec donec mulier vterum gestat, ampliantur, in illū influere valeret, vti verò per ceruicis illius venas manifestiores ex eadem effluit. Quod tunc accidit, quando humor ille excrementitius, qualis in hoc fluore se offerre solet, sanguini confusus, vel cum eo in menstrua purgatione adhuc permixtus, vnde impurus maleq; coloratus tunc sanguis apparet, expurgatur, vel donec menstrua iam præterierint, omnino vel ex parte retentus & coaceruatus, tunc demum à natura propulsus, per eandem viam, per quam prius sanguis, eo ferè modo vti ante eum menstrua, ob quam

Aures
subiungunt
aquosus
humor è
venis il-
lic emanans
causa
sa aquosi
ex auri-
bus sua-
ris.

Vteri
ceruicis
influent
aquosus
humor, è
venis il-
lic pro-
manans,
causa
Vterini
fluentis.

quam causam & menstruum alborum nomen illi fuit inditum, excernitur. Quod & alio tempore quodcumque natura illuvie hac grauat, potest euenire, tū in illis quæ menstruas purgationes nihilominus habent, tum in aliis quibus hæc iam cessarunt. Vti & in grauidis hoc itidem aliquando contingit, in quibus cum vteri orificium internum penitus occlusum sit, hūc fluxum non ex cauo vteri promanare potuisse, sed ex illius collo, satis demonstrat, atq; in illis quæ vterum non gerunt, similiter euenire idem etiam cōprobat. Nec mirum naturam per eandem viam per quam sanguine euacuare solet, hæc excrementa si ea exuperent, repurgare, cum hoc & in aliis locis per vasa aliis rebus vehendis destinata, ea quandoq; moliatur. Verum quod citra cruoris permissione, humor ille venas hæc permeet, hoc ideo, quia fluxus ille extra tempus, quo natura eas ad fluxum menstruum excitandum sanguine implere solet, & proin eo veluti destitutæ sunt, euenit. Vti &, quia natura sanguinem ab impuritate hac segregans, ipsum tamquam vtilem retinet, excrementa hæc verò tanquam vitiosa atq; prænaturalia, eo modo vti dictum, ejicit. Quæ excrementa si aquea sint, à feri in sanguine copia, si pituitosa, à crudo sanguine eo deriuata, si saniosa, à sanguine nonnihil tincta, procedunt: quibus si alij humores excrementitij permisceantur, vt bilis crocea viridis aut atra, tunc pro horum ratione, colore alieno hoc illòve fluor imbutus est, atq; si acres sint eiusmodi humores, vel serum quod effluit admodum salsum, tunc & fluxus ille irritando, & vrendo, interdum in locis quibus adhæret, pruritus & ardoris sensum parit, & si diu durat, aliquando & ea exulcerat. Alias verò si hisce destituatur, sine sensu, instar aquæ vel albuminis oui cōquassati profluit, nec tunc adeò, nisi immodicus sit, vti cum vitium quoq; in se habet, noxius existit.

Cæterum horum excrementorum in sanguine contentorum, quæ fluxui huic muliebri materiam præbent, causa, ab illis quæ assumuntur, atque à viscerum concoctioni excrementorumq; segregationi destinatum imbecillitate dependet, eoq; modo ab

illis procedit, sicuti in affectibus etiam aliis, qui ab iisdem excrementis in sanguine retentis proueniunt, maximeque in cachexia, quæ huius floris plerumque, nisi per eum, succus crudus eam producat, admodum expurgetur, comes est, hæc abundè descripta fuerunt. Quæ excrementa, natura vti dictum, quando illis grauat sic expellit, eoq; citius, si vteri simul adsit imbecillitas, vti variis de causis ita & huius floris diu hæc fedas alluentis & humectantis & refrigerantis causâ, exorta. Vti etiam si natura ad horum propulsionem, alio modo quoq; excitetur. Sicuti mulieribus, quæ nunquam hunc fluxum passæ fuerunt, hunc postquam medicamenta cathartica sumpserunt, quia natura eorum vsu, ad alias excretiones moliendas excitata fuerat, superuenisse obseruauimus: Multasq; dum thermis aliquandiu insedissent, hoc vitium contraxisse, non ob contagium, quia cum aliis, quæ eo laborabant, in eodè balneo sederint, vti verò sibi persuadet, sed quod vsu horum continuo sicuti per sudores natura excrementa deponit, sic & per hanc excretionem, eadem, maximeque quæ ob crassitatem sudore exhauriri nequibant, expellit.

A totius corporis superficie emanat ferum quod in Sudore exudat, idq; ob contiguitatis solutionem aliquam cutis & cuticulæ, licet obscuram nec manifestam, vnde serum quod sanguini confusum & per superficiem corporis diffusum, & in venis illic inclusum est, eas permeas, omni sudori causam præbet.

Quæ contiguitatis solutio procedit tum à pororum apertione aliquâ, vel anatomosi, vel cuticulæ rarefactione, aut diapedesi: tunc enim serum cum tenuissimum sit, poros permeando, per cuticulam transudando, sudores efficit. Hanc autem in cute & cuticula apertionem, serum molitur, si eo attrahatur vel propellatur.

Attrahitur serum calore potissimum, si corpus extrinsecus eo incalescat, tunc enim serum cum sanguine ad corporis superficiem rapitur, atq; per cutem eo ferè modo, sicuti calore aqua è plantis per distillationem dictam, elicitur, eoq; melius, cum & simul calor cutem dilatando, serumq; nonnihil accendendo attenuandoque, vt propius penetret, efficiat.

Quod

Cutis poros permeans ferum, causam Sudoris.

Quod & serum si maior illius adsit copia, vel tenuius acre, & bilis ichoribus refertum, fluidumq; proinde sit, facilius copiosiusque calore allicitum, exsudabit. Quæ ut calor in sudore naturali, cuius præcipuè causa est, molitur, ita si vehemens ille sit, aut diutius duret, vel etiam licet mitior, tamen serum tale ut dictum se offerat, præternaturali immoderato sudori causam præbebit. Qui calor ab exercitiis vehementioribus & balneis tam siccis quam humidis concitatur, & horum immoderatiore usu sudores immoderatos parit. Quorum causâ & balnea corpus enervare dicuntur.

In morbis veluti febribus licet corpus vniuersum admodum incalcescat, sudores vix erumpunt, donec natura causam morbificâ, ut iam ostendetur, per sudores expellat, quod in febribus intermittentibus cessante iam calore in die quietis, in continuis, circa harum declinationem, fit, cum dum corpus adhuc æstuat, in concoctione causæ morbificæ natura occupata, nondum donec ea præparata attenuataque sit, hanc per sudorem excretionem instituat.

Propellitur ad superficiem corporis serum à natura, si eo grauetur, tunc enim facultate expultrice, illud per hanc excretionem, quæ per sudores fit, nititur excutere; Grauiatur autem eo, quando vel quantitate vel qualitate peccat.

Quantitate si nimium redundet serum in venis, nec per urinas sufficienter expurgetur, tunc ibi cumulatam, cum ex illis per aliam euacuationem, à sanguine separari commodeq; repurgari non possit, à natura hac illi destinata, viâ, per sudores certo tempore, vel citra aliam attractionem, vel eadem simul per calorem accedente, exhauritur: Vnde qui parum mingunt, multum sæpeq; immoderatiùs sudant, præsertim ij qui humidis cibis, largoque potu copiam illius sibi comparant.

Qualitate si peccet serum, atq; permistione aliorum humorum ichorum impurum reddatur, naturaq; sic graue fiat, ab ea, uti per urinas, sic & per sudores propulsatur. In cacohymicis plerumq; corporibus, tunc sudores non naturali modo se habent, sed vel

fœtidi, vel tenaciores, caloreque aliquando alieno imbuti se offerunt, atque nunc in toto corpore, nunc certis saltem in sedibus, veluti extremitatibus, quo natura illuuiem solet excutere, conspiciuntur; ob quam & causam in pedibus & manibus, maior aliquibus consuetus, è quo sordes fœtidæ, uti in sordibus dicitur, etiam gignuntur. Qui omnes sudores vitiosi existunt, & morborum futurorum præcursores sunt.

In morbis si causa morbifica in sanguine, cuius portio etiam serum existit, consistat, veluti in febribus aliisve inde pronatis morbis accidit, natura eam si non per aliam viam aut urinas, per sudores frequentissimè è corpore elicit. Qui etsi nunc odore graui, nunc colore aliquo alieno parumper infecti, se exhibeant, si tamen decenter procedant non noxij sed salutares existunt. Quod si verò immoderatiùs erumpant, vel non sufficienter, aut tempore non conuenienti, nondum morbosâ ad expulsionem rectè preparatâ, inutiles & vitiosi habentur. Idem in morbis à vi malignâ pestilenti vel venenatâ & contagiosâ profectis, sæpenumerò euenit, ut natura eiusmodi qualitatè aduersam cum sero per sudores è corpore expellat, qui quoque sudores, nunc salutares nunc exitiosi existunt. Et si vel in his vel in aliis morbis contingentes, tunc se exhibent, quando calor nativus extingui incipit, corporisq; extremitates, in quibus primum hoc deprehenditur, refrigerari, tunc frigidi etiam sudores vel prodeunt, vel progressi mox tales fiunt. Quæ omnia quo pacto in morbis eiusmodi diuersis, in quibus sudores solent erumpere, fiant, in illis describendis fuit expositum.

Commota quoque natura animi affectibus, si spiritus cum sanguine intrò forasve propellat, sudores non nihil erumpunt, qui mox frigidi euadunt, si calor corporis introrsum vergens, superficiem corporis calore destitutam relinquat, veluti in Syncope accidere, atque in agone mortem instantem denuntiare videmus frigidum sudorem.

Ex aliis in corpore alicubi factis, vel superficialiter tantum, vel profundis aperturis, seri effluxus sequitur, ob solutam illic

cutis a-
perituræ
periculis
serum,
conti-

*causa il-
lus inde
effluat.*
continuitatem. Quæ si vel obiter in cuticulâ fiat abrasâ, serum leuiter etiam exsudat, vti & si scarificatione, sectione, vitione in phlyctenibus, pustulis aquosis, aut hydropicorû cruribus: Vel si per veram cutem, aut etiâ vltius penetrâte sectione, puncturâ, paracêtesi aqua ex abdomine hydropicorum, aut ex seroto in hydrocele, vel ex tumoribus aquosis emittatur: Vel ex vlceribus vti dictû malignis serum illud aquosum exsudat, sicuti in eiusmodi affectibus demonstratum fuit.

Curatio.

*Lachry-
marum
curatio.*

Lachrymarum ex oculis fluxus aliàs negligitur, aliàs verò curam requirit. Nam si à causa non perseuerante generentur, vt à commotione nimia in animi affectibus: vel irritatione, à splendore, odore, fumo & similibus, hisce cessantibus vel remotis, sponte iterum cessant. Præsertim verò hæc, si lachrymis oculi alioquin obnoxij sint, tantò magis declinâda. Quæ verò à causa durabiliore, perseuerantes aut sæpè redeuntes sunt lachrymæ, curationem requirunt. Et si cum rubore, ardore & pruritu in Epiphora dicta iungantur, indeq; procedant, eadem cura quæ epiphoræ debetur, in ea exposita, etiam lachrymis comitibus curandis competit. Vti & si cum vlcere oculi, vel fistula lachrymali copulentur, ab illisque proueniant, non nisi hisce curatis, cessabunt. Et proin cum ægrè hi oculorum morbi sanètur, ex illis natæ lachrymæ etiam difficulter abolentur. Ni fortè vti accidisse aliquando, in curatione fistulæ lachrymalis ostendimus, illa adeò ampla fiat, vel exeso osse interni oculi anguli, foramen illic tam latû aperiatur, vt aqua omnis ex oculo, per hanc viam deorsum in nares, nec ampliùs extra oculum, vti lachrymæ aliàs solent, profluat.

Ob pituitosi & serosi humoris copiam, nò per decentes vias se expurgantis, sed in oculorum sedem defluëtis, citra prædictos morbos, si lachrymæ oboriantur frequentes vel continuæ, tunc illis similiter cura debetur, quæ sic instituenda: Vt humorum horum in cerebro copia inde expurgetur, prouentusq; illorum impediatur, defluxusque ab oculis aliò diuertatur & sistatur, lachrymæque ab-

sumantur, oculisque robur addatur. Quæ sic sunt.

Expurgantur è capite humores eiusmodi per alium, exhibitis catharticis, per os Masticatoriis, per nares Errhinis; licet autem errhina irritando lachrymas concitent, quia tamen easdem ad nares promouent, plus commodi quàm detrimenti adferunt. Quælia quæ hoc illudve præstant, passim in affectuum variorum à defluxionibus è capite pituitosorum & serosorum humorum prosectorum: vt dolorum in habitu corporis inde genitorum, & tussis præsertimq; ophthalmiæ falsæ, & Visus imbecillitatis curâ descripta fuerunt. Inprimis autem sudorum frequens prouocatio, humiditates illas vti in vniuerso corpore, sic & in capite admodum aufert & absomit. Quam proin vti in aliis defluxionibus perseuerantibus, sic & lachrymis admodum infestantibus, tandem per vsum decocti Guaiaci, aut alia sudatoria diu continuata, cum stuphæ, & balnea non ita oculis conueniant, instituere solent. Eo modo vti hæc in aliis defluxionibus etiam exponuntur.

Prouentum horum humorum in capite impedimus, Parcâ & laudatâ victus ratione: Exhibitis & adhibitis capiti siccantibus, caputque roborantibus, Suffimigiis itidem idem præstantibus, passim quoque in defluxionibus dictis declaratis.

Diuertimus ab oculis defluxiones hæc, Cucurbitularum vsu, & Frictionibus, aliisve reuellentibus & deriuantibus: atq; nisi hæc iuuent, ad caustica tanquam extrema remedia transimus, & Vescicatoria ceruicis posteriori vel scapularû regioni adhibemus: Cauteriaq; actualia vel potentialia, hisce sedibus vel vertici capitis imprimimus: Eodem modo, sicuti in prædictis affectibus à defluxione genitis, similiter exposita sunt.

Sistimus defluxionem oculis illabentem, admotis fronti & temporibus, quæ siccado vel adstringendo descensum illius cohibent, emplastris præsertim, in defluxionibus oculorum, in ophthalmiæ falsæ cura expositis.

Ad absumentas lachrymas, angulis oculorum Collyria instillantur, cum cubitum eunt, vt in decubitu supino, oculis per so-

num clausis melius retineantur, vel bomba-
ce aut spongiola excepta, illis induntur: vel
unguenta imponuntur aut pulueres insper-
guntur, aut fumi oculis excipiuntur.

Quod multa ex illis quæ in Epiphoræ &
Vlcerum oculi cura topica remedia, ad siccā-
dum potissimum præscripta sunt, etiam in
lachrymis hisce, citra hosce morbos occur-
rentibus, absumendis, præstare possunt.

Veluti in epiphora descriptus pulvis, qui
Rz. Cadmiæ fossilis, &c. Et qui Rz. Antim.
præpar. Et collyrium de Hematite; Fumus
item ex Thure, &c. & suffitus ex Sale: Item
ex Vitreolo albo illic parata collyria & pul-
uis ob validam illorum exiccationem.

Et in vlceribus oculi unguenta illic præ-
scripta, album, rubrum & nigrum vtrum-
que Collyriū, item quod Rz. Sarcocollæ, &c.
Aliudq; potentius: Item Rhazis tria collyria
Eleifer, ex Plumbo, & Polychreston, omisso
in duobus postremis opio.

Præter hæc, Aquæ aliæ siccantes hisce col-
lyrijs misceri possunt: Veluti Myrthi aut
Myrtillorum, Caprifolij, Sumach, Agtimo-
niæ, florum Ligustri, Labruscæ & Salicis, aut
ex fructibus acidis vt Granatis vel Prunellis
sylvestr. exstillatæ.

Decoctum plantarum quarum aquis vti-
mur, efficacius siccabit; Imprimis Mali gra-
nati. Platani folior. decoctū probat Dioscor.

Imposita item folia Elatine, cum polenta
inuare idem docet:

Puluerem itidem Ebeni ligni ramento-
rum immixtum.

Unguentum oculi angulo indendum hoc
erit efficax: Rz. succi Malorum granatorum
acidorum; Vel succi summitatum Rubi aut
Rosarum fol. q. s. decoquatur ad consum-
ptionem medietatis, misce. Myrobalanorū
ossium vstorum, & Vuæ acerbæ si haberi pos-
sit q. s. ad incorporandum: Adde parum de
succo, qui ex lapidibus Hæmatite, Galactite
vel Cote albâ, quâ tonsores suas nouaculas
acuunt, prodit, quando alijs cotibus affrican-
tur, misce. Hisce & alij pulueres siccantes ad-
misceri possunt.

Vitreolum vltum addito Saccharo, & dis-
solutum Aquâ, paratu facile efficaxq; esse re-
medium.

Stillicidium narium aqueum vel mucosum, cum à cerebri excrementis proveniat, hisce potius ne abundant, cura erit adhibenda, quàm vt aliâ ratione fluxum hunc velimus compefcere.

In Goryza seu grauedine, in qua non so-
lùm magnâ quantitate aqueus humor è na-
ribus effluit, sed & nares partesq; vicinas v-
ti dictum molestiâ afficit, aliquando & tuf-
sim simul infert, cura similiter excrementis
cerebri expurgandis, & defluxioni inde na-
tę accommodabitur, non aliâ ratione, quàm
& in tussi cæterisque defluxionibus fieri de-
bere docuimus. Interim tamen etiam par-
tium inde læsarum, vt narium rationem ha-
bentes, topicaque vti in ipsarum inflamma-
tione & vlceratione dictum, illis adhibētes.

Ex auribus proueniens aquosus humoris ef-
fluxus, si paucus sit, nec aliam noxâ inferat
præter eam curam quâ corpus ab hac super-
fluitate mundum reddi debet, aliâ priuatâ
minimè opus habet. Vti nec si copiosior il-
lius sit effluxus, in quo ea quæ humorū isto-
rum prouentum impediunt, eosque expur-
gant, admiscendo & hydragoga & diureti-
ca, vsurpari debent, quorum varia exempla
in ascitis hydropis cura sunt exposita. Si
spissior & mucosa hæc aqua reddita, non ita
promptè vti tenus effluat, ea diluentibus
& abstergentibus eluenda erit: hisdem qui-
bus & pus ex auribus repurgari debere, in
eo fluxu demonstrauimus.

Fluor vterinus, quem Menstrua alba vo-
cant, licet in quibusdam feminis citra no-
xam grauiorem diu sæpè perseueret, tan-
dem tamen eas discolorēs & seigniores red-
dit, mulieresque ad conceptum minus a-
ptas, atque ob hunc maiorem viris quan-
doque invisas, quâ de causâ ab eo liberari
maximè optant: Quod non sine difficul-
tate, si præsertim diu durarit, perficitur,
vixque integrè, quin aliquando fluxus ille
redeat, tollitur.

Quod si in super vitiosa hæc quæ effluit
humiditas existat, tunc præter turpitudi-
nem adhuc maiorem quam adfert, nonnun-
quam & foetore, noxæ quoq; alię in vteri
cervice, interdum & illi cōtinuato vteri fundo,
inter quas præcipuè est exulceratio tandem
succe-

Stillicid-
dij nari-
curatio.

Goryza
curatio.

Aurium
effluxus
quasi
curatio.

Vterini
fluoris
curatio.

succedunt: Alias etiam ob nimiam inanitionem alij morbi sequuntur.

Scopus curandi in eo consistit, vt prouentum horum excrementorum, prospiciendo etiam vetriculo, impediamus, eaq; e corpore educamus atq; absumamus, & ab vtero reuellamus, vteruq; exiccemus ac roboremus. Quæ omnia huius solius fluoris causâ fiunt. Quod si verò alij affectus huic fluori complacentur, qui illi causam præbuerunt vel eum sequuntur, veluti cachexia, hydropis principium, tunc simul & hisce ante omnia prospiciendum, visceraq; concoctioni destinata, quæ labem aliquam contraxerunt, erunt corrigenda. Si sterilitas inde quoque sequatur, mulierq; & fluore hoc molestetur, & sterilis sit, vtriusq; cura accommodabitur, qualis si conceptio ob humiditatem aut excrementorum vteri copiam impedita sit, in sterilitatis cura exposita, hic quoq; poterit competere. Cæterum huius fluoris potissimum causâ, cura per euacuantia & alterantia sequenti modo erit administranda.

Euacuationes ad excrementa hæc ab vniuerso corpore, in quo ferè redundant, repurganda, variæ instituuntur per sanguinis imminutionem, deiectiones, vomitus & diaphoretica.

Sanguinis imminutio cum vnâ cū illo excrementorū portio quoq; aliqua educatur, in plethoricis vel nondū emaciatīs corporibus locū habere poterit: Quæ per venâ incisam & scarificationē perficitur: Vti & mensium prouocationem, si illi substerint, cum per hos vnâ cum sanguine excrementa fluorem vterinum gignentia aliquādo penitus, alias ex parte, ita vtille fluor vel non sequatur, vel parcius se exhibeat, repurgentur.

Deiectionibus per aluum concitatis, imprimis corpus purum & mundum ab excrementis reddere studebimus, eoq; frequentius cum ea copiosa esse, vt ferè sunt, ex fluoris copiâ & perseverantiâ cognoscimus, quæ pro ratione ipsorum, prout vel serosa aut pituitosa magis sunt, & bile hac illave, aut alio humore permista, obseruatâ maximè corporis constitutione, & qui nam in eo humores potissimū redundant, hisce euacuandis accommodamus: admiscendo in hoc

quoq; fluore, vti & in alijs ad eum insuper sistendum, si profusus sit, purgantia adstrictione aliquâ prædita.

In humidioribus corporibus, in quibus hic fluxus serosus vel pituitosus potissimum existit, ante purgationem sic præparamus. Propinando præmissâ ventris lenitione per clysmata aut exhibita minoratiua, ad dies 3. 4. vel 5. sequentia:

Veluti Iulepum qui R. Mellis rosat. colat. Syrupi de Hysopo ana ʒ. ij. Syrupi de Stœchade, de Arthemisia ana ʒ. j. aquarum Melissa, Betonica, Nepetæ, Pulegij, Saluiæ, ad duplum vel triplum cum Syrupis; misce; aromatiz. Cinamomo vel Spicâ, vel puluere Diamoschi aut Diambrae.

Vel vtatur hoc decocto: R. rad. Iridis ʒ. j. ʒ. rad. Rubiæ vel Valerianæ ʒ. j. rad. Cyperi, Enulæ an. ʒ. ʒ. herb. Betonica, Nepetæ, Melissa, Arthemisia vel etiam aliarum plantarum prædictarum aquarum ad M. iij. vel iij. summitat. Rosmarini, florum Lauandulæ vel Stœchados, Cheiri, Rosarum rubrarum ana p. j. sem. calidorum Maiorum ʒ. ij. Minorum ʒ. j. Cicerum p. j. decoquantur in Aqua, atq; addito Saccharo vel Melle dulcorentur, & Cinamomo vel Spicâ aromatizentur: Pro quatuor vel quinque vicibus.

Purgetur postea hoc pacto: R. decocti præpar. q. s. pro vnâ vice, adde feminis Carthami, fol. Sennæ an. ʒ. ʒ. fiat decoctio, infundatur Agarici cum Melle rosat. diligenter permisti ʒ. ij. fiat potio.

Vel dentur ex vsitatis, Diaphœnicon, Diacarthamum, De citro solutiū: vel per se vel dissoluta cum decocto vel aquis præparantibus. Aut sumat pilul. de Agarico, Coccias, Fœtidas, similiaque.

Per vices vt humores hi aquei & pituitosi diligenter e corpore educantur, purgandæ erunt: Vel leuioribus sæpe exhibitis; Qualia sunt pilulæ de Hiera, Mastichinæ, Assiæ, reth, Alephagine: Vel etiam fortioribus iam enarratis: Inter quæ decoctum pro potione descriptum, auctis omnibus ad triplum vel quadruplum, atque incoquendo simul vel infundendo Agarici troch. ʒ. v. Turpethi ʒ. iij. Zingiberis ʒ. ʒ. in formâ apozematiz vel Syrupi vsualis redigi poterit, sicq; suc-

cessiue vsurpari: Vel hæc omnia in Vino infusa & vel saltem macerata, vel leuiter in duplici vase etiam cocta, addito insuper Absynthio, eo pacto vsurpari possunt.

Multa alia præparantia & purgantia in aliis morbis, à pituita & sero maxime à defluxionibus profectis, hic quoque possunt competere, quæ inde peti huicq; affectui accommodari debent.

In impuris aliis corporibus, vnde vitiosus hic fluxus & malè coloratus oritur, præparatio sic poterit institui.

Per iulepum: R. Mellis. rosari colati 3.ij. syrupi de Bëtonica, de Endiuia, Fumariæ simpl. vel Lupulorū an. 3.j. aquarum Absynthij, Capilli veneris, Buglosi vtriusque, Fœniculi, duplici vel triplici ad syrupos mensurâ, misce: Per aliquot vices est sumendus.

Vel per hoc decoctum: R. radicem Liquirit. 3.j. β. Cichorij, Fœniculi, rad. Dentis Leonis, cort. Sâbuci, Ebuli an. 3.j. herb. Endiuia vel Cichorij, Buglosi vtriusque, Fumariæ, Lupul. Bëtonicæ ana M. j. florum Cordial. florum Genistæ ana P. j. quatuor feminum frigidorum Maiorum 3.β. femin. Fœniculi, Anisi ana 3.ij. femin. Cuscutæ 3.j. fiat decoctio, quæ coletur & dulcis reddatur Saccharo, aromatizetur Cinamomo vel Spicâ aut puluere Diarrhodon.

Purgetur dein hoc modo: R. decocti præparat. q. s. adde. foliorum Senæ 3.β. Myrobal. citrin. 3.j. β. fiat decoctio, infunde Rhabarbari elect. 3.j. syrupi Rosarum solut. simplic. 3.j. β. vel succi Rosarum 3.j. fiat potio.

Huius loco, potiones in menstruo fluore descriptæ, quarum vna R. Tamarind. Prunorum, &c. altera R. cortic. Myrobal. citrin. exhiberi poterunt.

Vel dentur ex vsitaris elect. de succo Rosarum, Diasenæ solut. Confectio hamech dissoluta cum decocto prædicto vel aquis, aut sero caprino; Vel pilulæ Aggregatiuæ, vel alia eiusmodi.

Cum pluribus vicibus purgare volumus, damus aliquoties ex leuioribus, Catholicon, Diascaphen, Trypheram persicam; vel syrupum Rosarum solut. simpl. vel cum infusionibus Senæ, Rhabarbari, Agarici: Vel syrupum de Fumaria composant de Epithy-

mo: vel de efficacioribus modò expositis.

Vel sequens apozema: R. Decoctum præparans supra dictum pro quatuor vel quinque vicibus, addendo Passul. enucleat. par. x. Prunorum numero vj. Tamarind. 3.j. radic. Polypod. 3.ij. β. foliorum Sennæ 3.ij. Epithymi 3.ij. cortic. Myrobal. citrin. chebul. indarum ana 3.ij. fiat decoctio in Aqua, & in colaturâ infunde Rhabarbari elect. 3.ij. Spicæ 3.j. fiat expressio, adde Sacchari q. s. pro apozemate dulcorando, vel in formam syrupi incoquendo.

Præter hæc multa alia & præparantia & purgantia in cacochymicis, biliosis aliisve affectibus, ab eiusmodi excrementis genitis, hic quoq; in similibus excrementis, hunc fluorem gignentibus expurgandis, possunt competere: Vti & purgantia quædam ex illis quæ in cachexia descripta sunt, si præsertim illa fluorem hunc comiterur: Vel etiam ex hydragogis aliqua, si feri magnâ in corpore redundantiam ex hydropis imminetis indicij cognoscamus, in hydropo exposita hic quoque exhibere, vel hisce purgationibus fluori huic competentibus commiscere debemus.

Vomitum ante cibum factum, cum crudorum & pituitosorum humorum vti & biliosorum magna fiat & subita euacuatio, corpora quæ eum ferre possunt, valde expurgantur. Vti & eo qui post cibum fit, quo tempore facilius vomunt, & vel cum cibo, vel etiam sine illo, vti sæpe obseruatur, nihilominus multa excrementa eiusmodi euomuntur: Fit quoq; in concussione hac per vomitum factâ, aliqua excrementorum ab inferioribus ad superiora reuulsio.

Diaphoretica, quæ per corporis habitum euacuant, insensibiliter per transpirationem, vel sensibiliter per sudores, in serosis & pituitosis corporibus, ad fluorem hunc abigendum, si præsertim diu hæc continuentur, plurimum iuuant.

Ad quam rem, Exercere corpus donec admodum caleat, vel etiam sudet, aliquam vtilitatem adferet.

Integumentis, aut indumentis, corpus ad calorem vel sudorem vsque compellere, idem efficit.

Præcipuè verò aëre calefacto hoc moliri, in Balneo sicco cum sudores potenter eliciatur, plurimum proderit, si præsertim decocti alicuius sudorem promouentis suffitu stupha calefiat: Veluti flor. Chamomillæ, Meliloti, aliarumve herbarum odoratarum calidarum, ex quibus balnea parari humida, in quibus sedeant, mox ostendemus. Quorum vsu & sudores simul eliciuntur.

Vti & Fumis, quibus totum corpus suffumigatur, atque inunctionibus spinæ. Quæ & præter quod sudores mouent, corpus insuper siccando, humiditates hæc admodum absumunt. Inter quæ fumum cinnabaris, vti ille in lue venerea vsurpari solet; sed hic paucâ saltem additâ illius cum cæteris quantitate, ne fauces inficiantur, plurimum in desperato hoc malo profuisse, vidimus.

Exhibitis sudores prouocantibus hoc quandoque perficitur, interdum ea propinando. Vel in perseuerante & diuturno hoc fluore hæc ad aliquod tempus vel septimanas continuando: adhibita insuper cibi parsimonia: Atque sic ligni Guaiaci decocto vel Zarsæ parillæ aliisve in Luis Venereæ curâ expositis, cura hæc perficienda.

Alterantia exhibentur, quæ humiditates hæc corporis exiccent & absumant, eoque validius, si aqueus & pituitosus hic sit fluor, addendo illis, si immodicus sit, quæ adstrictione insuper prædita, illum etiam nonnihil cohibeant. Qualia multa in mensium floris cura exposita, quæ assumuntur, atque adstringendo illos sistunt, hic quoque, si nimius adsit fluor, possunt competere: cum alioquin, quia per illum illuuias ea expurgatur, non utilis sanguis, vt in menstruis, nec corpus adeò vti ab illorum fluore, aut non tam citò debilitatur, non statim fluor ille sit compescendus, ob quam & causam hic potius hæc remedia siccando quàm adstringendo, secus ac in mensibus, præualere debent, quibus & quæ calore suo vtero simul amica sunt, permiscantur: Danturque sequentibus formis.

Puluerum forma efficacius illud præstat: Danturque hi pulueres, vel per se cum Vino rubro stiptico vel chalybeato, aut alio liquore: Vel possunt sumi addito Saccharo in for-

ma Pulueris, vel Tabularum.

Primus: R. Cornu cerui viti 3. ij. rasuræ Eboris 3. j. Coralli rubr. vsti 3. j. β. fiat puluis.

Alter: R. Succini puri 3. ij. Thuris vel Mastiches 3. j. gummi Arabic. vel Tragach. 3. β. pulueriscentur.

Tertius: R. ossium Dactylorum tostorum 3. ij. nucleorum Granatorum acidorum vel Rosarum 3. j. corticis interioris lanuginosæ Castanearum vel Auellandarum 3. β. fiat puluis.

Quartus: R. corticis Suberis vsti 3. ij. granorum Sumach 3. j. Acaciæ vel Hypocistid. 3. β. fiat puluis.

Quintus: R. baccarum exiccatar. Berberis, Rubi humilis vel Idæi vel Mororum, Myrtillorū ana 3. j. se. Viticis 3. β. fiat puluis.

Sextus: R. foliorum Consolidæ maioris 3. ij. foliorum Alchimillæ vel Millefolij 3. j. Mentæ 3. β. fiat puluis.

His singulis ad gratiam de sequenti puluere 3. β. fiat addi poterit: R. radic. Cyperi, Galangæ ana 3. j. β. cortic. Citri sicci, Cinnamon ana 3. j. semin. Anisi (quod in albo fluore prodesse docet Dioscorid.) 3. j. β. semin. Coriandri torrefacti 3. j. Spicæ 3. j. fiat puluis.

Vel huius loco, tantundem specierum Aromatic. rasati, vel Diagalangæ aliarumve siccantium addi.

Ex commistione horum compositi alij etiam fieri possunt pulueres, duos, tres vel omnes simul miscendo.

Alij quoque pulueres in fluore hoc cōpetūt, qui simplices inuicemve permisti, vel supradictis additi, sumi poterunt. Vti radix Gariophyllatæ, Chamæleontis, Vlmariæ, foliorum Quercus, Rubi, Sumach, Potétille, Pulmonariæ, Ophioglossi, Lunariæ minoris, Rosmarini, florum Amaranthi purpur. Milij Indici panicularum, florum Rosarum staminum capillaceorum, luteorumque in illis apicum, seminum Pæoniæ: Item cineres Astacorum fluuiatilium, Concharum marin. Spongiæ combustorum.

Si admodum astringendum in fluore nimio, potest de hoc puluere prædictis aliquid addi: R. Gallarum vel cortic. Granatorum 3. j. Balauftior. 3. β. Boli præparat. vel Terræ

alterius 3.j. Lapidis hæmatitis 3.β. Acacię vel Sanguinis draconis 9.β. fiat pulvis: Vel alia etiam astringentia in aliis fluxibus exposita.

Decocta ex prædictis plantis, quarū pulvis cōuenit, fieri possunt, sicq; vsurpari; vel Vina ex aridis illis in Vino infusis vel coctis. Polygoni decoctum in vino admodum probatur.

Succi earundem plantarum, per se vel permisti similiter assumi poterunt.

Syrupi ex hisce parari ad vsum possunt: Vel ex vſitatis dari syripi nonnihil adstringentes, in mensum fluore expositi, additis vterum respicientibus, veluti de Arthemisia, flor. Stæchados & similes.

Aquæ propinquantur Plantaginis, foliorum Quercus teneriorum, Potentillæ, Millefolij, Alchimillæ, Rosarum peculi, Nymphæe albæ, Mentæ, Sorborum.

Conserua Rosarum antiqua, Balaustiorū, vel Cytinorum, Acori vulg. Anthos, Stæchados, Condit. Citri.

Misturæ ex prædictis fiunt in forma electuarij, miscendo conseruas cum pulueribus & superbibendo aquas.

Pilulæ de Bdellio vti in aliis fluxibus, ita & in hoc sæpè sumptæ commendantur.

Comesta Cymbalaria in acetariis aut cocta: Item Vrtica mortua.

Extrinsecus circa vteri regionem, illiusq; orificium externum, varia adhibentur, quæ siccando humiditates circa vterum maximè redundantes, absumunt, & adstrictione aliqua prædita, vasa cum ambientia, per quæ fluxus hic fertur, nonnihil constringunt, vterumq; simul roborant. Qualia sunt sequentia.

Aquarum naturalium thermarū, ad plures dies vel septimanas continuatus vsus, prægressâ corporis evacuatione, & per vices repetitus, adhibitoq; decenti regimine, tum exiccando tum sudores promouendo, plurimum iuuat. Eoque nomine mulieres quæ hunc fluxum patiuntur, maximeque steriles simul sint, eas adire, illisque vti solent. Conueniuntque quæcunque vi siccante prædite sunt, in sterilitate expositæ, Aluminosæ, Nitrosæ, Salsæ, vel suâ naturâ actu calidæ aut arte calefactæ. Nec non Sulphuræ, quarum vsu mulieres aliquas, hunc fluxū quo prius carebant, primum cōtraxisse ob causas prius

expositas, nec ab eo donec vsus illarū rursum repeterent, liberatas fuisse, aliquoties obseruauimus.

Artificialia balnea quibus immergere inferiore corporis regionem ad vmbilicum vsque debent, pedibus exemptis vel simul, si illis oboesse nequeant, intromissis, idem præstabunt, vel diu continuata vti de thermis dictum, vel per interualla vsurpata. Sicuti in sterilitate ostensum, quâ ratione & hic adhiberi possunt. Paranturq; interdum vt thermis corresponsdeant, ex Sale, Alumine, Sulphure, decoctis in Aqua pluuiali, Cisterne aliæ, eâ quantitate, vt falsedinem aliquam vel odorem sulphuris aqua contrahat: Addendo interdum si adstringendum, etiam Chalcantum vel Chalcitum, aut Scoriam ferri, cuius loco Aquâ extinctionis ferri vti possumus. Gypsum vsum si ceteris permisceatur, vim siccandi augebit.

Ex plantis balnea parata, similiter competent, si fiant ex decocto facto in Aqua prædicta, addendo quandoque & Aquam extinctionis ferri fabrorum vel Lixiuum, aut Vinum rubrum, incoquandoque radic. Bistortæ, Lapatij, Rubiæ, Valerianæ, Cyperi, herbas, Clematim daphnoidem, Arthemisiam, Betonicam, Tamaricem, Sabinam, Hederam. Si amplius adstringendum, Gal-læ, Glandium capulæ, cortic. Granatorum & Suberis, Sumach, Rosæ, Balaustia, Muscus quercinus, baccæ Myrti similiaque addi possunt. In frigidis mulieribus odoratæ calidæ plantæ adduntur, veluti Pulegium, Origanum, Calamenta, Mentastrum, Melissa, Saluia, Nepeta, Maiorana, Rosmarinus, ex feminibus Calidis maioribus minoribusque aliqua, item Rutæ & Viticis. Huic decocto si prædicti terræ succi salis & nitrosi vel atramentosi addantur, aut alia terrena, vt Bolus, Lapis hæmatites, amplius tunc siccabunt & adstringent.

Fotus & ablutiones genitalium mulieris, ex iisdem naturalibus vel artificialibus balneis, si sæpè repetantur, loco in seſsionū vsurpari possunt. Vel fiat sacculi, supra quos mulier dum calens sæpè sedeat, herbis decoctis repleti, inter quas Eruca agreſtis, in Vino decocta, si sic subiciatur, fluxum hunc si sano-

niosus sit, curare docent. Ex odoratis enarratis plantis, si aliquæ horum fortium decoctis misceantur, foetorem qui ab illis excrementis exspirat, eadem operâ corrigent, imprimisq; si folia Lauri, vel Myrthi addantur, radix Angelicæ, semen Coriandri, Gariophylli & similia suaueolentia, atque Acetum rosaceum, flores Sambuci aliudve odoratum decocto addatur.

Inunctiones atq; emplastra pubis renum & lumborum sedibus apposita, vti menstrua immoderatiùs fluentia, sic & hunc fluxum, cum per easdem vias feratur, nonnihil cohibere possunt: Et proin in illis exposita olea (inter quæ & oleum Hyosquiami, vti in illo sic & hoc fluore aliqui approbant) hic quoque vsurpari debent: vti & vnguenta & emplastra ibidem exposita. Quibus & hic, cum aqueus sit humor qui fluit, calida permiscere possumus: vti de puluere aliquid, quem pro pessario vt tetrum odorem emendet, præscripsimus: Galliamq; moschatam, Moschumque & Ambram in magnatibus, quorum tamen odor admistione aliorum reunditur vel amittitur.

In ceruicem vteri varia intromittuntur, quæ illam, vti & fundum vteri vicinum, & largo hoc fluore humectata, rursus exiccant, & venarum orificia laxa adstringendo, fluxum hunc nimium, compescant, hisque sedibus robar addant.

Induntur ad illud præstandum herbæ aliquæ efficaciores, recenter contusæ, veluti Clematis daphnoides, Millefolium, Tamarix & similes: radix item Asari, quæ immunditiem abstergit, foetoremque corrigit.

Pessarium quod exiccet hoc pacto fit: R. Gallarum vel Capularum glandium ʒiij. Nucum cupressi ʒij. Balauft. ʒj. Thuris ʒj. ʒ. cineris Tamaricis ʒj. Sabine vel Arthemisiæ ʒ. ʒ. Stercoris caprin. vel asini exiccet. ʒj. excipiantur succo Bursæ pastor. & Albumine oui, impleatur sacculus pro pessario.

Ad tetrum simul odorem emendandum: R. rad. Cyperis ʒij. Maioran. Mentæ, Pulegij pulu. an. ʒij. Squenathi, Spicæ an. ʒ. ʒ. Gariophyllorum ʒj. fiat puluis, quo vel solo vel prædictis commisto vti possumus. Potest & addi Santalum citrinum vel Lignum aloës.

Gallia moschata, Moschus & Ambra addita, suauiore adhuc conciliabunt odorem.

Iniectiones in vteri ceruicem, sunt detergentes & abluentes madorem illum &ordes adhaerentes. Qualis est iniectio leuiter abstergens in vlcerum vteri cura descripta. Aliæq; quæ sequitur validius operans; Dein & tertia cum foetor adest vsurpanda; quaratq; idem præstans.

Siccantes iniectiones ad vterum siccandum ab eiusmodi humiditatibus, & adstringentes ad fluorem cohibendum, sunt ex decocto siccante & sanante vlcus vteri, sicuti in eo descriptum fuit. Vel parantur ex balneo aut fortu, quibus extrinsecus aliis vtimur. Et foetor adfit, eadem quoque quæ illic dicta sunt, admiscemus.

Suffitus & fumi vteri sinu excepti, cum altius penetrent, illique vndiquaque se affigat, admodum siccando adstringendo vterumq; roborando: cum si odorati sint, illis vterus delectetur, operantur. Qui suffitus è decocto plantarum quarundam, in balneo declaratur, dum feruet, fuscitari & in vase vtero supponi, ac per infundibulum vel vestes circumductas admitti possunt.

Vel Fumus, ab iniectionibus supra carbonem, pulueribus vel trochiscis in sterilitate expositis, excitatus, eo modo excipi; Vel ex hoc puluere carbonibus iniectione parari potest: R. Mastiches ʒij. Thuris, Ladani ana ʒj. Succini Hypocistidis, Storacis, Benzoini ana ʒ. ʒ. fiat puluis. Bdellium hisce additum probant aliqui.

Viuenti ratio idonea simul adhibebitur; Quod fiet si versetur in aëre sicciore, vitetq; frigidum & vduum: Cibo parca vtatur, eoq; minimè excrementitio, aut multam humiditatem gignete: Potu admodum moderato, Vinoque potius quam aqua: Ociam vitet, Somnumq; nimium durantem.

Sudores vitiosi quales sunt graueolentes, tenaces & qui linteamina colore alieno nonnihil imbuunt, cum & in sanis & ægris, per eos excrementorum è corpore fiat expurgatio, compesci minimè decent, aut naturæ ille motus impediri, sed potius promoueri: Atque redundantiarum harum causâ, quæ materiam huic sudori præbent, cura in-

institui, corpora quæ sic à morbis, quos sudores hi prælagiunt, præcauere: Et si in morbis, hi sudores proueniant, nec morbum soluant, similiter ad remanentias causæ morbificæ, quæ sudoribus hisce occasionem præbuerunt, nec integrè expurgatæ fuerunt, extirandas penitus curam dirigere oportet.

In frigidis sudoribus emendandis nihil peculiare quoque; faciendum, cum si in morbis lethales sint, prognosticis relinquantur: Si ex animi defectione hi erumpant, sponte ad se iterum redeuntibus ægris, desinant.

In nimis sudoribus, vires labefactantibus, si à calore proficiscantur, hic erit corrigendus. Si ob feri copiam, illius prouentum impedire, copiamque minuere oportet. In morbis si superflui & inutiles sint sudores, nec hi facile, nisi admodum vires iam prius morbi vi deiectas, prosternant, reprimendi: cum verò vel hi per quos aliquam naturæ euacuationem tentat, vel alij qui ad causæ morbificæ expulsionem rectè à natura instituuntur, adeò profusi sunt & continui, vt ne æger citius extinguatur quàm morbus finiatur, periculum sit, tunc ad eos compescendos cura adhibenda. Quæ omnia sequenti modo perficiuntur.

Euacuamus corpora ad sudores, ob feri copiam nimios & superfluos procliuia, per Venæ sectionem si plethorica sint, cum tunc & feri quantitas vnà cum sanguine educatur.

Purgantibus item exhibitis, quæ serosos humores aut eos qui illis permisti sunt, eosque nimium fluidos reddunt, educant. In morbis quoque, sudores superflui vel nimij morbum non soluentes vel non integrè, reiterandas purgationes esse, nos admonent.

Sudorum promotio, sudores sponte venientes interdum sistit, si hi qui illis obnoxij sunt, & leuem ob causam sudoribus instantur, balneum intrantes aliquoties egregiè sudent, & sudoribus materiam præripiendo, sic consuetos anteuertant.

Propinquantur quæ serum non nihil incrassando & refrigerando, viasque astringendo, vt minus fluxile fiat & promptè penetret, efficiendo, sudores sic impediunt. Qualia

in mictione immoderatâ, eodem modo eam retinere, ostensum fuit. Quæ & hic conuenire poterunt, permiscendo interim illis ea quæ vires restaurant, si hæ labefactatæ sint: Sicque competit cibus & potus ibidem designatus. Quæ in ægrotis pro morbi ratione dirigenda erunt.

Vrinarum prouocatio, similiter aliò serum diuertendo atque euacuando, sudores minuit vel compescit.

Ex medicatis ibidem quoque expositis etiam hic conuenient; Syrupi, Decocta, Aqua, Conditura, Mucagines, Pulueres, addendo cordialia, vt puluerem Diamarg. frigid. & similia.

Extrinsecus adhibentur repellentia feri effluxum, cutemque constringentia, & glutinositate poros obducentia, sensim à leuioribus ad fortiora si non illa iuuent, procedendo.

Inungantur spina, extremitates, nonnunquam & reliquæ trunci corporis sedes, Oleo in quo folia recentia Salicum, vel Succus eorum coxerint: Vel oleo Myrtillorum, Rosarum, Cydoniorum.

Vel: R. olei Salicum ʒ. iij. olei Myrtill. ʒ. ij. succi Semperuiui vel Solani, Aceti ana ʒ. j. ʒ. coquantur ad consumptionem succorum: Et vtatur.

Huic oleo addere possumus poros obliterantia, vt mucilaginem seminis Psyllij vel Cydoniorum ʒ. j. ʒ. infusionis gummi Tragachanti vel Arabici factæ in aquæ Rosarum ʒ. j. Album. oui num. j. Cera q. s. fiat linimentum.

Vel: R. Mastiches ʒ. ij. Santali rubri ʒ. j. Rosarum rub. Balaustior. foliorum Myrti vel baccar. ana ʒ. ʒ. excipiantur oleis prædictis, vel linimento, additaque Cera fiat vnguentum. Sulphur, Gypsum & Morochtum addit Dioscorides.

Suffumigantur validè siccantibus lintamina, indusia, vt dum cutem tangunt, eam siccando astringant, vel etiam nudum corpus, Thure, Mastiche, gummi Iuniperi, addendo interdum hisce puluerisatis Rosas, Balaustia & similia.

Odor Camphoræ in Aqua rosarum dissolutæ iuuare creditur.

tissimum coërcent, quæ tamen non subito dum corpus adhuc sudore æstuat, ne subita illa repercussio damnum adferat, sed sensim erunt adhibenda.

Aër hoc imprimis præstat frigidus, admixtus fenestris apertis, vel etiam detractis integumentis, denudato corpore. Qui nisi talis sit, cubiculum conspergendo Aquâ frigidâ, Aceto, herbis recentibus Frigidis, sic emendari poterit.

Faciei conspersio, similiter cum aqua & aceto, quoddam peculiari vi sudorem sistit, admodum iuuat.

Cordi & pulsibus epithemata actu & potentia frigida, vti & cordialia, si imbecillitas à sudoribus iam superuenerit, vtiliter adhibentur.

In Viuendi ratione, Aëre vtantur liberiore, nec calori se exponant, aut vestibus & integumentis corpus obruant. Abstineant à balneorum nimio vsu. Corpus moderate exerceat: A somno si eo tempore sudor maxime infestet, sibi temperent.

Sanguinis exsudatio cum non fiat, non aliam considerationem requirit.

Aquosi ex tumoribus apertis & vlceribus fluxus curatio.
Seri effluxus qui ex aperturis factis per paracentesim abdominis, in hydropicis, aliisve puncturas, sectiones, aut vstiones in scroti hydrocele, vel in pustulis & tumoribus aquosis, vel vlcerum serum exudante fit: quo pacto cura illi adhibenda sit, in intumescentiis & tumoribus eiusmodi iam fuit expositum.

DE EXSPVITIONE.

CAPVT VIII.

Genera.



EXSPVITIO per quam sputum ex ore ejicitur, opitulante simul etiam sreatu, nonnunquam & tussi, præternaturalis tunc maxime fit, si immoderata sit vel vitiosa, eâ potissimum de causâ, quoddam & alij humores & excrementa cum sputo simul expuantur, vnde præcipue exspuitionses eiusmodi præternaturales differunt, aliæque pi-

tuitosa, alia cruenta, alia purulenta existit.

Pituitosa exspuitio, sub quâ & saliuam seu sputum & pituitam ac serum comprehendimus, frequentior quam par est, in sanis alioquin etiam occurrit: Vt illis quibus consuetum est multoties exspuere, maximeque inter loquendum: Dein & illis qui post singula ferè orationis membra, pauas loco, excreant. Quod in oratoribus quibusdam vitiosum censetur, in aliis verò non adeò indecorum, si non ita frequenter, sed finitâ saltem aliquâ longiori periodo id fiat.

In morbis quibusdam vt catharrhis, & ventriculi humiditatibus, hoc idem euenit, vt copiose & continuò ferè aliqui expuant, qui affectus Ptyalismus appellatur.

Quæ ex remediorum saliuam prouocantium vsu promouetur, multa & frequens exspuitio, per caputpurgia dicta, cum ad sanationem opituletur, ad præternaturalem hæc expuitionem vitiosam & nocuam minimè pertinet: Vti & neque ea, quæ ex hydrargyri vsu, in lue venerea foeda & copiosa promanat exspuitio, cum ad curationem illius, vti in ea dictum est, conueniat.

Maiori conatu pituitam cum saliuâ etiam extra morbos, Pituitosi senes præcipue expuunt, quam vel sreatu valido ex narium amplitudine faucibusque, vel tussiendo ex imo pectore in os propellunt. In morbis pituitosis tussim mouentibus, pituitosa eiusmodi expuitio similiter & frequenter euenit. In quibus expuitionibus, pituita nunc tenuis & aquosa, nunc crassior & mucosa, tandem etiam purulenta egeritur: Alias sapore aliquo, aliis nullo prædita; atque nunc minori labore, interdum maiori, si præsertim aquea penitus vel tenax admodum existat, excreatur. Sicuti in tussi quàm hæc expuitio comitatur, hæc vberius descripta sunt.

Cruenta exspuitio interdum sine tussi atque dolore oritur, in qua sputum tantum cruentum redditur, quod & cibos qui masticantur commaculat: in alia purus isque vel fluidus adhuc vel concretus sanguis expuitur, præcedente vel comite narium hæmorrhagiâ.

Alias cum dolore aut aliqua læsione circa gingiuas, linguam, palatum, fauces, oc-

currente, sicuti in causis explicabitur, sanguinis hæc exspuitio contingit.

Cum tussi sanguis per os aliàs merus propellitur; aliàs permixtus cum sputo, instar saniei vel cruoris, in Pleuritide & Peripneumonia, & quidem in illa cum dolore punctorio lateris & febre, excretioneq; tandem purulentâ in vtrisque: Sicuti in dolore pe-
Hæmopto-
sis a
passio.

toris expositum fuit. Impermixtus & purus aliquâdo cum tussi per os ejicitur, in affectu quem Hæmoptoicam passionem vocant, vel per Sputum sanguinis sine dolore; Aliàs parcius, aliàs verò copiosius; quandoque certo tempore & interpolatis vicibus.

Eiusmodi sanguinis excretionem perseverantem, corporis extabescencia seu phthisis frequenter, uti in ea dictum, sequitur.

Sed & citra noxâ aliquas virgines & mulieres sanguinem purum cum tussi, verum non ad eod. copiosum, instantibus mensibus, reieciisse vidimus.

Aliàs quoque & sæpè certis temporibus, sanguinis insignem quantitatem, per hanc viam excretam fuisse observatum, in sanis alioquin, vel saltem anhelosis & dyspnœa quadam laborantibus: Interdumque tantâ mensurâ eum profusum, ut penè uniuerso corpore exhausto, vitam subito finierint.

Quod & in morbis aliis & febribus accidisse, peluesque cruore repleuisse aliquos, antequam morerentur, deprehensum fuit.

Purulenta exspuitio aliquando pituitosæ copulatur, vel succedit; tam huic quàm pituitosis naturis, quàm illi, quàm in catharris, aut aliis affectibus accidere diximus: In quibus, pellucidam tenuem vel mucosam pituitam excernunt, tandem verò puris instar spissam & albam, vel nonnihil subluteo aut subviridi, nigrescentēve colore tinctam; aliàs inspidâ, aliàs ingrato sapore præditam.

Aliæ verò purulentæ excretiones, morbos alios sequuntur, & symptomatibus ipsorum grauioribus copulantur. Quæ præcipua sunt Dolor in oris & narium diuersarum partium exulcerationibus, uti & faucium in Angina, in quib. affectibus pus excreatur. In cruenta item expuitione cui purulenta excretio cum tussi iungitur, in Pleu-

ritide & Peripneumonia, in qua tantam copiam puris aquosi eiectam vidimus, ut peluem, aliquot vicibus continuata hæc excretio impleteret, Tabes corporis, puris per tussim expuitionem comitem habet, in Phthisi, longo tempore & ad mortem vsque plerumque perseverantem. Sicuti hæc omnia copiosius in eiusmodi affectibus describuntur: Dein & in Empyemate, quando illud phthisi copulatur, purulenta hæc excretio, tum ob hunc, tum alium cum illo affectu coniunctū, copiosior euadit.

Est & purulenta quædam expuitio, per quam pus obductum & inclusum propriâ pelliculâ, quam Vomicam vocât, per os tussiendo ejicitur, quæ pisi magnitudinem saltem, aliàs verò nucis amplitudinem adæquat, tuncque ferè vna tantum occurrit, aliàs etiâ plures, si exigui præsertim sint globuli, in quibus pus nunc maturatum, aliàs putre & fœtidum inesse deprehenditur: Nonnunquam etiam pus & disrupta vomica separatim, eodem vel breuiore longiorēve interposito tempore excernuntur. Quam excretionem aliàs non alia grauiora symptomata, quàm dyspnœa levis, aliàs verò tussis diu continuata, & tandem cruenta expuitio præcedere solent, nec aliæ grauiorē noxæ subsequi, frequentius verò hæc tandem in phthisim definit.

Causa.

Causa omnium eiusmodi expuitionum generum, vel à saliuâ, aut homore pituitoso, vel sanguine, aut pure, aut putri humore exurgit.

À saliuâ quâ os & fauces naturaliter madent, & quæ continuè ex seroso humore exudante nascitur foueturque, & pituitâ simul affluente augetur, expuitio copiosa vel frequens prodit: Si illa concitata, ac impulsâ frequenti screatu in ore coaceruetur. Idque vel ex mala consuetudine, quâ sibi hanc excreationem familiarem quæ tamen indecens est, aliqui reddunt: Hi præsertim, quicum inter perorandum ne tacere, aut orationem ex ignorantia diutius protrahere videantur, inter pausandum, nulla necessitate adacti, toties ferè quoties sententiam absoluerunt,

Oris saliuâ canisâ ex-puitio-
pituitosa.

uerunt, aut etiam citius, excreant. Sed & copia illius inter loquendum, ob linguę & oris agitationem diutinam, saliuam comouens, ad exspuitionem impellit. Sic & medicamentorum eam prouocantium vsu promouetur, quę tamen expuitio cum utilis sit atque expectatur, non est, uti dictum, præternaturalis.

Cerebri pituita ad os, causa Exspuitionis pituitosa. & Ptyalismi.
A' pituitoso humore simplici, insipido, vel ob permissionem feri falso acidove, à capite defluente, per narium amplitudinē, ad fauces & os, saliuęque se immiscente, eamque adaugente, exspuitio illa frequens & multa in Ptyalismo oritur. Qui humor, si ad pulmones vsque descendat, exspuitionem illam pituitosam, quę cum tussi molestat, sicuti in ea id fuit expositum, concitat; In qua ab initio tenuis humor qualis defluerat, mox verò crassior ob moram redditus, tandemque calore interno excoctus & maturatus ac dealbatus, puris instar, uti in causis purulentę exspuitionis dictum, excreatur.

Pulmonum pituita ad fauces propulsa, causa Exspuitionis pituitosa.
In pulmonibus quoque eiusmodi humor pituitosus ab excrementis illic congestus, mucosus vel puris instar excoctus, si tussi sursum in os propellatur, exspuitionem similem parit. Quod in sanis alioquin senibus maximè euenit: Dein & in morbose tussi, interdum & in asthma, in quo tamē sæpè retentus eiusmodi tenax humor, tussim minimè mouens, non exspuitur: Sicuti hæc omnia in eiusmodi affectibus descripta fuerunt.

Ventriculi humiditas ad os perueniens, causa Exspuitionis pituitosa. & Ptyalismi.
In Ventriculo humidior pituita multam congerente, si illa sursum in fauces ipsamque os exurgens, sputo se commisceat, humiditatem illic copiosam gignens, Ptyalismi causa, uti si à capite eò feratur, interdum existit. In quo manē dum ieiuni adhuc sunt, nec ventriculus aliud ferè quàm aquosam illam materiam continet, os madore plenum, per frequentem & copiosam exspuitionem, se exonerare cogitur. Cuius Ventriculi humiditatis causas, in illius imbecillitate ex intemperie hac contracta exposuimus.

A' sanguine cruenta exspuitio proficiscitur, si ille è Venâ vel Arteriâ in naribus, ore vel faucibus aut pulmonibus, vel in pectore apertâ, ad os delatus exspuatur.

Narium sanguis ad fauces delatus, causa Exspuitionis cruenta.
In narium interioribus, quam ob causam sanguis è venis illius loci emanare possit, qui uti per nares effluit, sic ad os quoque descendere potest, in Narium hæmorrhagiâ explicatum fuit. Cæterum quòd in fauces quoque delabatur, causa est, vel ipsius copia, vel quòd venę humiliores apertę sint, vel præcipuè, quòd cum eum nimium fluentem sistere volunt, decubitu supino, vel obturatione narium, cum exitum illic non habeat, eò feratur.

Gingiuarum tumor, fistula, laceratio, causa Exspuitionis cruenta.
In ore à Gingiuis, quę laxę & molli carne constât, facillè sanguis exsudat, etiã sponte si eo turgeant & tumidę sint, alias verò per sectionē eo elicitō, uti in doloribus dentium, humores eò fluentes, collectis buccis circa gingiuas, exugere tentantes, sanguinem sic quoque exsugunt. A' læsione harum citius hoc euenit, ut aliquid sanguinis inde emanet; Ut à punctiōe illarum, dum dentes purgantur; Vel separatione aliquâ à dentibus factâ, eandem ob causam, vel ob morsum aut masticationem duriorē ciborum, gingiuas validè impellentium, quibus cibis præmorsis, sanguis postea adhærēns, eos cruore tinctos, eâ sede reddit: Maximè verò cum dentibus per vim erutis, illi à gingiuis membranisque auelluntur, sanguis maiori quantitate prodit: Vidimusque aliquando tantâ copiâ atque impetu, arteriâ illius loci diuulsâ, sanguinem tam diu profluxisse, neque sisti potuisse, donec æger vitam hanc ob causam finierit.

Oris interioris partium vulnera, causa Exspuitionis cruenta.
A' reliquis in ore partibus, vix nisi vi maiori illatâ, sanguis exit. Ut à lingua, eâ læsâ, maximeque per morsum illius, vel casu, uti sæpè euenit, & frequenter in conuulsionibus; Vel à tunicâ os faucesque succingente, si ea alicubi vulneretur.

Pulmonum venarum resectionis rupturæ, excessus, causa Exspuitionis cruenta. & Hæmoptoica passio.
A' pulmonibus prodiens sanguis, per os frequenter rejicitur. Qui à vasis pulmonum interioribus, quę magnâ copiâ illorum substantiam implent, vel resectis vel ruptis aut exesis proueniens, in asperę arteriæ ramos translatus, indeque in illius fistulam, tussi in os propellitur posteaque exspuitur.

Referatis per anastomosin vasorum illorum osculis, quandoque contingit, ut hæmoptoica dicta inde sequatur passio: Si ob

plethoram sanguinis in pulmonibus contenti, vasa distendantur osculaque aperiantur, eousque, ut sanguis per ea exsudans, vel etiam emanans, parcius copiosiusve expuatur. Idque sepe citra aliam noxam subsequenter, si oscula sponte iterum se recolligant & occludantur, quâ ratione hoc plethoricis quibusdam, vel foeminis quibus ob conceptum menses non expurgantur, vel ab aliis causis sistuntur, accidere aliquando vidimus. Alias vero cum periculo, si rursus hæc oscula, vel nimium dilatata, aut motu continuo impulsâ, se referare nequeant, unde magna sanguinis profusio, & mors etiam quandoque sequitur: Vti & si sanguinis effusi portio in pulmonum substantia retineatur, cum illic putrescens pulmones vitare possit, ut in phthisi dictum.

A simili pulmonum sanguine, per anastomosin vasorum illorum exeunte, nec rectâ in asperâ arterie ramos ut in hæmoptoica passione se insinuante, sed & in pulmonum substantiam prius disperso, inflammationemque illic pariente, indeque in ramos arteriæ primum se ingerente, expuditio quoque saniosa & cruenta nonnihil in Pleuritide & Peripneumonia exoritur; sicuti quo pacto inde plerunque non, alias vero sed rarius, subsequente pulmonum exulceratione, hoc fiat, in eiusmodi affectibus prolixè fuit declaratum.

Disruptis vasis pulmonum substantiæ intertextis, sanguinem continentibus, subita & magna, si in maioribus, præsertim hoc fiat, minor si in minoribus, sanguinis cum tussi fit per os profusio, in Hæmoptoica passione, quam plerunque, cum ægrè sanari queat, pulmonum exulceratio cum Phthisi, uti in illa explicatum fuit, sequitur. Disruptionem autem eiusmodi vasorum in pulmonibus, violētâ nimirum & nimia dilatio vel contractio moliri potest. Quam magna efflatio, in clamore vel sufflatione, sicuti ea quam tubicines edunt, aliquando efficit. Aliquando & sternutatio & tussis validissima, rarius tamen, cum videamus etiam post diuturnam tussim nihil tale subsequi: Alias spiritus violenta retentio, in conatu summo deiciendi, pariendi, hoc facit, vel ille qui in one-

ribus & ponderibus loco mutandis adhibetur: unde aliquor lapidas, quod saxa immensa magni nixu volverant vel gestarant, postea sanguinem expuisse, phthisicosque factos observavi: quod tamen vulgus pulueri, quem dum saxa scindunt, eos spiritu attrahere existimant, falsò attribuit, cum ille pulvis, si inspiratione in asperam arteriam incideret, mox tussi iterum rejiceretur, eamque asperitate potius suâ, quàm acrimoniâ, quæ nulla in eo est, unde nec eo modo pulmones lædere posset, concitaret. Sed & in aliis laboribus magnis obeundis, qui conatu perficiuntur valido, idem potest contingere. Præter quas causas, contusio pectoris ex casu, ictu aliòve modo impetu venas dirumpendo, idem potest efficere.

Exesis pulmonum vasis, cum & pulmonum substantia simul erodatur, sensimque hoc fiat, moxque vlcus inde sordidum potius sanguine madens prodeat, phthisi potius, quàm hæmoptoica passio exoritur, cui tamen uti in aliis vlceribus, sanguinemque interdum cum impelluntur exsulantibus, cruenta expuditio aliquândo iungi potest: Cuius exesionis causas in phthisi exposuimus.

A pectoris aliarum præter pulmones sedium venis apertis, sanguinemque vel exsulantibus vel effundentibus, pulmonemque in vasa illius usque penetrantibus, expuitiones quoque cruentas fieri docent. Veluti in succingentis membranæ inflammatione, in pleuritide: Vel aliis venarum in conuexo pectoris refectionibus aut lesionibus. Verum cum sanguis in pectoris cavitatem illapsus, pulmones minimè subintret, sed illic subsistens corrumpatur, & vel phthisim vel empyema tandem inducat, sicuti in eiusmodi affectibus, & præsertim in pleuritidis causis hoc prolixè demonstratum fuit, hanc expuitionis cruentæ causam statuere minimè possumus: Nisi ex vulnere pectoris inflicto, si pulmones tunc simul quoque vulnerentur, sanguis emanans, non solum in interiora pectoris defluat, sed & vasis infusus, ad os usque regurgitet. Quod si & aspera arteria vulnerata sit, potius euenit, ut sanguis in pulmones delapsus, tussi quoque iterum rejiciatur.

Oris, Na-
tis, Fau-
cis, Pul-
monum,
Thoracis
exulce-
ratio,
causa
Exspui-
tionis pu-
rulentæ.

A' pure purulenta exspuitio procedit. Quod pus à partis alicuius exulceratione interdum oritur; Veluti ab oris & narium vlcerebus, & faucium in angina. Dein & ab exulceratis corruptisque pulmonibus, in Phthisi, sicuti hoc in eiusmodi morbis fuit expositum. Aliquando etiam in thoracis interioribus, pus à pulmonibus thoracæve eò delapsum, illicque collectum in Empyemate, si per pulmones corruptos pateat via, tussiendo rejicitur, cum alioquin nisi hoc fiat, pus potius in pectore retineatur, quam per os ejiciatur, nec dum per aliam viam, quam extrinsecus: aperturâ factâ exhauriri queat, sicuti in eiusmodi excretionibus, quæ per superficiem corporis fiunt, ostendemus, huncque affectum describemus.

Pulmo-
num san-
guis in
pus con-
uersus,
causa
Exspui-
tionis pu-
rulentæ.

Verum non solum à partis vlcerae sup-
puratione, vti vulgus medicorum dicetium,
Vbi pus illic vlcus, censet, semper pus gigni-
tur, sed & à sanguine in pulmonum inflam-
matione, citra ipsorum exulcerationem, in
ipsis maturato & in pus conuerso, exspuitio
illa purulenta in Peripneumonia & Pleuri-
tidè suboritur, cruentaque mox sequitur.
Veluti in hisce morbis abundè fuit demon-
stratum.

Pulmo-
num san-
guis in
pus con-
uersus,
causa
Exspui-
tionis pu-
rulentæ.

Aliquando & à sanguine è vasis pulmo-
num paucâ quantitate, prodeunte, & se ali-
bi in eos ingerente retentoque, & sensim in
pus excocto, quod per superficiem siccescens,
tuniculam quâ includitur, sibi parit, exspui-
tio illius puris cum vesiculâ vel vomica, vt
vocant, integrâ adhuc remanente vel disrup-
tâ, sequitur. Quæ purulenta exspuitio, si
pus ita inclusum pulmones nondum læse-
rit, citra aliud incommodum sæpè transit. Si
verò pulmones exulceret, phthisin mox co-
mitem nanciscitur, vel si in ipsorum exul-
ceratione talis quoque vomica coaceruetur,
iam habet.

Pulmo-
num Na-
tis, pi-
tuita, eò
defluxa
vel in pul-
monibus
congesta,
causa
Exspui-
tionis pu-
rulentæ.

Frequenter quoque à pituitoso humore,
tum à capite in narium cavitates pulmones-
ve defluente, vel in pulmonibus congesto,
exspuitionem primùm pituitosam profe-
rente, si pituita illa retenta diutius calore
loci excocta maturataque & dealbata veluti
in pus conuertatur, tandem exspuitio puru-
lenta illius materiei cum pituita adhuc cru-

da plerunque copulata quoque superuenit. *tionis pu-
rulentæ.*
Qualem in multis adhuc sanis, tum etiam
in morbis eiusmodi pituitosis tussim mo-
uentibus exspui nullâ exulceratione aut ta-
be præsentē, indies obseruamus.

A' putri humore à pure per maturationē *Pulmo-
nis sub-
stantia
corrupta
causa
Exspui-
tionis
pitui-
tosæ pul-
monum.*
excocto differente, pulmonum substantiam
exedente & corrumpente, adeò vt in partes
diuidatur, vt portio aliqua de ea tussi reji-
ciatur, fieri potest.

Curatio.

PLerorumq; generum exspuitionum cu-
ratio, si aliis functionum læsionibus aut
doloribus coniuncta sint, quas magis respi-
cere oportet, in illis fuit exposita, sicuti in
singulis obiter repetemus: aliorum verò
quæ cæteris symptomatibus prævalent, cu-
ra hîc erit explicanda, & secundum causas
tractanda.

Exspuitio frequens ex mala consuetudi-
ne suborta, in illis qui hoc vitium sibi fami-
liare reddiderunt, præsertimque oratoribus
inter peroradum multoties exscreantibus,
non aliter quàm sensim ab eo diffuescendo
emendabitur. Si ob multam locutionem
hoc accadat, à nimia & crebriore garrulitate
sibi temperent. Pryalismus si à pituita à ca-
pite defluente, faucesque irrigante, sputum-
que adaugente; Vel à ventriculo sursum re-
gurgitante osque adimplente oriatur, tunc
priori in causa per ea quæ pituitæ prouetum
impediunt, eamque genitam expurgant &
absument, ipsiusque defluxum sistunt, cura
instituitur, in aliis affectibus à catarrho ge-
nitis, & tussi præcipuè expositis. In altera
causa, pituitæ in ventriculo generatio, si-
militer erit impedienda, genitaque expur-
ganda, ventriculique imbecillitas atque in-
temperies corrigenda: Idque remediis in
cura ventriculi imbecillitatis abundè de-
scriptis. Quibus factis, in vtraque causa o-
ris mador & humiditas exsiccantibus aufe-
renda, masticatoriis aliisque apophlegma-
tismis pituita ex ore erit elicienda, passim
in pituitosis cerebri morbis expositis: At-
que siccantibus mador & humiditas illa o-
ris absumenda, iisdem ferè ablutionibus o-
ris aliisque illi inditis remediis, quibus in

dentium dolore à defluxione nato vitur, quæque illic descripsimus.

Pituitosa exspuitio à pituita per catarrhū pulmonibus congestā, ob tussim quam cōmouet genitā, curam non aliam quā quæ tussi conuenit, exigit; quā desinente, exspuitio inde progressa etiam cessat.

*Exspui-
tionis
cruenta
curatio.*

Cruentæ exspuitionis curatio variat, pro ut sanguis ille ab hac illave parte procedit.

Ex gingiuis sanguis frequenter & leui de causā exsudans, ob illius copiam, cum plethoram indicet, illius causā, ne grauiora accidentia pariat, sanguis detrahitur, aliāque quæ plethoram corrigunt, fiunt, quæ & hoc vitium inde progressum sanant. Quod si nihilominus perseueret, adstringentibus collutionibus mox dicendis emendabitur. Si ob punctiōem leuem aut suctionem, sputum cruentum fiat, sponte cessat. Ob dentem euulsum sanguinis exspuitio cōcitata, etsi p se quoque plerumque desinat, tamen collutione oris factā, cum Vino rubro stiptico vel Acetoroseo, addendo & parū aquæ rosac. citius sistitur. Quod si verò non desinat sanguis, ob disruptam venam, vel præcipuè arteriā, fluere, tunc os vehementius adstringentibus, in oris & faucium inflammationibus, cum repellendum est, & dentium mobilitate expositis, colluendum, & si non cesset, in spaciū dentis eruti, pulueres aliāque sanguinem sistentia, in vulnere hæmorrhagia descripta, imponenda. Ad hæc valde iuvat Chalcāthum vstū impositum. Et si hæc non proficiant, cauterium actuale huic sedi imprimendum, vel potentiale, sed quod mox vrat, ne diu illud in ore retinere cogantur. Commodeque hoc pilulā ex Bombace formatā, in Aqua forti madefactā, vulneratoque dentium interuallo intrusā perficitur, quod cum cætera omnia irrita essent, p fuisse tum in hoc casu tum in aliis angustis vulneribus, sæpius experti sumus.

Ab aliis oris partibus, læsis aut vulneratis, prodiens sanguinis exspuitio, iisdem collutionibus, oris, cessat; si linguā ex morfu grauior læsā, perseuerans quædā sequatur hæmorrhagia, uti accidere cū periculo vitæ post cōuulsionem vidi, fortiora quoque & caustica, nisi hæc iuuēt, uti prius diximus, erūt administranda.

A naribus descendēs sanguis in os, si exspuat, non aliam curā, quā quæ narium hæmorrhagiæ debetur, ut inde fluens sistatur, exigit; si tamē periculum sit, ne in os delatus, deglutiatur, vel in pulmones defluat, quod tamen vix fieri potest, cum ad asperam arteriam perueniens, mox tussim excitans, subito per eam rejiciatur; decubitu pronocapitisque inclinatione antrosum, ut potius per nares effluat, quā retrorsum in nariū amplitudinem, indeque ad fauces relabatur, aliquo pacto cauebitur. Aquæ retentione in ore, ne ultra descendat, itidem præcauetur.

A pulmonibus exsudans sanguis, & cum sputo cōmixtus, cum tussi reiectus, in Pleuritide & Peripneumonia, non aliam curam quā quæ illis debetur, in pectorisque eiusmodi doloribus descripta fuit, requiritur.

Hæmoptoica passio, etsi quibusdam, scemini præsertim, citra noxam grauiorem, quod tamen rarum est, contingat, periculo tamen non caret, si præsertim frequentius hæc inuadat, augeaturque sanguinis qui exscreatur quantitas, Lethalis interdum ob magnam & subitam sanguinis profusionem existit, tam in morbis quibusdam, quā extra illos eueniens. Frequentius cum copiosiore parciorve sanguinis excretionem accidens, in phthisim tandem conuertitur.

*Hæmo-
ptoica
passionis
curatio.*

Occurrendū itaque mature huic præternaturali per os excreationi, antequam phthisis subsequatur, vel immodicus fluxus ægrum enecet. Quod fiet, si sanguinem immoderate fluentem sistamus, & si hoc ob referata oscula accidat, rursus ea referemus: si ob disrupta vasa, ea antequam hæc læsio in vlcus abeat, denuò reintegremus, atque in vtraque causa, sanguinē si grumofus in pectore hæreat, ne retentus corruptusque pulmones amplius lædat, eū expectoremus, tussimque quæ molestat admodumque nocua est, cōpescamus.

Quod si iam vlcera in pulmonibus, sanguinis & puris excretio copulentur, uti hoc in vlcere iam genito, apertis denuò vasis, tum si ob exesa vasa hæmoptoica passio nascatur, contingere potest, tunc remedia quæ vlcera sanando debentur, in phthisi cura exposita, cum venæ hæc diuisiones quoque obliterare possint, etiam fluxum hunc pote-

poterunt compescere, vel quæ huic nuxvi propriè debentur, aliis erunt intermiscèda.

In curatione verò hæmoptoicæ passionis, secundum prædictas intentiones, sequenti modo erit procedendum.

Euacuantiæ variis modis administrantur, primum sanguinis emissionem per venam sectam, in brachio illius lateris, in quo grauedo aut punctio quædam sentitur, quæ si plethora adsit, & immoderatè fluat, eum reuellendo, fluxum illius nonnihil compescit.

Idè molimur Scarificatione, adhibitis simul cucurbitulis in scapulis, colli lateribus, carpo. Vel Cucurbitâ maiori hypochôdriis, vel in inguinib. admotâ. Dein & Ligaturis, Frictionibus extremitatum; sicuti in hæmorrhagiis aliis, & præsertim narium, hæc quoque competere diximus.

Prouocamus Menses si sustiterint aut parcè fluant, in muliere plethorica, hac exspuicione cruentâ laborante. Et in viris Hæmorrhoides, prius consuetas, si in hoc casu sint supressæ.

Purgantia si sanguis serofus admodum & aqueus sit, vt repurgetur & crassescat, exhibentur. Sed mitia, & quæ non admodum calefaciant, nec vomitiones cieant, quæ in hac sanguinis excretionem nociuæ sunt. Dein & quæ adstrictione quadam prædita, alios fluxus, etsi alium subducant, cohibent, vel saltem non vti validiora cathartica concitant. Quale est Rhabarbarû puluerisatum datum cum succo vel syrupo Plâtiginis aut Portulacæ, addito & tantillo Spicæ nardi.

Alterantiæ remedia, tum per viuendi rationem, tum medicamenta exhibita admodum administrantur.

Viuendi rationem quod attinet, in Aëre versentur frigidiusculo, & sicciorè, per se vel arte facti, qui attractus cum ad pulmones rectâ perueniat, plurimum siccando iuuabit: maximè suffumigatus, accenso Thure, Mastiche, aliisque siccantibus.

Cibo vtantur glutinoso, ex eiusmodi carnibus cocto; Cochlearum terrestrium elixarium esum commendant: vti & Turturum, sanguinem itidem Hædi. Comedant Amylum cum Aqua rosarum coctû, & pulvis alias ex Farinis. Item Oryzata, Hordeata,

Ouum leuiter coctû & velut crudum adhuc sæpè sorptum probatur. Portulaca recens per se mansa, vel in acetariis vt aliàs solent comesta, aut etiâ cocta, valde proderit. Fructus item aliqui aciduli, crudi præparatiue. Bibât Aquam, Lac, Ptisanâ & similia. Temperent sibi à vino potenti vt & aliis actu potentiaque admodum calefacientibus.

Quies, Somnus, qui nisi sponte adsit, soporiferis inuitandus, profunt.

A vociferatione & tussi sibi caueant: parum loquantur.

Exhibentur medicamenta in hæmoptoica passione, tum emplastica, tum adstringentia, quæ oscula referata occludant, & vasa disrupta consolident, ita tamen ne nimia adstrictione, sanguinem in pectore retineant, permiscendo proin illis, quæ illum si grumosus hæreat, dissoluant & expectorent, & non temerè vtendo acidis austeris, alioquin non conuenientibus. Talia autem variis formis propinantur.

Decoctum sequens bibant manè & vespèri per biduum vel triduum: R. radic. Consolidæ maioris ʒ. ij. radic. Altheæ ʒ. j. herb. Portulacæ recentis si haberi potest, Plâtiginis, Bursæ pastoris, Polygoni ana M. j. flor. Rosarum rubr. p. j. semin. Portulacæ Plantaginis, Acetosæ, Scariolæ, Coriandri, Papau. albi ana ʒ. j. baccarum Myrti vel Myrtillorum ʒ. iij. Iuiubarum, Sebesten ana par. vi. fiat decoct. in Aqua pluuiali vel cister. & in colaturæ ʒ. j. ʒ. ʒ. dissol. Sacc. communis vel penidiati, vel Mellis rosac. q. s. fiat Apozema.

Plura alia in decoctis quoque probantur à diuersis, petita, veluti radices Cariophyllatæ, Rubi, cotices Quercus, vel Glandium, herbæ Sumach, Equisetû, Consolida media & minor, Lyfimachia, Verbena, & flores Chamæleontis, Gallij, Salicum, Cannarum, Balauſtia, semina Lagopi, Porri, Antheræ, baccæ Virgæ sanguinæ.

Hiscè decoctis etiam quâdoque alias plantas, quæ in vulnerariis potionibus dictis vsurpari solent, permiscant, quas vti vulnera, sic ruptas venas assumptas etiam consolidare existimât: Quales sunt Pyrola, Pilosella, Sanicula, Virga aurea, Potentilla, Millefolium, Agrimonia, Achilleia.

Addi etiam possunt quædam pectori competentia, vt Liquiritia, Tussilago, semen Melonum, aliæque aliquæ ex herbis sanguinem incrassantibus, vt Violæ, Endiuiæ, Buglossum, Nenuphar.

Decoctum Scoriz ferri additâ rasurâ Cornu cerui, factum in aqua stillatitia Plantaginis vel aliâ, probant aliqui. Alij pulueris lapidis Hæmatitis decoctum.

Syrupus ex decocto ex plantis prædicto, auctâ Sacchari quantitate, decoqui poterit, vt diutius conseruari queat, & sic vnciatim exhiberi.

Vel alij ex simplicibus enarratis confici. Qualis syrupus ex Portulaca fieri potest, qui præ cæteris in sanguinis hac reiectione excellit: paraturq; ex succi Portulacæ tribus partibus coctis, cum duabus Sacchari, ad consistentiam: Potest in penuria succi huius, cum planta non sit perennis, & succus ægrè asseruetur, à Mesuæo descriptus syrupus de Portulaca vsurpari; ex semine illius, succo Endiuiæ & aceto cum saccharo coctus. Proderit syrupus ex Plantaginis succo eodem modo, vt de portulaca paratus: vel ex aliarum herbarum recentium iam enarratarum, succo vel decocto, concinnati.

Ex vsitatis, syrups adstrictione præditi, de Rosis rubris ficcis, Myrtillorum; atque incrassantes, Iuiubinus, Violaceus, eodem modo exhibentur.

Succi prædictarum plantarum recentium similiter exhiberi possunt, simplices si efficaciores sint, vt Portulacæ, Plantaginis, &c. vel cum aliis, eosque per se, vel permiscendo cum Saccharo aut Melle.

Saluiæ & Menthæ succos, cum Saccharo vel Melle alij exhibent.

Aquæ destillatæ conferunt, dando ʒ. iij. vel plus, per se vel cum Saccharo rosac. tabulato, Portulacæ imprimis, Plantaginis, Polygoni, Bursæ pastoris, Symphiti maioris: Possunt & aliæ adstringentes dari, vt Equiseti, Ligustri, Myrti, foliorum Quercus, Rosarum, ipsarumque Peculi. Sunt qui aquam Cyclaminis admodum probant. Alij etiam aquam Saluiæ & Menthæ.

Composita sic fit: R. Limacū rubeorum sine testis, vel in horum penuria Cochlea-

restrium exemptarum è testis tb. j. radic. Consolidæ maior. recent. incis. tb. ʒ. herbarum recent. Plantaginis, Portulacæ, ana M. j. Rosarum rub. P. j. baccharum Myrti vel Myrtillorum P. ʒ. succi Cydoniorum vel Berberis aut Cornorum ʒ. iij. Spicæ nardi ʒ. ʒ. eliciatur aqua ad vsum, vt de simplicibus dictum.

Pulueres ex variis cōcinnantur, qui cū ingrati sint, plerunq; cū permistione sacchari assumuntur, estq; hic cōueniens: R. radic. Consolidæ ʒ. j. ʒ. seminū Portulacæ, Plantaginis, Papaueris albi, Hyperici, ana ʒ. j. florū Rosarū rubrarū ʒ. ʒ. Balaustiorū ʒ. j. Amyli, Succini ana ʒ. j. gummi Arabici & Tragach. ana ʒ. j. cornu Cerui vsti ʒ. ʒ. Boli vel Terræ sigillat. Coralli rubr. puluerisati ana ʒ. ij. Sanguinis draconis ʒ. j. Sacchari rosacei tabulati vel penidiati ad pondus omnium vel plus, fiat puluis: Capiat à ʒ. j. ad ʒ. ʒ.

Ex vsitatis trochiscis de Succin. vel de terra sigillata sine opio parati, vel de Spodio, pulueres, eodem modo exhiberi possunt.

Præter quos etiam alij pulueres vsurpari, vel hisce misceri possunt: veluti seminum Vuarum, Berberis, Myrtillorum: Item Thuris Mastichesque, cinerum cortic. Ouorum, Ofsis sepiæ.

Conserua Rosarum antiqua sæpè sumpta utilis. Et quæ ex radic. Symphiti maioris coctusâ, cum Saccharo vel Melle mistâ paratur, vel ex aliis prædictis herbis efficacioribus.

Conditura radicis Symphiti maioris cum Saccharo vel Melle similiter probatur.

Misturæ ex præcedētibus paratæ sequentes vsurpari poterunt, vt electuarium tale: R. conseru. Rosarum antiquæ conseru. Violarum & radic. Consolidæ maioris an. ʒ. j. ʒ. carniū Cydoniorum condit. ʒ. j. de pulueribus Supradiatis ʒ. ij. Acaciæ vel Hypocistidis ʒ. j. cum syrupo Myrtillorum, vel alio aliquo, misce.

Alia, vbi metus sanguinis concreti, mistura: R. Loöch de Portulaca ʒ. j. radic. Consolidæ subtiliter puluerisatæ ʒ. ʒ. Succini ʒ. j. Coaguli Leporis ʒ. ʒ. cum syrupo de Rosis rubris ficcis vel alio, misce: Capiat frequenter. Sunt qui Mumiam etiam addant, si gummos sanguinis adesse existiment.

Eclegma sequens sapè lambèdo vel sensim deglutiendo fumant, Recipiendò albumen oui bene conuassatum, quod misceatur cum pari quantitate Mucilaginis seminis Psyllij extractæ cum aqua Portulacæ, & infusion. gummi Tragachanthi factæ cum aqua Rosarum, miscendo Saccharum penidiatum, & parum Amyli.

Ex vſitatis Looch de Portulaca, ad cruentam exspuitionem efficacissimum est, quod R. succum portulacæ, gummi arabic. sanguinem draconis, trochiscos de terra lemnia, de charabe, pilos leporis vſtos & saccharum.

Aliud item Looch ex Tragachanta confert, sitq; ex infusione gummi arabici & tragachanti, in aqua rosacea, & conseruâ rosarum antiquâ, syrupo è roſis siccis, terrâ lemnia & bolo.

Tabulæ vel orbiculi aut aliæ formulæ, ex pulueribus prædictis fieri possunt; quæ sumuntur, vel in ore retenta noctu sensim deglutiuntur. Excipiendò eos cum Infusione gummi tragach. factâ in aqua rosaceâ. Vel cû Saccharo dissoluto & cocto in aquis conuenientibus.

Ex vſitatis proderunt etiam Saccharû rosaceum tabulatû, Tabulæ diatragach. frigid. & Trochisci, quos pilulas sua lingua vocant.

Potiones mistæ sic etiam exhibentur; Veluti Iulepi hoc pacto: R. syrapi de Portulaca & Plantagine ana 3. j. β. aquarum Polygoni, Bursæ pastoris, peculi Rosarum ana 3. ij. misce, aromatiz. Santalo vel Spica: Capiant tribus vicibus.

Ex aliis quoque syrapis & aquis alij simili modo possunt fieri.

Alia potio fieri poterit ex pulueris enarrati 3. j. β. dilutâ cum Aqua aut Lacte, & exhiberi poterit, aut cum aqua malsa, vel cû additione Syrapi alicuius, & tunc citra cõmissionē sacchari, pulueris 3. β. propinari potest.

Vel detur hic potus: R. syrapi vel succi Portulacæ vel Plantaginis alteriusve ad 3. j. syrapi Myrtillosum vel de Rosis rubris siccis, Vini granatorum acidi ana 3. β. Boli vel Terræ sigillatæ, Coralli an. 3. β. Lapid. Hæmatitis, Succini ana 3. j. (vel loco horum puluerum, de puluere præscripto, aut de trochi-

scis 3. j.) aquæ Bursæ pastoris, Polygoni alteriusve q. s. fiat haustus.

Narcoticorum mistione cum prædictis emplasticis & adstringentibus, remedia admodum efficacia pro hæmoptoica passione reddimus, cû tunc non solum enarratos vsus præstent, sed & sensum stupefaciendo, naturæque motum sic compescendo, vt minus sanguinis fluat, & tussis mitigetur vel cesset, quæ alias plurimum obest, efficiant. Quæ præſidia sequentibus modis parari possunt.

Pulvis summopere excellens: R. Sacchari cocti cum aqua Rosacea vel Violarum donec iterum concreſcat, 3. j. semin. Hyosquiami subtilissimè triti 3. j. fiat pulvis; Capiat 3. j. vel paulò plus, per se, vel cum Syrupo aut aquâ conuenienti.

Addere possumus, vbi multum sanguinis exspuunt, puluerem Corallorum rubrorum & Boli vel terræ alterius pinguis ana 3. β. gummi Arabici 3. j. Sacchari penidiati 3. ij. Capiatque tunc 3. j. β. Vel addantur pulueri prædicto, qui R. rad. Consolidæ, & c. semin. Hyosquiami 3. ij.

Possunt infusione gummi Tragachant. factâ in aquâ Portulacæ, in orbiculos formari, qui siccati, eadem quantitate sumuntur.

Opiata sequens horum loco dari poterit: R. conser. Rosarum vel Violarum 3. j. β. seminis Hyosquiami albi puluerisat. 3. j. β. syrapi de Papauere vel Diacodij 3. j. misce: Capiat 3. j.

Ex opiatiss vſitatis præcipuè hic conueniunt: Philonium Persicum & Diacoralium Galeni, trochisci Alkekengi cum opio, quæ præter astringentia & opium, etiam semen hyosquiami recipiunt. Quod & referri possunt trochisci de Succino cum opio. Quæ omnia cum liquore aliquo decenti dissoluta exhibentur 3. j. pondere.

Athanasia Nicolai, ex maioribus opiatiss etiâ præ cæteris in eiusmodi fluxibus commendatur. Cû cæteræ vt Theriaca & Mithridatum non adeò sint accommodata.

Pilulæ de Cynoglossa ad gran. vij. commode etiam exhibentur, quæ præter opium etiam semen Hyosquiami aliis permista recipiunt, sanguinemq; vti & catharos sistunt.

Syrupus de Papauere vel Diacodiū, cum syrupo, succo vel aquis conuenientibus exhibitus, similiter proderit.

Extrinsecus thoracis regioni admota, ad venarum in pulmonibus apertarum vel ruptarum adstrictionem parū iuuare possunt, cum pulmones pectori minimè sint continuati, & validè adstringentia, pectori appositā, sanguinem in eo retineant; itaque ea malum us omittē, cum leuiora ex illis inuncta, quæ tantum concedunt, vt oleum Myrtillorum, Lentisci, Cydoniorum, exiguum effectum præstare possint: & fortiora quæ si vena thoracis aliqua sanguis emanet, eo in loco vbi dolor aliquis in eo sentitur, adhibentur, cum tunc, vti in causis demonstrauimus, sanguis ille minimè expuatur, illius exspuitioni proin minimè conueniant, sed empyemati potius aut phtisi, quæ inde subsequitur, sicuti in illis casibus fuit expositum.

Aliis partibus vt hepatis regioni, testibus, quæ in aliis hæmorrhagiis ad sanguinis fluxum compescendum adhibentur, hæc quoq; si magna illius sit profusio, locum habere poterunt. Vti & Amuleta in narium sanguinis fluxu potissimum descripta.

*Exspu-
tionis pu-
rulentæ
cursatio.* Purulenta exspuatio, si a pituita in eiusmodi purulentam materiam inclinante transmutata oriatur, non aliam curam quam pituitosa, cuius pars est, requirit.

Si verò a sanguine in pulmonum inflammatione in Pleuritide & Peripneumonia, purulenta cruentæ exspuitioni copuletur, cura iam in hisce affectibus descripta fuit.

Quod si ab exulceratis corruptisve pulmonibus in phtisi procedat, quid faciendum sit, eo in loco fuit expositum. Si è thoracis cavitare collectum ab Empyemate prodeat, per pulmones exulceratos transiens, tunc eadem cura quæ phtisi pulmonum læsorum causâ competit, requiritur, ipsiusque causâ sit apertura in thorace, sicuti in illis excretionibus, quæ per corporis superficiem fiunt, demonstrabimus.

*Vomica
exspu-
tionis cu-
ratiō.* Si vomica integra pus continens vel dispersa, cum pure expuatur, in pulmonum exulceratione in tabidis, ad eam cura dirigitur. Quod si verò nulla pulmonum læsio il-

liusve accidentia se offerant, aliâ curâ minimè opus est. Nisi fortè postquam vomica vnam vel plures semel vel iterum eiecerūt, ex eo suspicio oriatur, alias quoq; nasci posse, tunc abscessus huius generationem, expectorantibus sæpè exhibitis, in tussi enaratis, impedire conabimur. Et si de nouo natus, ob impedimentum aliquod aut grauiorem in pulmonibus, esse conjiciatur, ne diutius detentus pulmones lædat, sed maturè disrumpatur, Dioscorid. Tragoriganum & semen Cyclaminis, sæpè bibenda, vel cum Melle lambenda, exhibere iubet. Quod & fumum Tusilaginis siccæ incensæ, per inspirationem attractum moliri existimant: Atque expectorantia quæ validius operantur, idem possunt efficere.

DE VOMITIONE.

CAPVT IX.

Genera.



VOMITIO seu vomitus, per quem assumpta & cum illis alij permixti humores excrementaque, ex ventriculo per œsophagum, osq; apertum ejiciuntur, præternaturalis ferè semper, etsi vtilitatem aliquam adferat, idè existit, quod nō vti exspuatio, mictio, alui deiectio, consueta sit & necessaria, nec tam faciliè vt illæ excretiones, si secundum naturam procedant, perficiatur, sed vti & tussis, cum labore magnoque conatu, vociferatione & sudore, præcedatq; eam nausea, oris mador & amaritudo, labiorumque tremor, aliaque accidentia, grauiora in illis, qui ad vomitum inepti & difficiles sunt: Imprimis verò tunc præternaturalis fit, si frequenter virgeat, nimiaque copia per eam ejiciatur: vel si per eam illa quæ minimè oportet excernantur.

Qualia eiusmodi præternaturalium vomitionum varia occurrunt genera, tum in morbis, quorum sunt symptomata, tum extra hos, in nondum ægrotantibus; hac ratione primum distinguuntur.

Nullò adhuc morbo præsentē, illiusve a-

liis accidentibus, sed tantum hisce quæ vomitus adfert, vomitio se offerens, frequens illa est, quæ post crapulam & ebrietatem, gulæ & vino deditis supervenit. Quando crapulam denuo euomunt, vinumque immoderatiùs hauustum rursus per os effundunt, & vnà interdum multa excrementa tam pituitosa quàm biliosa. Quod vel subito, vel post somnum, præcedente plerunque vertigine, multis accidit. Quæ vomitio licet alieuiet, si tamen consueta sit, vel diutiùs perseueret, vt ventriculi functiones minùs rectè procedant, efficit, & sitim aliæque accidentia post illam sæpè aliquandiu molestantia relinquit.

Est & altera vomitio post assumptos certos cibos nauseosos, aut alioquin aduersos, superueniens, per quam ea rursus multaq; alia contenta in ventriculo reijciuntur; quæ si immoderata sit, quoque nocere potest.

Dein & alia se offert vomitio, frequens admodum, quæ post medicamentorum quorundam vehementium aut venenatorum exhibitionem euenit, imprimis catharticatorum; quæ vel subito postquam assumpta sunt, rursus omninò vel ex parte euomuntur, vel tunc primum, cum operatio ipsorum per alui deiectionem incipit, vomitionem, per quam varia excrementa redduntur, commouent. Sed & quæ post vomitoria studio ad vomitionem concitandam, sumpta, accidit vomitio, si violenta aut nimia sit, damnum quandoque infert. Hasque vomitiones eadem symptomata, quæ in cholera eueniunt, interdum quoque sequuntur.

Vomitibus alius prægnantibus mulieribus quibusdam est consuetus, quæ primis post conceptum mensibus, ieiunè vel post cibum sumptum vomunt. Et licet hoc sine nocimento plerunque faciant, tamen si hoc magno fiat impetu, perseueretque, tandem læduntur.

Sunt & vomitiones aliquæ quibusdam malè plerunque tunc dispositis consuetæ. In quibus aliqui cibum paulò saltem pleniorè vel minùs còuenientem ingestum, facile rursus, vel paulò post euomunt, vel cum concoctio sit, aut nondum plenè abso-

luta est, immutatum sed crudum & indigestum vomitu rursus egerunt.

Alij verò pituitam copiosam, mucum, vel bilem, matutino præsertim tempore vomunt, prægressà plerunque cardialgià aliquà, & subsequente aciditate vel amaritudine in ore, vel acerbitate quâ & dentes exasperantur. Qui omnes etsi vomitione leuentur, tamen ex còtinuatione illius vomitionis, tandem damnum sentiunt, vel aliàs in morbos incidunt. Sicuti typographum excellentem Frobenium, multis annis vomitu, post primum somnum, corruptam materiam ferè atram reijcere solitum, eoque malo tandem extinctum, vidimus.

In morbis diuersis ventriculi, intestinorum aliarumve partium vomitiones, vnà cum reliquis ipsorum symptomatibus, frequenter concurrunt, sicuti quarundam cum de illis egimus, etiam meminimus. Quæ prout vel pituita vel bilis vel sanguis reijcitur, variant.

Pituitosa vomitio, præcæteris in diuersis ^{Vomitio pituitosa.} occurrit morbis: In qua cum cæteris accidentibus morbi causà euenientibus, pituita nunc aliis permista, nunc mæra & sola euomitur; Eaque vel glutinosa, tenax, mucosa, limosa, spumosa vel aquea & serosa, sapore dulcis, falsa, acida, quæ omnia pituitæ nomine comprehendimus: Hanc vomitionem in affectibus aliis, qui magis vrgent, copiosius exposuimus.

Non minùs consueta est, Biliosa vomitio, ^{Vomitio biliosa.} in multis morbis, vbi & descripta fuit. In qua bilis vel flaua, colore nunc sulphureo, nunc luteo, vitello oui similis, vnde vitellina dicitur, quæ tenax est, euomitur: Vel viridis, illaque vel herbacea, diluta plerunq; & fluida, Porracea vel Prærsina dicta: vel admodum virescens, Æruginosa appellata: Vel Atra, tuncque grauiora simul prout morbus existit, concurrunt symptomata.

Priuatim autem hic occurrit genus, bilio- ^{Cholericus morbus.} si seu cholericus vomitus, cæteris accidentibus præualens, vnde & hic tantum tractatur: Cui alui deiectio biliosa comes est: Estque affectus qui ob causam Cholera dicitur, vel simpliciter, vel cum additione morbus, aut Cholericæ passio, vt à colico dolore,

quem colicam quoque vocant, differat; in quo affectu sequentia occurrunt.

Deiectio & vomitio assidua, magno cum impetu & conturbatione, per quæ bilis summe acris & amara redditur; nunc liquida & diluta, aliàs crassior; colore nunc flaua, nunc viridis, nunc atra, mera & pura interdum, aliàs vnà cum aliis quoque excrementis permixta. Sed & cruenta quædam admixta fuisse aliquando obseruari.

Tormina torsionesque in ventre, & circa cordis dictam foueam admodum vrgēt: accedentibus interdum & punctionibus, dolore etiam ad dorsum & lumbos se quandoque extendente.

Ardor vrinæ huic malo ob bilem eò quoque propulsam sæpè copulatur.

Sitis intolerabilis affligit, etsi plerumque nulla adfit febris, quæ tamen nonnunquam accedit, nimirum Synochus illa, quæ in biliosis morbis, vti in febribus declarauimus, quandoque suboriri solet, quæ tamen nisi aliud accedat, magna esse non potest.

Imbecillitas mox adest magna, corporisque languor: pulsus est celer & debilis; perseueranteque morbo & aucto, animus quandoque deficit, interdum in syncopen cadunt, cor palpitatur, extremisque refrigerari incipientibus, sudoreque frigido prorumpente, mors est in propinquo. Fræquenter conuulsio superuenire solet, quam singultus & spasmus in furis præire aliquando solet, periculumque denuntiare.

Sanguinea vomitio quoque sed rariùs occurrit, in affectu quem Sanguinis vomitum ob id appellant. Qui non solum in morbis, aliis affectibus simul tunc eum comitantibus euenit, sed & in suppressis naturalibus hæmorrhagiis, & præcipuè fœminis, cum menstrua extra conceptum & in conceptu suppressa sunt, quibusdam accidit, vnde & priuatim hic casus illic describitur. In quo sanguis aliàs parciùs aliis permixtus, cum illis vomitu excernitur, aliàs copiosè admodum euomitur, isque nunc purus, aliàs dilutus, interdum concretus & grumofus, aliàs tenax picis instar & nigrescens, quandoque atramenti in morem, qualem magnà copiam supra infraque excretum, in celeberrimo iu-

reconsulto vidi. Hunc affectum vti deiectionis eiusdem sanguinis aliquando, ita & graues interdum morbi illorumque accidentia comitantur.

Excrementitia vomitio præter iam dictorum humorum, aliorum etiam excrementorum occurrit, diuersorum, quæ vel cum iam dictis humoribus mixta, vel etiam separatim euomuntur. Inter quas Stercorosa etiam existit; in qua fæces alui, quæ per aluum excerni debebant, per os euomuntur: quam cum de fæcibus alui per viam non decentem deiectione agemus, describemus.

Causæ.

In omni vomitione ventriculus molestia quadam affici necesse est, vnde facultas ipsius expultrix insurgens, vt quod eum molestat, expellat, ad officium ipsius superius sinistrum, & œsophagum illi continuatum, quicquid in eo continetur, aut portionem illius protrudens, adiuvante septo & ventriculus impellente, cum illi vicinatis causâ consentiat, per œsophagum officio illius continuatum, tanquam per fistulam extra os eiacularur seu euomit, quæ illius motum, Ventriculi subuersionem vocant. Afficitur autem adeo ventriculus & molestat, quando vel conturbatur vel grauatur aut irritatur: Citiusque cum causa magna & vehemens existit, aut plures occurrunt, vel alioquin ventriculus sensu exquisitiore præditus, patibilis est seu facillè patitur, aut ex mala consuetudine vomendi, relaxatus, cibos minùs rectè amplecti, & paulò copiosiores vel minùs gratos retinere nequit. Causa autem ventriculus conturbans grauians aut irritans, vel ab externa vi, aut ab assumptis, vel illis quæ in corpore sunt, humoribus, excrementis, corporibusve prodit.

Extrinsecus Frictio ventriculi regionis, vel impulsio alia vehementior, aut corporis inclinatio nimia, aut commotio in uestitione & nauigatione, post cibum præsertim copiosiore aut potum, vel decubitus in ebriis, conturbando cibum & potum in ventriculo, vomitui occasionem præbet.

Digitus vel penna, vel quid aliud in fauces gulamque intrusa, tirillando & molestando nu-

Vomitio
sanguinea.

Vomitio
Stercorosa.

Ventriculi
conturbatio,
aggrauatio,
irritatio,
a vi externa
vel ab
assumptis
causis
molestando
præterius
naturalis.

do tunicam oris succingentem, propter illius cum ventriculi tunicae continuitatem & consensum, offensam hanc propellere tentans, contenta in eo simul, excitatus ventriculus, effundit.

A cibi & potus, imprimisque vini nimia ingurgitatione, ultra modum impletus & obrutus ventriculus, ea rursus euomit, eoq; magis, si cibi aut vini vis vehemens ventriculum simul offendat; estq; vomitionis tunc illius quæ crapulam & ebrietatem sequitur, causa. Quæ & à cibo nimium medicamentoso, ut infra de medicamentis dicitur, proficisci potest.

Quæ nauseam mouent, si assumatur, cum ventriculus illa respuat, interdum rursus ab eo per eandem viam rejiciuntur. Qualia sunt (sicut in appetitus defectu in nausea hæc vberius ostensa sunt) cibi non consueti, à quibus natura abhorret, vel aliàs turpia & abominabilia casu vel necessitate sumpta: quorum & sola imaginatio, quibusdā nauseam nonnunquam & vomitum mouet. Idem faciunt quæ admodum ingrata sunt, vel odore terro & nauseoso prædita, qualia multa sunt medicamenta, & inter cætera ferè omnia cathartica, nauseam præ cæteris pariunt, quæ medicationis gratiâ sumptâ sæpè iterum euomuntur. Nauseam quoq; quibusdā cibi certi, non per se ingrati, sed illorum naturæ aduersi pariunt, adeò ut si casu ea ingerantur, rursus euomatur. In morbis quoque quamplurimis, in quibus cibos fastidiunt, alimentosus ipsorum odor, & imprimis carneus & pinguis nidor, alioquin satis gratus, ipsis nauseam inducit, unde ea alendi gratiâ ipsis obtrusa, fastidientes, aliquando reuomunt.

Medicamenta assumpta, nimium acri adurentēve, vel alioquin noxiā vi; ventriculum vellicantia, vel etiam pungentia, ut sunt pili incisi & rasuræ vnguium, vomitum quoque cieunt, uti Vomitoria, vomitionis mouenda gratiâ sumpta; quæ si violentius aut diutius operentur, noxiæ vomitionis quoque causa sunt. Idem etiam medicamenta alia vehemētia, medicationis, & præsertim purgationis per aluum causâ sumpta, faciunt, quæ ventriculum nimium sollicitando, bre-

ui postquā assumpta sunt, iterum euomuntur, vel tunc quando operatio illorum per aluum primum incipit, cardialgiam mouentia, ob causas illic explicatas, vomitum creant; imprimisq; deleteria erodentia medicamenta aut venena, casu vel alias ob causas ingesta. In quibus vomitionibus, quicquid in ventriculo continetur succorum, humorum vel excrementorum, illic congestorum, vel eò per cathartica promotorum, vel simul, vel separatim euomuntur: Imprimisque bilis diluta, sicuti post stibij aliorumve violentorum exhibitionem fieri videmus, magnā copiā aliquot pelues adimplentem eam effundi, quam prius nec in ventriculo aut intestinis hæsisse, quòd nulla prius symptomata passi sint, satis demonstrat, sed è venis meseraicis, impetu naturæ vehementius medicamento comota, eò propulsam, sicuti in vomitu bilioso postea ostendemus.

Præter hæc multa quoque casu deglutita, inanimata plerunque, rarius viua, per hanc viam vomitu prodierunt.

Inter humores & excremēta, Bilis in ventriculo coaceruata, illum irritans, Vomitionis illius, quæ picrocholis sæpè, ieiunis maxime, & in diuersis biliosis morbis euenit, frequentior causa est, eò vehementioris diuturniorisque, quò ea deterior existit. Quæ etiam si admodum tenax sit & adhærens, qualis ex flauis vitellina existit, vel summè acris, uti viridis vel atra, ventriculum grauius vellicans ac veluti adurens, nimiumque sic afficiens, non tantum vomitum, sed & deiectionem per inferiora simul, veluti medicamenta cathartica violenta in ventriculo adhuc contenta facere solēt, in cholera morbo, sic à bilis excretionem appellato, concitat; e quæ magis, si nimium abundans, ad intestina quoque propellatur, sicuti & in intestinis collecta, tenuioribus præsertim illaque irritans, ventriculo ob vicinitatem & continuationem simul officiens, utroque quoque modo per vomitum & sedes, excretiones moliri potest. Plus tamen supra infraq; mouens, prout ventriculo intestinisve magis incommodat.

Nascitur autē hæc bilis interdum in ventriculo, ex assumptis cibis, qui vel naturā suā

Ventriculi irritatio à Bile causa Vomitionis biliosa, & Cholera morbi.

calidiores, acrem & biliosum succum intra se continent, vel ex putredine rancoreve eum concipiunt, aut corruptione in ventriculo demum in eum conuertuntur; quod ex Cucumerum, Melonum similiumque vsu frequenter contingit, choleraeque morbi causa est, sicuti in cordis rofione inde quoque facta, quo pacto bilis ex dictis generetur, prolixè ostendimus, quae tamen in cholera morbo ob causas plures vehementioresve concurrentes, deterior copiosiorque gignitur, & proin grauius hinc quam in cardigo ventriculum afficit, atque ad intestina propulsa illa simul affligit. Sed & perniciofa haec bilis ex flauabile e vesicula propria in has sedes effusa, corruptaque genita idem potest efficere. Alias vero ex venis meseraicis, vbi coaceruata diutiusque retenta prauitatem hanc acquisiuit, in haec loca erumpes, illaque vti dictum, infestans, choleram morbum quoque parere potest. Sicuti quo pacto in venis meseraicis illa colligatur, & ex qua materia originem trahat, in febrium intermittentium causis abundè declarauimus.

Ventriculi repletio aut offensa ab Fluoribus & Excrementis, causa Vomitus pternaturalis, & pituitosi.

Ab humoribus aliis & excrementis, ventriculum nimium repletibus aut offendentibus, Vomitus quoque interdum concitatur. Veluti à succo crudo, ex cibo non bene concocto genito, qui in ventriculo fluctuans, ventriculūque statibus adimplens eum ad vomitū illius, qui tunc serè acidus est, quandoque impellit. Vel à succo alio præter bilem acri, ex cibi corruptione nato: Vnde vomitiones accidunt, quae vel non longà à cibo sumpto, vel tunc quando concoctio facta esse deberet, fiunt. Frequenter & à pituita cuiuscunque generis, aut à lentore qui in ventriculo coaceruari, illicque diu saepe cum aegrè descendat, retineri solet, vel alio aqueo humore, à quibus vti nauseam excitari in appetitus defectu diximus, vbi & causas prolixius declarauimus, ita & immoderatis, vomitus quoque commouetur, eoque magis, si alij quoque prauis accedant humores. Qui & per se, atque vnà cum cæteris in ventriculo geniti, aut eò effusi, ventriculum offendentes, vomitionem in variis cacochymicis corporibus accidentem, vti & in mulieribus quibuscūque, tunc cum grauidæ sunt, ob suppressa

menstrua, vel etiam aliis foeminis extra conceptum, ob illuuiem, vnà cum mēsis tunc retentam, aliquamdiu molestatam, & in febrium paroxysmorū initiis aut crisi bus, symptomatice, aliisque morbis grauidis, malignis item & pestilentibus, ventriculo compatiēte, atque interdū ab ipsis læso, euenientem efficiunt: sicuti in horum morborū tractatione causa plenius explicata fuit.

Sanguis è venis meseraicis quæ per ventriculum feruntur, in ventriculum instillatus vel effusus, vel à vicinis intestinorum venis hucusque regurgitans, vomitionis sanguineae causa existit, & prout ille sanguis se habet, talis euomitur, ac proin interdum ferofus vel admodum inquinatus aut niger, qualem in venis meseraicis coaceruari saepe solere, in febribus ostendimus, existit, nonnunquam & si diutius in ventriculo moram trahat, concretus. E venis autem excidit, vel ob copiam, vti in menstruis retētis, puellae vel foeminæ grauidæ sanguinem quandoque sine noxa euomunt; vel nonnunquam & cessante per nares cōsuetā hæmorrhagiā; vel ob amputatum membrum, sanguine in corpore cumulato; vel hoc fit ob nimiam illius cum sero permissionem vel tenuitatem, aut ob illius, quia admodū biliosus est, fluiditatem, in variis morbis, aut aliās illius impuritatem aut malignitatem, in febribus praesertim à natura propulsus. Sicuti hoc in variis morbis fieri solere, in illis ostendimus: A contusione quoque aliquā factā circa viscera ventriculo vicina, sanguis nonnunquam euomitur; vel ab alia ventriculi læsione, per deglutita acuta, vel ab accepto vulnere in ventriculo, per vomitum sanguis quoque rejicitur. Deglutitus quoque sanguis in fauces, vel à naribus, aut à thorace deteniens, concretus saepe rursus euomitur.

Curatio.

Cum per vomitiones materia aliqua, quæ per hanc viam vtiliter, nonnunquam & necessariò expurgatur, è corpore educitur, illa minimè compesci, immò si non sufficienter fiat, promoueri potius debet. Quod si verò adeò violentè fiat, vel

Ventriculi repletio à Sanguine venarum meseraicarum, causa Sanguinea vomitionis.

tam diu perseueret, vt vires deiciat, vel alioquin damnum inferat, tunc vt placidius procedat vel remittat, cura adhibetur. Impremis verò quando inutilis est vomitio, per quam ea quæ in corpore retineri debebant, vt cibus & pharmaca, rursus euomuntur; illa & præcauenda & sistenda erit.

*Vomitum
præternaturale
ab assum-
ptis cu-
ratio.*

Itaque si post crapulam & ebrietatem vomitus fiat, ille minimè erit impediendus sed potius promouendus: Si tamen sæpè fiat, ab ea cauendum, vel illam, vt edo iis quæ ebrietati resistunt, vt in mentis alienatione dictum, prohibeant, nec somnum mox à crapula capeffant, nec vertiginè sibi, quæ præcedere solent, intuitu aut motu corporis accersant. Quòd si perseueret, cum bilis ex ea concitetur, illa quæ in bilioso vomitu competunt, adhibenda sunt.

Si post alia assumpta necessaria, quæ satius esset in corpore manere, cum nausea vomitio fiat, ea erit præcauenda. Idque maximè post catharticum bibitum, vnde facillè vomitum sequi diximus, quòd cum subito post illud sumptum sit, medicamenti operatio frustratur, nam si hoc nonnihil protrahatur, non semper medicamentum irritum est, sed deiectio nihilominus sequitur, & per vomitum, multa excrementa ventriculi, quæ descendere propter lentorem nequibant, expurgantur, vnde etsi deiectio postea minus copiosa sequatur, ob duplicem illam euacuationem, tamen effectum suum consequetur operatio. Quæ eò maior, si non penitus medicamentum, aut iam aliquandiu retetum, demum euomatur.

Cæterum ne medicamentum reuomant cauebitur, odore & sapore grato & amico, qui tetrum odorem & saporem medicamenti emendat. Quo nomine Crusta panis tosta in Aceto madefacta naribus adhiberi; collo Pannus aceto madefactus obuolui; osque Aceto vel Aquâ mox ablui; & Pomum acidulum vel aliud quod maximè ori gratum, masticari debet.

Præter quæ Ouum gutturi adhibitum, ne reuomant medicamentum, impedire vulgò creditur. Sed & alia multa eo nomine in biliosa causa exposita, inter assumenda, & adhibenda, vt illis vomitum compescunt, sic

& hic eum præcauere possunt.

Si verò cathartico sumpto, tunc eum operatio illius incipit, vomitus sequatur, quem cardialgia præcedere solet, nec hic per se noxius, cum & supra infraque simul fiante euacuationes. Quia tamen ob cardialgiam comitem plurimum debilitantur, adeo vt in syncopen aliquando cadant; vt præueniamus vtrumque, Lauatiua vel lotiua dicta, quæ ventriculum ab eo quod eum irritat, abluant, vbi primum rosionè sentiunt, propinantur. Veluti decoctum Hordei, quod calidum exhibere iubet Hippocr. cui & saccharum vt magis abstergat, permisceri potest. Vel datur cremor Hordei cum saccharo, aut iusculum Cicerum vel Pisorum rubrorum. Sed & quæcunque stimulum hunc contemperant, tunc exhibita iuuant. Vt quoduis Brodium vel Iusculum carnis aliorumve.

Clyster tunc quoque injectus, cardialgiam compescens & operationem medicamenti accelerans, vomitum quoque corrigit; tum communis, tum priuatus in cardialgia ex hoc casu facta, descriptus.

Quòd si ob medicamenti vel purgationis per aluum, aut etiam vomitionis promouendæ causâ propinati, aut deleterij alterius medicamenti, vel veneni, casu aut temerè assumpti, nimiam violentiam, vomitio sequatur, tunc ea quæ horum acrem, adurentem & malignam vim reprimunt, atque ea abstergendo vt facilius reuomantur, iuuant, potius quam vomitum sistentia exhibendo, huic vomitui medemur. Vel etiam dando stupefacientia sensum ventriculi, vt minus sentiat, vomitum compescimus. Vel Antidota, quæ veneni vim, si inde fiat reprimant. Quæ si opiata simul sint, vt Theriacâ & similes, duplici nomine tunc conueniunt. Qualia multa in cardialgia, quæ tunc quoque vehementer angit, proposita hic quoque usurpari possunt.

Si à pituita aut alio crudo humore vel excrementitio, modò non biliosus aut calidus & feruens sit (de quo postea) vomitio fiat, siue in cacochymicis, vt & in prægnantibus, vel in morbis, per hanc excrementa expurgentur, recteque procedat, minimè impediri debet: Si verò sæpè eueniat, in sanis alio-

*Vomitum
pituitosi,
aut ab aliis
excrementis
excitati,
curatio.*

alioquin, vel in morbis non conueniat, aut nimium vrgeat, cura illius erit sequenti modo perficienda: Obseruando diligenter interim, si pręgnantibus hoc contingat mulieribus, aut morbo alio ægri laborent, ne quędam ex hisce remedijs illis incommodent, quę & tunc omittenda, aliaq; quę minimę obsunt, vsurpanda.

Vomitória exhibita, vomitu perseuerante, tunc iuuant, quando humor tenax ventriculo adhærens, eum ad vomitionem continuam sollicitat, per quam tamen ille minimę cedit neque expurgatur, proin & ad vomitum compellere non desinit, tunc enim vomitorijs eum abstergentibus, & si tenax sit, illum incidentibus exhibitis, cedens, per vomitum quoque ejicitur, causaq; sic vomitus vomitu amouetur. Quorum vomitoriorum formas aliquas in ventriculi imbecillitatis cura, atque in alijs pituitosis morbis exposuimus.

Purgantia deorsum causam morbi, pręmissis si opus sit pręparantibus, si illa, vti dictum subsistat & hæreat, exhibentur, vt quando per superiora expurgari minimę aut non sufficienter potest, è ventriculo deorsum ad intestina deriuata, eum molestare desinat, sicq; viâ consuetâ per aluum euacuetur. Quod eadem medicamenta, qualia in ventriculi imbecillitate alibiq; passim exposita fuere, præstant: Formas tamen purgantium gratiores & commodiores eligendo, ne rursus ea euomant: Inter quas Vini purgantis est conuenientissima: Vel pilularum, si eas facillè deglutiant, vel reliquę, si illis magis delectentur.

Clysmata iniecta simili ratione causam deorsum reuellendo, in vomitu nimio profunt, non tamen magnâ quantitate infusa, nec dum admodum acria aut relaxantia, ne dum colon subeunt, ventriculum vicinum premendo, aut relaxando vel irritando magis commoueant: Quorum præparationes multę in colicis doloribus habentur.

Sed & nutrientibus clysteribus iniectis, quādo in continuo vomitu cibū nullo pacto retinere possunt, neq; sic nutriri, ægros necessitate hac urgente, sustentare aliquandiu possumus. Quales in hæcicis ppositi fuere.

Propinantur postquam per vomitū spontaneum, vel arte promotum, aut per aluum expurgata est materia; quę eum si nonidum desinat, comescunt. Talia autem in hac causa sunt calida, adstringentia, ventriculo appropriata, minimeq; nauseam mouentia. Qualia multa in ventriculi imbecillitate exposita sunt. Quibus & sequentia, præcipuè in vomitione nimia conferentia, adduntur.

Aqua Cinamomi grata admodum & efficax, vomitionem mox cohibet: Alię ex aromatibus destillatę, in ventriculi imbecillitate enarratę, nausęam minimę mouētes.

Vinum prę cæteris ventriculo acceptum, bibitum, vomitum sedat, generosum præsertim, quale inter varia est Maluaticum.

Medicatum vinum, ex infusione factum, amarum, magis competit quàm dulce, cum dulcia vomitum potius promoueant. Præferturque Absynthites, cui in tenacissima materia, Squillam, Gentianam & summitates Centaurij minoris addunt.

Aliud ex Menta, Maiorana, summitatum Rosmarini, Betonicę, folijs Myrti, flor. Rosarum rubrarum, semine Coriandri, infusis in Vino, addito simul Absynthio, vel sine illo paratur. Quibus & interdum Garryophylli, Nux moschata & Macis adduntur.

Vina aromatica iuuant, Hippocraticum dictum, vel alia ex infusione aromatum parata, qualia in ventriculi imbecillitate exposita sunt; vel ex puluere mox dicendo aromatico infuso in Vino fieri possunt. Quibus Coralli rub. puluer. quoque adicere vtile censent. Sacchari minorem quantitatem quàm aliàs fieri soleat, ne dulcedine obsit, addimus.

Decocta non adeo sunt grata, & bibita facillè euomuntur, in formam tamen syrupi redacta, sic per cochlearia exhibentur: Veluti Syrupi de Absynthio & Menta, cum Vino vel per se propinati; additis succis Cydoniorum, Granatorum, & quod aliqui laudant imprimis, Mentę Gręcę.

Vel fiat tale decoctum, omnia vel quędam sumendo: R. radic. Cyperi, Galangę, Spinę albę ana ʒ. ʒ. Mentę, Betonicę, Sanguisorbę ana M. j. summitat. Rosmar. P. j. sem.

sem. Coriandri 3. ij. semin. Pæoniæ 3. j. Schœnanthi, Spicæ Celticæ, Corallorum rubrorum vti aliqui volunt puluerisatorū an. 3. j. β. fiat decoctio in Vino & Aquâ, additoq; Saccharo coquantur in formam syrupi, aromatizantibus.

In cibis Faba, Phaseolus, Lens comesta profunt.

Lentes excorticatas numero xxij. iubet exhibere Dioscor.

Pulueres stomachici varij, in imbecillitate ventriculi expositi comperunt, maxime qui adstrictionem habent, vt Aromaticum rosatum, & Gariophyllatum, Rosata nouella & Diagalanga.

Vel sic fiat puluis aromaticus, adstringens nonnihil: R. radic. Cyperi, Galangæ, Acori veri, Calsiæ lignæ an. 3. j. β. Nucis moschat. Maceris, Gariophyllorum an. 3. j. Schœnanthi, Spicæ Indic. ligni Aloës an. 3. β. Piperis, Zingiberis an. 3. j. fiat puluis. Qui efficacior erit, sed minus gratus, si ei addas Maioranæ, Mentæ, florum Rosarum an. 3. β. Mastiches vel Thuris 3. ij. Danturque hi pulueres cum Vino per se, vel Saccharo prius addito.

Conseruæ & condituræ variæ probantur, vt conserua Rosarum antiqua, Mentæ, Maioranæ, Conditura citri, Nucis moschatæ aliæque.

Admouenda ventriculo erunt, quæ eum roborant, & constringunt, in ventriculi imbecillitate præscripta, eligendo ex illis formas quas laxum ventriculum adstringere diximus, & quæ odore magis grato præditæ nauseam minus mouent.

Oleis illic explicatis ventriculus inungendus erit, quæ quando roborandum & potius adstringendum est, cōpetere diximus. Quorum vnctuosus odor, ne incommode, vti verò facere solet, capite auerso & interpositis odoratis cauebitur. Vel mox post vnctionem odorati pulueres illic quoque expositi superaspargendi, aut alia odorata olea ex aromatibus exstillata, illis permiscenda. Oleum quoque ex Nuce moschata, cum suaui odore præditum sit, hic imprimis iuuat.

Vnguentum ad humidum & laxum ventriculum illic descriptum, vel simile aliud,

hic quoq; locum habebit, obseruando in odore emendado, idem quod modò diximus.

Emplastra præ cæteris formis, ne per inunctiones fricando ventriculum, vomitus nonnunquam concitetur, hic ventriculo applicanda potius. Quale in imbecillitate ventriculi illud quod in laxiore ventriculo prodest, de Mastiche appellatum existit.

Fotus item, quos debilem ventriculum roborare, laxum constringere illic notauimus: hic quoque viles erunt, & cum odorem non ingratum exspirent, eò erunt conuenientiores.

Pulueres odorati hi qui cum validius adstringendum illic explicati fuerunt, hic quoque inunctionibus inspergendi, & sacculis excepti ventriculo admouendi.

Cataplasmata item citra vnctuosorum permissionem parata, cum sint odoratiora, illic præscripta hic vsurpantur.

Præter hæc multa extrinsecus adhibita alia, vt cucurbitulæ, dropax, ligaturæ, amuleta, in bilioso vomitu potius, cum ille magis infestus sit, mox explicanda, hic quoque proderunt.

Adhibita interim parca & decenti victus & reliquâ viuendi conuenienti ratione.

Si à bilioso humore, aut alio acri & feruente, ex cibo corrupto aut aliâ in corpore nato, ventriculum stimulante & irritante vomitio fiat, perque eam hæc euacuentur, potius iuuanda quam impedienda erit. Si tamen consueta sit in quibusdam cacochymicis corporibus biliosa vomitio, cum longè grauius affligat quàm pituitosa, & tandem noxam inferat, & præcipue quia morbos minatur, cura illius erit instituenda. Vti & si in morbis quibusdam immoderata sit & vehemens, quia plurimum obest, cura quoque eò erit dirigenda. Imprimisque in cholera dicta, cum vomitio præcipuum huius morbi sit symptoma, adeò periculosum, tota huius morbi cura, cum cæteris biliosis vomitionibus hic erit proponenda. Acutissimus autem est cholera morbus periculosusq; præsertim si nullâ causâ prægressâ manifestâ, ægrum corripiat: minus autem periculi, si ob esum cucumerum, melonum, aut alterius cibi in bilem conuersi inuadat: Mortemque

Vomitus
biliosus
Cholera
morb
curatio.

minatur, si pulsus debilis, cordis palpitatio, animi defectio, singultus & conuulsio accedant, quæ in propinquo est, si pulsus intermittat, urinae liuidæ fiant, atque extrema frigescant.

Scopus curandi in omnibus eiusmodi immoderatis biliosis & acris vomitionibus, habita semper interim ratione morbi, aliorumque symptomatum, si adsint, adhærentem bilem humoresque ab initio abstergere, illorumque vim refringere, & si magis ad superiora tendant, deorsum impellere: Ventericulum dein & intestina roborare, adstringere, nonnunquam & necessitate urgente sensum illorum, ut minus patiantur, retundere: idque internis externisque medicamentis; viribusque interim quæ citò deiciuntur, prospicere, atque imminuentia graui accidentia in cholera præsertim morbo, auertere, & si superueniant, emendare, ut & fluxui ventris in cholera simul prospicere. Quod per sequentia medicamenta perficitur.

Vomitória eadem quæ in cardialgia à bile, & in febribus biliosis descripta sunt, hæc quoque si causa cedere nolit, competunt. Quæ & euacuando bilem adhærentem & in cholera reuellendo simul alui fluxum immodicum sistendo quoque iuuant.

Purgantia eadem quæ in cardialgia à bile proposita fuerant, hæc ad causam deturbandam locum habent: Imprimis Myrobalani, Rhabarbarum cum Spica, quæ illius est correctiuum atque omnes fluxiones sistit, dando, & cæteris ferè semper addendo, quæ præter expurgationem bilis, deorsum materiam deriuando quoque vomitum sistunt. In cholera tamen cum tunc aliud alioquin nimium fluat, si ob bilem intestinis adhærentem, illius euacuatio requiratur, eadem quæ in dysenteria conuenire diximus, hæc quoque proderunt. Fortiora, nisi præcautionis loco in illis qui biliosis vomitionibus obnoxii sunt, non dentur, & proinde dum morbus adest, ab iis abstinendum. Clysteribus autè rectius hoc tunc perficitur, abstergentibus, bilisque feruorem minuentibus, in cholera, qui & si alioquin biliosus sit vomitus, reuellendo iuuare possunt.

Inter alterantia multa quoque conueniunt,

quæ in cardialgia biliosa descripta sunt, eligendo ex illis ea quæ magis adstringunt, & nauseam minimè mouent: Idque maxime inter ea quæ propinatur: Qualia sunt sequentia.

Fructus acidi illic descripti crudi coctiue, comesti vel condimenti loco, ipsi vel succi ipsorum in cibis vsurpati, hæc quoque proderunt, eoque magis, si non nimium maturi austeritatem aliquam habeant. Vnde Vua, Cerasa, Mespila, Sorba, Corna huc quoque referuntur. Olera item illic quoque nominata acida, vel etiam alia cum Aceto vsurpata. Et Brassicæ capitum & Raparum in Compositio nostro dicto, conditura.

Conseruæ & condituræ fructuum prædictorum acidorum, sicuti illa variis modis parantur, conueniunt, & præter hæc Myrobalani, corrices Citri conditi, conserua item Rosarum & Acetosæ.

Succi quoque horum fructuum & herbarum acidarum, extra cibos diuersimodè vsurpati, vomitum compescunt. Acetumque solum etiam bibitum post crapulam, uti ebrietatem corrigit, ita vomitum impedit vel mitigat. Vinumque absynthites vomitui bilioso medetur: quod proinde ab ebris qui crapulam edormiuerunt, cum cardialgia vomitum præfagit, magnopere expetitur. Aquæ etiam frigida potus post cibum, aliquando illius vomitionem arceat.

Syrupi etiam acidi illi qui in cardialgia propositi sunt, in hoc casu iuuant, qui per se dantur, vel dissoluti aqua Acetosæ aliòve modo.

Aliquando illis uti & cæteris, in ventriculis debilioribus, alia eum respicienda adduntur; Estque inter cætera hoc singulare in vomitu emendando: R. syrapi Granatorum acetosorum partes quatuor, syrapi de Menta partem vnam; misce.

Vel succi vtriusque expressi cum Saccharo coquantur in formam syrapi: Aut Mentæ parum, dum syrupus granatorum coquitur, simul incoquatur.

Puluis vomitum sedans per se cum vino, succis aliòve modo sumendus, vel aliis formis commiscendus, sic parari poterit: R. carnis seu pulpæ Cydoniorum vel Pyrorum austerorum, vel Mespilorum vel Sorborum vel

vel Cornorum, antequam, plenè mature-
scant exiccatorum 3.ß. corticorum Citri
sicci 3.j. Gallarum 3.ß. radic. Pentaphylli, se-
minum Acetosæ, Plantagin. Vuarum, Ber-
beris, Sumach, Granatorum, Rosarum, Co-
riandri an. 3.j. florum Rosarum, Labruscæ,
an. 3.ß. Antispodij ex ebore vel cornu Cerui,
Coralli rubri ana 3.j.ß. Crystalli 3.ß. Marga-
ritarum 5.j. Boli rubri vel Terræ alterius
pinguis & puræ 3.j. Hypocistid. 3.ß. Santali
rubr. Cinamomi crassi an. 3.j. fiat puluis.

Ex Mastiche, Thure, addito nonnunquã
& Succino, puluis similiratione datur, quem
alij cum Vitello. oui parum salito exhibitum
magis probant.

Præter hæc pulveres foliorum Trifolij, cor-
ticum Castanearum, seminis Maluæ, gum-
mi Ceraforum, cum Vino bibiti, vomitui pe-
culiariter resistere dicuntur.

Musci arborum quem Pulmonariam vo-
cant, & Lagopi foliorum panicularum ve-
cum semine pulveres imprimis præbentur
à Dioscoride, qui eodem modo exhiberi
possunt.

Ex vſitatis pulueribus, Diacydonites sine
speciebus, trochisci de Spodio cum semine
Acetosæ, præ cæteris competunt. Item tro-
chisci de Thure, nisi odor illis omnino ad-
uerſetur, descriptionis præsertim Rhazis,
thus, mastichem, succinum, bolum, campho-
ram, & odoris correctionis gratiã, galliam
moschatam & gariophyllos recipientes.

Electuaria & conditum in cardialgia bi-
liosa præscripta hic quoque iuuabunt.

Vel fiat hoc pacto: R. carniū Cydonio-
rum condit. 3.ij. cortic. Citri condit. conferu.
Rosarum an. 3.j. conferu. Acetosæ 3.ß. semi-
nis Rosarum, Acetosæ, Coriandri an. 3.ß. Co-
ralli rubri 3.j. misce. Possunt & plura ex præ-
dictis pulueribus hic quoque misceri, vel de
pulvere illo 3.ij. vel iij. addendo & interdum
Triasantalum, vel Diamarg. frigid. vbi syn-
cope metuitur.

Narcotica antidota, quorum illic quoque
facta est mentio, cum sensum ventriculi im-
minuendo, vt minus afficiatur, faciant, vo-
mitum admodum tum per se, necessitate vr-
gente exhibita, tum aliis commista, vti illic
dictum, compeſcunt.

Admouenda interim ventriculi regionis
anteriori sedi, nonnunquam & posteriori,
quæ illum constringant & roborent; tem-
perata, vel ad frigiditatem aliquam acceden-
tia, actu tamen calida, cum frigiditate facile
offendatur ventriculus, proin & licet poten-
tiã frigida non nihil, hic vsurpemus, illa ta-
men permixtis parum calidis contempera-
mus. Hæc in cholera simul fluxum ventris
quoque compeſcunt, & in vomitionibus al-
iis biliosis vti semper locum habent, sic ma-
ximè quando per os nihil sumere, ob nau-
seam volunt, præcipuè adhibere necesse est:
odore quoad fieri potest, minimè nauseoso
prædita.

Olea cum propter vnctuositatem omnia
actu relaxent, sola non adedè commodè vsur-
pantur, si tamen illis vti velimus, eadem ad-
stringentia frigida, admixtis parum calefa-
cientibus, vti in cardialgia biliosa ostendi-
mus, hic quoque competunt. Acetum con-
uenit, vti illic dictum, sed maiori quantitate,
vel alios succos acidos addendo, & super-
aspergendo pulveres adstringentes, odora-
tos, vt nauseam oleorum auferant, in cardial-
gia biliosa quoque expositos:

Vel hunc qui magis adstringit: R. Masti-
ches 3.ij. cortic. Thuris, radic. Cyperi, Balau-
stiorum ana 3.j. Absynthij sicci, Spicæ nardi
ana 3.ß. fiat puluis.

Vnguentum refrigerans & roborans, in
cardialgia biliosa descriptum, hic quoque
competet: Vel quod amplius adstringat, tale
fieri poterit: R. olei Mastichini, Cydoniorum,
Rosarum, Omphacini ana 3.j. olei Myrrini
vel Myrtillorum, vel Lentiscini 3.vj. olei de
Absynthio 3.ß. Aceti rosac. Vini rubri stiptici
an. 3.j.ß. succi Cydoniorum vel Pyrorum,
vel in diuitibus Citri aut Limonum 3.j. co-
quantur ad succorum consumptionem, pestea
adde pulueris Mastiches, Olibani ana 3.j. Bo-
li rubri 3.j.ß. Acaciæ Hypocistid. ana 3.j. Gal-
larum, Balauſtiorum, Rosarum rubr. an. 3.ß.
Ceræ q.ß. fiat vnguentum.

Vel fiat emplastrum; addendo iam præ-
dictis pondere duplicatis, Sanguinis draco-
nis 3.j. Ladani 3.ij. capularum Glandium,
Nucis cupressi, cortic. Citri, fol. Rubi, Myrti,
Absynthij, Mentæ, seminum Myrti vel

Myrtillorum, Coriandri an. 3. j. Antispodij 3. j. 8. Spicæ nardi, Nucis mosch. an. 3. 8. Santali rubr. 3. j. Galliæ mosch. 3. ij. cum Pice, Resinâ Oleisq; supradictis fiat emplastrum.

Mastiche pulverisata, albumine Ovi incorporata, nonnunquam & additis oleis supradictis, emplastri modo applicata convenit.

Placenta relicta in fundo cucurbitæ post exstillatam aquam Rosarum, aspersâ aquâ Rosarum & Aceto rosac. & Vino rubro stiptico applicatur.

Crusta panis parum tosta, in Aceto rosaceo macerata rursumque expressa, obvoluta tenuissimo linteo, ut cohæreat, ventriculi sedi applicata, remedium est in vomitu utile & paratu facile: Cui & Mastiche, Gariophylli aliaque inspergi possunt.

Vel crusta panis sic tosta & madefacta in Aceto rosac. vel solo vel addito etiam succo Cydoniorum, Vuæ acerbæ aliòve adstringente, vel etiam Vino rubro stiptico, cõtunditur, sicque applicatur: vel hi succi Farinâ communi vel Hordei vel Lentium subacti applicantur. Efficaciusq; hæc operantur, si pulvis Mastiches, Absynthij, Mentæ, Rosarû addantur, vel plantæ hæc in Vino rubro costę contusæ pani misceantur; Aliæve adstringentia in emplastris exposita.

Compositum magis & cum oleis paratû Emplastrum de crusta panis, præsertim ad vomitum sistendum, vîtatû habetur. Quod ex Crustæ panis tostæ & in Aceto maceratæ, & farinæ Hordei an. 3. ij. fit, subactâ olei Mastichini & Cydoniorum an. 3. j. additaque Mastiches, Antispodij, Coralli, Santalorum rubr. & Mentæ an. 3. j. Cui & Absynthium addi potest, aliæve adstringentes pulveres in emplastris descripti.

Emplastrum Diaphœnicum Alexandri ex dactylis, pane, carne cydoniorum, additis aceto, oleo, multisque adstringentibus, vomitui sistendo quoque est accommodatum.

Vel ex pulpis præcipuè paratum sic fit: R. Cydonia vel Pyra, vel Poma acida odorata, vel alios fructus carneos adstringentes supra recensitos, assentur si recentia sint, parum in fornace hypocausti vel sub cineribus, vel si sicca iam sint, emolliantur & co-

quantur parum in Vino rubro stiptico, addito etiam Aceto: Contundantur diligenter & applicentur; Quibus si oleum de Absynthio & de Menta permisceas, præter quàm quod per se etiam conveniunt, ut pulpæ hæc non tam citò arescant, & asperitate sua incommodent, efficient. Quibus & alia ex supradictis multa addi possunt.

Epithema ex Aquæ rosacę 3. iij. Aceti rosac. 3. ij. cum sindone rubra calens appositû. Cui addi possunt Mastiches 3. ij. Santali rubr. 3. j. Rosarum rubr. Gariophyll. an. 3. 8. nonnunquam & Camphoræ grana aliquot.

Pannus item intinctus in succo Cydon, vel Pyrorum vel Pomorum acidorum, addito interdum & succo Citri, Limonum, Granator. calidè quoque admotus: Quibus & pulveres enarrati misceri possunt.

Fotus adstringens paratur ex decocto corticum, arborum & foliorum Pyri, Cydonior. Quercus, Sorbi, Berberis, Ligustri, Oleastri, Mespilorum, Sumach, Myrti, Rubi, florum Rosarum: Labruscæ, Balaustior. cortic. Granatorum & Gallarum: additis etiam ratione ventriculi Absynthio & Mentâ, semineque Coriandri & Myrtillorum, Santalisque interdum, atque vno aut altero ex aromatis. Decoctioque in Vino rubro solo vel temperato, Aquâ præsertim extinctionis ferri perficitur.

Cucurbitula supra ventriculû vel in fundo ventriculi, vel paulò subtrus affixa, vomitum sedat, & si fiat dum cibus sumitur, ne rursum euomatur, eum retinet. Quod si à venis meseraicis bilis ad ventriculum feratur, hepatis vel lienis sedi apposita, ubi rami maiores harum venarum sunt, reuellendo prodest.

Dropax ex pice dissolutâ oleo convenienti supradicto, ventri appositus, retractusque, assiduum vomitum sistit.

Ligaturæ, Frictiones extremitatum, aliquid quoque præstant. Vti & si facies frigidâ conspergatur.

Odoretur æger & mastice grata ventriculo, veluti Poma, Pyra, Cydonia, aliaque superius in cathartici sumpti vomitu impediendo exposita, aut manus in Frigidam aquam immergat.

Ex Ebore elaborato facta lamina tenuis lata, ventri admota, vomitum sistere dicitur.

Iaspidem viridem appensum, ita vt ventriculum tangat, idem posse scribitur.

Quod regimen attinet: Cibus parçè detur, per interualla, isque euchymus & qui non facile corrumpitur, gratus, nauseam minimè mouens, spissior potius quàm liquidus, cum condimentis, vt supra dictum.

Inter cætera Panis aut Ferculum ex farina Tritici vel Hordei, cum succo Granator. pistâ, aut aliis acidis probatur; Hordeatum item cum aqua Rosarum, Acetorol. & Saccharo.

Congelatum ex succo Caponis in duplici vase cocti paratum, addito succo Citri aliisve cordialibus, quando syncope timetur, prodest.

Potus illorum actu frigidus potius quàm tepidus aut calidus: Vinum acidulum esse debet: Vel si vinum illis aduersum sit, Aquâ coctam addito s. Coriandri vel aliis bibant. Vel in qua syrapi aciduli dissoluti sint, habitâ in omnibus hisce diligentî consideratione, naturæ illorum & consuetudinis.

Aquæ frigida post cibum potus, aliquando illius vomitionem arceat.

Thermarum potum huic malo obnoxius adiuumentum adferre docent. Quod nō tam vomitionis quàm cachexiæ quando inde euenit causâ fieri, verisimile est. Acidarumq; potus tunc competit.

Quieti interim sint, corpus non admodū moueant, parum loquantur: Nec masticandoos nimium commoueant.

Somnus in hac causa valde prodest, cūm eiusmodi enacuationes sistat, qui proin illis cum ob inquietudinem aliàs vix dormiunt, erit concitandus, exhibitis soporiferis.

Accidentia graua choleram comitantia, vel illi superuenientia; iisdem quæ & cholerae competunt, emendamus, vel aliis quoq; horum symptomatum alibi explicatis remediis; vti Alui fluxum, quem & quæ vomitū externa remedia sedant, sistunt:

Item suum, acidis in potu & medicamentis expositis, Febrem iisdem quæ biliosos humores educunt, transeundo etiam febris causâ ad ea quæ illam tollunt: Conuulsio-

nem imminentem vel iam præsentem inunctionibus spinæ, aliisque illi dicatis remediis aliis, præcauere vel curare studebimus: Virium lapsum animiq; defectum, victu & cordialibus medicamentis corrigemus: Si quid aliud iungatur, vti interdum vrinæ ardor, huic peculiariter prospiciendum.

Si sanguis euomatur, isque in fauces illaplus eo descenderit, & concretus reddatur, tunc vomitus ille, vt nihil illic remaneat, nouaq; symptomata pariat, potius promouendus quàm impediendus erit. Si à venis meseraicis eò feratur, morbi magnitudinem & proin periculum denotat, tuncque morbo inprimis prospiciendum. Si à læsione aliquâ graui ventriculi aut partium vicinarū proficiscatur, summè periculosus, tuncq; vel contusioni vel vulneri quoque remedia erunt accommodanda. In quacunq; autem causâ, habitâ primùm illius ratione, si sanguis magnâ copiâ euomatur, influxum hunc illius in ventriculum potius quàm vomitum sistere internis externisque præfidiis oportet, & simul ne concreta illius aliqua portio in eo hæreat, vnde postea grauius quoque superueniunt symptomata, sanguinem dissoluentibus, quæ tamen illius fluxum quoque impediunt, exhibitis auertere. Quod sequentibus modis præstatur.

Sanguinis è vena secta emissio, parum à meseraicis, vnde sanguis in ventriculum & intestina influit, reuellere potest. Tamen in corpore plethorico, vel si affectus qui causa est huius vomitionis, id requirat, per venam conuenientem sanguinis portionem aliquâ educendo, reuellere oportet. Et si menstrua suppressa sint, illud potius in pede erit faciendum:

Per cucurbitulas affixas, in hypochondriis, vel sub vetriculi regione ventre, vel in menstruorum defectu in coxis, reuulsio hæc sanguinis quoque perficitur.

Vti & per ligaturas, extremitatum illarumque & inprimis femoris frictiones.

Purgantia hîc minimè nisi morbus illa requirat, nec tunc tamen vehementiora, naturam sollicitantia, locum habent. Concretum tamen sanguinis causâ, Rhubarbarum exhibitum valde proderit, nec tamen fluxio-

Vomitio
nis san-
guinea
curatio.

nem augebit. Quo nomine & Syrupus Rosarum conceditur.

Clysmata, si sanguis quoque per aluum reddatur, & sanguinis vomitui copuletur, qui tunc forè concretus & ater est, iniecta ad eum abstergendum, & demum quoque ad oscula venarum constringenda, locum habent, illis quæ in dysenteria proponuntur non absimilia. Si sanguinis grumi in intestinis hæreant, Posca infusa eos dissolvit.

Detur per os Amylatum, Oryzatum, Hordeatum, cum Iure glutinoso vel Lacte coctum.

Albumen oui crudum, mucagines seminis Cydoniorum & Gummi tragach. extractæ cum aqua Rosarum, Plantaginis, bene conquassata, dentur per se vel cum paucio Saccharo penidiato vel rosaceo, vel cum Syrupis sequentibus.

Succi Plantaginis, Bursæ pastoris, Polygoni maris, Caudæ equinæ, aut Fructuum austeriorum adstringentium in vomitu bilioso explicatorum, per se, vel addito Saccharo penidiato aut rosaceo, dantur, vel cum Vino rubro stiptico, vel addito paucio Aceto rosaceo.

Vel fiat Syrupus ex succis prædictis, coquendo aliquos cum Saccharo, vel in horum defectu herbas ipsas, quibus addi possunt Ros. rub. p. j. Balauft. 3. 8. Santali rubri 3. j. fiat decoctio in aqua Ferrata, additoque paucio Aceto & cum Saccharo coquatur in formam Syrupi: De quo sumat.

Vsitati Syrupi conveniunt, Myrtinus, Cydoniorum, de Rosis siccis, de Berberis, Omphacinus seu de Agresta, de Plantagine, de Portulaca. Syrupus acetosus, cum grumoso sanguinem dissolvere volumus.

Aqua Plantaginis data sanguinem sistit: Aqua Nucum concretum dissolvit.

Aquam bibant chalybeatam, in cuius Mensur. j. 8. coquatur Mastiches 3. j. Corallorum alborum 3. 8. CrySTALLI triti vel Iaspidis 3. ij. Posca bibita sanguinem coagulatum dissolvit.

Pulvis: R. Lapid. Hæmatitis 3. ij. Coralli rub. 3. j. 8. Terræ rubr. pinguis, Acaciæ an. 3. j. Gummi Arabic. vel Tragach. parum tosti 3. 8. fiat pulvis. Cui addi potest radic. Bistortæ,

Balauft. foliorum Equiseti an. 3. 8. Si feminis Hyosquiami quoque 3. 8. addatur, vtilissimus erit: Capiat 3. j. per se vel cum Vino rubro stiptico. Vel addita Sacchari rosac. æquâ portione: Dentur 3. ij. Vel cum Saccharo cocto in aqua Plantagin. fiant tabulæ.

Ad sanguinem grumoso dissolvendum, damus Succinum, Asphaltū id est Bitumen verum, vel Mumiam, Coagulum hœdi, &c.

Pulveres vsitati cōtinentes sunt trochiscorum de Succino, de Terra Lemnia, qui præterquam quod sanguinis fluorem, sistūt, simul etiam propter succinum eundem coagulatum dissolvunt, quod ambas compositiones subintrat: conveniunt & trochisci de Antispodio cum semine Acetosæ, in hoc casu. Qui & quia Papaver recipiunt, efficacius operantur, & ea formâ & mensurâ, ut prædictus pulvis exhiberi possunt.

Electuarium vtile: R. conferu. rad. Consolidæ maior. & Rosarum antiqu. cond. Cydoniorum an. 3. j. trochisc. de Succino vel de terra Lemnia vel de Pulvere præscripto 3. ij. & si vires deficiant pulveris elect. Diamarg. frig. vel de Gemmis 3. 8. cum Syrupo Cydoniorum, fiat electuarium, vel cum Saccharo rosato tabul. mixtura, instar castanæ magnitudinis sumenda: Aquamque aliquam prædictarum herbarū, quarum succos convenire diximus, superbibendo.

Philonium Persicum 3. j. quantitate exhibitum, valde hîc probatur. Cui Rhabarbari 3. 8. additâ, ut concretum sanguinem simul dissolvat, & euacuet, efficit.

Extrinfecus Epithema & Fœtus in vomitu bilioso descripta hîc quoque inuabunt. Vti & inunctiones vnguenta & emplastra illic proposita.

Vel hisce vrantur: R. olei Myrtini vel Myrtillorum, Cydoniorum an. 3. ij. 8. succi Plantag. vel alterius succi superscripti 3. j. 8. Aceti rosac. 3. j. coquantur. ad succorum consumpt. adde Acaciæ, Hypocistid an. 3. j. fiat vnguentum, vel addêdo Mastiches 3. 8. Boli 3. ij. Balauftiorum, Malicorij, Gallarum, Summach ana 3. j. Ceræ q. s. fiat ceratum, vel cum Resina pini fiat emplastrum.

DE M I C T I O N E.

CAPVT X.

Genera.

*Mictio
præternatu-
ralis.*



MICTIO per quam vrina in masculis per ductū & foramen virgæ, in foeminis per meatum vrinæ naturaliter emittitur, tunc præternaturalis fit, cum inuoluntaria vel immoderata, aut frequens sed pauca existit; vel in ea, vrina turbulenta aut cruenta aliòve modo tincta permistaque redditur: vel si per aliam viam quàm quæ illi destinata, effluat.

*Mictio
inuolun-
taria.*

Inuoluntaria mictio, est in qua citra voluntatem vrina sponte profluit. Atq; hoc interdum sine sensu, in Apoplecticis, Paralyticis, Animo deficientibus fit: Et in quibusdam, quibus lapis è vesica extractus, remanens est vitium.

*Vrinam
contine-
tia, cor-
qui lectu
comar-
gunt.*

Est & alia inuoluntaria mictio, quæ dormientibus, lectum commingētibus accidit. In infantibus præsertim, si in illis hoc vitium, tum maximè cum adulescentes facti illud cognoscunt, & cauere deberent, perseveret, turpe. Turpius verò est, si ætate aliquoufque progressis vel prouectis, accidat, Vrinæque incontinētia dici potest.

*Mictio
immoder-
ata.*

Immoderata mictio dicitur, quando copiosius aut frequētius seu intempestiuè mingunt; qualis Bibonibus consueta est, qui cum se vino replerunt, à conuiuio mox coguntur surgere, vrinamque copiosè reddere. Quod vitiosum esse meritò, præsertim in illis quorum existimationi non parum inde detrahitur, ij censent, qui ebrietatem probro, vt reuera est, dandam; & multa pocula exhaurire, summè ignominiosum esse arbitrantur.

Est & alia intempestiua frequens eiusmodi mictio, quæ non post largam potationem, sed alioquin quàm par erat ad illius excretionem sollicitat: cuius causâ diutius in conuentibus moram trahere nequeunt, sed vrinæ reddendæ causâ secedere coguntur.

Præsertim verò ea immodica & copiosa mictio existit, quando plus quàm biberunt

& humidi comederunt, mingunt. Quod in sanis adhuc quos Vriticos vocant, obseruatur, si citra alium affectum eueniat; aut in morborum crisi vel declinatione, cum vtile potius tunc quàm noxium sit, præternaturale idèò nondum existens, nisi perseveras supramodum, vires deiciat, quæ facile ab eiusmodi excretionē admodumque labascunt.

Alia in affectu quem Diabeten vocant, sed rarissimè contingit, immoderata & copiosa mictio, in qua quæ bibuntur parum aut nihil immutata iterum egeruntur, sitisque inexplebilis ægrum diuexat, vnde Diplosacū eum vocarunt, corpusque admodum calet, & sensim cōsumitur atq; labefactatur.

*Diabe-
tes.
Diplosa-
cus.*

Frequens sed pauca alia occurrit mictio, in qua vrina guttatim seu stillatim emanat, vnde & Stillicidium vrinæ, Stranguria dicitur. Quæ aliquando sine dolore perficitur, de qua in mictionis defectu egimus.

*Stillici-
diū vri-
næ.
Strangu-
ria.*

Cum dolore ardente hæc frequentius molestat, qui cum vrina emittitur, sentitur, vnde Ardorem vrinæ vocant, nos Mictionem ardentem appellamus vel Dysuriam, quod vocabulum mictioni cum dolore coniunctæ, vt dysenteria deiectioni simili quæ per aluum fit, rectius quàm huic quæ diminuta est, accommodatur. In hoc affectu ardor quamdiu vrina guttatim extillat, excruciat: aliàs verò si vrina paulò vberius procedat, citra finem mictionis primùm incipit. Sed & peractâ mictione aliquandiu perseverat, & ad nouam mictionem vehementer rursus impellit, tantumque conatum excitat, vt & horrores sudoresque commoueat. Intolerabilis sanè cruciatus, qui in masculis circa virgæ anteriora, & glandem potissimùm considerare putatur: quæ tunc etiam frigida admodum esse contactu deprehenditur, vnde hunc affectum Germani Kastenreiz, hoc est, frigidam vrinam vel mictionem, quæ tamen ardens est, appellant. Foeminis verò pudendi superiora, ubi meatus vrinarius prodit, maximè ab eo instantur.

*Mictio
ardens.
Vrinæ
ardor.
Dysu-
ria.*

Talis dysuria aliàs citra alios morbos commites, & iuuenes & senes diuexat; Breuisque est quandoque affectus, si assumptorum quorundam

rundam causâ, aut alijs de causis non perfectantibus, ut in causis dicitur, eueniat: Aliàs diuturnus longo tempore affligens, cum quo impuritatis corporis notæ aliquæ concurrunt.

Cum alijs morbis illorumque accidentibus ardens hæc mictio aliquando copulatur; Veluti Turbulenta mictione, in qua purulenta vel mucosa aut lactea quædam materia, cum vrina excernitur, In Renū & potissimum Vesicæ affectibus, nonnunquam & aliarum partium: Vti & cum Puris citra mictionem excretionem, in Vesicæ & Penis exulceratione; Vel fluore seminis inuoluntario in Gonorrhœâ, maximè eâ, quæ virulenta existit. Sicuti in illis excretionibus ostendimus.

Interdum à calculo vesicæ prodeuntia symptomata, dysuriam hanc comitantur, qualia sunt, Pruritus circa pudenda, Virgæ in viris tensio, Ponderis & grauitatis supra podicem sensus, cui digito immisso calculū in vesica esse deprehenditur, Adest & conatus deijciendi, Vrinaque cruda, sabulosa interdum, aliàs etiam parum cruenta, illiusque omnimoda quandoque suppressio.

Mictio turbulenta: Mictio purulenta. Turbulenta mictio sæpè variis modis se offert. Aliàs enim purulenta est, pureque referta vrina: Quod cum aliquandiu in vase vrina steterit, in fundo pulvis instar subsidet, atque agitata, iterum cum ea confunditur, & vbi rursus quieuerit, denuò fundum petit. Estque nunc materia hæc alba inodora, aliàs nonnihil virosa vrinam graueolentem reddens. Interdum & loco puris filamenta quædam alba in eiusmodi vrina innatant. Talis mictio in renum exulceratione, vel aliâ in illis factâ suppuratione, vti in causis dicitur, aliàs nullo cum ardoris inter mingendum sensu occurrit, sed saltem cum grauedine aliquâ vel dolore nephritico, circa renum regionem: aliàs verò ardens mictio huic comes est.

Aliam purulentam mictionem eiusmodi, in Hepatis abscessu contingere posse, docet, quod tamen rarum est, vti & rarissimum, quod in Pleuritide aut Peripneumonia vel Empyemate, sicuti quoque creditur, id eueniat.

Alia turbulenta frequenter quoque se offert Mucosa mictio, in qua mucus quidam crassus, tenax cum vrina egeritur, qui fundo matulæ se affigens, pertinaciter illi adhæret, ab ea, cum vrina effunditur, glutinis instar dependet, in Vesicæ exulceratione, tuncque illius alia accidentia, inter quæ mictio ardens existit, simul concurrunt. Sed & mucus eiusmodi, citra vrinam è pene interdum progreditur. Sicuti in ea excretionem quæ per penem fit citra mictionem explicabitur.

Est & alia mictio turbulenta, in qua vrina *Mictio lactea.* veluti lactea mingitur, posteaque materia quædam alba in fundo illius copiosa interdum subsidet, rursusque postquâ vrina commota fuerit, vti de pure dictum, illi confunditur. Talem vrinam turbulentâ, longo tempore, aliquando continuatis aliàs interpolatis diebus, sed certis tantum diei horis, maximèque sub vesperam, post exercitationem corporis aliquando reddi, tum in meipso, tum alijs obseruavi. Idque citra alia grauiora accidentia, nisi quod Ardor inter mingendum quoque circa finem illius, conatusque ille eam iterum emittendi, vrgebat.

Cruenta mictio quandoque se offert, Vrinaque colore rubro sanguineo tincta apparet, diciturque Sanguinis mictus. In quo, vbi quieuerit, circa fundum vasis residentia crassa, mox nigricans subsidet. *Mictio cruenta.*

Talis in Calculo renum, cum alijs illius accidentibus, ut doloribus nephriticis, frequentius se manifestat, vrinaque tunc post exquitationes aut exercitia, motusque corporis validiores, sanguinolenta redditur. In calculo itidem vesicæ hoc sed rarius contingit. Quod & si exulceratio simul in his locis cum calculo concurrat, fieri potest, ut cruenta & purulenta simul vrina reddatur.

Plerumque etiam vrina cruenta fit, sed leuiter saltem, nec diu sic permanet, in illis quibus catheter in vesicam usque adigitur.

Aliàs quoque illi, qui ictum vel casum sustinuerunt, post illa sanguinem mingunt.

Nonnunquam & hisce qui aliquid quod mictum sanguinis mouere potest assumpserunt, veluti Cantharides aliæ, idem accidit.

Rarius cruenta mictio aliter euenit: In morbis tamen quibusdam vt febribus, critice hoc interdum contingit: Et in febre pestilentiali, puellam sanguine puro per mictionem matulas impleuisse, paulò ante obitum vidimus.

Citra morbum etiam, illiusque aliqua manifesta indicia, sanguinem copiose aliquando emictum fuisse, similiter obseruatum fuit. Sicuti in causis horum, quo pacto & vnde tam hæ quàm aliæ cruentæ mictionis species procedant, ostendimus.

Vrina tincta præternaturaliter vel permixta. Ad mictionem præternaturalem, etiam alia varia huius genera referri possunt. Veluti hæc in quibus vrina tincta alieno colore, aliaque materiâ præter iam dictam vti contentis variis, item arenulis sabuloque mista & perfusa est: quæ vrinarum mutatio & commictio vel morbos imminentes præcedit, vel præsentis comitatur. In quibus & cum eiusmodi vrinarum mictiones expositæ sint, non necesse est hinc eadem repetere, præsertim cum harum causâ nihil sigillatim instituat, sed morbo sanato, vrinæ quoque rursum ad naturalem statum redeant.

Vrina stercore, ossiculis mensibus permixta reddita. Huc & referri potest, mictio illa penitus aliena, in qua cum vrina stercore excernitur: qualem in secum alui deiectione præternaturali descripsimus; Vel ossicula aliæ assumpta, sicuti huius casus in excretionem præternaturali eorum quæ assumpta sunt mentionem fecimus. Vel menses per vias vrinæ cum ea confusæ egeruntur: sicuti in illorum præternaturali fluore fieri posse ostendimus.

Vrina per vulnus effluis. Per viam aliam quàm eam, quæ vrinæ per meatum vesicæ destinata est, vrina quandoque omnino præternaturaliter effluit, è vulnere nimirum, vti iuxta perinæum in lithotymia, tamdiu donec vulnus iterum coalescat. Dein & in alia vesicæ regione, circa abdominis & lumborum humiliorem sedem, idem fieri potest, vt è vulnere illis in locis facto, vrina profluat. Sicuti iuxta inguina, alicui vniversam vrinam, nec per aliam viam, iam multis annis profluere vidimus.

Causa.

CAUSA omnis mictionis præternaturalis, qualis est inuoluntaria, immoderata,

frequens sed pauca, turbulenta, cruenta, aliove modo tincta vel confusa & permixta; dependet vel ex Consuetudine prauâ, vel Affectu aliquo renum aut vesicæ proprio, qualis est constitutio quædam horum peculiaris, vel calidior aut imbecillior, vel intemperies frigida, calida; vel irritatio aut soluta continuitas vel contiguitas; Vel proficiscitur ab affectu per consensum vesicæ; Vel ab affectu alterius quàm renum & vesicæ partis originem trahit.

Ex consuetudine mala, mictio frequens & intempestiua quandoque nascitur; Si vrinam inordinate reddere assuescant. Cum enim in excretionibus alui & mictione, natura, in illis qui in viuendi ratione non peccant, suum seruet ordinem, certoque ad hæc obeunda inuitet tempore, si ordo hic illius anticipando, vel cunctando sæpius peruertatur, tandem ex consuetudine hac peruersa exsurgit, vt ad mictionem antetempus conueniens impellantur. Ob quam & causam infantes, si noctu dormientes, lectum commingere sæpius in eo delinquendo assuescant, inuoluntariam hanc & intempestiuam mictionem tandem sibi familiarem reddunt. Quod & adultis quibusdam, ob eandem causam euenit, turpeque in illis est vitium.

Ob constitutionem quandam peculiarem renum & vesicæ, mictionum quædam exsurgunt genera. Qualis est, si sensum exquisitum admodum vesicæ à natura adepta, ab vrina citius & antequam mediocris illius quantitas colligatur, stimulum sentiens, ad mictionem sollicitetur, vnde intempestiua oritur mictio. Quæ & causa fortè est in infantibus, quod frequentius mingant, nocteque, nisi vt vrinam reddant excitentur, in lectum vrinam emittant. Verùm & exquisitus ille vesicæ sensus, si vrina acrimoniam maiorem consequatur, non solum vt tanto frequentius eam reddant, efficiet, sed & occasionem præbebit, vt eò citius mictio ardens ab vrina acri, sicuti in hac illius causa diceretur, eueniat.

Calidior renum constitutio nondum præternaturalis, sed à natura quibusdam insita, vt plus cæteris sæpiusque mingant, causam

*Mictio
frequentior
causa.*

aliquam adferre poterit, cum ad segregationem citius absolvendam calor, ut omnes operationes accelerat, iuvat.

*Renum &
Vesicae
imbecillitas.
causa.
Mictio
nisi frequen-
tia.*

Quod & imbecillior renum constitutio, similiter efficere potest, cum facultate tunc retentrice debilitata, serum citius quam oportebat, praeterlabatur.

Quae imbecillitas illis ab ortu nonnunquam contingit, ob caloris debilitatem, aut substantiae vasorumque illorum, laxitatem nimiam & molliorem. Alias vero postea primum ob crebram mictionem, à potatione frequenti progressam, accedit, vel ab immoderata Venere, quae hasce sedes debilitat, prodit.

Vesicae quoque imbecillitatem inde natam, quod mollior aut laxior sit, mictioni frequentiori occasionem praebere, aliqui docent. Quae tamen potius, si nimium ampliata tenuiorque existat, illud efficit, quod ab ortu quibusdam potest accidere, alias vero ob longiorem urinae retentionem, in diu durantibus conuiuiorum, vel aliis conuentibus, si saepe hoc continent.

*Renum &
Vesicae
frigida
intemperies,
causa
Mictio
frequentior.*

Ab intemperie frigida renum & vesicae, si facultas ipsorum retentrix labefactetur, mictio quoque frequentior reddi potest. Quae à frigore externo regionem horum admodum impetente, proficiscitur. Quam ob causam, & pedum frigus vehemens, per consensum hasce sedes quoque afficiens, & ad eas usque perueniens, mictionem accelerat.

A calida intemperie renum Diabete proficisci plerique autumant; quod tamen cum rarissimus sit affectus, renum vero intemperies calida saepe eueniat, nec tamen mictio adeo immodica inde sequatur, non fieri satis demonstrare videtur. Et quod si renes summopere incalescant vel inflammantur, mictio minimè augeatur, sed potius minuat, vel etiam supprimatur & per hanc illarum intemperiem, vis attractrix potius destruat, quam intendatur: Dein & licet sitis, calor totius corporis illiusque consumptio, mictioni huic crebrae copulentur, tamen nec quidem haec eam à renum calore proficisci, comprobant. Cum sitis ob omnem serè per hanc continuam mictionem humorem exhaustum, possit accidere, & calor totius corporis à calore solo renum, nisi in-

flammatio adsit, unde potius eam mictionem minui ostendimus, non possit accendi, multoque minus consumi. Quapropter aliam potius diabetis causam esse, eamque ut infrequens affectus est, ita quoque raro se offerentem, mox ostendimus: Mictionem tamen accelerari aliquo pacto à renum intemperie calida, si feri adsit quantitas, eo modo, sicuti etiam à constitutione ipsorum calidior fieri diximus, libenter concedimus, at verò insuetam illam & profusam inde proficisci inciamur.

Verum Ardens mictio potius à caliditate hac renum prodit, vel ab ea augetur. Vt ex inflammatione renum accidere in eo affectu ostensum fuit, in quo urina à renum calore feruidior reddita, inter mingendum ardorem parit. Quod & citra inflammationem ab intemperie simplici hac fieri potest, vix tamen nisi iam prius urina calorem & acrimoniam ab aliis causis adepta ulteriorem calorem à renibus concipiens, amplius dum redditur, vrat.

Ab irritatione renum & vesicae, ad excretionem urinae facultatem ipsorum expultricem impellente, diuersa mictionum praeternaturalium procedunt genera; quae irritatio nunc ab urina, nunc ab alia materia aliqua, nunc à semine, nunc à calculo proficiscitur.

Ab urinae quantitate nimia, vesicam implete & ad excretionem stimulant, copiosa exurgit mictio: Idque ob eorum quae materiam sero unde urina prodit, praebent, nimium usum, potiusque imprimis ingurgitationem.

A potatione larga plerumque euenit, ut ea quae bibuntur nihil aut parum immutata, vel saltem cruda adhuc, nec in sero verum, sanguini deducendo accommodum, transmutata, & nihilominus per venas ad renes, moxque in vesicam transeuntia, copiose mingantur. Cum potus ingesti tanta copia, tantum diu donec mutationem decentem humorumque permissionem accipiat, nequeat subsistere, sed imperfecte elaboratus praeterlabatur.

Si quoque feri magna quantitas, quae in venis delituit, per hanc viam à natura subito euacuetur, immodica etiam mictio inde

*Renum
calida
intemperies,
causa
Mictio
nisi ar-
dens.*

*Renum &
Vesicae
irritatio,
causa
Mictio
nisi praeternaturalis.*

*Urinae
copiosa
causa
Mictio
nisi copiosa.*

*Potatio
nimia,
causa
Mictio
nisi immodica.*

*Seri co-
pia, cau-
sa
Mictio.*

immoderata, & Diabetis.

prodire potest. Sicuti in corporum quorundam superfluitatibus potest accidere: Et in morbis quibusdam, ut in cachexia vel hydrope aliisque, maximeque in febribus continuis, in quibus causam morbificam criticè vel in intermittentibus in harum declinatione, natura cum sero ad vesicam expellens, copiosam mictionem parit, postquam morbus aliquando soluitur.

Quod si verò hoc nimium fiat, naturaque per hanc viam causam morbi, cum sero per urinas adeò profusè euacuet, ut vniuersum ferè serù è corpore exhauriatur, profusa hæc mictio, quam Diabetem vocant, inde fortè prodibit. Vnde iam calor ille totius corporis, fitisque, si præsertim in febre aliqua hoc accadat, tum febris, tum inanitionis huius causà; uti & corporis marcor, maxime si febri aliqua ardens vel colliquatiua dicta adfit, mictioni huic iunguntur. Et quia rarò hoc accidit, ut in febribus adeò immoderata feri fiat per mictionem profusio, sed potiùs moderatior sit criticèque fiat, febrisque per eam uti dictum, solvatur, ideo & rarus hic est affectus, qui non alleviat, sed summè debilitat, & in periculum maius ægrum deducit. Nec mirum, cum tam copiosè subitoq; vrina in hoc casu effundatur, eam crudam minusque ob id tinctam apparere.

Quam rari illius affectus diabetis causam esse potiùs, quam intemperiem renum calidam, à qua sola eum proficisci non posse, in eadem ostendimus, ex prædictis colligimus. Quod & practici aliqui, etsi in causa diabetis explicandà non ita expresse febris meminerint, tamen in prognostico si febre ardenti iungatur, cum eum lethalem esse scribant, frigidaque remedia in curatione adhibeant, innuere videntur: Nosque proin verum diabetem, qualem describunt, in quo subita hæc corporis colliquatio, eum calore & siti intolerabili oritur, febri causoni colliquatiuæ potiùs accidere, huicque colliquationi occasionem aliquam præbere, existimamus, & proin uti febris ipsa, rarum & periculosum illi copulatum symptoma esse. Nisi fortè, si citra febrem diabetes aliquis oriatur, ob copiam potus in venis meseraicis diu retenti & coaceruati, (neq; enim in ven-

triculo aut intestinis tamdiu posset subsistere) posteaque vi naturæ subito ad renes propulsi potiùs quàm attracti id accadat; unde & potus ferè talis qualis assumptus fuerat, parumque aut nihil mutatus, nec in prima concoctione quam effugit, elaboratus, mingitur: Et si tunc corporis adsit calor ac sitis, hæc ob inanitionem potiùs illam magnam, quàm à renum calore prodeit, quippe qui hæc efficere, aut corpus adeò debilitare, uti ostensum, nequiret. Verùm cum potus sic rarò in venis retineatur, etiam hic diabetes infrequens existit.

Ab vrinæ qualitate vesicam admodum irritante, & ad redditionem illius sollicitante, Mictio ardens cum stranguria nascitur: Si præter illi insitam qualitatem, à bile & fæsedine illi innatâ perfectam, quâ vesicam naturaliter ad illius emissionem sollicitat, vteriolem & nimia stimulan- di vim adeptâ, mox ubi ad vesicam, vel paucâ solum quantitate, peruenit, eam irritando, quod eò citius facit, si vesica admodum sit sensibilis, ad excretionem vrgeat, vnde frequenter & stilletim redditur, & in transitu angusto ductus summè sensibilis eum irritans, hæc molestiam inter mingendum cum ardoris sensu efficit. Qui in virga & maxime circa illius summam molestat, cum vrina acris, in angustiam cernicis vesicæ & ductus penem peruenientis, perueniens, illas sedes vrendo dolorem pariat, qui in glande, ubi ductus ille finitur, summusque est sensus, præcipue per-sentitur. Et quia ex dolore immenso membrum collabitur, flaccidumque sanguine & spiritibus refugientibus fit, frigidum quoque & pallidum inde redditur. Vis autem ea stimulan- di nimia in vrina suscitatur, si plus iusto incalescat & inflammetur, tunc enim veluti vrens, ardentem mictionem parit: Vel si vim deterforiam aut erodentem, quâ vesicam vellicat, obineat: Aut acrimonia aliam, ob fæsedinem nimiam quâ imbuta est: Vel aciditatè, quâ non solum etiam stimulat, sed & meatum vrinæ stringendo & exasperando, sic quoque molestiam dum mingitur, gignit.

Verùm non solum ab vrina admodum irritatâ, ardens mictio, sed & cruenta, vix ta-

mi, cau-
sa Mi-
ctionis
cruenta.

men potest exsurgere, cum si talis sit, ad excretionem illius impellens, diutius minimè subsistat. Si tamen non solum stimulet, sed & vim erodentem adepta etiam vesicam erodat, tunc sanguine exsudante cruenta redditur.

Has autem qualitates quibus ardentem mictionem, rarius etiam cruentam efficit, vrina nunc ab assumptis, nunc ab humoribus aliisve excrementis illi permistis desumit.

Ab assumptis vrina hæc vires interdum consequitur, accenditurque per victus ratione nimio vsu vini potentis, aromatum item, olerumque calidorum, vt nasturtij, ceparum, sinapis & similibus. Salsedinem adipiscitur à sale, falsisque cibariis, Aciditatem ab acidis, imprimisque potatione vini acidi, quâ aliqui ardorem vrinæ sibi accersunt: Vel vim Deterforiam vrinæ inditam, tum à prædictis, tum aliis abstergentibus sumptis. Inter quæ & ceruissa, illis, qui eam bibere non sunt assueti: huicque malo obnoxij, detergendo nimium, mictionem quoque acrem nonnihil reddit. A medicamentis potentius adhuc hæc operantibus idem euenire potest: vt catharticis illis assumptis, quæ non solum validè accendunt, sed etiam vrun, veluti est esula, lathyris, colocynthis, quæ vt naturam ad excretionem vi detergente & acri sollicitant, sic & easdem vrinæ imprimentes, vt & illa in vesica operetur, eamque stimulet, efficiunt. Quod & alia alterantia facere possunt: Inter quæ & cantharides adeò vrinam inflammant adurentemque reddunt, vt mictio vehementer ardens inde proveniat. Sed & ab iisdem assumptis, si validius agant, sanguinis sequitur mictus, aliquando & vesicæ exulceratio. Qua ratione & cantharides hæc progignere potius quam proprietate, hoc quod etiam foris applicatæ cutem inflamment & erodant satis demonstrat.

Ab humorum permissione, vrina similes qualitates assumere potest. Vt à bile, vim detergendi validam atque acrimoniam caliditatemque, si illa copiosius ei permisceatur, maximè eâ quæ præternaturalis est & adurens, cum aliquin bilis quæ in folliculo fellis colligi solet, sero perfusa coque diluta,

non adeò possit vrinam acrem reddere, sicuti ictericorum vrinas, etsi admodum bile tinctæ sint, non tamè mictionem ardentem efficere, obseruamus. Cuius bilis coacervationis causæ variæ existunt, tum extra morbos, tum in illis, quorum, ardor vrinæ, quoque est symptoma. Causa verò illius bilis, quæ illud potest efficere, cum sero permissionis indeque cum vrina, in variis aliis ab eadem genitis affectibus, explicata fuit.

A falsis vel acidis aliis humoribus, si præter serum quod tale ab assumptis, vt dictum, redditur, eiusmodi inueniantur, seroque asfatim permisceantur, vrina quoque idem quod ab assumptis eiusmodi concipere diximus, potest assequi.

Ab alia materia vrinæ permistâ, profecta irritatio, mictionis ardentis vel dysuriæ vt & turbulentæ causa esse potest. Veluti à pure non solum eo quod ab exulceratis renibus, de quo in illa causa agemus, procedit, sed & ab aliâ illuuiè in impuris corporibus illic retentâ, caloreque renum excoctâ, & puris instar maturatâ, nascitur, quæ puris genera per vrinam expurgata, interdum acredine suâ ardorem inter mingendum, & purulentam simul mictionem producant, alias verò, illud præsertim quod citra exulcerationem gignitur, citra alia accidentia, nisi quoddam circa renum regionem grauedo interdum quædam sentitur, turbulentam mictionem efficit.

A lactea & alba alia materia, turbulenta quædam mictio, priori huic non adeò assimilis, nisi quod albidior est, cum mingendi ardore incommodans, procedit. Quæ etiam à renibus vt alia provenit, falsa tamen magis existit, quod ex siccata materia, salem album colore & sapore referente deprehendi. Atque à feri salsedine, in illius in renibus segregatione illic congestâ, proficisci, illicque vt aqua falsa solet, excoqui & crassescere, hac obseruatione potui colligere, quod alias vbi terrestre itatem maiorem possidet, in arenulas & calculum renum, vt in illorum generatione ostensum, conuertatur.

A semine in masculis, è loco in quo continebatur commoto, nec dum ei aculato, sed retento, vrante atque irritante, Mictio ardens

Semen
loco mo-
tū, causa
Mictio-
nis ar-
dens

dens interdum suboritur. Cum enim semen ex natura sua, vti & alibi dictum, acre admodum sit, licet in suis vesiculis contineri possit, nec eas, sicuti nec bilis suam vesiculam, vellicando lædat, tamen ex illis prodiens, si in ductu illius per quem ejici debebat, angustio hæreat, cum tunica intrinsecus vix inuestitus nudus existat, mox illum nonnihil erodens, nonnunquam & exulcerans, facit, vt urinam præterlabente, hancque sedem aluente, ardor ille inter mingendum sentiat: sicuti frequenter hoc illis contingit, quibus per imaginationes nocturnas vel diurnas venereas, aut actus illius imperfectos, semen concitatum, è sua sede non spargitur. Quod & ob feminis paucitatem, & virgæ non sufficientem extensionem, in inualidis & senibus maxime solet contingere, vt & illi mictionem ardentem, quam iuvenes non laborarunt, in senio primum experiantur.

Semen corruptum causa mictionis ardentis in gonorrhœa violenta.
A corrupto semine, in Gonorrhœa vitiosa dicta, hoc idem accidit, vt non tantum, quia præternaturalem acrimoniam adeptum est, sicuti in excretionem seminis dictum, elaboratur, sed & in transitu, ductum illius erodat, maximeque si portio subsistens illi adhæreat, mictionemque ardentem pariat.

Calculus vesicæ, causa mictionis ardentis.
A calculo vesicæ, stillicidium urinæ cum mingendi conatu & dolore suboritur, quando ille in vesicæ ceruicem se insinuans, eam irritando molestat, vbi quamdiu eam affligit, frequenter urinam reddere coguntur, & proin parum illius per vices egerunt, qui si magnus sit, grauitatis sensum parit. Eiusmodi calculi à renibus plerumque primum per vteretres in vesicam delabuntur, illicque retenti, ab alluente eos continuo urinam incrementum sumunt, augenturque, sicuti hæc in calculi renum causis in doloribus hypochondriacis descripta sunt, vbi & quo pacto arenulæ & calculi, quæ mictionis quoque præternaturalis illius, in qua hæc cum urina prodeunt, causæ sunt, præcipue in renibus, nonnunquam & in hepate ex sero generantur, abunde ostendimus.

Renis & vesicæ soluta causa mictionis.
A soluta continuitate renum vel vesicæ, Cruenta procedit mictio, vt plurimum, si renum substantia contundatur vel vulneretur.

ta, causa mictionis.
Quod ab ictu aut casu, circa renum regionem factum, potest accidere. Frequentius vero à calculo renibus infixum, illorum substantiam eousque vt cruor inde exfudet, atterente & veluti contundente, tunc enim sanguis sero mox confusus, illud rubore tingens, urinam sanguinolentam reddit, & post emissionem, vbi aliquandiu steterit, ab ea serosum segregans, fundum petit, illicque subsidet: quod & si in vesica diutius retenta urina fuerit, euenire potest, tuncque concretus etiam in mictione, vel post eam redditur. Accidit autem hoc à calculo, quando loco motus egredi nititur, & sic suam duritiam aut inæqualitatem renes confundit. Vel si ille ob compressionem renum regionis, ab externa vi, vel ob motum, per quem hypochondriorum regio admodum torquetur, impulsus, eos intrinsecus conterendo, sanguinem ab illis elicit, qui postea cum urina redditus, plerumque calculum in renibus latere, si præsertim alia quoque illius indicia adsint, nobis significat. Sæpe quoque si vlcus in renibus simul concurrat, calculus illud refricans, facit, vt non solum purulenta, sicuti in vlcere dicetur, sed & cruenta interdum fiat mictio.

In vesica contusio vel ictus, circa sedem illius à vi externa illata, aut vulnus ad vesicam vsque penetrans, cruentam quoque urinam possunt reddere. Quod & leuior illius attritio potest efficere, quæ sit cathetere ad explorandum calculum, vel urinæ suppressæ emissionem, in vesicam vsque intruso, ceruicem illius ductumque inde progressum, circa angustias illius atterente, vnde tincta nonnihil cruore urina interdum, præsertim si prima vice hoc fiat, prodit. A calculo itidem è vesica per ceruicem egredi nitente, hoc idem quandoque euenit, vt sanguinolenta inde reddatur urina.

Vesicæ sphincteris vulnus, causa mictionis inuoluntariæ.
Interdum & inuoluntaria mictio à soluta continuitate vesicæ procedit, vt si sphincter vesicæ, qui urinæ effluxum cohibet, vulneretur; vti in sectione ad calculum è vesica extrahendum, vel dilaceratione colli vesicæ, in mulieribus sæpe euenit, vt licet vulnus sanetur, mictionem tamen ob læsionem hanc musculi, diutius retinere nequeant.

*Vesica
vulnus,
causa
Vrina
per vul-
nus ef-
fluxus.*

A vulnere vesicæ, vrinæ præternaturalis, per viam non destinatam effluxus interdum euenit. Vti non solum in lithotymia, quemadmodum iam dictum, sed & si illi alio modo vulnus maximè per abdomen infligatur, accidit: Sicuti circa inguina è vulnere in sectione sarcocœles causâ susceptâ, læsâ tunc quoque casu vesicâ, cuidam vrinam profluxisse, & iam multis annis, ex eodem loco promanare, nec dum per virgam amplius reddi, in mictionis defectu ostendimus. Dein & iuxta pubis ac lumborû regionem, è vulnere cornu bouis homini inflicto, corpusque illic penetrante, & per vesicam adacto, vrinam similiter vtrinque profluxisse, vidimus.

Quod & in aliis quoque locis, abdomine præsertim, vt inde vrina ex vulnere aliter inflicto, effluat, potest accidere.

*Renum
exulce-
ratio,
causa
Purulen-
ta mi-
ctionis.*

Ab exulceratione renum, purulenta sequitur mictio, cum pus ab illis prodians vrinæ confusum, eam turbidam, & quæ pure subsidente, & ab vrina se segregante, sedimentum purulentum deponit, reddit. Cui & dolor inter mingendum, si pus illud acrimoniam aliquam acquisierit, interdum accedit: aliàs verò nullus vel exiguus. Comitibus etiam aliis quæ ab vlcere renum proficiuntur, accidentibus. Cuius exulcerationis causa, interdum ab inflammatione renum quæ præcessit, vti in ea fuit expositum, procedit.

Aliàs verò & ab iisdem causis, à quibus renum substantiæ continuitatem dissolui, sanguinisque mictum prouenire ostendimus, si læsio hæc non sanetur, sed in vlcus conuertatur.

*Vesica
vulnus,
causa
Mictio-
nis puru-
lenta
mucosa
& ar-
dens.*

A vesicæ vlcere in ceruice illius aut fundo existentis, purulenta quoque mictio nascitur, pure se cum vrina miscente, & cum ea se exonerante. Aliquando verò puris etiam citra mictionem, sicuti in ea excretionem ostendimus, effluxus fit, si præsertim in ceruicis remotiore à vesica sede vlcus fit. Quod pus vrinæ confusum putrescens, ipsiusque vrinæ imbutum odore, eam admodum graueolentem reddit. Aliàs verò mucosum & tenax existens, quale in hisce membranosissimis locis gigni solet, emictum subsidens,

fundo matulæ adhæret, vel cum difficultate vti dictum, egeritur. Hisce ardens mictio, quia exulcerata sedes ab vrina irritatur, plerunque accedit, eoque maior, si pus simul acre existens, similiter hæc loca molester. Prouenit autem hæc vesicæ exulceratio, ab illis quoque illius læsionibus, à quibus cruentam mictionem procedere diximus, si illæ in vlcus abeant.

Ab vlcere ceruicis vesicæ, mictio hæc horrenda, per quam stercus & oscicula cum vrina in quibusdam excreta diximus, quoque prodiit: Quod vlcus vel illic primum à causis enarratis natum incepit, vel foeminis in vteri collo aut recto intestino à causis illic expositis, primò factum, exedendo ferpendoq; sedes has vicinas permeans, & in vtrisque aperturâ viâ factâ, vt quæ in intestino continebantur stercora, vel etiam oscicula, inter transeundum vrinæ permiscerentur, & vice versâ vrina illis, simulque sic confusa, prodirent, effecit. Ob quam exulcerationem in foeminis etiam menses vesicam subire, vrinæque permisceri possunt.

*Vesica
ceruicis
vulcus
causa
mictio-
nis ster-
coris, of-
siculorû
& men-
sium.*

A soluta contiguitate, per anastomosis vel diapedesis vaforum in renibus, cruenta quandoque exsurgit mictio. Quâdo ob sanguinis copiam & impuritatem, in plethora aut morbis inde profectis, natura sanguinè ex vasis emulgentibus, in sinus renum, indeque cum fero per vretes in vesicam expurgat. Vnde sæpè multum sanguinis, citra dolorem aliûmve affectum, quæ se in aliis cruentæ mictionis causis offerunt, mingendo excernunt. Quod licet rarum vti ostensum, in febris nonnunquam criticè per hanc excretionem eas solutas fuisse, obseruatum est. Verisimileq; est, in puella peste correpta, sanguinem ante mortem mingente, naturam veneniv ad illud excutiendum tantopere excitatam fuisse, nec tamen hac via id expellere potuisse.

*Renum
vaforum
anasto-
mosis vel
diapede-
sis, causa
Mictio-
nis cruen-
ta.*

Tenuitas nimia sanguinis & serositas, huius anastomosis vel diapedesis potius vaforum in renibus, Vnde cruenta fit mictio, causa esse poterit, ob quam sanguis antequam à fero in renibus segregetur, cum eo adhuc confusus, vasa penetrans, ad vesicam præterlabitur, vrinamque sanguinolentam, magis

tamen

tamen quàm si purus eò feratus, dilutam reddit.

Renum Ad hæcæ cruentę mictionis causas, à con-
vasorum tinguitate solutâ procedentes, etiam renum
laxitas, imbecillitatem, nimiamque inde vasorum
causa renum laxitatem, referre possumus, vnde
Mictio- tamen mictio frequentior potius, sicuti in
nis cruen- hacillius causa expositum fuit, quàm cruen-
ta. ta procedit, nisi iam enarratis causis, hæc ac-
cedat, illisque vt sanguis citius elabatur, o-
pituletur.

Spiritus Affectu per consensum si vesica laboret,
vitalis de muscutorum qui excretioni illius inseruiūt
fectus vel causâ, inuoluntaria exurgit mictio.
privatio, Sphincteris præcipue occasio, si eius fun-
causa ctio vel aboleatur, vel imminuatur. Quod
Mictio- illi ob defectum spiritus animalis accidit,
nis inuo- tunc enim relaxatus vel resolutus, vt vocât,
luntaria. omnino non potest vel saltem non sufficien-
ter constringi, vrinamque sic quò minùs ef-
fluat, cõtinerere. Qui defectus ob nerui, sphin-
cteris motum communicantis affectum, pro-
cedit, si ille vnâ cum aliis vel totius corpo-
ris, in generali resolutione, vel quibusdam
saltem, à causis in paralyfi expositis, afficia-
tur: quaratione & apoplectici, & paralytici
aliqui, vrinam inuoluntariè profundunt.

Ob spiritus vitalis priuationem omnimo-
dam in syncope graui, vti omnes functiones
tantisper conualescunt, sic & sphincteris a-
ctione cessante, vrina sponte profluit.

Ab do- Abdominis musculis, in conuulsione va-
minis mu- lidâ, vna cum cæteris musculis conuulsis,
sculorum similiter vrinæ effluxus inuoluntarius quan-
conuulsio doq; accedit: cum vrinâ ob constrictionem
causa Mi- hanc muscutorum abdominis, ventrisque
ctionis in- compressionem, ex vesicâ propulsâ, etsi tunc
uolunta- sphincter quoque conuellatur, ampliusque
ria. stringatur, hunc vrinæ impetum cohibere
nequeat.

Viscerum Ab alterius partis quàm renum aut vesti-
interio- cæ affectu, mictio præternaturalis quando-
rum ab- que etiam procedit. Veluti ab hepatis ab-
fectus, cessu in vicus conuerso, pus sero indeque
causa Mi- vrinæ commiseri, purulentamque mictio-
ctionis nem fieri posse, aliqui existimarunt: Vti & à
purulenta. pulmonibus & thorace in pleuritide, ac pe-
ta. ripneumoniâ suppuratis, atq; empyemate,
purulentam illam materiam, per vrinâs quo-

que expurgari: sicuti in eiusmodi affectibus
qui tunc comites erunt ostendimus. Quod
si ab hisce sedibus eò peruenire potest, tunc
etiam ab aliis sedibus internis, abscessu in-
deque vlcere tentatis, pus in vasa remeare,
& sic cum sero ad renes peruenire, vrinæq;
misceri, & cum ea progredi valet.

Viscerum A ventriculi, hepatis, lienis aliarumque
interio- quarundam partium morbis, vel illorum
rum mor- causis, imprimis que in febris, ab horum
bi, causa affectuum intemperie, vel humoribus, vrina
Mictio- colore alieno tincta, vel cum materia incon-
nis vrinæ uenienti permista, mictione eiusmodi præ-
tinctæ ternaturalem producit. Sicuti quo pacto
permiste hoc fiat, in eiusmodi morbis, in quibus vri-
næ tales se offerunt, fuit expositum.

Curatio.

Accommodatur diuersis mictionum ge-
neribus, scilicet mictioni inuoluntariæ,
Immoderatæ, frequenti quam Ardentem
vocamus, Turbulentæ, Cruentæ, & huic
que per Alias vias vrinæ minimè destinatas,
perficitur.

Inuoluntaria mictio, si ob resolutionem
aut virium lapsum in Apoplectis, Paraly-
ticis & Animo deficientibus accidat, cum
grauioris casus potius quàm huius mictio-
nis ratio habeatur, cura illuc dirigenda: Et
si in Paralyfi generali, vel particulari,
vrinam amplius continere nequeant, hocq;
incõmodum perseveret, vnde lectum com-
madefaciendo, sibi noxam ob excoiatione
in cute, quæ inde sequitur, inferunt, non a-
lia cura quàm ea quæ paralyfi debetur, illi-
que fuit exposita, instituitur, Topicaq; tunc
remedia, huius resolutionis causâ, etiam spi-
næ circa lumborum regionem adhibentur,
atque iuxta podicem, vbi ceruix vesicæ, ap-
plicantur, suffitusque eo in loco excipiuntur.
Qualia remedia in paralyfis cura de-
clarata fuerunt.

A vulnere in sphinctere vesicæ, illiusque
cervice post sectionem aut dilacerationem,
pro calculi extractione, facto, si remanserit
vrinæ inuoluntaria mictio, immedicabilis
ferè hæc remanet. In qua tamen aliqua re-
media, in immoderatæ mictionis curâ ex-
ponendâ, quæ vrinam comtemperando,
viasque

viasque nonnihil adstringendo, nimiam mictionem impedire nonnihil possunt, hic quoque tentanda.

Mictio in inuoluntaria illius, in qua dormientes lecturi committunt errorem.
 Quæ somni tempore inuoluntaria mictio accidit, in qua iuniores præsertim, nonnunquam & adulti lectum commingunt, cum ex consuetudine praua sit nata, ab eadem hac diffuescendo emendabitur. Quod fiet, si antequam somnus obrepit, urinam exonerare assuescant, & medio somni tempore, ad eandem reddendam excitentur, idque tamdiu, donec natura assueta, in somno non amplius ad mictionem impellat, sed ea urgente, ut expergescant, efficiat. Qua ratione vitium hoc inde natum, citius quam alia arte emendabitur: Idque maxime si causas alias, quæ insuper accedunt, mictionemque promouent, simul auertant, è quibus larga præsertim tardiusque tempore somni est potatio, à qua sibi cauere debent.

Quod si verò ex imbecillitate quadam, vel ob sensum nimium vesicæ, etiam hæc inuoluntaria mictio dormientibus noctu accidat, tunc multa ex illis, quæ urinæ acrimoniam mitigant, leniunt, crassitientique aliquam illi conciliant, & nonnihil adstringunt, parumque stupefaciunt, in cura immoderatæ mictionis exponenda, hic quoque usurpari poterunt.

Proprietate quadam iuuare creduntur sequentia, costa vel assa comesta, Ericius, Mures, Pulmo hœdi, Cerebrum & Testiculi leporis ac vulpis, Cerebrum item vulturis vel aquilæ, & Adeps perdicis.

Pulueres item, ex sequentibus in furno prius admodum exiccatis, vel etiam in cineres combustis parati, variisque modis exhibiti, ut puluis vel cinis Ericij, Capitis leporis cum pelle vsti, Vesicarum bouis, porci, capræ, ouis, earumque quæ in piscibus inueniuntur, pellicularum Stomachi, gallinæ Gutturis galli, Linguae anseris.

Ad corrigendum aliquo pacto hoc vitium in illis qui in lectos mingentes, eos mæd faciunt, atque sæpe faciend tandem corrumpunt, conueniet, si vesicæ bouis aut tauri inflatæ siccataeque, & alicubi apertæ, virgam noctu ante somnum inferant, sicque eam alligatam in lecto retineat, eaque urinam in-

fluentem inter dormiendum excipiant, quod & alio instrumento apto fieri poterit. Alij spongiam admovent, ut urinam concipiat, quod tamen citra mædactionem aliquam vix efficitur.

Immoderata mictio sic dicta, quando copiosior aut frequentior existit; Si ex mala consuetudine, quam obseruato ordine, sæpius urinam reddendo, acquisiuerunt, ut postea frequentius quam par erat, mingere cogantur: naturam assuescunt; tunc eandem consuetudinem contraria sensim corrigant, nec semper cum mictio urget, naturæ obtemperant, sed differendo aliquandiu, ad naturalem ordinem reducant, sicque huic incommodo molesto & turpi medeantur.

Ob sensum exquisitissimum vesicæ si plus quam par erat ad mictionem impellantur, tunc ut urina minus acris sit, procurandum, & si perseueret nihilominus, sensus nonnihil etiam obtundendus, remediis in ardenti mictione expositis, mitioribus tamen, cum defectus hic non adeo magni sit, uti ille momenti.

Ob constitutionem calidiorem renum, nondum tamen præternaturalem, si plus solito urinam reddant, cum citra detrimentum hoc ferè fiat, correctionem aliam non exigit, quam ut à calidioribus introsumptis, forisque admotis, in viuendi ratione consuetà, sibi temperent, & temperatis vel ad frigiditatem aliquam inclinantibus potius vtantur.

Ab imbecillitate renum à caloris natui aliquo defectu, vel laxitate vasorum in ipsis, aut vesicæ dilatatione, & attenuatione, quæ procedit frequens mictio, si ab ortu eam imbecillitatem hæc partes acquisiuerint, ægrè amplius hæc à teneris assueta sæpius mingendi consuetudo, emendatur, Si verò ea ob potationem crebram, urinæque per vim retentionem, maximeque si sæpe hoc fiat, accidat, tunc causas hæc omittendo, plerumque etiam hæc imbecillitas remittit: Vt & si ob venerem nimiam, renum imbecillitas originem traxerit, si postea sibi ab ea temperent.

Quod si verò nec sic altius hæc impressa debilitas cesset, & quæ inde sequitur mictionis

Mictio in inuoluntaria illius, in qua dormientes lecturi committunt errorem.

nis frequentia, cum ea non adeo, ut verò alia peiora accidentia, quæ inde simul prodeunt, incommodet, ferè negligitur, aliorumq; potius causâ hisce imbecillitatibus prospicitur, iis, quæ & tunc hanc molestiam inde natam emendare possunt.

Ab intemperie frigida renum & vesicæ, à frigore maximeque à pedibus refrigeratis, hisce sedibus contingens mictio frequentior si accadat, cum non diutius duret, negligitur; si verò hisce locis frigida intemperies impressa remanserit, atque sic mictioni incommodet, eadem quæ in paralyfi vesicæ calefacientia remedia competunt, hic quoq; locum habebunt. Vti & si imbecillitas inde nata sit, eodem modo procedendum.

*Mictio-
nis immo-
derata
& copio-
sioris ob
vrinæ co-
piam cu-
ratio.*

Ob vrinæ copiam, à vini nimia ingurgitatione coaceruatam, si copiosa sequatur mictio, cum ea & conferat, & necessariò sequatur, correctione aliâ minimè opus habet, nisi ut, de turpe aliquid comittant, è mensa surgendo, vel inter dormiendum caligas aut lectum contingendo, ab ebrietate abstineant; vel mediis, in nocturna inuoluntaria mictione expositis, hanc quoq; auertant.

*Mictio-
nis copio-
sioris à se-
ri redun-
dantia
curatio.*

Ob seri redundantiam in venis coaceruati, subitoque per hanc excretionem vesicæ euacuati, copiosa mictio superueniens, tum in nondum adhuc ægrotantibus; tum in morbis quibusdam, ut cachexiâ, hydrope, aliisque, cum ad morbum futurum in illis præcauendum, in hisce verò sanandum conferat, nisi immoderata omnino sit, utilis & necessaria salutiferaque existit.

Si verò ob subitam affatimq; hanc & perseveranter factam euacuationem, vires admodum dejiciantur, noxam quoque inferre potest: sicuti enim in asciticis per paracentesin, aperto abdomine, si aqua vnâ vice, tota vel maxima illius pars emittatur, viribus subito lapsis, in periculum veniunt, pari ratione & hic, licet natura per viam ordinariam humores superfluos, euacuet, nimio tamen & confertim factò effluxu, periclitari possunt.

In febribus immodica hæc mictio contingens, si natura causam illarum, in febrium continuarum crisi, atque intermittentium declinatione, expurget, cum febris plerunq;

per hanc euacuationem solvatur, conueniēs atque salutifera existit. Quòd si tamen nimum profusa & perseverans existat, maximeque ea, nondum concoctâ materiâ, nec dum instante adhuc crisi in febribus continuis, & in intermittentibus nondum declinante febre, eueniat, cum tunc de morbi causa parum aut nihil euacuetur, nec proin ægri inde allevientur, sed vires eorum omnino prosterantur, sitis augeatur, corpusque marcescat, diabetes periculosissimus ille affectus suboritur.

In eiusmodi autem copiosioribus mictionibus, per quas causa, quæ morbos producere posset, vel iam produxit, è corpore euacuatur, nihil quod eas impedire possit, molliendum, sed tunc viribus saltem ne labantur, prospiciendum.

In aliis verò profusis & immoderatis mictionibus, vires prostermentibus, vel etiam raro illo affectu Diabete, in quo corpus simul absumitur, sitisque summa exoritur, mox occurrendum. Quapropter tunc feri prouentus impediendus, aliòque deriuatum per alias vias euacuandum, dein illis tenuitas, caliditas atq; acrimonia incrassantibus, refrigerantibus & lenientibus corrigenda, atque viæ per quas fertur, nonnihil adstringendæ arctioresque reddendæ, & ut stimulum minus sentiant, stupefacientibus nonnihil, vesicæ sensus minuendus. Qualia multa eiusmodi quæ illud præstant, in mictionis ardentis cura exponuntur, sequentibusque præsertim perficiuntur. Quæ omnia interim pro ratione morbi comitis, si adhuc ille perseveret, erunt dirigenda, sequenti modo.

*Diabe-
tes cura-
tio.*

Sanguinis missio circa initia in plethoricis è venis deriuando, si morbus non impediat, nonnihil prodesse poterit.

Clysmata refrigerantia leuiterq; adstringentia aliquid præstabunt, addendo & Rhabbarbarum & Myrobalanos in decocto. Sunt qui talia non solum ex decocto, sed & aquis id præstantibus, ut Rosarum, Plantaginis facta, approbent; addendo & glutinosa, ut Albumen oui, & mucagines Psyllij, Cydoniorum vel infus. gûmi Tragach. in aquis conuenientibus factam.

In vitæ regimine, cibo & potu vtantur

parce, & saltem quantum ad vires sustentandas sufficiat: Caueantque ab acidis, falsis & acribus adurentibusque aromatis, quia hæc mictionem promouent.

In quiete maneant, neque decubitu lumborum regionem premendo, renibus calorem inducant.

Purgationes per aluum, deriuando serum à venoso genere ad intestina, sicque vrinæ copiosioris prouerum impediendo, nimiam mictionem compescunt, vnde qui alias purgantur, eo tempore parum mingunt: frequensque mictio, interdum in sanis alioquin, purgationem instituendam esse arguit, vt & in morbis quandoque, non sufficienter corpus purgatum esse ostendit, aut per crism mortificam causam expulsum.

Perficitur hæc leuioribus, si vires iam prosterini incipiant, iisque non nihil adstringentibus exhibitis, vt dando Rhabarbarum, Myrobalan. citrin. syrupum Rosarum ex infusion. quibus & alia adstringentia miscentur, vt syrupi vel decocta aut aquæ ex sequentibus: Qualia in dysenteria etiam describuntur, quæ & hic vsurpari possunt.

Sudores cum serum per habitum corporis exhauriendo, à venis deriuando, vrinamque sic minuendo, paucior mictionem efficiant, similiter possunt competere, eosque ideò mature, si metus sit in morbis, ne nimia oboriatur mictio, antequam vires labantur, promouebimus.

Propriantur incrassantia, adstringentia & refrigerantia varia: Veluti in cibis, quæ præcipue emplastica sunt: Vt Panis, Pulles item variæ, parata ex Tritico vel Amylo & Zeâ, cuiusmodi sunt Halica & Chondros veterum, nostraque varia ex farina illius parata Lacinia. Item ex Hordeo excorticato, quod Hordeum mundum vulgò dicitur, veteres Prisanam vocabant: ex auena nostrum Auenatum aliaque similia. Vti & sunt Oryzata, Amygdalata, variis modis præparata: Lentæ coctæ, Amygdalæ, Auellanae, Castaneæ tostæ, comestæ: Item Caro crassior illiusque partes viscosiores: Oua item, illorumque inprimis albumen: Atque inter olera Lascuca, Endiuia, Buglossum vtrumque, Portulaca, eiusdemque generis varia.

Dein & inter ea quæ bibuntur, conferunt Iuscula ex cerealibus & carnibus dictis facta; Lac omne, Aqua chalybeata, Emulsio seu lac amygdalinum: Vinum crassum & stipticum dilutum aquâ Myrti, Buglossi, aliisque.

Ex Medicatis, dantur syrupi Myrtillorum, Rosarum rubr. sicc. de succo Acetosæ, aliisque similes adstringentes, non tamen calefacientes.

Decoctum fieri poterit tale: R. radic. Consolid. mai. Buglossi vtriusque; ana ʒ. j. foliorum Plantagin. M. ij. florum Cordialium P. j. Balauft. sicc. Myrobalan. citrin. ana ʒ. ʒ. semin. Myrtill. vel Myrti ʒ. j. semin. Plantagin. Lapatij, Portulacæ, Acetosæ ana ʒ. j. decoquantur in Vini rubri stiptici lb. vj. ad consumptionem aliquam: Et de hoc vino bibat æger.

Aqua Plantaginis, Bursæ pastoris assatim bibita, iuuat; & si calor adsit, aliæ refrigerantes exhiberi possunt.

Conditura radicum Symphiti, Myrobalanorum, carnis Cydoniorum & Enule, conferua Rosarum antiqua prodest.

Mucilagines exhibentur seminis Psyllij, Cydoniorum, vel infusio gummi Tragachanti facta cum aqua Rosarum, Plantaginis: Dantur ad ʒ. ʒ. cum Saccharo vel Syrupo conuenienti.

Pulueres sunt, qui exhibentur per se, vel cum Saccharo rosato, aut cum liquoribus supradictis, vel Vino rubro.

Ex Glâdibus solis paratus, admodum est efficax, vel ipsis & Lentibus, simul excorticatis & exiccatis in furno.

Vel sic compositus: R. seminis Coriandri ʒ. ij. foliorum Agrimonie ʒ. j. Rosarum rubr. ʒ. ʒ. Santali rubri, Cinamom. ana ʒ. j. Spicæ nardi ʒ. ʒ. fiat puluis.

Si capulas Glandium, Gallas, Balauftia addas ad ʒ. ʒ. erit magis efficax.

Vel: R. Thuris, Succini ana ʒ. j. ʒ. Myrrhæ ʒ. ij. cinerum Vesicæ vstæ tauri, porci, aut alterius domestici pecoris ʒ. ʒ. fiat puluis.

Alius: R. Myrobalan. citrinarum, osium Dactylorum ana parum vstorum ʒ. ij. granorum Berberis, Rosarum, Granatorum, Myrtillorum vel Myrti ana ʒ. j. sem. Plantagin. Portulac. flor. Rosarum rubr. gummi Tragachanti vel Arabici ana ʒ. ʒ. Acaciæ vel Hypocistidis.

pocistid. Sanguinis draconis ana ʒ. j. fiat pulvis, cui & Spodium & Camphora admisceri poterit.

Vel: ʒ. Coralli rubri & Boli præpar. ana ʒ. j. ʒ. lapid. Hæmatitis ʒ. ʒ. fiat pulvis. Qui per se sumi potest, vel prædictis cum exhibentur quarta pars ejus misceri, ut efficacior illa reddat.

Hiscæ & alia commisceri possunt: Veluti pulveres vel cineres ab animatibus desumpti, proprietate quadam agentes, in involuntaria mictione descripti. Et præter hæc, alia, ut semē Rutæ agrestis, folia Rutæ, Mentæ, Calamētæ, Myrti, Phoenix, Radix Bistortæ, Tormentillæ & Enulæ.

Stupefacientia propinquantur, si admodum vrina irritet: Ex vſitatis imprimis syrupus de Papauere, Philonium Persicum, quod adstrictione simul præditum est, aliaque varia. Theriacam exhibita in diabete, aliqui commendant, & sitim extinguere docent, quod tamen cum calida sit, quo pacto illud faciat, non video, nisi quod narcotica vi iuuare quoque possent.

Foris adhibentur renum regioni refrigerantia, adstringentia, additis quæ eos firmat. Quod præstat inunctio in hepatis & renum inflammatione descripta, quæ ʒ. olei Rosarum, Cydoniorum, &c. cui & oleum Violarum, Nenupharis, succus Lactucæ, Menthæ addi poterit: Item oleum Lumbricorum quod peculiariter mictionem compescere creditur. Dein & semina Plantagin. Portulacæ & Camphoræ.

Conferunt &, quorum illic quoque mentio facta, Unguentum refrigerans renes & Rosaceum: Et ceratum Santalinum quod potentius stringit, ex oleo rosac. santalis, ros. spodio, bolo & camphorâ concinnatum.

Epithema repellens in inflammatione hepatis & renum expositum, in hoc casu quoque vſurpari poterit, uti & subsequens Oxyrhodinum atque Epithema, quod ʒ. aquæ Solani, Lactucæ, &c. Quibus & aqua Acetosæ, & ad robur huic visceri addendum, aqua Absynthij admisceri poterunt. Vti & Bolus, similiaque adstringentia, sicut & Spica.

Fotus renum regionis, vel Inſessio eouſ-

que pertingens, fit ex decocto Plantagin. Bursæ pastoris, Tapſi barbati, Violariæ, Maluæ, Nymphææ, Vitis foliorum, Rosarum, Balaustiorum, cortic. Granatorum, granorum Sumach, Berberis, Myrtillorum, Rosarum similibumque.

Cataplasmata ex iisdem decoctis & contusis fieri possunt, additâ farinâ Hordei, atque Oleis quibusdam supradictis. Lumbricæ terrestres contusi additi, à quibusdam probantur.

Ardens mictio, quæ Ardor vrinæ, cōmuniter & Dysuria & Stranguria, cum dolore, ad differentiam similiter appellatorum affectuum, qui sine eo in mictionis defectu fuerunt recensiti, dicitur, si ab irritatione facta in ceruicæ vesicæ, aut penis ductu procedat, facilius sanabitur; si verò ab exulceratione in virgæ ductu fiat, difficilior. Si ab vlcere vesicæ illiusve ceruicis, omnium difficillimè, cum nisi hæc prius sanentur, quod vel vix fieri vel nunquam potest, ardens hæc mictio minimè cesset: Si à calculo hæc procedat, non nisi eo sublato remittet. Quod si plures illius concurrant causæ, & ab vlcere & vrina simul oriatur, tanto deterius malū, eoque magis, si hisce etiam accedat calculus, illeque nequeat auferri.

Curationem quod attinet, hanc primum huic ardenti mictioni, quæ ab irritatione tantum proficiscitur, accommodabimus. Quod si verò ab exulceratione procedat, cum tunc turbulenta quoque mictio sequatur, in turbulenta mictione curam vtriusque exponemus, uti & si à penis exulceratione, aut gonorrhœa virulenta, in hisce excretionibus curam exponemus. Et si à calculo ardor ille suboriatur, quo pacto tunc cura instituenda sit, postquam curationem illius quæ ab vrina dependet, absoluerimus, explicabimus.

Itaque si ab vrinæ caliditate seu ardore & acrimonia ardens mictio fiat, quam ab asumptis aut permissione humorum concepit, adjuvante aliquando etiam calore reponendo, tunc curatio perficietur, causam amouendo, vrinæque ardorem & acrem vim corrigendo, & vesicam indeque progressum ductum, ne facile afficiantur, aut ut dolorem

Mictio-
nis arden-
tis cura-
tio.

Mictio-
nis arden-
tis ab vri-
næ ardore & acrimonia
nunc præcedenti
curatione.

minùs sentiant, ab illius muniendo. Quæ omnia variis tum euacuantibus tû alterantibus, intû forisqûe administrantur.

Euacuationis gratiâ exhibentur, quæ aluum, si adstricta sit, aperiant, & dura excrementa emolliant, cum ea per vim excreta, ductus vrinæ iam priùs irritates, premendo offendant, doloremqûe sic augeant. Dein & damus quæ humores per aluum educant, si à bile aliisve humoribus serosis & salsis, vrinæ hæc acrimonia nascatur, vt eos ab vrina diuertamus. Danturqûe leuiora laxantia, cum fortiora cathartica accendendo & irritando, malum potiùs exacerbarent.

Imprimisqûe confert Cassia, quæ & anodynâ quandam in se vim habet; atque ex compositis Diacassia, Diaprunis simpl. Diasebesten.

Valde lenit & laxat electuarium hoc v-fuale: R. Cassiæ recenter extractæ ʒ.ij. Mannæ ʒ.j.β. pulpæ Sebesten & Tamarindorum vel Prunorum dulc. ana ʒ.j. mucilag. feminis Psyllij ʒ.vj. quatuor seminum Frigidorû maiorum mundat. ʒ.β. succi Liquiritiæ ʒ.j. cum Syrup. rosarum solutiuo q. s. fiat electuarium: Detur ad ʒ.j.

Vt biliosis humoribus medicamentum præcipuè accommodetur, vtimur Rhabarbaro, Myrobalanis, syrupo Rosaceo laxat. Violarum, Catholico, & Electuariis lenitiuis distis, cum multa lenientia simul recipiant. Quibus & ad fortiora si necessitas requirat, vt Sennam, addimus, vel alias compositiones, vt Diaprunis solutiu.

Portio sic fit: R. Polypodij ʒ.ij. foliorum Sennæ ʒ.j. Liquiritiæ ʒ.j.β. Passularû mundat. ʒ.j. Prunorum numero x. Iuiubar. Sebesten ana par. x. Hordei p. j. femin. Anisi ʒ.j. fiat decoctio, adde syrup. Rosarum solutiu. ʒ.ij. syrupi Violac. ʒ.j. Capiat aliquot haustibus: Potest & Rhabarbarum hisce infundi.

Clysteres idem præstant iniecti, suntqûe ex decocto Maluæ, Althææ, Violaris, Prunorum, quatuor femin. Frigidor. maior. addendo Cassiam, Mel violaceum, item oleum Violarum, Saccharum rubrum, &c.

Vomitùs, quia bilem à venis meseraicis reuelli, vt minùs vrina acris inde reddatur, conferre in consuetis præsertim potest.

Frictionibus quoque, & Sudore bilem reuelli, ob idqûe conuenire, docent.

Sanguinis missio è poplite, si inflammatio circa inferiores sedes ob dolorem metuatur, quandoque iuuat: Vti & hæmorrhoidum in consuetis fluxus, cum & biliosi inde diuertantur humores.

Alterantia propinantur, quæ refrigerando ardorem vrinæ, renumqûe calorem inde accensum restinguant, & leniendo vias vrinæ, & stuporem inducendo, dolorem mitigent: Qualia varia sunt, quorû aliqua vnum ex illis, alia plura simul præstant.

Lac quoduis bibitum, admodum lenit, & si excoriatio aliqua facta sit ab vrina, eam sanat.

Emulsio lactea plurimùm conducit; quæ fit ex seminibus Frigidis maioribus distis Cucurbitarum, Peponum, Citrullorû, Melonum, Cucumerum, si à recentibus contusis, & cum aqua, vel decocto hordei, aliòve conuenienti, dissolutis, per transcolationem atque expressiorem, cremor albus exprimitur & veluti emulgeatur: vel etiam ex Amygdalis, Pineis, hisce additis, vel separatim ab hisce emulsis. Cum quibus si semen Papaueris albi contundatur, dolor & ardor ampliùs compescetur.

Mucago exprimitur ex seminibus Cydoniorum, Lini, Maluæ. Althææ, per macerationem in aqua conuenienti, vel per decoctionem aliquam, in Decocto aliquo ex enarratis elicita; cuius ʒ.j.β. cum eodem decocto vel iure vel lacte detur. Psyllij mucago valde est efficax: Et infusio gummi Tragachanti dissoluta, similiter exhibita.

Albumen oui, optimè agitaturn, abiectâ spumâ, sæpè sumptum, per se vel cum Saccharo rosaceo tabulato, vel dissolutum: Oleum Amygdalarum dulcium bibitum.

Decoctum per se sumendum, vel cum quo & alia permista dantur, fit ex radice Althææ, foliis Maluæ, fructu Sebesten, seminibus Frigidis maioribus, semin. Papaueris albi, Psyllij vel Cydoniorû, pauciora plurave sumendo, & decoquendo, in Aqua vel Iure, addendo & Saccharum.

Huic vt ad vias vrinæ dirigatur vis, eaqûe faciliùs exeat, addimus interdum Ciceris rubros,

rubros, radicem Glycirrhizæ, semen Alkekengi: & in calidis & biliosis naturis, herbas alias refrigerantes, vt Endiuia, Lactucam, flores Violarum, Buglossi, &c.

Iulepus & Syrupus Violarum, de Portulaca, de Iuiubis aliique refrigerantes profunt.

Aqua item Maluæ, Bismalug, sæpè bibita.

Puluis admodum ardorem vrinæ compescens, sic paratur: R. semen recentium non rancidorum, excorticatum, Cucurbitarum vulgò dictarum, licet pepones sint: quibus & ex reliquis aliqua, si recentia haberi queant, addi possunt, vt Melonum, Cucumerum, Citrullorum & Cucurbitarum lógarum vel lagenatarum ad 3.j. feminis Papaueris albi recétis 3. iij. feminis Hyosquiami albi 3.j. Sacchari penidiati vel Rosarū tabul. 3.j. fiat puluis: Detur 3.j. cum Lacte vel Iusculo, vel Iulepo aut Aqua convenienti.

Vel R. de prædictis seminibus Frigidis maioribus appellatis 3.j. semin. Papaueris albi recét. 3. iij. feminis Lini vel Cydoniorum 3. j. 8. feminis Maluæ vel Altheæ, feminis Hyosquiami albi ana 3.j. feminis Portulacæ Alkekengi ana 3. 8. (quæ fortè vt ad vias vrinæ vires medicamenti penetrent, apponuntur, vti & alij semen Apij addunt) Amyli 3.j. nucleorum Amygdalarum vel Auellanarū, Pinearum vel Fisticorum ad 3. iij. gūmi Tragach. Arabici ana 3. 8. quorum loco gummi Persicorum aut Amygdalarum sumi posset: fiat puluis tenuissimus; cuius vsus, vt prioris erit. Potest & radix Liquiritiæ vel succus illius inspissatus permisceri.

Hisc pulueribus Opium quandoque additur, vbi dolor intēsus id exigit, ad 3. ij. puluerum, Opij 3. 8. diligentissimè miscendo, atque antequam certum illius pondus assignetur, illius efficaciam exhibitione 3.j. huius pulueris experiri oportet.

Necessitate vrgente, dantur & fortiora Narcotica alia, vt Syrupus de Papauere, aliæve in colico dolore & nephritico exposita.

Iniectiones fiunt, quæ ductum vrinarium & vesicam, quæ vrina irritat & vrīt, mitigēt leniendo, & stupefaciendo dolorem sedent.

Ex Lacte mulieris, vel alio etiam fiunt.

Vel ex emulsione quatuor seminum frigidorum Maiorum, vel feminis Papau. albi.

Albumen oui, mucilago sem. Cydoniorum, Lini, optimè agitata & dissoluta cum aquis Violariz, Maluæ, Solani, Cucurbitæ vel Lactæ. Quibus & mucago seminum Maluæ & Altheæ addi potest. Vel quod valde iuuat, semen Hyosquiami aut Papaueris.

Decoctum: R. radic. Altheæ 3.j. foliorum Maluæ M. j. Hordei P. j. seminum frigidorū Maiorum, Minorum, & feminis Papaueris albi ana 3. ij. fiat decoctio in Lactæ. Amplius mulcebit dolorem, si cortic. Mandragoræ 3. 8. incoquatur, vel capita Papaueris aliquot, vel feminis Hyosquiami 3. ij.

Oleum Amygdalarum dulcium recens prodest, & Violarum, aliquoties lotum, si prædictis misceatur iniectionibus. Vel ad sensum minuendum, oleum Mandragoræ, vel expresū ex semine Papaueris aut Hyosquiami.

Quæ olea turundā in illis madefactā, in foramen virgæ immittuntur.

Opium lacti vel iniectionibus prædictis, loco aliorum narcoticorum misceri potest, addendo ad 3. ij. iniectionū, Opij 3. j. vel plus: Additur & interdum oleis, præsertim illis quæ cum turunda imponuntur, tantillum Camphoræ, quandoque & opio admiscet parum Croci.

Infessio in Aqua calida, hunc ardorem admodum compescit: In qua & Malua, Violaria, flores Chamomillæ, Meliloti, aliæque lenientia incoqui possunt. Vel cum ea pectinis & perinæi regio foueri debet.

Immersio saltem virgæ in ea etiam iuuat: Vti & in Lactæ vel Oleis tepidis.

Vel alioquin fouenda virga & calefacienda puluinaribus, pellibus, vel pannis calefactis, illique vicinæ sedes, vti & podex, quod admodū mitigat, cum semper frigeat glans, quamdiu dolor ille vrget, cessetque cum frigus remittit. Proderit & pedes calefacere, cum frigus admodum noceat.

Mingere in profluentem aquam, ad eò vt strepitum edat, profuisse aliquando obseruauimus.

Hepatis & renum epithemata atq; inunctiones, si vrina calida & biliosa sit, eam contemperando proderunt, eoque magis si horum viscerum, renum præsertim quoq; ac-

cedat caliditas; fiuntque eodem modo, uti in horum calida intemperie atque inflammatione ostensum fuit.

Danturque per os similia bibenda assumendaque.

Aspectum solum floris Cardui Lactei, quæ Mariæ vocant, in stranguria profuisse sibi, quidam milites asseruit.

In vitæ regimine, observanda præcipue; ut versetur in aëre temperatiore frigidiorēve; caveat à vehementi æstu, & quæcunque corpus humoresque vehementer possunt accendere, bilemque concitare. Inter quæ & nimius motus corporis atque animi existit. Quo nomine & à cibis atque condimentis admodum calefacientibus, acris & salis, à quibus vrina acuitur, abstineat, & præsertim à vino, vel illud valde lymphatum & parvè bibat: Vel illius loco tū maximè cum dolor virget, decoctum Hordei, aliudve conveniens: vel Syrupos aquâ dilutos, Serūmve lactis. Utatur quandoque cibis, qui simul humorum acrimoniam contemperet, & veluti glutine vias vrinæ obducendo, ut minùs affici queant, efficiant: Veluti glutinosis, ab extremitatibus animalium aliisque desumptis: Item lacticiis pultaceis, ex farinis uti & Amylo paratis: Imprimisque frequenter Cremore hordei, Amygdalis, Auellanis, Pineis, Fisticis & Ovis forbitibus. Conveniunt & alia temperata, ad humores leniendos comesta: ut Poma, Pruna, Iuiubæ, Sebesten: & ex oleribus, Lactuca, Spinachia, Melta, Portulaca, Buglossum, cocta in iusculis, hisque affinia. Pinguia, uti & Butyrum & Oleum hoc idem præstant. Coitus, cum in eo semen, quod naturâ acre esse diximus, per ductum communem feminis & vrinæ transiens eum irriter, nocivus.

*Mictio-
nis arden-
tis à cal-
culo pro-
pelle cu-
ratio.*

À calculo vesicæ, citra exulcerationem illius, de qua in turbulenta, quæ inde etiam prodit, mictione agemus, si ardens mictio suboritur, illeque non diu illic hæserit, sed à renibus primum descenderit, nec adeo magnus adhuc sit, sponte interdum cum vrina progreditur, alias usu medicamentorum propellitur. Quod si verò in vesicam à renibus illapsus retentusque diutius eousque

augeatur, & per additionem adeo increseat, ut vesicæ ceruicis meatum ampliùs permeare nequeat, quotiesque in eum illabitur, ardorem cruciatumque rursus commoveat, tunc ut è vesica, si vnus vel plures sint, auferantur, cura adhibenda; quæ tum medicamentorum usu, quibus tamen non facile cedit, tum manuali operâ, eum per sectionem prius factam extrahendo, quod tamen non sine vitæ sit discrimine, perficitur. Sicuti in calculi vesicæ cura, uti & præcautione, in excretis, ubi in genere de calculis agitur, demonstrabitur.

Turbulenta mictio, quæ & Purulenta dicitur, à pure pultis instar mucoso, in renum & vesicæ exulcerationibus profecta, cum ardente plerunque mictione prodiens, non nisi sanatis eiusmodi vlcerebus, curatur; quod cum ægrè fiat, etiam difficulter inde nata hæc vlcera sanantur, renumque vlcera inueterata sordida facta, puris copiam in mictione augent, sensimque renum substantiam depascentia, illam aliquando penitus absumunt, remanente solâ tunicâ induratâ marsupij instar, quod in vno saltem rene si fiat, æger nihilominus diu superstes manere poterit, alterque ren solus actionem edere. Incurabilia vel curatu saltem pertinacissima sunt & vesicæ vlcera, tum quia ob maiorem vesicæ perpetuum ægrè coalescere possunt, tum quod ab vrina quæ ex sua natura salsa est, continuò irritantur, maximeque si vrina vltiorem acrimoniam adepta sit. Maior tamen sanationis spes, si carnosam ipsius ceruicem possideant, minor si membraneam ipsius sedem occupent, cum harum continuas soluta vix reparari amplius possit, longeque difficilius, si substantiam illius omnino penetrent, nisi fortè ob vicinam carnem, sicuti in vulneribus vesicæ, in causis inuoluntariæ inde prodeuntis mictionis, hoc accidere posse ostendimus, etiam hæc vesicæ læsio ex vlcere facta, per coalitum consolidari queat. Hisce vlcerebus tam in renibus quam vesicâ, si calculus iungatur, cum continuò ea affricando, amplius lædat, nec vlcera nisi ille auferatur, quod fieri non potest, sanari queant, desperatum est malum.

*Renum
exulce-
rationis
curatio.
Vesicæ
exulce-
rationis
curatio.*

Curatio autem vlcerebus renum & vesicæ, cum

cum in multis conueniat, vtrisque simul accommodabitur. Nam eodem modo vlcera hæc exhibitis detergentibus, quæ ea à sordibus abstergant, mox siccatis & glutinantibus, quæ ea sanent, perficitur, miscendo semper ea, quæ acrimoniam vrinæ retundant, eaque augendo, si insignem acrimoniam nata sit, adiiciendo simul ea quæ vias vrinarias leniant, & dolore ardente vrgente, stupesciant, in ardente mictione exposita: Vel interdum necessitate exigente, alternatim nunc his nunc illis vtendum. In vlcerebus vesicæ & ceruicis illius, in hæc loca infunduntur iniectiones idem præstantes. Quod si calculus hisce exulcerationibus copuletur, ijs & ea quæ illum comminuere possunt, permiscenda, sed mitiora, & quæ detergendo potius illud, quam vehementer incidendo, vnde vlcera irritarentur, moliuntur, atque si calculus in vesica fuerit, & fieri possit, fectiōe eximendus, cum quam diu ille perseverat, nulla spes sanationis existat. Sicuti & quo pacto hæc fieri debeant, in calculi cura ostendimus. Sed multa ex illis, quæ in vlcere cura explicabuntur, detergentia, calculo comminuendo quoque sunt aliquo pacto accommodata. Adhæc & viscosa & glutinosa competunt, quæ vlcera veluti glutine oblinendo, acrimoniamque vrinæ mitigando, iuuant, & calculum obducendo, eumque sic læniorem minusque asperum reddendo, vt sic minus infestet, efficiunt. Cæterum in curatione vlcerebus renum & vesicæ hoc pacto procedimus.

Purgantia quod attinet, sufficiet, nisi aliud accedat, si à fæcibus & flatibus intestina interdum expurgentur, cum ab illis retentis aut induratis excrementis malum irritetur, cauendo tamen à fortioribus cathartici, quibus naturam excitando, dolorem potius exacerbaremus, atque interim de vlcere nihil educeremus.

Conueniunt proin & hic eadem laxantia leuiora, in mingendi ardore ab vrina profecto, exposita, cum & hic ardor ille infestet: Præcipueq; Cassia, quæ cum puluere Liquiritiæ exhibetur, alioue modo. Item Manna quæ ad detergendum vlcus utilis, vti & Serulactis, & imprimis Resina laricea vel Te-

rebinthina exhibitæ, cum non solum aluum laxet, sed & vlcus, sicuti mox ostendemus, sanat.

Alterantia quæ ad vlcerebus renum & vesicæ deterfionem, & sanationem, intermissis quæ ardorem mingendi simul compefcunt, propinantur varijs formis, sunt sequentia.

Decoctum in mingendi ardore descriptum etiam hic conueniet, si radix Consolidæ maioris, Agrimonia, Plantago, Ceterach semen Myrtillosum, aliaq; ad vlcerebus sanationem propinari solita, illi permisceantur.

Vel vtatur sæpè hoc decocto: R. rasuræ ligni Gaiaci lb. β. radic. Consolid. maior. ʒ. ij. cortic. Peponium, quos Cucurbitas vocant, siccorum ʒ. j. β. Equiseti M. j. Rosarum rubr. p. j. fiat decoctio in Aqua pluuiiali ad lb. iv. Capiat frequenter haustum, miscendo Mel vel Saccharum rosatum aut syrupum Myrtillosum, &c.

Succi prædictarum plantarum per se, vel in syrupos redacti, alioue modo præparati, vtiliter exhibentur.

Aquæ item Caudæ equinæ, Plantaginis, Myrti, &c.

Lac bibitum, vti detergendo, glutinando & leniendo, in vlcerebus pulmonum præcipue conuenit, sic hic maxime, cum illud adrenes & vesicam viribus suis melius peruenire queat, in illorum vlcerebus sanandis proderit, atque insuper ardorem mingendi mulcebit: Eligiq; atq; administrari, sicuti in phthisis cura ostendimus, hic quoque poterit.

Resina laricea, abietina, & terebinthina vtilissimè exhibetur, cum non solum vlcera detergat, sed & lentore glutinet: cuius vires ad vesicam vsque peruenire, vrinæ odor violaceus inde redditus, satis demonstrat: Daturq; per se ʒ. j. quantitate vel maiore, si aluum laxare simul velimus: Vel in pilulas, cum radic. Liquiritiæ, Saccharo cando aliisque pulueribus conuenientibus formata: Admodum operatur, si cum Vitello oui & Melle dissoluta, Vinoq; & Aquâ bibatur.

Pulueres præcipue ad sanationem vlcerebus renum & vesicæ exhibentur, qui cum diu asseruari debent, infusione gummi Tragachanti factâ in aqua Rosarum aut aliâ in trochis-

trochiscos rediguntur & siccantur. Qui cum illis vti volumus, rursus puluerisantur: Daturq; eiusmodi pulueres per se 3 j. vel si Saccharum addatur, maiori pondere, cum Lacte, vel Hydromelite, vel alio liquore, manè ieiunis, vel noctu cubitum ituris, si præsertim narcotica recipiant, vt superdormiant, præcedenti cœnâ horis quatuor prius eaque leui.

Possent & hi pulueres excipi resinâ Lari gnâ vel Abiegnâ; Et sic in forma boli vel pilularum sumi.

Vsitati in hanc rem sunt trochisci Alkekengi à pharmacopœis allati, qui: R. semina folani vesicarij, halicacabi & alkekengi dicti, femin. frigida quatuor minora, hyosquiami, apij, papaueris, amygdalas, pineas, fisticos, hordeû, liquiritiam, rosas, gummi tragach. arabicum, myrrham, bolum, spodium, saccharum candum, penidiatum & hydromel.

Alij ob sanationem horum vlcerum maxime directi, doloremq; acrem qui intermingendum affligit mulcendum, sic parari queunt.

Primus: R. pulueres ardorem vrine compescentes, in frequenti & ardente mictione descriptos, addendo radic. Consolidæ maior. 3 j. Rosarum rubrarum, Succini, Thuris ana 3 ij. Boli rubri vel alterius Terræ pinguis, quas sigillare solent 3 j. Sanguinis draconis, Spodij ana 3 β. fiat puluis: Detur vti dictum.

Alter ex multis compositus, summeq; efficax: R. nucleorum seu medullæ sequentium seminum & fructuum excorticat. nimirum Amygdalarum dulc. Auellandarum, Pistaciorum, Pinearum ana 3 β. Amygdal. amar. Persicorum, Ceraforum ana 3 ij. Castanearum, Glandium, Peponum, Cucub. dictarum ana 3 β. Melonum 3 ij. Hordei, Oryzæ ana 3 iij. radicum Consolid. 3 ij. radic. Glycyrrhizæ 3 β. Rosarum rubr. vel Balauft. feminis Portulacæ, Lactucæ, Endiuizæ, Psyllij, Lini, Gossipij, Cydoniorum, Maluæ vel Altheæ, Myrti, Coriandri, Alkekengi, Anisi. Apij veri Petrofelini dicti ana 3 j. femin. Papau. albi 3 β. femin. Hyosquiami 3 ij. ossa Datylorum num. v. gummi Ceraforum, Prunorum ana 3 ij. gummi Arabici, Tragachanti

ana 3 j. lachrymæ Laricæ vel Abietenæ coctæ donec induretur, vel Terebinthinæ veræ 3 β. Thuris, Succini ana 3 j. succi Glycyrrhizæ, feminis tritici Amyli dicti ana 3 ij. Acaciæ vel Hypocistidis 3 j. β. Sanguinis draconis 3 β. Opij, in doloribus 3 j. Boli rubr. vel Terræ alterius pinguis quas sigillare solent 3. vj. Coralli rubri, Osteocolli lapidis, Oculorum cancri ana 3. ij. Spodij 3. j. cineris Priapi tauri vel cerui 3. β. Santali rubri 3. j. Sacchari candi & Penidiati ana 3. j. fiat puluis; Per se vsurpandus, vel cum infusione gummi Tragachanti in trochiscos formandus, atque 3. j. pondere cum liquore conuenienti sæpe exhibendus & diu continuandus. Vel addatur huic pulueri, Sacchari albi 3. x. & sic detur pondere 3. ij. per se vel cum infusione dicta in orbillos vel tabulas redactus.

Tertius puluis vlceribus sanandis tantum accommodatus: R. Coralli rubri lori 3. ij. pulueris Equiseti, cineris corticum Cucurbitæ ana 3. j. Thuris vel Mastiches, Sarcocollæ nutritæ in lacte an. 3. β. Sang. draconis 3. β. Sacchari rosa. tabul. vel candi ad pondus reliquorum: Vtatur vt prædictis.

Hisc pulueribus, si dolor summus requireret, etiam Opium, vt in trochiscis alkekengi fieri solere diximus, addi posset.

Vel etiam alia narcotica interdum, sicuti in Ardente mictione docuimus, exhiberi. Quæ innoxie centies & amplius, aliquos ægros & hisce & alijs diuturnis morbis diu afflictatos, singulis ferè noctibus sumpsisse, doloremq; inde ad aliquot horas cessasse, ægrumque refocillatum, diu viuere adhuc potuisse, cum sine illis dolorem diutius perferre impossibile fuisset, sæpius obseruauimus.

Pilulæ sanantes & narcotica: R. Thuris, Mastiches ana 3. j. Myrrhæ, Styracis, gummi Tragachanti ana 3. β. cortic. Mandrag. 3. j. feminis Hyosquiami 3. β. Opij & Succi liquirit. inspiss. dissolut. in Vino generoso ana 3. j. misceantur diligentissimè, addendo syrupi de Papau. q. s. fiat massa pilularum: Detur pilula vna vel plures, prout illarum sequitur effectus.

Iniectiones in vlceribus tantum vesicæ, non renum per syringam sunt, per penis ductum in masculis, per meatum ceruicis vteri

vteri in foeminis, in vesicam, quò tamen in masculis ægrè ob ductus obliquitatem & longitudinem perueniunt, in foeminis ob breuitatem faciliùs, vnde & sæpè sine successu in maribus, cum rursus dum infunduntur regurgitent, administrantur, & si altius instrumenti canalis ad vesicam vsque adigatur, interdum lædatur, ac si vlcus in ceruice sit, illud refricando plus obsit quam profit hoc remedium. Quæ tamen iniectiones necessitate urgente, si cætera non iuuēt, tentandæ.

Ad quas faciendas sumimus quæ vlcus dum sordidum est, abstergant detergentia, posteaquæ siccando sanent; quod cum maior continuus impediāt, ægrè perficitur; Nilominus tamen tentanda, quibus & ea, quæ ardorem mingendi inde contractum mitigant, si ille vrgeat, miscentur, vel illæ iniectiones anodynæ illic expositæ, hisce intermiscuntur.

Fiuntque hæ iniectiones ex Lacte, quod lenit, abstergit & glutinat, utimurque cum magis leniendum, Muliebri vel Bubulo, cum detergendum, Caprino, vel alio cum additione Sacchari vel Mellis, vel Aquæ mulæ & feri Lactis; cum glutinandum, Ouillo, vel alio Vstulato, aut misto cum Saccharo vel Melle rosaceo.

Ex decoctione Hordei, addendo interdum cortices Fabarum, addito Saccharo vel Melle, vti de lacte dictum, sit detergens iniectio.

Decoctum pro iniectione ad sanationem vlcera: R. rad. Consolidæ ʒj. β. cortic. Cucurb. siccæ ʒj. herbarum Equiseti, Plantagin. Solani ana M. j. florum Rosarum, Hyperici ana P. j. quatuor seminum frigidorum Maiorum ʒvj. fiat decoctio in decocto Hordei, dissolue in lb. j. Mellis vel Sacchari rosac. ʒ. iij.

Si maiore siccatione opus est, possunt de sequentibus quædam addi, nimirum de Bupleuro, Polygono vel Herniaria, Pilosellâ, Bursâ pastoris, Ceterach, Betonica, Geranio Robertiano. Narcissi radix, quæ valde glutinat: Semina item Plantaginis & Portulacæ.

Succi Plantaginis, Equiseti, Virgæ pasto-

ris, dissoluti vel misti prædictis, vtiliter inijciuntur: Triticici itè succus siccus, Amylum appellatus, dissolutus etiam glutinat.

Aquæ prædictarum plantarum aliquam quoque habent efficaciam iniectæ, imprimis Plantaginis, vti & Myrti, summitatem Rubi & Oleæ, & peculi Rosarum: Item Centaurij, Hyperici.

Chalybeata per extinctionem ferri aut chalybis in aqua, iuuat, vel in quam plumbum igne solutū, aliquoties infusum fuerit.

Misturæ pro iniectione sunt glutinantes, vt: R. Sarcocollæ nutritæ in lacte ʒ. j. infusion. gummi Tragachant. vel Arabic. ʒ. β. factæ in aquæ Plantagin. ʒ. j. β. Cerussæ ʒ. β. Sanguinis draconis ʒ. j. dissoluantur in Lacte vel decocto, aut Aquis quibusdam: Pro iniectione.

Hisce quandoq; miscentur quæ dolorem simul sedant, vt in decocto semin. Papauer. albi, cortic. Mandragoræ; vel addimus mucilagines, in ardore mingendi expositas, Albumē oui, & necessitate urgente, etiâ Opiū.

In vlceribus pertinacibus confert Decoctum Lithargyrii ʒ. ij. in aquæ Rosarum peculi & Plantaginis ʒ. iv.

Vel misceantur prædictis iniectionibus, Bolus, Cadmia fossilis, quam lapidem Calaminarem vocāt, Tuthia, Cerussa, Plumbum vstum & lotum. Interdum & Antimonium & succus attritus à lapide Hæmatite. In sordidis vlceribus parum Myrrhæ.

Ex compositis trochiscis aliqui dissolui cum prædictis possunt, qui etiâ pes os sumpti comperunt, vt trochisci Alkekengi, trochisci Gordonij; Vel etiam alij, vt de Succino, de Terra sigillata, de Spodio, dissoluti in supradictis aquis vel liquoribus.

Collyria quædam siccata citra morsum, in ophthalmiæ cura exposita, hic admodum ad vlcera sanationē iniecta conferunt. Qualia sunt Collyrium album, citrinum & de thure, Rhazis dicta. Item de Tuthia, aliæq; hisce similia illic descripta, ex cerussa, tuthia, sarcocolla, thure, gummi tragachant. arabic. amylo parata: Quæ & quia opium simul recipiunt, dolorem simul admodum sedant.

Vnguenti Ægyptiaci exigua portio, in

summè sordidis vlceribus, ea mundificat & à putredine conseruat.

Inunctiones etiam conueniunt in vlceribus renum & vesicæ, factæ circa renum regionem, ex vnguento Refrigerante, aliisq; in eum solùm finem, vt vrina mitior fiat, minusque partes vlceras irritet: sicuti etiam in mictione ardente citra vlcus, eo nomine hoc fieri debere, ostendimus.

Pubis & perinæi sedes, eandem ob causam in vesicæ illiusq; ceruicis vlcere, refrigerantibus oleis, vt Rosaceo, Violaceo inungi poterit. Et si metuitur inflammatio ob dolore, addendum oleum Myrtillorum, Cydoniorum atq; parùm Aceti penetrationis causâ.

Hisc vnguentis Cerussam, Lithargyriũ, & succum Plantaginis, Equiseti aliaque siccantia vlceris causâ admiscant, quæ tamen foris inuncta parùm ad vlcus sanandũ conducere possunt, & cum constringendo ductum vrinæ, liberum ipsius transitum impediendo, vt maior ardor suboriat, efficiant, satius erit relaxantibus inunctionibus hasce vias dilatare, vt oleo Amygdalarum dulciũ, Chamomelino, eoque magis cum & dolore simul leniant.

Fotus pectinis & perinæi, ad dolore mulcendum, ex iisdem fieri possunt, vt decocto Maluæ, Chamomill. Meliloti, additis si calor adfit, etiam refrigerantibus, vt Nymphææ radic. & floribus, Violis & similibus.

Vitæ regimen quod attinet, idem ferè quod in cura mictionis ardentis sine vlcere declaratum fuit, cum & hic dolor ille adfit, cõueniet. In quo cibi qui glutine veluti oblinunt vias vrinæ, vlceribus hisce se obducunt, vt minus ab vrina molestantur, efficiant. Pinguia tamen hic eum vlcera sordida reddant, non adedò competent.

Mictionis turbulenta à renum illiue profecta curatio.
Alia turbulenta mictiones, quales sunt, tum ea quæ à purulenta, vel alia quæ ab alba lactea materia, à renibus non exulceratis proueniente, illicq; ex illiue quadam ibidè collectâ sicq; excocta, vrinq; cõfusa nascuntur, cum ardorem quoq; inter mingendum pariant; & si perseverent, tandem in renibus aut vesicâ excoctionem quandam, vnde & vlcus sequeretur, possèt inducere, ad vtrumque auertendum, curam postulant.

Quæ perficitur, si purgantibus decenter corpus, ab humoribus excrementitiis, vnde hæc illiue renibus adhærescens oritur, & in eiusmodi purulentam vel pultaceam materiam conuertitur, sic corpus purum reddamus, & causam illius antecedentem subtrahamus: Dein abstergentibus exhibitis ab hisce sordibus renes eluamus: vtendo præsertim leuioribus detergētibus, in vlcerum renum cura quoque expositis, quæ vti illic pus ab vlcere, sic hic hancce materiam abstergant. Inter quæ Terebinthina valde conuenit, vti & Lac, similiaque: Administrando interim etiam lenientia, quæ ardorem inde natum mitigent. Qualia in ardente mictione descripta sunt; quæ vti vrinæ acrimoniam contemperando illic inuant, sic hic quoque eandem in hac materia, retundendo proderunt.

Quod purulentam raram illâ mictionem attinet, quæ à pure aliunde quàm à renibus aut vesicâ, ab hepatis alteriusve partis abscessu vel vlcere proueniēte, vel in peripneumonia, pleuritide & empyemate se offert; In ea, naturæ hic motus potius erit promouendus, quàm sistendus, exhibitis quæ per vrinas illiuiem in sanguine contentam euacuant, in febribus per hanc viam suas excretionem quoque molientibus expositis. Per reliqua cura potius morbo quàm huic symptomati à quo pus hoc prodit, accomodabitur.

Cruenta mictio, si à calculo renum, illorum carnem dum lumbi admodum mouentur, contundente procedat, cum in ea paucus admodum sanguis à renibus abscedat, qui vrinæ permixtus eam tingit, neque diu hoc duret, sed cessante motu, vrina rursus clarescat, curationem vix aliam quàm quæ causæ illius calculo scilicet debetur, requirit. Quam calculi renum curam in nephritico dolore tunc quoque comite exposuimus.

Quod si verò à sinibus renum, sanguine nimium refertis, mictus sanguinis proueniat, & natura eum ob sanguinis copiam vel impuritatem aut tenuitatem cum vrina confusam per mictionem expurget, quod tamen infrequens existit, quia copiose tunc plerumque sanguis excernitur, si diutius hoc

Mictionis purulenta à vesicæ abscessu genita curatio.

Mictionis cruenta à calculo profecta curatio.

Mictionis cruenta per anastomosis vasorum vel lesionem in renibus curatio.

hoc perduret, cura erit adhibenda. Quod & si à læsione ex casu vel ictu circa regionem renum facta cruenta hæc mictio sequatur, faciendum. Quæ omnia sequentibus perficiuntur.

Reuellimus sanguinem nimium fluentem, per Venæ sectionem, Cucurbitularum in extremitatibus applicationem, cum si lumbis admouerentur, ad renes potius sanguinem è venis maioribus allicerent.

Mundum reddemus sanguinem, si ob se rositatem vel impuritatem ad renes feratur, fluxusque ille inde oriatur. Idque purgantibus mitioribus, quæ & simul adstringant, sicuti & in aliis hæmorrhagiis inde natis hoc fieri solet, atque in illis descripsimus.

Sistimus fluxum exhibitis iis quæ sanguinem incrassant, vias adstringunt, additis quandoque quæ stupefaciendo sensum partium minuunt. Qualia multa eiusmodi in aliis hæmorrhagiis exposita sunt, quæ & hic conuenire possunt, imprimisque sequentia.

Pulueres dantur simplices, vel permixti inuicem, per se, vel addito Saccharo rosat. tabul. aut Ouo, aut cum Lacte chalybeato vel ouillo, aut Vino rubro austero, vel Syrupo aliquo, vt Rosarum siccatar. vel Myrtillorum vel Aquis conuenientibus.

Suntque idonei pulueres Equiseti, Millefolij, radic. Consolidæ, Bistortæ, Penta-phylli, semin. Myrtillorum, ossium Dactylorum vstorum, & vti vult Diosc. Elichrysi & semin. Cumin. sylu. alterius. Item Boli vel Terræ alterius pinguis, lapid. Hæmatitis, Amianthi, Coralli rubr. quod & sanguinis, si adsint, grumos dissoluere dicitur, Succini, Spodij, gummi Tragach. Arabic. Acaciæ, aliorumque idem præstantium.

Trochisci de Succino, Alkekengi, Gordonij, multa que ex illis quæ adstringendo in vlceribus renum iuuant, hic quoque data fluxum hunc sistunt, & si ardor mingendi simul adsit, eum quoque mitigant.

Aquæ, succi & decocta Plantaginis, Portulacæ, Millefolij, Bursæ pastoris, Sumach, Cydon. similiaque propinantur.

Ex narcoticis Philonium Persicum, vti in cæteris hæmorrhagiis, sic & hic quoque

competit, vti & Trochisci prædicti cum opio parati, alii que alibi expositi. Imprimisque; semen Hyosquiæ cæteris additum, vti in hæmoptoica passione, sic & hic vt & in aliis hæmorrhagiis, plurimum conducit.

Extrinsecus renum regio hisce quæ sanguinis fluxum cohibent, inungenda; Veluti hoc vnguento: R. Boli Armen. vel alterius Terræ glutinosæ ʒ. ʒ. cortic. malorum Granat. vel Gallarum ʒ. ij. Sanguinis draconis, Aluminis ana ʒ. j. olei Myrtillorum quant. suffic. ad incorporandum, addendo & Albumin. oui & Aceti parum, fiat inunctio & emplastrum, quod efficacius si oleum omittatur, illiusque loco succus Plantaginis sumatur.

Succus Portulacæ subactus cum farina Hordei renibus admotus probatur.

Si à cantharidibus sumptis, sanguinea sequatur mictio, damus ea quæ leniendo vrinæ summum feruorem, à quo vasorum emulgentium oscula reserantur, fluxusque hic concitatur, contemperent vel extinguant: Imprimisque decoctum feminis Lini, Lac chalybeatum, affatim bibenda; Item emulsionem quatuor feminum frigidorum Maiorum & Papauer. albi, Amygdalarum: Item oleum Amygdalarum vel Rosaceum, Albumenque oui, mucilago feminis Psyllij, & similia. Et si mictio cruenta perseueret, transimus ad iam in aliis causis exposita remedia.

A vesica læsa si sanguinis mictio proueniat, quia copiosus sanguis ob venarum paucitatem, vix ab ea emanare potest, remedia potius læsioni, vti in vlceribus dictum, accommodantur, per exhibita atque iniecta. Quod si perseueret, modò exposita quoque conuenient, vntionesque vesicæ regioni tunc applicabuntur.

Si grumi sanguinis in vesica retineantur, eamque obstruant, propinamus quæ eos dissoluunt, vt Succinum, Coagulum hœdi, aliaque in mictionis defectu à grumo sanguinis proueniente, & aliis hæmorrhagiis declarata. Imprimis Satureiam sumptam sanguinem in vesica coagulatum dissoluere docent, & si Raphano excauato virga indatur, grumum sic elici.

Mictio -
nis cruen-
ta à can-
tharidi-
bus prou-
enientis
curatio.

Mictio -
nis cruen-
ta ob ve-
sicæ læ-
sam cu-
ra.

Mictio-
nis pier-
naturalis
lis per
vulnera
prodeunt
in cura-
tio.

Per vias non destinatas vrinae, sed per alias, vulnere apertas, praeternaturalis vrinae effluxus, si ob sectionem, quae in lithotymia suscipitur, accidat, non aliam curam, quam quae vulneri debetur, requirit, quo sanato, vrina iterum naturalem cursum repetit.

Ab alio vulnere ventris imam regionem & vesicam simul perforante, si vrina per illud effluat, cura etiam vulneri tantum accommodatur: quod si incurabile, vti ferè contingit, existat, tunc & hinc vrinae per viam inconuenientem effluxus, vel ad mortem vsque durat; vel si etiam euadant, nec vlcus tamen coalescat & occludatur, nihilominus permanet, sicuti huic, cui in sectione sarcocoles vesica laesa fuit, vti prius dictum est, accidit; quod labiis vulnertum in vesica quam carne & cute cicatrice obductis, vulnereque sic in fistulam conuerso, per eam ad hodiernum vsque diem vrina effundatur, idque citra aliud incommodum, cum vrina per viam hanc illi extrinsecus patefactam, extrorsum nec in abdomen profluens, noxam intrinsecus nullam adferat. Aliquando tamen in aliquibus, sicuti & in eo cui, vti ostendimus, bos cornu impresso abdomen & vesicam perforat, contigit, vt vulnere iterum sanato & penitus occluso, vrina mictione naturali rursus redderetur; quod, cum alias vesicae corpori illatum vulnus non amplius coalescere possit, hanc ob causam euenisse putamus, quia vulnus non membraneam vesicae, sed carnosam circa illius ceruicem sedem, vbi vulnera iterum concreescere possunt, penetraverit; vel quod illic aliave illius in sede vulnus infictum, carni vicinae, quae simul vulnerata fuit, ita inter coalescendum accreuerit, vt foramen in vesica factum, veluti callo hoc sic obturaretur & obliteraretur, atque ita minus in abdomen aut vulnus externum, quod interea simul sanatum fuit, vrina effluere potuerit,

& proin ad naturalem suam
excretionem re-
dierit.

DE IECTIONE.

DE IECTIONE.

CAPVT XL.

Genera.



IEECTIO, excretio illa quae per aluum fit plerumque appellatur, per quam excrementa ventris tam crassa quam liquida, diuersisq; humoribus permista excernuntur. Quae deiection praeternaturalis fit, quando in eo potissimum peccat, quod nimia copia excrementorum eiusmodi per eam excernatur, atq; Diarrhoea appellatur; Vel quod illis alia quae huc non pertinent, permista, cum faecibus ejiciantur, veluti cibi crudi adhuc, in Lienteria vocata; vel chylus, in Coeliaca passione nominata, vel sanguis in Cruenta, vel pus, in Purulenta, vel pinguedo, in Vinctuosa deiectione. Quod si praeter haec alia quaedam, vt vermes aliave assumpta deijciantur, horum excretio peculiari capite singulis accommodato explicabitur. Praeternaturalis huc quoq; ea faecum alui excretio refertur, quae non per viam naturalem aluum scilicet, sed aliam exeunt. De quibus omnibus generibus hoc ordine agemus.

Diarrhoea, Alui fluxus seu fluor, German. *Diarrhoea*, *Alui fluxus*, *Superpurgatio*. Rust à commotione, & Bauchlauff, quod venter nos ad affellationem festinanter incitet, dictus, ac si post purgantia sumpta, immoderatus contingat, Superpurgatio vocata, ea praeternaturalis est immoderata & frequens deiection, in qua faeces aliave excrementa & humores diuersi, nunc pauciores nunc plures, plus minusve inuicem vel etiam cum faecibus permisti vel confusi, paucis interiectis intervallis, interdum etiam ferè sine quiete, nunc magnam nunc minori copia redduntur, nunc imperu quodam effunduntur & veluti eiulantur. Suntque haec ab initio crassiora magis, mox aquea & diluta, colore vario, cinereo, flauo, atro, inaequaliter, alias etiam aequaliter tincta. Plerumque muco albo crasso & tenaci, vel phlegmate permista. Quod excrementum interdum aqueum, alias spumofum, alias tenax, pellu-

Fluxus
cerebra-
lis.

pellucidum, album, foeturæ ranarum vulgò assimilatur: Aliàs crassius adhuc, vitrum fufum referens: quale sub finem harum deiectionum aliquândo purum & impermistum, nec olidum prodire, deiectiones propius inspicendo, videmus. Aliquando spumosa pituita deijcitur copiosè, tuncq; priuatim Fluxum cerebralem, quodd inde prodeat, vocât. Aliàs præcipua horum excrementorum copia ex crocea, biliosa & spumosa constat materia. Aliàs ex nigra atrabilaria crassa materia componitur. Quæ quando minùs diluta prodeunt, cum pauciora sint, conatum potius deijciendi frequentè, quàm diarrhœam copiosam concitant; & Tenesmi speciem constituunt eam (de qua postea dicetur) quæ sine mucò, stimulo continuo molestat, per quem pauca eiusmodi materia exprimitur, aliquando magna difficultate, tardius hac materia procedente, & circa exitu subsistète.

In diarrhœis torsiones ventris aliàs nullæ; aliàs leuiiores aliquæ; aliàs grauiiores, cù tensione & rugitu; præsertim cum deiectione instat, percipiuntur: aliàs & in podice quædam molestia vel ardor, conatusq; deijciendi vehemens, & frequens; maximè in Tenesmo iam dicto.

Ventriculû quandoque seu cordis, vt vocant, adest dolor; vomitusq; nonnunquam simul infestat, non tamen adeò violenter vt in cholera morbo, qui proin in vomitione fuit expositus; per quem id quod in ventriculo continetur, cibus, chylus, mucus & humor pituitosus vel biliosus euomuntur. Interdum aliarum naturalium functionum accedunt læsiones; Febrisq; aliquando illis copulata est; aliàs nulla; aliàs de nouo illis accedit: vti & in superpurgationibus dictis ea frequenter superuenire solet.

Lienteria.

Lienteria alui deiectione est præternaturalis; in qua cibi qui assumpti fuerant, parùm vel nihil ferè immutati, per aluum, vix separatim, sed cæteris excrementis misti prodeunt, ita vt adhuc cognoscantur; idq; cum alui fluore, minùs tamen frequenti & copioso quàm in diarrhœa; Atque etiam vt in illa interdum cum murmure stomachiq; & ventris aliquâ molestiâ, naturaliumque functionum læsione.

Cœliaca affectio seu passio, illa est excrementi alui præternaturalis, siue copiosa aut parca existat, in qua succus è cibo concoctus genitus, seu chylus nunc crudior adhuc & imperfectè coctus, & proin fluidus subcinereus aut veluti lutosus, nunc meliùs elaboratus, crassior & albidior, copiosius interdum & purus, aliàs minùs, egeritur. In qua æger admodum debilis maleque coloratus & pallidus euadit.

Cruenta deiectione est, per quem sanguis progreditur. Quod variis modis fit: Aliàs enim simul cum aliis alui deiectionibus redditur; in Dysenteria ob intestina affecta dicta, quâ à rubore sanguinis nostri *Rothe ruhr* *Schaden* / vel *Rotlauff* vocant. Popularis plerunque, in iuuenes faciliùs, sed & adultos & senes quandoque sæuiens: Aliquando quibusdam certæ cuiusdam complexionis peculiaris. In hac deiectione vrget molesta, per quam interdum copiosa, aliàs pauca egeruntur, frequenti plerunque conatu deijciendi, & sæpè redeunte affligenteque, cum torminibus & ventris torsionibus, nonnunquam & rugitu ac murmure: Cruorq; purus excrementis & fæcibus permistus redditur, & plus minùsve sanguinis in illis apparet. Dein & præter sanguinem Mucus quidam, quem pituitam esse putant, cum fibrosæ substantiæ, qualis in sanguine in aquam per venæ sectionem emissio, secerni solet, quæque falsò pituita esse creditur, sit persimilis, copiosè interdum, & plus ferè quàm sanguinis redditur: tunc Germani eam Albam dysenteriam, *Weisse Ruhr* appellare solent. Quem mucum etiam alij pinguedinem esse crediderunt, falsi eo, quod intestina inuerfa à laniis, pingua esse vidètes, intrinsecus quoque pingua eadem esse, cum tamen omni pinguedine ibi careant, malè existiment. Nonnullis pro ramentis intestinorum accipitur, quæ tamen si prodeunt, quod rarum, ea membrana esse necesse est. Sed & Bilis flaua hisce plerunq; commiscetur, nonnunquam viridis, aliàs atra. Pituitaque vt in omnibus ferè deiectionibus, sic & hic quoque istis miscetur.

Sitis in hoc affectu plerunque vrget, calorq; aliqua adsunt indicia: Urinæque tinctæ

& bilioſæ ſunt. Non infrequenter tamen febris Synochus bilioſa, vt in cholera diximus, huic quoque morbo copulatur.

Fit tamen vt dyſenteria febres ſequatur, easque interdum putridas continuas vel intermittentes, vel quod frequentius accidit, malignas, quandoq; & peſtilentas, tuncque vti hæ febres, populares & contagioſæ ſunt.

Singultum ad mortem vſque durantem, aliaque incommoda graua dyſentericis ſuperueniſſe, sæpè obſeruauimus.

Ad dyſenteriam refertur cruenta diectio, in qua ſanguis vt in illa, excrementis permiſtus, ſed copioſior prodiit, cum torſionibus & multis veræ dyſenterię ſymptomatibus, quæ pro vera dyſenteria etiam habetur, ab inflammatione, vt dicitur, non vlcere procedens.

Teneſm. Alias ſubcruenta, mucoſa vel purulenta materia, in qua cruoris guttæ quoque interdum apparent, per aluum egeritur, vocaturque tunc Teneſmus ſeu Teineſmos, à contentione & nixu ſummoque conatu, quo ſine intermiſſione ferè ad exonerandum ſollicitantur, citra alias ſecus ac in dyſenteria torſiones. Quo malo perſeuerante, tandem ſolum pus idque copioſius redditur, nullo vlcere in podicis exterioribus, vti in illius dolore dictum, apparente.

Hepaticus Dilutus & aquoſus omnino ſanguis interdum, ſed rariſſimè per aluum effunditur, adeo vt ſerum potiùs tinctum nonnihil ſanguine, & veluti aquam in qua caro cruenta adhuc abluta eſt, ſubrubicam, quàm exactam ſanguinis rubedinem referat, fluxusque Hepaticus, cum ab hepate hunc prodire putent, communiter vocatur. Hic ſine dolore, copioſè admodum fit, noctuque magis afficit, diuque sæpè durat; Vires functionesque naturales admodum deiciens, & cum ſiti aliis que accidentibus eueniens. Huic non abſimilis eſt fluxus cruentus dilutus, qui in dyſenteria aliquando ſuperuenit, grauiter offendens.

Diectio per aluum ſanguinis concret. Concretus alias, interdum retorridus, & veluti frixus ſeu aſtutus niger, picis inſtar, cum excrementis, vel paucus, vel ſua copiâ illâ exuperans, vel ſolus etiam ejicitur, cum vomitu nonnunquã eiufdem materie, ſicu-

ti in vomitione diximus, cui ſumma virium proſtratio aliaque accidentia iunguntur.

Purus & ſincerus per podicem nonnunquam ſanis emanat, in fluxu Hæmorroidum. Qui ſæcibus alui minimè permiſtus, ſponteque defluens, in ſanguinis aliis excretionibus deſcribetur.

Purulenta diectio in dyſenteria & teneſmo, vt dictum, parca & cum dolore fit. Et interdum ceſſante dyſenteria, illius effluxus diu remanet, ægrumque conſumit. Alias etiam ſine dolore, copioſè pus egeritur: Idque longo sæpè temporis ſpacio, quo æger malè coloratus & habitus, marceſcit, comitantibus aliis quandoque partium naturalium morbis.

Mucoſa diectio & phlegmatica, cum ſæculenta, in diarrhœa, vt dictum, alias iungitur, & in ea interdum præualet: Aliquando cum cruenta diectione in dyſenteria & teneſmo copulatur mucus, & circa finem in teneſmo purus exit. Sed & mucum merum, ceu limum ſubalbidum, ſine dolore ſecus ac in teneſmo, paucâ etiam vt in illo, quantitate, è podice emanare, poſt morbos diuturnos atque equitationes multas, annotat Fernelius.

Vinctuoſa interdum eſt diectio & Pinguis, nunc oleum, nunc butyrum, nunc aliam pinguedinem vel adipem referens. Vidimus & candelæ ſebacæ portiuncularum inſtar portiones aliquas, diu multumque cum aliis excrementis fuiſſe redditas. Hæc diectio Lienterię eſt ſpecies, ſi ab aſſumptis hoc procedat sæpeque fiat, vel Diarrhœæ, ſi hæc vnâ cum cæteris egerantur, atque aliunde quàm à cibo proficiſcantur. Et tunc Colliquationem inteſtinorum, cauſâ non bene intellectâ, vocant.

Per aliam viam ſæces alui ſeu ſtercora, quàm per aluum è corpore prodeuntia, præternaturalem penitus illorum excretionem faciunt: Vt cum è ſequentibus locis erumpunt.

Per vomitum ſtercora interdum egeruntur: Tuncque ſæculentam materiam inteſtinorum foetidam, liquidam ferè & dilutâ, aliquando ſimul & chyloſam, magna cum moleſtia ægri, aſtantiumque horrendo & miſe-

Diectio per aluum purulenta.

Diectio per aluum mucoſa & pinguis.

Diectio per aluum pinguis.

Fæcum alui per vomitum excretum.

miserabili aspectu euomunt: In morbo qui Cōuolulus dicitur, & in Ruprura seu Hernia, vbi & hic casus aliaque accidentia eum comitantia descripta sunt.

Faecum alui cum vrina excretio. Per mictionem cum vrina faeces alui, cum insertis autem osciculis, è virga virili prodire vidimus, cum purulenta simul mictione ardoreque vrinæ, magnoq; cruciatu.

Faecum alui per vteri sinum excretio. Per sinum ceruicis vteri excrementa alui similiter effluxisse vidimus, cum pure aliisque exulcerationis illius loci accidentibus.

Faecum alui per vuluera & fistulam excretio. Per vlnera abdominis, faeces alui, nonnunquam & chylus exeunt, idque non solum in illis qui mox moriuntur, sed etiam diu post superstitibus contigisse, illisq; ex vlcere fistuloso stercora indies effluxisse, aliquoties obseruauimus, alijque annotarunt.

Causa.

OMnium harum deiectionum præternaturalium ob id existentium, quod maiori copiâ vel frequentius quàm par erat fiant, vel quod aliena per eam deiciantur, causa in ventriculo & intestinis consistit.

Estque inter eas præcipua horum viscerum exquisitè sentientium irritatio tanta, quæ facultatem ipsorum expultricem adeò excitet, vt ea quæ in illis continentur, propellere nitatur, eoque magis, si vicinarum sedium facultates, per consensum simul ita irritentur, vt ad intestina etiam quod in illis præcipuè redundat, expellere conentur, vnde Deiectionum eatum præcipuè quæ cum torsionibus & dolore fiunt, varia prodeunt genera. Nam si in ventriculo hoc fiat, ille insurgens, ad intestina, viam illius expurgationi destinatam, quod in se continet, propellit, & deiectiones sic efficit potius, quàm vomitiones, nisi adeò violenter afficiatur, vt & per superiora mox offensam hanc, sicuti in vomitione diximus, eijciat. Quo nomine & cum hæc diutius minimè retineat, grauior noxas hac ratione euitat, ob idque rarius quàm intestina exulceratur. In intestinum ductu longo alicubi facta hæc irritatio, deiectiones similiter concitat, easque vehementiores moderatioreve, prout maior minorve est irritatio, quâ concitata vis expultrix intestinum, ea quæ in illis

continentur, deorsum propellens, & adiuuante conatu, ad quem hic stimulus naturæ se iuuari cupientis, incitat, per finem intestinorum expellendo, diarrhæas cum torsionibus molestantes parit. Vel si grauius adhuc afficiant, ita vt intestinum substantiam rodant & exulcerent, Dysenteria dicta oritur. In qua si colon afficiatur, dolor in circuitu illius, latere præsertim sinistro, & cum colon statim sub vmbilico ducatur, si id illic afficiatur supra vmbilicum, dolor quoque, non saltem tenuibus affectis vt putarunt, se potissimum manifestabit: vt & si tenuia alicubi affecta sint, eo in loco, siue supra aut infra vel iuxta vmbilicum fiat, dolor se ibi magis exeret. In quo affectu sanguis qui cum excrementis redditur, illis eò magis confusus mistusque apparet, quò longius ab intestinis tenuibus prodit, minusq; quò recto intestino propius è crasso intestino emanat. Et quò maior est læsio, eò sanguis redditur copiosior, maxime in principio minus cum vlcus fordescere incipit, prodeunte tunc purulentâ quoque materiâ. Estq; liquidior crassiorve sanguis, purior impuriore, prout ille in venis meseraicis occurrit: Acceditque ob dolorem interdum febris, præsertim si ille inflammationem intestinum accersat, quæ aliquando dysenteriaë copulatur. Sed & fit, ob irritationem validam, vt nondum exulceratis intestinis, osculis venarum meseraicarum referatis, deiectio sanguinis, rarius puri, frequentius concreti, interdum & nigri, vt in eiusmodi sanguinis deiectionibus in generibus ostensum fuit, sequatur. Vel vt simul accedente inflammatione, fluxus cruentus instar dysenteriaë oriatur, in qua citra vlcus intestinum, sanguis vt & in alia excernitur, cū maximo dolore & febre, conatuq; deijciendi frequeti: vti sectio in infantibus quibusdâ, qui ex dysenteria putabatur mortui, deprehendimus.

In intestinum vltima sede seu recto intestino, circa exitum ferè, non tamen in podice, cuius læsiones in podicis dolore descripsimus, si hæc irritatio fiat, vel etiam exulceratio, tunc ob partis exquisitū sensum, stimulus continuus ad excretionem incitat, causaq; est Tenesmi dicti, in quo si ab vlcere

Intestini recti irritatio, causa Tenesmi.

procedat, notæ aliquæ sanguinis adfunt, & purulenta materia mucosa subruenta exit, estq; Tenesmi prima species: si verò biliosa quædam vel alia tenax materia prodit, secūdam illius speciem constituit: Si nihil, tertia erit, recto intestino tunc à ductus vesicæ illi adiacentis calculo, pressione, tumore vel à duris excrementis retentis, vel irritato vel molestato, vel ab ardore illic mitionem ardentem reddente, accedente sepe inflammatione, simul incitato, aut à vermibus ascaridibus stimulat, sicuti in hisce affectib. explicabitur. Qui & tenesmus cum conatu solo sine excretionem factus, à refrigeratione podicis ad interiora etiam penetrante, oriri potest. Sed & hæc irritatio venas hæmorrhoidales aperiendo, hæmorrhoidum fluxum promouere potest, purusque tunc emanat sanguis.

Ventriculi atq; intestinum aggrauatio, causa Deiectionum per aluum præternaturalium.

Præter irritationem & offensam hanc vehementiorem, vnde deiectiones cum dolore & conatu exsurgunt, aliqui quoque ventriculi & intestinorum affectus, deiectionibus quæ minori molestia & dolore fiunt, occasionem præbent. Idque cum ab excrementis & humoribus, nonnunquam & alijs quibusdam corporibus affecta, ea deicere coguntur, vel alijs ob copiam illorum aut quia præternaturalia sunt, diutius ea retinere nequeunt, eoq; magis, si simul partes hæc ad excretionem suam quantitate vel qualitate incitent: Vnde cum hæc excernantur, Deiectionis varia genera ab illis quæ deijciuntur denominata, exoriuntur. A quibus omnibus affectibus, eo facilius quoq; ad deiectionem ventriculus & intestina commouetur, si dispositio eorum talis insuper accedat, quæ vel dilatata seu ampliata aut laxata, ea quæ in se continere diutius deberent, ægrè continent.

Intestinorum transitus, siue obstructio, causa faccum alui per vomitum excretionis.

Ob occlusum intestinorum transitum, fæces alvi & chylus sursum regurgitatus, excretionem hanc fæcum præternaturalem & horrendam, quæ per vomitum fit, pariunt. Cuius obturationis causa, in ileo morbo quem Conuulsulum vocant, explicata fuit: Vti & in Herniarum, in quibus hæc vomitio stercorosa etiam contingit, cura.

A læsione grauiore intestinorum, illa si-

Intestini recti vlcus, causa faccum alui per illud excretionis.

militer alui fæcum excretio præternaturalis procedit, in qua non per aluum sed aliam aperturam, ob solutam continuitatem, prodeunt. Veluti à vulnere abdomen penetrante, atque intestina simul vulnerante; tunc enim excrementa alui crassa, si crassiora intestina, liquidiora, si tenuia, & chylus, si circa ieiunum læsio facta sit, prolabantur; quod vulnus, interdum in fistulam conuersum, permanentem eiusmodi excretionem ægro superstiti parit. Hocque tunc fieri potest, si labia vulnorum vtriusque partis, tum in abdomine, tum in intestinis, per contactum concreuant; quod, si in carnosa abdomine sede vulnus sit, eo citius succedet, tuncque si vlcus hoc non penitus consolidatur, vti factum vidimus, in fistulam conuersum, fæcibus exeuntibus viam præbet, easque quod minus in abdomen deuantur, vti alioquin fit, tunc ad exitum canalibus instar deducit: Fitque hoc eadem ferè ratione, quæ vulnus vesicæ infictum, in vlcus fistulosum quoque desisse, in vrinæ exitu hoc præternaturali ostendimus.

Intestini recti vlcus, causa faccum alui cum vrina excretionis.

Ab vlcere quod rectum intestinum cum ceruice vesicæ vel collo vteri, iisdem connatum, penetrarat & sinum illic pepererat, fæcum stercoris illa excretio, per mitionem & sinum Vteri aliquando contingens, procedebat. Sicuti in eiusmodi harum sedium exulcerationibus demonstratum fuit.

Causæ verò omnium horum ventriculi & intestinorum affectuum, vnde præternaturales eiusmodi excretiones exsurgunt, præter causas obstructionum, vulnorum & vlcerum intestinorum, vnde stercorum per vomitum, per mitionem, per sinum vteri, per vulnera excretio prouenit, quas in ileo morbo, vulneribus & vlceribus ceruicis vesicæ & vteri exposuimus, à sequentibus iam enarrandis dependent.

Medicamenta cathartica, causa faccum alui per vomitum excretionis.

Medicamenta purgantia, quod per aluum expurgent, dicta, assumpta, si adeo facultatem expultricem ventriculi & intestinorum commoueant, ut vehementius operentur, & diutius quam par erat purgationes ab illis procedentes durent, Superpurgationes dictas efficiunt. Quod licet præcipue à fortioribus catharticis, ob illorum vim ad-

modum irritantem aliquando eueniat, tamen & leuiora, laxantia dicta, quod aluum laxando saltem mouere credantur, cum etiâ abstergente vi aliquâ & aduersâ, naturam ad excretionem sollicitent, nec tanta in illis sit humiditas, vel aliqua vñctuositas, vt sic aluû vehementius laxando soluere possent, Superpurgationes, vt in calsiæ & mannae exhibitione sæpè fieri solet, nonnunquam pariunt. Sed & inter cathartica, quæ admodû acri & adurente vi prædita sunt, vt sunt esula, cucumis asininus, colocynthis, laureola similiaque, non solum nimium irritando superpurgationes faciunt, sed & nonnunquam erodendo vel inflammando, Dysenterias citra vel cum inflammatione, vel venas aperiendo, Sanguineas alias deiectiones procreant, sicuti prius, quomodo ab irritatione hæ eueniant, descripsimus: si in podice hoc fiat, quousque vis catharticorum, imprimis validorum, vt colocynthis nonnunquam pertingere potest, Tenesmus inde sequitur, vel apertis etiam illic osculis, Hæmorrhoidum fluxus. Quod & eodem modo à clysteribus iniectis euenire potest. Vti & à suppositorij in podicem intrusi nimia vi, non solum stimulant sed & exulcerant, Tenesmus fit. Quem & canalis syringæ clysmatum asper, aut violenter intrusus, potest efficere.

*Clysmata
suppositorij
in podicem
intrusi
causa
Dysenterias
& Tenesmi.*

Præter hæc quæ purgationis causâ vsurpantur, etiam alia, casu assumpta, non solum diarrhoeas irritando, sed & exulcerando dysenterias possunt procreare. Vti Venena quædam, inter quæ Adamantis puluërem propinatum dysenteriam gignere docent. Dein & alia acuta, quæ pungunt & scindunt, si fortuito deglutiantur, idem efficere possunt, quod in intestinorum ductu rarius fit, cum illic vix possint subsistere, vti verò in illorum exitu angustiore hærentia, eumque lædencia, Tenesmi quoque causa interdum sunt.

Cibus & potus tam ob copiam quam corruptionem vel cruditatem, deiectiones præternaturales efficit. Ingurgitatio eorum præsertim, quæ crudiora cum maneant, grauant, & cum flatus gignant, conturbant, vel humidiora cum sint, laxant, vel pingua, lu-

bricas vias reddunt, eoque modo Diarrhoeas gignunt. Vel si tales assumantur, qui facillè corrumpantur, Diarrhoea citius inde prodit, tum eâ corruptione, quâ in prauos humores commutantur, de qua causâ in humoribus agemus, vel eâ quâ in fæces copiosas, nunc limum, nunc lutum, pultaceamve aliam materiam terram & fœtidam conuersi, copiâ suâ & aduersâ qualitate naturam ad deiectionem sollicitant.

Quod tum assumptorum eorum quæ facile in eiusmodi succum aduersum corrumpuntur, tum etiam ventriculi eiusmodi constitutionis, quæ sic eos peruertere apta est, ratione euenire potest, sicuti in ventriculi imbecillitate suo loco copiosè exposita sunt. Quod si verò crudi omnino maneant cibi, & omnimodam concoctionem effugiant, Lienteria fit, quando accumulati, naturæ graues, quales assumpti sunt, rursus vnâ cum cæteris excrementis per aluum exeunt, eo maiori copiâ & frequentia, quod hæc magis redundant, Hoc assumptorum causâ quandoque accidit, si talia ingerantur, quæ omnino non vel ægrè euinci à natura queunt: Vel occasione ventriculi aded debilitati vel refrigerati, vt cibos concoquere & transmutare nequeat: cuius causas in imbecillitate ventriculi abundè exposuimus. Inter quas & cicatricem à vulnere in ventriculo relictam, referunt. Quibus causis concurrentibus, vehementiores sunt lienteria, & si certo tempore, certisve in locis, eiusmodi cibi concoctu pertinaces, quibus plures vti necesse est, vel aliæ causa ventriculum lædentes abundant, frequentiores & Populares sunt lienteria, quas ab aëris constitutione certa, quæ hisce gignentis apta sit, provenire existimant.

Humores acres pungentes, vrentes, erodentes, deiectiones præternaturales sæpè excitant. Inter quos bilis flaua seu atra est frequentior, quæ si in ventriculo & intestinis genita, vel è folliculo fellis, aut à venis meseraicis intestinis infusa, ob illius copiam, vel in morbis vt ictero, febribus, eò expurgata, phlegmati intestinorum & muco confusa, seroque diluta & contemperata, mitior fiat, tunc irritando solum citra ma-

Lienteria.

*Bilis
causa
Diarrhoeas
Dysenterias
& Tenesmi.*

gnas torsiones, Diarrhœam ob commixtionem hanc, excrementa fluida & spumantia, crocea vel atra, prout bilis est, profundentem, procreabit. Quod si verò bilis eadem, qualem ventriculū & intestina vellicando, choleram morbum efficere diximus, ob maiorem pernitiem quam acquisiuit, vehementius in intestina agat, vbi diutius quàm in ventriculo, qui eam vomitu mox ferè excutit aut deturbat, subsistere solet, tunc grauius irritando, & vel venas patefaciendo, vel erodendo, Dysenteriam cum inflammatione vel exulceratione, vel Alias cruentas deiectiones, vt prius dictum, procreabit, eò grauiores, quò bilis est deterior; qualem nunc flauam, nunc viridem, nunc atram, vnà cum excrementis & sanguine prodire, videmus.

Sed & eadem bilis descendens nec donec ad intestini recti finis angustias perueniat, subsistens, sed illic adhærens, præsertim si glutinosa sit, vel irritando, vel exulcerando has sedes, Tenesmus procreat; quod & si dysenteria prægressa, bilis à loco affecto huc delata promanet, accidere, & Tenesmus qui dysenteriam sequitur, fieri solet. Quæ bilis ab iisdem causis, veluti in cholera dictum, nasci coaceruarique potest, atque in iunioribus præsertim, qui fructuum horariorum vsu delectantur, illorumque copia se obruunt, ob corruptionem illorum & conuersione bilem colligi; vnde & dysenteria in illis, qui præsertim ad hoc vt facile hæc in illis corrumpantur, dispositi sunt, circa autumnum ad hyemem vsque, quo tempore hi fructus recentes & maturi inueniuntur, potissimum grassari solent, eoque magis, si non perfectam maturitatem adepti, vel alias vermibus erosi, facilius corrumpantur: aut si, vti voluit Rondel. ob fructuum adstringentium simul comestionem, fructus illi qui statim pertransire deberent, diutius in corpore retineantur. Quæ inde natæ dysenteria, populares quoque, cum plures qui hisce fructibus vsi sunt, afficiantur, existit.

Ab humoribus aliis acribus, vellicatibus, & vel ad bilis flauæ vel atræ naturam accedentibus, vel alioquin putridis corruptis, prauis & venenatis, consimili ratione, si sero

phlegmateq; ipsorum acrimonia mitigetur, Diarrhœa fieri solent, vel si minùs diluantur, & magnam habeat acrimoniam, Dysenteria & Tenesmi, eodem modo vt de bile diximus: Quæ dysenteria si à causa pernitiōsa procedant, contagiosa atq; eo nomine quoque populares sunt. Nascuntur autem eiusmodi humores, vel ex cibis, humoribusve peruersis, in ventriculo & intestinis; vel à venis meseraicis, vbi sæpe diu latuerunt, eò effunduntur, & hoc pacto, vt dictum, illa lædunt. Quod & frequenter in febribus putridis malignis, nonnunquam & pestilentibus accidit, vt in illis humor ille putris vel malignus, & in peste venenum illud, quod summè ardens esse in febribus ostendimus, vi naturæ interdum & per crism ad intestina tanquam sentinam excrementorum protrusa, illicque aliquandiu retenta, ea irritent vel etiam erodant & exulcerent. Suntque hæc diarrhœæ & dysenteria, vel febribus hisce copulata, vel quæ eas mox sequuntur, atque proin cum hisce morbis multis communes. Sed & in aliis morbis venenatis contagiosis, vt lue venerea, maligno humor, vel vi naturæ vel medicamentis, vt hydrargyri maximè vsu, quod vt eum in os expellendo, exspuitionem mouet, vel etiam illud exulcerat, sic & si ad intestina propellatur, vel diarrhœam irritando vel dysenteriam exulcerando, quæ in cura huius luis quandoque accedit, producit.

Pituita interdum facibus vel humoribus permista, seroque diluta, diarrhœis cum aliis occasionem præbet. Alias ceteris in hac mixtione præualens, potissima illarum est causa, tuncque in illis, vt dictum, copiosa apparet, vel etiam mera, sub finem præsertim, reliquis omnino iam repurgatis excrementis, accedente quandoque etiam bile, cum mucos intestinorum rejicitur. Quæ pituita in ventriculo & intestinis, nunc aquea, nunc mucosa, nunc vitrea, à causis pituitam generantibus, sæpe expositis, nascitur. Alias sero diluta, aquea præsertim, per venas meseraicas, vnà cum cæteris humoribus, à variis corporis sedibus eò repurgatur: Quam & à cerebro ad ventriculū & intestina defluere posse, spumofamque esse, fluxumque cere-

cerebralem dictum gignere, Hippocr. hoc Aphorif. Quibus excrementa spumosa sunt, iis à capite pituita defluit, docet. Cuius pituitæ in cerebro prouentus causa in defluxionibus explicata fuit.

Cæterum & falsam pituitam iuxta podicem congestam, tenesmum gignere affirmant. Qui tamen cum hic humor adeo non pungere, ut vlcus fiat, possit, non verus tenesmus, sed sola erit in podice irritatio, unde mucī qui in tenesmo prodit cum phlegmate similitudine deceptos, hoc affeuerasse, & ut illi vim stimulantem attribuerent aliquam, falsum mucum statuisse existimo.

Serū cau-
sa Diar-
rhæe.

Serum cum non solum sanguinem sed & cæteros humores, uti & excrementa omnia diluat, illisque proinde confusum fit, quò maiori quantitate illis admistum est, eò deiectiones mouet magis fluidas & copiosiores. Idque imprimis in diarrhæis, in quibus præualens, ut aquæ instar deiectiones effundantur, efficit. Quas tamen si ab acribus procedat humoribus & biliosis, eos contemperando, tunc mitiores potius, quàm vehementiores reddit. Quod serum nunc in prima coctione, ex cibis humidioribus potuq; copiosiore genitū, excrementa illa nimium diluendo, hoc facere potest. Alias per venas meseraicas, in intestina infusum, secumq; varios humores ducens, idq; naturā sponte illud agente, vel vi medicamenti cathartici impulsā, in repletis corporib. vel morbis ex repletionē pdeuntibus, diarrhæis iam dictis serosis varietq; mistis, occasionē præbet. Quas à sero è venis meseraicis transsudante, prouenire, magna illius quātitas, eaq; cōtinuū & diu sēpē p̄fusa ostēdit, quē in ventriculo & intestinis tamdiu subsistere, aut ex assumptis, quæ interdum perseverante diu alui fluxu, pauca sunt, prouenire minimè potuisset: nec obstat, quòd illic sanguini permistum, ab eo nō coloratum deijciatur, cum & alibi exsudans è corporis habitu & læsionib., & per renes ab emulgentibus separatum, non cruentū reddatur, & post sectam venam, ubi concretus ille est serum purum à sanguine separetur.

Serū cau-
sa Diar-
rhæe.

Accidit tamen etiam, sed rarissimè, ut serū cruore tinctū, sed leniter admodum, adeo ut loturam carnis saltē referat, copiosè, in fluxu

Hepatico dicto excernatur: quod cum in venis ^{patitū} meseraicis à sanguine illo sine dubio tincturā illam accipiat, in hoc affectu, & tamē in aliis à sero natis diarrhæis ex iisdem venis pcedens, uti dictū, minimè rubescat, quomodo hoc fiat dubiū: pleriq; causam illius hepatis imbecillitati, unde etiā nomen illi inditū fuit, attribuunt, eamq; sanguificationis defectū statuunt, à quo sanguis imperfectus subcruentus aqueus natus, copiosq; collectus, tandem è venis erumpat meseraicis. Verū licet hæc feri redundantia & sanguinis crudioris causa esse possit, unde sæpē diarrhææ prodeunt, quia tamen tinctura hæc illi rariùs accidit, causam aliam in hepate, & illi adnexis venis meseraicis insuper, eamq; insolitā accedere oportet. Qualis esse potest, sanguinis meseraici summa tenuitas, seu ipsius ichorū, h. e. tenuiorum partium copia, osculorumq; venarū amplitudo vel dilatatio. Cuius causam hepatis caliditatem potius esse, quàm frigiditatem, ut illa arguūt, sic & inde quòd in hoc affectu calor adfit, fitis, ardor circa hypochondria, & quòd febris quandoq; superueniat, & quod post febres arden-tes sequatur, potest colligi, uti & ex ipsa curatione, cum ea frigidis potius hepaticis quàm calidis perficiatur.

A qua hepatis caliditate & seruore, accedente insuper sanguinis constitutione tali, qualē exposuimus, venarumq; anastomosi, ab eodem calore profectā, euenit, ut serū rursus per hanc viam, exiguis guttis sanguinis tinctū, in intestina relabatur, huncq; fluxum serosum subcruentum efficiat, uti & in fluxu illo consimili hepatico qui dysenteria interdum copulatur, exulceratio hæc oscula aperiens, ut sanguis sero, præsertim admodum in venis redundante mistus, similem fluxū subcruentum efficiat. Qui fluxus copiosus & dilutus, magis tamen quàm verus hepaticus tinctus & frequentior existit.

Mucus seu limus ventriculum & intestina oblinire solitus, deiectiones præternaturales, solus minimè, cum separatim vix prodeat, efficere potest, sed tantum quatenus cæteris excrementis miscetur, si præsertim hoc fiat maiori copia. Cuius redundantia causa à cibo glutinoso & excrementitio

Mucus
ventricu-
li & in-
testinorū
causa de-
iectionis
per aluū
mucosa.

*Mucus
subcruentus, causa
Dysenteriae
mucosae
& Tenesmi.*

dependet, unde sordities illa gignitur. Mucosa verò materia, quæ in dysenteria excernitur, si adeo copiose egeratur, ut reliqua excrementa exuperet, dysenteriae veluti priuatam speciem, albam ob huius prævalentiam dictam, parit, uti & illa mucosa, nunc subcruenta nunc alba materia, quæ in tenesmo exprimitur, hanc deiectionem, tum ob mucum hunc, tum illum conatum præternaturalem reddit. Qui mucus ab exulcerata intestinorum substantia provenit, quæ cum membranosa sit, pus eiusmodi viscosum, uti & in vesicæ ulcere fieri videmus, profert, quæ ab initio dum recens est, sanguinis notas, mox mucum illum tinctum adhuc, postea cum sordescere incipit, ulcus album magis producit, & cum in intestini recti exitu illud sit, ob crassitiem illius, copiosum, & quia podici vicinum, in hoc affectu separatim prodit.

Ob quam causam mucum hunc ad pus potius quam ad aliud referimus, quod phlegma esse quidam voluerunt, illudque saluum, ut sic vim ei tantam stimulandi, uti in pirituita dictum, attribuerent, cum tamen tale nequaquam sit, & conatus in tenesmo potius à læso intestino summè sensili, quam hoc muco purulento, procedat, qui tamen acrimoniam quoque adipisci potest. Quod mucum illum, quem sine dolore è podice prodire Fernelius scribit, attinet, & falso pus aliqui esse crediderunt, illa verò veluti faciem sanguinis è venis podicis, in morbis longis melancholicis præsertim, erumpere docet, fieri hoc fortè eadem ratione, ut in albis uterinis fluoribus, ut sicuti in illis per venas menstruas, sic hic per hæmorrhoidales natura ab alba illa materia, menstruis albis tenacibus non absimili, se repurget.

Pus quâ ratione instar muci cuiusdam in dysenteria, atque tenesmo prodeat, prius ostensum est: sicuti & in colico dolore, quomodo illic interdum exeat, ibidem dictum fuit:

*Pus causa
Dysenteriae
per alium
purulentum.*

Præter quas illius excretiones, ulcere sordido ex dysenteria remanente, pus continuo genitum, purulentam facit deiectionem. Dein & pus purulentam deiectionem eam, in qua citra dolorem illud copiosè & sæpè egeritur, efficit. Quod ab ulcere quodam

magno, admodumque sordido, cum tanta illius sit copia, prodire necesse est; eaque in sede, quæ sit insensilis, cum nullus adsit dolor, atque ideo pars non adeo magnas functiones edens, cum sensim & longo tempore, non subito ægrum consumat. Quod in mesenterio fuisse, eius constitutio ignobilis, & quod intestinis cohæreat, atque sectio demonstrant, sic enim per venas illius in intestina perferri, illicque donec rejiciatur, accumulari potest. A distantioribus locis si prodiret, fortè à iecore, vel liene, per venas easdem meseraicas illis continuatas, eò pervenire posset, quod si fieret, ob ulcera harum sedium, grauvia simul, ut hydrops, aliaque symptomata, superuenirent. A longinquis locis, ut pectore vel capite, pus eò penetrare posse, haud credibile est, etsi varias ei vias excogitarint, per quas si quid permearet, exiguum illud esse, & per venam cauam in venæ portæ ramos transire oporteret, quod tamen potius per emulgentes ad renes & vesicam deduceretur, sicuti illis in locis demonstratum fuit.

Chylus per aluum elabens, Chylosum fluxum, Coeliacum dictum efficit: si ille ob distributionem impeditam, non à venis meseraicis rapiatur, sed in intestinis coacervatus, copiâ suâ interdum, & quia corrumpitur, vel aliis miscetur acribus, acrimoniam stimulans, deorsum propulsus, per aluum eâ quantitate & frequentia, prout redundat, vel colore & consistentia, prout se habet, vel aliis miscetur, ejiciatur. Hoc autem distributionis vitium, vel ob viscerum sanguificationis destinatum imbecillitatem, unde non alliciunt succum, evenit, vel propter viarum & ductuum, hoc est venarum meseraicarum obstructionem. Sed & chylus ex cibo fluido & humido pingui diu continuato, liquidior fluidiorve factus, citius præterlabitur.

Pinguedo vel adeps copiosè excrementis perfusa, deiectiones Vntuosas dictas profert, & si intestina excrementaque admodum inungat, eas accelerat, vix tamen per se nimias reddit. Hæc autem ab assatis assumptis pinguibus, ut oleo, butyro, carne pingui, quandoque procedit, cum qualia

*Chylus
causa
Coeliacæ
passionis.*

*Cibus
potus ex
pingui-
bus, causa*

fue-

sa Deie-
Bione
per aluū
pinguū.

fuerunt, concoctionem præsertim, ut de cibo in lienteria, dictum, effugientia, iterum per aluum exeunt. Adipem quoque vel pinguedinem ex colliquatione facta circa intestina, prodire, qui docent, & colliquationem intestinorum vocarunt, vel persuasi, quod ut in dysenteria putarunt, intestina intrinsecus pingua esse illumque adipem abradi vel dissolui posse, hoc scripserunt, vel quod à mesenterio aut omento, pinguibus hisce membranis intestinis continuatis, adeps in intestina ferri possit, quod si fieret, eum liquefcere potius, ut per venas meseraicas transire posset, oporteret. Quod cum vix fieri queat, nec eum adipem, multoque minus aliis corporis sedibus distantioribus adhærentem, huc peruenire, probabile videtur, cum tantus calor actualis qui eum liquefaciat, intrinsecus exfuscitari minime possit, nec in corde calor, illi adhærentem dissoluat pinguedinem. Qui cum non ad vrinam, ut in febribus hecticis demonstraui-
mus, multo minus ad aluū, ut de pure etiam dictum fuit, peruenire poterit.

Sanguis quo pacto summè irritatis vel eros-
is intestinis, aut ulceratis, cruentas deiectiones pariat, in quibus cum excrementis purus exit, & fluidus in dysenteria, & affectu illi consimili, vel sine illis in hæmorrhoidibus, vel concretus, in ea deiectione, iam prius in affectibus enarratis dictum fuit: Et quomodo dilutus fluxum hepaticum pariat, in sero qui illi tunc præualeat, explicatum fuit.

Cibus quomodo non transmutatus per aluum excretus, lienteriam faciat, in causa priore in cibo & potu fuit expositum.

Curatio.

A Graviores exorfi deiectionum generibus, hisce quæ plus laboris requirunt, primum, dein cæteris curationem accommodabimus, videlicet primum Dysenteria, deinde Tenesmo, & cōsequenter Diarrhœa, Lienteria Hepatico fluxui, Celiacæ passioni, Purulentæ & Pingui deiectioni.

Dysenteria gravis & periculosus est affectus, omni ætati, cum infantes, adolescentes & senes hoc morbo sæpè à medio tollantur, eoque magis, si intestina grauer

læsa sint, quod ex copia cruoris, & carnearum illarum fibrarum, puris & torsionibus magnis ventris cognoscitur. Malum quoque, si accedat inflammatio, existit, febre tunc & convulsionibus sæpè subsequen-
tibus. Si bilis vitellina vel æruginosa vel atra simul prodeat, pessimum, uti & si vires subito consternantur. Singultus superueniens, lethalem esse ostendit: Peruersum quoque si continuò sine intermissione de-
jiciant: aut si cessante deiectione cruenta, nouus fluxus dilutus cruentus instat hepatici, tunc alia foeda diarrhœa, cadauerosi odoris excrementa putrida proferens, superueniat: Hæc enim omnia mortem præsa-
giunt, quæ nunc citius septimanâ primâ, alias secundâ, nonnunquam tertiâ demum superuenire solet. Si symptoma sit februm continuarum aut malignarum, vel pestilentialium, & proin contagiosum, plures tunc interficit. Aliquando in vlcus sordidum desinit, & tunc cessante dysenteria, diu postea purulentâ deiectione laborantes, consumuntur, & tandem extinguuntur.

Curandi scopus in eo versatur, ut causam morbi propellamus, siue bilis, aliūve peruersus humor, aut medicamentum erodens vel venenum existat; quod euacuantibus & abstergentibus efficimus; dein ut illius violentiam infringamus, quod lenientibus, anodynis, stupefacientibus & antidotis, si venenatus sit humor, perficitur; admittis refrigerantibus, si inflammatio simul adsit: Dein ut morbum ipsum, qui excoriatio vel exulceratio existit, siccantibus, quæ vlcera & excoriationes curare, illis in locis ostendimus, sanemus, additis semper adstringentibus, quæ præterquam quod siccant, fluxum immoderatum cohibeant. Quæ omnia sequentibus præstabit.

Inter euacuantiæ remedia, purgantia ut humorem vitiosum, siue biliosus aut alius acris & peruersus existat, qui intestina vellicat vel exulcerat, abstergant, & à loco affecto deorsum propellant & euacuent, propinantur, eoque citius, si profundius in intestinis, tenuioribus præsertim, lateat causa morbifica, cum clysmata tam exactè

Dysen-
teria cu-
ratio.

ad peruenire nequeant: Statimque ab initio morbi, vt eò celerius, antequam grauius lædat, propellatur, exhibenda, & si non satis deturbetur vna vice, repetenda. Eaque eligenda ex purgantibus, quæ adstrictionem aliqua simul prædita, nimiam deiectionem, quæ ratione morbi & medicamenti violentioris, alioquin sequeretur, aliquo pacto moderentur.

Et cum Rhabarbarum hoc præsertim præstet, illud præ cæteris in hunc vsum exhibetur, tostum prius vti volunt parum, ad maiorem adstrictionem illi conciliandam; quod quidem si leuiter fiat, rectius vt in puluerem redigatur, conueniet, sed si nimium assetur, inualidum & inutile redditur, vnde non adeò in eo erit laborandum, sed potius viribus eius adhuc integris, exhibendum, idque in principio, vt rectius euacuet, faciendum. Nam si postea repeti debet, tunc potius si maiorem in eo adstrictionem requirimus, aliquo pacto torrendum. Daturque à 3.ß. ad 3.iiij. vel v. vel illius puluis, vel prius infusi & expressi dilutum; puluerem diluendo cum Vinorubro, vel aquâ Rosaceâ, Plantaginis, Oxylapathi, Acetosæ, aliisve, vel hisce simul mistis; quâ ratione & infusum illius sit: addendo interdum & de succo Cydoniorum, Plantaginis, vel Syrupos eorum, aut de Rosirubris siccis, Myrrilorum ad 3.j. Vel Hypocistidis aut Acaciæ 3.ij. nonnunquam & cum simul siccare vlcus cupimus, pulueres cornu Cerui vsti, sem. Rosarum, Plantaginis, aliūve aliquem ex mox enarrandis pulueribus siccantibus.

Rhabarbaro nonnunquam cortices Myrobalanorum citrinarum iungimus, cum & hæc euacuando nonnihil, aliquid adstrictionis post se relinquant; miscendo maiori ferè vel dupla, cum inualidiores sint, cum rhabarbaro quantitate, eademque formâ vel siccâ vel liquidâ, admistisque cæteris cum eo exhibendo.

Præter quæ ex iis quæ vtrumq; præstant, etiam Syrupus rosaceus solutius censetur, ex infusionibus factus, maximeq; Rosarum rubrarum; qui præter vim purgandi, à rosis adstrictionem aliquam quoque sortitur, ad-

modumque conuenit, eoque amplius, si prioribus permisceatur, vel ex infusione Rhabarbari, vti fieri solet, simul paratus sit, & per se tunc ab 3.j. ad 3.j.ß. propinetur.

Ex hisce omnibus, additis simul quæ vlceri sanando competunt, talis quoque potio fieri potest:

℞. rad. Liquiritiæ 3.j.ß. foliorum Plantag. recent. aliquot, & flor. Rosarum p.j. Passulorum 3.j. Tamarindorum 3.vj. cortic. Myrobalanor. citrinarum infus. prius in Vino 3.iiij. decoquantur in Hydromelite, & in colatur. infund. Rhabarbari elect. 3.j. Spicæ 3.ß. fiat expressio, adde syrup. Cydon. vel de Rosis rubris siccis 3.j. Detur.

Quando mucosa magis quàm biliosa, vel alioquin copiosa sunt excrementa, nec dum adeò cruenta, etiam alia exhibentur, vt Tryphera Persica vel Sarracenia Nicolai, ad 3.ij. cum Syrupo adstringente, Aquisque conuenientibus; Vel potius ex Myrobalan. citrin. vel Indis 3.ij. & Tryphera Sarrac. 3.ß. dissoluendo vt supra.

Catholicon etiam datur ad 3.j. adiecto simul Rhabarbaro & Myrobalanis, aliisve iam expositis. Hiera quoque probatur. Agarici 3.j. exhibet Dioscorid. quod validius absterget minusque acre erit & irritabit, si in syrupo vel Melle rosaceo infusum, adiecto Rhabarbari diluto exhibeatur: Sunt qui semen Carthami in Sero lactis infusum exhibent; Alij Tamarindorum pulpam vel decoctum cæteris permiscunt, qui bilis feruorem simul reprimunt. Ad fortiora, irritantia præsertim & inflammantia intestina, transire periculosum.

Vomitum in dysenteria tunc tantum, si causa morbi ad ventriculum vsque feratur, vel illic fomitem habeat, probatur. Et si ab adurente pharmaco, vel venenato ortum habuerit, & de eo aliquid adhuc circa superiora hæserit, vomitus sponte factus, vel arte impulsus, ea ratione conueniet.

Sanguinis per venæ sectionem emissio, in dysenteria parum iuuare poterit, cum è venis meseraicis, quæ in intestina sanguinem amandât, nihil detrahat, nec tantus illius sit fluxus, qui reuulsionem hanc exigat, viresq; quæ alioquin in hoc casu mox labuntur, amplius

plius labefactaret. Hæmorrhoidum tamen spontanea apertio, nec immoderatus fluxus, hic deriuationis gratiâ aliquid conferret.

Sudores fluxiones hæcæ compescere aliquo pacto possunt, qui proin viribus constâ-
tibus in huc vsum, maximè si naturâ eò vergat, integumentis, lateribus, lagenis calidis, aliâve arte promoueri poterunt. Idem vrinarum facit prouocatio, & materiam ex parte ad vias deducit vrinarias. Quo nomine sequens dari poterit: R. quatuor seminum frigidorum Maiorum cum cortice contusorum ana 3.ij. Capilli veneris M.ß. radic. Asparagi 3.j. vel seminis Asparagi 3.j. Sumach 3.ij. Coriandri præpar. Anisi ana 3.j.ß. bulliant in iure; Bibat cum sitit.

Clysmata, si intestina crassa affecta sint, cum ad locum affectum perueniant, topicâque fiant remedia, præ cæteris ad curationem conuenient: si verò profundius in tenuibus intestinis malum lateat, cum eousq; non tam faciliè ascendat, non aded tunc vlcæris causâ insignem vsum præstabunt, nisi quatenus in hoc affectu, prout parantur, nunc torsiones consuetas mitigant, nunc illuuiem in via retentam, ad excretionem promouent, vel etiam intestina constringendo, fluxum immoderatum non nihil sistere possunt.

Hæc autem si crassa intestina læsa sint, vt retineantur diutius, paruâ quantitate injici debent; si tenuia, vt sursum quoque portio aliqua illorum deueniat, copiosiore; Et si sedem affectam attingere possunt, sæpè repeti.

Parantur autem hæc, tam acris humoris erodentis, quàm excoriationis vlcærisve ratione, tum ex lenientibus, abstergentibus & siccantibus.

Lenientia clysmata cum humoris acrimoniam contemperando, atque intestina lentore obducendo, dolorem mitigent, & læsionem grauiorem impedian, dolore urgente, tam ab initio, quàm postea quoque si perseveret vel redeat, vel separatim, vel aliis permista, vsurpantur: Additis interdum & necessitate exigente, stupefacientibus; cum sensum intestinorum minuendo, dolorem leniant, & fluxum insuper compescant. Suntque etiam hæc lenientia, ad sanatio-

nem vlcæris accommodata, si aliqua abster-
gendi leuiter, siccandique vel glutinandi vi simul sint prædita, qualia quædam ex illis existunt, vel adiectione aliorum, clysmata vtrumque præstantia ex illis concinnantur.

Abstergentia clysmata, cum non solum humorem irritantem & vlcærantem abluant, sed & vlcus à sordibus & pure repurgent, ad sanationem vlcæris, cæteris quæ illud siccando sanant, vt vlcærum sanatio requirit, præmitti, semperque ferè illis adhuc, quamdiu vlcus est sordidum, misceri debent, & pro ratione illuuii repeti, aut intermitteri. Quæ tamen ne vlcus nimium irriterent, in parte summè sensili, & inflammationem, vt aliquando fit, accersant, moderatè illud facere debent, nisi sordidum admodum aut putridum factum vlcus fortiora requirat; post quorum vsum si ex irritatione dolor sequatur, lenientibus tunc immixtis, vel cæteris permixtis, corrigetur.

Siccantia enemata, quæ iam vlcus repurgatum sanant, vlcere absterfo vsurpantur: inter quæ alia, vt de excoriatione, & vlcæribus dictum, glutinosa cum sint, veluti vlcæra glutinando, alia siccando, consolidant, & sanant. Ex quibus quæ adstrictione quædam simul prædita sunt, validius siccant, & constringendo fluxum sistunt. Quibus si fortiora sint, in fine tantum vtimur, prius leuioribus adhibitis, miscendo quoque, si vlcus nondum satis repurgatum sit, adhuc quædam detergentia. Et cum validioribus vtimur adstringentibus, fluxu immodico illud requirente, glutinosorum permixtione, ne nimium exasperent, effcimus, illisque sanationem minimè impedimus, sed potius vt rectius & tutius fiat, promouemus. Horum autem omnium formæ accommodatiores sunt sequentes.

Inter lenientia clysmata, Lac solum etiâ infusum, non solum dolorem lenit, sed & abstergendo glutinandoque vlcærationes illas sanat. Amplius verò absterget, si serosiore vtamur: glutinabitque magis, si calculis ferræve ignitis immixtis, feri illius portionem absumamus, sicque glutinosum magis reddamus.

Efficaciùs hoc præstabit doloremque sedabit, si ad Lactis ꝑ. j. Vitellum oui vnum vel alterum addas, magisque adhuc; si mucilaginea seminum Psylli, Cydoniorum ad ꝑ. iv. permisceas. Vel horum loco aut cum illis, Sæui recentis ꝑ. j. cum illud etiam non nihil secus ac alia pinguedo, vt in cutis abrasionibus dictum, excoriationes sanet; probaturq; imprimis seuum hircinum, inde ceruinum, sed & hoedinum & caprinum conuenit, maxime durius à renibus sumptum. Quod dolore vrgente in pari quantitate olei Rosacei dissoluitur.

Cum simul abstergendum & leniendum, Lacti cæterisq; Sacchari vel Mellis ꝑ. j. β. vel prius miscemus: Et si magis sanare velimus seu glurinare, succi Plantaginis ꝑ. ij. iij. vel iv. vel alia in solidantibus explicata.

Lac seu emulsio ex Amygdalis, vel cremor Hordei seu Oryzæ, quem Oryzogalon vocant, sola vel inuicem mista, iniecta, admodum leniunt, quibus & cætera permisceri possunt.

Ius Veruecis, Caponis, aut Pulli, additis Vitellis & Mucilaginis, vt in colicis doloribus, sic hinc quoque lenit, quibus & alia addi possunt.

Decoctum leniens & glutinans: ꝑ. radic. Altheæ ꝑ. j. Hordei mundi vel Oryzæ ꝑ. j. feminis Lini vel Foenogr. Cydoniorum ana ꝑ. j. semin. Psylli. ꝑ. β. & propter flatum femin. Anisi ꝑ. ij. florum Chamomill. vel Anethi ꝑ. j. fiat decoctio in Lacte vel lure, addendo Vitellos, Sæuum, & si opus sit Oleum, vt in lacteo clysmate dictum fuit.

Cum Lacte, Iure & Decocto, simplicibus vel mistis, seu clysteribus ex illis paratis, dolore vrgente, Philonii ꝑ. j. vel ij. permiscemus, Perfici præfertim, cum fluorem quoque fiat. Vel pilularum Cynoglossæ ꝑ. j. vel ij. dissoluimus. Aut vt cum successu sæpe feci, syrupi de Papauere ꝑ. j. β.

Opii ꝑ. j. vel ꝑ. j. similiter cæteris loco aliorum permiscere possumus, sed tutius opio iam in cæteris compositionibus diligenter misto, & vt inquit fermentato, vt.

Olea sola, necessitate summâ doloris vrgente, injicere cogimur, ad eum compescendum, cum alioquin quia pingua vlcerebus

inimica sunt, & ad sanationem vlcerebus nil faciunt, sed eam potius impediunt, omittantur. Inter hæc Amygdalarum dulcium oleum quandoque sumitur, sed rectius oleum Rosaceum, adstrictione simul aliqua præditum, eoque magis si Omphacinum sit, vel illi portio olei Cydoniorum vel Myrtini addatur. Cui Mucagines & Vitelli ouorum, aliaq; addi simul possunt.

Abstergens clyster communis hic in usu est: ꝑ. decocti Hordei integri ꝑ. j. Sacchari impurioris rubri vocati (vipere vilioris puro, non autem quoddam magis abstergat illo, clysteribus indi soliti) vel Mellis ad ꝑ. ij.

Huic cum lenire simul volumus, Vitelli ij. ouorum adduntur, & vt adstrictionem aliquam simul habeat, Mel rosaceum loco communis, & aliquando Saccharum loco alterius sumitur, Resinæ lacticæ aut alterius ꝑ. j. dissol. in Vitello oui addita, absterfionem & glutinationem valde promouet.

Serum solū & Hydromel iniecta abstergunt. Quibus & ea quæ decocto hordei miscebantur, obseruatis iam dictis, permisceri possunt.

Aliud clyisma abstergens: ꝑ. rad. Liquir. ꝑ. j. β. Ficum Passularū ana ꝑ. ij. Furfuris ꝑ. j. Hordei, Cicerum, vel Pisorum rubr. Lentium vel Lupinorum ad ꝑ. ij. fiat decoctio in Sero lactis vel Hydromelite, & in s. q. dissolue Saccharum vel Mel aliæ quædam, vt in decocto hordei dictum fuit.

Fortius erit, in fordidioribus vlcerebus ac commodum, si huic decocto Parietariam vel Betam addas. Et adhuc validius absterget, si amara, vt Centaurii, Absynthii, & Gentianæ portionem addas: Et prædicta in lixiuio, debiliore tamen, decoquas. Sed & si putredo & corruptio sequatur, adhuc efficaciora injicimus, vt Lixiuium solum vel Vrinam. Aquam salis; Muriam & Garum infundere iubet Diosc. Aliqui & ad erodentium usum, vt in externis vlcerebus putridis, progrediuntur, vnguentumq; Egyptiacum dilutū injiciunt; Vel etiam ea quæ ex Auripigmento paratur: Ex quibus tutiora illa erunt, quæ in oris vlcerebus sic parata descripsimus, cautè interim ea administrando & cum Lacte, Cremore hordei, Oryzæ, similibusq; lenientibus contemperando.

Ad glu-

Ad glutinandum seu consolidandum vlcus, enema leuiter siccans, nec adeo adstringens, primum fit ex Lacte vstulato filicibus vel chalybe, in quo Rosæ decoctæ sint.

Alterū fit ex decocto Hordei vel Oryzæ, torrefactis prius & Ros. rubr. P.j. addendo vtrique clysmati interdum Vitellos ouorū ij. prius affos: Aliquando & Mel rosaceum, & cum magis operari volumus, succi Plantag. 3.j. vel paulò plus.

Tertiū clyσμα cum glutinare & adstringere simul volumus tale erit: R. rad. Consolidæ maioris, Tapsi barbati an. 3.j. foliorum Plantaginis, Solidaginis an. m.j. Rosarum rubr. Hordei assi an. P.j. semin. Myrti 3.ij. vel Vuarum 3.β. fiat decoctio in aqua Cisternæ, dissolue in l. q. Mellis rosac. 3.j. β. Albumen oui vnus, vel infusion. Gummi tragach. 3.j. Sæui hirci vel capræ 3.ij. succi Millefolij vel Polygoni 3.j. fiat clyster.

Quantum quod magis siccabit vlcus & adstringet hoc pacto: R. rad. Bistortæ vel Tormentillæ 3.j. β. Consolidæ 3.j. herbarum Bursæ vel Virgæ pastoris, Polygoni vel Herniariæ, Equiseti, Pilosellæ an. m.j. Balaustrorum, Capul. Glandium, Nucis cupressi an. 3.ij. Lentium excortic. Oryzæ tostæ an. P.j. fiat decoctio in Aqua extinctionis ferri fabrorum, dissolue succi Plantagin. 3.ij. Vitellos ouorum affos ad temperandum nimiam adstrictionem, num. ij. fiat clyster.

Horum clysmatum decocto alia quoque addi possunt adstringentia & consolidantia, vel quorundam loco substitui, vt Sanicula, Pyrola, Virga aurea, aliæve traumatica; dein & folia Myrti, Lentisci, Oleæ, Sumach, Ceterach, Agrimonie, Rubi, Rumicis sanguinei, Salicis, Linguae passerinæ, flor. Chamæleontis, Gallæ, cortic. Granatorum; Item fructus aliqui adstringentes sicci: Et dissolui ex supradictis quædam, vel succi enarratarū plantarum quarundam:

Succus Plantaginis solus etiam iniectus conuenit, vel Lacte aut decocto Hordei nō nihil contemperatus.

Gummi tragachanti 3.ij. si in Lacte vel decocto Hordei, aut clysmate primo vel secundo dissoluantur, aut potius infusio ipsius facta cum aqua Peculi rosarum vel Planta-

gin. illis misceatur, optimum erit ad sanandum enema.

Efficacissimum est, si infusio gummi Tragachanti cum succo Plantaginis injiciatur, & simul plurimum mulcebit dolorem, addito Sæuo hircino, vti dictum.

Loco Tragachanti vel vnà cum illo gummi Arabicum vsurpatum idem præstat: vti & Thus, Mastiche, Sarcocolla. Quæ omnia diluta, vti dictum, glutinando potius operantur, nec vlcera sic vti valde adstringentia, exasperant.

Exsiccati succi, veluti Acacia, Hypocistis, Sanguis draconis, si in supradictis clysteribus glutinantibus 3.j. ad ij. dissoluantur, adstrictionem illis addunt, in aliis adstringentibus eam augent.

Idem facit Hæmatitis lapidis succus rubeus, attritione cum aqua Rosarū vel Plantagin. elicitus, & 3.ij. circiter pondere ceteris additus, glutinans & sanguinis fluxum compescens.

Terræ siccantes pingues nec asperæ, idem quoque præstant, vt Boli, Lemniæ dictæ, similiter 3.ij. quantitate mistæ.

Trochisci de Succino vel Albi Rhazis ad 3.ij. diluti Lacte, succo Plantagin. vel decoctis, aut additi aliis clysteribus, vti in excoiationibus seu exulcerationibus vesicæ, sic & hic valde profunt. Et si cum opio parati sunt, dolorem admodum sedant.

Præter hæc aliis pulueribus vti, cum in liquore mox subsideant, partemque facile exasperando irritent, non adeo necesse est. Licet Chartam combustam, Chalcithim aliqui quoque permisceri debere, doceant.

Multò minùs vnguenta addere propter vntuositatem commodum videtur, vt Rosaceum, Pompholygos, Diapalma, Diuinū, quæ aliqui immiscent.

Sanguinem Cerui in dysenteria infusum laudant.

Per os exhibita, alia præter purgantia iam descripta, eò magis si circa superiora intestina affectus consistat, proderūt, dantur q̄ in eum vsum, sicuti clysmata, vt prout dolor morbusve requirit, vel leniamus, vel abstergamus, aut exulcerationem sanemus, hæc remedijs.

Lac vaccinum, cum omnes vlcera in-
ternorum curandorum, leniendo, abster-
gendo & glutinando indicationes compleat,
hic vtiliter quoque datur, addito Saccharo
vel Melle, imprimis Rosaceis, cum detergere
magis volumus. Vel Caprinum damus,
cum serosiore vti volumus.

Si verò glutinare potius velimus, Lac vac-
cinum vstulatum filicibus ferròve (fumen-
do purius vel chalybem) vel Ouillum, sim-
plex vel etiam vstulatum exhibemus.

Lactis 3.ij. si succi Plantagin. 3.j. addas &
totidem Sacchari rosat. tab. admodum sana-
bit. Quibus & alia permisceri possunt.

Consolidæ radix in Lacte vstulato cocta
commode exhibetur.

Inter iuscula, leniens Ius fit ex decocto
Carnis vitulinæ, optime & diu coctæ.

Brodium Oryzæ mundæ bene coctæ, vti-
lissimum ad sanationem.

Decoctum ex Hordei bona quantitate, &
Liquiritiâ, cum Saccharo vel Melle, ad de-
tergendum exhibetur.

Ad sanandū decoctum: R. rad. Tormen-
tillæ 3.j. rad. Consolid. & Alceæ an. 3.ß. Plan-
tag. Burfæ pastoris an. M.j. Rosarū rubr. sicc.
P.j. Sumach vel Vinaciorum 3.ij. coquantur
in Aqua pluuiali vel cisternæ, addito & pau-
co Vino rubro, colaturæ addatur Sacchari
rosat. tabul. q. f. Bibat duabus vel tribus vi-
cibus.

Vel: R. rad. Quinqufol. vel Bistortæ 3.j.
rad. Nenuphar. 3.vj. herbarum Millefolij vel
Equiseti M.j. Labruscæ P.j. sem. Plantaginis
& Acetosæ vel Lapatij an. 3.ij. coquantur in
aqua Plantag. & paucō Vino, & in colatura
dissolue syrupi Cydoniorum vel alterius, vt
sequitur q. f. fiat potio: Bibat vt suprà.

Præter hæc decocta, ex aliis quoq; plan-
tis alia fieri possunt, vel illarum aliqua hæc
decoctis permisceri. Veluti sunt radix Cario-
phyllatæ, Filicis, Acetosæ, Polemonij, Ali-
smatis: Et ex herbis vulnerariis aliqua, vt
Solidago vtraq; Pyrola, Pilosella, Fragaria,
Potentilla, Sanicula, Virga aurea, & præter
has Lyfimachia, Scordium, Eupatorium, Po-
lygonum seu Herniaria, Phyllitis, Potentil-
la, Balsamine, Clematis & fol. Quercus, Ru-
bi, Myrti, & Lentisci. Quibus status discu-

tientia, propter tormina, vt flores Chamom.
sem. Anisi aliquando adjicimus.

Vt causa morbi propellatur simul dum sa-
nare volumus, Rhabarbarum interdum ad-
miscemus aliis, vel hoc pacto: R. Rhabarba-
ri torrefacti 3.j. Coriandri torrefacti 3.ij. in-
fundantur in Vino rubro vel succo Cydo-
niorum, parum ebulliant, colentur; adde sy-
rupi de Rosis rubris siccis 3.j.ß. fiat potio:
Pro duabus vicibus. Si Acaciæ vel Hypoci-
stidis 3.j. addas, efficacius operabitur.

Boli aut Spodij 3.ij. vel iij. si simul in hisce
decoctis coquantur, efficacius operabuntur:
Vel Mastiches 3.ß.

Mastiches solius 3.ß. decoctum in aqua
Rosarum vel Plantaginis conuenit.

Ceræ in iusculis decoctum probat Diosc.

Stercoris asinini decoctum bibitum, ali-
qui pro secreto habent; quod minus senti-
tur, si in Vino coquatur, additis aliis feeto-
rem illius corrigentibus.

Lumbricorum decoctum, si insciis offera-
tur, commodum.

Vina medicata sūt ex iisdem, in Vino ru-
bro vstulato quoque, interdum Chalybe vel
Auro infusis & maceratis vel leuiter coctis,
imprimis rad. Tormentillæ, Bistortæ, vnde
stiptica vis vino accedit, nec ingratum inte-
rim saporem illi conciliant. Potestque tunc
Saccharo addito, paucosq; Cinamomi vinum
instar Hippocratici gratum fieri.

Si Vino rubro, Pruna syluestria matura
parumper exiccata indas, stipticum fit nec
ingratum. Quod & aliis fructibus adstrin-
gentibus fieri potest.

Infusionem Oryzæ in Vino rubro factam,
plurimum profuisse aliqui testantur.

Succi per se etiam exhibiti competunt,
præcipue Cydoniorum, coctus prius sine ad-
ditione, ad consistentiam syrupi vel rob,
dando sæpe cochlear. j. vel ij. Qua ratione
etiam aliorum adstringentium austeriorum
potius quam admodum acidorum, vnde
tormina sequerentur, succi exhiberi pos-
sunt: Vt è Pyris austervis vel Granatis mediij
saporis Vinosis dictis recentibus integris
cum cortice, expressus succus: Et de Cornis
aliisve, inter ea ex quibus edulia parantur,
explicatis.

Plantaginis succus crudus ab ʒ. iij. ad iij. exhibitus admodum sanat, & si inflammatio addit, eam compescit, qui & cum brodio vel lacte alijsve dari potest.

Hederæ terrestres succum propinatum, plurimos à morte liberasse testatur Hollelius.

Traforum lacteum succum aliqui similiter exhibent.

Syrupi aliqui austeri potius quàm vehementer acidi, sæpè per cochlearia exhibentur; vt ex vitatis syrupus Cydoniorum vel simplex, vel cum Vino coctus, Miua dictus, Myrtillorum, de Rosis rubris siccis: Vel parati ex succo Plantaginis alijsve, vel coctis supradictis, adiecto saccharo in formam syrupi coctis. Aliqui syrupum Cydon. maxime prodesse putant. Si in illius ʒ. j. seminis Nasturtij torrefacti ʒ. j. decoquatur.

Iulepi etiam conueniunt & sitim simul resingunt. Consuetum est iulep Rosaceum, quod ex aqua Rosarum & Plantaginis si coquatur, efficacius hinc erit.

Vel si syrupi prædicti cum aqua Chalybeatâ, vel stillatiis liquoribus, florum Rosarum vel Calicum, florum Ligustri, foliorum Plantagin. Burfæ pastoris, Quercus, Aparine, &c. diluantur.

Inter ea quæ comeduntur, alimenta medicamentosa, vt Pulces admodum nutriendos & consolidantes ex sequentibus fiunt.

Oryza cocta in Lacte, additis Vitellis ouorum, & succo Hederæ terrestres optimum est remedium, quo multi in longinquis nauigationibus, fame pænè enecti dysenterici, vt testatur Lerijs in sua historia, restituti fuerunt. Quæ & in Lacte amygdalino cocta probatur: Dein & Lac vtrumque vitulari prius potest: Si auro id fiat vtilius censetur.

Amylum similiter coctum, vel addito interdum Ovo conuassato vel illius Vitello, Aquâ rosac. & Saccharo ac Butyro, vt nostri Germani parant, dictum Ammelmus. Butyri loco aliqui Vituli pinguedinem, potius addunt.

Milium excorticatum cum Lacte coctum idem præstat, addito Oui vitello. Alij Putamen illius cum Ovo assant, & propinant.

Auena munda integra cocta; vel Farina illius, vt Germani Auenatum ab ipsis Heremus dictum parare solent, admodum apud eosdem dysentericis in usu est.

Eiusmodi pultibus ex Oryza, Amylo, Auenâ, Milio coctis, alia quoque addi possunt, vt efficaciores fiant: vt farina Fabarum, radix Tormentillæ, semen Plantaginis, Sumach, Bolus aliæve.

Panis coctus ex Farina cum albumine Oui subactâ, addito puluere Gallarum, vel corticorum Granatorum, contritus exhibetur cum Vino.

Fabas in Posca decoctas laudat Dioscorides, alij etiam Lentesc.

Ex alijs cibis medicatis, prodest Ouum depositâ testâ, coctione in Aceto induratum: vel frixum cum Ceræ nouæ ʒ. j. dissolut. in fartagine: Quibus & puluis Sumach, vel semen Plantaginis vel folia Cannabis, misceri, eaque exhiberi possunt.

Sanguis frixus, Hirci, Capræ, Cerui, comestus, à Discoride probatur. Imprimis Leporinus, frixus vel coctus, cum farina Hordei. Turtur assus comestus peculiariter prodesse creditur, nonnunquam & deplumatus & euisceratus infarcitur granorum Myrti & Ceræ nouæ an. drach. ij. vel minori quantitate, coctusq; ad comedendum tribus continuis diebus datur, integer adhuc, vel confusus prius.

Huius infarctui etiam Thuris addi possunt drach. ij. & de sanguine Columbæ siccato drach. j. aliaque adstringentia, vt semen Plantaginis vel Rosæ, Sumach, & Cinamomum ad gratiam.

Inter fructus, Cydonia, Pyra, & Poma parum austerâ, non cruda, quia ventrem conturbant, sed cocta vel tosta conceduntur & profunt: è quibus, varia conditurâ, etiam fiunt edulia, tam ex recentibus, quàm prius siccatis. Si Pyra aut Cydonia excauata Cerâ novâ impleatur, & postea assa comedantur, admodum probantur.

Mespila, Sorba, Corna, Cerasa & Pruna austeritatem habentia, cum maturari incipiunt potius, quàm cum plenè matura sunt, similiter præparata, adstringendo iuuant.

Vuæ spinæ fructus laudatur, vti & Rubi: Mora item, quæ tamen cum tormina facile excitent, non temerè dabimus.

Lori arboris baccas, vti & Oxyacanthæ, cõmendat Dioscorides: Siliquas item deuoratas.

Castaneas vulgus probat tostas, vti & Auellandarum nucleos, tunicâ rubrâ inuestitos: Dein & Amygdalas crudas esitatas, sed facile stomachum grauando nocere possunt in debilioribus.

Inter olera Portulaca cocta comesta, lenit admodum asperitatem.

Pulueres diuersi, siccando & adstringendo vel etiam proprietate quadam agentes, vel simplices, cum per se efficaces sunt, vel inuicem permisti, à 3. j. ad 3. j. bibendi propinquantur, plerumque, cum Vino rubro austero nonnihil, vel cum Aqua chalybeata, aut Lure aliquo, vel Lacte, aquisve Plantaginis aut aliarum Plantarum, addendo interdum & Saccharum, Mel, Syrupos ad gratiam vtiles, aliaque.

Conuenit ad hanc rem puluis radicis Tormentillæ, Bistortæ, quæ cum insipidæ sint, non ingratae sunt gustui. Nymphaeæ radix mirificè in dysenteria & quibusvis fluxibus accommodata est: vti & Alceæ, Consolidæ maioris, Polemonij, & Cariophyllatæ radices.

Herbæ Millefolij puluerem probat Dioscorides. Item Conyzae mediæ, Scordij, & Tragi cacuminum. Præter quas & aliæ vrsurari possunt, vt Pilosella, Gnaphalium, flos Solis cum radicibus, Verbasci lutei medium seu cor, vel aliqua ex illis, quæ in decoctis explicatae fuerunt, siccatae, puluerisatæ, vt Equisetum, Balsamina, &c.

Flores Hederæ, Cisti, Palmaeque Christi odorati illi & Amaranthi purpurei elegantes flores, vti Granatorum, Balauistia siccata & puluerisata, similiter profunt. Vti & Rosarum rubrarum placenta, in fundo alembici, post aquam elicitam remanens.

Fructus Rosarum cum lanugine & nucleis, siccatus & puluerisatus valde efficac. Vti & racemi Berberis similiter præparati.

Malum granatum integrum torretur &

vsque, donec in puluerem redigi possit, & sic exhibetur.

Nuclei seu semina Rosarum rubrarum separatim etiam dantur, vti & Granatorum acidorum & Passularum maiorum, minorum, Vuarumve aliarum nuclei.

Nasturtij semen vel solum propinatum vel aliis mistum, singulare plerique in dysenteria censent esse remedium, quod cum acre sit & veluti adurens, torrendo prius emendant, vel admiscendo alia. Probatur & semen Tamaricis.

Semina Oxylapathi seu Lapatij acuti, vel Sanguinarij, vel Acetosæ, eundem ferè effectum habentia, puluerisata, in multis etiam sola propinata profuerunt.

Glandium nucleorum afforum puluis mira præstat. Vti & Castanearum: Fagineas glandes idem efficere docent.

Tunica interior Castanearum lanuginosa, vti & nucleos inuestiens, Glandium, Auellandarum rubrarum puluerisata.

Thus, Mastiche, Myrrha, Tragachantum, integra deglutienda, vel puluerisata bibenda exhibentur.

Genitale Cerui, efficax esse censetur, cum Vino rubro datum.

Cornu Cerui crudum vel vstum, ossaque Bouilli femoris, profunt.

Coagulum Leporis & Hædi magni censentur. Equinum addit Dioscorides.

Adipem caprillum cum Polenta & Rosis præscribit Diosc.

Stercus Leporinum vel Caninum aut Asininum, cum Lacte vstulato datur.

Terra Armenia quam Bolum vocant, vel alia Pinguis, inter quas præfertur Lemnia, propinata. Item Corallium rubrum, Crystalus, Margaritæ, Sapphyrus.

Alumen aliqui cum Ovo propinant.

Sal cum admistione seminis Rosarum, Dioscorides condimenti loco cibis admiscet. Cui & alia misceri possunt.

Compositi ex his varij sunt pulueres, eadem mensurâ & ratione, vt de simplicibus pulueribus dictum, propinandi: Vel admiscendo Saccharum, rosaceum præsertim, maioreq; tunc quantitate, cum crusta Panis in Vino intinctâ, aliòve modo exhibendi.

Primus sic fit: R̄. rad. Tormentillæ 3.j. rad. Bistortæ 3.j. feminis Lapatij vel Acetofæ 3.j.β. Plantaginis 3.j. Coralli rubri 3.β. fiat pulvis subtilissimus: Ad vsum vti dictum.

Alter: R̄. huius pulveris mediam partem, hoc est 3.ij. adde feminis Rosarum, Myrillorum an. 3.j. Balauſtiorū, cornu Cerui vel Spodij vti an. 3.β. Margaritarum in diuitibus 3.β. fiat pulvis.

Tertius, si amplius adstringendum, conueniens: R̄. insuper cum prædictis, Gallarum 3.j. Sanguinis draconis vel Acaciæ 3.β. Boli vel Terræ Lemniæ 3.j. Si magis adhuc, lapidis etiam Hæmatitis 3.β.

Pulvis Glandium mirè glutinans & sanans: R̄. glandium Quercus nucleorum asforum 3.j. feminis Coriandri præparati 3.j.β. femin. Portulacæ, Psyllij an. 3.β. fiat pulvis. Possunt & Castanearum assarum nuclei addi, vel loco Glandium sumi.

Si amplius glutinare velis, huic pulveri misce Amyli 3.j.β. gummi Tragachanti parum asci 3.j.

Si simul amplius ficare & adstringere velis, de prædictis pulueribus, à 3.j. ad 3.ij. misce.

Ex cineribus pulueres aliqui facti, admodum extolluntur, & vt cæteri propinantur. Veluti Leporis viui vel potius modo iugulati in vase fictili bene obturato, in furno vsti, cinis, maximi vsus esse censetur.

Turturis vel Cochlearum terrestrium cum putaminibus vstarum cineres, æque extolluntur.

Qui ex vtrisque parati cineres, etiam aliis pulueribus dictis misceri sicque vsurpari possunt. Cum turture alij Bolum, Sanguinem draconis & Mumiam miscent, sicque vrunt, eoque modo vtuntur. Alij cineribus cochlearum Gallas, parumque Piperis albi miscent, sicque propinant.

Vel talis sit cinis: Pannus cannabinus immergatur in succi Plantaginis partibus duabus & Aceti Rosacei parte j. in quibus Alaminis & Boli portiunculæ dissolutæ sint: ubi bene madefactus fuerit, siccetur, postea comburatur, cineresque, vti sæpè iam explicatum, propinentur.

Trochisci de Succino vel de Spodio vel de Terra sigillata cum semine Acetofæ, vel Ramich, separatim vel simul ad 3.β. indies sumpti valde profunt. Dantur puluerisati cum Vino rubro aliòve liquore addito ad gratiam si velint, Saccharo rosaceo vel Syrupo aliquo. Vel excipitur pulvis conseruæ Rosarum antiquæ, vel aliis mox dicendis, aut syrupo Myrrino, atque instar pilularum, vel boli deglutitur.

Ex cõseruis & condituris, fiunt sequentia electuaria: R̄. conseruæ Rosarum antiquæ, conditur. carniū Cydoniorum an. 3.j. conseruæ rad. Consolidæ 3.β. Coralli 3.j. trochiscorum de Terra sigillata vel alterius alicuius pulveris, ex præcipuis simplicibus vel compositis 3.j. Nucis mosch. assæ, Cinamomi an. 3.β. Sacchari rosac. tab. q. s. fiat conditum, quod mixturam vocamus.

Vel: R̄. conseru. & condituras prædictas, addendo quandoque etiam eas quæ parantur ex Sorbis, Cornis, Rosarum fructu, Mespilis aliisve adstringentibus. Item pulueres aliquos & Rhabbari toſti 3.j. excipiendo syrupo Cydoniorum, vel Miua, vel aliis Syrupis supradictis, vel Succis.

Micleta Nicolai ex myrobalanis, mastiche, gummi arabico, sumach, balauſtiis, Spodio, feminibus nasturtij & carminatiuis, parata compositio, vtiliter in dysenteria cæterisque alui fluxibus datur.

Nasturtij feminis toſti & puluerisati 3.ij. si in quartario vno syrupo Cydoniorum, donec crassescat, coquantur: Dara de hoc cochlearia iij. mirè probantur.

Leniens & sanans optimum: R̄. mucilaginis feminis Cydoniorum, mucilag. rad. Consolidæ, infusion. gummi Tragachanti, omnium factorum cum aqua Rosarum an. 3.j. Amyli 3.j. Coralli rubri 3.ij. Boli præparati 3.j. Balauſtiorū 3.β. rob de Sorbis vel Cornis vel conditur. Cydoniorum 3.ij. Sacchari rosac. tabul. 3.j. fiat instar electuarij: Capiat ad 3.ij.

Narcotica cum dolore compescant, & fluxum alui simul sistant, vt in clysteribus dictum, meliusque exhibita quàm iniecta id præstent, atque insuper somnum, qui propter inquietudinem, ob continuam deie-

stionem impeditur, concilient, & sic viribus quoque admodum profint; ob multa hæc commoda, non sunt negligenda: aliquotiesque si præsertim dolor, vigilæ vrgeant, repetenda, cum nihil adeò facultatem expultricem sopiendo, fluorem indefinentem, vti hæc compescant.

Imprimis autem in hoc casu Philoniam Persicum vtile erit, quod fluoribus diuersis sistendis, cum plura adstringentia recipiat, simul accommodatum est: illius 3.j. vel paulò plus exhibendo.

Pilulæ item Cynoglossæ, cum ad defluxiones cohibendas paratæ sint, hic etiam præ cæteris proderunt, præsertim si succo Plantaginis, vel Rosarum aliisve adstringentibus excipiantur, formenturque: & à 3.ß. ad 5.j. propinentur.

Trochisci de Succino cum Opio, cum ulcerationes simul sanent, duplici nomine quoque proderunt exhibiti. Præter quæ multa alia in colicis, & nephriticis aliisve doloribus exposita narcotica, hic quoque conueniunt, si adstringentia quædam illis permisceantur, eaque efficaciora, cum parua quantitate narcotica dari soleant. Vt si syrupo de Papauere vel Diacodio sicco vel humido Myrrinum aliisve adstringentes addas, & cum aqua Plantaginis aliave dissoluas: sæpe addito puluere, Diamarg. frigidi, virium causâ, propines: vel in aqua Rosacea folia Papaueris albi maceres, vel decoquas: Eamque bibendam des:

Vel Theriacâ, Mithridato, Athanasîâ, aliisve antidotis & confectionibus narcoticis, Bolum, Terram Lemniam, Gallas, Balaustia, Acaciam, Hypocistim, cum validius adstringant, admisceas.

Aut si pulueribus vel electuariis supradictis dysentericæ adscriptis, tantillum Opii recte præparati, vti alibi docuimus, optime permisceas, illisque remediis, hoc quoque commodi addas.

Externa quod attinet remedia, inungatur venter oleo Cydoniorum, Myrtillorum, Rosaceo, eoque si magis adstringendum, Omphacino, vel additâ Aceti tertiâ parte, decoquantur hæc olea ad consumptionem aceti: Quod si ventriculus simul affectus sit,

addatur Mastichinum vel Absynthinum. Si dolor summus, Anethinum, Chamomelinum, vel Amygdalinum dulce; Si inflammatio aut caliditas, Violaecum. Sunt qui & anum eiusmodi vnguentis inungendum esse docent.

Post inunctionem locus vnctus, puluere aliquo adstringente conspergatur, vel composito ex pulueribus, sequenti modo: vel etiam simplici vno ex illis, sed efficaci.

Primus: R. granorum Myrtillorum vel Berberis, vel Vuarum rubrarum aut Passularum 3.ß. Gallarum vel corticorum Granatorum, Nucum cupressi vel capularum Glandium an. 3.ij. Rosarum rubr. vel Balaustiorum 3.j.ß. Mastiches vel Thuris 3.j. puluerisuntur.

Alter ad potentiùs adstringendû: R. huius pulueris 3.ß. adde Boli 3.ij. Sanguinis draconis, Acaciæ vel Hypocistid. an. 3.j. Sumach 3.j.ß. Coralli rubri vsti 3.j. fiat puluis.

Tertius: Trochiscos de Terra sigillata, vel de Bolo, vel de Charabe simul recipit; vel alia insuper adstringentia, in pulueribus qui exhibentur descripta efficaciora.

Vnguentum ex eiusmodi pulueribus fit, si oleis iam enarratis excepti additâ Cerâ in formam vnguenti redigantur.

Emplastrum etiam ex pulueribus prædictis fieri potest, excipiendo eos Oleo adstringente, & admiscendo Resinam & Picem, addendo simul Aloës & Vernicis an. 3.ij.

Vel fiat tale emplastrum admodum stringens: R. Boli Armen. 3.vj. Thuris 3.ß. Sanguinis draconis, Mastiches, Mumie an. 3.ij. fiat puluis qui excipiat Albumine oui & Aceto, & cum panno ventri sub umbilico apponatur.

Cataplasma hoc efficax est: R. Cydoniorum malorum recent. vel siccatorum, vti asseruari solent, carniū, vel aliorum fructuum adstringentium, vt Pyrorum, aliorumve 3.iiij. Panis crustæ assæ & inter torrendum Aceto rosac. sæpius aspersæ 3.ij. coquantur in Vino rubro stiptico & Oleo rosac. omphacino, contundantur, adde pulueris Gallarum 3.vj. Boli, Mastiches an. 3.ß. vel de pulueribus compositis descriptis 3.j. misceantur: Pro applicatione.

Huius loco possunt sumi Verbascom cum radicibus, Bursa pastoris, Plantago, radic. Consolidæ, flores Rosarum rubrarum: Hæc coquantur in Vino rubro, & oleo Rosæ. vti dictum, contendantur, addendo prædictos pulueres: Pro cataplasmate.

Omentum rete vocatum castrati, vel hœdi aut agni, applicatum calidum, vt in colicis dictum, tormina in infantibus maximè compefcit: quod in hoc casu, oleo aliquo adstringente, vt Cydoniorum vel Myrtillo- rum inungi debet: & si amplius adstringere volumus, puluere aliquo ex prædictorum puluerum simplicium vno vel pluribus, vel puluere Tapfi barbari, conspergi. Cuminum in aceto maceratum & torrefactum, idem præstat, omento inspersum, vel aliis applicandis additum.

Diaphœnicum emplastrum Mesuæi, ad idem conuenit, ventri admotum.

Fasciam Aceto irrigatam, ventri circumligatam, aliquid efficere posse, quidam scribunt.

Cucurbitularum in ventris medio seu centro, vel vtrinque circa inguina affixio, nimium fluorem aliquo modo retinet.

Fotus sunt ventris interdum & podicis ex decocto herbarum adstringentium, vt Verbascom cum radic. Plantaginis, Polygoni, foliorum Quercus, Pyri, Cydoniorum, Sorborum, Mespilorum, Cornorum, Myrti, Berberis, Rosarum rubrarum, Balauftiorum, Sumach, radicis Filicis, Calcitrappæ, cortic. Granatorum, Pinearum, capul. Glandium, Gallarum, Myrtillo- rum, Vinacio- rum, in Vino rubro, addito interdum & Aceto, aliàs in aqua Chalybeatâ.

Oleis quibus ventrem inungi debere diximus, eundem & fouere possumus: addito Aceto nonnunquam, vel aliis succis Herbarum enatarum.

Salfamento piscis Siluri ventrem fouere iubet Dioscorides.

Lotio crurum in iam dicto decocto admodum calido, facta, similiter iuuat. Quæ & si ex decocto Scorix ferri & Limaturæ chalybis in Aceto acerrimo fiat, probatur.

Vapor ab eodem decocto, è quo fotus

fit, suscitatus, si podice excipiat, si præsertim altius se insinuet, admodum proderit: Vehementiusque operabitur à salfamento dicto, vel Lotione quæ ex Scorix ferri & Chalybe paratur, excitatus.

Ex Anguilla decocto, vapor probatur à quibusdam.

Fumus in anum admissus, quia & ille penetrat, iuuare potest, excitatus à resinosis in tenesmo explicatis, prunis ardentibus vel laminæ ignitæ impositis: Idem præstat ex puluere Verbascom factus: Vel stercoreis Afini siccati: vel Aceto rubro forti insperso iam dictis rebus candentibus; fumoque sic facto, qui & Ferro candenti in eo extincto suscitari potest. In quo aceto astringentia possunt decoqui.

Suppositoria dolorem præsertim sedantia, in tenesmo exponenda, vt de Sæuo, aliæque eiusmodi, etiam in dysenteria nonnunquam indita proderunt.

Purgare podicem ab adhærentibus excrementis post egestionem, foliis Verbascom & Lagopi panniculis, tum ob mollitiem ipsorum, tum vires aliquas, quas simul cōferunt, probantur. Cuius mollitiei causâ folia Althææ vsurpari possunt.

Quod Regimen attinet: Cibo nutrantur euchymo, qui simul etiam ad morbi sanationem aliquid conferat, denturque Lac, Oua, Pultes, aliæque iam in exhibendis expositæ: Vel alia alimenta in aqua Chalybeata aut Rosacea decoquantur, additis interdum pulueribus, vel succis supradictis, quæ gratiora sint: Bibant aquam Chalybeatam, lac Amygdalynum: Interdum Vinum rubrum aquâ Vstulatâ dilutum. Vitent omnia Salsa, Acrida & summè Acida.

Quieti maneant, neque corpus surgendo ad sellam, vel ob inquietudinem, lectos & loca mutando, vti verò facere solent, ab eoq; admodum debilitari, exagitent: Excrementaque in lecto remanentes, linteaminibus duplicatis, vel pelui depressâ, cuius ambitus calcitris suffultus sit, excipiant.

Quod si dysenterix alius aliquis affectus copuletur, aut occasionem præbeat, veluti hepatis aut ventriculi: tunc si ob hepatis morbum

morbū bilis fiat prouentus, vel quod maxime metuumdum, fluxus accedat hepaticus, dilutaque cruenta copiosa sequatur deiectionis, quod lethale admodum, hepatis habenda erit ratio, illicque epithemata & ceratum illi conuenientia applicabuntur: qualia in fluxu Hepatico, aliisque iecoris affectibus explicabimus.

Et si ventriculi dolor aut imbecillitas accedat, ea quæ illi accomodata sunt, aliis adstringentibus dysenteriae competentibus, permiscebuntur, vt de Mastiche, Rosæ, Absinthio, aliisque vtrique competentibus, dictum est. Velsi ventriculi affectus præualeat, priuatis etiā remediis huic subueniendum, quæ in dysenteria tamen nocere nequeunt. Qualia multa adstringentia, ventriculum roborantia, in illius imbecillitate sunt exposita.

Cruentæ deiectiones aliæ, præter dysenteriam veram, cuius curam iam exposuimus & fluxum hepaticū, de quo postea agemus, siā referatis venarum meseraicarum osculis, accedete insuper inflammatione procedant, Dysenteria nisi quod nondum adest exulceratio, nonnihil correspondent, & interdum pro ea sumuntur, non tamen ita pertinaces sunt, si modò inflammationi occurratur, vt vera dysenteria, quæ citius quam illa si rectè tractentur, cessant, sæpe tamen auctā inflammatione & febre, ob dolorem, vt in colico dolore ab inflammatione quoque procedente, conuulsi moriuntur, vel si in abscessum vergant, in veram dysenteriam commutantur, quæ vlcus post se relinquens sordidum, purulentam dictam, quæ dysenteriam sequitur, efficit deiectionem. Huic in affectus cura, causa quæ irritando eum procreauit, si adhuc persistat, propellenda & in ea infringenda, iisdem euacuantibus & abstergentibus sed mitioribus propter inflammationem, & lenientibus, vt in dysenteria dictum fuit, vtendum. Et morbi causā, inflammationis scilicet, refrigerantibus eam compescere studebimus, qualia in dysenteria cum inflammatione & colicis doloribus proposita fuerunt. Dein ad oscula venarum obseranda, & fluxum cohibendum, sedatā iam inflammatione transeun-

dum, eligendo ex adstringentibus remediis ea, quæ in dysenteria injici forisquæ adhiberi diximus: & si in abscessum vergat inflammatio, indeq; in vlcus, tunc quæ exulcerationem in dysenteria vera sanare diximus, locum habebunt.

Concretus nigricans, vti expositum, a pertis osculis, si copiose ejiciatur sanguis, ob violenta cathartica aliave medicamenta, nonnunquam & simul vomatur, periculosum imprimis, vnde aliquos subito sanguine nimium profuso extinctos vidimus. In quo casu sicuti in vomitione sanguinis docuimus, procedendum, aliaque adstringentia intus forisquæ, vt in priori casu, administranda.

Tenesmus, cum circa exitum intestinorum illius consistat causa, minus periculosus quam dysenteria existit, faciliusque illa sanatur, cum ad partem affectam medicamenta rectè perueniant, licet & hoc quod ægrè illa retineant, ob stimulum quo diuerxantur, & quem in anum immissa, etsi blanda sint, de nouo incitant, difficultatem curæ adferat, morbumq; sæpe protrahat. Qui & per se nonnunquam longus est, difficiliterque sanatur, si vlcus sit sordidum, sin alia causa leuior, eò facilius.

Scopus curandi pro diuersitate causæ instituitur. Nam si cum exulceratione tenesmi prima sit species, in qua mucosa subcruenta egeruntur, siue per se inceperit, aut dysenteriam sequatur, aut ex leuiore talis factus sit, cum in intestino recto vlcus consistat, eadem cum dysenteria curandi obseruatur methodus, similiaq; ferè remedia, (vti ostendetur) huic sedi accommodantur. Si verò sola irritatio tenesmi alteram inducat speciem, in qua biliosa, vel alias acria simul prodeunt excrementa, nec tunc remedia ab illis, quæ primæ speciei conueniunt admodum acrimoniam ardoremve leniant & contemperent vsurpentur, postea quæ sordes hasce auferant, abluant abstergantve, demum, quæ inde natam attritionem sanent, & si in vlcus verum degenerarit, quæ hoc vt prius dictum, curent. In tenesmi verò tertia specie, in qua solus conatus citra excretionem aliquam

*Deiectionis
non per
alium
cruenta
citra ex
ulceratio
nem cu-
ratio.*

*Deiectionis
non per
alium
sanguini
con-
creti cu-
ratio.*

*Tenesmi
curatio.*

aliquam vrget, causæ habitâ ratione, eam amouere studebimus, vt si à duris hoc procedat excrementis, quæ ea emolliant, si à frigore, quæ calore suo illud emendent, administrantes. Si à calculo intestinum premente, vel vermibus, aut ductus vesicæ causâ accidat, curatio horum in doloribus illarum partium fuit exposita. In reliquis, sequentibus remediis hoc pacto erit procedendum.

Exhibentur rariùs hîc purgantia cùm humor circa locum affectum consistens, tenesimum efficiens, in extremis intestinorum consistat, nisi antecedentis causæ nomine, ne malum augeatur vel repetat, illud fieri debeat, tuncque si exulceratio adsit, eadem quæ in dysenteria competere, & præter vim purgandi vim etiam adstrictione prædita esse diximus, hîc quoque vsurpari poterunt: si verò alia adsit causa, ad alia quoque quæ humores moderate euacuant, transire possumus, leuiora tamen, ne aluum hisce de nouo irriteremus.

Hoc idem de aliis, quæ per os sanationis gratiâ exhiberi debent, intelligendum, parum hæc, in distantiori hac intestinorum sede affecta, posse efficere. Interim tamen si ea quæ in dysenteria conuenire diximus, lenientia vlcusque sanantia, aliquoties vel copiosè exhibeantur, vires ipsorum etiam eousque deferri possunt. Vt si Lac, Decoctum hordei, copiosè sæpeque bibant, aliavè fumant, quæ interim aliis partibus nocere nequeunt. Decoctum Betonicæ sunt, qui in tenesmo laudant, vti & Saluiæ.

Injiciuntur imprimis in hoc casu Clysmata, cum ad partem affectam proximè accedant, eamque alluant, quæ vt diutius contineri queant, quantitate mediocri infundenda, sæpeque quia cum labore ob conatû retinentur, reiteranda, canalem cùm applicatur, ne locum irriter, blandè in podicem inferendo.

Lenientia clysmata, in omnibus tenesmi speciebus, siue pars erosa, vlcerata, irritatæ tantum sit, conatu & dolore vrgente, cùm illum mitigent & humorum acrem vim retundant, competent; Qualia in dysenteria descripta sunt, ex Lacte, iure, Decoctis; Oleis parata, & prout vel simul abstergere vel glutinare volumus, hæc aliavè eligimus.

Detergentia enemata, si in tenesmo exulceratio adsit sordida, vel irritatio à mucosa aliavè adherente tenaci materia, ad eam abstergendam conuenirent. Similiter eadem quæ in dysenteria ex Sero, Hydromelite, Decocto hordei aliorumve parari diximus, hîc etiam vsurpanda.

Consolidantia solummodo in tenesmo ab exulceratione procedere, infunduntur clysmata, ex illis quæ in dysenteria diuersimodè proposita sunt, maximè conuenientia, seligendo.

Emollientia clysmata in tenesmo, cuius stimulum dura excrementa commouent, ad ea dissoluenda injiciuntur. Quibus laxantia aluum adduntur, si in tenesmo ad deiectionem sed vanam tantum irriterent, nihilque vel parum prodeat. Demum & calefacientia flatusque discutientia, si frigidus humor aut alia refrigeratio, flatuumque adsit copia, è quibus quæ blando calore prædita sunt, dolorem etiam leniunt. Ita cùm emollire & laxare volumus, decoctum Plantarum quinque emollientium fumimus, vti & feminû Lini, Fœnogræci, additis oleis aliisque pinguibus laxantibus. Si simul calefacere & flatus discutere, tunc quæ illud efficere possunt, adjicimus, vt herbas calidas, Origanum, Calamentum, Pulegium vtrumque, Melissam, Hyssopum, Saluiam, Maioranam, folia Lauri, Rûtam, flores Chamomillæ, Meliloti, Anethi, Rosmarini, Stœchados; femina Carui, Fœniculi, atque hisce similia. Cuiusmodi clysmata quamplurima in colicis doloribus, à facibus flatibus & frigore genitis, descripta sunt, quæ inde peti possunt, causis siquæ hisce similibus accommodari.

Imponuntur podici in forma suppositorij vel aliâ, quæ dolorem leniant, in omni tenesmo, in quo ille vrget: dein & quæ erosiones & exulcerationes sanent, si tenesmus inde fiat: quæ cùm locum affectum attingant, admodum iuuarent, si diutius retineri in parte hac sensili quæ ad omnè duriorem contactum mox excitatur, possent: quod tamen vt fiat, blanda admodum esse debent, nec dura aut aspera, & si siccare oportet, citra morsum illud faciant: Talia autem ex sequentibus componuntur.

Sæuum hirci vel capræ in formam suppositorij sectum & inditum, cruciatum sedat, & sanat excoarationem factam.

Cui sæuo liquefacto prius, si semen Papaveris vel Hyosquiami quod efficacius est, subtilissimè tufum permisceas, & in modulum chartaceum suppositorij forma fundas, ac suppositorium formes, ad dolorem sedandum ampliùs conferet. Longeque magis, si horum loco oleoret, ex hisce seminibus expressorum guttas tres, cuilibet supposito-rio addas: vel Opii dissoluti in olei Amygdal. dulcium ʒ.ß.

Ad sanandum efficacius fiet, si Sæuo ut dictum soluto, vel simplici vel narcoticis additis, Amylum & Gummi tragachatum tritū vel infusū prius in aqua Plātaginis misceas.

Vel sic: R. gummi Tragachanti portionem, affunde tantillum aque Plantaginis ut intumescat saltem, neq; nimium liquefeat, adde mucilaginis seminis Psyllij vel Cydoniorum tantundem, & Vitellum oui assum, misce, illisque calentibus nonnihil, adde Cereæ albæ dissolutæ q. s. ut concretum formam suppositorij nanciscatur, sicque indi-possit; vel si mollius remanserit, bombace aliōve molli immerso in anum trudi. Cui & narcotica dicta addi possunt.

Hiscæ suppositoriis ad erosionem maiorem curandam miscentur etiam pulveres, qui tamen subtilissimè triti ne irritent, esse debent, ut Cerusæ, Tuthiæ præpar. Boli, Balaustiorum, aliorumve citra acrimoniam siccantium.

Vel si magis adstringendum, succi Aciæ, Hypocistidis, Sanguinis draconis, cum infus. gummi Tragachant. emollixi & triti vsurpando.

Ex Licio paratum suppositorium Rhazis, narcosi & vi sanandi præditum est.

Emollientia suppositoria in duris recrementis, aliave laxantia, additis calidis, flatu discutientibus, in aliis causis convenientia, ut de clysteribus dictum, in colicis quoque describuntur doloribus, quæ si necesse sit, huc quoque referri possant. Ex Ladano & Stryace additis Oleis calidis, quædam parata, in tenesmo eiusmodi quoque laudantur.

Vapores vel suffusus, uti & fumi in tenes-

mo ab exulceratione, iidem qui in dysenteria competebant, illicque descripti sunt, hic quoque conueniunt: Præter hosce, fumus etiam factus ex validè adhuc siccantibus, multamq; fuliginem reddentibus prodest; ut Pice, Bitumine, Succino, Colophonîa, Terebinthinâ, Resinâ pini, Sarcocollâ & similibus, quibus & Sulphuris portionem aliqui addunt, & in Aceto prius illa macerant.

Vel si calefaciendum potius, vaporem ex decocto clysmatis hoc idem efficientis, ut illic exposuimus, excitabimus. Sabinæ in Vino & Aceto coctæ suffitum aliqui probant.

Fotus ad sanandam exulcerationem in tenesmo, ex plantis in dysenteria propositis, fieri quoq; possunt: Vel etiâ infessio ex illis.

Myrrhæ decoctionis fotum, tenesimum qui dysenteriam sequitur, sanare docent.

Si multum sanguinis reddant: R. Verbasci cum radicibus M. ij. Rosarum rubr. P. j. cortic. Granatorum, Gallarum ana ʒ.ß. coquantur in Aquæ ferratæ partibus duabus & vnâ Vini. Possunt addi Balaustia vel Psidia ad ʒ.ß. & cortic. Pini.

Efficaciùs fiet si Aluminis ʒ.ß. addas.

Ad calefaciendum, fotus ex plantis in clysmate explicatis quoq; fieri possunt, illorumq; decocto foueri podex illiusque ambitus ventrisq; inferiora, in quo decocto etiam sedere possunt. Cui, si quædam adsit erosio, Verbascum & Plantaginem addimus. Vel solo etiam Verbasco cocto in Vino, si hæmorrhoids accedat, anus fouetur, aliisve in hæmorrhagia expositis.

Vel fiat fotus cum Aqua, Oleo & Vino simul calefactis: Aut cum Oleo solo aliquo enarratarum herbarum, ut Chamomillar. Anethino & Rutaceo, &c.

Vnguentis ad sanandam exulcerationem, iidem quibus in dysenteria vsi sumus, hic quoque vti possumus.

Imprimis dolore urgente in tenesmo, illitione quæ ex oleo Rosaceo, Violac. Nymphææ & mucilagine seminis Psyllij, Vitellis ouorū paratur: vel aliis in hæmorrhoidum dolore descriptis.

Vel si calefaciendum, utrendum oleis calidis, Chamomelino, Anethino, Laurino, Rutaceo, similibusque.

Cataplasmata ex iisdem quæ clysmata, fota, vnguenta subintran, concinnari possunt.

Erui farinam Vino subactam applicat in tenesmo Dioscor.

Sacculus calefaciens anodynus fit ex Milio, Furfure & Sale, frixis in sartagine, additis aliquando herbis calidis in foru dictis, aridis contritis.

Vel in exulceratione fiat ex adstringentibus, vt seminibus Coriandri, Myrtillorum, Glandium capulis, Gallis aliisve herbis, in foru dysenteriae expositis: Sacculoq; in Vino tubro decocto infideat.

Laterem ex fumo denigratum, comminutum & in Aceto feruenti immersum, inuolutu linteo, perinaeo & podici in tenesmo cum excoriatione, applicant.

Sedeat supra Arthemisiā calefactā eger.

Puluini, Pannive liniei calidi actu adhibiti ad anum & perinaeum, blando calore dolorem eorum sedant.

Diarrhoea crassa.

Diarrhoea, in qua sacculenta excrementa varia humoresque in ventriculo & intestinis genita, vel eo transmissa, per alui fluxum euacuantur, non erit sistenda, si vel arte per medicamenta promota, vel à natura sponte fuscitata, ad redundantiam corporis expurgandam, recte & feliciter procedat. Tum in nondum ægrotantibus ad morbos præcauendos: tum in morbis, ab humorum copia & cacochymia pendentibus, dein & in acutorum principiis, vbi docente Hippocr. si talia qualia oportet deiciantur, & ægri bene tolerant, bonum, vel etiam declinatione & crisi, per quæ alui fluxum morbos quandoque soluit. Compescenda verò tunc erit, si in sanis & puris corporibus hæc veniat, maximeque superpurgatio dicta sequatur. In ægris verò si vel promota vel sponte superueniens, vel quia non cessat, vel quia de causa morbi nihil aut parum aufert, vires prostermit, & sic nocet, vel iam prius illis dejectis, exitiū adfert. Veluti in internis inflammationibus, pleuritide, peripneumoniā, & in febribus quibusdam acutis malignis, pestilentibus & in aliis quibusdam diuturnis vires prostermentibus, vt febribus hecticis, phthisi, hydropi superueniens lethalis. Quem-

admodū in affectibus hisce aliisve, vbi perniciosa est, fuit expositum. In quibus omnibus, quantum fieri potest, ne fiat, aut si facta sit, rursus sistatur; præmissio prognostico si periculosa videatur, procurandum.

Idq; hac methodo, obseruando primum an per se hæc accadat, citra alium affectum comitem; Vel an alius affectus concurrat, illumve sequatur. Si itaque per se eueniat, sitque vel à medicamento facta superpurgatio, vel à cibo & potu nimio, crudo vel corrupto proficiscatur, aut humoribus biliosis vel acris, vel pituitosis serosis, tunc per euacuantia si quid de causa subsistat, & exagitare non desinat, illud propellere oportet, stimulusque illius reprimendus: Dein ventriculus, eoque magis si vomitus simul infestet, & intestina roboranda, constringenda, idque calidioribus magis minusve, vel temperatis vel frigidis, prout causa plus minusve frigida vel calida existit. Quæ omnia sequentibus operandi modis perficiuntur.

Expurgandus ventriculus & intestina ab humore peccante, idq; leuioribus, ne aluum prius commotam nimium exagitent: vtendo si humor aqueus & pituitosus sit, pilulis stomacho simul congruentibus, imprimis illis quæ Mastichem simul recipiunt, vt Asfaiereth, Mastichinis aliisque in Lienteria exponendis.

Vel datur electuarium Hieræ simplicis ad ʒ. vj. aut pulueris ʒ. ij. addendo propter amaritudinē, Oxyfaccharæ simpl. ʒ. j. dissoluenta omnia cum liquore cōuenienti, vel mulsā, vti veteres voluerunt. Sed hæc amara commodius in forma pilularum dantur, Pilulæ scilicet de hiera.

Possunt & aliæ formæ id præstantes, in Vino aliōve modo, illud efficere, sicuti in Lienteria & imbecillitate ventriculi variæ eiusmodi compositiones proponuntur.

Si biliosus verò humor vel alioquin acris, diarrhoeam inducat, eadem remedia leuiter purgantia & adstrictionem quandam simul habentia, in dysenteria explicata, hic quoq; vsurpabuntur.

Veluti potio ex Rhabarbari vel integri vel torrefacti puluere, vel diluto ipsius, adiectis etiam aliis, vti illic dictum, parata: cui &

hic Vinum absynthites vel Syrupus illius, aut de Mentha commodè additur.

Qua ratione & ex Myrobalanorum citrinarum vel chebularum, eodem modo ad 3. β. infusarum potius expressione vel decoctione leui, quàm puluere, cuius ægrè tanta copia vnâ vice sumi potest, potio potest effici: Vel similiter ex Myrobalanorum 3. ij. & Rhabbarbari 3. j. concinnari.

Vel pilulæ ex Rhabbarbari 3. ij. Mastiches 3. j. Spicæ 3. β. cum succo Rosarum formatae exhiberi. Vel bolus ex eo cum carne Cydoniorum aut conseru. Rosarum fingi: Vel puluis siccus propinandus, adiecto Cinamomo & Saccharo ros. Quibus & Myrobalani addi possunt, si molem medicamenti, quæ hic exigua esse debet, non nimium auferent.

Trochisci de Rosis appellati & parati, vti & ex spica, spodio, sem. berberis & sem. frigid. maior. addito diagrydio, in diarrhœis si purgandum, in vsu sunt.

Tryphera Sarracenica Nicolai ad 3. vj. cū eiusmodi portionibus ex Myrobalanis, vel Rhabbarbaro vel vtrisque paratis quandoq; dissoluitur, quando humorum adest copia. Alias etiam Catholici tantundem. Ad fortiora transire in alui hoc nimio fluore, non satis est tutum.

Inter ea quæ euacuando profunt, Vomitus, interdum reuellendo, & causam simul euacuando, vt in dysenteria dictum est, conuenit. Sudorum item prouocatio, imprimis si feri copia diarrhœas efficiat. Qui si vires ferant, admodum sæpè iuuant. Inedia leuis ad humorum horum prouerum & absorptionem, aliquid adiumenti adferet. Sed in picrocholis nocet.

Clysmata quæuis, etsi, cū mox iterum deiciantur, aluum sic moueant, tamen si vim adstringendi habeant, cū eam tunc potius sistant, etiam quandoque vsurpata conuenient.

In quem vsum Quartum clyσμα in dysenteria descriptum, cū adstringat valide, ad aluum sistendam quoque erit accommodum. Cuius decocto etiam alia adstringentia, post hunc clysterem descripta, addi possunt. Et si amplius fluxum sistere volumus, in decocto succos exsiccatos Plantarum vel

lapidis Hæmatitis aut Terrarum siccantium, vti omnia illic exposita sunt, dissoluere debemus. Vel etiam sub acri humore metuitur excoctio, Tertium clysterem qui adstringit & glutinat, vel alios ibidem enarratos injicere possumus.

Sed & in acri & bilioso humore si intestina vellicent, abstergentia clysmata, in dysenteria quoq; copiosè descripta, ante adstringentium vsu possunt infundi. Quæ & si alij humores redundant, maximè si adhæreant, ad eos promouendos, præsertim quando purgantia alia, illis non fuerunt exhibita, conuenient, additis etiam fortioribus, si necesse sit, vt Absynthio, Centaurio, & in pituitosa causa, ppter tormina & murmura, quæ tunc simul adesse solent, illis quæ flatus discutiant, vt in decocto, seminibus Fœniculi, Anisi, floribus Chamomillæ, Meliloti, Anethi, vel horum oleis.

Nōnunquam & lenientia enemata, si humores intestina irritent, vel medicamentum violentum catharticum aliudve intestina ledat, ad eos contemperandos vsurpari possunt, in dysenteria abundè proposita, additis etiam, si cruciatus adsit, iam enarratis flatibus discutientibus; Veluti in decocto leniente in dysenteria descripto, quod R. radic. Altheæ 3. j. Hordei, &c. factum est.

Exhibenda quædam, adstringentia præsertim, interdum & abstergentia, & lenientia, pro causæ ratione, vt prius dictum, idque diuersis formis, ne natura vni assueta, parum aut nihil inde muretur, bis terve in die.

Decocta varia in Aqua vel Vino, vt Adianthi, Trichomanes, Altheæ, Rubi, radic. Quinquefolij, Pœoniæ à Dioscoride commendantur.

Vinum infusionis Prunorū syluestrium, prius exsiccatum, ne ventrem conturbent, vti & aliorum fructuum austerorum; Item Musci arborei, vel Absynthites, in quo radices Bistortæ, cortic. Citri aliæve adstringentia maduerint.

Succi Plantaginis, Polygoni, Equiseti, Chondrillæ, Punicorum acidorum Diosc. Cydoniorum.

Syrupus Cydoniorum, Myrtillorum, de Rosis rubris siccis, de Berberis, de Ribes, per se sua-

Te sumendi, vel cum Aquis sequentibus in forma Iulepi.

Aquæ Plantaginis, Rosarum florum & pectali, Acetosæ, Bursæ pastoris, Sorborum, Prunellorum, foliorum Quercus.

Vel decoctum in dysenteria descripta. Quorum vnum R. radic. Tormentillæ ʒ. j. radic. Consolidæ, &c. Alterum subsequens; R. radic. Quinquesolij vel Bistortæ, &c. & quæ sequuntur. E quibus & syrups possunt parari.

Vel syrupus ex succis ad vsum asseruandus: R. succi Cydoniorum ʒ. iij. succi Berberis qui eodē tempore, cum Cydonia matura sunt, haberi potest, ʒ. ij. succi Plantaginis vel alterius ʒ. j. β. Vini rubri stiptici, Aquæ rosarum ana ʒ. ij. Sacchari quartarium j. decoquantur ad consistentiam syrups, aromatiz. puluere Santali rubri. Si ante coctionem Acaciæ aut Hypocistidis ʒ. ij. in eo dissoluas, efficacior erit, & in biliosa causa, Aceti rosac. tantillum, vt melius acescat, addas.

Est & syrupus Nicolai contra omnem fluxum ventris, ex fructuum & aliorum decocto concinnatus.

Inter alimentosa, Carnes in aqua chalybeata coquantur, vt in dysenteria, addendo interdum Sumach, vel alia non ingrata.

Iuscula condiantur succo Cydoniorum vel aliis.

Cibi crassi, spissiores potius quam liquidi.

Turtur præparatus, vt in dysenteria.

Sanguis frixus, vt in dysenteria.

Lac vstulatum Vaccinum vel Ouillum, vt in dysenteria.

Ouorum bene coctorum Vitellus cum Aceto comestus.

Ouum, detracto albumine per angustum illius in apice factum foramen, Aquâ rosacea impleatur, beneq; obturatum coquatur, donec aqua absumatur; Vitellusq; comedatur, vel cum Iure dissolutus bibatur.

Milij putamen cum Ovo assum, comestum, vt in dysenteria.

Caseus elixus in iusculo vel affusus, Helvetiorum remedium, quod & Diosc. probat.

Panis triticeus ficcus nec dum recēs, non tamen rancidus nec mucosus. Panis coctus ex pasta facta ex Amylo, farina Fabarū & Ovis, addito semine Plantaginis vel aliis.

Panis ex farina subacta Hordei vel Oryzæ & Vitellis ouorum coctus, beneq; exsiccat, diu asseruatur. Qui ad vsum puluerisatur & cum Lacte in formam pultis redigitur; Sicque sumitur.

Alter ex farina fit Tritici cum succo baccharum Sambuci, in pastam redacta: quæ in clybano eousque coquitur, donec penitus arefcat, vt diu vsum asseruari possit. Cuius puluerisati cochl. j. cum Vino rubro aliquoties propinabitur.

Oryza cocta cum Lacte vstulato, vel cum Brodio carnis, cui gummi Tragach. vel Arabicum additum valde iuuat.

Amylum cum lacte Amygdalarum, vt in dysenteria.

Puls ex farina Zeæ, Auenæ, Milij, vt in dysenteria.

Lentes non excorticatæ coctæ, addito Aceto, vel aliis adstringentibus, nonnuncquam & Betâ, Diosc.

Fructus recentes vel exsiccati, Mespila, Sorba, Corna, Pyra sylu. Diosc.

Brassica, Beta nigra cum radicibus, Plantago, Intybus, Apium, cocta in cibis, Dioscorid. addito Aceto.

Cibi conditi Gariophyllis tostis & Aceto.

Bibat aquâ Hordei loco vini, seu aquam Vstulatam vel Cisternæ.

Pulueres ppinadi, vt in dysenteria dictum.

Præcipue in vfu sunt rad. Alceæ, Tormentillæ, quæ & in venenatorum morborum diarrhœa simul est antidotus, Equisetum, puluerisata cum Vino data, vti & Lagopi folia, panniculi, & semen Oxylapathi, Acetosæ, Plantaginis, Nasturtij torrefactum, quod magni sit, Mastiche item & gummi Tragachantum.

Præter hos à Diosc. & aliis probatur pulueres Astragali, Hyacinthi, Acathi, Alysmatis, Xyridis, Myricæ, Verbasci, Rubi Ideæ, cortic. Tamaricis.

Folia Sanguisorbæ, Fragariæ cum radice, Pyrola, Pilosella, Virga aurea, Pulmonaria, Clematis prima, Anchusa, Lens syluestris, Phyllitis, Sedum maius, Phoenix, Ruta, Acinos, Anethum, Anisum, Fœniculum erraticum.

Flores Labruscæ, Verbasci, Milij Indici.

Ossa Myrobalan. affata, Auellanae putamina, Nux moschata tosta, Gariophylli tosti.

Semen Coriandri, Milij seminis putamē, Anethi, Iunci maximē, Granatorum nuclei. Coagulum leporinum, Fimus caninus, Cornucertui.

Rubrica Synopica, Terra Armenia, Crystatallus, Margaritæ, Corallia, Gummi Arabicum, Tragachantum.

Trochisci Ramich, aliq; ad fluxum Mesuæ; Item de Terra sigillata, de Succino, de Spodio cum semine acetosæ. Dantur vt in dysenteria, vel sunt ex iis pilulæ. Item Diacoralium.

Pulvis cum rhabbarbo: R. Rhabbarbari torrefacti 3.j. β. Boli Armen. vel lapid. Hæmatit. ana 3.j. ofsium Myrobalanorum vstorum, Succini ana 3.β. fiat pulvis: Detur duabus vicibus cum Vino; Vel cum mucilagine Tragach. factâ in aqua Rosarum vel Plantaginis, fiant pilulæ: Capiat 3.j.

Adduntur pulueres cordiales, si vires deficiant, vt Diamarg. frigid. de Gémis. Item Triasantalum, Diarrhodon.

Vel sic ex pluribus concinnatus: R. Castanearum nucleorum assorum, vel Glandium 3.β. cortic. Myrobalanorum citrinarum, Chebularum assarum 3.ij. seminis Coriandri, Nasturtij in aceto macerat. & torrefact. ana 3.j. β. seminum Myrti, Sumach, Mespilorum, Granatorum acidorum, Berberis, Rosarum, Plantaginis, Oxylapathi ana 3.j. sem. Cimini in Aceto macerati, Thuris vel Mastiches ana 3.β. Cotalli rubri 3.ij. Boli, Lapidis Hæmatit. ana 3.j. cornu Cerui vsti 3.β. Margaritarum vel lapidum preciosorum 3.j. Acaciæ vel Hypocistid. 3.j. puluerisuntur. Et detur 3.j. per se vel cum Saccharo, vel alio modo: vel fiat ex eo electuarium.

Diacydonites cum speciebus, in frigida, sine illis, in calida causa, per se vel cui alia permista sint, datur in forma electuarij, aut pulueris, addito Saccharo rosac. à 3.j. β. ad 3.ij.

Conserua Rosarum antiqua, Acori, Symphiri: Possunt & alię cordiales conseruæ addi: vel conditur. Cydoniorum, Citri, Myrobalanorum per se vsurpantur, vel pulueres trochiscorum aliue adduntur.

Micleta dictum electuarium Nicolai, vt in dysenteria (vbi ex quibus componatur ostensum fuit) sic & diarrhœa cæterisque alui fluxibus datur.

Myrti baccarum, Mesuæ item electuariū, ex myrobalanis, baccis myrthi, seminibus anisi, cimini, apij, & syrupo cydoniorum.

Narcotica in diarrhœa, si dolor aliquis accedat, vt in colicis vsurpata, eum mitigant, & facultatem expultricē sopiendo, fluxum sistunt, eoque modo vt in dysenteria ostensum, additis plerunque validiūs adhuc adstringentibus, cum necessitas requirit, vsurpari possunt.

Foris adhibenda in diarrhœa, propter fluxum immoderatum, magis quàm in dysenteria locum habent, vt in illa, clysmata, propter exulcerationem internam, quare illie ea copiosius, vt in hac hæc erunt explicanda. In diarrhœa quoque ventriculo simul affecto, frigidâ quædam in lienteria explicanda, hîc locum habebunt: In calidâ verò, quæ in dysenteria.

Inunctiones ex oleis eedem conueniunt, vt in dysenteria; & si ventriculus affectus sit, ille vt in lienteria dictum, inungendus.

Vel ventris & ventriculi regio hoc pacto illinenda: R. olei Myrtilorum, Cydoniorum, Rosarum, Omphacini an. 3.j. β. olei Mastichini 3.j. Absynthini, Nardini ana 3.β. succi Plantaginis, Bursæ pastoris an. 3.j. β. Aceti rosac. 3.j. fiat decoctio ad succorum consumptionem, addendo Cera q.f. Et permiscendo vel inspergendo post inunctionem puluerem vnum ex præscriptis in dysenteria; cui addere possumus Nucis mosch. 3.ij. Santalorum omnium 3.j. radice Galangæ vel Cyperi, seminis Coriandri, Storacis calamit. an. 3.β. misce. Vini faciem admiscet & illinit Diofc.

Fotus & infusus sunt ex radic. Tormentillæ, Bistortæ, Pentaphylli, Calcatrippæ, Filicis, (Consolida nihil foris facit, non enim adstringit) Verbasco, Plantagine, Equiseti, Bursâ pastoris, Centinodiâ, foliis Rubi, Berberis, Sumach, Lentisci, addito Absynthio & Mentâ ratione ventriculi, nucibus Cupressi, cortic. Granatorum, baccis Myrti, Nasturtio torrefacto, ex floribus, Rosis, Balauistiis,

laustis, Spongia Bedeguar; coctis in Vino rubro, & Aquâ chalybeatâ, addito Aceto, addendo interdum Alumine.

Saccus ex enarratis quibusdam impleri potest, vel duo sacculi iteratis vicibus adhibendi, & in eo decoqui, sicque ventri applicari possunt.

Vapores & fumi in dysenteria & tenesmo positi, hic prodesse possunt.

Cataplasmata ex residentia decocti herbarum pro fori fieri possunt, additis oleis enarratis, Sæuo hirci, Farinâ, Amylo, vel Pane & puluerib^{us}, quos inspergere docuimus.

Vel ex succis herbarum dictarum, vel fructuum adstringentium, Pyrorum, Pomorû austeriorum & Prunorum, præsertim sylvestrium, Cydoniorum, Sorborum; Mespilorum, Cornorum, Berberis, &c. incorporando eos cum Farinis aut Pane, additis oleis & pulueribus.

Emplastra & cataplasmata in dysenteria exposita, in diarrhœa calida, illa verò quæ in lienteria exponuntur, in frigida competunt.

Vel sic ex pluribus pauciorib^{us}ve compositum: R^{ex}. Fructuum adstringentium prædictorum exiccatorum optime & veluti vstorum ʒ. iij. farinæ Hordei ʒ. ij. frixæ cum Aceto, radic. Bistortæ ʒ. ʒ. Equiseti, Absynthij, Mentæ, cortic. Granatorum, Gallarum, cortic. Myrobalanorum, Nucum cupressi ana ʒ. ij. baccarum Myrti, acinorû Vuarum, Coriandri præpar. Cumini, Nasturtij torrefact. in Aceto mac. ana ʒ. j. Thuris ʒ. ʒ. Mumia, Acaciæ, Sanguinis draconis an. ʒ. j. ʒ. Boli Armen. lapid. Hæmatit. & Magnetis ana ʒ. j. Nucis mosch. ʒ. ij. Santali rubri, Gariophyll. an. ʒ. j. Spicæ nardi ʒ. ʒ. Caseum veterem & Gluten piscium miscent puluerisata omnia Vino rubro vel Succis herbarum incorporentur, & parum calefacta & frixa contundantur, addendo olei Mastichini, Rosarum Omphacini an. ʒ. ij. ʒ. fiat cataplasma, vel additâ Pice nauali & Colophonîâ, Cerâ & Resinâ emplastrum.

Vsitata emplastra vsurpari possunt ex Gallâ mosch. Mesuæi, de Mastiche, Diaphœnicon, Contrâ rupuram, Ceratum santalinum, additis adstringentibus fortioribus.

Rete castrati, oleo Rosarum omphacino,

vel alijs inunctum, pulueribus prædictis aspersum.

Cucurbita affixa vmbilico.

Potentilla viridis, plâtis pedum apposita.

Podex Tapsi barbati foliis tersus.

Pedes calefacere actu & potentiâ illud agentibus, plurimum quoque iuuat, ad alui fluxum sistendum, præsertim si à frigiditate pedum aut aliarum partiû, diarrhœa oborta sit: Vel si pituita aquea intestina continuo alluens, ea refrigeret, aut ob sessionis in sella morâ, podex partesq; vicinæ refrigeretur, quas & calefacere tunc quoq; oportet.

Si cum diarrhœa alius affectus concurrat, qui tamen non cum illo implicatur, aut illius causa est, tunc singulis sua cura adhibetur, huicq; quod magis vrget, primum subuenitur. Si verò affectus ille diarrhœæ causa existat, tunc causa hæc primum erit auferenda vel auertenda, & postea nisi causâ sublatâ cesset, hoc pacto procedendum:

Si cum catharro diarrhœa coincidat, v- *Dys-*
trisque remedia accommodanda, maximè- *rhœa cū*
que si vti putatur, illius sit causa, humore pi- *defluxio-*
tuitoso aqueo vel seroso, salso vel acri, à cere- *ne coinci-*
bro ad ventriculum delabente, tunc primò, *dentu cu*
defluxioni, postea diarrhœæ occurrendum. *ratio.*
Et defluxionem quod attinet, illius ratione fortioribus catharticis, propter fluxum aliquin immodicum, eam expurgare non consultum erit, sed potius particularibus euacuationibus, per nares & os factis; errhinis & caputpurgiis eam euacuabimus, & simul diuertemus, aliis modis: veluti Lotionibus pedum actu calidis, quæ tum defluxionum nomine, tum alui fluxus causâ competunt, si ex capitis congruētibus & simul adstringētibus decoctis fiant; Item Frictionibus, Cucurbitulis vel etiam Aperturis, si necessitas exigat. Dein illud quoq; roborabimus atq; exsiccabimus, inspersis pulueribus, admodis cucuphis, emplastris, & suffumigationibus. Quorum omnium formas vtendique modû, in aliis defluxionibus, in habitu corporis factis, & affectibus à pituita & seroso humore, in capite prodeuntibus, vt cephalæâ, sopore, apoplexiâ, paralyfi, copiosè exposuimus.

Fluxus verò alui seu diarrhœæ nomine,

Ventriculum à pituitoso humore leuiter purgabimus & roborabimus, illique vti & ventri ad fluxum constringendum per admota exhibitaque medebimur, iisdem præfidiis eademque ratione, vt in diarrhœa pituitosa, & lienteria iam dictum fuit. Ea præsertim eligendo, quæ & caput simul respiciunt, qualia multa inter adstringentia, veluti Nux moschat. Galanga, Cyperus aliaque illic descripta inueniuntur.

Diarrhœa post morbos alios superuenientis curatio.

Si febrem intermittentem diarrhœa sequatur, illiusque causâ biliosa per hunc fluxum expurgentur, iisdem remedijs purgantibus, quibus in biliosa diarrhœa vtimur, hic quoque procedendum, & postea iisdem quoque remedijs adstringentibus, quib. in dysenteria vtimur, fluxus est sistendus, febris interim semper habitâ ratione. Quod & in febribus continuis obseruandum erit, si per eum naturâ biliosam materiam exoneret, in quibus etiam si fluxus hic criticus sit, non erit, nisi natura per eum admodum debilitetur, sistendus: Sin verò aliâ superueniat, vires deiciendo, nihil boni portendit: tamen ad eum cohibendum, viresque sustentandas remedia adhibemus. Quod & in febribus pestilentialibus faciendum, in quibus cum de causa nihil detrahat, semper superueniēs ille fluxus perniciosus existit.

Si in alijs morbis, hepatis, lienis eueniat, eadem erunt obseruanda & prædicenda: In Phthisi, Atrophîâ, Hecticâ febre, Hydrope superueniens alui fluxus, lethalis plerunque: tamen & huic quamdiu conceditur, resistendum, ad morbum comitem semper interim respiciendo.

Lactatio in cura.

Lienteria, in qua cibus non mutatus, sed vti assumptus fuerat, iterum redditur, si ratione assumptorum accadat, facilius sanatur; Si ventriculi causâ eueniat, cum magnam illius imbecillitatem esse oporteat, quæ cibos omnino non immutet, siquidem in alijs illius intemperiebus aliquo modo, si non omnino concoquitur, curatione difficiliorem reddit, & in senibus aliquando incurabilem. Qualis & ea est, quæ grauib. vt in diarrhœa dictum, iungitur morbis.

Methodus verò curandi pro ratione causæ instituitur; Quæ si fuerit intemperies fri-

gida vel humida, vel alia imbecillitati simplici, vel cum humore crudo & pituitoso iuncta, curandi ratio in imbecillitate Ventriculi abunde fuit exposita, quo pacto hæc emendari debeant, eligendo præsertim ea in hoc casu, quæ adstrictione simul prædita, ventris fluxum possint compescere, tum ex illis quæ pituitam si illa redundet euacuent, tum quæ intemperiem alterent, ventriculūque simul roborent.

Euacuamus autem humorem, si ille ventriculo inhæreat, per Vomitionem, per quā fluxum ad inferiora factum simul diuertendo sistimus: Quam sicuti illic dictum, proin promouemus, imprimis illis quæ humorem si tenax sit, simul abstergant & incidant: Veluti Oxymelite simplici vel squillino.

Purgamus etiam eundem humorem exhibitis, quæ ventriculo simul accommodata sunt, eumque roborant. Veluti pilulis leuioribus, de Hiera, Alephanginis, Assaiereth & Stomachicis dictis: vel fortioribus, Mastichinis, de Agarico. Quorum loco in imbecillitate ventriculi descriptis illis, quæ cum purgare, & simul roborare laxum ventriculum volumus, competunt; & R. Aloës præparatæ cum succo Absynthij ʒ. ʒ. ʒ. &c. Vel sequentibus, quibus alia quoque purgantia adduntur & R. Aloës select. & præpar. ʒ. ʒ. Rhabbarbari, &c.

Vel vtimur Vino medicato, in laxo, debili & pituitoso ventriculo ibidem descripto, qui R. Rhabbarbari ʒ. ij. Myrobalan. citrin. &c. Alijsque formis ad ventriculum purgandum & simul adstringendum illic traditis.

Clysmata cum ventriculus hic potissimū laboret, magisque quod cibus incoctus deiecitur, quam deiectio ipsa spectetur, hic non aded erunt necessaria. Nisi immoderata deiectio accedat, vt in alijs diarrhœis ea requiratur. Tunc ea ipsa, quæ in alijs alui fluxibus eum sustere ostendimus, hic quoque locum habere possunt: Eligendo ad hæc ea, quæ ventriculum simul respiciunt; vel illis eadem erunt permiscenda in decocto; veluti radic. Cyperi, Noces cupressi, Absinthium, Salvia, flores Rosarum, Stœchados, Rosmarini, similiaque.

Roboramus ventriculum varijs exhibitis, in im-

in imbecillitate ventriculi expositis, feligendo quæ adstrictione simul aliquâ cum sint prædita, in ventriculo laxo, humido præcipuè competere, illic ostendimus; vt sunt Nux moschata, & Gariophylli, comesta, quæ in hoc casu parum prius torreri debent: Vel Mastiches grana duo vel tria aliquoties deglutita.

Vinum item, conuenitque hic imprimis vetus, rubrum, stipticum, per se, vel post alia stomachica sumpta, quantitate mediocri bibitum. Vel illud medicatum, quod R. radic. Imperatoriæ, Galangæ, &c.

Cuius loco tale parabitur: R. radic. Tormentillæ, vel Bistortæ 3. j. cortic. Citri 3. vj. Nucis mosch. Gariophyll. ana 3. iij. seminis Coriandri 3. ij. Mastiches 3. j. β. conquassentur pro vino.

Vinum infusionis Musci arborei sunt qui probent.

Pulueres stomachici in imbecillitate ventriculi expositi, per se aliâve formâ, vt illic ostensum, vsurpandi, qui lientericæ accommodari possunt; Sunt ex vsitatis, pulueres Aromatici rosati Gabrielis & Mesuæi, Rosatæ nouellæ, Diagalangæ: Et ex de nouo illic compositis, numero Octauus & Nonus.

Atq; ex pulueribus qui post pastum dantur, ille qui R. Cinamomi 3. β. Calsiæ arom. 3. ij. rad. Galangæ, &c.

Et ex illis è quibus tabulæ parantur: Qui R. pulueris Octaui vel Aromatic. rosat. 3. j. pulu. Noni, &c.

Vel fiat talis puluis: R. Nucis mosch. assæ 3. ij. Gariophyll. tostorum, seminis Coriandri præpar. ana 3. j. Coralli 3. ij. Da cum Vino, vel addito Saccharo rosac. vel carne Cydon. fiat conditum vel electuarium.

Vel: adde huic pulueri nucleorum Granat. acetos. 3. j. seminis Oxylapathi, nucleorum Passularum ana 3. β. aliâve adstringentia stomachalia, vt Acaciam, Lycium: Interdum & Myrobalanos parum assas.

Ex aliis ventriculum laxum humidum pituitosum, adstringentibus & roborantibus illic descriptis, hic quoque competentibus sunt; ex conditis tam humidis quam siccis, Acori, cortic. Citri, Cydoniorum, Nucis mosch. Gariophyllorum.

Ex electuariis, Diacydonites cum speciebus, Acori palustris cum speciebus. Vel illud quod à nobis compositum: R. carniū Cydon. condit. 3. j. β. cortic. Citri condit. 3. j. &c. Mixturæ item binæ sequentes.

Extrinfecus ad ventriculi intemperiam vel imbecillitatem corrigendam, & fluxum simul cohibendum, prægressâ euacuatione pituitæ, si illa redundent, multa in imbecillitate ventriculi exposita, præsertim adstrictione prædita, ob fluxum ventris hic quoque ventriculo admota, vt & ventri competent. Et præter hæc aliqua in diarrhœa descripta, si nimia deiectio hoc expostulet.

Inunctiones ex oleis, quæ cum roborandum vel potius adstringendum, in imbecillitate ventriculi declaratæ sunt; hic quoque locum habebunt.

Vnguenta item duo subnexa: Quorum vnū R. olei Mastichini, Nardini ana 3. j. &c. Aliud R. olei Myrtini vel Myrtillorum, &c.

Ceratū similiter stomachicum Galeni, vel illius loco illud quod R. radic. Aristoloch. longæ, Acori veri ana 3. β. &c. Vel aliud quod R. Mastiches 3. j. β. Thuris, &c.

Emplastra itidem, vt vsitatum de Mastiche, vel correctum illic descriptum, quod R. Mastiches 3. ij. Thuris 3. j. Storacis, &c. Vel emplastrum Diaphœnicon. Mesuæi: Aut de Panis crustâ Montagnanæ: quorū omnium mentionem illic fecimus.

Cataplasma dein, etiam illic propositum, ex succis paratum, quod R. Mastiches 3. β. Thuris, Ladani, &c. illud vel solum, aut cum additione pulpæ Cydoniorum, vt illic ostensum, vsurpatum.

Vel paretur sequens: R. pulpæ Cydoniorum vel Pyrorum (vt in dysentericæ cataplasmate dictum) 3. iij. medullæ Panis ex secale 3. viij. coquantur in Vino generoso, & circa finem misce puluerem Cortic. citri 3. ij. cortic. Granatorum 3. j. Nucis mosch. 3. β. radic. Galangæ vel Cyperi 3. ij. Gariophyll. 3. j. Spicæ 3. β. Absynthij, Mentæ sicc. ana 3. ij. Ladani 3. iij. Mastiches 3. β. optimè agitentur & contundantur, addendo olei Myrtillorum, Rosac. Omphacini ana 3. j. β. olei Nardini 3. j. fiat cataplasma.

Fotus adhiberi etiam possunt, qualis in-

ter eos qui in imbecillitate ventriculi describuntur, ille est qui debilem ventriculum roborat, & R. radic. Acori veri, Imperator. &c. Vel alter laxum ventriculum constringens; qui R. cortis. Citri ʒ.β. cort. Granat. ʒ.ij. &c.

Ex sacculis ibidem descriptis. conueniet ille, qui cum validius adstringendum, ponitur: Vel alter qui R. Mastiches ʒ.β. Thuris ʒ.ij. &c.

Cucurbitula ventriculi regioni affixa, cibos diutius in ventriculo retinet, vti in vomitione dictum.

*Lienteria
ab humo
re acri
vel bile,
vt ali-
mentu
proceden
in cura.*

Sinapismo & Dropace aliq. quoq; vtutur. Si ab aliis causis lienteria fiat; veluti à bile aliòve acri humore, ventriculum ad propulsionem cibi sollicitante & vellicante, tum vt is præsertim euacuetur, illiusque acrimonia infringatur, mox intendendum, fluxusq; alui, qui tunc magis vrgeret solet, vti nonnunquam & simul vomitus, compescendus: Eodem ferè modo, similibusque præfidiis, in dysenteria, atque etiam in vomitu cholericò seu cholera morbo explicatis, per interiora exterioraque hæc administrando.

Si alimètorum assumptorum causâ Lienteria procedat, ab illis abstineant, & moderatam ac decentem victus rationem obseruet, qualis in imbecillitate ventriculi descripta fuit. Imprimis verò cibi non fluidi, sed qui substantiæ densioris & tenacioris cum sint, facilius subsistunt, atq; interim tamen concoctionem non effugiunt, exhibebuntur; vt Caro minùs pinguis & humida, Caseus recens, Oryza, Pulles, sed sine lacte cocta. Adhibendò interim foris ventriculo, quæ cibos retineant, medicamenta adstringentia, vti & cucurbitulâ, sicuti iam demonstratum est.

*Lienteria
ab vl-
cere & ci-
catricere
lacta ene-
mentis;
cura.*

Si ab vlcere ventriculi lienteria proficiscatur, huic curando intenti erimus, sicuti in ventriculi exulceratione in Cordis dolore inde nato, explicatum fuit, atque interim fluxus ventris causâ, vt in diarrhœa dictum, procedendum.

A cicatrice relicta, vti aliqui putarunt, si hoc fiat, exigua curationis spes, cum illa nisi sponte minuatur, extergi aliâ ratione vix possit.

*Fluxus
Hepaticus
curatione.*

Fluxus hepaticus dictus, si dysenterie accedat sub finem, vti frequentius fit, prostra-

tis iam viribus, hepate malè affecto, mortem plerunque infert. Alter quoque rarus affectus eiusmodi, vires admodum dejicit, cum copiosa feri euacuatio plurimum debilitet, vti in hydrope & diabete ostensum, hepatis calore præternaturali affectum sit & imbecille. Cui in curatione præcipuè remedia accommodantur, vt intemperies illius emendetur, illique appropriatis ei remediis robur addatur, & fluxus interim alui compescatur, vbi multa in dysenteria dicta etiam locum habere possunt. Quapropter à nimium aperientibus calidis cauere debemus potius, quàm illis venas amplius referare, nisi quatenus quædam ex illis temperatoria, ad vrinas serum deriuant. Hæc sequentibus operandi modis præstantur.

Inter ea quæ euacuationis causâ sunt, Venæ sectio minimè necessaria, cum sanguis hæc pauca in hoc affectu euacuatio, reuulsionem hanc non requirat, quæ vires prosterneret.

Rhabarbarum in dysenteria, sic in fluxu hepatico, cum hepatis anima dicatur, vbi aliquid simul educendum etiam, valde conuenit. Daturq; vel puluis illius vel dilutum ad ʒ.ij. addito Spicæ ʒ.β. vel Cinamomi ʒ.β. additis interdum & Myrobalanis, vel aliis, vt in dysenteria dictum: Vel sunt pilulæ ex Rhabarbaro cum Mastiche, vt in diarrhœa notatum: Abstinendo hic ab Aloë, cum venarum oscula aperiat.

Clysmata non adeo hic necessaria, quod tamen ex Lacte vti dictum preparato paratum, eodem modo vti assumptum prodesse poterit. Quod si dolor aut aliud accidens superueniat, pro illius ratione, vel absterforiū leue, vel glutinans aut adstringens, in dysenteria descripta, vsurpari possunt.

Propinantur ad fluxum sistendum & hepatis intemperiem corrigendam, varia sequentia: R. fyrupi Cydoniorum, de Rosis rubris siccis, Myrtini ana ʒ. j. de Cichorea simplic. vel cum Rhabarbaro, de Endiuiâ ana ʒ.β. misce: Vtatur.

Vel fiat Iulep, diluendò aquis Plantag. fol. Quernorum, Endiuiæ, Hepaticæ.

Syrupus ex succo Hepaticæ coctus cum Saccharo, probatur.

Decoctum conueniens: R. radice Asparagi, Acetosa, Plantaginis, Foeniculi ana 3.j. foliorum Hepaticae M.j. fol. Endiuiae, Agrimoniae ana M.ß. Passularum cum vinaceis 3. iij. fiat decoctio in Brodio vel Aquâ: Capiat scutellam sæpius. Hepar lupi puluerisatum ad 3.ß. misceatur vtiliter.

Lac quod glutinando oscula aperta recludat, quandoque conceditur, illis præsertim, quibus & cibus insuper est cõsuetus & gratus: Datur vstulatum; Ouillum cæteris præfertur, coctum, vt serum penitus absumatur, quod similiter vstulari potest.

Amygdalogalon & Oryzogalon, Hordeum simili ratione competunt.

Passulae maiores vel minores, vel minime Corinthiacae dictae, cum hepati sint amicae, valde probantur comestae, præsertim cum granis: quod vt commodius fiat, prius contundi possunt.

Rob passulatum fieri potest, coquendo illarum bonam quantitatem in Vino rubro, vel alio illoque generoso, si calor non obstat, & postea succum ex hisce diligenter exprimendo, rursusque in formam rob coquendo: Quod simplex vsurpatur, vel componitur aliis additis pulueribus, vti dicitur.

Pulueres qui per se propinantur cum Vino, Iusculis, Lacte, vel cum Rob passulato, carne Cydoniorum, additis interdum & syrups incorporati, in forma electuarij dantur, vel cum Saccharo rosat. tabul. puluerisato, vel cum Saccharo & prædictis conseruis Rosarum, Cichoreae, &c. cocto in tabulas formantur.

Primus: R. Coriandri præparati, seminum Oxylapathi ana 3.j. femin. Endiuiae, Portulacae ana 3.ß. Rosarum rubrarum 3.j. Santali rubri & odorat. 3.ß. Coralli rubri 3. iij. fiat puluis.

Secundus: R. seminum Acetosae 3.j. seminum Securigidae vel Cuscutae, Nasturtij ana 3.ß. Spodij 3. iij. pellicularum interiorum stomachi Gallinae 3.j. fiat puluis.

Hiscæ Hepar lupi præparat. ad 3.j. additum, efficacissimum est, & virium causâ pulueres Diamargar. frigid. De gemmis, & similes permiscuntur.

Tertius puluis: R. Rhabarbari, Hepatis

lupi præpar. ana 3.j. cortic. Thuris 3.ß. Cinnamon 3.j. Spicae 3.3. fiat puluis; Vtatur per se, vel misceatur cæteris.

Ex vstatis, puluis Diatrion santalorum & hepatis & fluxui huic accommodatum est remedium, tum ob santala & rhabarbarum, quod in eo aliquando duplicatur; dein ob gummosa, venarum oscula occludit, & ob frigida, calorem contemperat. Datur tabulatum vel puluis illius per se, vel permixtus reliquis pulueribus expositis. Hæc eadem etiam Diarrhodon Abbatis præstat, eadem quoque recipiens, aliaque plura idem efficiunt, & in tabulis vel alio modo sumitur: Aromatico rosato, cum tantus non est calor, maior vero ventriculi imbecillitas, etiam vti possumus.

Narcotica vigiliarum potius causâ, quam doloris quandoque dantur, cum noctu hic fluxus præsertim ægrum molestant, inquietum reddat. Inter quæ Philonium Persicum cum adstringat, vt in aliis fluxibus, sic & hic pulueribus iam dictis permixtum, si opus sit, exhibetur.

Extrinsecus ventri applicatur ferè eadem quæ in dysenteria fuerunt exposita, cum & hic oscula venarum sint occludenda, fluxusque sistendus, additis tamen hic semper quæ hepatis etiam conueniunt, cum illud abdominis sub hypochondrio dextro spacium insigni occupet, atque eousque vnctio soleat extendi. Possumusque vti illic descriptâ inunctione, pulueribus, emplastris, cataplasmate: addendo simul hepatis causâ Absinthium, Eupatorium, Santalorum omnia genera, Spicam, Squænanthum, radices Asari, Spodium, Storacem calamitam, & similia.

Hepatis regioni, si caloris præsertim magni ad sint indicia, quæ illud non nihil cõtemperant & roborent, adhibenda, qualia in illius inflammationis principio adhiberi solent, illic descripta inunctio, quæ R. olei Rosae, Myrtini, cum succo Endiuiae vel Cichorii. Item vnguentum Rosaceum & ceratum Santalinum, quibus adeps lupinus, qui tantopere in fluxu hepatico laudatur, addi poterit. Qui etiam comestus, si recens haberi posset, iuuare creditur. Dein & calore præsertim exigente, Epithema repellens, ibidem descriptum, quod R. aquæ Rosarum,

3.c. addito etiam Spodio, vsurpari poterit.

Renum sedibus, cum magnum habeant cum hepate consensum, ex refrigerantibus in illius inflammatione expositis, quædam adhibere possumus.

Pedum foras, aliorumque externorum in dysenteria expositorum vsus, hic quoque conuenient.

*Celiaca
passio
curatio.*

Celiaca passio seu fluxus alui chylosus, per quem chylus purus exit, frequens est affectus, infantibus præcipuè familiaris, nec adeo periculosus, nisi grauioribus affectibus copuletur, aut illi etiam alia diarrhœa accedat. In hoc casu, cum ab obstructione venarum meseraicarum proueniat, accedente interdum hepatis imbecillitate, harumque illi adnexarum venarum, vnde suctionis euenit defectus, obstructionib⁹ aperendis primaria hic curandierit intentio, hisce præsertim quæ hepati simul sint conuenientia, nec aluum perturbare possint: abstinendo ab adstringentibus interim, cum fluxus ille non adeo immoderate fiat, nec illis vtendo, nisi aperta obstructione, diarrhœa alia subsequatur, tunc etiam illa vsurpare possumus. Remedia autem fluxui chyloso competentia, præter multa, in hepatis obstructione explicata, sequentia erunt.

Ad pituitam, mucum, limum quæ venas obstruunt, deturbanda leuiter; Conferunt pilulæ leuiiores eiusmodi: R. Rhabarbari 3.j. ß. Agarici 3.j. Cinamomi 3.ß. Spicæ; Squeænanthi ana 3.j. fiat puluis, & cum Aqua vel succo vel syrupo Endiuia, vel Vino albo fiat pilulæ: Capiat 3.ij. semel, vel si opus sit, iteret.

Vel: R. Prædictum puluerem, irroretur Vino albo per noctem, postea additis aquis Fœniculi, Apij veri, & Cichorij, fiat expressio, misce syrapi Ros. solut. de Endiuia, Capillorum veneris ana 3.ß. fiat potio: Bibatur vna vice.

Postea conueniunt sequentia successiue exhibita, Tabulæ Diarrhodon, Diatrionfantalorum; & si validius aperire volumus, Diacurcumæ, quæ omnia rhabarbarum simul recipiunt.

Vel detur hoc electuarium: R. conferuæ florum & condit. radicum Cichoreæ ana 3.j. conferu. Capillorum veneris veri, vel Tri-

chomanes 3.vj. conferu. radicum Apij veri vel Fœniculi 3.j.ß. conferu. Eryngij radic. 3.ß. pulueris Diarrhodon vel Triafantalorum 3.j. Diacurcumæ 3.ß. cum syrupo de Byfantiis fiat electuarium.

Aquæ stillatiuæ post tabularum vel electuarij vsum statim superbibantur, Fœniculi, Apij, Cichoreæ, Endiuia, addendo tertiam partem Vini albi.

Syrupus Byfentinus, de quinque, de duabus Radicibus, de Cichorea, de Endiuia, Capilli veneris sumi possunt, per se, vel diluti aquis iam dictis.

Vel decoctum hoc bibatur: R. radicum Cichorij, Fœniculi, Apij, ana 3.j. radicum Eryngij, Pastinacæ syluestris ana 3.ß. macerentur parum in Vino albo, herbarum Capilli veneris, Sonchi, Endiuia ana M.j. Cicerum rubr. P.j. seminum Coriandri, Apij veri ana 3.j. fiat decoctio, & in colatura adde Sacchari q. aromat. Cinamom. 3.j. Satal. odorat. Squeænanthi ana 3.j. Bibat tribus vicibus.

Vinum per infusionem ex iisdem radicibus factam, efficacius operabitur, addendo & Rhapontici, Rubiæ an. 3.j. Cyperi 3.ß. Absynthij, Eupathorij ana 3.ij.

Inunctiones ventris non ex adstringentibus, sed obstructiones soluentibus faciendæ, quæ cum illarum vis ad mesenterij & omenti venas, vbi obstructio consistit, penetrare possit, aliquid quoque præstabitur.

Fiat igitur tale linimentum pro ventre: R. olei Amygdal. amar. 3.j.ß. olei Nardini, Chamomel. vel Melilotini ana 3.j. succi Apij vel Fœniculi, Vini albi ana 3.j.ß. cocta prius, vel alioquin inuicem agitata, inungantur, manibus Aquâ vitæ prius madefactis, vel Vino, si hoc in linimento omisum fuerit.

Vel: R. prædictum linimentum, addendo Afari & Gentianæ ana 3.j. Spicæ, Squeænanthi ana 3.ß. seminis Apij 3.j. Cere q. s. fiat vnguentum.

Hepatis regioni si illius adsit imbecillitas, quædam quoque adhibentur, quæ in illius imbecillitate explicantur.

Cucurbita illius sedi admota, chylum ed rapere creditur.

Si diarrhœa alia fluxui chyloso iungatur vel superueniat, tunc si illa admodum virgeat, adstri-

adstringentibus, vt in lenteria dictum, intus forisque, sed leuioribus vti possumus. Quæ alioquin vti dictum, omittuntur.

*Deiectio
nisi puru-
lenta cura-
ratio.*

Purulenta alui deiectio, si in dysenteria vel colico dolore accidat, curatio in illis affectibus iam fuit exposita: Vti & si ab hepate aut liene proficisceretur, cura in horum morbis alibi est exposita.

A mesenterij abscessu in vlcus conuerso, si diu perseverans illa purulenta deiectio proueniat, ægri plerunque malè habiti, discolorés, longo tempore hoc fluore molestantur. Cui mederi cum extra intestina vlcus sit, & ab eo in abdominis cauum facile etiam aliquid de pure illabatur, admodum difficile; Interea tamen iisdem & propinatis atq; iniectis, quibus in dysenteria & tenesmo, si purulenta quoque in illis fiat excretio, vtimur, curam aggredi, in eaque si spes aliqua affulgeat, perseverare possumus.

*Deiectio
nisi vn-
ctuosæ &
pinguis
curatio.*

Vnctuosæ & pinguis excretio, si ab assumptis pinguibus, coctione non transmutatis eueniat, & lenteria sit species, nō aliam curam, quàm quæ lenteria debetur, exigit. Vti nec aliam, si ob nimium talium ciborum vsum, in diarrhœa pinguis cum cæteris ejiciantur, quàm quæ diarrhœæ conuenit.

*Facum
alui per
vomitiū
excretio-
nis cura-
tio.*

Per viam aliam quàm podicem, quæ sit facum alui præternaturalis excretio; Si per vomitionem fiat, in ileo, vti ostensum fuit, morbo, vel Herniâ, periculosa cura, cū pauci euadant, existit: Et tunc causæ morbificæ, sicuti in illis affectibus dictum est, curatio potius accommodatur, & propter vomitum abominabilem, tetrumque odorem & saporem, quem infert, os faucesque Vino, Aceto aliisque odoratis & gratias abluuntur, ventriculusque roboratur; alioquin in eo sistendo, ne sordes hæ retineantur, laborare minimè debemus.

*Facū al-
ui cū vri-
na excre-
tionis cu-
ra.*

Per mictionem si stercora cum vrina prodeant, exulcerationi huic fistulosæ cervicis vesicæ rectum intestinum permeantis, tota cura accommodabitur, qualis in purulenta mictione descripta fuit.

*Facū al-
ui per v-
teri sinū
excretio-
nis cura.*

Per sinum vteri si stercora exeant, similiter cura vlceri cervicis vteri sinuoso, rectum etiam intestinum penetranti debetur: Qualis in ea exulceratione declarata fuit.

Per vulnus abdomini inflatum, intestina perforans, si alui faeces vel chylus elabatur, cura ad vulnus tantum dirigitur, quod si lethale sit, vti existit, si magna sit facta læsio, aut excrementa in abdominis cauum quoque se inferant cum sanguine, tunc cum morte hæc excretio finitur. Quod si verò tale non sit, atq; in fistulosum vlcus vulnus hoc conuertatur, tunc excretio hæc permanens est, atq; incurabilis. Si verò vulnus hoc non solum in cute & carne, sed & in ipsis intestinis, vel callo illic genito, vti cum aliquando deprehendimus, vel carne adnata, sicuti de vesicæ vulnere diximus, coalescat & obturetur, excretio hæc sordida, viuo remanente ægro, vti interdum accidit, aboleri poterit.

DE SORDIDA EXCRETIONE.

CAPVT XII.

Genera.



SORDIDA excretio, per quam sordes, hoc est alia excrementa præter ea quæ enumerata sunt, corpori alicubi se insinuantiæ, vel adherentiæ, inde abscedunt, sordium causâ, quæ omnes vitiosæ sunt, semper præternaturalis existit; cuiusmodi sordes in sequentibus locis se offerunt.

In auribus eiusmodi sordes semper ferè colliguntur, indeque, cum sponte vix prodeant, eximuntur, suntque plerunque ceræ instar crocæ & spissæ, nonnunquam & duriusculæ, interdum & aliter coloratæ. Hæ pruritum in auribus mouent cum redundant, audituique impedimentum adferunt: sicuti in auditus læsione ostensum fuit, vbi & eas exactius descripsimus.

*Aurium
sordes.*

In naribus sordes crassæ, nunc humidæ, nunc siccæ, albæ, flauescences, nigræ, firmiter sæpè adnatæ, adeò vt ægrè & nonnunquam non citra læsionē inde auelli queant, hærent, naresque interdum opplent, quas Germani *Näsen* vocant, admodum cum extrahuntur, illis qui eas vident, nauseam mouentes: præsertimque si infantes vel etiam

*Narium
sordes.*

alii sordidi homines eas deuorent.

Oculorū
sordes.

In oculis præter lachrymas & pus, sordes aliae crassæ, albæ vel subflauæ oculorum, angulis inhaerent: idque in purulentis & lippis oculis, sicuti in hisce oculorum affectibus descriptum fuit.

Oriū an-
gularum
sordes.

Labiorum angulis, quos frenas vocant, sordes similiter adhærent, vnde si diutius illic hæreant, nec auferantur, vt in negligentibus sit, exulceratio quædam earū sedium quandoque exoritur.

Vteri &
anus sor-
des.

In obscenis mulierum, sordes similiter copiose interdum, præter alios fluores, coaceruantur, vnde foetidus odor exhalat.

Cutis sor-
des.

Cuti sordes multis in locis adhærent, tenuiores crassioresve, quæ odorem grauem, vt hirci interdum expirant, in quibusdam, quos ac si ex longiore in vno loco morâ, ad gallinarum otis incumbantium fotum alludentes, hoc vitium contraxissent, Brieteken nostri Germani vocant.

Pedū in-
sensitio-
rum sor-
des.

In pedibus hoc frequentius accidit, illis quibus continuò pedes sudoribus madidi fordescunt & foetent; consuetumque multis est vitium, maximè ætatis tempore vrgens, valde illis cum quibus versantur, molestum. In interstitiis digitorum pedum sordes crassæ & nigrae, frequenter cumulantur, admodumque foetent; vti & nonnunquam sub axillis, aliisve in locis pilosis, in quibus facilius hærent.

Dentib;
sordes.

Dentes præcipuè sordibus scatent & inquinantur, quibus sæpè tori obducuntur, alias circa radices potissimum; Quæ nunc molles adhuc sunt, & albæ pultis instar, alias subflauæ, interdum duræ, tandem etiam tophaceæ: interdum & fuligo quædam illos denigrat.

Causa.

Bilis, cau-
sa sordid-
is au-
gulis.

A Bilioso humore excrementitio, sordes illas croceas in auribus gigni, croceus illarum color & amaritudo summa ostendit. Quæ bilis sero permixta, vti in capite naturaliter, sensim in aurium hanc cauitatem cum sero, quod eò quoque, vt aurium hunc meatum humectet, transmeare modò diximus, transfudans, in eo coaceruatur, ita copiosius eò delata, aures nisi repurgetur, op-

plet, & diutius retenta, crassescit, tandemque, vti dictum, indurescit. Ab interiore auditus meatur, hanc prouenire, cum tympanum non lædat, nec auditui, nisi extrinsecus aurem obstruendo noceat, satis demonstrat.

Ab aquoso humore oculos irrigante, atque aures humectante, ob retentionem tenacior reddito, oculorum sordes angulis adhærentes gignuntur, & sordes etiam aliae quàm croceæ illæ in auribus proueniunt. Atque in obscenis mulierum, ex madore illo has sedes alluente, maximeque si fluor vterinus adsit, sordes quæ foetorem expirant, congeruntur.

Ab eodem humore pituitoso tenaci seu mucos, nares alluente, ob aeris per nares attracti expiratiq; calorem vel siccitatem exiccato, sordes illæ tenaces & siccae naribus ad eò validè affigentes, gignuntur, notuq; præsertim, si capite declinui iacente, madore quo nares madere solent, quò minus ad nares feratur, prohibeatur, & sic exsiccetur.

Ab exhalationibus & sudoribus, e corpore prodeuntibus frequentibus, odore graui præditis, quem hircosum, cum ab hircis talis expiret, nominant, in hominibus immundis, qui curam corporis negligunt, se affiguntibus, cutis fordescens, foetorem eum qui ab illius quibusdam locis, vbi magis se affigunt, expirat, concepit: quod cum in extremitatibus, quò natura hanc illuuiem propellit, facilius accidat, idcirco pedum foetor adeo est frequens quibusdam, quibus & pedes continuò ferè tunc sudant & calent, idq; ætatis maximè tempore. Sudor quoque aliaeve sordes cutis & strigmenta diutius in angustis corporis retenta, si hæc loca immunda feruentur, vel in pilosis sedibus corrupta, ex eiusmodi locis expirant, vt sub axillis, circa inguina, in obscenis, & in interstitiis pedum digitorum frequenter accidit, vbi sordes collectæ moraq; crassæ & nigrae euadentes, teterrimum odorem exhalant.

A cibis sordes quæ dentes oblinunt, nascuntur, præsertim tenacibus, qui suo lentore continuo illorum vsu dum masticantur, nisi abluantur & fricentur dentes, successiuè illis veluti gluten adhærescunt. Ab iisdem in

Aquo-
sum hu-
mor, cau-
sa sordid-
is au-
gulis &
Narib;.

Sudor,
causa for-
ditum in
Cute &
Pedibus.

Cibus,
causa sor-
ditum in
Dentib;
& Oriū
angulis.

oris diuisionis angulis hærentibus, sordes quæ illic sæpè hærent, & nisi abstergantur, tandem eas sedes exulcerant, emergunt.

*Saliua, causa for-
dium in
Dentibus.* A saliuâ dentes sordidi similiter euadunt, cum mucosa sit, maximeq; tunc si tenacitatem maiorem à cibo acquirat, vel à calida expiratione, quæ eam, dum ore clauso dormiunt, exsiccando amplius increffat. Sic autem dentes oblinuntur, cum otiosi sunt, nec mandunt, & proin à cibo, à quo, solidiore præsertim, vt pane, inter masticandum aliàs abstergeri & poliri solent, non repurgantur: vnde is qui in vno oris latere cibos tantum conterere solent, alterius dentes sordibus hisce inquinatos plerumque esse cernimus, limoque obductos; qui limus tandem etiam in tophum conuersus, dentes non solum discolorat, sed & inæquales reddit, quod à serosa & terrestri materia, quam saliuâ in se continet, dentibus sensim cum limo accrescente, vt & alios calculos gigni ostendimus, hic quoque prouenire solet, maxime illis in locis, vbi dentes minus læues existunt, vt circa radices sub gingiuis, vel vbi aliàs læsi & attriti sunt, in quibus dentium sedibus primum tophi adhaesci, indeque sensim augeri, nisi abstergantur, donec totum dentem sæpè cooperiant, solent. Verum & saliuâ putris & maligna, in lue Venerea, ex hydragryi usu reddita, dentes inquinat & denigrat, simulque vt vacillent efficit.

*Exhalatio calida, causa for-
dium in Den-
tibus.* Ab exhalatione calidâ, in morbis calidis, aut malignâ, in febribus malignis aut pestilentialibus, vt simili modo dentes cum faucibus & linguâ inficiantur, proficisci potest.

CURATIO.

*Auribus for-
dium
cura.* IN aurium sordibus, quo pacto procedendum, in auditus læsione quam interdum pariunt, declaratum fuit.

*Oculo-
rum for-
dium cu-
ra.* In oculorum sordibus, eadem cura, quæ in epiphora & lachrymis exposita fuit, adhibetur.

*Narium for-
dium
cura.* Narium sordes digito immisso, si impedimentum adferant, plerumque solent eximi, quod si secedere nolint, prius attracto liquore aliquo, vt lacte alii se emolliendæ, & postea auferendæ.

Oris au- In labiorum angulis sordes, ciborum &

saluæ abstersione, præcauentur, atque auer-
guntur: sin exulceratio sequatur, cura eadem
erit, quæ & in aliis oris exulcerationibus.

*Cutis for-
dium cu-
ra.* Cutis sordes aliæq; adhærentes immundities, actuali ablutione & frictione tum faciei tum aliarum partium, & præsertim manuum, quæ frequentius immundæ sunt, Aquâ auferuntur, meliusque calidâ: Et si plures partes fordeant, in balneo. Vel si eiusmodi sordes ob glutinositatem aut pinguedinem pertinaciùs adhærescant, nec facile cedant, illis abluendæ sunt, quæ præter deterforiam vim, etiam pinguedine quadâ prædita sunt, quâ magis quam aquea sola istis sese permiscendo, potentius in ea agere possunt. Qualia sunt Lixiuium, quod ex transcolatione frequenti aquæ per cineres fit, addito interdum si efficacius illud esse velimus, etiam Calce, quod lètore quodam pingui simul cum vi detergendi præditum est, cuius vi quæ manus inquinant, facile cedunt: In primisq; si Sapone simul fricentur, qui iisdem viribus & potentius adhuc agit; vt pote ex cineribus, calce & seuo, donec dure scat, coctus qui ad usum, additis quandoque & odoratis, vt radice Iridis, afferuatur. Aliàs verò loco sæui Oleum sumitur, & tunc Sapo mollior remanet, vnde & mollis ad differentiam duri, vel etiam niger ob colorem, & gallicus, quia illic sic ferè paratur, dicitur. Quibus saponum generibus, manus, adhibita aquâ vel lixiuio frictæ, spumâ inde suscitata, sordes quæcunque auferuntur.

Vrinâ propriâ si manus lauentur, æquè ferè ac lixiuio abstergantur.

Reliqua quæ manus mundas albas mollesque reddunt, in Comptoriis & Cosmetictis iam explicata sunt.

*Pedum
fordium
cura.* In pedibus sordes ex sudore contractæ, pedumque foetorem efficientes, difficilius cum sudores continuò redeant, abiguntur, pedumq; foetor ægrè emendatur, diuque sepe perseverat, & vicinis tædium adfert, vnde & maiorem curam requirit. Quæ & in hoc casu vt & axillarum foetore, hoc pacto debet institui.

Purgatione indoneâ, sudorum, qui hisce vitiiis ferè copulantur, & occasionem præbent, materiam auertemus, eam humoribus
& cor-

& corporis constitutioni accomodando.

Sudores postea vt similiter horum scaturigo è corporis superficie exhauriatur, promouendi, idq; sæpius si redire non desinant.

Abluendi vel fouendi dein pedes, vel etiam axillæ aliæve loca potenter abstergentibus & siccantibus, addendo semper ea, quæ simul bonum odorem hisce sedibus conciliant.

Hoc præstat inprimis Lixiuum, factum ex Cinerum in Aqua maceratione vel etiam decoctione, posteaque colatis, vel etiam sine colaturâ, eligendo interdum Cineres è lignis magis siccantibus vel etiam Osibus viridis, miscendo si vehementius siccare velimus, Gypsum, Bolum, Tartarum, Sal, Alumen, Vitreolum.

Quæ & omnia vel aliqua ex illis in Aqua fabrorum decoqui possunt, vel in aliâ minerali aliquâ.

Decoctum Vitreoli folius in Aqua factum admodum operatur.

Quibus omnibus boni odoris causâ incoquimus herbas odoratas, Saluiam, Spicâ, Lauandulam, fol. Myrthi, Absynthium, Vinumq; permiscemus. Aliasque herbas adstringentes, ad validius siccandum.

Applicationes ex Myrrha cum Alumine, Cardui radice, laudat Dioscor. Asphodeli item radic.

Thermarum siccantium, si perseveret malum usus valde iuuat, &c.

In obscenis sordes grauem odorem & marito molestum parientes, quo pacto auferri viriumque hoc corrigi debeat, in fluoris uterini, qui illius quoque causa existit, curâ declaratum fuit.

Dentium sordes, cuiuscunq; generis tam albæ quàm flauæ, aliàs fuliginosæ nigræ, plerumque tophaceæ, sequentibus modis auferuntur.

Repurgando primùm frequenter eos à cibis, illorum interstitiis inter masticandum inhaerentibus, cum ab illis corruptis sorditiem quoque acquirant; idque dentiscalpiis atque collutione oris.

Dentiscalpiis extrudi debent ciborum reliquæ, quando illic subsistunt. Quæ ne continuo usu dentes lædantur, ex ferro minimè

parari debent, & proin nec acie cultri, vt communiter sed malè fit, illud moliendum, cum succo acri qui illi inest, dentes, crebriori eius usu, tandem vitientur. Sed ex ligno vel offe firmo & flexili tenuiter incisus, vel per se sic fabricatis, vt dentium spacia subintrare possint; quales sunt Spinæ piscium aliquæ Tédines item offei pedum gallorum vel aliarum auium maiorum, Clauiculæq; quarundam.

Vt simul dentes firment, odoremq; gratum insuper aliquem concilient, ex lignis peculiaribus quibusdam sunt, vt Lentisci, Myrthi, Lauri, Iuniperi, caulibusque Foeniculi, aliisque similibus, quæ Moscho interdum imbuuntur.

Ex radice Althææ dentiscalpium conueniens paratur, cum metuimus, ne duriora gingiuas atterant: Fitque radicem sub cineribus calidis vel in furno prius exiccando, & postea in longas laminas tenues & acutas secando.

Collutione oris, cibos ex interuallis dentium quoque eluimus, Aquam in os è vase vel volâ manus hauriendo, atque validè vt dentes vndique alluat, in eo agitando.

Abstergendo à dentibus sordes, fuliginem & tophos, eos nitidos reddimus, & ad naturalem album colorem reducimus, quod variis modis perficitur.

Friccione potissimam, quæ sola per se digito vel panno linteo, vel etiam laneo coccineo imprimis facta, dentes mundos reddit, & ne quid ipsis perseveranter adhæreat, impedit: Eoque magis, si hoc quo frictio fit, vi simul efficaci abstergendi prædictum sit. Vt si cortice Nucis arboris exteriori ab interiore viridi cortice mundato hoc fiat, vel aliis abstergentibus corticibus aut membranis.

Dentificiis dictis potentius hoc perficitur: Quæ ex pulueribus fiunt, qui vel per se digito aut panno linteo madefactis prius excepti, partimq; illis adhærentes sic adfricantur: Vel prius infusione gummi Tragachanti aut Arabic. facta in aqua Rosarum aut alia odorata, incorporati, suppositoriorum instar formantur, & ad usum siccantur, vt cum opus est, illis dentes fricentur. Excipiuntur interdum & Melle, & sic pulvis instar adfricantur.

cantur. Quæ per vices tantum, cum fordescent, aliquoties vsurpari debent, ne nimio ipsorum vsu, simul dentium substantia attrahatur.

Pulveres autem, è quibus dentificia hæc sunt, desumuntur ab illis, tum quæ actu illuuiem illam, dum dentes illis fricantur, abradant, sicuti cum arenâ vel aliâ terrenâ materiâ adhibitâ, vasa mundantur, tum quæ potentiâ simul visiccante & abstergente illud agant. Qui tamen ne dentes asperitate sua exasperent, aut etiam de ipsorum substantia aliquid insuper deterant, minutim contriti & læuigati esse debent.

Quod cum facilius fiat, si friabilia & leuia sint, à quibus hæc petuntur, idcirco communiter vsurpantur pulveres Osis sepia, ex alba & fungosa illius substantia; Item Oculorum vti vocant canceri, & spongiosorum lapidum, vti Pumicis & Spongiæ: Dein & Halcyonij seu Spumæ maris.

E quibus aliqua etiâ prius vt vehementius abstergant, interdum vruntur: vti Pumex, cuius loco Carbone fossili eousq; combusto, vt pumicem referat, vti possumus.

Ex solidioribus & durioribus quæ sumuntur, egregiè comminui debent, vel potius si ægrè hoc fiat, vt friabilia fiant, prius vri, à qua vitione nouam insuper, vti dictum, abstergendi vim acquirunt: In vsuque sunt præcipue pulveres Cornu cerui, aliæve, Ebur, Dentesque varij vti & equi, Concharum omnium genera & Cochlearum terrestrium testæ: Atque ossa seu nuclei fructuum quorundam, vt Dactylorum, Myrobalanorum, Oliuarum, Nucum cupressi: Quæ omnia vti prius potius quam non vti rectius adhibentur. Vti ex lapidibus, puluis Alabastris, vel Specularis lapidis, aliorumve qui facilius attrahuntur, vel si difficulter hoc fiat, prius vruntur; Vti & ex Terra vsta, Tegulis minutissimè contritis.

Ex mollioribus quoq; & humidioribus aliqua vsurpata, in furno vel sub cinerib. prius ita exiccantur vel vruntur, vt in puluerem redigi queant; Veluti Panis illiusve crusta, præferturq; Hordeaceus vel ex Rogga salitus.

Item ex plantis, Pimpinella, Parietaria, Beta, Capillus Veneris, Caules, folia Myrthi,

Lentisci, Oleastri, atque ex odoratis, Pulgium, Origanum, Hyssopus, Menta, Salvia, Rosmarinus, separatim vel plura inuicem, aut cum supradictis simul vsta & in cineres redacta.

Hæc odorata varia vt suauem insuper anhelitum concilient, permiscantur, veluti pulueres aromatum, imprimis Cinamomi, Gariophyllorum, Ligni Aloës, similitumve. Vel etiam plantarum odoratarum, vt Maioranæ, Pulegij, florum Lauendulæ, &c. radices Ireos: Dein & Moschus.

Et ad gingiuarum corroboracionem, si præsertim laxæ sint aut consumptæ, Mastiches, Thuris, aliorumve quæ putredinem arcent, vt Myrrhæ pulueres: Quod si dentes corrupti sint, quæ in illis competunt, sicuti in hæc affectibus dictum est, vsurpantur.

Atque ad pituitam insuper educendam, radix Pyrethri, semen Sinapis, Piper, Zingiber, vel etiam Hellebori tantillum, si ea redundet, additur.

Succi terrestres falsi aliqui non tamen erodentes, abstergendi vi quâ pollent, vtilissimè ad dentes mundandos illis affricantur, cum asperi non sint, facileque comminuantur, & spontè diffuant; Veluti Sal, quo cum semper ad manus sit, communiter dentes fricantur; vel cæteris pulueribus ad vim eorum intendendam, & vt gratiores sint, ferè semper additur. Conuenitque tam commune quod coctum est, quàm fossile, quod sal Gemmæ vocant. Idem Alumen & Nitrum præstant, magisque tam sal quàm hæc adhuc agunt, si supra tegulam ardentem fusa, assentur, sicque vstis, vti vocant, vtamur.

Salis Alkali, quod ex cineribus Kali plantæ conficitur, dissoluti cum contritis lapidibus pro vitris conflandis, innatans veluti pinguedo, quæ refrigerata durefcit lapidis instar, atque Axungia vitri vulgò appellatur, puluerisfata dentes mire nitidos & politos reddit.

Tartarum Vini albi validius eos extergit, non solum, sed cæteris additis, adhibitum.

Composita varia ex enarratis fieri possunt; E multis hæc sunt faciliora: Bz. Osis sepia 3.ß. Corallorum subtilissimè attritotum 3j.

Cornu Cerui vsti ʒ.ʒ. Salis ʒ.ij. vel plus, fiat pulvis.

Aur: R: Pumicis ʒ.ʒ. Alabaſtri leuigati ʒ. j. Eboris vsti ʒ.ʒ. Axungia vitri ʒ.ij. fiat pulvis.

Vel: R: cruſtę Panis toſtę ʒ.ij. Oculorum cancri ʒ. j. Oſium daſtylorum vſtorum ʒ.ʒ. cinerum Roſmarini ʒ. j. Aluminis vſti ʒ.ʒ. fiat pulvis.

Hęc addito tantillo radicis Angelicę vel Ireos, vel Cinamomi, aut Gariophyllorum, aut guttā vnā aut alterā olei ipſorum, odoratioꝝ reddi poſſunt. Vel infuſione factā in aquā Roſarum moſchatā, in dentiſſicia reduci. Addendo & parum Maſtiches, ad robur dentium, aliāve ex iam dictis ſimpli- cibus.

Succis plantarum quarundam dentes fricati purgantur. Vt de ſucco Pimpinellę ſcribitur. Et ſuccus radicis Cyclaminis idem illud efficit.

Aquis quibusdam ſtillatitiis panno linteo digito vel bacillo obuoluto exceptis, dentes fricati, ſimiliter repurgantur; Conuenitque ſequens: R: Salis communis vel gemmę vel foſſilis ʒ.ij. Salis ammoniaci ʒ. j. Aluminis ʒ. j. Trita & diſſoluta cū pauca aqua Roſarū vel Limonū, deſtillationi ſubſiciantur.

Fortis appellata aqua, ſi diluatur iisdem aquis, eoſq; vt innoxia fiat, & dentibus vt dictum, adhibeatur, eos egregie ab immunditie omni repurgat, vt & eā quę in Lue venerea dentibus adnaſcitur.

Oleum ſeu ſpiritus Vitreoli dilutus quoque eodem modo applicatus, ſimiliter operatur.

Collutione oris, non tantum cibos qui illis inhærent abluendo, vt dictum, ſed & ſordes & fuliginem, quę noctu ab expiratione ſe illis aſſigit, abſtergendo, dentes mundos reddimus, vel ſaltem ab immunditie præſeruamus: Si matutino ſemper tempore os diligenter aquā, addito interdum & Vino, vel pauco Aceto aliisve, colluatur, eoque magis ſi inſuper dentes perfricentur, & tunc quoque ſi neceſſitas exigat, dentiſſicia adhibeantur, eaque ruſum hac quoque collutione eluantur. Quę ſi fuerint, atque dentes ordinariē ita abluerentur, cū non minus quā manus continuo inquinati, iungi ablu-

tione etiam opus habeant, mundi & ſani ad extremum ſæpe ſenium uſque, niſi vis alia accederet, conſeruarentur; cū e contra his neglectis, mundi, albi, & incorrupti minime poſſint permanere.

Maſticatio ciborum facit, vt dentibus minus ſordium adhæreſcens eos inquinet, unde & eo in latere, vbi ob dentes vitiatos, cibos non mandere ſolent, dentes citius inſciuntur, tophiq; illisq; accreſcunt, ob eamq; cauſam, ſi fieri poteſt, eo etiam in loco interdum cibos manducare aſſueſcant, ſic enim ſucceſſu temporis de adnata illis materia ſemper aliquid deceder.

Dentiſcalpiis cū cibi dentibus inſixi extruduntur, ab iisdem quoque, & præſertim ipſorum lateribus ſemper aliquid auferitur, quod dum fricantur, in interſtitiis hærens, attingi nequit, & proin non ita vt quod in ſuperficie ipſorum eſt, auferri. Hoc validius præſtabunt, ſi ligna vel radices, ex quibus dentiſcalpia, vt ſuprà dictum, ſunt, in aqua falſa vel aluminosa coquantur, vel prius in ea tingantur.

Inſtrumentis ad id aptis, quę ex ferro puro lata vel acuta in hunc uſum formantur, Tophi ſpiſſiores aliquando ab ipſis abrum- puntur vel abraduntur.

~~~~~

## DE ANIMALIVM EXCRETIONE.

### CAPVT XIII.

#### Genera.



ANIMALIA quædam in corpore genita, quę viuunt & mouentur, toto genere præter naturam ſunt, vt & ipſorum excretio. Suntque vel ex vermium genere, & proin Vermes appellantur, vel inſectorum, Pediculi nominati. Nam quodd pulices attinet, an & illi in corpore humano gignantur, dubium, vt verò, quodd alibi geniti, corpus inuadant certum exiſtit.

Vermes, qui vermibus aliis extra corpus natis nonnihil corꝛeſpondent, atque aſſimilantur, diuerſimodè formati, è variis corporis ſedibus prodeunt.

*Lubrici.*

Longi Vermes quia lumbricis terrestribus admodum sunt similes Lumbrici appellantur: Suntque teretes, vtrinque in extremitatibus vti & terrestres acuminati, nec rostrum nec caudam exprimentes, subalbi di & duri, infantibus admodum familiares. Qui nunc plures nunc pauciores numero, prius plerumque extincti rejiciuntur, nonnunquam tamen & viui excernuntur.

*Ascarides.*

Accidentia varia eiusmodi lumbricos comitantur; è quibus leuiora sunt, Ventris torsiones, Cordis rosiones, Singultus, Tussicula sicca, Pruritus narium, cuius causà eas continud perfricant, Dentium stridor, Inquietudo, Insomnia grauiora: quorum causà à somno subitò, & sæpè cum clamore expergefiunt. Grauiora, quæ superueniunt interdum, sunt Boulimos, Vomitus, Alui profluuium, Lienteria, Febres, Conuulsiones, Animiq; deliquia.

Breues vermes qui per anum exeunt Ascarides vocantur, suntq; rotundi, cafeo in nascentibus vermibus, aut illis qui in vlceribus nascuntur, non absimiles. Qui viui è podice cum excrementis extra eum protrudantur, aliàs sponte emergunt, Pruritu maximo circa ani sedem molestiam exhibentes, & vix dum grauiora accidentia inferentes.

Hiscè vermibus per aluum reddi solitis, Latos lumbricos dictos adnumerant: verum cum non vti iam dicti vermes viuant, aut moueantur, sed membranæ sint longissimæ, in corpore crescentes, in inanimatorum excretionem eas explicabimus.

*Vermes ex ore prodeuntes.*

Ex ore Lumbrici quales per aluum excerni modò offendimus, nonnunquam prodeunt, quod infantibus dum dormiunt, aliquando contingit, interdum & aliis, etiam alio tempore, nauseam sæpè & vomitum mouentes.

*Dentium vermibus.*

In dentium interioribus, vermiculos nasci aliqui crediderunt, fortè fibris dentium decepti, quæ vti in maiorum ossium cavitatibus, sic & in dentibus cōfractis inueniuntur, aliiq; neruos, alii vermes esse crediderunt: Nisi fortè in excauatis & putridis dentibus hoc accadat.

*Vermes è*

E' naribus iidem lumbrici qui ex ore ali-

quando prodeunt, vti dictum, etiam ex naribus pruritus narium mouentes.

*Naribus emergentes, Narium vermes.*

Vermiculi exigui in narium exulcerationibus emuncti fuerunt.

Vermem pilosum, Salamandræ instar, multis pedibus constantem, è naribus mulierem per sternutationem excussisse, cum longo prius tempore pruritus, circa frontis regionem sensisset, Bergensis Medicus, sanctè affirmans se vidisse, mihi indicauit.

Ex auribus vermiculos aliquando emergere, cum pure, in aurium vlceribus demonstratum fuit.

*Auribus vermes.*

Per tussim vermes in phthisicis aliquando eiectos fuisse, aliqui testantur.

*Vermes tussis reiecti.*

Per mictionem cum vrinâ, quales in cafeo putri gignuntur, exiguos, illisq; omnino similes viuos innumeros, vrinæ innantes, sed mox fundum petentes, illicq; extinctos conglomeratim iacentes, à colico ægro, emictos vidimus, sicuti in eo affectu huius rei quoque mentionem fecimus. Postea idem in alio ægro euenisse obseruauimus, atque alios quoque hoc obseruasse legimus.

*Vermiculi mictione redditi.*

Ex superficie corporis externis vlceribus vermes prodeunt, sicuti in vlceribus vermicosis ostensum fuit.

*Vermes in vlceribus.*

Ex vmbilici profundo, vermem rotundum longiusculum, quales in farina nasci solent, se nonnihil exerentem, moxq; denuò subducentem, vidimus.

*Vmbilici vermes.*

Ex ventris aliâ aliquâ sede, Lumbricos emeruisse, quidam testantur, in vlceribus profundis abdomen atque intestina penetrantibus, per quæ lumbrici intestinorum prodierunt.

*Vermes ex abdominis vulture.*

In brachiis, cruribus, furis, interdum & lateribus, vermes se in affectu quodam exerere, quos Dracunculos vocant, Germani Wirtrosi scibunt. Quorum vtique nobis incognitorum descriptionem aliis concedimus.

*Dracunculi.*

Præter hæc vermium genera, alii in aliis corporis sedibus internis nati, illic, cum nullus inde ipsis pateat exitus, abstrusi permanent, quales post mortem in corporibus sectione apertis, nonnunquam deprehenduntur, de quibus dum viuerent, licet illis instarentur, ipsis aliis morbis affectis, vel om-

*Vermes corpori inclusi manentes.*

nino nihil, vel saltem certi nihil constabat, vti nec Medicis, quorum curam habebat. Hi vermes ad excreta minimè pertinent, sed ad alia accidentia, quibus incommodant, vbi & explicantur, referuntur.

*Vermis  
sub cor-  
de.*

Sub corde illiusque inuolucro, sic vermes generari, illicque latere, & punctione aliquâ molestiam exhibere, aliqui prodiderunt, sed locum aliter nō exprimunt, falsi fortè, quod cum si lumbrici ad orificium ventriculi vsque ascendunt, & statim sub corde illud occurrat, & proin cor dicatur, illudque vellissent, eos sub corde consistere existimarint. Neque enim alibi, vel in ipso pericardio, minusque sub eo, cum septo connatum sit, generari aut subsistere possent.

*Phitiria-  
sis. Pedi-  
cularis  
morbis.*

Pediculi, animalcula exigua sic appellata, è variis corporis superficiei sedibus emergunt, & pruritus admodum sepè molestus mouet. Quam molestiam inde natam, Phitiriasin, Pedicularem morbum appellant. Horum genera pro ratione partium quas occupant, primùm distinguuntur.

*Pediculi  
in pilosis  
sedibus.*

In pilosis corporis sedibus plerumque certatim proueniunt, maximeque in capitis capillis, frequentius in infantibus & mendicis, nonnunquam & in aliis immundis hominibus, qui plerumque iis scarent, in aliis pauciores inueniuntur. Hi postquam excreuerunt, latiusculi sunt, pedesque plures obtrinent, eosque æquales, cum saltem repant non saltent, nigraque maculâ aliquando in dorso notantur: aliàs aliter se habent, & Pediculi nomine generali appellantur. Quod si verò modò nascantur, minimeque adhuc vt vix cognoscantur, existunt, tunc priuatim eos Lendes Latini, Germani Müss vocant.

*Lendes,  
Müss,  
Germ.*

In barba & palpebrarum ciliis ac superciliis, eiusmodi quoque interdum deprehenduntur, illisque in locis pruritus excitant, sed exigui plerumque sunt, cum postquam augeri incipiunt, facile de loco non adeò spaciofo depellantur.

Sub axillis in pilis illic latentibus, pediculi similes quandoque oberrant.

*Vermis  
culi ca-  
pillis.  
erodens.*

Ab aliis pediculis, quos & ventriculos vocant, visum penè subterfugientibus, capillos capitis & barbæ rodi & findi, aliqui docent.

Circa pudenda in pilosa cute, impacti atque inserti inueniuntur pediculi, alterius generis, vehementer pruritus & lancinationem mouentes, & pertinacissimè hærentes, quos Germani *Sitzläuse*/Latini pediculos Inguinales, Galli *Mortpions* vocant: fortè quod non adeò absimiles pediculis in columbario natis, qui pullos columbinos quandoque interficiunt. Hi nonnunquam alia quoque loca perreptantes, alibi se cuti quoque inserunt.

*Pediculi  
cuti im-  
pacti,  
Mort-  
pions  
Gall.  
Sitzläuse  
Germ.*

In nudâ manuum volâ plerumque, vix dum aliis in locis, nisi fortè in plantis pedum hoc quoque: vti aliqui voluerunt, accidat, peculiariter genus pediculorum, sub cuticula latitans, ex leui tuberculo seu fissurâ illic apparente, pruritusque indefinente illic solum molestante, deprehenditur, adeò vt vix dum etiam eximantur, nisi speculo lucido imponatur, possint cognosci, motusque ipsorum obseruari. Hos *Sirones* Germani *Süren* appellant, rectius fortè *Chirones*, cum manus occupent.

*Chirones  
pediculi  
manuum,  
Süren  
Germ.*

### *Causa.*

**O**Mnia enarratorum & vermium & pediculorum genera, vel ex succo aliquo, vel sordibus generantur.

Ex succo quodam per calorem excocto aut putrescente, Vermes gignuntur; qui vel chylus est, vel pus, aut alia crassa materia.

E' chylo in ieiuno præcipue intestino, vbi abundat, Lumbrici intestinorum gignuntur, si portio illius, quæ à venis meseraicis non exsucta est, vel quia crassior, aut veluti carnosior & pinguior, calore intestinorum diu elaborata, sic formam & vitam assumens, in lumbricum vnum vel plures conuertatur. Talis autem chylus certorum ciborum vsu producit, unde portio illius eiusmodi, ad lumbricos procreandos idonea, gigni potest. Ob quam & causam præcipue infantes, si carnibus nimis maturè vesci assuescant, nec in conuenienti ipsis lactis vsu diutius perseuerent, lumbricis tam facile infestantur. Qui lumbrici vti à succo hoc primùm nascuntur, sic & postmodum eodem aluntur, ac si eum immoderatus absumant,

*Chylus,  
causa  
Lumbrico-  
rum.*



appetentiam nimiam excitant. Et si intestina perreptant, ea titillando, vellicando & fugendo, fatigant, torsionesque & alui profuuium mouent. Atque si ad ventriculum usque ascendant, quò facile à tenuibus transire possunt, tunc & eum molestando, concoctionemque perturbando, alia ventriculi affectus accidentia, atque inter ea etiam lenteriam produciunt, & si os ventriculi rodant, cordis & cerebri symptomata procreant. Et si inde sursum in fauces & nares usque tendant, illicque prodeant, illis quoque in locis molestiam pariunt. Longè autem grauiora, si mortui putrescentes, in tenuibus intestinis hæreant, accidentia inferunt, vapore tetro cor cerebrumque afficiendo, & febres conuulsionesque excitando. Sed & lumbricos diutius retentos, ad eò intestina rodere posse existimarunt, vt non solum ea perforent, sed & ventrem, atque per eum iuxta inguina aut vmbilicum erumpant, quòd haud verisimile, cum nec rostro acuto vel aperto, nec dentibus præditi esse conspiciantur, & fugendo hoc minimè possint efficere. Quapropter si illis in locis vermes prodeant, hi certè in sedibus illis exterioribus in abscessu aliquo facto nascuntur, & lumbricos minimè, sed vermes quales in vlceribus gignuntur, referent. Vel si ab intestinis lumbrici emergant, vulnus in hisce sedibus præcessisse necesse est. Quòd si lumbrici à tenuibus intestinis deorsum, vnà cum excrementis depulsi, in colon ferantur, tunc si mox procedant, viui adhuc per podicem exeunt, vel si excrementis permisti diutiusque retenti, prius extinguantur, mortui cum facibus ejiciuntur.

*Mucus seu pituita, causa generationis Ascaridum, & Vermium in naribus.*

A putrescente materiâ ascarides cæteri que minores vermes nascuntur, quæ ex putredine calorem nouum adepta, tales vermes diuersimodè pro materie diuersitate formatos producit: Cum materia hæc non simplex semper, sed composita mistaue aliis existat.

A pituita vel muco in crassorum intestinorum gyris diu retentis, Ascarides sic gigni possunt, diuque sæpè latere, donec ab excrementis ad ani exitum usque propellantur. Ab eadem in narium antris diu hæren-

te & putrescente, Narium vermiculi nascuntur; Et eruca illa villosa, quam mulierem sternutatione eiecisse è naribus diximus, prodit.

A pure, non solum maturato, sed putri in super reddito, in vlceribus, Narium, Aurium, Externisque vlceribus, vti & eo, quod in vmbilici interioribus latebat, vermes qui ex hisce sedibus prodeunt, gignuntur: Vti & ab eo, quod in pulmonibus coaceruatum, in ipsorum exulceratione, illi qui expuuntur: Et si in dentibus inueniantur, ex putredine in cauis illis existente, oriuntur.

Ab assumptis cibis qui facile putrescunt, vt carnibus caseo & fructibus, si de illis aliquid in intestinorum crassorum anfractibus hærens putrescat, ascarides fortè frequentius, quàm à pituita, vt dictum, procreantur, cum & hæc extra corpus putrescentia, mox vermibus scatere videamus: quod in corpore rarius, cum non nisi diu retineantur, quod vix fit, accidit. Possent & eadè assumpta, si diutius in dentium cauio hærent, putredine vermiculos illic gignere.

A caseo vermiculos quosdam genitos, cum vrina excretos fuisse, prius ostendimus, idemque comprobare videtur, quòd illi, vermiculos quales caseo putri innasci solent, omnino repræsentabant, ægerque sicuti in colico dolore ostendimus, caseo dum sanus erat, immoderatè vtens, illius quantitatem post vsum clysmatis per aluum reiecerit. In quo caseo, diu in intestinorum saccis retento, putrescente, verisimile videtur, hosce vermiculos natos fuisse, & per venas meseraicas, cum sero in venam cauam, indeque in renes & vesicam peruenisse, vrinaeque sic se commiscuisse. Quod eò facilius, cum minutissima sint corpuscula, fieri potuit, cum & crassiores humores, & corpora quædam aliquando per eandè viam in venas transmeant. Quà ratione fortè & in aliis, qui vermiculos tales minxerunt, hoc casei assumpti, & iam vermibus scatentis, vel retenti & primum in intestinis ex putredine eiusmodi vermiculos producentis, causâ accidisse, credibile: cum ab alia putredine humorum, vel in venis vel extra has factâ, hoc non procedere, illud innuere videatur, quòd putredo

eiusmodi frequenter accidat, rarissimum verò sit, tales vermiculos per vrinam reddi, & quod non tam exiles, sed ascaridum instar aliave formâ, sicuti aliis in locis ex putredine nascuntur, generarentur, quales per vrinam excretos fuisse, neminem annotasse nouimus, quod &, tales vermiculos, non ex renû vel vesicæ vlceribus promanasse, cum in vlceribus aliâ quoque formâ prodeant, similiter comprobatur.

*Sordes cutis, causa generationis Pediculorum.*

Ex sordibus cuti adhærentibus & impactis, Pediculi nascuntur. Quæ ab exhalationibus, sudoribus, cutisque excrementis, tum in superficie cuticulæ, tum sub ea collectis retentisque & coaceruatis, infantibus si ipsorum cura negligatur, aut mendicis, aliisve impuris & immûdis hominibus proficiuntur, certisque in locis vbi putrescunt, ob id animalcula eiusmodi inde generantur. Fitque hoc potissimum in pilosis corporis sedibus, cum pertinaciùs sordes illis pilis adhærescant, minusq; quàm in glabra cute abstergi queant: præcipueque in capitis densa syluâ pilis obstitâ, vbi proin frequentius gignuntur, minuti quidem ab initio, cutique penitus inhærentes, sed qui cuticulæ nutritio alii, mox incrementum, atq; per caput oberrant, nonnunquam & vltariùs vti & in vestes, indeque in vicina corpora exspiciantur.

Quod si præter humiditatem illam excrementitiam, sordes hæc vitium simul aliquod in se habeant, aut contrahant, veluti circa pudenda, vbi virus in immundis hominibus deterius exhalans, illuuiem deteriorempilosæ cuti impactam producit, tuncque pediculi peiores profundius cuti infert, quos Anguinales vocant, generantur. Qui in concubitu, iunctis his sedibus pilosis, vel etiam aliàs corpus inuadunt, cutique pertinaciter infiguntur.

*Humoribus, causa generationis Pediculorum.*

Ab ichoribus humorum, vnde scabies gignitur, sub cuticula crassiore in vola manus alicubi reteritis corruptisque, minutissimos illos pediculos sub cuticula latentes, Chirones nominatos, generari inde liquet, quod & pustulæ & scabies vel asperitas illius cutis, simul ferè se offerant.

Verùm quod in hac sede potiùs quàm

aliâ hoc fiat, crassities cutis volæ manus fortè in causa est, quæ vt excrementa hæc tenuia minus dissipentur, efficit. Quod & si in plantis pedum hi quoque nascantur, eandem ob causam euenit.

### *Curatio.*

**L**umbrici in intestinis tenuibus geniti, diu sæpè illic perseuerantes, & chylo aliti, cum nulla incommoda manifesta adferant, nec cognoscantur, negliguntur, qui citra aliam curam, tandem cum excrementis deorsum in crassa intestina peruenientes, ab illis impuls, cum iis per aluum dejiciuntur, aliàs sed rariùs sursum repentes, per os vel nares emergunt: Aliàs verò in intestinis permanentes, vel viui vel mortui, atque incommodantes, grauiæque sæpè numero accidentia, in tenellis præsertim corporibus adferentes, vnde mors quandoque sequitur, curationem exigunt.

Intentio autem curandi eò dirigitur, vt generationem illorum impediamus, genitosque è corpore deturbemus. Impedimus illorum exortum, si ne chylus lumbricis gignendis idoneus reddatur, caueamus: quod fit, si vt moderatus & dilutus lactis instar, non copiosior aut crassior viscosiorque reddatur: cibariis temperanter, illisque quæ laudatum succum gignunt, exhibitis efficiamus, infantesque carne & pinguibus, donec parùm adolefcant, vesci non sinamus, eosq; diu in lactis consueto & pulitum vsu retineamus.

Genitos lumbricos è corpore tam viuos quàm mortuos exturbamus, illis quæ naturam ad illorum cum excrementis excretionem sollicitant: Viuos verò hisce, quæ eos vi ipsis aduersâ vel fugant vel etiam enecant, eaque vel manifestâ, vt amaritudine vel acrimoniâ, aut faldedine vel aciditate, quos sapores lumbrifici fastidiunt: vel quæ pinguedine vel lentore spiracula ipsorum occludendo eos suffocant: vel quæ occultâ quadam proprietate illis inimicâ, vsu cognitâ, eos vel depellunt, vel illis exitum pariunt. Dein & alliciendo eos, vt ad exitum properet, aliquomodo efficiamus, idq; hisce quæ illis iucunda & grata sunt, qualia sunt & alimente-

*Lumbrici corum curatio.*

mentosa & dulcia, è quibus uti viuunt & nutriuntur, ita contrariis afficiuntur. Quæ omnia remedia pro ratione corporis constitutionis, accidentiumq; comitum dirigenda erunt. Ut si febris adsit, calidissima, qualia sunt amara & acria, vitemus vel temperemus, hisce quæ aciditate suâ calorem aliorum, uti & febris contemperant, & nihilominus lumbricis resistunt. Si fluxus alui comitetur, eligenda ea aut miscenda quæ adstrictione aliquâ prædita, vtrumque, & aluum cohibendo & lumbricos necando, præstare possunt. Postremò & si animi defectiones sequantur, cordialia, si conuulsionem, quæ hæc auertunt, prædictis miscebimus. Ad quæ omnia præstanda, sequenti modo per assumpta, admota iniectione procedimus.

Purgantia exhibentur, ut naturam uti ad cæterorum excrementorum, sic & lumbricorum expulsionem excitent, quod & siue viui mortuive sint, efficiunt, & si viui sint, vi in super ipsi aduersa, quam pleraque possident, eos enecant vel fugant, quod in mortuis, cum ea non sentiant, tunc efficere nequeunt.

Ex leuioribus hoc præstat imprimis Rhabbarum, quod cum adstrictione aliquâ sit præditum, etiam cum fluxus alui adest, conueniet, uti & si febris iuncta sit; vel Myrobalani. Quod & succus Rosarum efficit, & florum Perficorū, vel cimarum Lauri, lumbricis inimica. Maximè verò Aloës ob insignem amaritudinem conuenit, & cum ventriculo amica sit, eum repurgando à cruditatibus, chylum puriorem reddendo, sic quoque conducit.

Ex fortioribus, pleraque cathartica cum sint vel nauseosa aut amara vel acria, & purgando & vermes interficiendo pellendoq; proderunt. Vti Senna, Agaricus, Turbith, Scammonea, Colocynthis cæteraque ferè omnia exhibita, de quibus plus adultis minùs infantibus, formis sequentibus propinatur.

Puluis sic parabitur: R. Rhabbarbari 3.ij. adde pulueris Seminis contra lumbricos, quod & sanctum vocant, 3.ß. Musci marini, corallinæ d.ßi 3.j. vel horum loco tantundem de composito aliquo mox enarrando: Detur cum liquore aliquo conuenienti &

Syrupo, mox explicadis, media pars adultæ, minor quantitas iunioribus. Efficaciùs purgabit si & Sennæ vel Turpeti 3.j. addas ampliusque si Scammoneæ 3.ß. misceas.

Pilulæ sic fiunt: R. Aloës 3.ij. Myrrhæ 3.j. sem. Contra lumbricos 3.j. cum syrupo vel succo Absynthij aut Gentianæ fiat massula: Capiat 3.j. vel 3.ß. si iuniores sint. Acuiuntur prædictorum purgantium additione: Possent & Nitri gran. vj. addi.

Infusio conueniens: R. Rhabbarbari 3.iiij. infundatur in Vino Absynthice, vel si febrat in aqua Portulacæ vel Graminis, fiat expressio, adde Sacchari q. s. Exhibeatur.

Decoctum vile: R. radic. Graminis 3.j.ß. Dictamni albi 3.j. Abrotani Hyfopi, fol. Persic. an. m. j. sem. Lupinorum 3.ij. sem. Contra vermes 3.j. sem. Cimini 3.j. Sebesten par. x. quæ vermibus aduersari dicuntur, foliorum Sennæ 3.j. radic. Polypodij 3.vj. fiat decoctio, in fine adde Rhabarb. 3.ij. Cinamomi 3.j. fiat potio. Pro duabus vicibus, in iunioribus pro quatuor vel quinque.

Vinum valde conueniens, cum amaritudo, in illo, non adeò iniucunda: uti in cæteris formis habeatur: R. radic. Dictamni albi 3.j.ß. radic. Tormentillæ 3.j. radic. Filicis. Gentianæ ana 3.ß. herbarum Absynthij, Abrotani ana 3.ij. Menthæ, Hyfopi ana 3.j.ß. summitat. Centaur. min. 3.j. feminis Contra vermes 3.ß. foliorum Sennæ 3.j.ß. Agarici vel Mechoacæ 3.iiij. Turpeti & Rhabbarbar. an. 3.ij. conquass. infundantur in Vini ft. iiij. Utatur per vices, plus minùsve sumendo prout operabitur.

Ex vñtatis purgantibus confert Syrupus de florib. Perficorum, qui præter quàm quòd laxat, vermibus inimicus existit: Vel syrupus Rosarum solutiuus, qui & ipse amaritudine suâ illis est ingratus. Quibus si Rhabbarbū infundas, efficaciores reddes; vel si grana aliquot Scammoneæ illis permisceas, ut infantes libentiùs sumant, efficies.

Pilulæ & Tabulæ purgantes, si conuulsionem vermibus iungantur, vtrisq; conuenientes, in Epilepsiæ curâ expolitæ, hæc quoque vsurpari poterunt.

Puluis ad lumbricos à quibusdam purgans in vsu est, qui Sennam, semen Contra-

**lumbricos, coriandrum & Cornu cerui recipit.**

**Pilulæ vsuales ex Aloë competunt, item Ruffi cum & Myrrham recipiant: Et de Hiera ventriculo acceptæ, aliæ ve stomachales aloëm fumentes. Possumus & aliis & leuioribus & fortioribus vti.**

**Vti & electuariis cuiuscunque generis catharticis, cum omnia & vermibus aduersa sint, atque ipsos expellere queant, addendo etiam alia hisce inimica, obseruando tamen in his & ætatem & vires corporisque constitutionem & accidentia, quæ lumbricos comitantur, maximeque si fluxus adsit, hæc vel omittendo vel huic quoque accomodando, vti & si febris adsit, à calidioribus abstinendo, sicuti prius diximus.**

**Qualitate lumbricis inimicâ & noxiâ manifestâ vel occultâ, vti dictum fuit, lumbricos enecantia vel fugantia, varia exhibetur, quibus & vt ea fugant, vnde citius moriuntur, quandoque ipsis grata permiscemus, atque vt auidius rapiat, cibos alios antequam his vtantur, subtrahimus, atque ea, quæ accidentia ipsorum respiciunt, si illa sint præsentia. Idque variis modis sequentibus.**

**In victu quædam vsurpata alimenta & condimenta lumbricis inimicâ & noxia sunt: Veluti Panis filigineus, Nuges recentes, Allium comestum quocunque modo, & Sebestena vti docent: Atque in acetiariis Beta, Endiuiâ, Cichorium nondum dealbata, sed viridia adhuc & amaritudinem seruantia: Portulaca item & Nasturtium. Acetum cibariis additum, præsertim affatim bibiti; Salcibus permittu, cuius causâ potissimum accidit, vt cum cibis salis vti incipiunt, lumbricis minus infestentur, magisque ante illius usum, dum lacte vel aliis plane, nō, aut leuissimè salitis, infantes fruuntur. Sed & sal solum vel ore retentum, vel deglutitum, ne in ventriculum ascendat, indeque in gulam, prohibet.**

**Inter medicamentosa, Pulueres in hanc rem parantur, qui Saccharo aliisve misti, comedendi vel etiam sine hoc cum Vino, Aquis vel Lacte in infantibus, additis Melle, Passo, Sapâ bibendi exhibentur à 3. β. ad 3. j. vel plures. Vel cum Saccharo dissoluto in a-**

**quis conuenientibus, in tabulas rediguntur.**

**Simplices pulueres propinari possunt sequentes, inprimisque puluis seminis Contra lumbricos, ob efficaciam nomen sortitus: Item musci marini Corallinæ dicti: Item rasura Cornu cerui, maxime infantibus, si reliqua ingrata fastidiant. Aliiue pulueres in compositis efficaciores, simplices quoque dari possunt.**

**Compositi ex hisce tribus sunt, primus: R. seminis Contra lumbricos 3. β. Corallinæ in Aceto macerata & siccata. 3. j. rasura Cornu cerui 3. ij. fiat puluis,**

**Alter ex seminibus compositus: R. seminum Contra lumbricos, farinæ seminis Lupinorum ana 3. ij. seminum Caulium, Coriandri præp. Portulacæ, Citri vel Arantiorum ana 3. j. fiat puluis.**

**Tertius: R. radic. Dictamni albi 3. ij. radic. Tormentillæ 3. j. Gentianæ 3. β. Absynthii, Abrotani ana. 3. j. foliorum Thymi vel Mentæ, florum Centaurii minoris vel Hysopi ana 3. β. Zedoariæ 3. j. fiat puluis.**

**Quartus: R. Cornu cerui vsti 3. ij. rasura Eboris 3. j. pulueris Lumbricorum terrestrium 3. 2. Coralli rubri 3. j. β. fiat puluis.**

**Hisce quibuscunque si Rhæbarbarum adjicias, efficaciores reddes, in lumbricis e corpore expellendis atque occidendis.**

**Ex commistione horum puluerum amplius compositi sunt. Quibus & ex sequentibus aliqui addi poterunt. Vt radic. Filicis masculi & feminae, Asclepiadis, Carlinæ, Aristolochiæ, Succisæ, Anchusæ, Rubiæ, cortic. radic. Mori & Caparum; herb. Rutæ, Polii, Asarinæ, Sabinæ, Marrubii, Calamentæ, Seriphii, Tanaceri, Mentæ, Mentastri; seminum item Atriplicis, Anethi, Securidacæ, Nigellæ, Pseudomelanthii, Nasturtii, Erucae satiu. & sylu. Napi, Leuistici, Lupuli, Acetosæ: Item Sulphuris, Salisnitri, Bouis astragali, Myrrhæ, item gummi Iuniperi: Et vt preciosius fiat medicamentum, Aurum, Margaritas, lapides Preciosos, Unicornu, Os de corde cerui, Moschum & Ambram addunt.**

**Vsitati aliqui sunt pulueres, Contra lumbricos inscripti: quorum vnus ex semine contra**



contra lumbricos, lupinis, absynthio & cornu cerui paratur. Alij aliter præparant.

Si conuulsiones superueniant aut animi defectus: R. feminis Pæoniæ 3.j.ß. sem. Portulacæ, Citri vel Arantiorum an. 3.j. rasuræ Cornu cerui 3.ß. Coralli rubr. pulu. Diamarg. frigid. an. 3.j. Sacchari rosati tabul. vel Manus Christi ad pondus omnium. Possunt & species electuar. de Gemmis addi, & quædam ex illis quæ lumbricos necant.

Decoctum vel syrupus: R. rad. Graminis, Dictamini an. 3.ij. rad. Tormentillæ vel Bistortæ, maximè si fluxus alui adsit, Iridis, Helenij, Filicis an. 3.j. herbarum Cardui bened. Absynthij vulgaris vel marini aut Pontici, Marrubij, Thymi, Calamenthæ, Menthæ, Rutæ, Cannabis an. m. j. Lupinorum, baccarum Lauri an. 3.ij. seminum contra Lumbricos 3.ij. femin. Portulacæ, Caulium, Coriandri præpar. Citri vel Arantiorum an. 3.j. Sebesten par. x. fiat decoctio, & in colatura dissolue Sacchari vel Mellis q. s. aromatiz. Gariophyll. & Cinam. fiat syrupus: Ad vsum.

Secalis quam Roggam vocant decoctum, valde in lumbricis pellendis cõmendatur.

Sebestenorum decoctum, ad lumbricos necandos aliqui vtile esse censent, fortè quòd lentore suo spiracula ipsorum obturando, eos suffocet, cum alijs illis, vtpote dulcia infuauitate nocere nequeant.

Nucum viridium corticum decoctum in aqua factum, bibitum, lumbricos pellere, ex eo licet colligere, quod si supra terram calidum fundatur, lumbrici terrestres statim ex eo emergunt: sicuti experientia docet.

Lupulorum florum decoctum in Lacte factum, bibitum, cum & muscas interficiat, si illud fugant, etiam vermibus inimicum esse, verisimile est, possitque ad lumbricos pellendos similiter vsurpari, cum & semen Lupulorum eos enecare doceant.

Syrupi vsitati ex amaris conferunt, vt syrupus Absynthij, & si febris adsit, Endiuia, Cichorij cum & sine rhabarbaro: Ex acidis, quibus præcipuè cum etiam febricitant vtimur, sunt syrapi de Succo acido, Citri, Limonum, Arantiorum, de Berberis & Ribes, Acetosus simplex vel de succo Acetosæ, de Byzantiis.

Succi ex enarratis similiter conueniunt, vti & Galegæ, Chamædreos, Mentæ, Græcæ, Eupatorij, Helenij, aliarumque plantarum, simplices vel misti, propinati.

Vinum Absynthites lumbricos exterminat: Cui & alia ex prædictis in decocto, amara præsertim, addi possunt: Vt sem. Contra lumbricos & similia.

Laudatur & Vinum ex infusione Chamæpytheos; Item florum & foliorum Eupatorij Mesuæi.

Infusio facta ex Rhabarbaro, semine Lumbricorum, & Scordio, maceratis in aqua vini Vitæ dicta, admodum efficax censetur, etiam infantibus data. Hoc pacto & alia infundi possunt, sicque exhiberi.

Aquæ destillatæ probantur, bibitæ; Veluti aquæ Absynthij, Gentianæ, quæ amaritudine carent, Graminis, Portulacæ, Raphani marini, Rutæ, Mentæ, florum Pruni sylvestris: Et si febris adsit, Endiuia, Cichorij.

Conseruæ & condituræ aliquæ prædictarum plantarum similiter dari possunt. Conferuntque imprimis, conserua florum Persicorum & Gariophyllorum; Item florum Arantiorum, Limoniorum & Citri, sicuti expertus sum. Corticis item horum fructuum conditi, ita vt amaritudinem suam adhuc feruent.

Vrina propria bibita: Et Lixiuum, lumbricis aduersantur; Muria item.

Oleum oliuarum affatim bibitum, lumbricos suffocando, vti & alia quæ spiracula habent, enecat. Huic si succus Limonum æquali quantitate addatur, potentius id præstabit.

Idem facit etiam minori quantitate bibitum oleum Amygdalarum amararum & nucleorum Persicorum, Nucum Indicarum, Item oleum Hyperici.

Item ex oleis destillatis, Spicæ, vel oleum Chalcanthi seu vt vocant Vitreoli, si grana ij. vel iij. dentur.

Misturæ ex enarratis formis variæ fieri possunt, hæc inuicem miscendo, & in compositas formas redigendo, imprimis electuariorum, vel si admodum ingrata sint, pilularum.

In metu conuulsionum hæc mistura fiat: R. cortic. Citri condit. 3.j. conseruæ florum

*Pæoniæ, Rosarum & Buglosi, Mentæ ana* 3.ß. Pulveris prædicti 3.j. Syrupide acetositat. Citri vel de Limonibus q. s. fiat electuarium: Capiat superbibendo aquam Portulacæ, *Pæoniæ, Buglosi, &c.*

*Theriaca & Mithridatum, propinata, ob multa quæ recipit, lumbricos similiter tollit, quibus & alia addi possunt.*

Argenti viui guttam vnam vel alteram vel 3.ß. aliqui deglutiendum propinant, quod vermes, quibus admodum aduersum, citò fugat: Potestque innoxie, vt alibi dictum, sumi.

Aqua in quam portio argenti viui infusa fuerit, in eaque diu agitata, si ab eo colata, bibatur, lumbricos mirificè pellit: Posset & hoc in Vino aliòve liquore fieri.

Injiciuntur enemata, quæ lumbricos alliciant, vt ex tenuibus intestinis in crassa descendant, nec superiora petant, præsertim cum ventriculum eos appetere cognoscimus, ex sequentibusque fiunt, quæ vermes vtpote ipsis grata, appetunt. Propinando prius per os ea, quæ eos fugent, & à superioribus illos depellant.

Fiunt autem ex Lacte, quod si febricitent, omitti potest, vel Brodio carniū non salito, vel decocto Ficuum, Passularum, Tritici, Hordei mundi 15.j. dissoluendo in his Saccharum, Mel vel Sapam ad 3.ij. addanturque Vitella ouorum numero ij.

Ad enecandos lumbricos, si iam in crassis eos esse, illicque hæere coniciamus, quia tunc vix amplius in tenuia possunt iterum ascendere, ea quæ illis aduersa sunt amara, per enemata injicimus, hoc pacto: R. radic. Gentianæ 3.j. Absynthij, vulg. vel seriphij, hoc est marini, Abrotani, Perficariæ an. M.j. summitat. Centaurij minor. p.j. Lupinorum 3.ß. seminis contra Lumbricos 3.ij. fiat decoctio, & in colatura q. s. dissol. olei Absynthij 3.j.ß. Salis 3.j.

Vel fiunt ex Muria aut aqua Salis & Lixiuo, addendo olei Laurini 3.j.ß. & dissolue Hieram picram vel Aloën, vel succum Absynthij, aut fel Porci vel Tauri.

Cum repetendus clyster, vt enecati educantur, addemus & ei incoquemus Agaricum, semen Carthami, aut dissoluemus in eo

Benedict. laxatiu. aut Hieras fortiores, aliàve purgantia.

Si febris adsit, omisissis hisce calidioribus, alia amara decoquemus, hoc pacto: R. Endiuia, Cichorij cum radice, Dentis leonis, Portulacæ, Sonchi cum radicibus ana M.j. seminis Secalis p.j. fiat decoctio, dissolue succi Betæ vel Mercurialis 3.j.ß. succi vel syrupi Rosacei, olei Amygdalarum amarar. an. 3.j. Salis 3.ß. fiat clyster.

Si alui fluor adsit, talis conueniet: R. rad. Tormentillæ, Aristoloch. vulgaris an. 3.j.ß. cort. Granatorum, Myrobalanorum an. 3.j. Lentium p.j. baccarum Myrti 3.ß. Rosarum rubrarum p.j. fiat decoctio, adde olei Mentæ 3.j. misce: Pro enemate.

Admouentur extrinsecus ventris medio in circuitu vmbilici, vbi sedes intestinorum tenuiū, in quibus lumbrici resident, existit, quæ vermibus aduersa sunt, sequentia.

Olea quæ inungenda, manibus madefactis prius aquâ Vitæ vel Aceto, conueniunt sequentia, scilicet oleum ex Nucleis persicorum vel Amygdalis amaris expressum; vel Absynthinum, Rutaceum: Item oleū Colocynthis valde efficax, quod fit si oleum in Colocynthis pomo excauato fufum, vel pulpa Colocynthis oleo indita, coquatur.

Aliud compositum oleum: R. olei Nucum 3.vj. succi corticis viridii Nucū 3.ij. succi foliorum Persici arboris, vel Nasturtij aquatici, Aceti squillitici an. 3.j.ß. Fellis porci vel tauri 3.j. coquantur ad succorum consumptionem ad vsum.

Inunctio ex succis talis, vtilis erit: R. succi Allij vel Porri & Absynthij vel Persicariæ, vel Vermicularis an. 3.j.ß. succi Iridis, Aloës dissol. in Aceto forti, Fellis tauri vel porci an. 3.ß. Aquæ vitæ 3.ij. misce. Si succum Cucumeris asini foliorum vel fructuum addas, efficacissima erit.

Vnguentum vel emplastrum sic fit: R. radic. Gentianæ 3.j. rad. Dictamni vel Aristoloch. 3.vj. cortic. Arantiorum 3.j. Colocynthis 3.j. cornu Cerui vsti 3.ij. Croci 3.ß. fiat pulvis, cui & alia vermibus inimica addi possunt, veluti semen Pseudomelanthij, Agaricus, Helleborus albus. Hic pulvis subigatur cum oleo Absynthino, & de nucleis Persicorum,

vel Amygdalamar. additaque Resinâ & Cerâ fiat vnguentum vel ceratum, vel cum pice emplastrum: Efficaciùs operabitur, si loco oleorum puluis hic inunctioni supradictæ permixtus, additaque resinâ in formam emplastri redigatur.

Vsitatum vnguentum de Arthanita ventri inunctum, sicuti aluum mouet, ita & vermes propellit.

Cataplasma pultis instar, paratu facilè, fiet ex farina Secalis vel Lupinorû, si cum Aceto forti subigatur, sicque, vel priùs parùm coctum, applicetur: Cui parùm olei de supra expositis, ne citò arefcat, misceri poterit.

Efficacius erit, si eiusmodi farinæ, succis inunctionis prædictæ, excipiantur, & in cataplasma redigantur.

Alia cataplasmata hoc pacto parari poterunt: R. bulborum Allij vel Ceparû aut Porrorum, si allij odor displiceat, quartarium j. de Squillæ bulbosa radice ʒ. j. nucleorû Persicorum ʒ. ʒ. coquantur in Aceto & contundantur, adde farin. lupinorum ʒ. ij. Fellis ʒ. j. olei Absynthij ʒ. ij. misce.

Vel sic: R. de herbis sequentibus, Absynthij, Abrotani, Marrubij, Mentæ, Marricarîæ, Tanacetî, Rutæ, Cruciatæ, Scordij, Gallegæ, foliorum Persici arboris, sumit. Centaurij minoris ad m. aliquot, coquantur in Aceto, contundantur, adde farinæ Lupinorum ʒ. iij. olei Nucleorum persicorum ʒ. ij. Aloës dissolutæ in Aqua vitæ ʒ. ʒ. Myrrhæ ʒ. ij. fiat cataplasma.

Fotus ventris ex decocto herbarum, in hoc cataplasmate descriptarum, factò in Vino, Aceto & Aqua, fieri possunt:

Sacculi item adhiberi, impleti residentiâ eiusdem decocti: vel sicci gestari, referti herbis illis aridis puluerisatis, vel etiam pulvere superius in vnguento descripto.

Ventriculi sedî, si in eum lumbricos reperire suspicio sit, easdem remedia inungi, vel ei illa applicari poterunt, eligendo tamen præcipuè ea, quæ & ventriculo accommodata recipiunt: veluti Absynthium, Mentham, Aloën & similia. Et si fluxus alui vel lienteria simul infestent, addendû insuper oleum Mastichinum, Cydoniorum, Nardinû, Rosaceum, pulueresq; Mastiches, Rosarum, Ga-

riophyll. aliorumque ventriculo accommodatorum simplicium.

Cordis regioni adhibere inunctiones à quibusdam probantur, ex illis quoque quæ vermibus resistunt paratæ, admixtis insuper cordialibus. Quæ fortè si animi defectio, aut conuulsiones adsint, horum causâ cordis regioni apponuntur, quæ cum & ventriculi officij sedem comprehendat, quæ huic applicantur, in vtrumque vires suas extendent. Sed non solum cordi, verum & pulsibus, & temporibus, & spinæ insuper hæc inunctiones applicatas conferre docent:

Imprimisque sequentem: R. Aloës ʒ. ʒ. Myrrhæ ʒ. ij. Croci ʒ. ʒ. puluerisata subigantur cum succo Citri vel Limonum aut Arantiorum, aut Aceto rosaceo, aut vtriusque; Pro inunctione.

Huius loco massa pilularum Pestilentia- lium dictarum emollita, in succis enarratis, cordi admoueri poterit.

Vel fiat talis inunctio aut emplastrum: R. prædicta tria, adde medullæ seminis Citri, rasuræ Eboris, cornu Cerui vsti ana ʒ. j. Coralli rubri ʒ. ʒ. seminis Pæoniæ in metu conuulsionum ʒ. ij. Gariophyll. ligni Aloës ana ʒ. j. excipiantur succis vti priùs: Pro inunctione vel emplastro.

Aliàs Theriaca, pulueribus supradictis vel hisce permixta incorporatur: Sicque cordis regioni vel pulsibus imponitur.

Apri vrinam in vesica ipsius retentam, oleoq; permixtam, & in fumodiu suspensam, postea exemptam, & pulsibus temporibusq; illitam, prodesse aiunt.

Oleum sequens cordi, pulsibus, & temporibus illitum, valde aliqui commendant, Quod fit ex oleo Scorpionum ritè parato, in quo Theriaca, Aloës, Myrrha, Scordium, Gentiana, Carlina, Nigella & Acetum ebullierint.

Epithemata cordialia etiam aliqui, addito semine Lumbricorum, aliisve, cordi administrant. Quibus & Pulueres cordiales supradicti & sem. Pæoniæ, commode ad eundem vsum, vti inunctiones misceri poterunt.

Ex amuletis, Allium collo appensum, vermes è corpore pellere docent: Vti & Stœchadem citrinam.

*Ascaridum curatio.*

Ascarides in crasso intestino nati, sæpè spontè cum excrementis extrusi, ipsis inhæ-  
rere complures, illique nunc maiores nunc  
minores visuntur: quòd si verò ad podicem  
vsque delati, illic subsistant, ob pruritus  
quem mouent, curam exigunt.

Perficitur hæc in illis, prospiciendo, si sæ-  
pè hoc contingat, ne excrementa putredini  
obnoxia gignantur, bona victus ratione, &  
purgantium vsu: Item exhibitis medica-  
mentis putredinem arcentibus, qualia sunt  
tum acidi succi, aliaque multa siccantia,  
vt cornu Cerui, in lumbricorum cura ex-  
posita:

Demum illis, quæ vermes hisce è crasso  
intestino deorsum, vt excerni queant, alli-  
ciant, vel eosdem perseuerantes enecent.

Quod propinatis multis, atque iniectis,  
quæ idem in lumbricis alliciendis, vel ex-  
pellendis vel necandis, præstare diximus, vi  
purgante, vel quia grata illis sunt aut aduer-  
sa, cum & ascarides vti & lumbrici viuant &  
sentiant, in illorum cura possumus efficere.  
Imprimis verò iniectis clysteribus, vel im-  
missis suppositoriis, cum quæ per os sumun-  
tur, non adèò vti quæ in rectum intestinum  
mox perueniunt, in hos vermes vires suas  
queant extendere.

Potissimumque ad ascarides allecandas,  
atque eximendas, Suppositoria podici infi-  
gunt, filo alligata, vt cum aliquandiu reten-  
ta fuerint, vermes se illis affigentes, cum il-  
lis rursus possint extrahi: paranturque ex  
Carne pingui vel Lardo, leuiter saltem vel  
minimè salitis, sectione vt indi possint, for-  
matis: vel ex Ficu inuerfa & intrusa: aut ex  
radice Betæ, aut caule Brassicæ folij, Melle  
illitis.

Ex Melle costū suppositoriū sine sale, eos-  
dem allicit, præsertim si pulpa Ficum aut  
Passul. simul misceatur, quod etsi diffuit, nec  
integrū prodit, tamen cum excernitur, ver-  
miculos sibi permistos simul producit.

Ad interimendas ascarides, supposito-  
rium ex Melle costum, permiscendo Aloën  
& Fella, valde est efficax, omisso ab initio  
Sale, vt diutius retineatur, postmodum verò  
addito, vt facultas ad earum expulsionem  
irritetur.

Clysmata ad necandas ascarides potius,  
quàm alliciendas, cum non circa exitum  
maneant, sed penitus, cum infunduntur,  
subintrent, vsurpantur: Possuntque eadem  
quæ in lumbricis interimendis descripta  
sunt, sed minori quantitate, cum non adèò  
procul absint, hæc etiam injici.

Vel hoc: R. rad. Gentianæ, Aristolochiæ  
cuiuscunque an. ʒ. j. herbarum Absynthij,  
Marrubij, Perficariæ, Calamenthæ an. m. j.  
Lupinorum ʒ. j. fiat decoctio, adde Fellis tau-  
ri, hirci vel porci ʒ. ij. Salis gemmæ ʒ. j. fiat  
clyster. Potest & Hiera vel Benedicta dissolui  
& Olea addi amara.

Lixiuum, Muria, Vrina infusa, ascarides  
quoque perimunt.

Vnguentum ex Argento viuo, Resinâ &  
Axungia factum, vt in lumbricorum cura  
parari ostendimus, si podici illinatur, vel il-  
lud illi imprimatur, aut suppositoriis illicitum  
intrudatur, præ omnibus remediis ad ver-  
mes eiusmodi delendos, efficacissimum est.

Vermium aliorum præter lumbricos, a-  
liis in locis prodeuntium cura, simili ratio-  
ne, vt ipsorum causam declinemus, ipsosq;  
occidamus atque auferamus, instituitur. Vt *Narium vermium curatio.*  
in narium vermibus, in quibus quæ vlceri  
debetur cura, in eiusmodi vlcere exposita,  
& causam illorum, vermesque simul abolet.  
Hos quoque fumo immisso ex femine Por-  
ri, Absynthio & Aloë vltis excitato, abigi  
docent.

In aurium vermibus, vlceri cura adhibita,  
idem præstat, in vlcere illo descripta, vti &  
quæ eos enecant. Quod & facit instillatus in  
aures succus Calamenthæ & Cannabis, &  
vti docet Dioscorides, succus radicum Cap-  
parum, Vrina item in Malicorio costâ.

Possuntq; & alia quæ lumbricos & asca-  
rides necant, illic descripta infundi.

Si tussi, ab interno vlcere pulmonum ver-  
mes, quod vix fit, rejiciantur, huic vlceri, vt  
in phrasi declaratum, cura debetur. *Vermium tussi resectorum cura.*

Mictio vermiculorum, si ab assumptis  
vt dictum, veluti caseo prodeat, ab eo abs-  
tineant. *Vermium mictione reddito- rum cura.*

In externorum vlcereum vermibus, ver-  
micosis inde dictis, ea quæ potenter abster-  
gendo, vti sunt amara & acria, ad vlcerū ho-  
rum *Vermium in vlcere bus cura.*



rum putridorum curam vsurpantur, etiam vermes in illis natos enecant & abstergunt: Maxime quæ succum Absynthij, Centaurij, Allij, Porri, Cæparum & Fella recipiunt.

Eosdem decoctum ex radic Hellebori, Dictamni, Gentianæ, foliis Absynthij, Centaurij, Calamenthæ, Marubii, factum in Lixiuo vel Farinâ, si eo vlcus tangatur, tollit:

Et pulvis Dentis leonis, Rostri porcini dicti, inspersus.

Imprimisq; vnguentum ex Argentoviuo, quod etiam alios vermes abigit, idem in hisce facit.

*Vmbilico  
vermis  
cura.*

In vmbilico vermem latentem, applicatione farinæ Lupinorum, in Aceto coctæ, produximus & extraximus, sine læsione, aliam curam requirente.

*Dentium  
vermium  
cylorum  
cura.*

In dentibus excauatis & putridis si vermiculi nascantur, diu illic nequeunt subsistere, sed vel sponte iterum excidunt, vel dum dentes repurgantur, eximuntur.

Hisce tamen abolendis, si vti putant, hæreant, doloremq; dentium faciant, Aloë & Camphoram cum Aqua vitæ subactam induant.

Vel Fumum illis excipiunt, qui à semini Porri, foliorum Absynthij, & Aloë inuicem mistorum puluere, carbonibus iniecto, excitatur.

Idem seminis Hyosquiami vsti fumum, per emborum admissum, vti in chironibus manuum, efficere docent. Alii verò ex illius fumi admisione, qui ad dolorem dentium sedandum, vt in eo ostensum, admitti solet, simile quid paruis vermiculis, in dentibus generari scribunt.

*Vermis  
sub corde  
cura.*

Sub corde, vti putarunt, degentes vermes, succo Allij, Raphani & Nasturtij propinato, extirpari docent: De quibus si ex pruritu circa cordis regionem, suspicio oriatur, ille autem inde potius sit, quod lumbrici os ventriculi fugunt, nihilominus in hac causa dicta competent.

*Pediculorum  
cura.*

Pediculi qui oberrant facilius abiguntur, difficilius qui cuti impacti hærent, extirpantur, tuncq; pruritus ab illis excitatus, simul aufertur, nec alia noxa sequitur. Hos tamen adeò in morbis quibusdam abundasse, historia testantur, vt exitium aliquibus crea-

runt. Quod tamen diuinæ vindictæ potius, quam causis naturalibus adscribitur.

Curatio autem primùm causæ accommodatur, deinde ipsi morbo inde excitato, Pediculari vocato:

Causam, immunditiem nimiam illam, ex qua pediculi generantur, præcautione & curatione impedire ne nascatur, genitam auferre studebimus. Quod fiet euacuando corpora, si hisce sordibus, sanguinis impuritas aut plethora, vel ichoribus, illorum redundantia occasionem præbeant; idq; per euacuationes, quibus & in scabie sanguinem repurgari docuimus. Inter quas sudores hancce cuti impactam illuuiem egregie exhauriunt. Quos balneo sicco humidove eo nomine frequenter prouocamus.

Quibus euacuationibus, si decentem viuendi rationem iungamus, vt corpora minus sordibus inquinentur, efficiemus. In qua obseruandum, certa quædam cibaria, ad superficiem cutis excrementa pellendo, pediculos gignere, quosdam prodidisse, veluti Ficus & Viperarum carnem: Verum quid viperarum caro sumpta præster, in elephantiasis cura ostensum fuit, quam hanc ob causam inhibere, cum in vsu non sit, non necesse erat: vti nec ficus, quas decepti seminum similitudine, quæ pediculos non nihil, vt alibi ostensum, repræsentant, eos procreare, existimarunt.

Lauando frequenter caput Lixiuo, & fricando, peccinandoq; tam sordes illas pingues, quam surfures capitis simul abluimus atq; abradimus, quæ & in alijs locis si fiant, idem præstabunt.

Morbo pediculari seu ipsis pediculis, pruritiq; inde progresso, cura accommodabitur, si ea administremus, quæ valide siccando & abstergendo, pediculos cum sordibus vnde gignuntur, auferant, atque amaritudine sua, vel acri aliâve illis aduersâ vi eos fugant atque occidant.

Quod per exhibita, cum in superficiem corporis suas vires non adeò exercere queat, vix potest perfici. Aliqui tamen Allium comestum, vel cum decocto Origani potum, pediculos fugare prodiderunt, fortè eadē vi, quâ & vermes pellere docet. Aliqui rusticos

allium comedere, ne à muscis infestentur, dixerunt.

Extrinsecus adhibitis maximè pediculos abigimus, vel necamus, & pruritus cōpescimus, idq; variis modis: Et primū ablu- tionibus capitis, aliorumq; locorum, ubi pediculi versantur, atque etiam manuum, in Chironibus.

Veluti hac ablutione quæ: R. radic. Aristoloch. vulgaris vel alterius 3. j. β. radic. Hel- lebori albi vel nigri 3. β. foliorum Betæ, Per- ficariæ, Absynthij, Marrubij, Tamaricis, summitat. Centaurij min. an. M. j. seminis Staphisagriæ Lupinorum an. 3. β. ( possunt & sumi baccæ Euonymi ) Agarici 3. ij. fiat decoctio in Lixiuio: Pro ablutione capitis vel manuum, vel aliarum sedium.

Efficacior erit, si Sal, Alumen vel Nitrum addas, aut Acetum, maximè squilliticum.

Cum caput abluendum, herbæ, capiti ap- propriatæ, vt Beronica, Salvia, Stœchas, a- liæve addi possunt.

In palpebrarum pediculis confert, si Ace- tum squilliticum sumatur, & in eo parum Aloës dissoluatur, eoq; palpebræ madefiant. Huic & alia nitrosa & salsa addi possunt.

Pulvis inspergendus capillis, ad pedicu- los illius loci pellendos: R. seminis Staphi- sagriæ 3. ij. Salis 3. iij. Aloës 3. j. Cinnabaris 3. ij. fiat pulvis.

Illiriones in hunc usum, ex variis sunt vnguentis, inter quæ, ex Argento viuo pa- rata, omnium sunt efficacissima, cum illud quocunque modo foris administratum, pe- diculos non solum vulgares & cuti insertos, abigat atq; occidat, & pruritū interim sedet.

Quod sic vsurpari potest: R. Argenti viui 3. j. Resinæ liquidæ therebinthinæ dictæ 3. ij. Axungia porci vel etiam alterius, aut Buty- ri vel Olei communis 3. vj. distemperentur & agitentur probe, fiat vnguentum.

Aut misce cum prædicta materia, loco ar- genti viui, Cinnabaris, quod ex argento vi- uo & sulphure confectum est, ad 3. ij.

Vel ad Chirones manuum argentum viuum Sublimatum, loco viui ad 3. j. cum ea- dem materia permisceatur.

Alia vnguenta ex aliis pediculis aduer- sis parantur; inter quæ semen Staphisagriæ

præcipuum est, ex quo solo puluerisato cum pinguibus misto, vnguentum factum egre- giè eos exterminat.

Vel sic permistum: R. seminum Staphi- sagriæ 3. β. radic. Hellebori albi 3. j. β. Piperis, Nitri ana 3. j. Axungia vel Butyri vel Olei communis vel Laurini & Cera q. s. fiat lini- mentum vel vnguentum.

Hiscæ vnguentis si portionem illius quod argentum viuum recipit, addas, efficacissi- mum erit; vel si Sandaracæ 3. j. permisceas.

Est & vsitatum Vnguentum contra pedi- culos, in pharmacopoljis, quod R. semen staphisagriæ, helleborum album, sal, argen- tum viuum, axungiam porci, oleum laurini, saponem & acetum.

Aliud vnguentum ex amaris sic fit: R. Aloës 3. ij. Myrrhæ, gummi Hederæ ana 3. j. Fellis porci vel alterius 3. j. β. Sulphuris viui, Aluminis an. 3. j. olei Absynthini vel Amy- gdal. amararum q. s. fiat linimentum.

Pasta facta ex farina Lupinorum & Felli- bus, manibus diu retenta, chirones tollit.


Fumum excitatum ex semine Hyosquia- mi, proiecto supra carbones ardentes, ma- nuum vola exceptum, vt Chirones è cuti- cula emergant atq; excidant, facere docent. Quod nos pruritus potius sedando, iuuare credimus, cum & inunctione olei seminis Hyosquiami, vel Papaueris alteriusve nar- cotici, aut syrupi de Papauere similiter illiti, vel Opi tantilli dissoluti in Aqua vitæ, com- pesci possit.

Effodiuntur chirones, acu euticulam ubi sub ea latent, sensim, sed in superficie tantum diuidendo, ne si altius adigatur, serum sub- sequens, locumq; madefaciens, vt non am- plius conspici possint, efficiat, & postea pe- diculum extrudendo. Quo facto ne rena- scantur, Vino vel Aceto, quibus Sal vel Alu- men aut Nitrum additur, manus sæpe ab- luendæ.

Pectine pediculi communiter in capite à cute abraduntur, & à crinibus segregantur auferunturque. Cuius dentes cum minimi abundant, arctè iuncti esse debent, ne spa- cium interpositum, dum pectine trahuntur, subterfugiant.

Scopinâ fetaceâ, pediculi similiter è capite, illius-

illiusque capillis depelluntur, atque detruduntur. Suntque eiusmodi scopinæ & pestines, ad pediculos abigendos præcipue excogitati, quibus matres liberis indies capita purgare, mundareque solent.



## DE ANIMATORVM EXCRETIONE.

### CAPVT XIV.

#### Genera.



**A**NIMATA corpora quædam in corpore genita, intelligimus ea, quæ viuunt, nutriuntur & vegetantur, stirpium instar, sed non sentiunt nec mouentur, & proin non sunt animalia; suntque toto genere præter naturam, quemadmodum & ipsorum excretio talis existit; qualia è duobus potissimum locis, videlicet per sinum vteri, aliàs per podicem eiiciuntur.

*Mola.*

Per sinum vteri, corpus eiusmodi infensile & immobile, Mola à mole seu pondere, quo grauat, nominatum, aliquando rejicitur; estque hæc nunc informis, nihil certi exprimens, sed carnem saltem, quæ mollis est, sine ossibus, & in eo contentis visceribus, venis tamen refertam, & cute vel membrana obductam, representans. Aliàs membranosa & fibrosa magis existit, informis alioquin, qualem è quadam quæ octodecim annis sterilis fuit, post pessarii vsum, eiectam vidimus; aliàs verò formam alicuius rei refert: quemadmodum tale reiectum, stellam arborecentem marinam appositè representantem, à muliere reiectam conspeximus, quæ conuoluta, in aquam proiecta, & diducta stuporem nobis spectantibus præbebat: Sed alià formâ talia reiecta apparuisse, obseruauimus.

Eiusmodi molæ per sinum vteri reiectio, Partus præternaturalis instar, seu vti Abortus, procedit, atque vti ille, nunc ante pariendi tempus, nunc eo ipso, aut postquam hoc prætergressum est, & sæpe diu postea, accidit, eadem pariendi difficultate, facilitatève, sanguinisque maiore minoreve profusione, ut aliàs in partu. Hancque accidentia non admo-

dum illis, quæ sæpe grauidis mulieribus contingunt, dissimilia, solent præcedere. Inter quæ cum & ventris tumor sit, cum de illo in tumoribus ageremus, etiam huius, qui in mola se offert, meminimus, illicque accidentia hæc eius in generibus, vti & causam in causis descripsimus.

*Fascia intesti-  
norum.*

Per podicem talia corpora etiam sed raro rejiciuntur, diuersorum generum. E quibus vnum fasciam quandam refert membranam, intestinorum tenuium substantiæ similem, eorum longitudinem adæquantem, minimè tamen vti illa cauam, sed digitum transuersum latam, quam Latum lumbricum appellant, rectius Toeniam intestinorum, siquidem cum lumbrico nullam habeat similitudinem, nec vti lumbricus viuat aut loco moueatur, sed tam diu donec nunc integrum, magno impetu aut terrore patientis, existimantis intestina omnia sic procidere, vel abruptum, elabatur. In qua fascia plerunque transuersæ lineæ nigrae, spacio digiti ab inuicem distantes, per totam ipsius longitudinem, & ad formam vertebrarum, in interuallis illis extuberantes apparent.

*Lumbrici  
lati.  
Toenia  
intestini-  
norum.*

Aliàs verò aliter formata eiusmodi toenia longissima, veluti ex portionibus multis coherentibus, & quæ ab inuicem abscedere possunt, constare videtur, quas portiones, cum cucurbitæ semina quadrata nonnihil referant, Cucurbitinum vermem vocant. Qualis rarius integer, sed plerunque in plura frustra diuisus, rejicitur: Quæ singula, priuatos vermes esse, cucurbitinos dictos, crediderunt, licet tantum fasciæ illius abruptæ sint particulae.

*Vermis  
Cucurbiti-  
ninus.*

Est & aliud toeniarum genus, longitudine prioribus respondens, minimè tamen latum, sed teres, lumbricorum instar, totoque ductu sibi simile, quod & Ligulam appellare possumus, immobile quoque, & rarius in homine, in canibus verò frequentius reiectum; nunc integrum, aliàs verò disruptum; interdum & cum tenue sit, podici ex parte adhuc inhærens, adeo ut ex eo illud, nisi trahatur, non facile cedat.

*Ligula  
intestini-  
norum.*

Accidentia dum toeniæ in corpore hærent, nisi aliud accedat, sæpe nulla grauiora, è quibus cognosci possint, præsentuntur, sed incolu-

incolumes alioquin existentes, se illuuiem hanc in corpore gestasse, non prius donec inopinatò excidunt, cum terrore experiuntur. Interdum tamen, auiditas quædam sæpius & plus solito cibum sumendi, virget, & grauedo quædam in ventre, ac si aliquid illi inesset, sentitur. Deteriora, qualia si lumbrici moriantur, symptomata superueniunt, si abrupta ab ipsis particula remanens putrescat.

### Causa.

**C**orporum enarratorum in corpore generationis causa est vel semen vel chylus.

*Semini  
imperfecti  
conceptio,  
causa  
Molæ.*

Ex semine in vtero concepto imperfecto, quomodo mola generetur, in intumescencia ventris, quam ac si mulier guauida esset fœtumque gestaret, parit, expositum fuit. Illius quoque reiectionis causa, eadem quæ & fœtus abortus existit, nimirum naturæ vis expultrix, quæ huius corporis præternaturalis mole grauata, connexum vasorum, quibus & mola vtero adhæret, dirimens, illud per viam partui destinata eiecit, eoque citius, si vi quadam externâ insuper accedente, natura ad illius excretionem impellatur. Cuius impulsus causæ eadem, quæ & abortus, per quem fœtus rejiciuntur, esse possunt, in abortu expositæ.

*Chylus,  
causa  
generatio-  
nis  
Tæniarum  
& cucurbiti-  
ni ver-  
min.*

Et chylus crassiore vel pinguiore, vti lumbricos generari ostendimus, ita si tanta illius sit copia, vt tenuibus intestinis à ventriculo ad colon vsque deductis, vndique se affigat & accrescat, membranae illæ Tæniæ nascuntur. Qui chylus illis non in toto illorum ambitu, sed sede saltem aliquâ, illius latitudinis, quam hæ fasciæ obtinent, & forte illic tantum vbi intestina mesenterio adnectuntur, toto ductu accrescit, atq; in eiusmodi tæniæ, quæ non ita vti lumbricos, qui à connexu liber, viuere & se mouere possunt, conuertitur. Et proin eam plerunque, quam tenuia intestina habent, longitudinem adæquant. Nam quòd vltèrius feratur, & crassis intestinis etiam adnascatur, haud verisimile, cum chylus eiusmodi in illis intestinis minimè contineatur, atque fæces alui illic accumulatae, hanc moram quam vt ac-

crescat requirit, minimè ferrent, sed eum detrudendo expellerent, quod dum in tenuibus consistit, minimè fit, sed cum fluida ea sint, quæ in illis continentur, nihilominus etiam citra tenuis fasciæ propulsionem, pertransire queunt. Vnde & citra incommodum maius, nisi quatenus intestina grauat, & quòd cum chylus copioso nutriatur, appetentiam nimiam cibo promoueat, diu sæpè subsistere atque gestari potest, donec tandem in valida aliqua corporis commotione aut conatu, à connexu alicubi soluta tænia, pondere suo seipsam liberans, sicque vel toto ductu, vel ex parte secedens, & in crassa intestina prouoluta, per aluum, vel integra vel disrupta rejiciatur, vel frustatim prodeat, quod tunc maximè fit, si non continuatim chylus, sed veluti per portiones, quasi articulatim coniunctas, intestinis accreuerit. Cuius qualiscunq; affixionis causa, chyli admodum tenacis in intestinis perseverantis copia erit, quod cum rarissimè vt sic colligatur subsistatque accadat, etiam rarissima harum fasciarum reiectio se offert & ostendit.

Quæ quando non penitus è corpore prodeunt, sed portiones illius aliquæ vel longæ vel breues remanent, tunc illæ putrescentes, grauiora symptomata, vti dictum producant.

### Curatio.

**M**olæ curatio in eo, ne amplius generetur, vel si genita sit, maturè antequam in immensum, vti sæpè fit, excrescat, expellatur, consistit, cum sic aucta difficulter postea cedat, & vel retenta, vel cum magna difficultate & hæmorrhagia, tandem erumpens, exitium ægræ aliquando pariat.

Præcautione ne generetur vitur tunc saltem, quando mulieres molæ obnoxias esse, ex eo quòd vel prius semel aut iterum, vel sæpius eas eiecerint, colligimus: tunc antequam conceptio fiat, & si fieri possit, antequam concumbant, ea instituetur. Quæ præcautio admodum difficilis, cum id quod præcipuum est, lateat, seminis nempe defectus in mare vel fœmina, qui corrigendus:

*Molæ  
curatio.*



gendus: diligenti tamen consideratione vtriusque naturæ & temperamentis, si alterutrum aliquod vitium deprehenderimus, ut hoc bona viuendi ratione, medicamento- rumq; conuenientium vfu emendetur, tam in viro quàm in muliere procurabimus.

Præcipue verò quod mulierem attinet, ad molam gerendam pronam, illi præter decet euacuationes, per venæ sectionem, si plethorica sit, per purgationes, si humoribus excrementitiis vel prauis scateat, ad vterum confirmandum, ea quæ robur addunt, administrabuntur, eoque magis si imperfectio hæc in mola, ab vteri imbecillitate & caloris natiui penuriâ procedat, quod semen susceptum non conuenienter, & prout ad foetus procreationem opus foret, fouere queat. Qualia remedia vtero conuenientia & appropriata, in sterilitate, & fluxu muliebri, aliisque ab vteri imbecillitate, & fluxu muliebri profectis affectibus, describuntur. Inter quæ & balnea præcipueque ther- mas, si hæc mulieres eas adeant, multum efficere posse, sibi persuadent.

Curatio molæ iam genitæ à semine, sicuti in extumescencia ventris inde progressâ ostensum, in eo, ne admodum excreseat, & maturè ex eo propellatur, versatur. Verum cum de ea plerumque non satis certi simus, etsi suspicio illius magna sit, tamen validioribus & violentis remediis rem aggredi, & per vim conceptum ejicere velle, cum si verus conceptus esset, eum perderemus, res est periculi plena, nec temerè suscipienda; & cum vel minimum dubitamus, omittenda, satiusque tunc vel naturæ negotium committere, donec certiores de ea fiamus, euentum expectare, vel saltè per sanguinis missionem nutrimentum non nihil illi detrahendo, incrementum illius impedire, vel purgantibus exhibitis, naturam, ut cum aliis immundities expellit, etiam fortè hanc illi grauem & alienam molem propellat, sollicitare; nec ab illis administrandis metus nos, ne si fortè verus esset conceptus, abortus inde sequatur, absterre debet, cum hoc minimè factum fuisse, in multis mulieribus grauidis sæpe sic euacuatis, vel diarrhoeis diu laborantibus, obseruauerimus, naturaq;

non facile ad ea quæ naturalia sunt, sicuti verò præternaturalia illique onerosa, excernenda, commoueat.

Quod si tamen de mola nobis certò constet, ex pluribus indiciis concurrentibus, & tunc quoque eodem modo, vti cum prius molam passa est mulier, apparentibus, vel ex eo quod adhuc certius est, si tempore partus elapso, tumor ille ventris, & durities qualis in foetu etiam tactu deprehenditur, nihilominus permanferit, tunc ut natura excretionem illius moliat, eam exhibitis admotisq; atque inditis & iniectis in sinum vteri, excitabimus, viasque ut ex vtero emergere queat, aperiemus atque dilatabimus. Quæ omnia iisdem quibus menses prouocamus, atque partum acceleramus, leuioribus remediis primum perficere studebimus, & nisi succedat, illis quæ foetum mortuum & secundinam expellunt, illud efficere tentabimus; atque necessitate urgente, præferim si malo apparere incipiat, obstetrici, ut eam (sicuti de partu mortuo dictum) manuali operâ eximere studeat, mandabimus. Vel in desperato & extremo periculo, sectione per abdomen in vterum adaptâ, vltimam manum adhibebimus. Sicuti quo pacto hæc omnia fieri debeant, in mensum & partus defectu, abudè declarata fuerunt, indeque peti poterunt.

Tæniæ illæ intestinorum tenuium, membranæ & longissimæ, quarum vna lata est, & Lumbricus latus vocatur, altera ex pluribus portionibus compacta, quam Cucurbitinū vermem, vel si frustratim exeat, vermes appellant, tertia Teres lumbricorum instar, si quod rarum est, in intestinis tenuibus nascantur, quam diutissimè plerumque illic latitant, & cū certis indiciis non cognoscantur, ferè negliguntur.

Quod si verò ex distensione & grauedine ventris, atque appetentiâ cibi nimia, qui hinc infestantur, eas adesse suspicentur, tunc ut e corpore expellantur, & ne rursus regenerentur, efflagitant, & curam eò magis expectant, cum se monstruosum vermem vel serpentem, cui colore & transuersis lineis tæniæ aliquæ nonnihil correspondent, in corpore alere, sibi persuadeant.

Tæniarū  
& Cucur-  
bitinū  
vermū  
curatio.

Instituitur autem cura illarum hoc pacto: Antequam nascantur, ipsarum generatio impedienda, tum materia ex qua oriuntur, auerrenda; tum eadem ne intestinis accrescat, illicque formetur, abstergenda. Postquam autem iam genitæ sunt, atque intestinis adnatæ, abstergentibus similiter, sed validioribus eas abradere, atque purgantibus quæ naturam ad illarum excretionem excitent, exturbare per aluum studebimus. Ingratis autem illis, quæ lumbricis aduersa sunt, eas velle fugare aut enecare, cum nec vitam nec sensum uti lumbrici, habeant, haud necessarium, sicuti nec aliis quæ idem in lumbricis efficiunt, hic vtendum, nisi, uti pleraque sunt, vi insuper abstergendi vel purgandi, quæ tunc quoque operantur, sint prædita. Hæc aut omnia in victus ratione, & medicamentorum exhibendorum, injiciendorum admodum vtendū; vsu, sequenti modo administrantur.

Victu decet, chylum moderatum & fluidum, lactis instar reddendo, illius copiam & tenacitatem auerrendo, eumque ne adhæreat, abstergendo, generationem harum tœniarum impediunt. Eaque instituenda, sicuti & in lumbricorum ne nascantur cura, demonstratum fuit: Idque comestione Alij, Mucum, atque ex Oleribus, amaras & acres illas herbas frequenter esitando: Item Sale cibos condiendo, & Aromatibus: Atque inter condimenta, Sinapis illa consuetâ confectio, sæpè vtendo: Vinumque absynthites bibendo.

Inter medicamentosa, purgantia cathartica, non solum ad tœnias hæc ab intestinis depellendas, sed & maximè si iam ab hisce liberata, alicubi portio ipsarum hæreat, & corrumpi incipiat, eam propellendam exhibentur, tum etiam ad easdem, ut citius abscedant, abstergendas; Cum pleraque cathartica, amaritudine atque acri vi prædita, id simul moliri queant. Qualia in lumbricorum cura exposita, atque ex illis ea quæ amara sunt, uti quæ Aloën recipiunt, & Absynthium, aliæque eiusmodi, uti & acria, hic quoque exhibita, sæpiusque iterata, aliquid tandem efficiunt. Quibus si Tartari vel Nitri parum addas, ab-

tergendo potenter operabuntur.

Abstergentia varia, ad tœniarum harum femina, & materiam ex qua prodeunt, vel etiam ipsasmet iam natas, abradenda exhibentur, ut sic liberatæ, vel sponte postea delabi atque elabi possint, vel sumptis catharticis facilius expelli. Quod multa in lumbricorum cura exposita, quæ ad illos fugandos vel necandos illic dantur, cum & deterforia vi prædita sint, hac potissimum hic operando præstabunt.

Veluti ex pulueribus illic descriptis, tam simplices quam compositi, ob amaritudinem, vel alioquin vim abstergendi quam habent, hic quoque conuenient. Quibus semen Heliotropij maioris, & folia addit Dioscorides, uti & semen Nigellæ.

Ex decoctis, syrupis, succis, cōferuis quæ vi absterforiæ etiam prædita sunt, pleraque & hic valent.

Imprimisque vtile est, Vinum absynthites cum additione aliorum amarorum, ut Centaurij, Marrubij: Plurimum etiam abstergunt Vrina, Lixiuū, Muria bibita. Idem facit Vinum vel Aqua, cui olei Vitreoli guttæ additæ fuerint.

Iniecta clysmata cum ad tenuia intestina, quibus fasciæ affiguntur, vix penetrent, eaque subeant, non aded in illis abstergendis, uti quæ per os sumuntur, operabuntur. Si tamen portiones aliquæ in crassiora intestina delapsa, illic subsistant, eas quoque possunt eluere, & fortè abstergendo, vires suas si sæpè reperantur, ad tenuia vsque extendere. Eoque nomine, ea quæ & lumbricos necant, cum amara sint & proin abstergant, similiter hic tentari poterunt.

Admota ventris regioni, ad lumbricos fugandos & necandos, cum & illa ex summe amaris vel acris concinnentur, ea quæ potenter abstergant, hic quoque inuncta vel applicata, multum possunt succellu temporis efficere; tam olea quam

vnguenta, emplastra & cataplasmata illic descripta.



# DE TERRESTRIVM EXCRETIONE.

## CAPVT XV.

### Genera.



**T**ERRESTRIA corpora quæ in corpore nascuntur, sunt Arenæ vel Sabulum, Calculi tophacei vel lapidei: Suntque toto genere præter naturam, veluti & ipsorum excretio; prodeuntque è diuersis corporis sedibus sequentibus, è quibusdam frequentius, ex aliis rarius, ex aliis rarissimè.

*Arenulae mictione reddita.* Per meatum vrinarium inter mingendum, in multis Arenulæ cum vrina effluunt; nunc citra alium affectum, aliàs in morbis quibusdam.

*Calculi mictione excretus.* Calculi inter mingendum quoque progrediuntur, aliàs cum impetu quodam eiciuntur; quam excretionè nephriticus dolor ferè præcessit, vbi & hi calculi descripti fuerunt, interdum & sanguinis mictus; aliàs & vrinæ suppressio, ardensque mictio, quandoque & mucosæ vel purulentæ materie simul excretio, sicuti in eiusmodi excretionibus ostensum est, accedit. Sabulosa quædam alba materia, nonnunquam loco arenularum cum vrina prodit, cum calculæ vesicæ, à quo prouenit, indicium.

*Arenula oculorum materia.* In oculorum angulis, maximeque in ciliis palpebrarum, non infrequenter Arenosa materia, aspera, friabilis, cinerea vel subflaua se offert, quæ pilis illis per noctem, dum oculi clausi sunt, iunctis se affigit, illisque accrescit, vt ægre ab inuicem palpebræ rursus diduci, oculique aperiri queant. Quod & in affectu oculorum, quem Sclerophthalmiam vocant, accidit, sicuti in oculorum doloribus demonstratum fuit.

*Calculi mictus.* Ex aliis sedibus arenæ vel calculi rarius prodeunt: Aliquando tamen emunctione, calculum pisi magnitudine, album friabilem excretum vidimus, eumque cum cæteris in Archiuo supellectilis nostræ medicæ asseruamus.

*Calculi excreta.* Exspuitione cum tussi, calculos reiectos fuisse, non solum ego, sed & alij obseruauerunt.

Quorum quidam albi & tophacei, quidam cinerei & lapidei, teretes rotundi vel latius æquales vel inæquales fuerunt: Præcedente dyspnœa summâ, seu Asthmate: In quo frequentius eiusmodi calculi inclusi remanent retinenturque potius quàm expelluntur, sicuti in eo dictum fuit.

Ex ore quoque alij calculi aliquando prodierunt, veluti è linguæ tumore, quem Ranim vocant: Vel etiam ex tonsillarum tumore, sicuti aliqui notarunt.

Per anum calculum sciuili formam exprimentem, redditum, domi quoque asseruamus: aliumque qui ex equi aluo prodit.

In partu foetum lapidescentem seu petrosum exclusum à matre, se vidisse, Medicus quidam nostri seculi clarus, mihi narrauit, idemque scripto publico testatus est.

Cutis poris tophuli exigui quandoque innascuntur, indeque eximuntur; Vti in faciei cute, nunc vnus, nunc plures se aliquando exhibent, quos Germani Leichterborn quasi leues spinas vocant. In cute callosâ plantæ pedis, similem effectum retinemus.

In oculi globi albâ fede tophulum minimum impactum, aciculâ quidam sibi eximicurauit, mihi que ostendit.

Dentibus Tophi frequentissimè adnascuntur, eosque sæpè penitus obducunt & occultant, aliàs circa radices potissimum se affigunt.

Per aperturas sponte vel sectione factas, Tophi è nodis podagricorum, plures sæpè numero prodeunt; sicuti hoc in podagra ostensum fuit.

E vulnere in perinæo, calculi per Lithotimiam eximuntur.

Ex alio vulnere in inguine, dum secaretur sarcocoele, inflicto, in fistulam conuerso, & arenulas & calculos iam diu progredi cum vrina, in illius præternaturali excretionè ostensum fuit.

### Causa.

**A** Terrestri materia arenulas & calculos generari, nec dum à pituita, sicuti dictum est, & potissimum eâ, quæ sero per-

mista, hinc inde siccioribus partibus se affigit, illisque accrescit, in nephritico dolore, quia calculo procedit, ostensum fuit. Ad hæc & à terrena alia materia, in certis excrementis aut partibus coaceruatâ concretæque, idem fieri, eaq; lapidescere posse, probatur eo, quod hoc idem extra corpus, in lignis ossibusque petrificatis accidere videamus, & talia aliquâdo in corpore inueniuntur. Sicuti quomodo hæc arenularum, calculorum & partium petrificatarum generatio, in corporis diuersis locis fieri possit, iam demonstrabimus.

**Renum:** In renibus præ cæteris locis, utpote quos terrenæ materia, causa calculi & arenularum misetione reddita. **Resica illarum:** In vesicâ delabuntur, & si illic subsistant, ut calculi maiores solent, illicq; incrementum ab urinae terrestreitate sumant, vesicæ calculum tunc nominatum produunt: si verò ulterius cum urina procedant, uti arenulæ plerunque solent, nonnunquam & calculi minores, tunc cum urina, uti dictum, eminguntur. Alias verò hi qui in vesica reperiuntur, aut auctique fuerunt, per vulnus cervicis illius inflicto, in lithotomia inde extrahuntur. Qui & ut casu factum esse diximus, in quodam è vulnere in inguine vesicæ inflicto, prodierunt.

**Hepatis:** In hepate arenulas & topios gigni, ob ferum quoque, quod vasa ipsius pertransit, in illius affectibus ostendimus, è quibus arenulæ, cum sero ad renes delatæ, similiter inde ad vesicam, ab eaq; cum urina inter urinandum, excerni possunt. Quam viam ab hepate ad renes, topi pertransire minimè possent.

**Oculi:** In oculorum sedibus, à seroso humore, quo oculum continuè etiam naturaliter humectari, vel in lacrymis, eò quoque deferri ostendimus, arenosa materia illa, quæ ex iis prodit, eadem ratione ut in cæteris locis, gignitur: Eoque libentiùs siccalidæ & acres obferum sint eiusmodi lachrymæ, vel alioquin terreni quid in se contineant: Vnde in fanis

adhuc oculis, arenosa hæc materia nata, notu dum oculi clausi sunt, in angulis oculorum colligitur, atque in cilia vsq; progressa, illis adhæret. Sicuti & in ægris, si oculi lachrymis obruantur, atque incalescant, arenulæ eiusmodi nascuntur, ut in Epiphora, quemadmodum illic quoq; fuit declaratum.

Ab eadem causa, uti arenulæ, sic & topiulus, ex compactis arenulis oculi duræ tunicæ accretis, in eo cui talis exemptus fuit, nasci potuit.

In narium profundis antris & cavitatibus, à feri cum pituita à cerebro eò delabentis terrestreitate, se illic affigente, calculum qui emungendo profiliit, genitum fuisse, credibile est. Nam licet in cerebro etiam calculi inueniantur, cum tamen hisce non pateat exitus, per angusta calvaria foramina, vasis aliis oppleta, vix inde ea peruenire possent.

In pulmonibus, calculi qui exspuntur, quo pacto gignantur, in asthma, cuius ferè tunc causa existunt, ostendimus.

In intestinorum angustis, & crassiorum præsertim gyris, in quibus diu sæpè materia quædam hære atque indurari solet, ex feri quod & hæc loca continuè cum excrementis peruat, eaq; madefacit, terrenam materiam accrescente, calculos generari etiam possibile, verisimile videtur, licet non adeò frequenter obseruetur, uti verò in reliquis sedibus, cum hi excrementis misti, sine labore prodeant, & proin ferè se manifestent. Quod tamen & in homine fieri posse, probabile, cum & ex equo talem calculum reiectum viderim. Quod scilicet non verò in calculum conuersum attinet, hoc ex alia terrestri falsave materia ab assumptis procedente, cum excremento hoc congesta atque cum eo indurata prodierit, uti cætera quæ petrificantur, oportuit.

In vtero foetus lapidescens, qualis in partu prodit, quod rarum & inauditum aliàs fuit, vel à simili terrestri & falsâ materiâ totus imbutus, sic tandem lapidauit: vel ossa ipsius, uti reliqua ossa etiam extra corpus posita, veluti dentes, cornua, aliæque interdum lapidescunt, eodem modo in terrenam illam formam transmutata sunt.



*Porro in-  
nata ter-  
rena mas-  
teria, cau-  
sa Calculi  
infixi.*

In poro vno seu pluribus, feri terrestres-  
tas inclusa manens, tophulis qui illic inue-  
niuntur, materiam præbuit, eosque sensim  
calore externo exiccando, genuit. Quod  
maximè in facie, cum sit aëri calido & sicco  
exposita, contingit. Eadem ratione hoc in  
oculi globo, huic cui tophulus illic prodiit,  
accidit, ex hærente illic simili veluti in pun-  
cto materiâ.

*Tumoribus  
terrestribus  
materia,  
causa cal-  
culorum  
sub lin-  
gua, ton-  
sillarum,  
in no-  
du poda-  
gricorû.*

In tumoribus, veluti sub lingua, item in  
nodis podagricorum, quo pacto calculi qui  
inde exeunt generentur, in iisdem demon-  
stratum fuit. Eo modo & in aliis tumoribus,  
vti & tonsillis hoc idem fieri potest.

Dentibus quo pacto tophi, ex limo & for-  
dibus qui dentibus adhærent, accrescant, in  
fordinibus ostendimus.

### *Curatio.*

*Dentibus  
limus &  
fordes,  
causa To-  
phorum  
illis ad-  
matorû.*

**C**ALCULIS quæ adhibetur cura, tunc præ-  
sertim instituitur, cum aliqui sæpius iam  
prodierunt, vel aliis indiciis se produnt, vn-  
de facile cõiicimus eos rursus generari pos-  
se. Nam quod illos attinet, qui raro se offe-  
runt, cura tantum adhibetur, vt, nisi sua spon-  
te e corpore abeant, expellatur vel eximan-  
tur. Quæ omnia sequenti modo in singulis  
administrantur.

*Vesicæ  
calculi  
præcau-  
tio & cu-  
ratio.*

In calculo qui è vesica per mictionem e-  
gredi solet, & Calculus Vesicæ, licet aliunde  
eò perueniat, dicitur, vti & in arenulis, hæc  
ipforum excretio promouenda potius, quàm  
impedienda erit, & ne noui nascantur, præ-  
cauendum. Quod si in vesica hæreat, per cu-  
rationem inde educendus.

Præcautio autem primum in calculo ves-  
icæ, non alia quàm quæ & calculo renum  
debetur, & in nephritico dolore fuit exposi-  
ta, suscipitur, cum in renibus calculi, qui ad  
vesicam ab ipsis descendunt, primam suam  
habeant originem, illicque exortus ipforum  
impediri primum debeat; quæ tamen præ-  
cautio, vt retenti in vesica minùs increfant  
augeanturq; etiam aliquid poterit efficere.

Curatione verò quod attinet calculi iam  
vesicam occupantis, hæc sic instituenda, vt  
ille vel atteratur vel comminuetur aut ex-  
pellatur, vel à meatu quem occupat, remo-  
ueatur, aut è vesica eximatur. Quæ omnia

sequentibus operandi modis perficiuntur.

Purgantia exhibentur interdum, tum si  
corpus aliis prauis humoribus refertum sit,  
ad eos repurgandos, corpusq; sic disponen-  
dum, vt quæ huic affectui adhibentur, rectius  
operari queant.

Tum verò vt alius respondeat, exhiben-  
da quæ laxando & leniendo eam frequen-  
ter moueant, qualia in ardore vrinæ ab aliis  
causis proueniente, exposita sunt.

Tum etiam vt calculus vesicæ simul pro-  
moueat ad excretionem, dantur fortiora  
cathartica, si fortè hisce natura excitata, vti  
alia superflua excrementa è corpore, sic &  
lapidem vi expultrice è vesica propelleret:  
sicuti sæpè vidimus, post conatus illos vehe-  
mentes deijciendi, purgantibus propinatis  
commotos, non solum alui excrementa, sed  
& calculos fuisse excretos.

Hisce omnibus etiam lithontripica per-  
miscemus, si fortè & sic calculus confringi  
aut cõminui posset. Cuiusmodi laxantia &  
purgantia medicamenta, in calculo renum  
exposita sunt, quæ hic quoque locum habe-  
re possunt, cum virtus eorum cum vrina, ad  
vesicam vsque possit etiam pertingere.

Clysmata ad aluum leniendam sæpè in-  
iecta prosunt emollientia & laxantia, pas-  
sim descripta, tum etiam anodyna ad ardo-  
rem vrinæ inde contractum, si ille vrget, mi-  
tigandum, in colicis doloribus exposita, ad-  
dendo semper ea, quæ ad lapidis comminu-  
tionem aliquid possunt efficere. Qualia in  
nephritico dolore, à calculo renum proce-  
dente, tribus exemplis proposita fuerunt.

Vomitum sæpè factum, ad præcautionem  
vtile esse, censent illi, qui à pituita calculum  
generari credunt, cum potius quod corpus  
purum inde reddatur, & maiori successu sic  
tractari possit, competat.

Hic quoque lapidem iam genitum, cum  
magno conatu fiat, aliquando potest è vesica  
inductum illius excutere.

Exhibentur ad vias aperiendas & terre-  
streitates, quarum adhæsione calculus in-  
crementum sumit, abstergendas, calculum-  
que minuendum, eadem ferè, quæ idem in  
calculo renum moliantur, illicq; exponun-  
tur. Quæ & ad præcautionem calculi vesicæ

cæ. cum ille in renibus initium capiat, proderunt. Quibus, cum hic calculus remotior quam renum existat, efficacioribus ex illis & frequentius maiorique quantitate, ut vires eo queant pertingere, utimur.

Qualia sunt Ius alimentosum & medicatum, & Decocta varia. Cui & hoc adjici poterit, quod R. radice Liquirit. 3. ij. radic. Graminis 3. j. radic. Asari 3. β. Betonicæ, Capilli vener. vel Trichomanes, Bupleuri, Saxiphragiæ albæ, Parietariæ, Fœniculi marini, Pimpinellæ ana M. j. florum Hyperici, Genistæ, Rosarum ana P. j. baccarum Myrti, seminum Anisi, Fœniculi ana 3. β. seminis Milij solis & Paliuri, si haberi potest, 3. ij. seminum Apij veri & Paludapij ana 3. j. Passularum enucleat. quartarium β. Ciceri rubr. P. j. fiat decoctio in Vino & Aqua: Pro 5. vel 6. dosibus bonæ quantitat, ut sic abunde bibitum, citius ad partem affectam deueniat, dissoluendo in singulis haustibus, syrupi de Limonibus & Oxymell. simpl. ana 3. j. Oxymell. squillit. 3. ij.

Huic decocto & alia addi possunt aperientia vias, & lapidem atterentia, ut radices Aperitiuæ temperat. in aceto, radic. Rubi, Mori, Herniaria, Erica, Baccharis aliæve.

Infusa item conuenient in calculo renum exposita: Et Lixiua.

Succi item, ut Vrina, Aceta, Aquæ naturales, aliæve succi illic enarrati, quibus & succus acidus Berberis adiungendus, ad idem efficax: Vti & succi Fœniculi marini, Saxifragiæ, Hyperici, Nucum item viridium & Porri, qui per se vel cum liquore aliquo vel cocti soli aut cum Saccharo, & in formam syrupi, aut rob seu extracti ut vocant, vel tabularum redacti, dari possunt. Sicque tabulæ ex succo Limonum & Berberis nunc fieri consuetæ, valde sunt conuenientes & gratae.

Aquæ stillatitiæ ad calculum renum præscriptæ, tam simplices quam compositæ, huc quoque referendæ, quibus & ægri facilius utuntur.

Vrina hirci hic quoque probatur, uti & Apri, à Dioscor. potui datæ.

Olea item illic propofita bibita, similiter & in hoc casu competunt.

In cibis itidem vsurpari solita medicamentosa comesta.

Et ex medicamentis quæ in substantia diuersimodè preparata sumuntur, quibus simplicioribus utimur, ut sunt Resinæ, Plantarum quarundam pulueres, Sanguis, Cinesque aliquorum animalium: Dein & alia varia, ex quibus composita fiunt remedia, à plantis, animalibus, terrestribus innumeris petita, alibi que descripta: Vti & ex illis concinnati pulueres, electuaria, pilulæ, vsitatæque quædam in hanc rem compositiones.

Præter quæ & in calculo vesicæ comendantur Murium stercus, lapid. Limacum, Calculi in felle bubuli, Ventriculus ossifragi, sanguis Cuniculi, Vitrum combustum, Sagapenum à Dioscorid. Euphorbium item cæteris additum, gummi Amygdalarum & Vitis viniferæ, radic. Eryngiorum, Pastinacæ sylvestr. flores Sambuci nondum expansi, sed compacti adhuc siccati sæpeque exhibiti. Semina Vrticæ, Cappari, Tragij & Sisymbrij.

Iniectiones in vesicam fiunt, ex illis quæ ardorem mingendi, si ille vrgeat, mitigant, in eo dolore expositæ.

Deinde ad calculum confringendum, si fieri possit, fiunt ex oleo Scorpionum, ex sanguine Hirci vel Vulpis: Maxime ex succo Limonum & Berberis, vel etiam aliis acidis, ut Aceto, quæ & emollire seu dissoluere saxa, corallia & margaritas, si illis imponantur, docent. Quæ tamen sic vsurpanda, & si opus, contemperanda, ne vesicæ noceant.

Iniectiones & foras, & relaxantibus & aperientibus vias, calculumque cominuentibus fiunt, iisdem quibus & in calculo renum utimur, quæ uti illic hypochondriorum regioni, sic hic ventris inferiori sedi maxime accommodantur: Quibus & alia quoque addi possunt, veluti Fœniculus, Meum, Saxifragia, flores Melilot. Hyperici. aliaque; Lithotriptica.

In thermis naturalibus etiam balneæ illic expositæ, hic quoque conuenire possunt, si illis ad tempus aliquod utantur, ut Acidis & Sulphureis præcipue. Quarum loco arte paratæ ex Sulphure in aqua decocto, vsurpari possunt.

Inunctiones in calculo renum descriptæ, dilatantes vias, anodynæ, & calculum disrumpentes, hîc vtiliter pectinis & perinæi regioni, testibus item & virgæ applicantur. Inter quas & oleum Scorpionum admodum est efficax, tam simplex quàm compositum, in quo aristolochia, gentiana, cyperus & cortices radic. capparum coquantur, cum quo sanguinem hirci præparatum interdum miscemus.

Cuius loco efficax quoque oleum parabitur, ad hunc affectum, ex Cantharidibus tum officinarum tum aliis, tum Scarabeis, Cicadis, decoctis in oleo; efficaciusque fiet, si succus Raphani, Parietariæ, & Sanguis hirci simul incoquatur, additâ Aceti squillici portiunculâ.

Cingulum lapidem continens, quem calculum renum præcauere existimant, illic declaratû, idem in lapide vesicæ efficere docent.

Zona à quibusdam, si lumbis circumdata gestetur, quod noctu tempore somni commode fiet, admodum laudatur, ex linteo panno facta, inuncto succis Tanacetî, Plantaginî & Barbæ Iouis, farinâ Fabacæ & Melle exceptis.

Operationibus aliis calculum vesicæ, si in principium ceruicis illius insertus illic hæreat, urinæque meatum obstruat, ab eo abigimus: Idque Concussione, si æger supinus collocetur, cruribus attractis & in altum eleuatis, & sic regio vesicæ nonnihil quatitur, lumbique concutiantur.

Cathetere immisso, atque ad vesicam vsque adactò, calculus in vesicam ex meatu protruditur, qui cauus esse debet, vt vrina quæ suppressa erat, mox per illum effluat, atque ad formam ductus per penem obliqui, curuatus. Candelâ tereti cereâ hoc itidem fit, quæ cum se commodè secundum ductû illum flectere possint, & mollis sit, minori labore in vesicam vsque impellitur.

Aufertur è vesica atque eximitur calculus aliis artibus; quod fieri posse aliqui putarunt, applicando quædam peni, quæ proprietate quadam lapidem è vesica, per urinæ ductum allicere & attrahere credunt: Ideò cerebrum Picæ avis, præputio & glandi im-

positum alligant: Vel virgam Raphani radicis excauatæ eousque vt membrum admittere possit, introtrudunt, sicque relinquunt.

Missionis impetu calculus è vesica nonnunquam expellitur, si multum vini, aciduli præsertim, vna vice bibant, urinamque diu postea, donec admodum vesicam oppleat, retineant, & dein affatim mingant, quo conatu & impulsu urinæ, calculi interdû exiliunt, præsertimque si pedibus interim terram calcando, inferiora corporis sic concutiantur.

Suctione calculus in canali virgæ subsistens, nec vterius progredi potens, attractus, interdum cedit, si virgæ glans ore, fortiter attracto spiritu, fugatur, vnde in infantibus præsertim, calculi nonnunquam exeunt.

Sectione calculum è vesica, qui aliâ nullâ ratione progredi potest, atque indefinenter dolore, urinamve supprimendo molestat, eximere cogimur, licet non sine mortis periculo, & conuulsionum quæ interdum sequuntur, hoc fiat; Vel noxæ alterius subsequens, præsertim missionis, quam postea retinere aliqui nequeunt. Multi tamen hoc pacto liberati, nunquam postea à calculo vesicæ molestari fuerunt. Alii verò post sectionem, aliis se offerentibus rursus in vesica calculi indiciis, qui vel de nouo à renibus descenderant, vel relictî in vesica non integrè repurgatâ, fuerant, repetita sectione restituti sunt, alij verò occubuerunt.

Perficitur verò sectio à chirurgis lithotomis hoc fere pacto: Æger sedes ita mensa, dorso alteri qui eum retineat, in fasciis alligatur, vt motu corporis aut manuum, chirurgi operatione minimè impedire queat, cruraq; attracta, admodumque diuaticata contineat: Quo factò, cathetere intruso in vesicam, extrorsumq; pressò, illic vbi supra podicem in perinæo, vesicæ ceruicem denotat, prominentiamq; facit, sectione nouacula in longum aliquousque supra catheteris fissuram ad hoc paratam inductâ, collum vesicæ aperiatur, indeq; illud foramen per vlnus factum, cathetere tunc retracto, directorium instrumentû, canaliculum in superficie impressum habens, in vesicam vsque imprimitur, &

tur, & forcipe in extremitatibus in cochleare vtrinque paruum desinente, per canali- culi ductum in vesicam vsuque adaptâ eaque parum apertâ, calculus apprehensus extra- hatur, qui si plures sint, denuò immisâ for- cipe perquirantur eximanturque. Quibus absolutis, vulnus facillè plerunque iterum, nisi vesicæ corpus læsum sit, coalescit.

Minori labore & periculo, calculus in pe- nis ductu hærens, & nulla ratione cedens, simplici sectione sub illo, in medio corpo- rum duorum illius factâ, ad calculum vsque, è ductu illo exilit.

In mulieribus citra sectionem, per di- ductionem meatus vrinarii, ampliati eous- que, vt forcipem possit intromittere, calculi è vesica eximuntur: quæ dilatatio fit instru- mento quod Speculum matricis vocant, quod stilo, prius meatui inserto impositum, mucrone eius in ductum illum impresso, sensim ab inuicem donec forcipi qui indi- cetur, pateat aditus, diducitur: per quam vi hac factam sensibilis huius sedis dilatatione, cum dolor non exiguus suboritur, & ple- runque dilaceratione illius loci vulnus & læsio admodum grauis inducantur, non si- ne periculo, dictarum quæ post sectionem interdum eueniunt, noxarum, etiam hæc administratio perficitur.

Sunt qui sectione factâ in abdominis se- de, in vesicam vsque penetrante, superstitie homine, calculos è vesica eximi posse, do- cent. Quod nos ex casu, vulneratâ vesicâ, fieri vidimus, in piscatore, qui per fistulam post vulnus vesicæ relictam, iam multis annis, non solum vrinam, sed calculos at- que arenulas excernit.

Comprimendo foris & impellendo ve- sicæ regionem, deorsum versus, & digito immisso in podicem, calculum in vesica premendo, eum in ductum vrinarium im- pelli, indeque ductum sub pene vltius im- pellendo, etiam è corpore citra sectionem educi posse quidam aiebat. Et cum me- præsentè hoc tentaret, calculus quidem in ductus illius principium adegit, verum cum vltius propelli non posset, mox sectione leui illic factâ, vbi calculus hærebat, is pro- filiit.

Viuendi ratio eadem quæ in calculo re- num descripta fuit, hic est obseruanda, cum calculus vesicæ ex calculo suum capiat ini- tium, & augmentum illius, per adhæsi- onem terrestritatis & salsedinis vrinæ, iis- dem impediatur quæ illius ex eadem ma- teria generationem præcauent, & contrariis inducatur.

In oculorum angulis & ciliis, adhæren- <sup>Oculi in- nata a- reno- sa materiei curatio, vti et Tophuli.</sup> tis & impactæ arenosæ materiei cura in eo versatur, vt humiditatem illam nimiam madoremque oculorum auertamus. Quod eâ ratione quæ in cura lachrymarum de- scripta fuit, & si oculorum adsit rubedo, iis quæ in epiphoræ cura proposita fuerunt, poterit perfici. Interim cum ciliorum con- glutinatione, palpebrarum diductio impe- diatur, vt hæc sine labore rursus separari oculique aperiri queant, liquore aliquo, ve- luti aquâ Rosaceâ vel Lacte, concretam hanc materiam à somno, quo tempore ma- ximè hæc agglutinatio fit, emollire oportet. Tophulum oculi globo innatum, quod attinet, si tale quid contingeret, cum parum impediret, vel finendus donec sponte ela- beretur, vel acu, quod citra noxam in cras- sa hac oculi, tunica fieri potest, eruendus.

E naribus si calculus emungatur, & su- <sup>Narium calculi curatio.</sup> spicio ex noua redeunte narium obturatio- ne alterius calculi oboritur, Errhinis in na- res attractis, aliisque quæ facultatem ex- pultricem excitant, sternutationemque mo- uent, maturè illum excutere studebimus.

E pulmonibus si calculi expuantur, nec <sup>Pulmo- num cal- culorum curatio.</sup> dyspnœa aut asthma cesseret, ex eoque alios adhuc superesse colligamus, expectoranti- bus in asthma expositis, eos ad expulsio- nem promouere conueniet.

Ab intestinis calculi progressi, si fortè in <sup>Intesti- norum calculi curatio.</sup> sæcum deiectione deprehenderentur, cum hoc rarum sit, & hæc ipsorum excretio per loca excrementis cuiuscunque generis de- stinata, fiat, non erit ipsorum causâ aliqui- molendum. Quod si sæpè hoc eueniret, quod tamen non fit, ad hosce præcauendos, aliquid foret tentandum.

Ex vtero quod sætum lapidescentem par- <sup>Fætu la- pidescen- tis cura- tio.</sup> tu redditum attinet, satius est rem tanquam prius inauditam admirari, & in causarum inue-



investigatione hærere, quàm aliquid aliud in præcautione faciendâ tentare.

*Poris in-  
natorum  
tophulo-  
rum cu-  
ratio.*

Poris innati tophuli, vix sponte egrediuntur, sed vnguibus in facie, vel acu leuiter cuticulâ diuisâ eximuntur: Et in pedum plantis callosæ cuti immersi, scindendo & diuidendo eam, similiter effodiuntur.

*Tumori-  
bus lin-  
gue &  
tonsilla-  
rum &  
nodis po-  
dagrico-  
rum cal-  
colorum  
curatio.*

E tumoribus lingue, tonsillarum aliarum-ve sedium calculi, aut nodis podagricorum tophi, si progrediantur, cura vlcери relicto accommodatur. Quod si tumori inclusi adhuc sint, molestiamque pariant, suppurantibus tumores in abscessum deducendi, vt eo vel per se aut sectione aperto, vel sponte, prodeant, aut eximi queant. Quod si maturari nequeant, aut aliquin tamdiu moram non patientur, statim aperiendi, calculique eximendi: Sicuti hæc in tumoris sub lingua curâ, quem Ranam vocant, docuimus.

*Dentium  
tophorū  
cura.*

Dentibus accrescentes Tophi, quo pacto auferendi, vbi de sordibus tum in genere, tum in specie dentium sordibus egimus, fuit descriptum.



## RERVM EXTERNA-

RVM CORPVS SVBEVN-  
tium Excretio.

### C A P V T XVI.

*Genera.*



Es externæ corpus subeuntes, indeque rursus excretæ diuersæ admodum sunt, quæ vel corporis interiora subintrant, vel extrinsecus se illi affigunt: Suntque cum in illud minimè pertineant, toto etiam genere præter naturam, vti & ipsarum excretionis talis existit. Quæ è diuersis corporis sedibus

*Oculorū  
excretio,  
rei exte-  
rie cor-  
pus sub-  
euntis.*

procedit. Ex oculis varia, quæ in cauitatem ipsorum illabuntur, & lachrymas, pruritus, dolore, inflammationem, vel etiam exulcerationem pariunt, sicuti in oculorum dolore demonstratum fuit, prodeunt.

*Aurium  
excretio,  
rei exte-  
rie cor-  
pus sub-  
euntis.*

Ex auribus quædam quæ in eas irrepunt, & strepitum in illis excitant, vel introtruduntur, audituique impedimentum adse-

runt, sicuti in auditus læsione fuit expostum, exeunt.

E naribus, quæ in eas spiritus attractione inuolant, & pruritus mouent, sternutatione excutuntur: Aliquando quæ per os assumpta fuerunt, per nares rursus effunduntur vel prolabuntur.

*Narium  
excretio,  
rei exte-  
rie cor-  
pus sub-  
euntis.*

Ex ore aliqua quæ in nares illapsa fuerant, & in fauces descenderant, expuuntur, vel tussis in asperam arteriam perueniant, eamque irritent, rejiciuntur: Vel ea quæ per os assumpta fuerunt & deglutita, ventriculoque molestiam exhibent, per eadem viam rursus euomuntur, vel quæ in cæphago hæserunt, rursus per os prodeunt. Aliquando & quæ per podicem iniecta, per os rursus vomitu reiecta fuerunt.

*Exposi-  
tio, rei  
externe  
corpus  
subeun-  
tis.  
Vomitum,  
rei exte-  
rie cor-  
pus sub-  
euntis.*

E podice, varia quæ assumuntur, & quæ molestiam aliquam in regione ventriculi vel ventris, vel in ipso dum egeruntur, vel illic subsistunt, excitant, deiciuntur: alias verò sine omni molestia iterum egeruntur, & plerumque non obseruantur. Alia quoque quæ in podicem immituntur, infunduntur aut casu, vdicetur, irrepunt, indeque rursus prodeunt.

*Defectio  
rei exte-  
rie cor-  
pus sub-  
euntis.*

Ex sinu vteri, quædam eum subeuntia afficiunturque; rursus prodierunt.

*Vteri si-  
nus ex-  
cretio, rei  
externe  
corpus  
subeun-  
tis.*

E meatu vrinario aliqua ex assumptis, cum vrina emicta fuisse, obseruatum fuit.

Ex papillis mamillarum itidem, aliquid deglutitum egestum constat.

*Mictio*

Per aperturas alias in superficie corporis, aliqua ex assumptis vel arte magica corpori inditis, prodisse aliqui scripserunt.

*rei exte-  
rie cor-  
pus sub-  
euntis.*

A cute quæ se illi extrinsecus aliquando affigunt, maxime in illius plicaturis, vti & sub vnguibus, rursusque recedunt, huc quoque referri possunt.

*Papillæ  
penetrans  
res exte-  
rie cor-  
poris illa-  
ra.*

*Causa.*

MVltæ & variæ sunt omnis generis res externæ, quæ casu plerumque oculos, aures, nares, os, sinum vteri, podicem subeunt, indeque vel per easdem sedes per quas subintrarunt, vel etiam alias rursus prodeunt, hisce excretionibus occasionem causamque præbent, & quæ corporis superficie se affigentes, inde quoque recedunt. Quas omnes recensere cum impos-

*Corporis  
superfi-  
cien per-  
vadens  
res exte-  
rie cor-  
poris illa-  
ra, cutis  
affigen-  
tis rei  
externe  
ab eo re-  
cedens.*

fibile sit, sufficiat præcipuas, & quæ maioris sunt momenti, vel quæ frequentius illud efficiunt proposuisse, & prout has illasve vias subeunt, primum distinxisse.

*Oculis illapſa, causa vt inderur sum ex ce nan tur.*  
In oculos quæ incidunt, indeq; rursum exeunt, sunt plerunque muscæ, casu inter volandum oculis illapſæ. Aliquando pulveres, festucæ, pili, arenulæ, lapilli aliæve minuta cuiuscunque rei corpora, in oculorum dolorum causis exposita. Vbi & quo pacto cilia in oculum contorta, illumq; pungentia molestiâ afficiant, demonstratum fuit.

*Aures irrepen tia vel illis indi ca, causa vt inde rursum emergat vel effluat.*  
In aures quæ illabuntur indeque prodeunt, sunt præcipue aqua, quæ inter natandum, in illas influit. Item pulices & pediculi, aliæ & cimices, scarabæi, aliæque insecta, & vermiculi. Inter quos & salamandram parvam, ne in aures irrepant, metuunt. Aliquando & auribus aliæ parvæ res incidunt, sicuti in oculos, in auditus læsione expositæ inter quas & nucleus ceræsi existit, qui ab infante quodam intrusus, vbi diutius subsistens, terrorem vanum ne illic crescendo augetetur, quibusdam incussit.

*Naribus astracta. causa vt rursum emungatur vel accutatur vel exspuantur aut excreantur.*  
In nares quæ feruntur res, exiguæ quoque sunt, quales oculos & aures etiam subire possunt: quæ inspiratione plerunque attrahuntur, & vel subito emunguntur, vel sternutatione quam commouent, ejiciuntur, vel per narium amplitudinem in fauces delabentes exspuuntur, vel in asperam arteriam se ingerentes, tussi rejiciuntur. Alia quæ in nares sensim repunt animalcula, quod inter dormiendum fieri necesse esset, diutius quin ob pruritum quem mouent, sternutatione excutiantur, vix possunt subsistere.

*Os subeuntes res extranea assumpta, causa vt hæc deiciantur.*  
Per os assumpta, quæ per deiectionem alui, cum prægressis ventris torsionibus vel etiam sine illis, nonnunquam & vomitionem, si ventriculum molestant, rursum excernuntur, sunt varia.

*Et ciborum genere quædam assumpta, non quæ ob ventriculi imbecillitatem incocta & cruda permanent, in hienteriaq; deijciuntur, sed quæ in sano alioquin ventriculo, cum concoqui & euinci nequeunt, talia qualia erant, rursum rejiciuntur, præternaturalem illorum per anum deiectionem pariunt, idq; vel quia nimis magnâ quantitate*

assumpta concoctione subterfugerunt, vti ali- quâdo ob pinguiû, olei butyrive immodicû vsum, accidit, pinguisq; deiectio sicuti in ea demonstratû fuit, sequitur; vel quia ob durtiem vel crassitiem non potuerunt mutari, talia rejiciuntur. Sicuti quendam caseû quem diu immoderate comederat, in colico dolore excreuisse, in eodè ostendim⁹. Et duas puellas, castaneas, quibus se impleuerant, post clysmatis vsum, magnâ copiâ reieciſſe vidimus: Vti & in dysenteria similiter quendam castaneas multas, quas ante menses aliquot assatim comederat, quæ adhuc cognoscebantur, etiam post vsum enematis deieciſſe.

Plerunque verò quæ concoqui in hominis ventriculo nequeunt, vti in animalibus, non mutata rejiciuntur: Vt sunt ossei nuclei ceraſorum, prunorû, cornorum similiumq; fructuum, vti & mespilorum ossa dura & veluti lapidescentia, quina plerunq; in quouis, cuiusmodi ad me pro calculis excretis missa, cum diligenter examinauiſſem, protinus ofsicula mespilorum esse deprehendi.

Cortices fructuum & leguminum, etſi tenues sint membranæ, tamen quia integri etſi medulla cõcoquatur, manent, in excrementis alui conspicui excernuntur: Magnaq; sæpè copiâ post esum leguminum & imprimis lentium, vnde eas non concoqui posse, falsi hisce ipsarum tunicis, & ob id insalubres esse, vulgò iudicant.

Ofsicula gallinarum multa simul, mulierem quæ in seruanda diætâ pedes gallinarum coctos comederat, diu postea cum clysmate excreuisse, obseruauimus.

Præter iam enarrata, inter cibandum vsurpari solita, multæ aliæ externæ res casu deuorant, plerunque deijciuntur, aliæ euomuntur. Vt sunt animalia quædã tam viuâ quàm mortua, quæ cum integra sint, & proin in ventriculo humano digeri nequeant, talia rursum egeruntur, secus ac in cæteris animalibus quibusdam, quæ varia animalia integra adhuc deuorantia, videlicet mures, serpentes, scarabæos (inter quos & ceruum volantem dictum, cornutum à capitone Aleto pisce deuoratum vidi) eadem concoquunt, & licet viuâ adhuc sint, ab ipsis tamen minime læduntur.

Inter cætera, anguillam viuam, fatuum quendam quam per lufum & iocum ori indiderat, in fauces se subito, utpote lubricam, infinuantem, deglutiuisse certò constat, eamq; post grauiora tormina quæ passus fuerat, sequenti die, mortuam, atque uti ferebat veluti excoxiatam in superficie, per aluum reddidisse.

Persuadent sibi fatui quidam, atque imprimis melancholiâ affecti homines, diutius murmura quædam, aut motum in ventre, flatuumq; plerumque causâ sentientes, se serpentes deuorasse, illosque intestinis subsistere, vel etiam ranas, quæ ex fœtura ipsarum, casu inter natâdum in flumine haustâ, genitæ aut alioquin iam natæ, verum parvæ adhuc ab illis deglutitæ sint. Id tamen falsum esse, hoc ostendit, quòd si in ventriculo hæc vel etiam alia viuentia perueniant, quod tamen vix potest fieri, viuere diutius ea minimè possint, sed in angustiis illis suffocentur, & a calore nostro edomentur.

Animantium pili interdum deglutiti, rursus cum excrementis excernuntur, qui si dum adhuc calent, conspiciantur, se non nihil torquentes ac si viuerent, vermiculos viuos referunt talesque ab imperitis esse putantur: Sicuti impostorem quendam noui, qui ut se vermes è corpore suo pharmaco propellere testaretur, chordas minutas incisas frustatim, clam pilulis insitas propinabat, & postea quando rursus excernebantur, quo pacto se mouerent demonstrabat, multisque sic credentibus vermiculos esse imponebat. Vidimus quoq; & habemus pilas in ventriculis vitulorum, caprarum & imprimis rupicaprarum frequentissimè inuentas, ex pilis deuoratis, & in ventre inuicem firmissimè còpactis ac intestis, extrinsecusq; crustâ quadam obductas formatas. Quales fortè & in homine, si multos deuoraret pilos, ut iam dicta animalia, quæ horum deglutitione delectantur, possent enasci.

Ex terrestribus quædam deuorata, talia qualia sunt, rursus deijciuntur. Ut sunt arena, lutum, lapides & metalla. Sicuti fatuum quendam quæstus causâ, pretio vili, plurimos silices, etiam nucis magnitudine, subito sine molestia deglutiuisse, stomachuq;

ad eò impleuisse, utdum compleretur, sonum lapidum se mutuo collidentium ederet, & postea eosdem ejectos ablutos rursus deuorasse, idq; sæpius, spectauimus: Vti & mulierem quendam argentum viuum, fortuito bibitum, dum in musæo meo mihi casum narraret, copiosè per aluum iterum effudisse vidimus. Quæ corpora solida & dura, terrena, homo nullo modo potest digerere, sicuti verò aues fabulum & lapillos, quorum esu delectantur, consumere posse certò obseruaui, & lupos lutum lambendo, famis tempore se diu sustentare, inq; lupi ventriculo lutum lapidescens, aut ex argilla cinerea conflatum lapidem deprehensum, inter alia rariora asseruamus.

Artificialia multa ex prædictis terrenis, vel ex ligno conflata, varia sæpè casu deglutita, nisi in intestinis subsistant, uti sæpè dicitur, per aluum excernuntur: Veluti globulum sclopeti, quem studio aliqui medendi gratiâ deuorant: Alij temulenti & ebrii immò insani vitra morsâ confracta deglutiunt.

Cochleare quidam ebrius, lac eo cementi ab altero intrusum, deglutiuit, unde cum diu torsiones sensisset, altero die, non sine labore & dolore in exitu podicis hærens iterum tandem per aluum idem reddidit.

Crucem auream magni precij, quendam noctu dormienti concubinæ, de collo clam detractam, ne apud illum deprehenderetur, deglutiuisse, & postmodum denudò excre, tam sic abstulisse, narrat Vesalius.

Cultrum panno linteo obuolutum, per vinum intrusum, aliquem deglutiuisse, indeque torsiones summas persensisse, qui postea in inguinis regione tumorem & abscessum genuerit, ex eoque dissecto extractus fuerit, diu post superstitè illo, scribit insignis quidam Medicus.

Acum pridem ante deglutitam, è vena quadam prodijisse alius scribit.

Ex papilla mamillæ, acum in lacte prodijisse, Medicus fide dignus certò mihi affirmavit.

Inter ea quæ os subeunt, multa rursus quam primum deprehenduntur, exspuunt.

tur: Aliqua si à meatu proprio aberrant, vti loquuntur, & in asperam arteriam labantur, sicuti panis micæ, aqua bibita, aliæve, tussi per os rursus excreantur: Vel in nares vi profusa, vti liquida, per eas denud effunduntur.

Interdum ex illis quædam deglutita, in faucibus hærentia, transglutendi vti & respirandi pariunt difficultatem, nonnunquam & suffocant. Quæ inter cætera spinæ, ossa & numismata deglutita, sicuti in transitu per gulam defectu demonstratum fuit, subsistentia, nonnunquam efficiunt: Et sanguisugam fortuito haustam, in œsophago hæsisse, ostendit Rhazis.

Ex assumptis quædam etiam ulterius ex intestinis per venas meseraicas transeuntia, cum vrina mictione, quandoque reddita fuerunt: Veluti Oleum assatum bibitum. Quod & ab aliis pinguibus frequenter & copiose sumptis fieri potest, vt vrinæ pinguedo hæc innatet, neque illa, quæ sæpe in ea deprehenditur, semper à renibus, vti putant, procedat.

Vermiculos cum caseo comestos, eo quoque peruenisse, & vrinæ confusos emictos fuisse, in vrina excreta ostendimus.

Fortè & arenosa quædam sumpta, per venas meseraicas transeuntia, vrinam sabulosam reddere possunt, vt non sit necesse eas arenas in corpore natas esse, quod tamen si fit, admodum rarum est.

Per recti intestini vlcus, ceruicem vesicæ simul perforans, fistulosum, ossicula auium comesta, inter mingendum prodiisse, similiter obseruauimus.

*Podici insecta clysmata, velin cum irrepentia, causa harum eorum eundem exomissionem vel defectum.*  
Per podicem insecta enemata, aliquando ex cæcisioribus intestinis in tenuia ascendentia, indeque in ventriculorum vomitu rejiciuntur.

Sanguisugæ podici ad prouocandas hæmorrhoides induntur.

Talpam rustico cuidam viuam in sacculo femoralium eo perforato, aliquousque vi podicem subiisse, vixque inde rursus nisi prius intersectam, extrahi potuisse, alter rusticus, qui consilij gratia ob læsionem podicis ad me venit, mihi retulit.

In sinum vteri murem aliquousque pe-

netrasse, quidam testabatur, estque verisimile hoc, cum mulieres adeo sibi ab illis meruant.

Quæ magica arte corpori indita ab eo excernuntur, hic proponere non est nostri instituti.

Ossicula, pili aliaque res externas representantia, in abscessibus genita, cum extrinsecus corpus non subire soleant, sed vti in tumoribus eiusmodi ostendimus, ex succo nutriente partium nascantur, non ad hæc excretiones rerum externarum pertinent: Nisi magicis præstigijs talia indita sint, quod tamen à causa etiam naturali dependere posse, in tumoribus in abscessum desinentibus, demonstratum fuit.

Quæ se cuti extrinsecus affigunt externa, indeque rursus auferuntur, præcipue sunt Sordes, non illa quæ ab internis causis proueniunt, de quibus iam egimus, sed quæ ab externis prodeuntes, & ex contritu rerum sordidarum sensim corpori in manibus, pedibus illorumque digitis & sub vnguibus, se agglutinant, eaque sordida reddunt, coloreque alieno interdum inficiunt, & sub vnguibus nigredinem illam sub illorum eminentiis conspicuam pariunt, sicuti in discoloratione horum quoque facta est mentio. Inter quæ frequens pecuniæ contrectatio, sordibus abominandis, quas tamen immodicum eius desiderium obfuscet, manus inficit, quæ sordities pecuniæ inde quod à tot hominum millibus, mendicis, leprosis aliterque infectis contrectatur, aduenit.

Inter animalia Pulices frequentius saltu vestibus & integumentis se inferentes, inde corpori nudo se affigunt, & aculeo intruso, ex eo sanguinem, donec impleantur, sugunt. Quos aliunde potius huc peruenisse, nec in corpore, vt pediculi ex sordibus cuti vestibusque adhærentibus, vti ostendimus, nasci, ex eo patet, quod longè aliam quam pediculi formam habeant, rubeant, nec vti illi repant, sed pedibus longioribus duobus saltent, non sordibus, vti pediculi, sed sanguine se saginent, nec in corpore, vti pediculi, continuo subsistant, sed locum mox mutant. Licet enim in canibus, in quorum

repentia, causa inde de suo prodeat.

Sordes, causa eorum quæ extrinsecus cuti affigunt, ab eaq; iterum recedunt.

Vnguius sordes.

Pulices causa eorum quæ extrinsecus corpori affigunt indeque recedunt.



pilis tam numerosi hærent, gigni, vel saltem aliunde illati, se multiplicare, novive ex sordibus illorum cutis nasci videantur hoc tamen in homine, cuius sordes diuersæ à canum sordibus existunt, fieri nequit: sicuti etiam in aliis animalibus pilosis, & plumis auibus, ob sordium in illius diuersitatem, aliâ formâ pediculos quàm in homine, & pulices quàm in canibus generari videmus, nec solum ex sordibus quæ ab ipsorum corporibus emanant, illicque permanent, sed etiam ex illis quibus nidi ipsorum replentur, vt in homine in indusiis, sic & pulices in canibus & aliis animalibus tam pulices quàm pediculi enascuntur.

Hirudines siue sanguisugae, studio ple-  
runque cuti ad sanguinem eliciendum ap-  
ponuntur, raro in flumine natantibus,  
sponte se affigunt: vti verò minores sangui-  
sugas piscibus copiose adhærere interdum  
videmus.

*Curatio.*

**R**ES enarratæ aliæve corpus subeuntes, & vel illapſæ vel aſſumptæ, aut irrepentes, ſi illiſc perſiſtant, nec incommodent, maximeque ſi nihil de eo quod corpori illata ſint, conſtar, negliguntur; ſi verò vel functionum aliquâ læſione aut dolore ſe pateſciant; tunc vt è corpore educantur, cura inſtituitur; ſicuti quorundam etiam, cùm de ſymptomatibus quæ proferunt, ageremus, fuit expoſita. Quod ſi ſponte procedant, naturæ hoc committendum; ſi in ipſa excretionè moleſtiam pariant, aut ſubſiſtant, hiſce cura adhibebitur. Si ægrè procedant, hæc expellere, ejicere, eximere variis modis ſtudebimus; Veluti ſequentibus.

*Oculi illa  
lapforu  
cura.* In oculis illa pfa varia, nifi fpon te rursum  
exeant, quo pacto elui vel eximi debeant, in  
cura dolorum oculi fuit defcriptum : Vbi &  
ficilia contorta oculos pungant, quid agen  
dum fit, declaratum fuit.

*Adversus* In aures irrepentia, vel intrusa, quomodo  
*irrepentia*  
*intrusa* elui, excuti, extrahi, & si animalcula sint, al-  
lici & necari debeat, in auditus læsione quã  
inducunt, ostensum fuit.

In nares attracta, vel eas subeuntia, mox

plerunque sternutatione quam mouent, ite-  
rum excutuntur, vel per amplitudinem na-  
rium in os vel fauces prolapsa, exspuuntur  
vel excreantur. Et si in asperiam arteriam  
perueniant, tussi rejiciuntur.

Per os sumpta varia, si in asperam arteriam incident, similiter tussi rejiciuntur, quandoque etiam in narium amplitudinem delata, per nares emunguntur. Si in aspera arteria subsistant, nec possint excuti, quod vix fit, expectorantibus exhibitis subueniendum, ne uti alicubi ob muscam illapsam accidisse scribunt, suffocetur patiens.

— Si in œsophagū delata, illic alicubi in du-  
ctu vel circa stomachum hæreant, vti de san-  
guifugis aliisque dictum, vnde periculum  
suffocationis oritur, quâ ratione hæc inde  
fursum deorsumve propellenda sint, in Trā-  
glutiendi impedimento quod adferunt, o-  
stensum fuit.

Quòd si verò in ventriculum varia illa cuiusunque generis quæ assumpta studio casive fuerunt, deueniant, nisi sponte eum grauidando vel irritando, vomitionem mouendo, per eum excernatur & euomui queant, vomitus mouendus.

Si verò in intestina vsque descendant, ea-  
que peruadentia, per podicem egerantur, &  
hæc ipsorum excretio clysteribus iniectis  
promouenda, & si in podice quædam substi-  
stant, instrumentis euellenda.

Per podicem inieſta clyſmata, ſi ſurſum  
delata vomitu rejiciantur, pro malo ſigno  
habetur, & cum hoc in colico dolore acci-  
dat, cura non alia quàm quæ colico dolori  
debetur, adhibenda.

Sanguisugæ podici inditæ, postquam sanguinem fuxerunt, seque impleuerunt, rursum sponte elabuntur, vel extrahuntur. Si cedere nolint, caudâ præcisa, quod vt sanguinem suctum effundendo, amplius fugant, fieri solet, citius fecedent: Vel cineribus aspersis, sale aliisve, quæ & vermes fugare diximus, vt locum deferant abeantq; efficimus.

Quæ in podicem scandens, se aliquouſque inſormiſerat talpa, cùm trahendo ob cruciatum, quem pedibus renitendo pariebat, inde auelli nequiret, occiſa tandem pro-

Uteri s- diut, læsionem aliquam ani, cui cura adhibita  
nam ir- fuit, post se relinquens. Quod & in mure, si-  
repentiū num vteri subeunte, accidit.

Cuti ad- Cuti adhærentes sordes, ab externis pro-  
harecen- fectæ, quo pacto auferri debeant, & ab illis  
tium for- corpus repurgari, in sordium quæ ab inter-  
dium cu- nis causis proficiscuntur, cura fuit edoctum,  
ratio. cum eadem ratione, uti illæ abstergantur.

Unguiū Sub vnguium eminentiis coaceruatæ sor-  
sordium- des, ob neglectam ipforum abfectionem, il-  
cura. lis præfectis simul amouentur.

Pulices quo pacto ex conclau, leſticiniis  
& vestibis abigantur, non nostri est institu- Pulicem  
ti exponere; ut verò corpus minus infe- a corpore  
stent, si certis decoctis dum in balneo sunt, depulſio  
quibus & pediculi fugantur, se lauarent, pos-  
set id aliquo pacto effici, cum aliter se hanc  
ob causam inungere tædiosum sit.

Hirudines cuti affixæ, uti de illis quæ po- Hirudi-  
dici induntur diximus, vel sponte iterum num cui  
procidunt, vel eadem arte affixorū  
abiguntur. depulſio.

## F I N I S.

**I** Amq, Opus absolui, quod non abolere vetustas,  
Non poterunt flamma, non vis, non vlla potestas;  
Cum veniet tempus, quod mundo me auferet isto,  
Parte tamen meliore mei viuam, atque manebit  
Nomen, dum mundus manet, indelebile nostrum.



# I N D E X.

**A**ffectuum omnium qui in hoc opere tractantur, & in margine plerumque adnotati reperiuntur, tam Symptomatum in generibus propositorum, quam Morborum in causis descriptorum: Quibus, ubi cuiusque cura (quo nomine omnem actionem Medici, quæ prædicendo operandoque perficitur, intelligimus) inueniatur, numero indice, singulis addito, significatur.

|                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Bdominis musculorum conuulsio, causa Mictionis inuoluntariae 681. cura 682 | Atrophia cachexia topulata 438. causa 440. cura 448                                              | Bronchocele 182. causa 238. cura 299                                            |
| Abortus vel aborsus 472. causa 475. 476. cura 480                                   | Atrophia hydrope comitata 438. causa 440. cura 448                                               | Bubonocoele, vide Cete.                                                         |
| Albura, vide Vitiligo.                                                              | Atrophia particularis Schweinfucht 438. cura 465                                                 | <b>C</b> Achexia 57. causa 72. cura 90                                          |
| Alopecia, vide Pilorum defectus.                                                    | Aures irrepentia vel illis indita, causa vt inde rursum emergant vel effluant 831. cura 837      | Cacochymia cachexia species 58. causa 72. cura 90                               |
| Alui fluxus, vide Dyarrhoea.                                                        | Aures subiens aquosus humor è venis illis emanans, causa Aquosi ex auribus fluoris 600. cura 608 | Calculus emunctus 817. causa 819. cura 829                                      |
| Anasarca, vide Leucophlegmacia.                                                     | Aurium aquosus effluxus 595. causa 600. cura 608                                                 | Calculi è nodis podagricorum 818. causa in podagra, cura 829                    |
| Aneurisma 183. causa 299. cura 343                                                  | Aurium excretio rei externa corpus subeuntis 822. causa 831. cura 822                            | Calculi & arenula per fistulam prodeuntes 818.                                  |
| Animalium excretio 784. causa 788. cura 792                                         | Aurium purulenta excretio 584. causa 586. cura 589                                               | Calculus excreatus 818. causa 819. cura 828                                     |
| Animatorum reiectio 809. causa 811. cura 812                                        | Aurium sanguinea excretio 558. causa 560. cura 568. 575.                                         | Calculus in oculi globo 818. causa 820. cura 828                                |
| Aniresolutio 487. causa 496. cura 529                                               | Aurium sordes 774. causa ibid. cura 777                                                          | Calculus mictione redditus 817. causa 818. cura 820                             |
| Aquosus humor, causa sordium in oculis, auribus, naribus & obsecanis 776. cura 778  | Aurium vermes 786. causa 789. cura 804                                                           | Calculus per alium excretus 818. causa 819. cura 828                            |
| Aquosa seu aquea excretio 593. causa 597. cura 605                                  | Aurium vlcus causa Purulenta inde excretionis 586. cura 589                                      | Calculi poris infixi, Leichdörff 818. causa 828. cura 829                       |
| Arenosa oculorum materia 817. causa 819. cura 821                                   | Auriga, vide Icterus.                                                                            | Calculus renum, causa Mictionis cruenta 678. cura 728                           |
| Arenula mictione reddita 817. causa 819. cura 821                                   | <b>B</b> Arba tardius enascens 8. causa 19. cura 26                                              | Calculus sub lingua 818. causa 820. cura 829                                    |
| Arteria sectio seu Arterotomia, causa illius sanguinis effluxus 567. cura 576       | Bilis ad superficiem corporis delata, causa Icteri 82. cura 119                                  | Calculus tonsillarum 818. causa 820. cura 829                                   |
| Ascarides 785. causa 789. cura 802                                                  | Bilis, causa Dyarrhoea, Dysenteria Tenesmi 774. cura 725. 748. 753                               | Calculus vesicæ exfectus 818                                                    |
| Ascites 167. causa 212. cura 251                                                    | Bilis, causa Sordium in auribus 775. cura 777                                                    | Calculus vesicæ, causa Mictionis ardentis 678. cura 695                         |
| Atheoma 188. causa 197. cura 313                                                    |                                                                                                  | Calor cutem dilatans, causa coloris Rubicundioris & viridioris 88. cura 129     |
| Atrophia 434. causa 440. cura 448                                                   |                                                                                                  | Calor febrilis, causa impressionis factæ in vnguibus vel diuisionis 23. cura 51 |
|                                                                                     |                                                                                                  | Calor                                                                           |

# I N D E X.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Calor febrilis, causa Pylorum de-</i><br><i>fluxus</i> 22. <i>cura</i> 26                                                                              | <i>Cibi sumpti putrescentes, forte</i><br><i>causa generationū Ascaridum</i><br><i>&amp; Vermiculorum dentium, eo-</i><br><i>rumq; qui Mictione redduntur</i><br>789. <i>cura</i> 803 | <i>rum</i> 820. <i>cura</i> 823                                                                                                  |
| <i>Calor feruens, causa Pylorum de-</i><br><i>fluxus</i> 17. <i>cura</i> 26                                                                               | <i>Cibus in causa sordium Oris an-</i><br><i>gulorum &amp; Dentium</i> 775.                                                                                                           | <i>Cutis poros permeans serum cau-</i><br><i>sa sudoris</i> 602. <i>cura</i> 618                                                 |
| <i>Calor vehemens extrinsecus ad-</i><br><i>ueniens, causa Dentium mobili-</i><br><i>tatis vel lapsus vel fractura</i> 17.                                | <i>cura</i> 23.24.                                                                                                                                                                    | <i>Cutis siccitas, causa illius Coloris</i><br><i>obscurioris &amp; Nigredinis vulgo</i><br><i>dicta</i> 90. <i>cura</i> 129.142 |
| <i>cura</i> 23.24.                                                                                                                                        | <i>cura</i> 778                                                                                                                                                                       | <i>Cutis sordes</i> 775. <i>causa</i> 776.                                                                                       |
| <i>Callus cutaneus</i> 190. <i>causa</i> 201.                                                                                                             | <i>Cirsocele</i> 183. <i>causa</i> 207.                                                                                                                                               | <i>cura</i> 778                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 329                                                                                                                                           | <i>cura</i> 342                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>Callus offens</i> 290. <i>causa</i> 204.                                                                                                               | <i>Clauus Egerstenaug</i> 191. <i>causa</i>                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 327                                                                                                                                           | 202. <i>cura</i> 332                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| <i>Caluities</i> 3. <i>causa</i> 21.                                                                                                                      | <i>Cœliaca passio</i> 710. <i>causa</i> 724.                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 26                                                                                                                                            | <i>cura</i> 771                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>Cancer generalis, vide Elephan-</i><br><i>tiasis.</i>                                                                                                  | <i>Colliquatio corporis</i> 437.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <i>Canities</i> 66. <i>causa</i> 89.                                                                                                                      | <i>causa</i> 443. <i>cura</i> 449                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 162                                                                                                                                           | <i>Coloratio cutis</i> 60. <i>causa</i> 87.                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <i>Carnositates nimia</i> 6. <i>causa</i> 19.                                                                                                             | <i>cura</i> 144                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 43                                                                                                                                            | <i>Colores ab externis profecti, cau-</i><br><i>sa Discolorationis cutis, Vnguiū</i><br><i>&amp; Dentium</i> 87. <i>cura</i> 144                                                      |                                                                                                                                  |
| <i>Caro luxurians</i> 177. <i>causa</i> 196.                                                                                                              | <i>Commaculatio cutis</i> 60.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 322                                                                                                                                           | <i>causa</i> 87. <i>cura</i> 142                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <i>Cele, Chyli</i> 192. <i>causa, cura, vi-</i><br><i>de Partium prociſionem in ex-</i><br><i>cretorum vitii.</i>                                         | <i>Condyloma</i> 178. <i>causa, cura</i><br><i>in Doloribus.</i>                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <i>Cerebri pituita defluens ad os,</i><br><i>causa Expirationis pituitosa &amp;</i><br><i>Ptyalism</i> 625. <i>cura</i> 630                               | <i>Consuetudo mala, causa Mictio-</i><br><i>nis intempeſtina</i> 670. <i>cura</i> 683                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| <i>Chirones pediculi in manibus</i>                                                                                                                       | <i>Consumptio</i> 434. <i>causa</i> 439.                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| <i>Süren</i> 791. <i>cura</i> 806                                                                                                                         | <i>cura</i> 448                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>Cholera morbus</i> 642. <i>causa</i>                                                                                                                   | <i>Corporis gracilitas</i> 7. <i>causa</i>                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 646. <i>cura</i> 654                                                                                                                                      | 13.15.19.22. <i>cura</i> 47                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <i>Chylus, causa Cœliacæ passionis</i><br><i>753. cura</i> 766                                                                                            | <i>Corporis superficiem perueniens</i><br><i>res externa corpori illata</i> 830.                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <i>Chylus, causa generationis Lum-</i><br><i>bricorum</i> 788. <i>cura</i> 792                                                                            | <i>causa</i> 835. <i>cura</i> 839                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| <i>Chylus, causa generationis Tania-</i><br><i>rum, &amp; Cucurbitini vermis</i> 812.                                                                     | <i>Corporis totius incrementum</i> 4.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 816                                                                                                                                           | <i>causa</i> 13. <i>cura</i> 36                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>Chyrades, vide Scrophula.</i>                                                                                                                          | <i>Corpus geminum</i> 2. <i>causa</i> 15.                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <i>Cicatrix</i> 190. <i>causa</i> 201.                                                                                                                    | <i>cura</i> 24                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| <i>cura</i> 330                                                                                                                                           | <i>Coryza</i> 594. <i>causa</i> 599.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| <i>Cibi &amp; potus copia, corruptio,</i><br><i>cruditas, causa Diarrhœæ &amp;</i><br><i>Lienteria</i> 717. <i>cura in hisce</i><br><i>affectionibus.</i> | <i>cura</i> 608                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>Cibus &amp; potus pinguium, causa</i><br><i>Deiectionis per aluum pinguis</i><br>724. <i>cura</i> 773                                                  | <i>Crepitus ventris</i> 574. <i>cau-</i><br><i>sa</i> 537. <i>cura</i> 746                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           | <i>Cuti se affigentis rei ab ea recessio</i><br>836. <i>causa</i> 840. <i>cura</i> 843                                                                                                |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           | <i>Cutis aperturas perueniens Serum,</i><br><i>causa illius inde effluxus</i> 604.                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           | <i>cura</i> 621                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           | <i>Cutis poris innata terreſtreiras,</i><br><i>causa calculorum ipsis infixo-</i>                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>rum</i> 820. <i>cura</i> 823                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Cutis poros permeans serum cau-</i><br><i>sa sudoris</i> 602. <i>cura</i> 618                                                 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Cutis siccitas, causa illius Coloris</i><br><i>obscurioris &amp; Nigredinis vulgo</i><br><i>dicta</i> 90. <i>cura</i> 129.142 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Cutis sordes</i> 775. <i>causa</i> 776.                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cura</i> 778                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <b>D</b> <i>Deiectio cruenta dicta citra</i><br><i>exulcerationem</i> 711. <i>cau-</i><br><i>sa</i> 714. <i>cura</i> 747         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deiectio per aluum mucosa &amp;</i><br><i>pituitosa</i> 712. <i>causa</i> 772.                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cura in Diarrhœa.</i>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deiectio per aluum pinguis</i> 712.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>causa</i> 744. <i>cura</i> 769                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deiectio per aluum purulenta</i> 712.                                                                                         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>causa</i> 723. <i>cura</i> 773                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deiectio per aluum sanguinis co-</i><br><i>creti</i> 711. <i>causa</i> 716. <i>cura</i><br>748                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deiectio praternaturalis</i> 711.                                                                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>causa</i> 713. <i>cura</i> 725                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deiectio rei externa corpus sub-</i><br><i>euntis</i> 830. <i>causa</i> 831. <i>cura</i><br>338                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Defluxio in dentium alueolos cau-</i><br><i>sa Dentium mobilitatis &amp; ca-</i><br><i>sis</i> 22. <i>cura</i> 25             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Defecatio</i> 344. <i>causa</i> 357.                                                                                          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cura</i> 365                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Deformatio</i> 1. <i>causa</i> 13.                                                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>curatio</i> 24                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentes &amp; vngues se inuicem pro-</i><br><i>pellenes, causa vt decidant</i> 24.                                             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cura</i> 25                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentes flavi, nigri</i> 60. <i>causa</i> 87.                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cura</i> 171                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentium breuitas</i> 7. <i>causa</i>                                                                                          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 18. <i>cura</i> 47                                                                                                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentium caries &amp; fractura</i> 9.                                                                                          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>causa</i> 17. <i>cura</i> 49                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentium defectus</i> 3. <i>causa</i> 13.                                                                                      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 17.22.24. <i>cura</i> 25                                                                                                         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentium limus &amp; sordes, causa</i><br><i>Tophorum illis adnatorum</i> 821.                                                 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cura</i> 829.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>Dentium mobilitas</i> 12.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | <i>cau-</i>                                                                                                                      |



- causa* 17. *cura* 33  
*Dentium numerus auctus* 2.  
*causa* 13. *cura* 24  
*Dentium prominentia* 12.  
*causa* 13. *cura* 47  
*Dentium sordes* 775. *causa*  
*ibid.* *cura* 779  
*Dentium superincarnatio, vide*  
*Gingivarum caro luxurians.*  
*Dentium tophi* 818. *cau-*  
*sa* 280. *cura* 829  
*Dentium vermiculi* 785.  
*causa* 790. *cura* 804  
*Diabetes* 666. *causa* 672.  
*cura* 686  
*Digitus sextus* 2. *causa* 13.  
*cura* 24  
*Dipsacus, vide Diabetes.*  
*Discoloratio* 56. *causa* 67.  
*cura* 90  
*Dracunculi* 786.  
*Dyarrhoea* 711. *causa* 714.  
*717. 719. 720.* *cura* 753.  
*si post alios morbos* 763  
*Dysenteria* 710. *causa* 714.  
*716. 717. 718.* *cura* 725  
*Dysuria, vide Mictio ardens.*  

**E**

*Echymomata, vide Sugillata.*  
*Echymoses, vide Sugillata.*  
*Echymata* 63. *causa* 70.  
*cura* 158  
*Efflatio è vulnere procedens* 535.  
*causa* 536. *cura* 545  
*Efflatio praternaturalis* 533.  
*causa* 536. *cura* 540  
*Elephantiasis* 344. *causa* 358.  
*cura* 365. *Walshen, Aussen.*  
*Empyema* 436. *causa* 444.  
*cura* 449  
*Encanthus in oculi angulo*  
*causa* 196. *cura* 322  
*Enterocoele, vide Cele.*  
*Epiplocele, vide Cele.*  
*Epulis in ore* 179. *causa* 196.  
*cura* 322  
*Erysipelata* 63. *causa* 70.  
*cura* 158  
*Exanthemata* 64. *causa* 70.  
*cura* 158  
*Exhalatio calida, causa sordium*  
*in dentibus* 777. *cura* 779  
*Exspuitio pituitosa* 622.  
*causa* 625. *cura* 630  
*Exspuitio praternaturalis* 622.  
*causa* 624. *cura* 630  
*Exspuitio purulenta* 624.  
*causa* 629. *cura* 639  
*Exspuitio rei externa corpus sub-*  
*euntis* 830. *causa* 832.  
*cura* 837  
*Exspuitio sanguinea* 622.  
*causa* 626. *cura* 631  
*Extuberantia* 166. *causa* 194.  
*cura* 240  

**F**

*Fascia intestinorum, vide Ta-*  
*nias.*  
*Faucium exulceratio, causa Ex-*  
*spuitionis purulenta* 629. *cura*  
*in Faucium dolore Tract. 2.*  
*Flatus ab intestinis per podicem*  
*erumpentes, causa Crepitus ven-*  
*tris* 537. *cura* 540  
*Flatus è ventriculo per os erum-*  
*pentes, causa Ructus* 537.  
*cura* 540  
*Flatus in abdominis cauum aliun-*  
*de irrepens vel illic genitus, cau-*  
*sa Tympanitis simplicis, vel si*  
*cum aqua se offerat, compositi*  
*cum ascyte* 233. *cura* 285  
*Flatus in intestinis & ventriculo*  
*retenti, causa Tympanitis inte-*  
*stinalis* 236. *cura* 282  
*Flatus in muscutorum spatia e-*  
*rumptes, causa spasmi statu-*  
*lenti* 238. *cura in Spasmo*  
*Tract. 1.*  
*Flatus in ventriculo retetus, cau-*  
*sa Inflationis ventriculi, & in*  
*intestinis, Tumoris in colico do-*  
*lore prominentis* 237. *cura in*  
*inflatione ventriculi & colico*  
*dolore.*  
*Flatus sub cutem erumpentes vn-*  
*dique, causa Intumescencia ge-*  
*neralis* 237. *cura* 289  
*Flatus sub cutem membranasq;*  
*colli rrumpentes, causa Bronco-*  
*celes* 238. *cura* 290  
*Flatus sub cuticulam delati, cau-*  
*sa Phlyctenarum, atulentarum*  
*238.* *cura* 293  
*Flatus sub cutis certa loca erum-*  
*pentes, causa tumorum atq; in-*  
*tumesceniarum, quas Physodes*  
*vocant* 237. *cura* 292  
*Flatus ventriculo atq; intestinis*  
*inclusi, causa Fluctuationis, Ru-*  
*gitus & Murmurum vètris* 537.  
*cura* 540  
*Fluctuatio in ventre* 574. *cau-*  
*sa* 537. *cura* 540  
*Fluxus cerebralis* 709. *cau-*  
*sa* 720. *cura* 753  
*Faecum alui cum urina excretio*  
*713. causa* 773. *cura* *ibid.*  
*Faecum alui per vomitum excre-*  
*tio* 712. *causa* 715.  
*cura* 773  
*Faecum alui per vteri sinum ex-*  
*cretio* 713. *causa* 716. *cura* 773  
*Faecum alui per vulnera & fistu-*  
*lam excretio* 713. *causa* 715.  
*cura* 774  
*Fætor crepitus oris vel vètris* 535.  
*causa* 538. *cura* 540  
*Fætor narium* 535. *causa* 539.  
*cura* 544  
*Fætor oris seu anhelitus* 535.  
*causa* 537. 538. *cura* 541  
*Fætus lapidescens* 818. *causa* 820.  
*cura* 829  
*Frigus cutem condensans, causa*  
*Coloris obscurioris* 88. *cura*  
*eadem quæ & Palloris* 129  
*Furfures* 10. *causa in Abrasio-*  
*ne cutis Tract. 2.* *cura* 52  

**G**

*Anglion* 188. *causa* 201  
*cura* 322  
*Gingivarum caro luxurians* 178.  
*causa* 196. *cura* 320  
*Gingivarum separatio à dentibus*  
*11. causa* 22. *cura* 49  
*Gingivarum tumor, suctio, lesio.*

causa Exspuitionis cruenta 626  
 cura 631  
 Gingivæ consumpta 7.  
 causa 16. 23. cura 39  
 Cippus 12. causa, & curam  
 vide in 1. Traët.  
 Glandula 183. causa 194.  
 cura 293  
 Gonorrhœa 546. causa 548.  
 causa 550  
 Gonorrhœa virulenta 546.  
 causa 548. cura 554  
 Grado in palpebra superiore 192.  
 causa 203. cura 337  
 Grauedo, vide Coryza.  
 Gutta rosacea 62. causa 70.  
 cura 146  
 Gutturis hernia, vide Broncho-  
 cele.

H

**H**epaticus fluxus 711.  
 causa 721. cura 767  
 Hepatis durities & scirrhus, pro-  
 minentiam in hypochondrio dex-  
 tro pariens 187. causa 199.  
 cura 311  
 Hepatis terrestreitas, causa Are-  
 nularum, quæ minguntur, &  
 Tophorum qui in eo subsistunt  
 819. cura in morbis aliis.  
 Hernia, vide Cele.  
 Hernia abdominis, vide Cele.  
 Hernia inguinalis, vide Bubono-  
 cele.  
 Hirudines, causa eorum, quæ se  
 extrinsecus corpori affigunt 837  
 cura 839  
 Hamoptoica passio 623.  
 causa 626. cura 632  
 Hamorrhoidum fluxus immode-  
 ratus 557. causa 560.  
 cura 569  
 Hordeolum in palpebris Berren  
 192. causa 203. cura 337  
 Humidi substantifici defectus, cau-  
 sa Marcoris & Tabis 442.  
 cura 448  
 Humores pravi in morbis mali-  
 gnis, causa Macularum peruer-

farum in febribus malignis &  
 luibus 87. cura 158  
 Humores putridi, corrupti, cau-  
 sa Diarrhœa, Dysenteria & Te-  
 nesmi 719. cura 725. 743  
 Humor pravius & malignus circa  
 poros congestus, causa Pilorum  
 defluuij 23. cura 26  
 Humor vitiosus circa detium ra-  
 dices congestus, causa Dentium  
 mobilitatis & casus 22.  
 cura 26  
 Humorum ichores, causa genera-  
 tionis Chironum pediculorum  
 791. cura 805  
 Hydrocele 180. causa 222.  
 cura 279  
 Hydrocephalos 181. causa 231.  
 cura 281  
 Hydroæ Sûren Germ. 182.  
 causa 232. cura 281  
 Hydromphalos 181.  
 causa 232. cura 281  
 Hydrops, vide Ascites.  
 Hypofarca, vide Leucophlegma-  
 cia.  
 Hypofarcosis, vide Sarcoma.

I

**I**cterus 58. causa 82.  
 cura 119  
 Impetigo, Zittermahl Germ. 62.  
 causa 70. cura 146  
 Indica lues, vide Venerea lues.  
 Inflatio seu intumescencia corpo-  
 ris 167. causa 237. cura 289  
 Inguinis aquosus tumor in mulie-  
 ribus 181. causa 224. cura 281  
 Intestini recti irritatio, causa Te-  
 nesmi 714. cura 748  
 Intestini recti vlcus, causa Facum  
 alui cum vrina & per vteri si-  
 num excretionis 716. cura 773  
 Intestinorum aggrauatio, causa  
 Deiectionum per aluum præter-  
 naturalium 715. cura 725  
 Intestinorū irritatio, causa Diar-  
 rhœa, Dysenteria & Deiectionis  
 cruenta 713. 714. cura 725  
 Intestinorum procidentia in En-

terocele vel Omphalocele, vel  
 Hernis aliis 485. causa 489.  
 cura 497  
 Intestinorum terrestreitas se affi-  
 gens, causa Calculorum qui il-  
 li latent vel deiciuntur 820.  
 cura 828  
 Intestinorum transitus obturatio,  
 causa Facum alui per vomitum  
 eiectionis 715. cura 773  
 Intestinorum vulnus, causa Fa-  
 cum alui per illud excretionis  
 715. cura 773  
 Ionchi, vide Vari.

L

**L**abij superioris diuisio ab orcu  
 Nasenscharten 9. cau-  
 sa 13. cura 47  
 Lachryma 594. causa 597.  
 cura 605  
 Lac redundans, causa Mamilla-  
 rum extuberantiæ & tumoris  
 206. cura 337  
 Lendes Rûß, vide Pediculos.  
 Lentigines 61. causa 80.  
 cura 151  
 Lepra Arabum, vide Elephan-  
 tiasis.  
 Leuca, vide Vitiligo.  
 Leucophlegmatia 166. causa  
 204. cura 240  
 Leucophlegmatia serosa 167.  
 causa 228. cura 240  
 Lienis durities & scyrrhus, pro-  
 minentiam in sinistro hypochon-  
 drio efficiens 187. causa 199.  
 cura 311  
 Lienteria 709. causa 717.  
 cura, vide in Curatione.  
 Ligula intestinorum 810. vide  
 Tanias.  
 Lingua connexus relaxatio à con-  
 tusione, causa illius prociden-  
 tia 497. cura 532  
 Lingue procidentia 487.  
 causa 497. cura 532  
 Lumbrici 785. causa 788.  
 cura 792  
 Lumbricus latus, vide Tanias.

## M

**M** Acilentia, vide Marcor.Macula erysipelatodes 61.  
causa 70. cura 146Macula lutea in Spasmo 64.  
vide Spasmm.Macula fusca lata 61. causam  
& curam in Lentigine.Macule febrium malignarū cau-  
sa 87. pestilentiarum, vene-  
natarum 64. cura 188Macule luis elephantice, Venereæ,  
Stomacacæ 64. causa 87.  
cura 158Macule originales *Annaler* 60.  
causa 67. cura 151Macule pulicares 61. cau-  
sa 71. cura 146

Macule sanguinea 62. causa 71

Malum mortuum, vide Vitiligo.

Mamillarum tumor ex lacte 182.  
causa 205. cura 338Mammarum moles 6. causa 19.  
cura 43Mamma molles, flaccidæ, pendu-  
la 8. causa 19. 21.  
cura 47Manus volarum squama, Pela-  
tella Gall. 10. causa in abra-  
sione cutis Tract. 2. cura 53Marasmus 437. causa 443.  
cura 449Marcor 434. causa 442.  
cura 448Medicamenta erodentia vel pu-  
trefaciētia adhibita, causa par-  
tium ablationis, & Pylorum 18.  
cura 44Medicamenta stimulantia, ero-  
dentia, venenata, sumpta indi-  
cāve, causa Diarrhœæ, Dysen-  
teriae, Tenesmi aliarumq; cruen-  
tarum deiectionum 716. 717.  
cura 725

Mele, vide Vitiligo.

Meliceris 189. causa 197.  
cura 313Mensium fluor immodicus 556.  
causa 564. cura 588

Mēstrua alba, vide Vterinus fluor.

Mictio ardens 666. causa 674.  
676. 677. cura 690. 695. 696Mictio cruenta 668. causa 678.  
cura 704. 706Mictio immoderata 665.  
causa 612. cura 685Mictio involuntaria 665. cau-  
sa 681. cura 682. 683. 684Mictio lactea 668. causa 676.  
cura 690Mictio mucosa 668. causa 679.  
cura 696Mictio praternaturalis 665.  
causa 670. cura 682Mictio purulenta 667. cau-  
sa 676. 679. cura 704Mictio rei externæ corpus subeun-  
tis 830. causa 831. cura 837Mictio turbulenta 667. causa  
679. cura 696Mola 809. causa 811.  
cura 812Morbus Arcuatus, Regius, vide  
Icterus.

Morphœa, vide Vitiligo.

Mucus seu pituita, causa genera-  
tionis Ascaridum & Vermium  
in naribus 789. cura 802Mucus subcruentus, causa Dysen-  
teriae mucosæ & Tenesmi 723.  
cura 725. 748Mucus vetriculi & intestinorum,  
causa Deiectionis per aluum  
mucosa 722. cura 773Murmura ventris 574.  
causa 537. cura 540

## N

**N** Aeni, Signa, Nota, vide Ma-  
culas originales.Nares petens aqueus humor à ce-  
rebro destuens, causa Stillicidi  
narium & coryza 599.  
cura 608Naribus accrescens terrestitas,  
causa calculi qui inde prodit  
819. cura 832Naribus attracta, causa vt rur-  
sum emungantur vel excutian-tur aut exspuantur, aut ex-  
screantur 831. cura 837Narium excretio rei externæ cor-  
pus subeuntis 830. causa 831.  
cura 837Narium exulceratio, causa Ex-  
spuitionis purulenta 629. cura  
in Narium vlcere Tract. 2.Narium hæmorrhagia 554.  
causa 560. cura 568Narium odor foedus vel teter, cau-  
sa inde progressæ Expirationis  
ferida 539. cura 540Narium pituita in pus conuersa,  
causa illius Exspuitionis 629.  
cura 639Narium pituita in pus conuersa,  
causa Purulentæ emunctionis &  
nonnunquam Lactea 588.  
cura 589Narium purulenta excretio 584.  
causa 586. cura 589Narium sanguis ad fauces dela-  
tus, causa Exspuitionis cruenta  
626. cura 631Narium sarcoma 178. vide Po-  
lypus.Narium sordes 774. causa ibid.  
cura 778Narium vermes 786. cau-  
sa 789. cura 804Narium vlcus, causa Purulenta  
inde excretionis 586. cura 590Neapolitanicus seu Gallicus mor-  
bus, vide Luem Veneream.Nigredo Aethiopum 59. causa  
67. cura 129Nigredo à Solis perussione 60.  
causa 88. cura 142Nigredo vulgò dicta, cutis fuscus  
color 59. causa 67.  
88. cura 129Nodi in ossibus callosi 193. cau-  
sa 204. cura 227Nodi iuxta articulos podagrico-  
rum 189. causa ib. cura 325Nodi Luis Venereæ & cephalæ  
290. causa ibid. cura 328

Nutrimenti defectus ob sanguine

- impeditum, causa Atrophie par-  
ticularis 441. cura 465.  
Nutrimenti defectus, quia san-  
guis non generatur vel inutilis  
est, causa Atrophie simplicis, vel  
illius quæ cum cachexia aut hy-  
drope copulata est. 440. cura 448.
- O
- Oculi atrophie vel tabes 438.  
Oculi connexus relaxatio à  
contusione, causa illius Prolap-  
sus 496. cura 533.  
Oculi glauci, castij, nigri 65.  
causa 67. cura 161.  
Oculi globi vesica 182. cau-  
sa 232. cura 282.  
Oculi membranarum siccitas, causa  
Macularum albarum in illis 88.  
cura 160.  
Oculi procidentia 487. causa  
496. cura 533.  
Oculi vlcus, causa Purulenta inde  
excretionis 586. cura 589.  
Oculis illapsa, causa vt inde rur-  
sum excernantur 831. cura 837.  
Oculis innata arenosa materia,  
causa illius inde excretionis vel  
tophuli innati 819. cura 828.  
Oculorum exanthemata & ech-  
tymata 65. causa 70. cura 158.  
Oculorum excretio rei externa  
corpus subeuntis 829. causa 831.  
cura 931.  
Oculorum flauities 65. causa,  
cura in Ictero.  
Oculorum humiditas in pus con-  
uersa, causa Purulenta emun-  
itionis, & nonnunquam lactea  
588. cura 589.  
Oculorum macula alba 65.  
causa 88. cura 169.  
Oculorum prominentia 122.  
causa 16. cura 55.  
Oculorum purulenta excretio 584.  
causa 586. cura 588.  
Oculorum rubedo 65. causa 68.  
cura in Ophthalmia.  
Oculorum sanguinea excretio 555.
- causa 564. cura 575.  
Oculorum sedem subiens aquosus  
humor à cerebro defluens, causa  
Lachrymarum 597. cura 604.  
Oculorum sordēs 775. causa 776.  
cura 777.  
Oculorum sugillatio 66. cau-  
sa 72. cura 160.  
Oedema 179. causa 205.  
cura 247.  
Oedema flatulentum, vide Physo-  
des tumor.  
Oedematosus tumor pedum, Ger-  
Desschenel 179. causa 205.  
cura 247.  
Oedematosus tumor brachiorum  
& manuum 179. causa 205.  
cura 247.  
Omenti procidentia in Epiplocele  
485. causa 490. cura 498.  
Omphalocèle, vide Cele.  
Ophiasis, vide Pilorum defectus.  
Orificiorum concretio 11. cau-  
sa 13. cura 54.  
Orificiorum nimia amplitudo 5.  
causa 13. cura 35.  
Orificiorum nimia angustia 7.  
causa 13. cura 46.  
Oris angulorum sordēs 725.  
causa 776. cura 777.  
Oris exulceratio, causa purulen-  
ta exspuitionis 629. cura in  
Oris vlcere. Tract. 2.  
Oris interiorum partium vulnus,  
causa Expuitionis cruenta 626.  
cura 631.  
Oris odor foedus vel teter, causa  
Anhelitus foetoris 539. cura 541.  
Oris salina copia, causa Ptyalismus  
625. cura 630.  
Os constrictum in spasmo 19.  
causa ibid. cura 54.  
Os subeuntes res extraneæ assu-  
pta, causa vt hac iterum deiciantur  
vel euomantur, nonnunquam  
& emingantur 831. cura 839.
- Palpebrarum inflatio, vide Phy-  
sodes tumorem, cura 281.  
Palpebrarum oedematosa intu-  
mescentia 181. causa 232.  
cura 250.  
Papilla absumpta 7. cau-  
sa 17. cura 45.  
Papillam penetrans res externa  
corpori illata 830. causa  
831. cura 837.  
Parotis indolens 186. causa 199.  
cura 307.  
Bubo indolens 186. causa 199.  
cura 306.  
Partes duplicata, triplicata 2.  
causa 13. cura 24.  
Partes mutilata 7. causa 16.  
cura 44.  
Partium coniunctio stabilis inde-  
cens 11. causa ibid. cura  
54. vide Spasium in 1. Tract.  
Partium corpus constituentium  
ablatio 474. causa 479.  
cura 484.  
Partium defectus 2. causa 13.  
17. 20. cura 24. mutilata-  
rum cura 44.  
Partium diuisio illic vbi vnita ef-  
se debebant 9. causa 13. 17.  
cura 48.  
Partium excretio 472. causa  
475. cura 479.  
Partium figura indecens 9.  
causa 13. 16. cura 47.  
Partium gracilitas 8. causa  
13. 16. 20. 21. cura 47.  
Partium immodica magnitudo  
5. causa 13. 16. 19. cura 35.  
Partium paruitas nimia 7.  
causa 13. 16. cura 44.  
Partium procidentia 485. cau-  
sa 487. cura 498.  
Partium quæ disita esse debebant  
concretio 11. causa 13. 21.  
cura 54.  
Partium situs peruersio 11.  
causa ibidem. cura 54.  
Partium vulnus, causa Hemor-  
rhagiarum 567. cura 576.

Pallor seu palliditas 59. cau-  
sa 69. cura 129.



|                                                           |                                    |                    |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Partium vulnus & vlcus, causa                             | Phlyctena flatulenta               | 180.               | Podicis musculorū reſolutio, cau- |            |
| Partium illarū ablationis 479.                            | causa 237.                         | cura 293           | ſa quo minus prolapsus retrahi    |            |
| cura 484                                                  | Phthiriasis, vide Pedicularis mor- |                    | queat 495.                        | cura 529   |
| Partus naturalis, non tamen ſine                          | bis.                               |                    | Podicis ſanguinea excretio pra-   |            |
| dolore 472.                                               | Phthiſis vel Phthoe                | 436.               | ternaturalis alia ab hamorrhoi-   |            |
| cura 479                                                  | causa 443.                         | cura 449           | dibus 558.                        | causa 565. |
| Partus præternaturalis, vide Ab-                          | Phymosis 7.                        | causa 13.          | cura 576                          |            |
| ortus.                                                    | cura 46                            |                    | Podicis ſeu Ani procidentia 486.  |            |
| Partum ſubſequens eruenta ex-                             | Phyſodes tumor                     | 180.               | causa 494. 495.                   | cura 529   |
| cretio 557.                                               | causa 237.                         | cura 292           | Polypus 178.                      | causa 196. |
| cura 558                                                  | Pili lanuginofi albi               | 7. 66.             | cura 318                          |            |
| Pedicularis morbus 787.                                   | causa 19.                          | cura 26. 161       | Porcorum lepra. Pſinnen           | 347        |
| causa 791.                                                | cura 805                           |                    | Pororum ſanguinea gutta 558       |            |
| Pediculi cui impaſti, Morpions                            | Pili intricati, Schrättelini & pff |                    | Pſydracia, vide Vari.             |            |
| Gall. Siſſglauß Germ. 788.                                | n. causa 13.                       | cura 54            | Pyraliſmus 622.                   | causa 625. |
| causa 791.                                                | cura 805                           |                    | cura 630                          |            |
| Pediculi in pilofis cutis ſedibus                         | Pili nimium criſpi                 | 9.                 | Pudendum mulieris carnoſitas 178. |            |
| 787.                                                      | causa 14.                          | cura 47            | causa 196.                        | cura 317   |
| cura 805                                                  | Pili ruſi, nigri, flau             | 66.                | Pulices, causa eorum qua ſe ex-   |            |
| Pedum digitorum interſtitiorum                            | causa 67.                          | cura 161. 162. 164 | trinſecus corpori affigunt 836.   |            |
| ſordes 775.                                               | cura 26                            |                    | cura 838                          |            |
| causa 776.                                                | Pilorum defectus                   | 3.                 | Pulmonibus innata terreſtreitas,  |            |
| cura 778                                                  | causa 17. 18. 19. 22. 23.          |                    | causa Calculorū qui exſcrean-     |            |
| Pedum intumefcentia 180.                                  | cura 26                            |                    | tur 820.                          | cura 828   |
| causa 230.                                                | Pilorum excreſcentia nimia         | 5.                 | Pulmonum exulceratio, causa       |            |
| cura 278                                                  | causa 19.                          | cura 36            | Exſpuitioſis purulenta 628.       |            |
| Pedum intumefcentia in tibia-                             | Pilorum fiſſura                    | 10.                | cura in Phthiſi.                  |            |
| rum ſede 180.                                             | causa 23.                          | cura 52            | Pulmonum exulceratio, causa       |            |
| cura 278                                                  | Pilorum ſiccitas, causa Canitiei   | 89.                | Phthiſis 436.                     | cura 449   |
| Peliomata, vide Sugillata.                                | cura 162                           |                    | Pulmonum pituita ad fauces p-     |            |
| Penis exulceratio interna, causa                          | Pinguedinis in ſanguine abun-      |                    | pulſa, causa Exſpuitioſis pitui-  |            |
| Purulenta e pene excretionis 587.                         | dantia, deficientiæve, causa Pin-  |                    | toſe 621.                         | cura 629   |
| cura 590                                                  | guiorum, Macilentorū & cor-        |                    | Pulmonū pituita e deſluxa vel     |            |
| Penis ſanguinea excretio 556.                             | porum aut Partium                  | 21.                | illic congeſta, causa Exſpuitio-  |            |
| causa 564.                                                | cura 41                            |                    | nis purulenta 629.                | cura 639   |
| cura 575                                                  | Pituita, causa Diarrhœa, Deie-     |                    | Pulmonum ſanguis in pus cōuer-    |            |
| Peritonæi proceſſus dilatatio, cau-                       | ctionis per alium pituitoſa &      |                    | ſus, causa Exſpuitioſis purulen-  |            |
| ſa Enterocœles & Epiploceles                              | Teneſimi circa exulcerationem,     |                    | ta 629.                           | cura 639   |
| 489.                                                      | Fluxusq; Cerebralis                | 720.               | Pulmonum ſanguis in pus cōuer-    |            |
| cura 498                                                  | cura 753                           |                    | ſus, causa Vomica exſpuitioſis    |            |
| Peritonæi dilatatio iuxta vmbi-                           | Pneumatocœle                       | 181.               | 629.                              | cura 639   |
| licum, causa Omphalocœles 490                             | causa & cura 289                   |                    | Pulmonum ſanguis in pus cōuer-    |            |
| cura 498                                                  | Podici inieſta clyſmata, vel in    |                    | ſus, causa Vomica exſpuitioſis    |            |
| Peritonæi ruptura in abdomine,                            | cura irrepentia, causa harum       |                    | 629.                              | cura 639   |
| causa Omphalocœles vel Herniarum aliarum illius loci 488. | euomitionum vel reiectionum        |                    | Pulmonum ſubſtantia corrupta      |            |
| cura 498                                                  | 836.                               | cura 838           | causa Exſpuitioſis pulmonum       |            |
| Peritonæi proceſſus ruptura in                            | Podicis & recti inteſtini inuerſio |                    | portionum 629.                    | cura 639   |
| inguine, causa Enterocœles & E-                           | a conatibus magnis, causa illius   |                    | Pulmonum venarum reſeratio,       |            |
| piploceles 487.                                           | Procidentia 494.                   | cura 529           | ruptura vel exeſio, causa Ex-     |            |
| Petechia Ital. vide Maculas fe-                           | Podicis musculorum imbecillitas,   |                    | ſpuitioſis cruenta & Hæmo-        |            |
| brum malignarum.                                          | causa quod minus prolapsus re-     |                    | ptoica paſſionis 626.             |            |
| Phlyctena 182.                                            | duci queat 495.                    | cura 529           | cura 631                          |            |
| cura 281                                                  |                                    |                    |                                   |            |

**Purulenta excretio** 584.  
*causa* 586. *cura* 588  
**Purulenta excretio per aperturas in corpore factas** 586. *causa* 585. *cura* 593  
**Pus, causa Deiectionis per aluum purulenta** 723. *cura* 773  
**Pus, causa generationis vermium in vlceribus Narium, Aurium reliquorumq;, vti & Pulmonum** 990. *cura* 803.804  
**Pus in pectore coacervatum, causa Exspuitionis purulenta & Empyematis** 444. *cura* 450

Q

**Qualitas exitialis vel humor vitiosus, causa Vnguium e-rosionis aut scabrities, alterius-ve labis** 23. *cura* 51  
**Qualitas seu intemperies venenata, causa Elephantiasis** 358. *cura* 364  
**Qualitas maligna, causa Stomacacis luis** 264. *cura* 431  
**Qualitas maligna, causa Venerea luis** 364. *cura* 380

R

**Ranex, vide Cele.**  
**Rana sub lingua citra infla-  
 mationem** 188. *causa* 197. *cura* 313  
**Renum calida intemperies, causa Mictionis frequentioris** 672. *cura* 684  
**Renum calidior constitutio, causa Mictionis frequentioris** 671. *cura* 684  
**Renum & Vesica constitutio quaedam, causa Mictionis inuoluntaria & intempestiua** 670. *cura* 684  
**Renum & Vesica frigida intem-  
 peries, causa Mictionis frequen-  
 tioris** 671. *cura* 684  
**Renum & Vesica imbecillitas, cau-  
 sa Mictionis frequentioris** 671. *cura* 684  
**Renum & Vesica irritatio, causa**

**Mictionis praternaturalis** 672. *cura* 684  
**Renum & Vesica soluta conti-  
 nuitas, causa Mictionis cruenta** 677. *cura* 704.706  
**Renum exulceratio, causa Puru-  
 lente mictionis** 679. *cura* 696  
**Renum humiditas suppurata, causa Mictionis Purulenta** 681. *cura* 704  
**Renum terrestreitas, causa calcu-  
 li & arenularum quae mingen-  
 do redduntur** 819. *cura* in calculo renum.  
**Renum vasorum anastomasis vel  
 diapedesis, causa Mictionis cru-  
 enta** 680. *cura* 704  
**Renum vasorum laxitas, causa Mictionis cruenta** 681. *cura* 704  
**Rerum externarum corpus sub-  
 euntium excretio** 830. *causa* 831. *cura* 837  
**Rhyas 3. causa 23. cura in  
 Oculi vlceribus Tract. 2.**  
**Rubedo 59. causa 68.87. cura** 129  
**Ructus seu crepitus oris** 574. *causa* 536. *cura* 540  
**Rugitus ventris** 574. *causa* 537. *cura* 540  
**Ruptura, vide Cele.**

S

**Sabulum mictione redditum** 817. *causa* 819. *cura* 821.  
**Salina, causa sordium in Denti-  
 bus** 777. *cura* 779  
**Sanguinea excretio per aperturas  
 aut vulnera in corpore** 558. *causa* 576. *cura* 576  
**Sanguinea excretio praternatu-  
 ralis** 555. *causa* 560. *cura* 568  
**Sanguinis copia, causa Carnosi-  
 tatis** 19. *cura* 41  
**Sanguinis defectus in superficie  
 corporis, causa Palloris** 69. *cura* 129  
**Sanguinis penuria, causa Gracili-  
 tatis** 19. *cura* 47

**Sanguis ex arteriis sub cutem ef-  
 fusus, causa Aneurismatis** 209. *cura* 343  
**Sanguis in cutis pororum ambi-  
 tum se diffundens, causa Macu-  
 larum rubrarum paruarum, vti  
 & Pulicarum & Sanguinea-  
 rum** 71. *cura* 146  
**Sanguis in superficiem corporis  
 delatus, causa Rubedinis** 68. *cura* 143  
**Sanguis in venis vteri, causa Tu-  
 moris ventris, ac si grauida esset  
 mulier, circa conceptum appa-  
 rentis, causa** 208. *cura* 340  
**Sanguis in veram cutem effusus,  
 causa Erysipelatum atq; Exan-  
 thematum, Ectymatum, Macu-  
 larum sanguinearum, Guttatq;  
 rosacea, atq; impetiginis illius  
 quam Zittermahl vocant** 70. *cura* 146.158  
**Sanguis maternus, causa quorun-  
 dam vitiorum abortu, in Ma-  
 gnitudine aucta vel imminuta,  
 vel Figura indecenti, acciden-  
 tium** 15. *cura* 24  
**Sanguis sub cuticulam & mem-  
 branam oculi erumpens, causa  
 Sugillationum in illis sedibus,  
 Punctorumq; quorundam san-  
 guineorum** 71.72. *cura* 144  
**Sanguis venas replens & dilatas,  
 causa Varicum** 206. *cura* 341  
**Sarcocele, Carnosifl** 169. *causa* 196. *cura* 316  
**Sarcoma vel Sarcitis** 186. *causa* 193.196. *cura* 312  
**Scirrhus** 186. *causa* 195. *cura* 309  
**Scorbutus** 355. *causa* 363. *cura* 431  
**Scrophula, Escruelles Gall.** 184. *causa* 194. *cura* 294  
**Scroti dissectio, causa Testium p-  
 cidentia** 497. *cura* 532  
**Scroti inflatio** 181. *causa & cura* 290  
**Seri copia, causa Mictionis imma-  
 derate**

- derata & Diabetis* 672. cura 686
- Seri ex aperituris in corpore factis effluxus* 595. causa 604. cura 621
- Seri in thoracis cavitate collectio in Hydrope ascite* 224. cura in Ascite.
- Seri in umbilico collectio, causa Hydromphali* 232. cura 281
- Seri per vterum effluxus in Hydrope ascite* 225. cura in ascite.
- Seri sub cute capitis collectio, causa Hydrocephali* 231. cura 281
- Serum sub cuticulam seu membranam adnatam oculi profusio, causa Phluctenarum & Hydroarum* 232. cura 281
- Serum, causa Dyarrhoea* 721. cura 753
- Serum cruentum, causa Hepatici fluxus* 721. cura 767
- Serum in abdominis cavitatem effusum, causa Ascitis hydropis* 212. cura 251
- Serum in inferiorem corporis habitus sedem dispersum, causa Tumoris pedum in Hydrope ascite* 225. cura 278
- Serum in inguinum spatium se ingerens, causa Aquosi illic tumoris in mulieribus* 223. cura 281
- Serum in nudam tibiaram sedem diffusum, causa particularis cuiusdam intumescencia illic genita* 231. cura 278
- Serum in pedes extra hydropem ascitem se insinuans, causa Intumescencia illic genitarum* 230. cura 278
- Serum in scroti cavitatem instillatum, causa Hydroceles* 222. cura 279
- Serum in totius corporis habitum se ingerens, causa Leucophlegmatia serosa* 228. cura 341
- Seru palpebras irrigans, causa ipsarum Intumescencia* 232. cura
- Semen corruptum, causa Mictionis ardentis in Gonorrhoea virulenta* 677. cura 783
- Semen imperfectum, causa Ventriculi tumoris in Mola* 194. cura 344
- Semen loco motum, causa Mictionis ardentis* 676. cura 690
- Semen parentum, causa Discolorationum & Macularum quarundam in Cute, Oculis & Pilis, originalium* 67. cura 129. 151
- Semen parentum causa Sarcomatum, Tuberculorum, Strumarum, Scrophularum, Verrucarum, hereditarium* 194. cura 443
- Seminis cita nimis profusio* 547. causa 548. cura 554
- Seminis in convulsione excretio* 547. causa 550. cura 554
- Seminis imperfecti aut subcruti excretio* 546. causa 549. cura 550
- Seminis imperfecti conceptio, causa Mola* 811. cura 812
- Seminis parentum indispositio, vel vbertas, aut penuria, vel commistio, aliave permutatio, causa vitiorum ab ortu in Numero, Magnitudine & Figura in corpore vel membris, vti & dentibus, vnguibus & pilis coningentium* 13. cura 24
- Seminis per foramen alienum effusio* 547. causa & cura in Conceptus defectu Tract. 1.
- Senium ex morbo* 435. causa 442. cura 448
- Sordes causa coloris obsoleti in cute, & nigri sub vnguibus, Dentiumque, flauitici & nigredinis* 87. cura 144. 161
- Sordes causa eorum quae se extrinsecus corpori affigunt* 836. cura 838
- Sordes cutis, causa generationis Pediculorum* 791. cura 805
- Sordida excretio* 774. causa 775. cura 777
- Spermatice excretio praternaturalis* 548. causa 552. cura 659
- Spiritus animalis vel vitalis defectus aut privatio, causa Mictionis inuoluntaria* 661. cura 682
- Spiritus & status è vulnere eruptio, causa Efflationis inde naturalis* 537. cura 545
- Spiritus exspiratio inconueniens, causa Efflationis praternaturalis* 537. cura 540
- Spiritus in naves impellens, causa stercoreis* 536. cura 540
- Spiritus infectio ab assumptorum alieno odore profecta, causa Anhelitus tetri vel foetidi* 537. cura 541
- Steatoma* 188. causa 197. cura 313
- Stertor narium* 533. causa 537. cura 540
- Stigmata, vide Sugillata.*
- Stillicidium narium* 594. causa 599. cura 611
- Stillicidium vrinae, vide Mictio ardens.*
- Stomacace, vide Scorbutus.*
- Stranguria, vide Mictio ardens.*
- Struma* 185. causa 194. cura 305
- Succi nutrientis redundantia vel penuria, causa vt Parres aliqua plus iusto excrescat, decrescatque, vti & Vngues & Pili crassescant atque elongentur vel subsistant aut attenuentur, vel etiam defluant* 19. 37. 26. cura 41. 47
- Succus nutriens corpus crudus, causa Leucophlegmatia* 204. cura 240
- Succus nutriens crassior, causa Duritiei & Scirrhi hepatis, lienis & vteri* 199. cura 311
- Succus nutriens crassior, causa Parotidum & Bubonum indolentium & Strumarum, Scrophularumque* 198. cura 306. 307

**Succus nutriendi crassior, causa**  
*Scirrhi, Atheromatium, Streato-*  
*matum, Meliceridum* 797. *cu-*  
*ra* 309. 313  
**Succus nutriendi crudus simpliciter**  
*vel simul serosus, causa Oede-*  
*matum & Tumorum oedemato-*  
*forū diuersorum* 205. *cura* 247  
**Succus nutriendi cutem, causa Ci-**  
*catricis* 201. *cura* 330  
**Succus nutriendi cuticulam luxu-**  
*rians, causa Callosa cutis* 201.  
*cura* 329  
**Succus nutriendi è carne exsudans,**  
*causa Sarcomatum diuersorum*  
*vtri & Carnis luxuriantis, Poly-*  
*pi, Epulidii, Gingiuarum excre-*  
*scientia, Encanthidis, Sarcocoles*  
*196. cura* 314. 316. 317. 320. 321.  
 322  
**Succus nutriendi exsudans, causa**  
*Concretionis parii* 21. *cura* 54  
**Succus nutriendi in cutis poros il-**  
*latus, causa Verrucarū & Cla-*  
*uorum* 202. *cura* 113  
**Succus nutriendi in poros cutis se-**  
*insinuans, causa Vari* 203. *cu-*  
*ra* 336  
**Succus nutriendi membraneas se-**  
*des, causa Ganglii* 201. *cura* 322  
**Succus nutriendi ossa, causa Nodo-**  
*rum & Callorum in illis* 204.  
*cura* 327  
**Succus nutriendi pilos, in poros di-**  
*ffusus, causa Lentiginis, & si*  
*vitiosus sit Vitiliginis* 80 81.  
*cura* 151  
**Succus nutriendi vngues redundans**  
*vel crassior, causa Vnguium ex-*  
*tuberantia callosa* 204. *cura* 329  
**Succus nutriendi vniuersum cor-**  
*pus crudus, causa Cachexia, pra-*  
*uus Cacoehymia* 72. *cura*  
 90  
**Sudor, causa Sordium in cute &**  
*pedibus* 776. *cura* 778  
**Sudor praternaturalis** 596. *cau-*  
*sa* 702. *cura* 618  
**Sugillata** 63. *causa* 71  
*cura* 144

**Superfoetatio** 473. *vide Ab-*  
*ortum*  
**Superpurgatio, vide Dyarrhoeam.**  
**Suppuratio, vide Empyema.**

T

**T** **Abes, vide Marcor.**  
**Tania intestinorum** 810.  
*causa* 811. *cura* 814  
**Talpa tumor in capite** 188.  
*causa* 197. *cura* 313  
**Temperamenti insiti in calidius**  
*& ficius peruersio in febre he-*  
*ctica & colliquante, causa Ma-*  
*rasmi & Colliquationis corpo-*  
*ris* 443. *cura* 449  
**Temperamenti insiti in calidius**  
*& ficius peruersio in febre he-*  
*ctica comitata, causa Phthisis*  
*443. cura* 449  
**Tenesmus** 711. *causa* 714. 717.  
 718. 719. *cura* 745  
**Terrestrium excretio** 817. *causa*  
 819. *cura* 821  
**Testis durities vel scirrhus** 186.  
*causa* 198. *cura* 308  
**Testium procidentia** 487. *cau-*  
*sa* 497. *cura* 532  
**Testudo tumor in capite** 15. *cau-*  
*sa* 21. *cura* 35  
**Thoracis pus, causa Expuitionis**  
*purulenta* 629. *cura in*  
*Empyemate.*  
**Thymium, vide Verruca.**  
**Tophi dentium, causa Gingiuarū**  
*separationis ab illis* 22. *cura*  
 49  
**Tophus vide Calculus.**  
**Triorches** 2. *causa* 13.  
*cura* 24  
**Tympanites intestinalis** 169.  
*causa* 236. *cura* 282  
**Tumorū terrestritas, causa cal-**  
*culorum sub lingua, conillarum*  
*& in nodis podagricorum* 820.  
*cura* 828  
**Tympanites cum ascyte copula-**  
*tus* 169. *causa* 232.  
*cura* 283  
**Tympanites simplex** 169. *causa*  
 232. *cura* 285

**V** **Ari** 192. *causa* 203.  
*cura* 336  
**Variolarum fouea relicta in facie**  
 191. *causa ibid. cura* 323  
**Varix, Krampffader** 182. *cau-*  
*sa* 206. *cura* 341  
**Vasorum foetus cum vteri vasis**  
*connexus separatio foetu adhuc*  
*immature, causa Partus pre-*  
*ternaturalis* 475. *cura* 489  
**Vasorum foetus cum vteri vasis**  
*connexus separatio ab irrita-*  
*tione natura profecta, causa Ab-*  
*ortus* 476. *cura* 480  
**Vasorum foetus cum vteri vasis**  
*connexus separatio ob foetum*  
*emortuum facta, causa Abortus*  
*477. cura* 48-  
**Vasorum foetus cum vteri vasis**  
*connexus separatio ob foetus ma-*  
*turitatem, causa Partus natu-*  
*ralis* 474. *cura* 480  
**Vasorum foetus cum vteri vasis**  
*connexus separatio ob motum*  
*corporis vel animi, causa Abort-*  
*us* 475. *cura* 480  
**Vasorum spermaticorum concus-**  
*sio, causa seminis profusionis in*  
*conuulsione* 550. *cura* 554  
**Vasorum spermaticorum imbe-**  
*cillitas, causa Gonorrhoea* 548.  
*cura* 550  
**Vasorum spermaticorum irrita-**  
*tio, causa Veneris nimia, citaq;*  
*nimum, Gonorrhoea & Gonor-*  
*rhoea virulenta* 547. *cura* 554  
**Vasorum spermaticorum osculorū**  
*apertio, causa seminis imperfe-*  
*cti aut subruenti excretionis*  
*549. cura* 559  
**Venarum osculorū apertio seu a-**  
*nastomosis in Auribus, Naribus,*  
*Vteri cervice, Recto intestina,*  
*Cute, causa Sanguinearū excre-*  
*tionum ex illis* 560. *cura* 568  
**Venarum soluta continuitas in O-**  
*culis, Auribus, Naribus, Virga vi-*  
*ribi, Vteri cervice, Recto intesti-*  
*no & Podice, causa Sanguinea-*  
*rum*



# I N D E X.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rum excretionum ex illis locis<br>564. cura 575                                                                                                                | humoribus, causa Vomitus pi-<br>tuitosi & praternaturalis 647.<br>cura 650                                                                                 | Mictionis inuoluntaria 678.<br>cura 682                                                                                                                |
| Vena osculi apertio spontanea,<br>causa illius Sanguinis effluxus<br>566. cura 576                                                                             | Ventris extumescencia citra con-<br>ceptum in foeminis 175.<br>causa 184. cura 340                                                                         | Vesica vlcus, causa Mictionis pu-<br>rulentæ, mucosa & ardentis 679.<br>cura 696                                                                       |
| Vena sectio seu Phlebotomia, cau-<br>sa illius Sanguinis effluxus 566.<br>cura 576                                                                             | Venula nuda in cute 192.<br>causa 307. cura 343                                                                                                            | Vesica vulnus, causa vrinae per vul-<br>nus effluxus 678. cura 713                                                                                     |
| Venera lues 351. causa 363.<br>cura 380                                                                                                                        | Venus nimia 546. causa 547                                                                                                                                 | Vibices, vide Sugillata.                                                                                                                               |
| Ventris excrescentia in grauida<br>muliere seu pregnantæ 170.<br>causa ibid. cura 343                                                                          | Vermes corpori inclusi manentes<br>786. causa, cura in aliis pro-<br>deuntibus affectibus.                                                                 | Viscerum interiorum abscessus, cau-<br>sa Mictionis purulenta 681.<br>cura 704                                                                         |
| Ventris seu abdominis tumores<br>scirrhusi vel glandulosi 186.<br>causa 199. cura 309                                                                          | Vermes è naribus emergentes 786.<br>vide Lumbricos.                                                                                                        | Viscerum inferiorum morbi, cau-<br>sa Mictionis vrinae tincta & p-<br>mista 682. cura in Morbis in<br>quibus vrina talis redditur.                     |
| Ventris tumor à Mola 174. cau-<br>sa 194. cura 343                                                                                                             | Vermes ex ore prodeuntes 785.<br>vide Lumbricos.                                                                                                           | Vis illata partibus, causa: Dæti-<br>um carentia, mobilitatis aut con-<br>tractionis, Pilorum casus & O-<br>culorum prominentia 17.<br>cura 24. 25. 56 |
| Ventriculi atq; intestinorum ex-<br>crementorum odor teter vel fœ-<br>tidus, causa Anhelitus, Ructus,<br>Crepitus graueolentis vel fœ-<br>tentis 538. cura 541 | Vermes per vulnus abdominis e-<br>mergentes 786. vide Lumbricos.                                                                                           | Vitiligo 62. causa 81.<br>cura 151                                                                                                                     |
| Ventriculi aggrauatio, causa De-<br>iectionum per alium praternat-<br>uralium 715. cura 725                                                                    | Vermes tussi reiecti 786.<br>causa 798. cura 804                                                                                                           | Vitiligo externa & interna, cau-<br>sa Purulenta excretionis per a-<br>perturas è corpore factas 587.<br>cura 593                                      |
| Ventriculi humiditas ad os per-<br>ueniens, causa Exspuitionis pi-<br>tuitosa & Ptyalismis 625.<br>cura 630                                                    | Vermes per vulnus abdominis e-<br>mergentes 786. causa 790.<br>cura 804                                                                                    | Vlcerà praua, causa Partium ab-<br>lationis 22. cura 44                                                                                                |
| Ventriculi imbecillitas, irritatio,<br>vlcus, cicatrix, causa Lientia<br>717. cura 763. 764                                                                    | Vermiculi capillos rodentes 787.<br>vide Pediculos.                                                                                                        | Vmbilici eminentia 191. causa<br>201. cura in Callo cutaneo.                                                                                           |
| Ventriculi irritatio à Bile, causa<br>vomitionis biliosa & Cholera<br>morbi 646. cura 654                                                                      | Vermiculi mictione redditæ 786.<br>causa 790. cura 804                                                                                                     | Vmbilici fouea permanens 191.<br>causa ibid. cura 332                                                                                                  |
| Ventriculi irritatio, causa Deie-<br>ctionum per alium praternat-<br>uralium 713. cura 725                                                                     | Vermis cucurbitinus, vide Tænia.                                                                                                                           | Vmbilici vermis 786. causa 790.<br>cura 804                                                                                                            |
| Ventriculi conturbatio, aggraua-<br>tio aut irritatio à vi externa<br>vel ab assumptis, causa Vomitio-<br>num praternaturalium 645.<br>cura 649                | Vermis sub corde 787. causa<br>ibid. cura 805                                                                                                              | Vomica excreatio 624.<br>causa 629. cura 639                                                                                                           |
| Ventriculi repletio à sanguine ve-<br>narum meseraicarum, causa san-<br>guineæ vomitionis 688.<br>cura 662                                                     | Verruca pensilis & sessilis 191.<br>causa 202. cura 332                                                                                                    | Vomitio sanguinea 643.<br>causa 648. cura 656                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                | Vesica ceruicis exulceratio causa:<br>Purulenta excretionis & mu-<br>cosa, etiam citra mictionem<br>587. cura 593                                          | Vomitio stercorosa 644.<br>causa 716. cura 773                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                | Vesica ceruicis vlcus, causa Mi-<br>ctionis stercoris & osculorum<br>& mensium 680. cura 696                                                               | Vomitus biliosus 642.<br>causa 646. cura 654                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                | Vesica illapsus, calculus renum, v-<br>ti & arenula, causa illius qui<br>mictione redditur vel exseca-<br>tur, aut ab alio vulnere prodi-<br>819. cura 821 | Vomitus pituitosus 642.<br>causa 647. cura 650                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                | Vesica sphincteris resolutio, causa:<br>Mictionis inuoluntaria 678.<br>cura 682                                                                            | Vomitus praternaturalis 640.<br>causa 644. cura 649                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                | Vesica sphincteris vulnus, causa                                                                                                                           | Vomitus rei externæ corpus sub-<br>euntis 830. causa 831.<br>838                                                                                       |

# I N D E X.

|                                                                     |                           |                                                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vagues inequales</i> 9.                                          | causa 19.                 | <i>Vrina ardor, vide Mictio ardens.</i>                                                                               | <i>Vteri procidentia seu exitus</i> 485.                                                               |
| 23.                                                                 | cura 36. 51               | <i>Vrina copia, causa Mictionis copiose</i> 672.                                                                      | causa 491. 492.                                                                                        |
| <i>Vnguium breuitas</i> 7.                                          | causa 19.                 | cura 685                                                                                                              | cura 520                                                                                               |
| cura                                                                | 47                        | <i>Vrina incontinentia eorum qui lectum commingunt</i> 665.                                                           | <i>Vteri scirrhus, tumorem in ima ventris sede procreans</i> 187.                                      |
| <i>Vnguium casus</i> 3.                                             | causa 24.                 | causa 670.                                                                                                            | causa 199.                                                                                             |
| cura                                                                | 27                        | cura 683                                                                                                              | cura 311                                                                                               |
| <i>Vnguium discoloratio, macula alba</i> 66.                        | causa 88.                 | <i>Vrina per vulnus effluxus</i> 669.                                                                                 | <i>Vteri sinus angustia</i> 6.                                                                         |
| cura 161                                                            |                           | causa, cura 706                                                                                                       | causa 13.                                                                                              |
| <i>Vnguium erosio, scabrities, fissura, diuisio</i> 9.              | causa 25.                 | <i>Vrinarij meatus per penem, aut collum vesicae in foeminis, purulenta &amp; mucosa citra mictione excretio</i> 585. | cura 46                                                                                                |
| cura 51                                                             |                           | causa 587.                                                                                                            | cura 830.                                                                                              |
| <i>Vnguium extuberantia callosa</i> 290.                            | causa 203.                | cura 589                                                                                                              | causa 836.                                                                                             |
| cura 329                                                            |                           | <i>Vrinarij meatus sanguinea excretio</i> 556.                                                                        | cura 838                                                                                               |
| <i>Vnguium mobilitas</i> 13.                                        | causa eadem quae & casus, | causa 564.                                                                                                            | cura 836.                                                                                              |
| cura 56                                                             |                           | cura 575                                                                                                              | <i>Vteri sinum irrepentia, causa vt inde denuo prodeant</i> 836.                                       |
| <i>Vnguium nimia auctio</i> 5.                                      | causa 19.                 | <i>Vterinus seu muliebris fluor</i> 595.                                                                              | cura 838                                                                                               |
| cura 36                                                             |                           | causa 600.                                                                                                            | <i>Vteri sinus fluxus sanguineus alius a menstruo, in senescentibus iam mulieribus</i> 556.            |
| <i>Vnguium siccitas, causa Macularum albarum in illis</i> 88.       | cura 161                  | cura 608.                                                                                                             | causa 576.                                                                                             |
| <i>Vnguium sordes</i> 830.                                          | causa 836.                | <i>Vteri cervicis influens humor aquosus e venis illic promanans, causa Vterini fluoris</i> 600.                      | cura 576                                                                                               |
| cura 839                                                            |                           | cura 608                                                                                                              | <i>Vteri sinus Purulenta excretio</i> 586.                                                             |
| <i>Vrina stercore, osiculis, mensibus permista, reddita</i> 669.    | causa 679.                | <i>Vteri cervicis conexus dissolutio, causa vteri procidentiae</i> 491.                                               | causa 587.                                                                                             |
| cura 696                                                            |                           | cura 520                                                                                                              | cura 593                                                                                               |
| <i>Vrina tincta praeternaturalis vel permista</i> 669.              | causa 678.                | <i>Vteri cervicis connexus dissolutio per vim aliquam facta, causa Vteri procidentiae</i> 492.                        | <i>Vteri sinus sanguinea excretio in deurginatione &amp; congressu, aliave vi</i> 576.                 |
| cura in morbis in quibus vrina sic mutatur.                         |                           | cura 520                                                                                                              | causa 568.                                                                                             |
| <i>Vrina acrimonia, causa Mictionis ardentis &amp; cruenta</i> 674. | cura 690                  | <i>Vteri cervicis exulceratio, causa Purulenta inde facta excretionis</i> 587.                                        | cura 558                                                                                               |
|                                                                     |                           | cura 593                                                                                                              | <i>Vteri sinus sordes</i> 775.                                                                         |
|                                                                     |                           | <i>Vteri descensus</i> 486.                                                                                           | causa 776.                                                                                             |
|                                                                     |                           | <i>vide Vteri procidentia.</i>                                                                                        | cura 779                                                                                               |
|                                                                     |                           |                                                                                                                       | <i>Vteri terrestreitas, causa Fetus lapidescentis</i> 820.                                             |
|                                                                     |                           |                                                                                                                       | cura 828                                                                                               |
|                                                                     |                           |                                                                                                                       | <i>Vulnus aut vlcus, causa Partium mutilationis aut ablationis aut separationis vel diuisionis</i> 16. |
|                                                                     |                           |                                                                                                                       | cura 44. 45                                                                                            |



# INDEX Remediorum quorundam.

Remedia, quorum innumera, nō solum prius vsitata (ex quibus pleraq; correctiora proponuntur) sed etiam noua & rara (inter quæ & chymica) multa hinc inde variis formis præscripta inueniuntur, Indici inferere nolimus; cū ea ex affectibus, quibus in curatione accommodantur, facile peti atq; illic reperiri possint. Diligentem enim Lectorem, non talem qui obiter saltem hæc mea scripta inspiciat, & neglectis aliis, remedia tantum excerp-  
pat, requirimus. Vt tamen vbi remedia quædam expressè copiosè proponuntur, pateat, hæc pauca huic Indici subiungere voluimus, sicuti etiam in primo tractatu operis nostri similiter quorundam meminimus.

|                                           |       |                                                   |       |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>C</b> omptoria aut parata remedia      | 130   | Pilos nigros corrigentia remedia                  | 164   |
| Cosmetica arte parata remedia             | ibid. | Pilos rectos crispas reddentia                    | 165   |
| Manus nitidas, albas & molles reddentia   | 139   | Pilos rufos efficientia remedia                   | ibid. |
| Oculos denigrantia remedia                | 161   | Psyllora pilos auferentia remedia                 | 37    |
| Fuci                                      | 47    | Restaurantia substantiam corporis in phisicis re- |       |
| Pilos odorem gratum conciliantia remedia  | 166   | media                                             | 458   |
| Pilos canos seu albos denigrantia remedia | 162   | Ruborem genis & labii conciliantia remedia        | 141   |
| Pilos flauos reddentia remedia            | 164   | Rugas minuentia vel extirpantia remedia           | 140.  |

## ERRATA.

Quæ toto in hoc genere Practico, dum excudebatur, inter corrigendum & reuiscendum, tum ob festinationem, qua interdum opus erat, tum mentis distractionem, vrgentium negotiorum causa, tum visus aliquam hebetudinem, cōmissa fuerunt, cū tanti momenti non sint, & quilibet diligenti lectione, sensum eorum quæ scribuntur, percipiens, ea sponte emendare possit, hîc annotare superfluum esse duximus.

## ELIXIRS.

FELICIS PLATERI  
quondam  
ARCHIATRI ET  
PROFESS. BASIL.  
ORDINAR.  
*QVÆSTIONVM MEDICARVM*  
*Paradoxarum & Endoxarum,*  
Iuxta partes Medicinæ dispositarum,  
CENTVRIA POSTHVMA:

*Operâ*  
THOMÆ PLATERI D. FEL. FR.  
Anatomic. & Botanic. Acad. Basil.  
Profess. Ordin.


*Nunc primum edita.*



BASILEÆ, IMPENSIS LVDOV. REGIS.  
TYPIS IOANNIS SCHROETERI.

MDCXXV.





MAGNIFICIS, NOBILISSI-  
MIS, AMPLISSIMIS, PRVDEN-  
tissimisq; Dominis Consulibus, Tribunis ple-  
bis, atque Senatoribus, inclytæ ci-  
uitatis Basileensis,

*Dominis meis summè honorandis,*

*S. P. D.*



VM FELICIS PLATERI, fratris mei, piæ me-  
morix, Praxis Medica, Tomis tribus com-  
prehensa, ante annos aliquot publici iuris fa-  
cta, ob exemplarium penuriam, denuò typis  
mandanda esset, haud contemnendi nominis  
viri, & eruditi Medicinæ studiosi, crebrò me  
instanter rogarunt, vt quæstiones Iatricas, multa paradoxa  
& endoxa continentes, quas idem olim in actibus publicis  
& priuatis, discursando tractauit, editioni nouæ adiungerem.  
His petitionibus morem gerens, sub Magnif. & Ampl. no-  
minis vestri patrocínio, illas in lucem prodire, æquum esse  
censui. Quum enim prædictus frater meus, piæ recordatio-  
nis, in vestra Academia, annos quinquaginta septem Medici-  
næ Doctoris, quadraginta tres, eiusdem facultatis Professo-  
ris & Archiatri munere sit functus, totoque hoc tempore,  
magna cum auditorum nostratium & externorum accla-  
matione & applausu, quæstiones illas tractarit, hunc factum

eius posthumum, in vrbe vestra conceptum & natum, vobis  
 iure deberi, mihi visum est. Accipite igitur quæso, Viri Ma-  
 gnifici & Amplissimi, Patres Patriæ, submissè mihi colendi  
 & honorandi, à ciue vestro, ad omnia officia paratissimo,  
 quod vobis offert munusculum litterarium, sparsim hinc  
 inde ex lucubrationibus fratris excerptum, & à me in Syllö-  
 gen centum quæstionum redactum, atque hoc ordine iuxta  
 partes Medicinæ digestum, & sub nomine vestro Amplissi-  
 mo, lucem aspecturum, ab inuidorum morsibus defendite.  
 Id vos facturos confido, tum ob singularem fauorem & hu-  
 manitatis officia, quibus illum semper quoad vixit, estis  
 complexi, tum ita merentibus etiam præclaris ipsius virtu-  
 tibus, & eximiis animi dotibus, inprimis rarâ Medicinæ co-  
 gnitione & peritiâ, quâ ita excelluit, vt plurimis viris Prin-  
 cipibus, ob eam fuerit charus & admirationi, qui illam ma-  
 gno cum successu fuerunt experti. Amplitudinem vestram,  
 viri Prudentissimi, submissè orans, vt quâ beneuolentiâ pa-  
 trem Thomam Platerum, & fratrem Felicem, vtrumque  
 p. m. semper estis prosequuti, sic foetum hunc posthumum  
 acceptare, pari quæ æquanimitate, erga me meosque, pro-  
 pensî & procliues esse, haud dedignemini. Ego vicissim,  
 vt hætenus, ita in posterum daturus sum operam, vt me-  
 dendo & docendo, pro virili, quemadmodum decet virum  
 & ciuem bonum, prosum quamplurimis. Animum insuper  
 addetis, vt ea quæ à fratre meo mihi in Archiuo (quod ex re-  
 rum naturalium & artificialium multis myriadibus concin-  
 natum) derelicta, augeam indies, & hortum arboribus &  
 plantis multis exoticis florentem & virentem, in ciuium  
 vestrorum, aduenarumque commodum, subinde exornem.  
 DEVM Ter Opt. Max. animitus precans, vt V. Magnif. &  
 Ampl.

# DEDICATIO.

Ampl. hisce turbulentis temporibus, felicem Reipublicæ  
administrationem, vt hætenus, sic deinceps largiatur, to-  
tamque Ciuitatem vestram, dulcissimam patriam nostram,  
potenti sua dextera, ab hostium insidiis & machinationibus  
clementer protegat & tueatur. Basileæ ex  
Musæo meo 18. Februarij, An-  
no 1625.

*Mag. & Ampl. V.*

*subiectissimus cliens  
& ciuis*

THOMAS PLATERVS  
professor Medicus.





In auctarium

# PRAXEOS MEDICAE,

*Excellentissimi Viri,*

D. FELICIS PLATERI, ARCHIA-  
triquondam & Professoris Basileensis, —

*à Clarissimo Viro,*

D. THOMA PLATERO,  
etidem Professore Basileense, iterum  
in publicum editæ

## EPIGRAMMA.



*VI velit ingenium FELICIS nôsse PLATERI,  
Atque eius fuerit gloria quanta Viri,  
Hûc sit, quò cernat ne quicquam in imagine pictâ;  
(Namque Animi dotes picta tabella negat)  
Sed relegat Studij magni & monumenta Laboris,  
Quem pendit Medicæ Præses is-ipse Scholæ:  
Quaq̃ iterum promit Frater, Doctorq̃ Lycæi,  
Consimilis studio, nec minor ingenio.  
Frater is est THOMAS fraterni Nominis hæres;  
Virtutum fratris cognitor; auctor Opum.  
Pro meritis tantis utriq̃ Scholastica pubes  
Debetit grates, ac pia vota feret.  
Tu verò perges sic, Vir præclare, mereri;  
Pluraq̃ pro Genio mox documenta dabis:  
Perpetuò ut constet nomenq̃ decusq̃ PLATERUM;  
Nec desint, vestrà qui releventur ope.*

M. LUDOVICUS LUCIUS, ORGANI LOGICI  
Professor, & Academiae Basileensis nunc Rector, P.

ANA-





ANAGRAMMA.

THOMAS PLATERVS;  
MAS, PLATO, HERVS.

*Corporis, Ingenij, Generisq; propagine clare,*  
*MAS, Marte; arte PLATO; sorte sed HERVS ave.*

RODOLPHVS SIMLERVS, TIGVRINVS,  
Med. Doct. Monspessuli inter Musas lufit,  
Anno 1595.



*Excellentissimo & Celeberrimo Viro,*  
D. THOMAE PLATERO, INCLY-  
tæ Basil. Acad. Professori, Domino  
suo amicissimo  
S. P.

*C*VM tua Dadaleâ domus inclyta splendeat arte;  
*Et recreet doctos ingeniosa viros:*  
*Ac tibi, quas Ponto, & vasta Tellure recondit,*  
*Natura omnigenas suppeditârit opes:*  
*Te Medicum eximium, Patriæ decus, atque Minervæ*  
*Delicium, Medicis Ithova beavit aquis.*  
*Nunc ergo, toto quæ nos miramur in orbe,*  
*Ædibus & hortis sunt veneranda tuis.*  
*Exorna spartam, & felicibus utere fatis:*  
*Excellatq; tuis chara propago bonis!*

IOHAN. IACOBVS GRASSERVS.



QVADRIGA EPIGRAMMATVM

Ad

Excellentissimum & Experientissimum Virum,

DN. THOMAM PLATERVM, ANATOMICVM  
& Botanicum, in inclutâ Rauracorum  
celeberrimum,

ablegata

à

BALTHASARO SIMONE Fr. P. L. C. & Phil. ac Med. D.

1.

**L** Aus sua cuiq; : suus manet omnibus ordine cultus !  
Pollet hic ingenio ; pollet at ille manu !  
Prædicat hunc ; illum pia prædicat ordine Musa,  
Laudatis merces una relictâ viris.  
Te vidit, stupuit, cupit & , potiturq; cupito ;  
Parco docere, refert lassâ, ministra, tuum.  
Hinc illis laudes ; hinc illis Carmina : nobis,  
Obvia quòd parcâ, laus ea, lassâ, TIBI.

2.

Flaccescunt demto PLATERI pectore membra ;  
Et repetunt viuo pectore membra decus !  
Rauricia pectus PLATERIVS athere missum,  
Hoc vires membris suppetit ; ille bonis.


3. IN HORTVM.

Hortus terra potest dici tuus Italia, dici  
Italia fructus gratia magna potest.  
Italia miror quâ tanta cupido videndi ?  
Suadeat Italia quid mihi miror iter ?  
Italia quicquid laudis, tuus eripit hortus  
Aemulus ; Italicas vincit & vnus opes.  
Dixeris an cultu ? num frugibus ? ambigo : cultu,  
Frugibus an illam vincat : utroq; puto.

4.

Non illinc Venerum, Charitum non tecta Dearum  
Culta patent. Ergo quid ? Charis ipsa, Venus.





# QVÆSTIONES PHYSIOLOGICÆ.

## 1. *An Vena, Arteria, Nervi à Cerebro originem trahant?*



N huius quæstionis veritate indaganda, & Philosophi & Medici admodum defudarunt, aliqui; multa incongrua proposuerunt. Nam qui in ea rationem tantum veluti ducem elegerunt, nec sensuum testimonio confisi, ex solius animi iudicio singula metiri voluerunt, hi, etsi præstantissimi essent Philosophi, in eo tamen grauitè peccarunt, quòd ea, quæ sensus falsa esse iudicat, pro veris venditarunt: Vti Peripatetici, qui neruorum originem cordi attribuerunt, imaginatione hac fortè seducti, quòd spiritum vitalem à corde per arterias cerebro communicari, ex eoque spiritum animale procreari, qui cerebro & neruis vim mouendi sentiendique confert, cognoscentes, à corde sic sensum & motum proficisci iudicauerunt. Quæ sensuum neglectio fecit, vt & in aliis, viri grauissimi errores non leues commiserint, vt qui potionem in pulmones deferri crediderint: Alii; qui serum ipsum in vesicam transudare, cum ex inflata vesica, aërem vnico intercepto meatu, per quem vrina effluit, minimè effluere, viderent, existimarunt. Vti & illi fuerunt hallucinati, qui nullas vias, nulla vasa, nullos ductus & meatus in corpore indagantes, corpus nostrum adeò perspirabile crediderunt, vt citrà hæc, omnia corpus permeare & peruadere posse, temerè affirmarint.

Sed vt ad quæstionis nostræ sensum accedamus; Si Neruorum Venarum & Arteriarum originem eam esse statuamus, à qua vt à radice vel caudice arbores & plantæ ena-

scuntur, ita hæc vasa ab illis prius generatis produci, & sic originem trahere velimus, non solum in Neruis hoc minimè fieri, nec eos ullo pacto à corde sic oriri, sensus iudicabit, sed & in Venis & Arteriis dubium erit, an ille à Corde, Venæq; ab Hepate vel à Corde proficiantur.

Si enim illic exortum vasorum esse asseuerant, vbi vas à principe parte aliquid deferens primum emergit, ac tanquam radice altissimis defixum radicibus, substantiæ ipsius inhæret, Iecur, cui vena caua infansis propaginibus intexitur, cui quoque venæ portæ soboles innumerae immergunt, & in quod Vena vmbilicalis in foetu se inserit, Venarum principium erit statuendum.

Si verò eam & venarum & arteriarum originem statuamus, cui vas exactè cōtinuatur, ab ea; diuelli non potest, vbi quoq; maior ipsius truncus caudexque existit, Cor ipsum, cum ex sinistro ventriculo arteriam magnam, ex dextro sinu venam cauam promat amplissimam, ipsius substantiæ pertinacissimè cohærentem, indeque ad hepar descendente, cor vt arteriarum, sic & venarum erit principium. Vti & duorum aliorum vasorum permixtæ naturæ, veluti Venæ arteriosæ, & Arteriæ venosæ, quæ quoq; ab ipsius substantia emergunt, atque per pulmones disperguntur. Quæ certè à pulmonibus, etsi multis ramis substantiæ ipsorum inhæreant, si illic vbi radices hæ sunt, origo ipsorum esset statuenda, quod tamen haud verisimile, exortum traxisse oporteret, vti neque emulgentes, etsi per renem substantiam & venæ ille & arteriæ ferantur, nec venas meseraicas quæ lienis substantiam perreptant, à renibus aut liene enatas quicquam iudicabit.

Adeò vt si vel hepar vel cor, venarum &

arteriarum principium ponamus, multae occurrant difficultates, cum in hepate nulla insignis deprehendatur arteria, & venarum tantum rami, non caudices edefinant. In Corde verò, etsi trunci & caudices horum vasorum illi adnascantur, cum tamen substantiae illius cum hisce vasculis sit similitudo, & vena magna, quae inde enascitur, non pulset. Dein cum & vas umbilicale, & vena portae nullibi cor attingant, cor venis originem minimè præbere, constabit.

Cæterum in tanta opinionum ambiguitate, ut certi quid cognoscatur, hac via id facillimè fiet, si quo pacto in prima foetus formatione, singulae partes, & quae primò, & quae posterius generentur, diligenter consideremus, quod cum non aliter sensibus deprehendi queat, quam per Anatomen, eaq; in gravidis mulieribus quam rarissimè se offerat, in foetu per abortum reiecto, hoc maximè patebit, idque non vno solum sed pluribus, ut quo pacto singulis mensibus partes formentur crescantque, pateat. Verum cum & hoc videre paucis contingat Medicis, non mirum, tot dissentaneas de origine harum partium & erroneas opiniones extortas fuisse. Liceat igitur mihi, nec vitio vertatur, quippe cui tot annis in studio Medico versanti, abortus quamplurimi inspicendi se obtulerunt, si quae in illis annotauerim, sincere & fideliter, ad quaestionis propositae decisionem proposuero.

Posteaquam semen utriusque parentis foecundum utero conceptum est, priusquam formam aliquam absolutam partes quae ex eo generantur, consequantur, sanguineque nutriantur & increcant, quae primo ferè mense perficiuntur; exsurgit primum vis illa procreatrix in semine latens & recondita, ac insigniores seminis portiones, quae à tribus parentum principis defluerunt, in tres quasi bullas, spiritibus turgentibus disponit, quae cerebri, cordis & iecoris sunt rudimenta, in corpuseculo exiguo conclusa, reliquasque illi adhaerentes portiones, in artus illique adnata membra ruditer segregat, quae pri-

ma septimanà ferè perficiuntur, ita ut tum reiecto per abortum embryone, informis talis massula, ex semine veluti concreta, rotunda & conuoluta, tribus hisce bullis distincta appareat. Qualem à Psaltria illa, quae per vim saltu impetuoso abortum sibi conciliarat, se obseruasse scripsit Hippocrates. Egoque eiusmodi reiectum, globuli rotundi & albi instar, magnitudine auellanae, in quadam, quae quotannis ferè, non multis à conceptu diebus, abortiebat, vidi, atque ex amnio tenui, cui innatabat, exemi, & cum ab inuicem deducere, tres eiusmodi bullas, quarum inferior iecoris rudimentum exprimens, pallidior non tamen rubra erat, obseruavi, quatuorque portiones pro brachiis & pedibus formandis, & quod spectatu iucundum, duopuncta nigra minutissima, oculis dicata notavi. Quae uti & in aliis, sic & in generosa quadam, quae toto ferè biennio, quod mirum & alias inauditum singulis mensibus abortiebat, saepeque ad me eiusmodi abortum, ut quid esset, iudicarem, trans mittebat, similiter sic se habere, deprehendi.

Atque haec uti prima septimana, facultas illa generatrix molitur in semine; Sic & mox eadem vi partes crassiusculas, quae in ossa abiturae sunt, tenuissimaque filamenta, quae nervis, venis & arteriis materiam suppeditant, latiusculaque, quae foetum ambientia inuolucra, membranæque & tunicae futurae sunt, certis locis segregat atque discernit.

Postmodum ad trigessimum usque diem, conformatrix facultas, ulterius opus aggrediens, solidarum partium conformationem ex semine tantum instituit. Atque inchoata prius principia, cor, iecur, cerebrum, propria figura exornat, mox & Nervii effinguntur, Venae & Arteriae excavantur, omnes in foetus umbilicum deductae, à quo duplicem quae inuoluuntur membranam persuadentes, matris uteri venis continuantur atque osculis adhaerent: Eademque operatum & membranæ foetum inuoluentes firmanantur, uti & reliquae membranæ. Viscera item interna



ternarobur nanciscuntur : Cutisque omnia integens concrevit, Ossaque figuram aliquam & duritiem sensim acquirunt. Quæ omnia ex puro utriusque parentis semine tantum perficiuntur, nullo adhuc affluente sanguine, nondum aucto aut amplificato foetu, neque rubore aliquo perfuso. Qualem quoque embryonem sic formatum & delineatum, primo mense reiectum, uti aliqui descripserunt, sic & ipse vidi notauique, in quo, ex sphaerica figura, uti dum vtero gestatur esse solet, dilatato & diducto, lineamenta partium hæc expressè cernebantur. Cuius caput, etsi exiguus esset embryo, a uellanae instar magnitudine, reliquum corpusculum proportionem obseruata superabat, quod cum illud solum ex semine constet, reliquæ verò partes sanguine enutritæ, augeantur, non mirum reliquas magnitudine superare. Oculi quoque huius embryonis, uti cancris non nihil exerti, Crura, Pedes, Brachia, Nasus, Auriculæ, Digiti secreti, Penis in masculo conspicuus, Scrotum sub eo exile, viscera interna fibrosa, vasa fili tenuissimi instar, Membranae cæparum pelliculis similes, Ofsicula flexibilia adhuc & mucosa, Cuteque omnia subtilissima pellucidaque, ita ut per eam interiora cerni possent, contracta: Omniaque hæc adhuc alba, & seminis æmula.

Hiscæ sic primò formatis, à trigésimo demum die partes hæc nondum adauctæ, nutrirî, carne fulciri, atque increfcere incipiunt. Et à matre sanguinem in hunc vsum haurire, qui per secundinas, foetus umbilicum pertransiens, hepatis illius affunditur, atque inde per venas, tum portæ tum cauam, ad partes dispersas, illarum vndique fibris accrescit, ipsarumque capacitates quæ inanes erant, sensim carne implet, atque partes sic adauget, quod & in musculis, tum aliis visceribus natura molitur, pistorum exemplo, qui primum imaginem rudibus lineamentis adumbrant, mox variis coloribus illustrant perficiuntque.

Atque uti hæc duobus mensibus enarato modo natura efficit, sic tertio longè

adhuc hæc magis conspicua apparent, ad eò ut tunc quoque, etsi embryo vix digiti longitudinem superet, nulla pars tam exigua sit, quæ non iam formam suam exprimat: sicuti in sceletro embryonis quod iam annos quadraginta asseruo, spectare licet, in quo ossa omnia vnà cum vnguibus tam manifestè citra corruptionem integra adhuc cernuntur.

A quo tempore, donec foetus ad perfectum complementum perueniat, atque ad partum absolutus & maturus fiat, partes formam perfectiorem, atque incrementum capiunt, aliæ citius, aliæ tardius, & plus minusve perfectæ, prout foetui dum in vtero inclusus est, vel postmodum demum ubi in lucem prodiit, inseruire debuerunt, formantur absoluunturque.

Nam cum magna sit partium, functionis causâ, varietas, atque ex illis aliquæ dum foetus vtero inclusus est, licet formatae sint, otiosæ tamen delitescant, aliæ verò statim opus suum aggrediantur, sit ut illæ citius aliæ tardius formam absolutam consequantur. Ut autem hoc magis fiat conspicuum, ex facultatum quibus foetus dum in vtero est, gubernatur, indeque prodeuntium functionum enarratione patebit.

Foetum ab initio ex semine recenter conformatum, sanguinis duntaxat beneficio nutrirî, haud secus ac stirpes terræ succo, & calore nativo innato viuere, certum est. Postea & spiritu vitali accedente, animalium instar viuere, & postremò etiam moueri & sentire.

Cæterum hæc facultatum functiones, cum certis instrumentis ad eas obeundas indigeant, atque foetus partes principes, ob exilitatem hisce suggerendis non sufficiant, illiusque iecur minutum aut venæ minimæ, sanguinis eam quantitatem, quam foetus ut augeatur admodumque increfcatur, requirebat, producere nequeat; Cor item exile, spiritum vitalem abundè & affatim subministrare non possit: aliunde foetum & sanguinem ad nutritionem, & spiritum ad vitam sustentandam, quam ab hisce

organis haurire necesse erat, à matris nimirum vteri venis, sanguinem, & arteriis spiritum alliciendo, idque per venas & arterias proprias umbilico insertas, indeque vena umbilicali ad foetus hepar, arteria ad crurales arterias deriuatas, atque sic per hanc viam vniuerso foetus corpori subministrando: à quo materno sanguine & ipsius foetus hepar, vti cæteræ partes aluntur & infarciuntur, matrisque spiritu vitali cor ipsum foetus vitam primum cum cæteris partibus accipit, ab eodemque spiritui animali quoque materia suppeditatur.

Pulchrè sic disponente naturâ, vt homo non ex se ipso, sed ex parentum semine, primò conformetur, caloremque natuum accipiat, atque inde à matre alimentum vitam & spiritum desumat, donec eo perfectò & genito, atque à matre excluso, ad sui nutritionem, vitam sensum & motum propriis vtatur organis.

Ex quo patet, foetus ipsius hepar vti & cor, dum in matre continetur, cum neque illud sanguinem generet, neque hoc spiritum vitalem procreet; sunt enim hæc iam in matre satis elaborata, proprio munere nondum fungi; Vti & Cerebrum, quod ad quartum ferè mensem otiosum esse, cum foetus prius non moueatur, nec ante partum sentiat, experientia comprobatur. Quo tempore etiam reliqua viscera opus proprium nondum aggressa sunt, neque enim ventriculus chylum conficit, nec pulmones spirant, oclusis exactè tunc naribus atque ore. Oculus quoque non videt; Auris non audit, nec lingua gustum vllum percipit.

Tantum igitur vasa postquam foetus incrementum incipit, Venæ primum, inde arteriæ, tardius nerui, illæ sanguinè matris deferentes, aliæ spiritum aduehentes, hi tandem motum præbentes, munus destinatum exequuntur, cum reliquæ totius corporis partes interea in actum, opus suum minimè producant.

Iam si ad functionem exequendam instrumenti forma perfecta requiritur, quis dubitabit, Venas primum excavari, perfici, atque absolutam figuram consequi, iecore etiam nondum integro, à perfectò, nec dum quic-

quam efficiente. Vti & reuera nullum vas in foetu magis manifestum latumque ab initio, quam vena umbilicalis cernitur. Dedit hoc occasionem quibusdam, vt hepar ipsum à venis pronatum, non venas ab hepate, hisce permoti, pronunciarent, iecurque nihil aliud esse, quam implexum venarum infinitum, cui concretus sanguis obnascatur.

Sic quoque arteriæ formantur, spiritumque vitalem à matris arteriis haurientes, deducunt & pulsan, antequam cor villo modo moueatur, neque enim illud, ad quod aëri non patet aditus, nec prius quam respirare queat, per systolen contrahi aut dilatari potest, donec foetus à membranis quibus obvolutus erat, liberatus, atque aqua cui immersus erat, in partu segregatus, & in lucem editus, per nares aërem attrahat; tunc enim cor pulmonesque eum suscipientes, primum moueri, infansque modo natus respirare, incipiunt. Quod vti ex hisce argumentis licet colligere, sic sensus ipse manifestum facit, si quis in brutis animalibus obseruet, quo pacto, si foetus vnà cum membranis, quibus inclusus immersusque est, rejiciatur, mater dentibus illud scindens, aëri vt ad foetum penetrare queat, faciat viam, & nisi hoc subito fiat, cum à matre separatus, ab ipsius arteriis nihil sumere queat, suffocetur. Vnde & vsu edoctæ obstetrices, in foetu humano, si cum amnio in partu excludatur, non prius vas umbilicale stringunt, donec inuolucrum disrumpant, quod bruta animalia naturæ instinctu sponte, vti dictum, faciunt.

Ex quibus satis patere arbitror, & hepar & cor, non prius quam infans in lucem editus sit, functiones suas obire, quod venæ & arteriæ, dum adhuc in vtero later, in eo moluntur, nec hepar ipsius prius sanguinem, donec infans cibetur, conficere, nec cor pulmonesque, donec respirare aëremque haurire incipiat, villo modo moueri.

Cerebri autem ipsius foetus, longè alia est ratio, cum enim hoc non tantum materiam aliquam, vt hepar, vel spiritum vt cor, sed & propriam substantiam, dorsalem scilicet medullam, & neruos, vndique

ad sensum & motum conferendum transmittat, à matre hoc in foetum deriuari minimè potuerunt: sufficiebat enim matri, sanguinem quo abundabat, & qui in non grauidis per menses expurgatur, & proin eo ad proprii corporis alimoniam minimè opus habebat, pro foetus alimonia, vti & spiritum vitalem, conferret. Verùm partes solidas, vt sunt Nerui, de suo corpore, foetui subministrare minimè potuit, sed foetus eos à proprio ipsius cerebro promit, atque cum cerebro hi & augentur, & cum illud aliquouſq; excreuit, etiam aliquo pacto vires exerunt, motumque aliquem foetui, sed leuem saltem, dum ille adhuc vtero inclusus gestatur, confert.

Vnde & cum cerebri structura tardiùs perficiatur, seriùs & non ante medium vteri gestationis tempus, motus foetus persentitur, donec nonnihil adaucto & confirmato cerebro, quod cum partus instare incipit, accidit, foetus validiore motu, se ex sphaerica figura sponte extendens, ad exitum in partu inuertit & accommodat. Sed & in lucem editus, principes animæ functiones, donec ad molem conuenientem cerebrum excreuerit, non nisi leuiter exerit, nec rectè ratiocinari, reminiscive potest. Quod post infantiam primùm, vbi aliquouſque excreuerint, aliis seriùs, aliis citiùs, prout cerebrum illorum plus minùsve perfectum existit, accidit.

Ex iam enarratis veris argumentis, quibus sensus ipse adſtipulatur, videtur colligi posse, frustra aliquos se excruciare, qui de exortu venarum & arteriarum, neruorumque ita disserunt, ac si hæc vasa à principibus partibus, hepate, corde & cerebro, prius genitis, demùm enasceretur expullularent, & per corpus dispergerentur, veluti ex caudice arboris rami & radices propagantur. Cum ex his quæ prædiximus, potius verisimile videatur, omnes partes in prima foetus conformatione simul gigni, venasque & arterias citiùs quàm ipsorum partes principes perfici, functionesque edere: nisi fortè aliter, dum de origine harum loquuntur, eam intelligant atq; interpretentur. Ex quo, vt variae de eo sententiæ sint ortæ, occasio fortè nata est.

2. *An ne venarum origo à Corde vel Iecore dependeat?*

Hæc quæstio primo intuitu facilis & inuitilis, atque ob id superuacanea fortassis videbitur, in qua explicanda diutiùs moremur. Præsertim cum in veritate illius inuestiganda, tot Philosophi, tot Medici diligenter laborarint, iamque apud plerosque quid in ea statuendum sit, satis constet. Verùm si rem ad amuſſim metiamur, non videbor rem ingratam facturus, quòd eam rursus in dubium vocem, vt quid de ea sentiendū, argumentis ratione inuentis, vsuque comprobatis, confirmetur.

Nam qui in ea soluenda, rationis tantum ductum adhibuerunt, nec sensuum testimonio consisti, ex solius iudicii scrinio singula depromere voluerunt, videntur non parum hallucinari, vtpote quos ratio ingeniùq; vis, sæpè eò perducatur, quæ sensus longè alia esse iudicat. Fecit hoc, vt præstantissimi viri, dum propriæ mentis imperum sequuntur, grauissimè impeggerint. Cum alius neruos à corde oriri, alius potionem in pulmones ferri, crasso satis errore, asserere non dubitaret, alius quoque serum ipsum Vesicæ insudare, cum ex inflata Vesica aërem vnico intercepto meatu, minimè prorumpere videret, imaginatione quadam sibi persuaserit, vt in præcedenti quæstione, huius rei quoque fuit iniecta mentio.

Nec & illi laudandi, qui solo sensuum indicio res examinantes, nullam earum rationem causasque adhibent, non aliter atque lanus in macello viscera interna inspiciebat, ipsorum vsum, functiones, actionesque ignorat. Sed & tertio loco hallucinari sæpè videntur, qui subiectum corpus humanum negligentes, à brutorum animantium partibus, sensuum testimonia desumunt, qui idem mihi efficere videntur, quod hi, qui veras Historias, Fabulis confpurcantes, faciunt, vt ea quoque, quæ in iis vera sunt, falsa esse credamus. Exemplo nobis bellum est Troianum, quod multis commentitiis narrationibus auctum, suspicionem præbuit, dubitandi an ne bellum aliquando eiusmodi fuerit. Qui item sacras Historias variis

figmentis contaminauerunt, magnam occasionem vel atheismo, vel superstitioni dederunt.

Aristoteles Philosophorum princeps, cor dum primò nasci contendit, omnium facultatum originem, ab ipso dependere, ipsumq; cum mouendi tum nutriendi principium esse asserit: vt neruorum, sic venarum quoq; originem cordi attribuit. Galenus contra Medicæ artis instaurator, vt facultates certis sedibus distinxit, ita nutritionem ab hepate proficisci, venasq; quæ sanguinem nutritionis materiam deferunt, ab Hepate enasci, magna contentione integro ferè libro 6. de Hipp. & Platonis decretis euincit.

Vt etque multis rationibus dogma suum comprobare nititur; verum vt veritas magis elucescat, ita habendum: Si illic exortum vasorum esse asseuerant, vbi vas à principe parte aliquid deferens, primum emergit, vt in præcedenti quæstione quoque fuit dictum, altissimisque defixum radicibus, substantiæ ipsius inhæret: iecur, cui vena Caua infinitis propaginibus intexitur; cui quoque venæ portæ soboles innumeræ permiscuntur: in quod vena vmbilicalis in foetu pertingit, venarum principium erit statuendum. Si verò eam originem statuamus, qua vas principis partis substantiæ, à qua dimanat, exactè continuatur, ab eaque diuelli non potest, vbi quoque maior ipsius truncus caudexque, Cor ipsum, vti ex sinistro ventriculo, arteriam magnam, quod nemo negauit, sic ex dextro sinu venam cauam promit amplissimam, ipsius substantiæ pertinacissimè coherentem, atque ad hepar deductam, duo quoque alia vasa confusæ & permixtæ naturæ, ad pulmones delata, erit dicendum principium.

Hæc vt veritati consentanea sunt, sic maiorem dubitationem mouent, vt cuius parti origo hæc sit ascribenda, nondum constet. Quod magis vrgent Venæ arteriosæ & arteriæ venosæ, cum pulmonum substantia confusio, à qua tamen nemo sanæ mentis ipsas progressas, sicuti à corde vnquam prodire, ausus fuit asserere; vt neque emulgentes venas à renibus arterias à liene, cui tamen multæ myriades impli-

cantur. Ita vt rursus hepatis ortum venarum acceptum referre vereamur, quemadmodum nec cordi, cum ipsius substantiæ cum venis nulla prorsus sit similitudo, cum sanguinis non sit officina, cum venæ non pullent, cum non omnes venæ eò pertingant, & vas vmbilicale & vena portæ, cordi nullibi adnascantur.

Cæterum si de obscuris & dubiis rebus non modò ratione, quæ ex ingenij acie prodit, verum etiam obseruatione experientiaque, quæ sensuum beneficio concipitur, iudicandum est. Intelligemus statim in prima hominis conformatione, foetus partes æquè omnes conformationis suæ adumbrationem & rudimentum nancisci, membraque simul omnia conformari spermatica, atque incrementum, nullumque prius aut posterius alterò, aliudve ex alio oriri, ex certis hisce demonstrationibus patebit euidentius.

Posteaquam vtero secundum semen conceptum est, priusque formam aliquam absolutam, partes quæ ex eo generantur, consequantur, sanguineque nutrantur & incrementum, hæc primo mense ferè perficiuntur. Exurgit primum vis illa procreatrix in femine latens, & recondita ac insigniores feminis portiones, quæ à tribus parentum principiis defluerunt, in tres quasi bullas spiritibus turgentes disponit, quæ iecoris, cordis atq; cerebri rudimenta sunt. Eadem vi partes crassiusculas quæ in ossa abituræ sunt, tenuissimæque filamenta, quæ neruis, venis & arteriis materiam supplerunt, latiusculasque quæ foetum ambientia inuoluta membranasque corpus inuoluentes futuræ sunt, certis locis segregat atque discernit. Quæ septem diebus ferè perficiuntur, ita vt tum reiecto embryone, informis quædam massula bullis distincta appareat.

Ab eo verò ad trigessimum vsque diem, conformatrix facultas opus aggressa, solidarum partium conformationem ex semine tantum instituit. Atque inchoata primum principia, cor, iecur, cerebrum propriâ figurâ exornat, mox & nerui effinguntur, venæ atque arteriæ excuantur, omnes in foetus vmbilicum deductæ, à quo duplicè qua inuoluuntur membranam peruadentes matris



tris vteri venis continuantur, atque osculis adherent. Eadem opera tum membranæ foetum inuoluentes firmantur, vt & reliquæ membranæ. Viscera item interna robur nanciscuntur, Cutisque concrefcit, omnia contegens, ossaque figuram aliquam duritiemque sensim acquirunt. Hæc omnia in puro semine, ex parentibus commixto, tantum perficiuntur, nullo adhuc accedente sanguine, nondum aucto, nondum amplificato conceptu, neq; rubore aliquo perfuso. Ita quidem abortum ante quadragesimum diem, vt Hippocrates notauit, sic & post eum multi, & ego quoque ex brutorum animalium reiectis, non semel obseruaui, foetum immaturum eiectionem, verè ac prorsus conformatum, seminis quantitatem mole sua nondum excessisse, cuius partes omnes albæ erant, iecore excepto, in quod vena umbilicalis ferebatur, sanguine conferta, foetum postea nutritura. Cuius magnitudo vix pisciculum minutissimū licet excedat, Caput tamen par est auellanæ, & maius pro reliqui corporis proportionem. Nam cum cerebrum tantum ex semine constet, reliquæ verò partes omnes sanguine enutritæ, molem suam primum accipiunt, Caput maius toto quo vtero gestatur tempore, semper apparet. Oculi his vt cancri exerti, Nasus, Auriculæ eminent, Brachia, Manus, Crura, Pedes, cicadarum instar, hisque secreti Digituli, Penis conspicuus, Scrotum milij magnitudine. Omnia cute tenuissima pelliculaq; contexta, per quam interiora cernebantur: Viscera fibrosa: Vasa filis araneorum subtiliora, Membranæ cæparum pelliculis tenuiores splendoribusque. Ossicula flexibilia adhuc & mucosa. Omnia hæc alba & seminis æmula. A die enim trigesimo, conformata partes solidæ, nodum adauctæ, nutrirī incipiunt, carne fulciri atq; increfcere. Idq; ex menstruo matris sanguine, qui per secundinas foetus umbilicum pertransiens, hepatis affunditur, atque inde per venas tum portæ tum cauam, vndiq; fibris accrescit, ipsarumq; capacitates quæ inanes erant, sensim carne implet atq; adauget, tum in musculis tum aliis visceribus.

Hæc donec foetus ad perfectum comple-

mentum perducatur, sitq; iam ad partū absolutus atq; maturus, natura pulchrè molitur. Ex quibus satis constare arbitror, vno eodemq; tempore partes simul omnes delineri, alio item conformari, speciemq; accipere: alio audaucter atq; increfcere, neq; ex spermaticis partibus aliam ex alia prodire.

Verum cum magna sit partium functionis causa varietas, cum aliæ dum foetus vtero inclusus est, licet formatae sint, otiosae tamen delitescant, aliæ cōtrā simul opus suum statim efficiant, fieri omnino nequit, vt omnes natura æquè promoueat, sed vt aliæ citius, aliæ tardius formam absolutam consequantur, atque iam genitæ dicantur. Quæ nam verò illæ sint, facile patebit, si in memoriam reuocauerimus facultates, quibus gubernatur.

Foetus ab initio ex semine recens cōformatum, sanguinis duntaxat beneficio nutrirī, haud secus ac stirpes terræ succo calore tantum innato viuere, certum est. Mox verò spiritu vitali accedente, animantium instar viuere. Postremò omnium moueri & sentire, omnib. in confesso est. Cæterū hæc facultatū functiones, cum certis instrumentis (vt quælibet actio) perficiantur, neq; dum sufficiat foetus principes partes ob exilitatē hisce suggerendis, utpote cuius Iecur minutissimū, sanguinis illa quantitate procreanda (qua ad perfectionem conceptus opus habebat) maximè sufficeret. Cor item exile, Spiritum vitalem abundè subministrare nō potest, aliunde & materiam & vitam aduexit, à matris vteri & venis & arteriis ipsius sanguinem spiritumq; vitam deriuans, illum per venam umbilicalem in venas proprias alliciēs, hunc per arterias umbilicales, in arterias cruales deducens: sic vniuerso ipsius corpori distribuens, à quo materno sanguine & hepar ipsum foetus cōcrefcit, & reliquæ partes nutriuntur, à quo etiam matris Spiritu, cor ipsum vna cum reliquis viuut, atque animali quoque Spiritui materia suppeditatur.

Pulchrè Deo optimo maximo ita disponente, vt homo nō ex se ipso, sed ex parentū semine primò conformetur, caloremq; natuum accipiat, atq; inde à matre alimentū, vitam & Spiritū desumat, donec eo pfecto, & ad sui

ad sui nutritionem, vitam, sensum & motum, propriis vtatur organis.

Patet ergò fœtus ipsius hepar, vt cor dum matre continetur, cum neque illud sanguinem generet, neque hoc spiritum vitalem procreet ( sunt enim iam hæc in matre satis elaborata ) proprio munere minimè fungi. Vt & cerebrum ad 4. ferè mensem otiosum esse, cum conceptus prius non moueatur, nec ante partum sentiat, experientia comprobatur. Quo tempore etiam reliqua viscera opus proprium nondum aggressa sunt, neque enim ventriculus chylum conficit, vnde & nulla excrementa in intestinis colliguntur, nec pulmones spirant, occlusis exactè tunc naribus atque ore. Oculi quoque non videt, auris non audit, lingua non gustat.

Tantum igitur vasa, postquam fœtus increscere incipit, venæ primùm, inde arteriæ, tardius nervi, illæ sanguinem matris deferentes, aliæ spiritum aduehentes, hi tandem motum efficientes, munus destinatum exequuntur, cum reliquæ totius corporis partes interea in actum opus minimè producant.

Iam si ad functionem exequendam, instrumenti forma perfecta requiratur, quis dubitat Venas primùm perfici, excuari, absolutam figuram & perfectionem consequi, iecore nondum integrè perfecto, nondum quicquam efficiente. Vt reuera nihil in fœtu manifestius, nil latius & maius venâ umbilicali: Dedit hoc occasionem multis, vt hepar ipsum à venis pronatum, non venas ab hepate, non ineptè pronunciarent, cum iecur nil esse, quàm inplexum venarum infinitum, cui concretus sanguis obnascitur, inficiari nemo possit.

Sic quoque arteriæ formantur, pulsant, spiritumque deducunt priusquam cor vel vllum motum persentiscit, quicquid de origine arteriarum à corde dicant. Hæc enim postquàm in lucem editus est infans, primùm operantur, cum iam solidiorem cibum per os accipit, tunc ex chylo hepar sanguinem efficit, cum per nares aërem respirationis causâ attrahit, tunc cor pulmonesque dilatantur constringunturque.

Vidi hoc sæpius in brutorum maturo iam fœtu, per abortum cum membranis ipsum

ambientibus reiecto. Exteriori enim effracto inuolucro, per interius, quod valde pelucidum est, videre potui, quam fœtus à matre iam separatus respirare conetur, nec possit tamen, cum aëri ad ipsum inuolucrum causâ non pateat aditus, ita vt statim suffocetur, nisi interiori inuolucro scisso, aërem continuo ducere possit. Vnde vsu edoctæ obstetrices, vas umbilicale non prius vinculo intercipiunt, donec inuolucrum disrumpant. Quæ bruta ex naturæ instinctu dentibus discindunt.

Cerebri longè alia est ratio, hoc enim cum non tantum materiam aliquam, vt hepar vel spiritum, vt cor, sed etiam propriam substantiam vndique ad partes transmittat, dorsalem medullam & nervos, à matre hi fœtui deriuari minimè potuerunt, sufficiebat enim matri si sanguinem quo fœtus aleretur, si spiritum quo viueret, cōferret, quæ non grauida muliere, certis periodis tanquam superuacanea expurgantur. Partes autem solidas mater de suis subministrare non potuit. Atque ideo fœtus nervis ad motum propriis vtitur, ab ipsius cerebro singulis partibus contributis, in easque dispersis.

Cumque cerebri structura tardius quoque perficiatur, serius mouetur infans, nec sentit, donec non nihil confirmato & adaucto cerebro, infans à matre iam excludatur. Neque tum principes adhuc functiones exerit, donec cerebrum ad molem conuenientem crescat, sicque ratiocinari reminiscique paulatim incipiat, quod post infantiam serius aliis, aliis citius euenit, prout cerebri constitutio perfectior atque exquisita.

Videor iam mihi obtinuisse quod volo, et si vitio minimè dandum, si à veterum placitis non nihil discendo, tandem effecisse, Venas ipsas vna eademque opera, cum cæteris spermaticis partibus genitas, formatas, atque ex semine primam originem traxisse. Ad hæc primas omnium perfecta specie ornatas absolutasque, suum opus perficere, necdum in fœtu ab adultiorum venis, nisi mole, qua indies ob sanguinis copiam magis magisque dilatantur, differre. Quæ non tantum rationibus nixi, sed & demonstratione vera sensuum beneficio ex Anatome didicimus (quæ simul

simul omnibus philosophis, ad quos propriè ea pertinet, commendamus) atq; ea asserere non dubitauimus, cum omnibus, maximè philosophis, iucunda & grata fore existimaremus. Cuiusmodi & multa in quæstione præcedenti fuerunt allata, quæ hic ob quæstionum similitudinem repetere non abs re fuit.

3. *Vasa vmbilicalia continua ne, an contigua?*

**F**OETUS propriæ partes sunt vasa vmbilicalia potissimum, quæ cum vasis matris non continua esse, sed contigua (& quidem mediâtè) tantum esse, præter *autopsiam*, (cùm in muliere in hepate vterinum, in brutis in coryledonas disseminari videamus & tangamus) ratio ipsa dicat: si enim vasa dicta continua essent, quantâ fieret, prohi Iupiter, in partu partium dilaceratio, sanguisque laudabilis effusio? Quis nescit, vasa dissecta, aut alio modo soluta in indiuiduo, nunquam aut rarissimè ob materiæ ineptitudinem, & tamen intercedente medio ut plurimum coalescere, ut rectè continua dici possint? Quis dicet, minoris vasis orificium minus, cum orificio maioris vasis maiori, commodè coalescere posse? Tandem si maximè velint, hæc vasa continua esse, non tamen aliter continua sunt, quàm fructus aliquis continuus est arbori; pedunculus enim iungitur arbori, instar illius articulationis ossium, quæ per symphysem fit.

4. *Cor sit ne viscus præstantissimum, primum viuens & vltimum moriens?*

**Q**UIS satis Principis huius partis, quæ scaturigo, fons & principium vitæ, eiusdemque vltimus actus & finis existit, dignitatem explicare poterit?

Cuius summam necessitatem, quòd nulla ex iis quæ viuunt, corde destituantur, primum ostendunt, cùm tamen cerebro, hepate, partibus primariis, multa è viuentibus careant. Cor autem & in homine reliquisque animantibus omnibus, viscus rotundum pyramidale fibrosum compactumque, duobus ventriculis in reliquis, Vnico saltem in

piscibus excauatum, reperiatur, quo nec minima insecta, nec informia ostracodermata carent. Quo neque plantæ destituuntur, in quibus etiam à toto segregatum collectumque, certaque forma circumscriptum cor minimè sit (neque enim cùm nec sentiant aut moueantur, eo instrumentorum ut reliqua animalia apparatu opus habuerunt) hoc tamen certa aliqua in plantæ sede consistere, vel radice vel medulla, quòd viuant, satis declarat.

Sed & excellentiam cordis, sedis ipsius dignitas ostendit, cùm tutissimo semper in loco, reliquisque partibus septo & munito, inclusum lateat. In homine reliquisque animantibus medio in thorace, pulmonibus immersum occultatumque.

In piscibus verò in capitis ima sede, cerebro proximum; In Plantis in intermedia, ubi radix cauli qui assurgit iungitur sede, sit positum. Hanc enim & carnosiore & molliorem cæteris partem, plerique plantæ cor esse asserunt, quam & aliqui Cerebrum potius vel matricem appellare voluerunt; nos verò quoque cùm vitalem humorem Plantæ conferant, cor esse dicimus.

Sed multis aliis argumentis omisis, quibus cordis præstantiam ostendere statueramus, sufficiat ad illius dignitatem comprobendam, vnum aut alterum attulisse.

Quòd nimirum cor ipsum, nullos grauiiores affectus, quales sunt, inflammationes, tumores, vlcera, aliis partibus principibus quoque consueta, citra hominis subitaneum interitum ferre pativè possit.

Et quòd leuiores illius pathemata, omnes mox totius corporis partes persentiant, & corde affecto, nobilissimo huic organo mox consentiant, & veluti condoleant.

Nam & sola cordis intemperies calida, statim omnibus partibus similaribus immititur, easque omnes simul accendens, febres, generales totius corporis affectus parit.

Sicuti frigida, si in corde oriatur constitutio, illa quoque omnium partium reliquarum calorem extinguit, actionesque labefactat. Siccitate itidem in corde nata, per febres heclicas vniuersum corpus emarcescit & consumitur.

Sed & folis cordis spiritibus intrò forasq; per animi affectus immodicos impulsis, quantæ perturbationes mutationesque per iram, terroremque, aliaque animi pathemata in corpore oriuntur?

Hisque interdum aliquandiu cor derelinquentibus, quàm horrenda mortis imaginè repræsentantia, per animi deliquia, Syncope, inde sequuntur symptomata?

Ex quibus, quæ illius passiones comitantur, totius corporis læsionibus, cordis principatum, & præ cæteris partibus, nobilitatè facile cognoscimus.

Vt non sit mirum, cor & originè & principium vitæ, omniumque actionum reliquarum à Philosophis fuisse positum.

Et quod & primum vltimumque inter ea quæ in corpore & viuunt & mouentur, & sentiant, existat.

Cùm Hepatis actionibus penitus aliquandiu deletis, læsæque sanguificatione, nihilominus ægrum superuiuere, ad tempus adhuc posse videamus.

Cùm cerebri functionibus omnino interdum sublaris, ita ut in apoplexia & caro, nec moueatur nec sentiat æger, tamen nisi respiratione impedita, atque eatenus corde suffocato, æger extinguitur, homo diutius superstes manere possit.

Cæterum Medici cùm non tantum ratione, sed & sensibus penitiùs res intueri soleant, factum est, ut diligenti multa; observatione, inter diuersas cordis actiones, dubia multa relinquunt. Inter quæ præcipua hæc sunt.

An cor primum, hoc est citiùs quàm aliæ partes similes, viuat: vltimum enim esse quod exstinguitur, dubium minimè est.

Secundò an cor citiùs aliis partibus moueatur, & num motus illius, dum fœtus adhuc in vtero est, perficiatur. Tertiò demùm, non tantum an primum sit ex iis quæ sentiunt, sed an sensu tactus præditus sit, ambigunt. De quibus quid sentiam, breuissimè & aphoristicè proponam.

Ecetum ab initio ex semine non ita conformari, ut cor, hepar, cerebrum, primum ex tribus veluti bullis formentur, sed omnes partes similes simul primum rudimentum

quoddam, mox formâ aliquam, quâ discerni statim possunt, accipere experientia docet: Quia id quod vidimus, multis præsentibus testari possumus, in globulo rotundo pisum maius vix adæquante, per abortum reiecto, diductoq; caput, corpusculum, pedes, brachia, oculorum puncta nigra, maculas rubras circa hepatis & cordis regionem, manifestè apparuisse, & in conspectum venisse.

Sed & fœtum ex semine recens cõformatum, calore innato tantum viuere, mox verò nutriri augeriq; spirituq; vitali simul perfrui, postremò omnium moueri, & sentire, & ratio dictat & obseruatio comprobat.

Cæterum hæc functiones cùm certis instrumentis perfici debuerint, eaq; in fœtu adhuc imperfectiora essent, quàm ut materiam idoneam partibus alendis viuificandisque præparare & suggerere possent, aliunde, à matre nimirum & sanguis ad nutritionem, & spiritus ad vitam, per fœtus vmbilicum, in eum aduecta deductaq; fuerunt, quæ non tantum reliquas illius partes, sed & hepar ipsum alunt, cordique vim viuificam subministrant.

Pulchrè Deo opt. max. ita disponente, ut homo non ex seipso, sed ex parentum semine primò conformetur, caloremque natuum accipiat, atque inde à matre alimentum, vitam & spiritum desumat, donec eo perfectò genitoq; ad sui nutritionem, vitam, sensum & motum propriis vtatur organis.

Ex quibus manifestè patet, pleraq; in fœtu otiosa adhuc esse organa, quibus etsi potentia vis facultasque insit, nondum tamen in actum deducit, donec absoluta fuerint, & eorum operatio requiratur, quod in plerisq; cùm iam in lucem infans prodiit, primum incipit.

Vnde & Hepar toto eo tempore, dum fœtus vtero inclusus retinetur, nec sanguinem generare, aliisve partibus subministrare, aut potuit aut debuit, sed materno sanguine, vnâ cum reliquis partibus frui, eoque nutriri atque augeri.

Neq; cor quoq; ob exilitatè teneritatemq; illius, dū fœtus ergastulo hoc immerfus est, spiritum vitalem cæteris organis, quem sibi ipsi à matre ut viuat allicit, conferre, aut eundem



dem ob imperfectionē illi<sup>o</sup> generare potuit.

Nec solum eam ob causam; sed & quod materia ad spiritus vitalis generationē necessaria, aëre nimirum tam diu quamdiu inuolucris septus, omnisque ad illum aditus interclusus est, priuatur ac destituitur. Quomodo enim inspiratione illum attraheret, cui nares, os exacte obturata sunt, humoreque seu aquæ cui foetus innatat, immersa, si paterent, eam potius quam aërem haurirent, suffocareturq; foetus. Ita vt qui foetum in vtero respirare contendunt, omnem sensum & rationem tollere videantur.

Quod si verum est, vti reuera verissimum, & eiectus partus brutorum animalium manifeste ostendit, ea non prius donec inuolucrum scissum sit, respirare, neque cor quoque quadiu inspiratione priuatur, moueri, cum motus illius spiritui vitali gignendo propagandoq; destinatus sit, certissime constabit.

Motumque eum quo foetus post medium vteri gestationis tempus se aliquo pacto manifestat, non à cordis illius, vti aliqui voluerunt motu, & pulsu dependere, sed ab animali illius vi, quæ cerebro illius iā ad iustā aliquā magnitudinē adaucto, sese exerit, pcedere.

Cerebrū enim cum non tantum ad sensum & motum spiritū, vti cor, sed & propriā substantiam per nervos, partibus cōmunicare debuerit, hiq; à matre in foetū deriuare minimè potuerint; neq; enim de solidis partibus mater quicquā, vti de humore, proprio & spiritu confert: hinc factum est, vt ad motum eundem, proprio foetus vtatur organo, cerebro nimirū, tunc quando illud non nihil confirmatū est, quod quo partui magis propinquus est, eò magis perficitur, motusq; vehementiores & tunc quadiu foetus exclusus est, sensus simul externos & progressu ætatis, magis adhuc pfectū, tandem etiā sensus interiores, rationē sensim sese exerentē, pfert.

Ex quibus reuera patet, cor quadiu foetus vtero hæret, non aliter quam cæteras partes viuere, augeriq; & nutrirī, sed nec tum moueri, donec à matre separatus, munus suum officiumq; quo reliquis vitā suppeditat, aggredditur, illudq; toto vitæ curriculo, ad extremum spiritum vsq; perficit, atque obit.

Ceterum neq; sensu tactus vilo, multo mi-

nus exquisitissimo, vti aliqui voluerunt, & vulgus existimat, cor prædictum esse, hæc quoque sufficienter probant.

Quod in hoc viscus nerui minimè inferantur, nec aliter ac in hepatis, lienis, renum pulmonumque tunicas, quas partes omnes sensu destitui quoque asserunt, si modò sit, in illius quoque tunicam fibra aliqua duntaxat nerui prorogetur.

Et quod nulla necessitas sensum cordi assignet, cum in corporis profundo pulmonibus, qui & ipsi sensu destituuntur, immersum, nullis externis iniuriis, quas per sensum declinare debuisset, sit expositum.

Et quod vasa continuatione illi iuncta, venæ & arteriæ, quæ & ipsa non sentire, argumentis certis alibi ostendimus, ob eam causam illi sensum tactus quoque adimunt.

Constetque omnibus cardiagias, cordis dolores dictos, non à corde, sed ventriculi officio, cardia dicto, dependere.

#### 5. *Cur facies frigus melius quam reliqua membra ferat?*

**M**iramur in quibusdā regionibus homines, vel omnino, aut ex parte nudos vagari, nec frigus curare, aut eo offendi, præsertim in locis frigidioribus, vt Hybernia, vbi quoque brachiis & pedibus nudis, per abstrusa illius loca incolæ incedūt; & licet in America celū temperatius sit, sine dubio tamen, aliquando etiam, noctū præsertim, gelidum, vt etiam apud nos in ipsis canicularibus sit. Ita vt consuetudo hinc quoque multum possit. Quæ facit, vt facies nostra detecta, quæ non minus rara mollis ac reliquū corpus, & sensilis, frigora tamen perferre possit.

#### 6. *Quid nam sit Barba in viris utilitas?*

**V**is illa & facultas, quæ vasis genitalibus certo tempore ætatis, ad illud homine maturo stimulum adfert, & aptitudinem ad generationem, eodem quoque tempore indicium veluti maturitatis, in pube lanuginē primò, mox in pilos desinentē, in vtroque sexu, ptrudit, & in muliere mamillas sensim sese exerentes profert: in viro verò, cum vis hæc procreatrix valida admodū sit, nō tantū in pube, sed & in facie, loco omnibus cōspicuo, vt cognoscatur virilitas, in viro, omnib; pateat,

(quam per genitalia quæ natura testat & abstrusa esse voluit, explorare, illud non omnibus concessum sit) barbam quoque producere tunc temporis incipit in facie, locum ubi minus impedire debuit occupantem, & pro naturarum diuersitate & efficacia facultatis illius, in circuitu oris, plus minusve sese ad aures vsque, & per malas extendentem. Hincque fit, vt quibus ante pubertatis annos, vis illa & virilitas, per castrationem testium, in quibus vis illa quoque latebat, adempta est, barba quoque minimè erumpat. Quæ vera causa generationis barbæ existit, vt non sit necesse hîc venustatem, cuius causâ hæc genita sit, protèdere, cum in muliere nihil turpius, quàm si ea cresceret, euenire posset, neque pulchritudinis causâ tamen aliquid in corpore humano condiderit natura, illudque tamen pulchrum existat, quod rectè formatum est.

Eadem ratione in cornutis bestiis masculo cornua crescunt, quæ si castrantur, minimè erumpunt. Et quibus animalibus genuini dentes tardius prodire solent, si antequam sese manifestent, castrantur, non amplius sese exerunt.

Barbæ autem in viris vsus nemo rectè hactenus descripsit, neque enim eum quem cæteri pili vsus calefaciendo, aut aliud quid corpori commodando præbet, cum potius impedimentum sit, non saltem ori ad res ingerendas, sed & in aliis actionibus. Vnde eam veteres, qui capillos prolixos alioquin alebant, penitus abradebant, ne belli tempore pacisq; illis impedimentum adferret.

Elegantie causâ si velint dicere esse genitam, quare igitur mulieres eâ carèt, quarum elegantie causâ in hoc maximè natura studuit, & barbâ carere voluit: quæ si quando vel leuiter se in illis manifestet, turpissimas facit. Virilitatis itaq; duntaxat est indicium, vt cum homo nudus minimè incedat, sicq; sexus dignosci nequeat, ex facie virilitatis illius pateant indicia. Quocirca eo tempore, cum vir esse incipit, hoc est, ad generationem idoneus, vt pili circa pudenda, sic & circa mentum aliis citius, aliis tardius erumpunt, & hæc cartilaginosa filamenta, à virilitate protruduntur; & cum vir ad generationem

nō habeat definitum tempus, vt mulier, sed semper sit habilis, semper quoque toto vitæ tempore manent. Hinc certè pulcherrimè illud obseruatur, quod si ante virilitatis tempus castrantur, antequam hæ partes genitæ sunt, non amplius crescant, cum virilitas in homine penitus sublata sit, & effœminati facti sint. Quæ tamen partes si iam genitæ sint, & post castrètur, non amplius amittuntur, cum firmiter corpori hæreant.

Eadem ratione vocem quoque in viro crassiorē, virilitatem demonstrare obseruamus, eamque quoque antequam tempus illius superuenerit, effœminatam esse, & tunc primū intendi, quando iam adest, cernimus, quæ & effœminata, si ante illud tempus castrantur, semper postea manet: sin verò hoc post virilitatis tempus fiat, nō mutatur.

#### 7. *Digitum an sint pellucidi?*

**M**anus digitos inuicem coniunctos, si radiis solaribus aut splendori ignis oppositas: admodum rubere & pellucere videntur, ex quo apparet cutem, membranas, ligamenta, cartilagines & ossa quoque pellucere, etsi mutò iuncta, partem constituent, eam quæ excarnis alioquin est, nullis scilicet musculis obfuscata.

#### 8. *Cur corpora humana post mortem non sepulta, mox flavescent, tandem rubescant, & sanguinem profundant?*

**C**orpora humana, quæ in scholis, Anatomie causâ interdum dierum quatuordecim spatio reseruau, post flavescentem mortalem illum colorem, quo postquā exspirarunt, statim pallent: (qui & mortis iam perfectæ certissimum est indicium) exactis aliquot diebus, rursus nonnihil rubere in malis, carnosioribusque locis, præsertim quibus incumbunt dum secantur, vt clunibus, aliquoties obseruau, atque è venis minoribus quoque nondum sectis, sanguinem ferofum omnino & liquidum, leui cadaueris cōmotione, ad interiora emanare, quod à sanguinis in saniem tenuem & corruptione transmutatione proficisci, cum is putredini obnoxius, primus fore alteretur, conieci.

ieci. Is enim sic attenuatus, facile è venis in corporis habitum, partibus præsertim ex mole corporis, dum asseribus incumbit, & in sectione hinc inde voluitur, & quasi contusis illabens, eas non nihil tingit, atque è venis quoque per nares, podicem, oculos, vel internas sedes apertas elabitur. Quæ causa fortè quoq; erit, quòd cadauera mensium aliquot spatio, rursus effossa, vt signum aliquod, homicidâ vel latrone præsertim edant, sicuti hoc accidere diuinitus creditum est, sanguinem sæpè, præsertim si admodum dum tractatur impellantur, profundant. Quod tamen si diutius sepulta manserint, non fieri, ego qui aliquot experimenti huius facienda causâ, rursus eruere vidi, vel ab aliis qui spectarunt audiui, testari possum.

9. *Cur corpora humana terræ mandata minimè putrescant?*

**C**orpora terræ mandata, si alitè defossa sint, minimè putrescere ex cadaueribus quorum quamplurima & mensium aliquot & annorum spatiis exactis, post sepulturam rursus vel casu vel studio effossa spectauimus, diligenter obseruauimus, his rationibus persuasus, quòd illa non putrida aut fœtida (nisi quatenus tetrum odorem, limacum instar aliquomodo spirant) aut vermibus scatentia inveniuntur, sed arida, sicca, vti fumigatæ sunt carnes, vel si longo tempore terræ inclusa fuerint, in cineres vel tenuissimum polinem redactæ, mox leuissimo motu vel flatu quoque concidant atque euolent. Dein quòd ossa integra & salua pleraque maiora durioraque remaneant, quæ tamen si caro verè putresceret, ab illa infecta, eandem quoque vt in viuientium sphacelis accidere videmus, corruptionem paterentur. Postremo quòd terra ipsa quâ nihil siccius existit, eiusmodi corpora, longè melius quàm si pice aut sale conderentur, à putredine conseruare possit. Ex quibus falsam magnatum persuasionem viderelicet, qui naturali hac corporum à putredine vindicandi ratione neglectâ, artificiali per balsama vti vocant, vtuntur, & qui terram abhorrentes, malunt in cameratis subterraneis, illorum corpora serpentibus, vespertilionibus vermibusque

exponere potius, quàm siccissimo & purissimo elemento, sensim consumi, & in nihilum redigi.

10. *Mirum in hominibus tot formarum præsertim varietates.*

**E**T hoc mirum, in homine præsertim, ex vna forma hominis faciei tam affabre constructa, tot differentes formas enasci, vt alterius rei in toto mundo diuersitates tot vix inueniantur, nec vna sit facies, quæ in tanta hominum multitudine, alteri per omnia similis existat, sed plerumque plurimum inter se; etiam inter eos qui ex iisdem parentibus nati sunt, discrepet. Et licet similitudo quoque aliqua facierum in quibusdam non solum consanguineis, sed & sanguine alienis deprehendatur, interdumque tanta vti in aliquibus, atque inter eos præsertim, qui eodè partu nati fuerunt, contingere vidimus & legimus, vt vix ab inuicem dignoscerentur, hæc tamen tam exacta minimè est, quin certis quibusdam notis differentibus, si modò rectè obseruentur, ab alterius forma distinguerentur. Quod in reliquis animantibus, pilis pennisque infectis, contrario modo euenit, vt plura eiusdem generis formâ tam simili quàm dissimili prædita inueniantur.

11. *Mirum hominem tam angustis pedum plantis erectum seruari, nec cadere.*

**A**dmirandum hoc quoque, hominis tam vastum & erectum corpus, duobus tantum fulcris, erubus scilicet sustentatum, (quorum tam angusta basis, quam pedum infima trasuersa amplitudo efficit) in illis, quò minus labatur & cadat, consistere posse: sicuti in cæteris rebus, quæ nō melius quàm duobus pedibus basi parua sustentantur, videmus accidere. Quod sanè & in corpore accideret, nisi beneficio musculorum ita fixi pedes retinerentur, & dirigerentur, vt non tantum dum corpus erectum in æquilibrio est, sed & dum ab eo recedens, in hanc illamve partem inclinat & fertur, non tamen concidat. Sicuti in infantibus modò natis imbellibus adhuc accidit, qui citra adminiculum

aliquādiu, donec pedes, hoc est musculi tendinesq; ipsorum firmentur, stare aut incedere nequeunt. Secus ac in reliquis bipedibus animalibus auib; scilicet, quorū pulli, cum firmos & offeos pedum habeant tendines, mox nati discurrere possunt. Cum & reliqua animalia quadrupedia, etsi quatuor fulcris sustentata citius & firmius stare & ambulare deberent, pedes tamen molliores quā aues sortita, vbi primum nata sunt facile quoque nutant, non tamen tamdiu atque humanus infans, à statione & incessu impediuntur.

12. *Inconsecta miraculosa, consueti licet turpia, pulchra videri & è contra.*

**M**iracula plerique videre exoptant, cum tamen omnia ea quæ videmus, Dei admiranda opera, miraculosa existant. Verum quia illa consueti nobis, idcircoq; non admiramur, miraculosa esse nō putamus. Nōne æque mirum est, hominem, qui nihil fuit, de nouo nasci, atque illum qui semel fuit, etsi moriatur, & in nihilum redigatur, rursus in resurrectione renasci. Hinc ego ea, quæ consueti non sunt, miracula tamen vulgò dici, existimo, quæ si horrenda videantur, monstra quoque appellant. Consueti verò licet turpia, pulchra videri & è contra. Consuetudo facit, vt scilicet res pulchræ vel turpes iudicentur. Hinc fit vt idem verbum, eodem sono iisdem litteris pro diuerso tamen intellectu prolatum, nunc turpe nunc decorum habeatur, quod vocabulo *Brant* Germanico probatur, quod vt nomen prolatum, sponsam significat, vt verbum, ne honestè quidem nominari potest. Quid quæso turpius vel inhonestius, braca dicta, in caligis excogitari potuit, quæ cum nullum vsum præstet, neque enim membrum (cuius veluti si theca esset, formatur) suscipit aut integrit, à qua etiam immensa, dum hoc adhuc consuetum erat, apud Germanos, nemo abhorrebat, aut indecorum esse putabat, imò cum iam ea omittatur, id plerique turpe in vestitu damnant, esseque iudicant, caligas gestare braca viduatas,

ac si castratos id denotaret, ac corporis formam vitiatam, ac si facies naso careret. Si quis offæ, aut iuri, aut pulti, quæ mensæ apponitur, digitum prius in ore saliuâ madefactum, intruderet, & in ea ablueret, nullus deinceps de ea quicquam comederet, & tamen non abhorrent, quando cochleare non vnum, sed multa à multis, ori sæpè indita, saliuâ imbuta, toties in offam intrudunt, & cum saliuâ permiscunt, nōne quia consuetum est hoc facere, nemo offenditur. Quid pecuniâ sordidius, quæ omnium mortalium manus, etiam leproforum, lueque veneræ & scabie infectorum, toties pertransit, quæ primo contactu sordes deponit, manusque contaminat, si sæpius tractetur, tamen ab ipsius attrectatione nemo abhorret, quod etsi lucri causâ potissimum fiat, nisi tamen consuetum esset, etiam sordities hæc nobis molestiam adferret. Quid turpius, foetidius Cæso putri, quid magis horrendum, quā cum vermibus ex putredine scatet, tamen plerique eo suauiter epulantur & delectantur, cum nihil putridi aliàs, quodcumq; tandem illud sit, comedat homo, sed ea non tantum fastidiat, sed & à contactu penitus abhorreat.

Quid mouet antropophagos, vt carne humana vescantur, & quid cæteras regiones, vt illius esum penitus abominentur, nisi consuetudo, vti & aliarum bestiarum nō consuetarum in cibo esus quā fastidiosus? Quis cochleas, ranas comedit primum & non abhorruit, tandem ex consuetudine fuit delectatus.

13. *Cerebrum rectè ne dicatur frigidum?*

**C**erebrum quod frigidius reliquis visceribus parenchymate constantibus esse censent, nos minimè tale esse putamus, sed si non calidius sit ipsis, saltem calore illis minimè cedere, idque cum sanguine copioso, in sinibus ipsius contentis, eoque arterioso, vnde & sinus pulsus, calidiore proin & tenuiore abundet, eoque alatur, sicuti in superficie illius, quæ tenui meningi cohæret, subcinerea ob hoc fieri, in opere



opere nostro Anatomico ostendimus: Dein & quia facile incalescit, vnde & morbis calidis cephalalgia atque deliriis facillime afficitur. Et quod operationes tot tamque multas præstare debet, quod ipsum admodum spiritu caloreque abundare, satis declarat. Etsi autem humidis excrementis facile abundet, non ex eo frigidum esse censebitur, cum hoc ob copiam sanguinis multamque illius nutritionem fiat, ubi multa excrementa colligi necesse est, sicuti & in pulmonibus calidissimo viscere fieri videmus.

14. *Quare natura alij læti, alij iracundi, alij melancholici, alij pusillanimes existant?*

**H**ic non effrænatos animi motus, quibus vel gaudio nimio profusi stultescunt, vel irâ nimium commoti, furiant, aut melancholiâ immodicâ oppressi, desperant, vel pusillanimitate circumuenti torpent, intelligimus. Sicuti in morbis id sæpe euenire videmus, illorumque hæc esse symptomata. Vti Delirium cum risu. Ritus ille Sardonicus, cuius Cicero quoque meminit. Saltus ille S. Viti, quem vocant, rarus & horrendus affectus: Aliique quamplures, in quibus aliquando læta loquendo, agendove multo risu & gaudio ægrotantes, vel summe periclitatos vel extinctos quoque fuisse vidimus. Sed & multo frequentius dum ægrotant irâ perciti insaniunt, phrenetici, maniaci, colici. Terrore & metu mortis, quam tamen sibi, nisi prohibeantur, inferunt, hi qui melancholiâ morbo laborant, premuntur. Pusillanimitate & metu angustantur, qui morbis diuturnis vexantur, acutis periclitantur, doloribus exagitantur.

Verum non hos quibus mens causarum externarum impulsu, vti neq; illos, quibus ad tempus saltem vel effereuescit vel concitatur, aut peruertitur & alienatur, vel hebetatur, moxque eadem causâ vel sublata, vel mitigata ad se rursus redit, hoc loco inuimus.

Vt qui Vini usu inebriati fatui sunt,

irascuntur, tristantur, plorant: Cum Vinum vt inquit Galenus immoderationis motus animæ concupiscibilis & irascibilis, & vt ratio præceps ruat, frequens fit occasio.

Vt qui ob offensam aliquam vindictæ studio præcipientes irâ feruntur. Vel ob prospera & iucunda lætantur, aduersa & inimica tristantur & moerent.

Quorum & mentis perturbationes, Vini vaporibus discussæ, vel vlione factâ, vel consolatione adhibitâ, si modò rationes admittant, mox cessant atque evanescent.

Nos verò eam constitutionem hic proponimus, quæ ab ipso ortu toto vitæ curriculo, ad interitum vsque perseverat, ætatis quidem decursu causarumque externarum internarumque occurssu mutationem aliquam accipit, nunquam tamen perfecte cessat aut desinit. Quæ natura in infantibus ratione nondum præditis, sese in ipsis cunabilis, mox detegit, multoque risu, gestibus vel fletu eiulatione vel iracundia, vel taciturnitate sese patefacit. Quæ in adultis potissimum adolescentibus, Virisque, & ætatem iam consistentibus, sese multifariam manifestat, adeoque prodit, vt facile sit alicuius naturam vel hilarem, vel ad iram procliuem, vel ad melancholiâ aut vitam sedentariam promptam cognoscere. Quæ & in senibus vel decrepitis, non aboletur penitus, cum nobis passim occurrant Moriones & Demeæ. Alij qui lætitiâ præ se ferunt: Alij quos varia studia artesque oblectant, alij qui perpetuò rixantur, alij qui de quibusvis conqueruntur, alij qui vitam otiosam agunt, nihilque curant, & alij quibus vt ille inquit, nihil suaue præter lucrum existit. Quæ diuersitas animi & morum, vnde prodeat, à variis variè disceptatur. Sunt qui quatuor complexionibus dictas, quas Temperaturas vocamus, quatuor hisce animi motibus accommodant. Vt nimirum hi, qui calidi & humidi sint, ad lætitiâ, qui calidi & sicci ad iram, qui frigidi & sicci ad melancholiâ, qui frigidi humidi ad pusillanimitatem proni existant. Et licet temperamentum ab insitis causis à parentum semi-

semine profectum, suas per etatem mutationes acquirat, non tamen adeo perueri, quin ortus sui semina & scintillas toto quoad viuimus tempore, proferat. Nec externarum causarum impulsu adeo posse immutari, vt viuente homine (nisi existimemus hominē ratione cibi quoque in bestiam aut animal brutum conueri posse) illud penitus aboleri nouumq; possit succedere. Secus alij humorum prædominio id potius fieri autumant. Et sanguineos hilares, biliosos iracundos, atra bile percitos, melancholicos, pituitosos tardos animoque deiecto esse arbitrantur. Sanguis enim, cum calidus & humidus sit, si is exuperet, moderatione sua lætitiā inferre: & proinde eos qui ad lætitiā procliuēs sunt, eo abundare; & corpore ac pilis rubere. Bilem suo feruore & stimulo, iram concitare, proin biliosos, oris amaritudinem sentire, bilem vomere illiusque incommoda experiri, eorumque corpora pallescere, & pilos croceo colore tingi. Atram quoque bilem, sua natura & vapore tetramentem perturbare. Pituitam verò grauē & eiusmodi constitutiones ex illorum humorum inditiis potissimum cognosci. Verum ab exuperante humore, illos sanguineos, alios biliosos, alios melancholicos, alios pituitosos, in quibus hi scilicet humores abundant, recte dici, certum est. Sed quod humorum illæ redundantia, non semper confinibus sibi temperamentis respondeant, à quibus potissimum natura & constitutio hominis deducitur, manifestum quoque existit. Cum & bilis, & pituita, & sanguis, in quauis natura redundare possit, & Melancholiam Dementiam, Torporem à variis humoribus, non vno aliquo saltem excitari videamus. Et cum humores ipsi per se, neque functiones animi aut corporis edant, sed mediante duntaxat temperamento, & humores immoderatiū congesti vel vitiiati, interueniente morbo seu intemperie, actiones lædant; Verisimile videtur neque ab humoribus nisi quatenus hi temperamentum immutant, animi affectus intendi vel remitti,

(\*)

15. *An Sanguis quo nutrimur simplex, aut ex aliis diuersis humoribus sit compositus?*

**V**El eo nomine quoq; digna hæc est quaestio, vt veritas eius inuestigetur, cum licet de sanguine emisso, vel solus sensus iudicium firmum ferre possit, tamen variæ de illius compositione & mistione ferantur sententiæ: Cum alij illum non ex simplici sanguine, sed bile, melancholia, pituita perfusum, constare censeant; eaque bile, qualis in bilis vesicula flaua, summeque amara, à sanguine in secunda concoctione secreta, coaceruari solet, eoque melancholico succo, qualem à liene allici illicque colligi autumant; Pituitaque ea, qualis etiam extra venas excrementitia deprehenditur; quod tamen sensibus diiudicare & certi aliquid inde colligere, valde est arduum. Alij verò sanguinem non aliter, quam in tenuiorem crassioremque & crudiorē illius portionem distinguunt, & ne conceptam vulgè eam de quatuor humoribus opinionem euertant, bilis vtriusque, vti & pituitæ nomina illi accommodant, sicque appellari posse concedunt. Quod si verò nihil aliud in sanguine obseruent, cum hæc non sint diuersæ à sanguine partes, sed sanguis ipse hoc pacto saltem certis in sedibus ipsius differens, ex quatuor humoribus sanguinem componi, hoc pacto asseuerare minimè possumus. Cæterum si sanguinem penitus introspectamus & examinemus, deprehendemus vti in lacte, ita in sanguine diuersas partes, lactis portionibus non adeo ab similes reperiri, vt non immeritò Galenus sanguinem lacti compararit, atque ob partium in vtrisque similitudinem, lac dealbatum vocarit. Vti enim in lacte diu multumque agitato, segregatio- ne partium, per calorem factā, portio illius butyrosa pinguis, alia lactea & alba, alia caseosa crassa, alia serosa aquea apparet, sic & in sanguine concreto, serosa illius pars, ab eo seiuncta cernitur, & si rectius eum contemplemur, atque indagemus, pinguem quoque illius humorem, qualis è venis ad pinguedinis generationem exudare solet, & fibrosam carneamque, quæ caseo compari

rari possit materiam, præter sanguinem simplicem, in eo obseruabimus, ita vt si quis hoc negare velit, sensus ipsos illum negare necessum sit.

16. *An rectè Sanguis lacti comparatus constare quatuor partibus dicatur, substantiâ Sanguineâ seu Lacteâ, Caseosâ, Butyrosâ & Serosâ?*

**I**N sanguine portionem aliam tenuiorem, aliam crassiore esse, aliam medio modo se habere, non negauerim. Verum quatuor humores in eo distinctos reperiri eo modo, quo explicant, nimirum vt bilis in superficie, melancholia in fundo, sanguis in medio; dum concrescit, consistant, & præter illa crudior quædam illius pars inueniatur, hætenus non diiudicare potui, etsi millies sanguinæ emissum, dum adhuc calet, & postea quando concretus est, in sanis & ægris inspexerim & considerarim. Concretus enim, in sanis, æqualis ferè vndique videtur, ex rubro plus minúsve subnigricans. In superficie cuticulâ vti puls, cum refrigeratur, nunc tenuiore, nunc crassiore obductus, quæ pinguior non nihil & rubicundior esse videtur, per reliquam ipsius substantiam vndique ferè sibi similis: in ambitu seroso humore plus minúsve madens.

In ægris verò, aut alioquin iam ad morbos dispositis, bilioso aut crudo humore perfusus, qui sero magis quàm sanguini permiscetur, inæqualis & cum sero confusus etiâ refrigeratus adhuc manet. Alias verò concrescens, in superficie cutem crassam albam, tenacem, quâ totus obducitur, profert, quam pituitam esse existimât. Ego verò pinguiorem illius portionem esse iudico, in otiosis frigidis, maiori copia, quàm in aliis coacervatam, sed crudam non nihil adhuc, quali videmus corpora leucophlegmatica intumescere. Itaque rectiùs in sanis sanguinem lacti, qui ex sanguine generatur, omnesque illius portiones adhuc retinet, conferri posse existimo, & illius portionem aliam serosam esse, quæ dum calet, omnino illi confusa est, cum verò concrescit, separata cernitur, vt & in lacte separata serum dicitur. Aliam verò pinguiorem, quæ lactis butyro comparatur,

& sicuti in lacte dum refrigeratur, in superficie hæret, sic & in sanguine cernitur: copiosius, si magna illius emittatur copia. Estque hæc illius pars, ex qua adeps totius corporis generatur, & medulla in ossibus, pro quorum omnium consumptionis repositione, insignis ipsius portio requiritur: Quod reliquum in sanguine est, corpori nutriendo idoneum, Caseosâ lactis substantiæ, siue recoctum ex ea fiat, siue caseus, comparatur, quæ & maximè alit. Præter hæc in sanis nihil vel oculatissimi obseruabunt. Ex sanguine quoque lac fit, ex singulis ipsius partibus singulæ lactis partes. Magnum quoque argumentum est, sanguine easdem quas & lac partes habere, illiusque partes istis persimiles esse: quod vti lac sic & sanguis concrescit. Et quod iisdem remediis sanguis & lac concreta, seu in grumos versa dissoluntur, vti & Diosc. docet in simplicibus, quæ illud præstare debent, explicandis. Dein quod vti & lac, sanguis quoque in alimentum, quo nutrimur cedit. Hoc idem in aliis quoque succis inuenitur, vt lacte amygdalino, cuius quoque oleosa, serosa & caseosa est pars.

17. *Cur Fel, humores, excrementa, & quæcungq, tenacia sunt & glutinosa, fluida reddat?*

**S**anguinem (qui per se glutinosus est, & facile adhæret, vti videmus, labia vulneris recentia iuncta, interuentu eius mox glutinari) fluidiorè reddit non tantum serum, sed imprimis fel, quod ichoribus suis sanguini seu illius sero semper confusum, vrinam tinctam efficit. Hoc enim eam naturam habet, & vim attenuandi & abstergendi, quod insignis ipsius amaritudo ostendit, vt non tantum excrementa intestinorum pituitosa & tenacia abstergat & proritet, sed & omnes humores & excrementa sero permixtum fluidiora reddat: quod pictores obseruantes, oleaginosi suis coloribus, qui ægrè è penicillo ducuntur, permiscunt à piscibus fella, in hunc usum ferè conseruantes, sic enim vel minimâ portione admixtâ, colorem fluidum & qui penicillo facile deducitur, vel pennâ quoque scribitur, reddunt.

18. *An humor quo substantia corporis, quæ  
continuo absumitur, reparatur, similis  
huic, è quo generatur  
existat?*

**L**icet sanguine nos nutrirī, omnibus in  
confesso sit, attamen cum non nisi ma-  
gnâ factâ eius mutatione id fiat, nouam qua-  
si formam induit, antequam substantia de-  
perdita inde reparari possit, quæ cum semi-  
ne partium principio, similitudinem quan-  
dam habet, quippe quod illius humoris est  
excrementum, vnde partes quidem de-  
perditæ reparantur, non tamen de nouo  
ob succi & seminis aliquam differentiam  
generantur: sic enim in infinitum dura-  
remus.

19. *An calor innatus elementaris sit,  
vel celestis?*

**T**rita & recepta est hæc apud omnes fe-  
rè opinio, animata omnia, quatenus a-  
nimo & corpore constant, ex anima ele-  
mentorumque mixtione constari, & præter  
hæc ad compositionem illorum nihil acce-  
ders. Vnde & calorem innatum, à quo vi-  
ta omnesque functiones proficiscuntur, ni-  
hil aliud esse, præter temperiem cuiusque  
partis, ex elementorum qualitatibus rectâ &  
æquali portione profectam, afferunt.

Verum cum videamus in iis corporibus,  
quæ calore hoc prorsus destituta sunt, vel-  
uti sunt corpora emortua, elementarem ta-  
men calorem adhuc aliquomodo permane-  
re, alioquin enim nec structuram nec figu-  
ram ullam retinerent: verisimile videtur ca-  
lorem hunc, per quem vita inerat, non ex  
prima elementorum mixtione, sed aliunde  
ab ortu occulto fluxisse. Vnde & vniuersa  
inanimatorum genera, etsi igneo calore vi-  
gent, tamen calore vitali destituta, minime  
viuunt.

Cum multa inter ea quæ inanimata sunt,  
igneum hunc calorem adeo vehementem  
possideant, vt nos vrant, qualia sunt arse-  
nicum, sublimatum &c.: & tamen vita-  
li hoc calore destituta sepulta iaceant. Et  
in viuentibus corporibus, per febres cerna-  
mus igneum hunc calorem dominari, sicuti

& in partibus quibusdam supercalefactis,  
natiuum verò calorem summè labefacta-  
tum, atque igneo exuperante, tandem ex-  
tingui. Quæ omnia diuersum quid, ab igneo  
elementari calore, calorem hunc innatum  
vitalem esse, atq; aliunde quàm ab elemen-  
tis primam traxisse originem, demonstrare  
videntur.

Ex allegatis & probatis videre licet, fru-  
stra & temerè, vt caloris natiui restauratio-  
nem, sic vitæ prorogationem Medicos seu  
potius Empiricos aliquos audaces falso il-  
lorum receptiunculis, ex auro, lapidibus pre-  
tiosis, margaritis & quicquid pretiosi ab In-  
dis petitur, concinnatis, acceptum referre:  
quibus iuuentutem prorogare, senium re-  
tardare, mortemque ipsam, si Diis placet,  
impedire se posse impudenter asseuerare  
non erubescunt, aurumque portabile, vt por-  
tatile acquirant, eo titulo, maximo precio  
vendere. Quid de illo dicam, quem non pu-  
duit in libello, quem de vita longa inscripsit,  
hoc facinus prodere, se hominem viuum so-  
la arte Chymica posse efficere, &c.

20. *An tres sint spiritus, vitalis, ani-  
malis, naturalis?*

**S**piritus corpus nostrum gubernantes,  
duos esse extra controuersiam est, quo-  
rum vnus vitalis dictus, in corde genitus,  
vim viuificam, alter animalis, in Cerebro  
productus, vim sensitiuam subministrat; il-  
le omnibus partibus, cum omnes vitæ indi-  
geant, & sine eâ durare nequeant, hic illis  
tantum inest, quæ sentiunt & mouentur,  
cum hoc omnibus accidere non necesse  
fuerit.

De tertio quem naturalem vocant, dubi-  
tatur: verum cum partium solidarum sub-  
stantia, ad nutritionem non solum sangui-  
ne, sed & Spiritus cuique parti similari con-  
genitus, spiritus insuper influente, cum san-  
guine, qui & eum alat & conseruet, opus  
habeat, videamusque sanguinem per se-  
ctam venam, spiritus quo refertus est im-  
petu salientem, proflile, spumofum & fer-  
uidum esse, omisiss multis aliis argumen-  
tis, de eo ambigere inconcinnum admo-  
dum esse viderur. Ab eo itaque quem na-  
tura-



turalem spiritum vocant, cum primus in generatione occurrat, reliquisque materiam & pabulum subministret, principium facientes. Hunc in hepate adiuuantibus & venis, una cum sanguine generari, atque ex puriore magisque aërea chyli portione, attenuata & in spirituosam substantiam conuersa prodire, verisimile videtur. Vti & spiritum hunc non solum in humore fluxili sanguineo illo residere, vbi si tantum hæreret, fundamento labili innixus, facile diffunderet, sed & in hepatis venarumque substantia, solidarumque partium omnium totius corporis, spiritum insitum fouere; spiritus præterea naturalis necessitatem demonstrant nobis partes, quæ sine eo ali sustentariue non possent, neque excludo ossa, cartilagine, ungues, pilos; Verum & eiusmodi omnes partes, cum vitæ æque ac alimoniam indigeant, spiritu insuper alio vitali nuncupato, opus habuerunt, qui spiritum ipsis insitum vitalem, partium quoque formam constituentem, foueret, & dissipatum repararet. Quem spiritum vitalem influentem, ex solo sanguine, è dextro cordis sinu, per cæcos meatus in sinistrum cordis ventriculum transfudante, gigni plerique crediderunt, neque ad illius generationem inspiratum aërem, materiam aliquam conferre, sed tantum refrigerij cordis causâ, eum attrahi. Alij verò ex sanguine, è dextro cordis sinu in pulmones effuso, illicque mixto aëri per respirationem attracto, indeque rursus in sinistrum cordis sinum remeante, illum prodire, verius existimarunt. Nec dum solum eum sanguini arterioso perfusum, sed & cordi arteriusque insidere, statuerunt. In quo peculiare hoc obseruandum, quod spiritus vitalis, licet non ad extimas vndique sedes arteriarum beneficio penetret, quæ non vti venæ in capillares ramos, vt vocant, exiguos disperguntur, nec eas proin ad extrema usque corporis comitantur, sed in profundo illius adhuc desinunt & finiuntur, illum tamen non sine subiecto, ab arteriarum sinibus ed permeare, & quasi euolare, sed confusum sanguini venarum, tum manifestè in cerebri sinibus, in quibus & venæ

& arteriæ suum sanguinem confundunt, tum in liene, vbi eadem sit permistio, tum in habitu corporis arteriarum osculis, cum venarum osculis conuiuentibus, ita cum sanguine & spiritu naturali, ad singulas partes deferri. Quæ notatu digna atque elegans est obseruatio. Sed nunc ad animalem spiritum nos conferamus, qui partibus sensibilibus tantum communicatur. Hunc ce implexu quodam exiguo, ex arteriarum vtputarunt myriadibus contexto, generari existimant, cum tamen vix pisi magnitudinem hic implexus adæquet, & carunculam potius quam, quàm tale quid referat. Alij ex sanguine, spiritu tam naturali quàm vitali referto, suam trahere originem, inque cerebri sinibus, quo à venis & arteriis infunditur, elaborari docent, nec eum in ventriculis cerebri excrementis illius potius, quàm hisce vsibus destinatis, consistere, aut neruorum meatus cæcos, nulloque pacto conspicuos peruadere, sed vndique in solida cerebri neruorumque substantia sedem sibi figere, sicuti hoc alibi diffusè demonstrauimus.

*21. An partes principes sensu prædite sint?*

**S**Entire quidem hæc organa, maximis & præcipuis functionibus destinata, hæc comprobare videtur, quod cerebrum offensum, quæ à malignis euaporationibus prodit, persentians, dum eam excutere nititur, conuulsuos enormes motus edit: Corde insuper venenatis qualitatibus irritato, animi deliquia synopesque sequantur: Hepate perniciosis exhalationibus molestato, noxæ similiter oriatur. Quod sanè nisi has iniurias persentisceret, minimè accideret. Verum quoniam sensu hoc fiat, maximè quæritur, an ex animalium quinq; sensuum numero illo, quem sensum tactus vocat, qui per præcipuas corporis partes dispersus, rerum qualitates maximè efficaces percipit, an naturali solū? Sensu tactus si destituantur hæc instrumenta, certè per eum hæc minimè sentient. Verum carere hoc sensu, plurima demonstrare videntur, è quibus præcipua. Quod nec Cordis aut Hepatis subitanea, ex parenchymate constans, non vt aliæ partes membranæ &

neruosa nervos, à quibus sensus ille diman-  
nat, recipiant. Et cerebrum ipsum, licet ner-  
uorum sit principium, quia tamen sibi ipsi  
nervos eiusmodi sensorios minimè distri-  
buit, illis quoque destituatur. Accedit quod  
cum partes hæ in intimo corporis lateant, &  
proin tutè ab iniuriis existant, aut si illis gra-  
uius lædantur, interitum sequi necesse sit, eo  
minimè cum perferre nequiuissent, opus ha-  
buerint. Naturali itaque sensu, quo & reli-  
quæ partes illud sibi iucundum alliciunt, uti  
alimenta, vel ingratum respuunt, has princi-  
pes partes quoque res persentire, iisque vel  
delectari aut molestari, verisimile videtur.

22. *An Cerebrum motu manifesto mouea-  
tur, aut aërem respiratione  
admittat?*

**C**erebri substantiam propriis viribus mo-  
tu manifesto dilatari & subsidere, aë-  
remque cum dilatatur in se recipere, pleriq;  
existimant: quod verò minimè fieri, hisce  
argumentis demonstrabimus.

Primum quod ipsa cerebri substantia, ex  
parenchymate conflata, non sit ita formata,  
ut motu manifesto, sicuti cor, pulmones, ar-  
teriæ, sinusque cerebri meningum, qui ar-  
teriarum munus obeunt, per systolen &  
diastolen, in se contrahi rursusque dilatari  
queat; est enim continuum & solidum ip-  
sius corpus, nullis fibris carnosus, uti cor,  
aut membranosis, sicuti arteriæ, sinusque  
meningum cerebri, intextum: aut fungo-  
sa ipsius veluti pulmonum caro, quæ sanè,  
ut viscus aliquod in motu aliquousque ex-  
tendi, & rursus in se remeare possit, requi-  
runtur. Nisi enim pars ex fibris, veluti  
pannus ex filis mutuo arctissime iunctis,  
contexta esset, non posset siue propriis viri-  
bus dilataretur, aut vi aliena traheretur, ci-  
tra diuulsionem ipsius substantiæ aliquous-  
que dilatari, multò minùs admodum assur-  
gere, cum hoc fibris singulis tantillum à se  
in vicem cedentibus fieri necesse sit: Nec  
pulmo adeò diduci posset, dum mouetur,  
nisi fungosa & porosa ipsius esset caro, &  
non compacta, uti cerebri. Quæ prædicta  
cum requirantur in viscere, quod motu ma-

nifesto extenditur, rursusque concidit, ce-  
rebrique substantia nec fibrosa aut mem-  
branosa sit, nec fungosa, sed medullosa, vn-  
diquaque sibi similis & continua, eam proin  
inhabilem ad motum, motuque manife-  
sto minimè moveri posse, constanter affir-  
mamus.

Aërem quoque etsi moueretur, minimè  
tamen alluere cerebrum, aut intra suam  
substantiam recipere posse, cum compacta,  
nec fungosa sit, similiter demonstrat, uti  
neque in suam cavitatem seu ventriculos,  
cum nullibi ad hos detur via, quæ non aliis  
occupata sit, atque aërem tantum per os &  
nares cum respiramus, attrahamus, quæ  
respiratio cum motu voluntario aliquan-  
diu cohiberi queat, cerebri verò motus si  
adesset, naturalis esset, nec cessare posset,  
quo tempore aëre priuaretur, moveri ne-  
quiret: Aërque inter respirandum omnis  
ex narium & oris amplitudine deorsum  
per fistulam in pulmones, non sursum ad  
cerebrum feratur, quo certè per olfactus  
organia angusta & occlusa, tum in osse  
cribroso, tum illud integente crassa cere-  
bri meninge, parte exsculpta, si penetra-  
ret, quod difficulter tamen fieri posset, ta-  
men inde non in cerebri substantiam, sed  
inter cerebri substantiam & meningem il-  
lius collectus, nullum usum præstaret, sed  
potius frigiditate actuali, quæ cerebro ini-  
mica, illud læderet.

Neque enim alium usum aër, cere-  
bro si ad illud perueniret, præstare pos-  
set, sicuti in pulmonibus, ubi eum san-  
guini permisceri, ad spiritus vitalis gene-  
rationem manifestè apparet, in cerebro  
verò ad spiritus animalis procreationem,  
cum ille ex sanguine spirituosus purissi-  
mo in cerebri sinibus contento, indeque  
per tenuem meningem cerebro vndi-  
que communicato, in cerebri substan-  
tiam suam trahat originem, nec possit  
ex aëre tam crudo nec prius elaborato, ge-  
nerari.

Quod verò sternutationem attinet, ex  
qua aërem in cerebro contineri probare co-  
nantur, ab eoque cum sternutamus excuti  
docent, illud quoque veritati minimè con-  
sonum

sonam, cum sternutatio valida sit exsufflatio, à pulmonibus & thoracis musculis, aërem vi per os & nares cū vociferatione expellens, qua ratione, si cerebrum concuteretur, ut aërem expelleret, nō sine magno hoc fieret periculo, quod fortē metuentes, ex sinistra hac opinione, sternutatibus tanquam in periculo versantibus, bene precari solent. Nec quoddam lachrymæ ex oculis & pituita è naribus inter sternutandum excutuntur, aërem è cerebro excussum, hoc efficere probari potest, cum aër à pulmonibus per nares vi protrusus, humores illos in narium amplitudine contentos, simul propellat, magnaquæ illa concussio lachrymas ex oculis proliciat, quæ & leuiori commotione facile exstillant.

Ex quibus omnibus patet, cerebrum minimè moueri motu manifesto, sed sinus tantum illius meningibus innatos, qui arteriarum modo pulsant. Quem pulsus cum in infantibus, dum caluaria nondum penitus coaluit, mox in vertice, in loco quem zeudes vocant, tactu deprehendant, ex eo coniectare, cerebri substantiam sic moueri, ceperunt. Quod & aperto cranio, viuente adhuc animali, tantum vbi illi sinus feruntur, & non in aliis cerebri sedibus, motum hunc pulsantem obseruari, certius cognoscitur & obseruatur.

### 23. Somnus quomodo fiat.

Somnus naturalis est animi quies per se, quo quiescente, corpus quod etiam non dormiendo quiescere potest, melius quiescit, proin ex accidenti illius quies; Hunc inuitat Lassitudo operationum animi & corporis, neque à vapore, nisi per accidens, tanquam causa adiuuante, euenit. Cuius rei tres à me ponuntur rationes. Prima; Quæ causas naturales habent, non ab iis quæ præter naturam sunt, proficiuntur. Vti & de fame & siti alibi dictum: Secunda; Somnus post lassitudinem inuitat, & nos vrget, etiam cibo non sumpto: Tertia; Quia qui post cibum mox obripit somnus, cum non naturalis sit, deterior existit, ob vapores in quibus sæpè narcotica vis, maxime ob vinum assidue potum.

### 24. An somni vigiliarumve tempore concoctio citius procedat?

Tempore somni minus concoctionē promoueri, quam vigiliarum, hoc quoque ostendit, quod in bradypepsia, noctu concoctione facta, magis laborant, quam interdiu quod in hydropicis cachecticis, incubo laborantibus, videmus accidere, qui noctu frequentius, non recte facta concoctione, post primum somnum afficiuntur, quam interdiu post meridiem eā facta, nisi superdormiant, quo tempore etiam magis læduntur.

*an in humor crystallinus Visionis, tympanum Auditus, lingua Gustus, nares Olfactus, cutis Tactus sensus prima ria sint instrumenta?*

Sensibus omnibus tum interioribus tribus, Rationi scilicet, Imaginationi & Memoriae, tum exterioribus quinque, Visui, Auditui, Olfactui, Gustui, & Tactui, certa instrumenta, vti reliquis omnibus functionibus, natura condidit, eaque vel in capitis interioribus recondita & abstrusa, quale est cerebrum, sensuum interiorum organum, aliàs aperta & patentia, ut sunt oculus Visionis: aures Auditus: Nares Olfactus: lingua Gustus, cutis Tactus instrumenta. Verum cum quædam inter hæc organa ex pluribus partibus componantur, è quibus aliquæ primariæ sunt, quæ actionem ipsam perficiant, aliæ verò ad functionem rectius edendam opulentur, non immerito quaeritur, quænam præcipua in singulis pars seu organum, sensus percipiens existat? Cerebrum ipsum caluariæ amplitudinem adimplens, nobiliorum interiorum sensuum instrumentum esse, rerum speciebus excipendis, iisque dijudicandis retinendisque comparatum, ut multis argumentis probari potest, sic inde maxime patet, quod eo hæso, eiusmodi functiones aboleantur vel labefactentur. Hoc autem propriâ suâ substantia perficere, spiritu animali perfusâ & impletâ, vel hoc ostendit, quod simplex sit parenchyma, nec ex aliis partibus compositum. Quod cum in homine tam magnum sit, molequæ sua Cerebrum omnium reliquorum animalium cerebra

vincat, quod Ratione etiā homo illa exsuperet, causa est, talisque à plerisq; illius statuitur, vti & non vna aliqua pars illius, Memoria, alia Imaginationis sedes, sed indistincte horum sensuum quoque vti rationis, sicuti demonstrari posset, organum, & veluti sigillum est, in quo rerum imagines conceptæ imprimuntur, retinenturque. Hoc vti Cerebrum in interioribus sensibus, ita quoque in quinque exterioribus molitur, illorumq; primarium fit instrumentum, sensibilia percipiens, sed diuerso modo. Nam è basi portiones substantiæ suæ emittens, nervos appellatos, eos ad instrumenta alia, sensibus excipiendis, nondum tamen dijudicandis parata, nunc vicina in capite, nunc etiam distantiora, per vniuersum corpus dispersa emittit, vt per hosce illius emissarios, non tantum spiritum animale illis infundendo, vim hanc sentiendi conferat, sed propriam substantiam quæ illud efficiat, spiritu quidem animali refertam, non tamen ab illis aliò diffusam, tribuat.

Hoc primum in Olfactu exercendo efficit, per nervos geminos, è basi sua anteriore sede in cavitates geminas, ad odores percipiendum pertusas, productos illicque latentes, nec extra caluariam deductos, cum odores rerum subtilissimi facile & in momento penetrare queant, ita vt nares ipsæ, nec eas inuestiens tunica, etsi canalem per quem odor rerum comprehensus, sursum fertur, constituent: olfactus tamē organum illum percipiens, statui minimè possit.

Simili modo in Auditu ad sonos percipiendos, Cerebrum neruum in anfractus Caluariæ ossium petrosorum ablegat, qui se per eos diffundens & dilatans, sonos excipit atque dijudicat, nec tympanum, vti nec ossicula tria Auditus artificiosè cōstrueta, cum ex neruo minimè consentur, illud possunt efficere, sed aliis vsibus, vt sonus rectius neruo auditorio offeratur, destinata sunt. Hoc cum in hisce fiat sensibus, nonne verisimile idem & in cæteris fieri, primumque in oculo, cui neruum opticum dictum Cerebrum, extra caluariam, in vtrumque oculum implantatum, ablegat, non vt oculum spiritu animali ad Visionem percipien-

dam, perfundat, atque humoribus vel membranarum vim videndi tribuat, sed vt in semiglobum tōcauum dilatatus, species varias, splendore suo oculi foramen, quod pupillam vocant, subeuntes, & humore lucidissimum CrySTALLINUM illuminantes, per hoc perspicillum illi oblatas excipiat, percipiat atq; agnoscat.

Hoc pacto & Gustum neruus peculiaris à Cerebro extra Caluariam missus, & non solum in membranam crassam quæ linguam inuestit, sed & palatum œsophagumq; succingit, dilatatus, huiusque membranæ latoris, non minimam partem atque substantiam efficit, sentit illiusq; verum & proximū est instrumentum. Quod si itaq; in quatuor enarratis sensibus, neruus veluti Cerebri pars & substantia, spiritu animali perfusa, proprium illorum est instrumentum, in sensu Tactus idem fieri necesse est. Cuius cum per vniuersum corpus sit dispersus, non vnus aliquis neruus, atque exigua hæc Cerebri portio, vti in cæteris sensibus organum esse potuit, sed plures ad illud nerui, maiorq; proin Cerebri moles, vt per totum corpus diffunderetur, requirebatur, & proin ad sensum Tactus, Cerebrum amplam illam medullam dorsalem, atque ex ea tum in caluaria, non solum cōiugationes neruorum, sed & extra caluariam, infinita neruorum paria emittens, per vniuersum corpus ita distribuit, vt ad sensum tactus exercendum, tum cutem externā, quæ neruea est, constituent, tum intrinsecus dilatati, viscerum, Ventriculi, Intestinatorum cæterorumque crassam substantiam efforment, tum membranas interiores sensiles, quæ partes multas comprehendunt, tum tunicas tenues visceribus obuolutas, quæ partes membranosæ, non eò, quod spiritum animale admittant, sed quod ex nerui substantia consentur, meritò proin tactus vera instrumenta censenda sunt, tum in partibus quæ motu voluntario minimè aguntur, tum illis quæ eo mouentur, musculis scilicet, qui vti à fibris & membranarum neruosis, è quibus consiti sunt, constant sensum tactus, ita ab iisdem spiritu animali perfusis, vim mouendi accipiunt. Ex quibus ita euidenter demonstratis, concludimus;



Instrumenta seu organa sensuum tam internorum quàm externorum proxima, esse, Cerebrum cum suis partibus, nervis scilicet, neque in oculis, auribus, naribus, ore, corporeque reliquo alia statui posse.

26. *An miraculum censendum sit, quòd sonus innumeras aures impleat, species tam innumeras oculis excipiat, & phantasmata mens concipere possit?*

Quam & hoc admiratione dignum & stupendum est: Vnum sonum ex angusto hominis ore prolatum, tot mille hominum aures vno impetu implere, adeoque ut ab omnibus intelligatur, oppleri posse. Tot rerum figuras & colores, simul angusto oculi globo comprehendi, cernique & dijudicari posse. Tot phantasmata, tot rerum imagines, toto vitæ tempore visa, audita, animoq; concepta, exiguo Cerebri scrinio inclusa, retineri memoriæque commendari, quæ vigilantes denuò in mentem reuocamus, dormientibusq; per insomnia, nunc sola; nunc confusa, variis modis occurrunt.

27. *Mirum meritò haberi, ex tam paucis literis tam multa verba constitui, ex sonis paucis tot concentus, ex coloribus tot diuersitates.*

Verum & extra corpus humanum, quid admirabilius, ex tam paucis literis numero viginti quatuor comprehensis, tot syllabarum & nominum verborumq; myriades concinnari. Ex sonis tam paucis, tam diuersos concentus, tam multos & varios, voce, fidibus, fistulis exprimi & excitari. Ex colorum paucis generibus, cōmixtione horum, tot species inde enasci & depingi.

28. *An sensu tactus exquisito, homo omnia animalia superet, cum illa non adeò uti homines voluptate aut dolore afficiantur?*

Cum in quinque sensuum acumine homo à reliquis animalibus quibuscūq; superetur, ut visu, auditu & odore, quod ex effectu deprehendere possumus, siquidem aues rapaces, ea quæ procul absunt, cernunt ocu-

li, talpæ quibus oculi nulli sunt vsui, acutissime audiunt, canes odoratu mirè res quasuis percipiant.

Tactus tamen sensu hominem cæteris omnibus viucentibus sentientibus animalibus præualere exquisitissimo, multa comprobant, ob quam causam & debilis factus est, & voluptatibus ex contactu perceptis, magis quàm cætera animalia allectus abutitur, doloribusque grauioribus & pluribus, quàm illa afficitur, quos in variis corporis partibus per sentit, vnde & reliqua animalia non adeò cum maculantur, vociferantur, nisi fortè, non assuetim tractata inter vincendum & deiciendum cum arripiuntur, clamitent, ut porci: hædi verò & agni, ob tonsuram, (vbi Æsopus hoc pulchrè philosophis ostendit) minimè, nec dum iugulum ipsorum cultro perforatur, clamorem edunt. Præsertim verò ex eo, cum ægrotant, quòd non adeò uti homines, dolorem gemitu, aut alia voce vehementiore, aut clamore prodant, ipsa non adeò uti homines dolorem exquisitè sentire, facile possumus conijcere. Quo sine dubio, Deus Opt. Max. cum hominum causâ, creaturas varia ferre & pati, multæque ex illis misere quoq; maculari debuerint, ne grauius afficerentur, ipsis prospicere voluit. Vti verò hominem peccati causâ calamitatibus hisce magis obnoxium esse, æterna sapientia prædestinauit.

29. *An Pulmones in respiratione, motu naturali, propriis viribus, vel fuga vacui, ad thoracis motum moueantur?*

Creditum est hætenus, magnum illud viscus, quod in inspiratione dum thorax distenditur, attollitur, aëreque vndiq; impletur, thoracisque spaciū opplet, iterumque expirando, pectore constricto in se subsidet conciditque, aëremque follis alicuius instar per asperam arteriam tanquam canalem efflat, non alia illius vi, sed saltem ad euitandam fugam vacui, ad motum thoracis voluntarium, qui musculis perficitur, se accommodare, pectoreque ampliato, ne vacuum relinquatur, spaciū inane oppleri, rursumque ab eodem thorace contracto & angustato,

gustato, comprimī, aëremque sic tanquam è folle exprimi.

Verum cum multa sint argumenta, quæ validum & magnum hunc pulmonum motum, etiam ab innata illi quadam mouendi potentia procedere, ostendant, non immeritò à vulgata, & hætenus in scholis Medicis recepta opinione discedimus, sequentibus rationum momentis moti.

Primum, quòd in moderata respiratione, quæ frequentior est, veluti cum non loquimur, aut sonum edimus, vel dormimus, thorax vix dum, vel saltem tæpillum vt ferè non appareat illius motus, moueatur; atque talis respiratio, septi beneficio, vtpurimum perficiatur, pulmones tamen se dilatent rursusque concidant: ex quo apparet, thoracis cavitatem internam aded amplam esse, vt etiam si thorax non vehementer in respiratione se dilaret, pulmones nihilominus spatium mouendi obtineant. Nec enim ob septi solius leuem motum, hæc cavitatis aded ampliaretur, vt pulmo totus se tantopere dilatare cogeretur: neque etiam totum thoracem tunc impleret, sed tantum infimum thoracis spatium, quod aliquousque saltem vacuum, ex septi motu fieret.

Dein & cum in apoplecticis, motus voluntarius totius corporis penitus sublatus sit, vti & septi & thoracis, quomodo hisce immotis, pectoreque ne minimum dilatato, pulmo nihilominus mouebitur, cum nulum vacuum hic, hisce non ampliatis occurrat; videamus tamen respirationem, eamque sæpè validam in apoplecticis aliquandiu perseuerare, pulmonesque aded se mouere, necessitate impulsos, vt & ad thoracem aliquousque extrorsum, vt se dilaret, non ex voluntate nostra, sed hac vi pulmonibus indita, impellant, cum alioquin ratione musculorum, moueri minime queat.

Sed & magnitudo & pondus huius visceris, quo ferè non est maius in corpore, motusque quem obit vehemens, ostendunt, pulmonem fugâ vacui solâ, nisi innata illi accederet vis, aded attolli & dilatari minime posse.

Vti & cor ipsum, etsi inania circa ipsum sint spatia, nullo modo ob fugam vacui, sed

propriis viribus, sicuti & arteriæ, moueri constar.

Accedit & firmissima hæc demonstratio. Quòd etsi nullum in thoracis cavitatem sit vacuum, tamen pulmo in respiratione nihilominus moueatur; sicuti vulnerato pectore, vulnereque patente longo tempore, videmus accidere, vt per illud aër subiens, spatium thoracis non sinat esse vacuum, & nihilominus pulmo moueatur, quod minimè fieret, si ad fugam vacui moueretur, vti & follem pertusum non ampliùs aërem, cum dilatatur, attrahere obseruamus.

Licet autem ex voluntate nostra respirationem aliquandiu continere, vel eandem etiam concitatiores & frequentiores reddere, pulmonumque motum, hoc thoracis motu, vel impedire vel promouere queamus, nec illud tamen eos ad fugam vacui moueri comprobatur, sed hoc tantum sequitur, liberius eos ampliato pectore moueri, eoque constricto rectius in se subsidere; magisque verisimile, cum respiratio aërisque in ea attractio aded sit necessaria, quæ pulmonibus perficitur, pulmones primum innata vi ad motum concitari, & voluntatem nostram monere, & impellere, vt thoracem dilatemus, vt pulmo rectius in magnis præsertim exsufflationibus se possit extendere, aëremque copiosius haurire. Ob quam causam, etiam nil de ea cogitantes, vel etiam dormientes, pulmo ad motum sponte impulsus, nos vt thoracem dilatemus, vrget.

Sicuri & in alui deiectionibus accidere obseruamus, primum naturalem intestinorum facultatem expultricem insurgere, & ad excrementorum propulsionem stimulum addere, eamque voluntatem nostram, vt superpetias ferat, excitare: qua adiuuante, naturaque impellente, deiectio fit, similique ratione, & vrinæ emissio & foetus, vti dictum, expulsio, mistusque sic ex vtriusque motus obitur.

Ita ob necessitatem illam inspirandi aërem, pulmones motu proprio dilatatos, si magna fieri debeat inspiratio, vt thorax ex voluntate nostra illi cedat, voluntatem nostram sollicitare, rursusque in valida exsufflatione, thoracem vt pulmones validius il-

lud agant, veluti follem manibus solemus, ita hic thoracem comprimere animaduer- timus.

Nec, quod validus hic pulmonis & ma- gnus sit motus, eum non posse motu pro- prio hoc efficere, sed fuga vacui, comprobare poterit, cum naturales aliqui motus, vt nu- tritioni & generationi inferuientes, non ap- parenter & sensim fiant, sed & hoc etiam va- lidè propriis viribus, motu naturali, nulla ac- cedente fuga vacui, in cordis & arteriarum motibus fieri videmus, adeò interdum vio- lenter, in cordis palpitazione, vt costam inde disruptam, seu potius, vt nos putamus, luxa- tam, testetur Fernelius.

Imprimis etiam pulmonis cum corde & arteriis connexus, vasorumq; mutua com- municatio, è quibus vena scilicet arteriosa, atq; arteria venosa, pulmonum substantiam magna ex parte constituunt, vim hanc illi à corde subministrari posse, vt motu etiam proprio moueri queat, demonstrare & com- probare videntur.

Eoq; magis, quod & fungosa pulmonum, apta vt dilatetur & subsideat, sit substantia.

Non negamus interim, voluntarium huc thoracis motum, cum naturali pulmonum, in respiratione sic concordare, vt thorax se dilatando pulmonibusq; cedendo, amplius spatium, quò si pulmones latius extendere, aëreque impleri valeant, efficiat; & dum con- cidit, pulmones comprimendo, vt maiori im- petu follis instar pressi, aërem in valida ex- piratione exsufflent, adiuvet. Vti & quod pulmo thoracem aliquo modo possit impel- lere, vt si vel non opus sit thoracem vniuer- sum in leui respiratione moueri, nihilomi- nus illi tantillum cedere possit, vel cum om- nino motus ipsius, vt in apoplexia, est abolitus, tunc pulmonu motu tantum per- seuerante, thorax quoque ab illis impulsus, nonnihil assurgat.

Magnum argumentum etiam hoc est, pul- mones non fuga vacui, sed sponte moueri, quod et si portio illorum aliqua, interdum etiam maior, adeò vt sæpè penitus ferè vel semiabsumptus in phthisicis deprehendatur, nihilominus moueatur, cum tamen tunc va- cuum, quod thorace dilatato, in eo sequitur,

adimplere minimè possit, quod tamè requi- ritur, & aliquid fuga vacui, sequi, & in illius locum cedere debet.

30. *Virum respirationis & Excretionum al- ui, vrinae & sætus motus sint mixti, partim à natura, partim à voluntate nostra, à diuersis organis profecti?*

**M**otus partium corporis nostri in fun- ctionibus ipsarum edendis, alij sunt oc- culti, nec sensibus nostris patet, quales sunt naturales illi motus, quando pro nutritio- ne, vel etiam generatione succum conue- nientem alliciunt, excrementaque expel- lunt, quæ functiones per se nullo volunta- tis nostræ auxilio, à temperamento & facul- tate partium proficiuntur.

Alij verò motus manifesti sunt, in quibus partes ad motum dilatari, constringique vi- demus. Suntque vel naturales quoque, qui ex arbitrio nostro minimè dependent, sed natura sponte eos perficit, qualis est cordis & arteriarum motus, dein & pulmonum, quibus & cerebri motum adnumerat, quod tamen minimè moueri, sed sinus tantum ip- sius membranarum, arteriarum munere fungi, alibi ostendimus. Alij verò motus sunt voluntarij, qui à voluntate nostra tan- tum perficiuntur; veluti omnium partium seu membrorum, quæ musculorum ope se- cundum arbitrium nostrum flectuntur & extenduntur. Qui cuiuscunque generis mo- tus, si ab vna tantum parte sunt, motus sim- plices eduntur, vel voluntarij, vt partium qui musculis aguntur, vel inuoluntarij, vt cordis & arteriaru, qui à vi insita procedunt.

Quod si verò diuersa organa in motu con- currant, tunc functiones mixtæ exsurgunt: veluti in excretionibus alui, in quo motu, insurgit primum motus facultatis expultri- cis naturalis intestinorum, qui voluntatem nostram impellens, facit vt motus, per mus- culos epigastrii factus, accedat, & sic excre- tio partim vi naturæ, partim voluntate no- stra, misto motu perficiatur. Quod in partu, in foetus exclusione, tum ab expultrice fa- cultate vteri, tū musculis abdominis fit mo- tu misto, ab vtrisque organis profecto. Idem

in vrinae redditione, ab excretrice vesicæ vi, musculisque dictis accidit.

In respiratione præsertim mistum ex naturali motu pulmonū, & voluntario motu musculorum thoracis, eam procedere, atque utrumque simul in ea concurrere, respirationemque sic efficere, manifestum est, adeo ut eam voluntario tantum motu perfici, uti plerisque persuasum, asserere minimè queamus. Licet enim eam ex voluntate nostra reprimere, aut etiam, ut citius perficiatur, impellere aliquousque possimus, cum tamen solus thoracis motus, quin & pulmo simul moueatur, hoc non possit efficere, nec coactus hic thoracis motus, ex sola voluntate nostra pendebit: uti nec alui excretio, etsi & hanc ad tempus retinere, aut promouere queamus.

*Appendix quæ prioris questionis fusior tractatio, & an in respiratione cum motus sit mixtus, plus valeat natura quam voluntas?*

**Q**ua ratione motio, quæ per respirationē, expirando inspirandoque aërem, eaque quæ deiectione per secessum & vrinas perficitur, obeatur, an voluntas naturæ nostræ in iis agendis plus præstent, vel ex utrisque comixta quædam fiat functio, in quibus explicandis tam veteres quam neoterici, diutius & cum fastidio immorati, plus quam par erat, temporis cōsumpserunt. Nam cum in variis, qui ab animo corporeque nostro procedunt motibus, Alij solā naturā operante, per nutritionem, procreationemque ferè obeantur; Alij verò motu arbitrario voluntateque nostra perficiantur: Alij denique sunt, in quibus agendis & natura & voluntas nostra æquales vires conferre, interdum vna aliam exuperare videntur.

Quo modo & respiratio & deiectio, naturā virgente impellenteque licet fiant, voluntate tamen nostra reguntur.

Et ut de Euacuationibus primū dicam in genere, sub quibus & deiectio comprehenditur. Licet quædam inter eas occurrat species, in quibus natura sola eas impellere videatur, uti tussis & sternutatio, ructus & oppositus illi status, item vomitio: nihilo-

minus tamen musculorum beneficio, septi thoracis, abdominis, ut perficerentur integre, opus habuerunt, & pro illorum arbitrio vehementius aut segnius, citius aut tardius procedunt.

Imprimis verò in euacuatione, quæ per aluum & vrinas frequentius obitur, cum utrumque concurrat, an voluntas nostra vel natura plus possit, ambiguum est. Nam quod arbitrium nostrum hæc moderari intendere ve queat, quotidiana quemlibet docet experientia; imprimis tamen id, quod hisce excretionibus musculi uti aliis, qui motu voluntario mouentur partibus, præfati sint. Inter quos etsi præcipuè sphincteres connumerentur, eorum tamen munus ad excretionem minimè; sed retentionem duntaxat excrementorum accommodatum esse, ne inuoluntariè ea reddere necesse sit, anatomica docet consideratio. Quod tunc quando quiescunt, naturali quæ sita constricti sunt, nullo impellente stimulo adhuc, citra negotium efficiunt, excrementaque ne temerè profundantur, retinet: Rursumque cum ab iis quantitate redundatibus, vel qualitate stimulantibus sollicitantur, aut alias vehementi cōcussione corporis per tussim, sternutationem, vociferationem protruduntur, tunc contracti hi musculi, facile quoque, ne inuitis excrementa profundatur, continent.

Proinde deiectionē recti intestini & vesicæ, annulares hi ipsi præfati musculi, nullo modo promouent, eadem tamen necessitate virgente, minimè quoque impediunt, sed quotiescūque excrementorum vi impelluntur, ab iis laxati, non propriis viribus, cum vnus idemque musculus diuersas actiones præstare non possit, liberum illis exitū concedunt. Ad horum verò egestionem, imprimis constrictionem recti intestini & vesicæ, irritatis hisce excrementorum receptaculis ab acri biliosaque, quæ sæcibus permiscetur, materiâ, opitulari omnibus in confesso est. Sic enim veluti offensæ, ut id quod molestū est, propellant, fibræ inter se collectis, angustati atque in se concidentibus, materiam contentam tanquā manibus exprimunt. Quod munus fibræ non tantum transuersis, uti voluerunt, sed omnibus ut æqualis vndique ha-



rum partium fieret coangustatio, concredi-  
tum est. Fibrarum autem hanc collectionē  
à sola natura proficisci, nec voluntatem no-  
stram hic quicquam posse, hoc arguit, quòd  
quotiescunq; natura vel propriis excremen-  
tis, vel alimento aut medicamento purgare  
stimulatur, volentes nolentes ad excretio-  
nem sollicitemur, eamque diutius retinere  
nequeamus. Interea tamen cum eximius  
hic excrementa deijciendi motus, non tam  
leui negotio semper procedat, ut à natura so-  
la perfici possit, sæpeq; tum ob excremento-  
rum duritiem, tenacitatem, crassiorum præ-  
sertim, & stimuli interdum penuriam, ratio-  
ne materiæ, cum bilis aliò quàm ad intestina  
rapitur, vel sensus obrusus harum partium  
stimulum non sentit, eoq; nomine vel vnā  
vel plures ob causas deiectio fit operosa &  
difficilis, uti in multis constipationibus, alui  
præsertim, & vrinæ suppressionibus accidit,  
ut naturæ suppetias tunc adferret nostra vo-  
luntas: alia insuper instrumenta in hunc v-  
sum exstructa sunt, musculiq; abdominis, li-  
cet aliis vñbus quoq; destinati sint, huic mu-  
neri præfati sunt, quòrum beneficio, quādo  
ad excludenda excrementa, item fœtum, a-  
liq; conatu & labore maiore opus est, natu-  
ra ad id præstandum, cum sola minimè suffi-  
ceret, iuuaretur. His enim contractis muscu-  
lis, spiritu interim per septi distentionem re-  
tento, venter inferior vndique compressus,  
quicquid in se continet, deorsum propellit,  
atque tandem exprimit; adeò validè, ut am-  
biguum sit, naturā ne an volūtas nostra plus  
in hac operatione efficiat, vel an parem in  
hiscè peragendis nauent operam.

In excretionibus quidè, quæ certo tātum  
tēpore perficiuntur, tam voluntatem nostrā,  
quàm naturæ opus, in iis perficiendis mu-  
tuas præstare operas, est manifestum: in Re-  
spiratione verò, cuius motus continuò ho-  
rologij instar procedit, & dormientibus &  
vigilantibus nobis, sine intermissione ferè  
obitur, dubium adhuc relinquatur, cum nul-  
la eam sequatur lassitudo, atque illa seipsam  
sine nostro arbitrio mouere videatur. Quod  
qua ratione fiat, antequam explicetur, pauca  
de illius necessitate & agendi modo, erunt  
præfanda.

Respirationem ad vitæ conseruationem,  
cordi potissimū inferuire, huncq; illius esse  
primarium vsum, vel hoc saltem, quòd respi-  
ratione sublatā, mox cordis pulsus quoque  
cessat, homoq; extinguitur, certissimum ar-  
gumentum demonstrat. Quòd verò non alia  
ratione, quàm cordis calore per aërem in spi-  
ratū refrigerando, atq; per expirationē à fuli-  
ginosis excrementis repurgando, respiratio  
cordi vsui sit, pleriq; statuerunt. Verum si nō  
aliud longè excellentius, nobilissima hæc  
totius corporis functio, summeq; necessaria  
præstaret, non in tanto versarentur, qui re-  
spiratione priuati sunt, periculo. Cum cor  
nullo calore alieno aut immoderato, dum  
rectè se habet, neq; per iram aut febrem in-  
caluit, accensum, hoc ventilabro, aut refriga-  
rio minimè opus habuerit. Cum hi qui sub  
aqua frigidissima merfi sunt, quorum cor-  
pus admodum refrigeratū, calore nullo ab-  
undat, nihilominus respiratione intercepta,  
suffocentur. Cumq; etiā hi quibus cordis ca-  
lor labefactus est, & penè extinctus, non  
minus quàm quib' adauctus & vegetus ad-  
huc est, respiratione opus habeant, Et qui a-  
nimā agunt, in ipso mortis agone, corde pe-  
nitus ferè iam refrigerato, spiritū adhuc im-  
mò velocius maioriq; nixu sæpe ducant. Et  
quemadmodū naturalis cordis calor refri-  
gerio non indiguit, sic neq; ut excremēta il-  
lius, quæ atra & fuliginosa fiunt, expur-  
garētur, tā insigni functione opus fuit. Lon-  
gè igitur præstantiorem respirationis vsum  
eum esse, quo vitalis spiritus, per inspiratum  
aërem & attractum sanguinem in pulmoni-  
bus, hæc inspirationis & expirationis vicissi-  
tudine agitarum, cōmixtum elaboratumque  
continuò cordi pabulum subministrat, mul-  
tis argumentis possemus conuincere. Quo  
pabulo cum indefinenter cor ad spiritum vi-  
talem vniuerso corpori longè lateq; disse-  
minandum, opus habuerit, quotiescunq; illud  
dilatatur, nouam à pulmonibus haurit ma-  
teriam, quam nisi continuò suppeditet re-  
spiratio, cor extingui necesse est.

Proin & quādiu cor mouetur, tamdiu re-  
spiratione opus habuit, quando verò à motu  
cessat, uti fieri interdum videmus, tamdiu  
quoq; respiratio, viuere nihilominus homi-

ne quiescere potest. Ob quam causam, qui in syncopes animique deliquia incidunt, cum cordis motu, pulsuque penitus destituantur, toto eo tempore, à respiratione quoque liberi, minimè tanten suffocantur. Cum alioquin si respiratio in aqua submersis, aut laqueo suspensis, vel tantillum impedita maneat, cordis motu non prius cessante, illud interire necesse sit. Quæ tamen in iis, quibus per vteri strangulationem animi defectus accidunt, corde prius à motu cessante, interdum ad horæ vnius & alterius quoque spatium, vsque adeo est intercepta, vt nec pennâ leuissimâ naribus admotâ, aut poculo aquâ pleno pectori imposito, commotione vllâ respirationis vel tantillum remansisse, deprehendere queamus.

31. *An homines simul summè esurire & sitire possint?*

**F**AMES & sitis vehementia, simul eodem tempore coincidere minimè potest, easque qui admodum sitiunt, minimè esse famelicos, certum est. Vnde & videmus antequam perfecta fames sedetur nonnihil, non sitire homines. Neque enim hæc fames, aut illa sitis dicenda, quando citra verum appetitum ex mala consuetudine, hæc inuicem confundunt aliqui, atque antequam cibum capiant, bibunt, & cum vehementer biberunt, postea comedunt. Cum enim diuersa vtriusque causa existat, non possunt hæc simul in eodem subiecto ventriculo scilicet, consistere, vnde neque effectus simul concurrentes producere. Proficiscitur fames naturalis ex defectu materię solidioris, in ventriculo temperato, sitis vero ex penuria materię liquidæ, & calore ventriculi à cibo assumpto supercalescenti, vnde & sitis tunc non vrget, quando ventriculus crassior, vt nutriatur, cibum appetit. Sed quando tam satiatus, vt non tantum infarciatur, sed & cib⁹ in eo diluatur, & ventriculus à cibis calidis, salis, aromaticis plus minusve calefactus, refrigeretur, liquorem actu frigidum copiosorem pauciorẽve in potu experit. Ita vt in perfectè sana constitutione, sitis naturalis ferè tantum à cibo proficiatur, vnde etiam non sitiunt, donec co-

mederint, nisi alia accedat causa, vt calor externus, quæ sitis, sicuti iam dicitur, præternaturalis est. Et in fame præternaturali, cum ab acido & frigido succo bulimos fiat, atque à calore & siccitate ventriculi in febribus aliisque calidis affectibus sitis sit, vt qui bulimo laborant, potum non curent, & qui siti immensâ cruciatur, nullum penitus habeant appetitum, sed cibi fastidium.

32. *An tolerabilior fames siti?*

**P**ERCREBUIT vulgi hæc opinio, omnibusque penè in confesso est, non esse dolorem atrociorẽ, non supplicij genus magis horrendum & metuendum, quàm famẽ perire, à qua concepta persuasione, vel latum vnguẽ recedere piaculum sit. Quod quidem nullis rationibus, sed exemplis duntaxat illorum, qui diuturnis obsefsionibus pressi, aut carceribus inclusi, vel maris incommoda perpepsi, famis necessitate compulsi, cibis ab humano vsu alienis vesci nõ dubitarunt, tanquam certis & indubitatis, vt per se illa vera sunt, argumentis, comprobare nituntur. Omisissis enim antiquioribus historiis, nostra ætate Sanferrana illa non minus, quàm Hyerosolomitana omnibus sæculis memoranda & detestanda fames, huius mali grauitatem in Christianos, maiori crudelitæ, à proprio Rege, quàm Iudæos ab alieno Imperatore exercitam, satis superque declarat. Vbi extremâ inediâ fameque adacti, à cadaueribus & propriis quoque liberis (quod facinus incredibile videbatur prius, nunc autem rei veritate recenti memoria adhuc confirmatum, certò constat) minimè abstinerunt.

Atque consilium dante ipsis verbi divini Ministro Iohanne de Lery, qui in eiusmodi famis necessitate, remedia quædam, dum Americam perlustrarat, magnis cum periculis terrâ marique obitis, didicerat, ab eo edocti, in extrema hac ciborum penuria, calceos, coria, aliisque incredibilia, ciborum vſitatorum loco deuorant.

Ad quæ sanè perpetranda dictu horrendum nihil nisi extremus dolor & summa necessitas ipsos sine dubio adegisset.

Alij verò sitis molestias, famis difficultatem longè exuperare contendunt. Quod hi, qui per Arabiæ deserta loca & fabulosa, deuotionis ergò peregrinantur, tanquam experti fatentur, memoriæque prodiderunt. Testantur & hi, qui assiduis vehementioribusque exercitiis, aut motibus corpus accendendo, non minùs quàm ceruus sitiens, aquas, fontes riuulosque quærunt. Vel qui cibis falsis, ventriculum exiccando, aut aliis calidioribus condicuris aromatibus, vino forti, calefaciendo, sibi præternaturalem sitim, & immensum bibendi desiderium, quod explere vix possunt, conciliant. Maxime verò hi fatebuntur, qui febribus, ardentibus præsertim detenti, dies noctesque vnicam sitim conqueruntur, clamitant, aquam expectant, fontes somniant, maluntque, cum summo vitæ discrimine, vbi frigidam clamfuffurari possunt, & Medicos & astâtes, eam affatim bibendo, fallere, sicq; cum periculo, huic dolori mederi, quàm certâ salutis spe, longiùs eâ excrutiari.

Cum tamen constet, in nullis ferè morbis (si bulimum, qui rarus admodum est, demas) de fame ægros conqueri, aut saltem esurire, cibumve expetere: Sed potiùs appetitu ipsorum ferè prostrato, cibum omnem solidiorem refugere, imò iuscula liquidissima, quæ ipsis obtruduntur, reformidare, & ex solo ipsorum odore, nauseam concipere.

Mirum sanè in tam diuturna inedia, quâ ægri à cibis sæpè diebus pluribus, nonnunquam septimanis, interdum mensibus aliquot abstinent, vel parcissimè iis vtuntur, nullâ aliâ grauiori molestiâ, aut doloris acerbitate, affici, aut cruciatus præter solam imbecillitatem, à morbo potiùs quàm ciborum abstinentia profectam, perferre.

Sed in sanis contrarium euenire quis existimabit, famemque illis dolores intolerabiles parere, sine dubio iudicabit. Verùm si veritati potiùs credere, quàm semel cõceptam opinionem mordicùs retinere volumus, fateri necesse erit, eos qui esuriunt, molestiam quidem perferre, non tamen eam, quam dolorem propriè dictum, quis dicere possit. Eumque appetitum licèt vehementem, tolerabiliorem tamen sui ipsa, aut aliis dolori-

bus grauioribus, existere. Nõne necessitate impulsì, multi, affueri præsertim, vt Hispani, qui famem tolerare à teneris didicerunt, famem ferunt patienter, minori quàm in aliis cruciatibus, querimonia; Multi etiam sanitatis acquirendæ studio, morbosq; profligendi causâ, vel sponte, vel Medici cõsilio, dum abstinentiâ, quam dietam vocât, vtuntur, famem nunc mensis spatio, nunc ampliùs, voluntariè, citra clamorem aut insignem dolorem, modeste perferunt. Quidam etiam, inaudito & malo exemplo, inuentus est, ante paucos adhuc annos captiuus in vinculis detentus, in hac vrbe, qui vt morte voluntaria supplicium grauius, quod illi imminebat, anteverteret, genus mortis, quod ipse in eo loco & tempore facillimum esse cogitabat, elegit, cœpitque, ab omni cibo & potu, licèt serò à ministris reprehensus, ob id facinus & frustra admonitus, in vniuersum abstinere, famemque is, quod admirandum, citra omnem querimoniam, aut molestiam, quatuordecim dierum spatio patientissimè pertulit, quo tempore primùm poenitentiâ, sed serius ductus, ita vt cum cibum tum peteret, eum tamen respueret, citra grauius aliquod symptoma, expirauit. Et quod ille sæpè fatebatur, in longa illa inedia, nunquam tamen esuriuisse, vel ex eo id colligere licet, quòd in proposito perseuerauerit, neque doloris atrocitate motus, cibum quem etiam suauissimum offerebant, aut admiserit, aut doloris alicuius indicia quædam præbuerit, lamentando aut suspirando.

Vti & in cæteris, qui inedia longiùs ferunt, accidere, indies comperimus, pycnocolis præsertim, statim os amarescere, appetentiam ciborum dejici, vt cum postea velint, vix cibum sumere valeant, idque bile aliisque prauis humoribus, dum ieiunus diu & vacuus est stomachus, ipsum adimplentibus, appetentiamque dejicientibus.

Vnde sanè non mirum, illos imbecillitate potiùs (vti & senes faciliùs ieiunium pueris ferunt) omnem ob diutinâ famem, & edendi stimulum, aliasque functiones naturales amittere. Quemadmodum sanè iis, qui fame penitus intereunt accidere necesse est, vt antequam vitales functiones deficiant, (quod

morientibus vltimò accidit) prius naturales operationes, inter quas attractrix & concoctrix, primas tenet; & animales, quo & appetentiam referimus, cessent, atq; vt in morbis etià frequentius accidit, prius aboleatur. Quibus argumētis & rationibus moti, quod fortassis multis durū videbitur, non tamē à ratione est alienum; statuimus nō tantum sitim maiorem cruciatum, quàm famem inducere, verum dolores esse innumeros, qui nos tortoris alicuius & carnificis instar diuellūt, lacerant, pungūt & vrunt, quod facili hi, qui colicos cruciatūs & vesicæ ardores perpepsi sunt, iudicabunt: Hos inquam & siti & fame longē esse acerbiores, minusque tolerabiles. Eamq; molestiā quæ in fame & siti naturali adhuc percipitur, non grauius quā eam, quæ & in aliis appetitus & cōcupiscentiæ speciebus accidere solet, nos afficere. Perseuerante verò inediā vires dejici, labefactariq; animū, & tandem in iis quibus omnis cibū capiendi spes detracta est, mortis quadā apprehensione, & desperatione furorē rabiēq; succedere. Quibus conceitati potius quàm doloribus exagitati, ad ea perpetranda, quæ desperatis in animum venire possunt, animi quadam perturbatione & cæco iudicio impetuque quodā ferūtur. Quæ sanè hisce rationibus & demonstrationibus persuasus, cuiq; suo in ea re saluo iudicio, asseuerare non dubitauit.

33. *An aliquis sit lienis vsus excellentior eo, quem illi communiter assignant, vt melancholicum humorem recipiat & expurget?*

**L**ienis seu splenis hunc præcipuum vsum esse, vt atrabiliarij, excrementitij humoris, seu vt alij volunt, sanguinis melancholici sit receptaculum, cōmunis est opinio. Vnde & vulgus Medicorū existimat, mali aded esse succi, vt ab illius esu in cibis sit abstinedū, & adhuc longē stolidius putant, posse innoxie illum hominibus exsecari, eoq; tanquā abiecto & inutili viscere, eos carere, imò liberius tunc motus vehementiores currendo perficere. Quæ tamē partim ridicula, partim falsa esse, pleriq; norunt, illud verò quod maximē vrgent, de illius vsu, cum nec sensibus, nec ratione probari possit, licet in scho-

lis receptum, hisce argumentis motus, concedere nullo modo possum.

Primum enim, nulla vesica lieni pro humore atrabitario isto suscipiendo, vt in hepate pro bile, adnata vllibi, aut illi alicubi subijci apparet, quod sanè necesse foret, si excrementitius ille humor à reliquo illic sanguine secretus colligeretur, vt in talem vesicam per porū, vt in hepate cholidochū, vel vretes, vt è renibus, expurgaretur.

Secundò nec sanguinem, qui in liene continetur, esse atrabiliarium, aut crassius, qualem melancholicum vocant, si rectè eum intueamur, iudicabimus, licet enim dum in substantia lienis secta, aut diuisa se manifestans, nigrior esse videatur, non ided quod talis sit, sed ob compactiorem magisque fuscā splenis carnem vasorumque copiam, quibus inhæret, obscuriorem, talis apparet. Cum alioquin inde expressus, à reliquo sanguine minimè colore differre cernatur, credibileque sit, cum lien arteriis simul abundet, quibus hepatis substantia destituitur, eum & tenuiorem spirituosiusque, & proin lucidiorem eo, qui in hepatis venarum ramis continetur, existere, vt & reuera ramus hæmorrhoidalis, inde deductus, non alium in se continere, ex eo patere alibi docuimus, quod is, qui per hæmorrhoides in quibusdam viris emanat, tenuior, calidior feruidiorque, reliquo, quem tamen crassum atrum & melancholicum esse putant, deprehendatur. Dein & sinister venæ portæ rami, ad lienem delatus, & venæ exiles à liene ad ventriculū reflexæ, quas spleneticas putant, & melancholiam ventriculo infundere, ad appetitum excitandum excogitant, non alium sanguinem, quàm ille qui in dextro ramo, partim ad hepar defertur, partim per omentum & mesenterium ad ventriculū & intestina dispergitur, in se continere, quilibet lanius etià obseruare potest, & diligens inspector in sectione facile deprehendet.

Dein & ex animalium lienum qui coquuntur gustu, nihil tale, quod melancholicum aut atrabiliarium saporem referat, vel amaro, qualem bilis habet, vel acido, qualem melancholiæ attribuit, deprehendimus; sed dulcedinem quandam, in quibusdam aded sapi-



spidam, vt in delitijs habeatur, quod & de liene porcino, adfirmat Galenus, atque experientia testatur, vti & in vitulino, aliorumq; iuniorum animalium, in quibus omnes partes sunt teneriores.

Quod verò hoc viscus longè alium vsum, quam adeò vtilem, cuiusmodi illi attribuunt & quidem excellentiorem, nec minus fortè quam ipsius iecoris præstantem habeat, ex ipsius structura, si eam cum hepatis conferamus, conicere licet. Vti enim hepatis substantia ex parenchymate constat, sic & lienis, differens saltem ab illa, quod non adeò exactè, vti hepatis rubeat, idque, sicut dictum, quia cum minor sit hepate, copiosioribusq; vasis intertexta, fusca obscuraque ipsius substantia appareat, & cum hepatis parenchymati venisq; ipsi insertis, vis sanguificandi tribuatur, verisimile est eandem & lienis substantiam possidere.

Eoq; magis probabile hoc fit, quòd venæ meseraicæ, à ventriculo & intestinis chylum fugentes, & ad viscera & vasa, in quibus in sanguinem excoqui & elaborari debet, deferentes, in duos truncos collectæ dextrum in hepatis, sinistrum in lienis substantiam diffundant & disseminet, vt sicuti in dextro viscere, ita & sinistro, ipsius fiat elaboratio; quid enim aliàs vt chylus ad lienem deferretur opus erat, nisi à sinistro trunco chylum minimè excipi, statuere velimus, quod veritati haud consentaneum, in diuisione illa maiorum vasorum, hanc separationem posse fieri, vt ad vnum tantum chylus, ad alterum sanguis tantum feratur, cum vnus idemque sanguis, in omnibus venarum meseraicarum ramis esse conspiciatur, quem & à chylis, quem hæ venæ rapiunt, & in venis eiusmodi tam dextro quam sinistro latere, & ad nato illo vtrinque parenchymate, elaboratum transmutatumque prius huc refluxisse, necesse est.

Adeò vt non absurdè viscera duo sanguificationis statuere liceat, vtrinque sub septo ventriculo adiacentia, ab eoq; vti & intestinis subiacentibus, per venas meseraicas chylum rapientia eumq; elaborantia, qui postea ab illis elaboratus & in sanguinem conuersus, in venis meseraicis collectus, per dextrum

truncum venis maioribus hepatis substantiam peruentibus, in venæ cauæ ramos transumptus, vniuerso corpori communicatur.

Sed & ex situ horum viscerum demonstrare licet, lienem quasi alterum hepar, ad sanguificationem opitulari. Nam viscera in corpore collocata si in medio corporis sint sita, vti cor, ventriculus, vesica, solitaria sunt, si verò in lateribus collocata sint, gemina semper existunt, vti & renes tales esse cernimus. Sic & natura cum ventriculus inter vtrumque viscus iaceat, illi duo viscera parenchymate constata, apposuit, quorum alterum maius, cum ventriculus causa æsophagi magis in sinistrum latus inclinans, spatium hoc magis amplum implere debuerit, formaque se partibus adiacentibus, vti parenchymata solent, accommodare, alterum minus, spatium minus & à ventriculo occupatum adimplens, formaque se accommodans, compactum magis, & cum substantia ipsius paucior, firmiter tamen & sic ad vsum instructior existat.

Quin quòd lien quoque, præter venarum meseraicarum ramos, arteriis æque multis implicatur, secus ac hepar, longè præstantiorem lienis esse functionem, quam vt excrementitij humoris esset veluti cloaca, satis declarat, cum nisi id esset, ramulus aliquis, pro conseruatione illius, vti in hepate, sufficisset. Videturque hac ratione hoc factum, vti in opere nostro Anatomico ostendimus, vt sanguis arteriarum in liene cum sanguine, quem vena portæ defert permixtus, sanguis & venarum & arteriarum vires materiamque inuicem conferrent. Quod cum ad perfecti sanguinis, qui corpori nutriendo aptus esse debuit, elaborationem (cum arteriæ non ad omnes partes perueniant) vti & ad spiritus naturalis generationem, necesse erat, ideò & in ventre hoc inferiore, in liene & renibus, vti & in thorace in pulmonibus, & in capite, in cerebri sinibus, sanguis venarum & arteriarum confunditur, miscetur exactiusq; concoquitur, elaboratur, & repurgatur.

Imprimis verò lienem sanguificationis esse organum cum hepate, id manifestè comprobatur. Quòd morbi hepatis si in liene fiant,

vti frequentius serè accidit, vt sunt intemperies, obstruatio, durities, scirrhus aliæ ve læsiones, eadem prorsus symptomata, qualia si hepar illis morbis afficiatur, profert, veluti sunt icterus, cachexia, dyspnœa, tussis sicca, hydrops, &c. Nec dū si icterus niger sit, eum à liene proficisci, & proin atrabiliarium humorem illic contineri approbat, cum non ratione visceris hoc, sed prout bilis, quæ in folliculo hepatis continetur, vel flaua vel atra existit, euenit, sicuti in nostra praxi id demonstrauius.

Dein & curatio, lienis vsum ab hepatis non adeò discrepare ostendit, cum eadem remedia, ad intemperiem tollendam, obstruções aperiendas, durities emolliendas, in vtriusque visceris eiusmodi affectibus, atque hepatica & splenetica remedia, si militer in vtroque vsurpentur, nullumque discrimen inter hæc, nisi quòd fortioribus magisque aperiendis in lienis morbis vti debeamus, vel ea spleneticis esse permiscenda, doceant practici. Qui vim sanguificandi venis duntaxat acceptam referunt, inter reliqua argumenta etiam hoc adferre possent, quòd sanguis meseraicarum venarum, in ipsius venis mox ex chylo quem hauriunt, generetur, antequam ille ad hepar usque vel lienem perueniat, atq; in eo nulla chyli portio quæ alba est, permixta appareat, ita vt Chylus statim postquam has venas subiit, & in ipsa venarum, in ventriculum & intestina insertionem, transmutationem accipiat, eamque tantam, vt iam sanguis sit idoneus, ad nutriendas partes, eas quas venæ meseraicæ subeunt.

Verum quis tunc hepatis aut lienis esset vsum, si non hunc venarum meseraicarum sanguinem, venæ portæ propaginum, & qui inde in venam cauam per hepar deriuatur, elaborarent, sanè vix alium excogitare liceret, quàm fortè hunc, quòd cum illic vbi venarum diuersarum rami conuenire & coniungi inuicem debent, cum nudi consistere nequeant, parenchyma hoc illis, vt in eo immeri tutius incedant & hæreant, affundatur, vti & in reliquo illorum ductu affusa pinguedine concretâ, munita incedit, quòd & calore suo sanguinem in illis fouendo, ad

ipsius perfectiorem elaborationem iuuare queat, veluti in iecore accidit, vbi rami venæ portæ, & cauæ, inuicem in substantia illius complicantur. Idem in liene, vbi venarum meseraicarum propagines & totidem arteriarum in ipsius carne implicatæ, intextuntur. Sicuti & in renibus accidere videmus, venarum & arteriarum emulgentium ramos, in sinus renum substantiæ innatos infundi, simulq; illic commisceri, & pulmonum fungosam substantiam, venæ arteriosæ, & arteriæ venosæ, fistulisque asperæ arteriæ propaginibus vndique adnatam, hæc vasa sustentare & munire.

34. *An maius sit miraculum hominem qui nunquam exiit nasci, quàm qui fuit, per resurrectionem renasci?*

QVòd caro humana, quæ corruptione putredine in nihilum redacta est, in nouissimo die in integrum sit restituenda, & priorem suum statum sit receptura, animâ immortalis cum eodem corpore denuò copulatâ, pro summo DEI Opt. miraculo, vti reuera est, Christiani habent. Atque interim hoc quod æquè mirum est, quotidieque accidit, non admirantur, hominem qui nihil erat & corpore & animo in lucem produci. Quæ hominis procreatio, resurrectioni magnitudine rei & miraculo, cum aliquid quod non fuit nasci, quàm illud quod semel fuit renasci, maius sit, minimè cedit, imò exuperare videtur, & tamen homines quia consuetum hoc, quod singulis diebus fit, non admirantur, illud verò quod certò futurum est, adeò omnes suspensos tenet, vt etiam impossibile impiis esse videatur.

35. *An semen animalium acre sit & calidum?*

SEmen humanum acre esse calidumq; admodum, nec lactis instar insipidum aut dulce, hisce colligitur, quòd odorem vehementem habeat, erucæ instar vel nasturtij, & quòd in reliquis quoque animantibus, grauem odorem expiret, sicuti ex vesicis semine recipientibus, in Castore præsertim, Marte, Vulpibus & Mustelis, salacibus illis animantibus colligere licet; Secundò quòd collectum admo-

admodum stimulet uratque, vt ex leui imaginatione vel titillatione profiliat. Tertiò quòd loco motù & subsistens in meatu communi, citissimè illas partes accendat, & si diutius retineatur, arrodat, ardoremq; mingendi excitet. Sicuti illis quibus vel per insomnia Venerea, vel actus venereos, semen ad expulsionem irritatum, vel ex subitanea expergefactione, vel quia aliquid superuenit, impeditur, frequenter accidere animaduertimus.

36. *An ex semine solo humani corporis partes, vel etiam ex sanguine generentur?*

**P**ARTES humani corporis ex Semine tantum enasci, certis ac firmis rationibus demonstrari potest. Licet enim corporis humani duo statuatur principia, Semen nimirum & Sanguis, reuera tamen Semen solum illud est, è quo, sicuti Plantæ & Bruta animalia, ita & corpus humanum eiusque partes omnes primam originem trahunt, & materiam formamque nanciscuntur. Sanguis enim post conceptum, alimoniam saltem & materiam pro nutritione & autione partium subministrat, pari ratione vti Terra Plantis, ad generationem verò, planè nihil confert, siquidem, licet sanguine nunquam destituamur, partes tamen ablatae, regenerari nequeant. Hinc etiam liquet, nullas verè sanguineas, quasi ex sanguine generatas partes dici posse, cum earum substantia, quamuis rubra, ex sanguine tamen venarum, minimè constet; sed in primo conceptu ex tribus seminibus bullis, tres principes partes oriri, sicuti Hippocrates in reiecto Placenta, ita & ego aliquando obseruauì; Heparque quod præ cæteris sanguineam esse partem, & veluti sanguinem concretum vulgò autumant, ex bullarum vna progenitum.

37. *Quare menstruas purgationes mulier tantum ferè ex animalium genere habeat?*

**M**ENSTRA, hunc fluxum, quòd singulis mensibus fluat, vocant: & ad illius nominis imitationem Itali, Mestruo: Germani Zeit, id est tempus, vt & Itali, il tempo; quod

certo tempore: vel Menageit / <sup>gione</sup> struo tempore inuadat, vocat, Flores Fleurs Galli: & Germani quoque Blum / atque si tunc floresceret mulier, appellant: iucundo nomine, quod alioquin in mulieribus dedecus esse censetur, opprobrium hoc ipsarum regentes. Qua de causa & Rustici Rosariu, Rosenfrank / hanc purgationem nominant, atque Itali Marchese, magnifico nomine appellant. Hunc autem menstruum fluxum in foemineo sexu animalium, sola mulier ferè patitur: cum in ea sanguis copiosior quam proprii corporis nutritione necesse erat, vt cum nullum definitum concipiendi tempus habeat, præstò pro foetus nutrimento semper adsit, idèd tantà copiâ nasci debuit; & proin, ne mole sua læderet, singulis mensibus, quamdiu non concipit, expurgatur. Cætera verò animalia, quia non semper, sed semel ferè tantum in anno calant, hac sanguinis redundantia non opus habuerunt, nec sanguis, donec tēpus illud, quò ad conceptum, idonea fiunt, adsit, in ipsis adeò augetur: qui &, cum ferè semper concipiant, ad foetus sustentationem tunc quoq; retentus, non expurgatur. Nisi fortè magnà curâ, vt tunc animalia non congregiantur, impediat: tunc enim aliqua quoque, sanguinis portionem, per hæc loca reddidisse, in simia obseruauì. Quod & in canibus feminis, si à maribus arcerentur, accidere, in canicula paruula, quam domi habui, deprehendi: quæ cum quoties caluit, ne congregederetur, & concipiat, & in partu (vti in minimis istis caniculis, qualis illa fuit, fieri solet) moriatur, inclusa retenta fuit, è pudendo rumido tunc sanguinem, sed parua quantitate, cum & ipsa parua fuèrit, reddens, stratum cui incubuit, per dies aliquot cōmaculauit. Quod verò hoc in reliquis canibus, vti & cæteris animalibus, rariùs contingat, causa est, vt dictum, quòd quotiescunque calant, sanguisq; ille redundat, marem quærentes & admittentes, concipiant, vnde sanguis ille ad foetus enutritionem, mox retinetur. Ex quo & mulierem tantum eo tempore, quo menstruus sanguis collectus fluxurus est, ad conceptionem aptam existere, colligo; & quòd rariùs ob id, quàm cætera animalia, concipi-

vi frequenter tunc à virorum cōsortio maximè  
adhibere soleat, causam quoque vnam, cum  
prioribus in conceptu explicatis esse existi-  
mo.

38. *Quare mulier definitam Tempus, quo ad  
concipiendum & procreandum apta,  
vir verò nullum habeat?*

**I**n humano sexu, & mas & fœmina ad pro-  
creationem tunc apti & maturi sunt, cum  
semen maturum profundere incipiūt: quod  
aliis citiùs, circa ætatis annum duodecimū  
(Nam ea ætate & mares & fœminas pro-  
creasse, historiæ testantur) aliis tardius, circa  
annum decimum quintum accidit. Licet e-  
nim non consuetum sit, tam maturè, mares  
præsertim, matrimonij vinculo adstringere,  
hoc tamen non quod adhuc ad generandum  
inepti sint, sed aliis de causis, accidit: cum si  
maturè quoque, iuvenes adhuc admodum  
copulentur, liberos etiam generare expe-  
rientia ostendat. Verum tempus, quo ad ge-  
nerandum non amplius idonei sunt, non  
utrisque æquè contingit. Cum fœminæ de-  
finitus terminus, à quadragesimo ad quin-  
quagesimum vsque ætatis annum circum-  
scriptus constitutus sit: quo & suas men-  
struas, quandiu sanæ sunt, nec grauidæ, nec  
lactant, purgationes habent, eoque termino  
finito, illis destituuntur, nec amplius pariūt.  
Mares verò quamdiu sani sunt, toto vitæ  
tempore, ad procreationem aptitudinem &  
habilitatem in se habent. Quod ut multa  
exempla demonstrant; sic parentis & pro-  
pui, tanquam propinquiora adducere satis  
erit. E quibus genitor meus, post septuage-  
simum secundum ætatis annum, nouis nu-  
ptiis contractis, liberos sex, & postremam fi-  
liam anno ætatis octuagesimo secundo pro-  
creauit. Cuius auum, post centesimum vitæ  
annum, filium adhuc genuisse, & ad nuptias  
illius superuixisse, non solum ex illo, verum  
& aliis plurimis, qui illum nouerant, sæpè  
audiui. Cæterum causam huius Diuinæ or-  
dinationis, viro nullum terminum, mulieri  
verò certum definiente, idque à mundi pri-  
mordio (cum & tunc mulieres senes, pro-  
creare miraculosum, non naturale fuerit:

sicuti exemplo Saræ vxoris Abrahamæ demon-  
stratur) esse existimamus, ne humanum ge-  
nus nimium excresceret, & prouidentia Dei,  
quæ certum numerum eorum qui nasci de-  
buerunt, prædestinauit, hæcque etiam per  
naturales causas dirigit, factum esse, cum si  
mulier ad extremam ætatem vsque pro-  
crearet, in infinitum, quod nec terræ totius  
amplitudo alere posset, humanum genus  
excresceret: proin non, ut reliqua animalia,  
semper, neque tam numerosam sobolem in  
vno partu, ut illa, quæ infinitam sæpè, ut pi-  
scēs, procreant; sed vnam plerunque, rariùs  
geminam, rarissimè frequentiore generat.  
Atque in humano genere sæpissimè steriles  
omnino fœminæ inueniuntur, in animalibus  
verò paucissima: quæ quotiescunque  
coeunt, fere concipiunt; mulier verò coitu  
frequentiore vtens, etsi fœcunda sit, rariùs  
tamen concipit. Dein & cum mulier non so-  
lum semen, uti vir in primo conceptu; sed  
& postmodum ad fœtus augmentum san-  
guinem, & ad geniti enutritionem, lac tantā  
copiā & mensurā conferat (vnde etiam quæ  
pariunt, præsertim frequenter, & quæ la-  
ctant citiùs, quàm quæ steriles sunt sene-  
scunt) in senio iam exhaustæ, sufficere mi-  
nimè potuerunt: & proin ne penitus con-  
sumerentur, hæc meta illis commoda hac  
quoque ratione, vbi subsisterent, fuit posita.  
Ad quam vir, qui si modò moderatè à tene-  
ris venere vtatur, (quod, si senes adhuc pro-  
creare debent, necesse est) semen tantum in  
procreatione confert, & proin diutius, &  
quamdiu semen in illo gignitur, aptus ad  
generationem est. Atque ea ratione elegan-  
ter à Deo quoque prouisum, ut vir, qui nunc  
militiā, nunc aliis distractus, cum sua coni-  
uge non semper permanere potest; vel cum  
ea, quia sterilis non generat; etiam senex,  
vel primis nuptiis, vel secundis aut pluri-  
bus contractis, ad generationem adhuc,  
nisi defectus alij obstant, ido-  
neus existat.





## PATHOLOGICÆ.

39. *An aer vel cibus & potus in gignendis potiores vires habeant?*



**N**ECCESSARIA sanè de morborum causis præcipuis quæstio, atque vt scitu omnibus apprimè vilis, sic minimè à professione cuiusquam aliena.

Siquidem humanum corpus, humanis casibus subiectum, variis tanquam procellis toto vitæ curriculo agitur tempestatibus: Neque tantum, dum luce hac fruitur infinitis & ineuitabilibus pœnè causarum iniuriis expositum est, sed & ante ortum, semina insita quædam à parentibus dimanantia sæpe assumit, quibus non tantum fatali necessitate, ob elementorum ex quibus constamus repugnantiam, & humidiprimogenij, siue olei & caloris natiui consumptionem, sensim ab ortu ad interitum naturali vitæ cursu declinamus: Sed & vitia quædam hereditario quasi iure à parentum semine mutamur, & toto vitæ curriculo instabili & anticipiti constitutione fluctuantes, morbosam vitam agimus; ita vt leuissima de causa, hi quibus eiusmodi misera contigit conditio, morbis affligantur doloribusque exagitantur.

Post ortum verò, quàm innumeris subiecti sumus malis? partim necessitate, partim voluntate nostra, & studio attractis, partim casu & fortuito nobis impendentibus, à quibus tanquam primis omnia interiora vitia, tum in spiritibus, humoribus, tum corporis habitu posita, suam primam sumunt originem. Quæ omnia cum sensibus pateant manifesta que sint, si declinare possemus, salubrem totius vitæ cursum perficeremus. Hæ certè licet infinitæ sint, certis tamen limitibus comprehenduntur.

Sic causarum insalubrium aliæ extrinsecus corpori accedunt, aliæ verò à corpore prodeunt, quibus tanquam summis generibus omnes causæ subijciuntur. Ex posterioribus, Motus corporis nostri & animi immodicus, in excessu vel defectu peccans, morbos causat.

Ex voluntario enim corpore nimius, exercitium vehemens, corpus duratigat. Maximè verò intermissa exercitatio otiumque corpus iners ineptum languidumque efficit, & quasi rubigine afficit, excrementorumque proventum coaceruat. Ita vt non sit ad sanitatem conseruandam vtilius quicquam, labore impigro.

Sic & reliqui corporis motus, partim arbitrio nostro, partim sine voluntate nostra præstiti, si non rectè obeantur morbis ansam præbent. Si respiratio sit impedita, cita nimis, aut tardior, cor suffocatur vel angitur.

Si Euacuationes naturales per vias patentes sæcum, vrinæ, pituitæ, quæ emunctione, expuitione scretu rursiq; rejicitur, non rectè procedant. Si venus sit immodica, quæ corpus eneruat; si per abditas vias sudore corpus diffuat; Aut arte vel casu, & naturali excretionem in mulieribus, sanguis vitæ fons exhauriatur nimium, calor vitiatur, corpus marcescit, morsque hominem occupat.

Et quemadmodum motus illi, quos corpus obit, necessitate quadam, sic & animi motus incommodant, si nimij sint, vt in vigiliis perpetuis; Cum id quod alterna caret requie, durabile minimè sit, sed otio nimio mens hebetatur, sensusque labefactantur, vt in somno accidit diuturniore, quàm par est. Qui si naturalis existat, animo veram adfert quietem. Huc & referimus motus animi, perturbationem, in ira, metu, gaudio, affatim & subito factis, vel perseverante mœrore tristitia & pudore, quibus non tantum animi functiones debilitantur, sed & sæpe penitus tolluntur.

Hæ sunt itaque morborum causæ, à corporis motu, quem necessario obimus, prodeuntes, quæ illud alterant, variisque mutationibus exagitant. Quibus potiores ferè sunt, magisque efficaces, quæ extrinsecus corpori accedunt, illudque ambiunt, elementa, maximè corpus subeuntia, vitiisque internis & excrementis materiam præbentia.

Ex quibus nulla necessitate, sed casu & fortuito irruens ignis, nos excalefacit, adurit, corpusque statim & in momento depascitur. Vti & alia terrena dura impetu in nos

ut frequenter à sua acie contundunt, se-  
cundum, merdunt, pungunt, corporisque sol-  
uunt continuitatem. Itaque extrinsecus  
corpori applicantur, indumenta, integu-  
menta, vnguenta, olea, emplastra, vel quæ  
subjiciuntur studio & voluntate nostra, cor-  
pus alterare immutareque possunt.

Atque ut subtilior ignis crassioraque ter-  
restria foris id præstant, sic aqua quoque  
tertium elementum, nos sua humiditate, fri-  
gidityte, vel etiam caliditate illi arte indu-  
cta, in balneis, vel natura in thermis dictis,  
afficitur, forisque admota immutat.

Validissima in omni causarum genere  
sunt, quæ intra corpus necessitate quadam  
ad vitæ conseruationem sumuntur elemen-  
ta, ut attractus aer, assumpta item, cibus &  
potus, quia non tantum qualitates propriis  
receptaculis, ille pulmioni, cordi, hæc ven-  
triculo, & per consequens inde vniuerso cor-  
pori imprimunt, sed & spiritibus aer, humo-  
ribus & corpori alendo materiam præbet  
cibus & potus. Quibus ne momento qui-  
dem ut aëre, nec die, alimentis scilicet, care-  
re citra offensionem possumus. Quorum ut  
salubris nobis est recta idoneaque quantitas  
& qualitas, sic noxia omnis in hisce im-  
moderatio & intemperantia.

Sic aeris defectus & exuperantia nos suf-  
focant, uti fit obturatis viis aëri patentibus,  
naribus, & ore, non crassioribus tantum, sed  
& aqua, aëreque fumofo caliginoso, illisque  
interceptis vinculo. Quinimò validius im-  
pulsus aer, agitatus coarctatus irruens, in i-  
dem nos strangulatus periculum conijcit.

Tum verò qualitatum ratione, calidior,  
frigidior, algidior, sicciorque vniuersum cor-  
pus peruadens, characteres hosce imprimit  
& quasi inurit. Vitiosus quoque, exhalatio-  
nibus pollutus vaporosis, nebulosis, putri-  
dis, foetidis, similem præbet spiritibus mate-  
riam, venenatisque seminibus inquinatus  
& pestiferis, contagium spiritibus primum,  
inde humoribus, mox nobilioribus parti-  
bus, cordi & cerebro, & per consequens vni-  
uerso corpori impertit, passimque in homi-  
nes, pecudes, crudeliter sæuit, omniaque  
depascitur.

Sic & cibi potusque parsimonia omnino,

dæve inedia, hominibus diutius est intolera-  
bilis, spiritus dissipans, humores exhauriens,  
corpusque absumens. Exuperantia verò ho-  
rum quanta parit nobis incommoda? tum  
in cibo, crapula, in potu Ingurgitatio & E-  
brietas, à quibus plures fortè, quàm à gla-  
dio pereunt. Plures quàm ætate senescunt.  
Magis quàm aliis quibusuis de causis disco-  
lorati, squalidi, cachectici, languidi, ventrosi  
& inertes, foetidi, scabiosi, & putridi euadūt.  
Hos fructus secum fert Voluptatis filia, ma-  
ter dolorum, Intemperantia.

Sed & assumpti alimentum qualitatem si spe-  
ctemus, & primum materiam, quæ vel ægrè  
interdum ob duriciem tenacitatemve dige-  
ritur, vel succum prauum & malignum gi-  
gnit, vel excrementorum facit prouentum,  
quàm vehementer corpori incommoda?  
Præsertim verò si gulæ libidine & volup-  
tate irretiti, sic condiantur, ut vel ab aromati-  
bus additis, insignem acrimoniam, vel falsis  
falsedinem, acidis aciditatem acquirant, cor-  
pusque sic accendant, exiccent, & conturbent.  
Si item reiecto naturali potu aqua, artificia-  
lem & medicatum paremus, ex succo vuarum  
decoctionibus cerealiū, & vino & ceruisia,  
tantum vtamur. Quibus certè si solis frua-  
mur iisque meracioribus, fieri non potest,  
quin corpus incalescat, caloreque nativo in  
igneum conuerso, citius sic absumpto oleo  
vitali, ex quo viuimus, senium ante diem ir-  
ruat, atque immaturâ morte, homo citius  
quàm par erat exolescens, abripiatur.

Ex quibus sanè patet, præcipuas morbo-  
rum causas in aëre & assumptis consistere.  
In illo, cum omnia citissimè peruadat, pene-  
tret & alteret. In his quia materiam inhæ-  
rescentem & contumacem corpori submi-  
nistrant.

40. *An ingluuie, ebrietate, luxuria, quàm  
fame, bello & peste, maior strages in  
humano genere edatur?*

EX hostibus, qui humanum genus depo-  
pulantur, vitam hominis breuiorem red-  
dunt, ac senium ætate nondum perfecta ac-  
cerfunt, mortem ante vitæ nostræ destinatos  
annos accelerant, commemorati præcipui  
sunt. Quorum tres posteriores, Bellum, Pe-  
stis,

stis, Fames, Dei iusto iudicio, vi externâ irruentes, maximamq; sæpè stragem facientes, multa millia hominum, atque vniuersas sæpè ciuitates, nec non exercitus perimunt: Illi verò hominum vitæ insidiantes, deterrimi hostes, non extrinsecus illati, sed studio, voluntate hominum voluptatibus & illecebris accersiti (Ingluuius videlicet, Ebrietas & Luxuria) æquè in humanum genus sæuiunt, innumerosque è medio tollunt: adeò vt meritò Poëta ille hoc de voluptate, matre horum malorum cecinerit: Quippe nec ira Deum, tantum nec tela nec hostes: Quantum sola nocet animis illapsa voluptas.

Licet autem intemperatîa tria hæc complexa, non adeò apertè & subitò homines, vt bellum, fames & pestis, absumant, sed sensim eos depascantur: non minus tamen damnum illis adferre, hæc satis comprobât: Quòd posteriores, certo duntaxat tempore, certisq; in regionibus, tum pœnæ loco, tum ad repurgandam & minuendam hominum multitudinem, à Deo immissa, grassentur: Crapula verò, ebrietas & luxuria apud multos mortales continuo in vsu sint, qui hæc sibi adeò familiaria reddunt, ac voluptatibus intenti & seducti, ita omnem sensum recti amittunt, vt nec metu morborum, dolorum acerbitate, vel terrore mortis, quam aliorum exemplo sibi ipsis imminere videt, immò nec pœnâ æterni supplicij (proh dolor) ab hisce absterri possint.

Vt enim primùm de Ingluue & in cibis intemperantia agam, quæ insatiabili illa vorandi auiditate, atq; Eresichthonis fame committitur, & inprimis in diutina illa in commensationibus mora, ferculorumque omnis generis varietate peccat; quàm communis & quantum vitæ nostræ insidietur, euentus quotidianus docet, quomodoque plures gula & venter, quàm gladius & infinita illa scloporum procella interimat atque enecet. Hac enim natura (quæ paucis contenta) grauatur, corpus excrementis omnis generis repletur, tandemque ex plethora & cacochymia innumeri oriuntur morbi.

Verùm non minorem perniciem luxuria hominibus adfert, eoque frequentius, quòd cum pudorem & verecundiam, hisce rebus

etiam concessis & licitis, natura adiunxerit, adeò vt vix tantum indecorum esse videatur, multi non edocti, nec admoniti, sed inscitia aberrantes, alij verò libidine excitati, in hac re naturæ limites transgredientes, grauissimè peccant, seque perdunt.

Inprimis verò iuuenes, quorum corpora hisce eneruata, ad iustum augmentum vigoremq; & robur minimè peruenire queunt, sed languida & inertia permanent, citiusq; quàm aliàs, nisi præueniantur morte, conefcunt. Senes verò lasciuos, luxuriosos, mors tanquam vmbra corpus comitatur.

Nunc verò paulò fufius ebrietatis incommoda examinanda, quò quippe vitio, in vtraq; Germania vulgatiùs nullum, nullum perniciosius, cum pro vitio minimè æstimetur, immò hodie laudi ducatur, & heroicum videatur, pocula ad vnguem strenuè (vt aiunt) exhaurire. Sicuri quælibet regio vitium epidemicum & populare, in virtutem commutare nititur. Nec mirum hic, cum ebrietas mentem adeò perturbet, sensus stupefaciat, vt licet aliqui euidentibus signis, ad interitum corporis & animæ se rapi videat, cognoscant & obseruent, ab ea tamen sibi minimè cauere possint, sed quotidianum & familiare hoc illis malum reddere cogatur.

41. Num in venis meseraicis magna illuvies excrementorum coaceruari possit?

IN venis tam generalibus, quàm speciatim acceptis, venis meseraicis, humores prauos sero dilutos, omnis generis coaceruari, diuque sæpè citra grauiorem noxam morbosque retineri posse, nondum ægrotante homine, sed saltem lassitudine quadam, inordinatis euacuationibus se patefacientibus, venturos morbos præfagientibus, non nihil molestato, in quamplurimis obseruati: Non solum ex prædictis indicij, excrementorumq; mutationibus, aliisque, sed & quòd materia hæc retenta in vasis adhuc remanens, tandem putrescens, vaporesque effundens, febres diuturnas creet, vel in venenatam conuersa naturam, lento veluti ve-

vi frequenter in principibus, cordi, cerebro  
causa, graua accidentia pariat.

Dein & quod hi prauī humores, vel ex sua natura per se, aut vt dictum peruersi, in vasa effusi, colicos dolores, icteros, cachexiam aliaq; pariant accidentia, vel in habitum corporis e venis maioribus elapsi sub cutē, scabies, herpes, aliosque tumores præter naturam, pro natura humoris diuersi generis, procreent. Sicuti quoque post febres etiam quartanas diuturnas, etsi per multos paroxysmos hæc materia expurgata fuerit, remansisse tamen insignem portionem, quæ postea à natura sub cutem protrusa, eiusmodi mala peperit.

42. *An aer sit causa veneni pestilentis?*

**V**enenum pestilens, quod febrium malignarum & pestilentium causa existit, vbi nam sedem suam habeat, & vnde corpori nostro impertiatur, Doctores litigant, dubitantes an aer magnis temporum mutationibus, vitiatu & contaminatus, eiusdem focus sit. Sed cum his non datis, sæpius obriatur pestis, puto pestilens hoc venenum, originem suam in Mundi origine habuisse, de corpore in corpus, per contagium dispergi: de nouo non creari vel produci, quamuis concedam certum certorum astrorum concursum, & hinc certam aeris mutationem factam, hoc virus, cuius naturam nescimus, at effectus videmus, diuersos & horrendos, quod aliàs delicescebat, in actum producere posse: sed cum nihil agat, nisi in proportionatum obiectum, quænam hæc obiecti sit dispositio, vt lubenter edoceri cupio, sic nos nescire promptè fateor, licet non ignorem, hoc venenum pro variâ corporis dispositione (ex qua omnis ad recipiendū venenum aptitudo) variè agere.

43. *Virum febris pestilentialis interna causa in humorum corruptione consistat, nec ne?*

**A**eris inquinamenta, quæ ex infectis paludibus, lacubus, antris, specubus, hominum animantiumque cadaueribus, excrementis, aut aliis grauioribus expirationibus contracta sunt, pestiferæ febris externâ cau-

sam esse, nulli dubium. Hic enim aer inspiratione perspirationeque intrò subit, cor ipsum affectioni præparatum inficit, febremque quæ non calore modò, sed & qualitate venenata cor fatigat, excitat. Sed est eognitu difficilimum, quid corpus vnumquodq; pestilentiae aptum reddat, internaue ipsius causa, cum passim nullo discrimine habito, senes iuuenesque inuadat, nondum certò est cognita.

Quamuis enim Galenus lib. 1. de differentiis febrium, & hunc secuti Medici, humorum corruptionem, & in venenatam qualitatem transitum, internum fomitem pestis existiment: Videor tamen mihi contrarium his argumentis conuicturus.

1. Quicumque morbi à Deo optimo maximo mortalibus peccatorum causâ immituntur, nō humorum vitio, sed peccatorum causâ eueniunt. Asqui pestem flagellum esse Domini, quo nos castigat, exemplum Dauidis manifestum facit, qui ob erratum commissum, censendo populum, triduanâ peste, septuaginta millia virorum amisit: nec dubito, in tanta strage paucos extitisse, qui ob humorum vitium perierint. Ergo caret internâ causâ pestis.

2. Quicumque morbi ex necessitate naturæ, & diuinâ prouidentia accidunt, ad causam aliquam internam referri non debent. Sed pestis (cum plures indies nascantur quàm intereant) vitior, quàm sit maturis frugibus imber, & ad terræ repurgationem summè necessaria, alioquin enim nec fruges sufficerent, & nimia hominum frequentia obruti, nobis ipsis exitio essemus. Ergo necessariò aduenit, nullâ internâ causâ ad hoc iuuante.

3. Qui ab occulta qualitate in nobis excitantur morbi, horum causa sciri non potest; Verum pestis essentia hætenus à multis ignorata, ad occultam illam, quam nemo intelligit qualitatem relegatur. Ergo ipsius origo ignoratur.

4. Quod si in humorum putredine siue corruptione causam ipsius internam quis statuatur, non aliquot annis cessaret, sed vt reliquæ febres, toto anni tempore suis incur- sionibus nos molestant, sic & huius febris peri-



pericula nos sine intermissione fatigarent. Atqui per decennium plerumque ab ea nos tutos Basileæ esse, palam est, cum tamen vitiositatem humorum, interim alij morbi denuncient. Non igitur ab humoribus corruptis.

5. Si ex humorum corruptela originem sumeret pestis, certè illi qui optimis humoribus præditi sunt, eâ non inficerentur; At euchymi æquè ac cacochymi huic morbo sunt obnoxij, quinimò longè facilius eâ corripitur, vt sæpius videre licuit, pueros temperatos, virgines optimæ cōstitutionis, probè coloratas, mediæ staturæ, in ipso ætatis flore, peste absumptas interiisse. Nulla igitur humorū corruptio causa hīc esse poterit.

6. Consimili ratione; Si humores putridi hanc excitarent, illi qui pessimis humoribus scatent, tantum afficerentur; Verum secus euēire videmus. Hi enim quibus diuturni incommodant morbi, pueri scabie, pustulis, alijsq; eruptionibus molestati, vtplurimum seruantur.

7. Quid? quòd illi qui lucri gratiā ægris ministrant, ventri crapulæque seruiētes, & ob id cacochymi, etsi præsentī se exponant periculo, liberi euadūt. Igitur alia causa statuenda, relictis humoribus.

8. Annonæ charitatē & famem, sequi pestem, veterum hoc prouerbiū innuit, *μετὰ λιμὸν λοιμός*. Cæterum inedia cum corpus exiccet, humoresque absumat, non vidēo quomodo ab humorum corruptione pestis fieri possit.

9. Iterum, si à corruptione humorum fieret, vel vnus alicuius, vel omnium. Non omnium, talis enim corruptio stante vitā, ne cogitari quidem potest, non quorundam, tum enim biliosi, vel melācholici, verbi gratiā, tantum interficerentur, pro proportionē humoris. Ergo neq; ab vnus, nec omnium humorum corruptione fit.

10. Insuper, si corrupti humores extrema corruptione, quam venenatam vocant, febrem hanc excitarent, in corde fieri necesse esset; sed tanta in corde, nobilissimo viscere, corruptio remanente vitā, ne cogitari quidem potest: Itaque corrupti humores non sunt in causa.

11. Ex ipsis signis patet, quod non a corruptione humorum, sed a corruptione sanguinis, enim ab humorum extrema corruptione, ueniret, accidentia intollerabilia sequerentur: Verum nec sitis vehemens, nec appetentia deiecta, nec tactui acris caliditas, nec magnum incendium, nec pulsus magna alteratio adest, vt interdum ægri nec se febri citare putent, & sine sensu doloris, viribus extinctis inopinatò decedant. Ergo quia symptomata mitia, nulla humorum corruptio.

12. Iam verò cum vrina humorum vitia demonstrat, fitque ipsorum certissimus index, si corrupti humores pestem fouerent, ex vrina appareret. Atqui non apparet, ea enim sanorum lotio quā similitima. Firmissime itaque constat, humores corruptos comites non esse.

13. Phlebothomia etiam vitium hoc humorum patefaceret, si ab iis proficeretur. Verum laudatus plerumq; sanguis, ex peste infectorum venis effluit. Ergo non ab humoribus corruptis.

14. Dein si ex humorum corruptione oriretur pestis, eadem esset curatio, quæ reliquarum putridarum febrium. At non hoc, nemo enim in peste primū concoctionem instituet, dein euacuationem. Sed id quod in reliquis febribus vltimum esse consuevit, primò tentat, materiā nimirū per sudorem euacuationem. Ergo nec illud.

15. Postremò, Si corrupti humores interna pestis causa essent, liceret purgatione humorum, eam præcauendo auertere, dein illā correptos curare. Verum videmus eos, qui tēpore pestis magnis purgationibus vtuntur, qui balneis aliisque sudatoriis, corpus exagitant, citius infici. Quia igitur purgatione præcauere non possumus, humores in causa non erunt.

16. Curare multò minus purgationibus quis aggredietur, ne in tam præsentī periculo, & Medicus necis illatæ suspicionem incurrat, & æger viribus extinctis, Medici culpā intereat. His abundè constare videmus, febris pestilentialis internam causam, in humorum putredine minime consistere. Et sic negatiua vera esse videtur.

1. Affirmatiuam quæstionis partē veriores

vi frequenter: tunc medici, tam Græci quam Arabum, tam etiam Neoterici, quibus sanior mens est, amplectuntur, qui omnes à corruptis humoribus, febrem pestilentem internam causam assumere, prodiderunt. Humores enim præter simplicem putredinem, alienam quoque ex corruptione perniciem contrahunt, venenatam nimirum. Hi enim vel sponte sua, eò interdum vetustate sensim degenerant, ut atra bilis, præsina, cæruleæve putrescentes, vel vitiosi cibi atque potus, quia sunt cuiusdam veneni participes, venenatam qualitatem induunt, & naturæ suæ similes humores proferunt. Hanc luculenter nobis Gal. 6. locorum aff. describit, ubi corruptum semen veneni naturam induere, sæuissimæque accidentia, ut conuulsiones, suffocationes & similia proferre comprobatur. Quod si à feminis tam benigni & utilis excrementi corruptione, tanta vis veneni exsurgit; Quid mirum, vitiosos humores nostri corporis, extrema putredine, in venenatam qualitatem abire.

2. Quid quod in cane rabido, tanta sit humorum putredo, ut vel solum ipsius sputum nos in extremum periculum adducat. Si igitur humores in perniciem summam & venenatam degenerare possunt, febremque pestilentem à venenata qualitate oriri, omnibus in confesso sit, certe ab humorum corruptione febris pestilētis internam causam dependere, asserere non dubitamus.

3. Huc accedit, quod à melancholico humore putrescente, plerique hanc luem provenire opinantur. Quam sæva enim & exitialia symptomata, hæc putrescens inferat, Gal. libro de atra bile, ratioque ipsa ostendit, quæ in quamcunque corporis partem effundatur, eam ulcerando erodat, unde Rodens dicta, quæ Cancros, Pforam, Lepram, & alios morbos, quos nec Esculapius ipse curaret, (aliqui autem imaginatione se curare posse sibi persuadent) excitat. Quis dubitat à tam pernicioso humore venenatam naturam induente, febrem illam suboriri posse, quæ & perniciæ & contagio, reliquas superet? Quid quod accidentia ipsa pestis, huius humoris naturam indicant.

4. Nonne Mania, furor, in quo porten-

tosa rerum simulachra, spectare se putant, vulgò das daub Hauptwache/ Anthraces, Carbones, Stigmata nigra, Exanthemata, Ecthymata, Pustulæ, Liuores, Ulcera crustosa, quæ omnia continuo in hoc morbo erumpunt, an non hæc materiam atræ bilis referunt, ab eaque pestem oriri, hos veluti characteres exhibent.

5. Huc facit similitudo huius febris cum quartana in horrore, debili calore, vomitu nigro.

6. Adde quod Autumnus pestilens dicitur, in quo atra bilis dominatur.

7. Huius rei suspicionem augent, causæ antecedentes harum febrium, ut cōiunctiones planetarum cum Saturno, item bella, annonæ charitas, quarum necessitate adacti homines, leguminibus aliisque succum melancholicum gignentibus, vescuntur.

8. Dein pestis tempore mœiores, timores aliaque animi pathemata, spiritus absumpti, sanguinem incrassant, & melancholiæ gignendæ materiam aptam præbent.

9. Idem confirmat, quod melancholicos timidosque pestem expauescentes, primum corripit, præterit autem eos, qui melancholiā postpositā constanti animo, diuinis promissionibus freti, aut etiam suis præsidiiis nixi, hanc contemnunt, & licet periculo expositi, vicinum ipsorum aërem, in inspiratione attrahentes, & per tactum perspiratione recipientes, impune tamen discedunt.

10. Ex his constare videtur, à melancholico humore corrupto, præcipue hanc luem provenire, non tamen inficias eo, à reliquis humoribus corruptis similem febrem excitari, quæ tamen perniciæ longè inferior sit. Hinc calida & humida corpora, putredini apta, qualia infantum, plerumque hoc morbo consistantur.

His argumentis satis firmum ratumque esse censeo, causam internam pestis in humorum putredine consistere. Nec me mouet illorum opinio, qui à spiritu Martis, veluti à Basilisco, corpora nostra in emundatoriis vulnerari, & tanquam sagittis configi, scripserunt, nullam patientis aptitudinem, in actu suscipiendo requirentes, atque adeo nec internam causam quærentes.

Verum

Verum solent plerumque rerum ignari, ad duo confugere, quod Galenus Erasistrato exprobrat, qualitates nimirum occultas, & nomina obscura.

Qualitatibus occultis ignorantiam excusantes, & dum inaudita nomina arbitrato suo imponunt, obscuritate fucum facientes. Hoc dum illi compendio sibi viam parant, in perpetuæ obscuritatis latebras præcipites se deuoluunt, & quasi luce mentis ereptâ, densam noctem ac tenebras ob oculos effundunt, dissolutam sine neruis & articulis rerum confusionem, animo consequuti.

44. *An venenata qualitas febrem pestilentialem accendens in corpore humano gigni possit?*

Cum de hoc quoque multæ dissentaneæ opinioniones habeantur, ut quæ verior esse videatur, indagare fuit propositum: Nam qualitatem illam vimq; pestiferam, tantam stragem edentem, & citra discrimine in quosvis tam iuuenes quam adultos & senes, tam sanos quam ægros, tam robustos quam imbecilles sæuientem, præter reliquorum quæ corpus alterant conditionem, venenatam & deleteriam esse, neque ad qualitatem aliquam manifestam referri posse, sed occultam & absconditâ, nec nisi ex effectu cognitâ, satis patet, uti & quod extrinsecus de corpore in corpus transfusa, extra corpus alicubi originem trahat. Verum an tale quoque venenum in corpore ex humorum putredine vel corruptione, ut plerumque creditur, gigni possit, non immerito ambigitur, cum tam multorum annorum decursu, iu tot hominum millibus interdum pestis nulla femina se prodant, interea tamen nihilominus tot vitia in humoribus, à quibus si inde pestis prodire posset, illa in tanta hominum copia alicubi fuscitaretur, se offerat. Magnum sanè & hoc est argumentum, ut alia omittam, non ex humorum putredine, aut alio illorum vitio pestiferam illam qualitatem exsurgere, quod qui ex hac luce euadunt, pleriq; etiam citra medicamentorum usum, & præsertim eorum, quæ corpus ab illuue eiusmodi expurgant, nihilominus sanentur: sicuti illud & prius aliquoties re-

gnante peste, & nuper Ambrasio in una mitosa urbem nostram depopulata, obseruauimus, supra duo millia hominum, & in solo nostro hospitali, quadringentos & septuaginta octo, citra medicamentorum opem, ab hac luce liberatos euasisse.

45. *An venena eiusmodi, qualia ab externis corpus subeunt illudq; insciant, in corpore etiam generari queant?*

Venenæ eiusmodi qualia extrinsecus corpus subeunt, illudq; insciant, in corpore neutrquam proigni posse, certum est, idq; non solum in illis quæ manifestè ab externis corpori inferri cognoscimus, veluti apud nos à morfu canis rabidi, in calidioribus regionibus ab ictu scorpionis, aspidis, cuiusmodi venena non in corpore nasci, symptomata enormia quæ superueniunt, satis demonstrant: Sed & in occultis venenis, quæ clandestinè corpus nostrum inuadunt, ut in luce pestilenti, venerea, qualitatem illam occultam nequaquam in corpore nostro generari posse, cum certis saltem in locis suo tempore extrinsecus eueniant, liquet.

46. *An mentis functiones ventriculorum cerebri an substantiæ causâ afficiantur?*

Quod principes animæ functiones, imaginatio, ratio seu iudicium vel apprehensio memoriaque separatim lædi queant, hoc præctici ventriculorum diuersitati ascripserunt, cum in anteriore imaginationem, medio rationem, postremo memoriam formari, & prout hic illæ lædatur, has illasve functiones quoque affici creditum sit. Cæterum cum cauitas interna cerebri vna continuataque, nec in plures ventriculos distincta sit, illaque potius humoribus excipiendis, quam spiritibus continendis, sicuti alibi dictum est, inseruiat: Non eam, sed cerebri substantiam, quæ vndique spiritu animali perfusa, sedes est animæ, prout vniuersa, vel pars illius dumtaxat, ligatur læditur, & pro causarum quibus afficitur diuersitate, nunc omnes simul, vel aliquas se-

**E**pilepticorum motuum causam ponunt Naturam morbo irritatam, vel deterius (vt alij) ipsum Morbum, dum expellere conatur, quod cerebro infensum est: sed cum id, quod naturæ molestum, eandem irritare quidem possit ad expulsionem, non verò eiusmodi ciere motus, opinamur, proximam causam motus deprauati, esse musculos inordinate motos, à spiritu animali à cerebro in nervos inordinate & impetuosè protruso. Hic enim solus, instrumentum est medium inter musculum (huic adiunge nervum) & facultatem mouentem: & prout spiritus in nervos variè effunditur, varij quoque apparent effectus; hinc in epilepticis perire potest sensus, remanere autem motus, quia cerebrum destituitur spiritu, quem tamen adhuc reseruant nervi. Cadunt autem Epileptici, non tam ob sensuum priuationem, quam totius corporis derepentè & subito ingruentem conuulsionem.

48. *Quæ paralyssis causa?*

**P**aralyssis duplex statui potest, vniuersalisissima & particularis, illam vocat Apoplexiam, hanc simpliciter Paralyssin. Apoplexia fit, quando humor præter naturam cerebrum circa basin, imprimis ad exortum spinalis medullæ, comprimendo (huc & cerebri residentia referri potest) spiritibus animalibus viam ad sensus motusve organa præcludit. Non interim negamus, ventriculos cerebri aliquando, imò vel semper obstrui posse, non tamen eâ ratione, quod spiritus animalis ex iisdem meare in nervos nequeat; imprimis cum ratio dicat, spiritum animale per totam potius cerebri substantiam dispersum esse, quam in ventriculis contineri. Et licet illud demus, interim tamen apoplexia, non alia ratione sequitur, quam ex nimium compressâ & grauata cerebri basi: ventriculos enim proximos esse ipsi cerebri basi, nemo nisi Anatomes ignarus nescit.

Particularis paralyseos subiectum & effi-

ciens, lites mouent nonnullis, subiectum quidem agnoscunt nonnulli solû Nervum, quidam cum neruo musculum simul, & rectè, sed si sumatur paralyssis pro sensus motusq; læsione, quis non cutim aut membranam cum neruo musculove partem affectam fatebitur? cutim quidem aut membranam subiectum læsi sensus, neruum verò subiectum efficientis, musculum symptomatis.

Causam agnoscunt efficientem, morbum conformationis obstructionem, angustiam & compressionem; posteriores duas admitimus, de tertia ipsa veritas dubitat. In neruo non potest fieri obstructio, quia neruus organum cauum non est: nec etiam patitur obstructionem ratione porosæ suæ substantiæ, eo modo, quo communis statuit opinio. Vult enim hæc, materiam peccantem in apoplexia à facultate expultrice è cerebri ventriculis in spinalem medullâ expelli, ex hac in alios nervos: sed considerent, egregiam proportionem inter recipiens, neruum videlicet & humorè recipiendum. Nervi principium vel maximi, sunt plura eaq; tenuissima filamenta, aded vt neruus secundum principium, nil aliud videatur esse, quam crassa & tenuis meninx, ratione corpulentæ suæ; sed quomodo nobis imaginabimur, humorem per meatum talium principiorum neruorum vel spontè vel inuite meare posse?

Omnis igitur paralyssis fit, vel à compressione, vel ab angustia (intellige simul, si placeat, apoplexiam.) Humor enim allabens ipsi neruo, eundè, si subsistat imprimis, comprimit, & quò minùs spiritus animalis penetrare possit, efficit, vt in apoplexia humor aqueus, dum nimium comprimit spinalem medullam, omnium sensoriorum collabitur vsus: si in leui apoplexia propellatur, deferretur maximè secundum superficiem spinalis medullæ, & quidè vel in vtrumq; latus, fitq; paraplegia, aut in alterum duntaxat, & suboritur hemiplegia: hic si non subsistat, propellitur vltèrius, secundum ductum neruorum particularium, donec tandem subsistens introducat paralyssin partiũ illarum, circa quarum nervos subsistit, eos vel comprimendo, vel diutinâ morâ eos irrorando, & ad descendendum spiritum ineptos reddat.



49. *Vnde dolor capitis, post narcoticorum  
vsum oritur?*

**P**ost opij vsum, postquam stupore soluto ad se redierint, caput illis non aliter ac si ebrij fuissent, dolere, sæpè notauimus; Vnde & dolores capitis post vini immoderatum vsum, potius à vi illa narcotica quoque accidere, quàm vaporibus ex eo colligo, tum etiam quòd non eadem ratione vaporosa reliqua, capitis dolorem inducant.

50. *Dentes an sentiant & doleant?*

**D**entes non sentire, hisce argumentis probatur: Primum, quòd cum ossei sint toti, ossaque non sentiant, nec dentes quoque; sentient, eoque minùs, cum reliquis ossibus duriores solidioresque existant.

Ad hæc si reliqua ossa sensum aliquem perioestij causâ, illic ubi eo obducuntur, percipiunt, dentes cum eo destituantur, longè minùs illis sentire possunt, tantùm abest, vt exquisitissimo illo sensu cuius causâ immensus dolor illic oboritur, præditi sint.

Dein cum nulla pars sensu tactus prædita sit, nisi neruus eam subeat, & in illius tunicas membranas & fibras dilateretur, nec dentes, in quos nerui minimè ingrediuntur, sentient, quod ex eo probatur, quòd neruus, cum nudi ossis contactum non ferat, & proin ossium substantiam nullibi subeat, nec in dentium substantiam ingredi possit, eoque minus, cum ea cæterorum ossium substantiam soliditate longè vincat.

Idè ocularis ostendit demonstratio, quòd nec quicquam in dente neruosæ substantiæ veræ inuenitur, fibræque, quæ in magnis dentibus inueniuntur, non neruosæ sed osseæ sint, reliquarum fibrarum ossearum instar, medullam aliquâ continentes. Et quòd nullum foramen, per quod neruus dentem subire possit, in dente absoluto inueniatur. Cumque dens corpori non ea continuatione, quâ reliquæ partes inuicem cohererent, connatus, sed per gomphosin duntaxat infixus sit, non potuit neruus hac quoque ratione in partem corpori non verè continuatam disseminari: Nec quoque vim illam, quam dentes mordèdo patiuntur, si in illis fuisset,

pati & citra grauissimam offensionem sentire. Vnde etiâ dentes insensibiles potius sensibiles, sicuti vngues esse debuerunt, qui eodem modo extrinsecus infixi, impetum sustinere debuerunt, & sine sensu sunt. Et ne quidem dolor, qui in ea regione nascitur, & in ipso dente inesse creditur, dentiumque dolor ob id vocatur, sensum in dentibus esse probat, cum hoc membranæ vicinæ vel gingivarum aut perioestij maxillarum causâ accidat.

51. *An Dentium dolor, lesio, corrosio aut corruptio à defluxione in dentem proficiantur?*

**S**i in nulla alia ossa in vniuerso corpore defluxio fertur, hoc est intra ipsorum substantiam, vt nemo hoc asseuerauit, longè minùs in dentes, qui longè duriores solidioresque sunt cæteris ossibus, neque corpori adeò exactè intermediis ligamentis ab vno osse in aliud connatis iunguntur, sed per gomphosin solum insiguntur.

Si defluxio in dentem ferri posset, etiam posset dens tumorem præter naturam pati, sed cum in ossibus fieri omnes negent, longè minùs dens tumorem præter naturam pati poterit.

Nam quòd nodi in ossibus nascuntur, aut calli, non à tumore præter naturam, sed accrescente illi de nouo, fit materia.

Quando ossa in corpore vitiantur, vel corroduntur, aut alio modo læduntur, hoc ab externis iniuriis semper proficiscitur, à causa violenta, ea frangente, scindente, aut alioquin lædente, vel ab vlceribus ad ossa quoque penetrantibus, nec vnquam ab humore aliquo in ossa defluente hoc fit, & quæ ossibus quoque adnascuntur, ex congestione potius quàm defluxione prodeunt. Ita & dentes, cum nudi iniuriis externis pateant, mastigando, mordendo res duras, idque continuò, item ab ingestis summe calidis, frigidis, ab illis potius dura hæc corpora franguntur, finduntur, aut alioquin læduntur. Si saxa aceto perfuso finduntur, nonne & hæc lapidescentia ossa sic, aliove modo possunt affici?

Vti & videmus illis non mundatis, à limo adhærente, à cibis & salua profectis, dentes

vi frequenter heri, tophos adnasci, illisque  
 alisis & excavatis, cibos inhærere,  
 putrescentes, quod ex foetore licet colli-  
 gere, illos amplius excavant, corrumpunt,  
 nigrosq; reddunt, radicibus adhuc integris,  
 nec defluxionem ullam recipientibus. Dein  
 & dum dentes acie metalli præsertim mun-  
 dantur, eos inde lædi quoque videmus.

Molares quoq; potissimum, quod hi lati,  
 dum in cibis conterendis plus diutiusq; la-  
 borant, citius atteruntur, quàm qui cibos  
 tantum abscindunt.

Nec dum quod alveolos largo humore  
 imbuant, ut dentes inde mobiles fiant, cau-  
 sam præcipuam esse putamus, sed quod ca-  
 lore tandem exiccatas radicibus, atq; sic at-  
 tenuatis, ex alveolis sine dolore excidant,  
 unde & in anterioribus, qui vnicâ radice eâ-  
 que tenui nituntur, tantum hoc accidit, mi-  
 nimè verò in molaribus latis pluribusque  
 radicibus inuicem diductis nitentes.

Quod & dolorem à defluxione in dentem  
 minimè fieri posse, satis demonstrat, uti &  
 quod dentes non sentiant, sicuti alibi de-  
 monstratum.

52. *An pulsus aurium ab arteriis?*

**P**ulsus & tinnitus aurium, sicuti à flatibus  
 intrinsecus auditus organum percutien-  
 tibus frequenter accidit, sæpenumero ab ar-  
 teriis in auris cavitare pulsantibus, profici-  
 scitur; si, ut in ægris fit, calore agitata, velu-  
 ti in febribus & cephalalgia, auriumque in-  
 flammationibus contingit, fortiùs pulsent.  
 Quem pulsus soni quoque in auribus quie-  
 tis tempore, maximè in aurem recumben-  
 tes sentiunt: qui si vehementiùs, ut in ægris  
 fieri diximus, intendatur, impedimentum  
 auditui affert, quod strepitus interior, exte-  
 riorem sonum, quod minus auris rectè au-  
 diat, impediat.

53. *Quanam fetoris oris causa?*

**N**on mirum multis os foetere, non tan-  
 tum ob crapulam, nimirum relaxato ven-  
 triculo, & pyloro, unde vapor cadaverosus  
 ab intestinis ad os usque pertingit, ut in pra-  
 xi ostensum. Sed & quod os cibis alimento-

sis, plerumque qui facile in foetorem abeunt,  
 interdum & foetidum aut gravem odorem  
 spirantibus, ut aliis, capis, caseo putri con-  
 tinuò inquinatur, à quibus diu odor adhuc  
 ori impressus manet. Præsertim verò si cibi  
 reliquæ diutius in ore hæreant, quod in den-  
 tium tot interstitiis facile fit, præcipueq; si  
 caui, fracti & inæquales, multa spatia ha-  
 beant, tunc si per se foetidae sint, foetore con-  
 tinuò expirant, si alimentosa, morâ putre-  
 scentes, tantum foetorem concipiunt, ut vel  
 minima portiuncula, totum os inquinat, te-  
 tra exhalatione, quod facile si dentis cal-  
 cipo interdum educatur, sentiunt, quam parva  
 portio, tetrum expiret odorem. Nec mirum  
 hoc accidere non tantum dentibus erosis,  
 sed & integris adhuc, cum os, quod præ  
 omnibus corporis partibus maximè eiusmodi  
 ciborum reliquiis, imò humore abundat  
 & commaculatur, non lauent, quod semper  
 cibo sumpto, & manè & vesperi fieri, & for-  
 des omnes diligenter elui, & è dentium in-  
 terstitiis auferri deberent. Cum & videamus  
 alia membra minus diu illota foetere,  
 ut pedes, & ab excrementis & sordibus in  
 digitorum spatiis collectis. Minorè curam  
 dentium & oris habent, quàm alterius ple-  
 rique, cum tamen adeò ex foetore & corrup-  
 tione dentium deformatur homo, aliisque  
 molestus fit, unde illorum potissimum cura  
 esset habenda: Cum videamus sanum alio-  
 quin & pulchrum hominem, tamen turpem  
 ex dentium vitio iudicari.

54. *An cartilaginee, & ossa febrium ca-  
 lore quoque alterentur?*

**I**n febribus cartilaginee, & consequenter  
 etiam ipsa ossa intemperie calida affici, uti  
 reliquas partes similes, in illis qui sensu-  
 bus patent, cartilagineis partibus cernere  
 licet, nimirum, quod ungues ipsorum, si in-  
 tensa sit febris & diuturna, circa radices, ubi  
 molliores adhuc sunt, interdum admo-  
 dum exiccentur, atque subsideant, ita ut  
 quado postea cum crescunt, sub cute emer-  
 gentes, se manifestent, impressio manife-  
 sta in ipsis deprehendatur, tam lata, quam  
 diu febris ardor illas siccauit, succedente  
 postea

postea cum febris remittit, vngue rursum naturaliter eleuato & æquali. Pilorum radicibus quoque arefactis, accidit sæpè post febres continuas & ardentes, vt defluuium capillorum patiatur, quod in conualecentibus ferè primùm obseruatur, quando pestilare pilos denudè incipiunt.

55. *An aqua immersi suffocentur?*

**E**Os qui aquis immersi moriuntur, non quodd aquam affatim & nimium bibant, vti vulgò creditur, sed quia suffocantur extingui, sic probatur. Quodd aqua non nisi per deglutitionem ventriculorum nostrum subire possit, deglutitio autem, cum motus sit ex arbitrio nostro pendens, cohiberi, ne fiat æquè in aqua, atque extra eam, nec ad eam tunc impelli possit, etsi fortè aliquid deglutiatur, in hac necessitate & agitatione, tamen parùm illud esse liquet, quod patientem tam citò interimere minimè valeret, sicuti in suffocatorum in aquis ventriculis obseruatum à me aliquoties fuit, in quibus paululum aquæ fuit inuentum, eamque aquam, quæ inuerso corpore ab illis, qui ex aquis extrahuntur, destillat, à vestibis potius defluere certum est. Quamobrem quodd aeris per respirationem ab aqua intercedente, attractio impedita sit; & cum aer attrahi deberet, aqua illius loco in asperam arteriam illabatur, causa suffocationis illius, illaque mortis existit.

56. *Phthisis num à vena rupta?*

**P**htisicos frequentius fieri ex venæ ruptura, quàm defluxionibus, inde colligo. Quodd ex vehementi nixu, qui cum spiritus retentione fit, qui onera eleuant, vel gestant, vti lapicidæ, vel ex casu, vt pueri, vel vociferatione, vt tubicines, in phthisin frequenter incidunt, quodd hæmoptoica passio ferè semper præcedat, quodd iuuenes sani alioquin, eam quoque & frequentius quàm senes corripiantur, & quodd si à causis internis, post alios morbos sequatur, hoc plerumque à vehementi tussi, quæ diuturnitate vel violentia venas dirumpit, proficiatur.

\* \*

57. *Excretio tussi facta, an pitis defluente humore fiat?*

**P**ituitosam materiam, nunc crudam, nunc purulentam, nunc tenacem & viscosam, alias subliuidam, alias subuiridem, quæ tussi à senibus præfertim, & hyemis tempore excreatur, non semper à cerebri excrementis à capite in pulmones destillantibus, sed ab excrementis quoque in pulmonibus continuò congestis, proficisci, illud docet, quodd quemadmodum cerebrum propter vasorum copiam continuò superfluitatibus scatet, tunc maximè, quando sanguis impurius est, cerebrumque imbecillius, ita & pulmones, quia vasis innumeris constant, sanguine omnino redundant, si cacochymia sit corporis, continuò eiusmodi excrementa colligunt, eaque è minoribus vasis in maiores asperæ arteriæ ramos protrudunt, è quibus dein vnà cum excrementis, defluxione hac delatis, tussi rejiciuntur. Huc accedit, quodd tanta copia pituitæ, qualis continuò excreatur, si à capite continuò in pulmones deflueret, perpetua tussi ob defluentem materiam, asperamque arteriam titillantem, homo diu exaretur, præfertim si maligna, qualis ferè rejicitur, existeret. Vnde magnam illius portionem in pulmonibus congeri, atque eam, quæ à capite defluit tenuem, morà diuturnà in pulmonibus, mucosam viscosamque fieri, iudicamus.

58. *An pleuritis citra pulmonum inflammationem fieri possit?*

**P**leuriticos quoscunque secui, iis pulmones vitiatos esse deprehendi, eosque pleurumque tunicæ succingenti aded adfixos, vt non nisi lacerando diuellerentur, ex quo cœpi suspicari in omni pleuritide vt & peripneumonia, pulmones quoque inflammari, & saniem & sanguinem à pulmonibus tantum, & iis suppuratis, pus quoque inde, non à thoracis succingente, cum illic transudare per integros pulmones non possit, excreari. Materiamque eam ex inflammatione pulmonum potius, quàm succingentis colligi, & suppurari, tandem etiam pulmonum substantià illæsâ, aut eâ simul læsâ, pulmo-

vi frequenter, & sequi phthisin. Differre autem eundem à peripneumonia, dolore punctorio, quodd in pleuritide latus quoque in consensum trahitur, & inflammetur, non tamen adeò, ut pulmones, cum tunica succingens sit tenuissima, proin & nihil inde expui. Vnde nihil à thoracis cavitate posse per pulmones excerni, nisi illis viciatis & corruptis, ut in phthisicis videmus.

59. *In pleuritide vera, pleura'ne sola, an simul etiam pulmo afficiatur?*

**I**N pleuritide vera, in qua nimirum excernuntur cruenta sputa, purulenta, huius vel illius coloris, quæ nam pars afficiatur pleura'ne sola, an simul etiam pulmo, disputatur. Puto pulmonem inflammatum & affectum; omnia enim signa pulmonem affectum demonstrantia apparent in verâ pleuritide: ex sola namque, pleura inflammata sanguis tam citò, nec pus citra pleuræ exulcerationem, in pulmones, & ex his, per asperam arteriam ferri posset. Vnicum hoc repugnare videtur: pleuritis manifestum habet dolorem, at pulmo sine dolore inflammari potest, aut exiguo admodum, ergo. Huic rationi respondeo: Pulmones inflammatos, non omnino doloris expertes esse, prout nunc in hac, nunc in illa afficiantur parte, si in sola substantiâ, nullus vel exiguus adest dolor: si circa membranam pulmonum, dolorem necessario sequi, & quidem distendentem, propter distentum corpus membranofum. Maximus verò oriri potest dolor, si pulmo in tantum distendatur, ut pleura, ratione fibrarum, quibus illa cum pulmonum tunica connectitur, afficiatur. Et huius connexionis medio, pulmonis communicari possunt affectus pleuræ & è contra; ut neque renuo aliquando pleuram solam inflammari posse, sed tunc pleuritis vera non oritur, sed spuria: hanc, si materia non discutitur, sed suppurata non ad superficiem corporis feratur, sequitur empyema.

60. *An pus citra exulcerationem aut carnis consumptionem interdum generari possit?*

**N**on semper verum esse illud, ubi pus ibi vlcus, ex eo patet, quod ex oculis pus

crassum citra ipsorum exulcerationem in puerulis, & adultis sæpè prodit, & quodd purulentam materiam frequenter, senes præsertim continuò, qui tamen phthisici nō sunt, excreant, & quodd pus ex vtero citra ipsius vlcus in fluore alborum mensium, mulieres sæpè reddunt.

Quod ego non ex carne suppurata, ut in abscessibus fit, generari, sed ex humoribus sanguine præsertim, in hisce locis extra sua vasa, non tamen in spatia distantia, tunc enim grumofus fieret, excidente, illicque in in carne adhuc suppurato prodire, non tamen carne exesa, proficisci, existimo.

61. *Virum excretio per screatam, à salina etiam procedat?*

**S**Aliua naturalis adhuc, uti continuò cum redundat, aut motu per loquelam commouetur, expuitur, & quæ tenacius & profundius hæret, screatu rejicitur; ita lenta, & excocta, nonnunquam & calore exiccata & denigrata, sicut in febris excreatur: quam pituitam esse, & à pectore vel capite eò profectam, falsò vulgò autumant.

62. *An ventriculi vulgò putati doloris causa semper lateat in ventriculo?*

**V**entriculi dolori multi subiecti sunt, præsertim eo tempore, cum concoctio iam facta est, ut post mediam noctem, & ante coenam, quo tempore sentiunt distentionem & tumorem supra umbilicum, cum tenui dolore, sæpè & ardore & nausæa.

Cuius causam non semper in Ventriculo latere deprehendi, sed in colo intestino, quod ventriculi fundo adnexum est.

Illud enim cum excrementis turgit & flatibus, uti ferè post concoctionem fieri solet, præsertim post cibos crudos vel crapulam, manè à somno excitatis, vel ante coenam, vicinum ventriculum comprimens, dolorem hunc infert.

Præsertim si vel incumbendo antrorsum versus, ut fit dum scribimus, vel decubitu, ut manè fit antequam surgimus, vel arctius stringendo lumbos, aut ariditate excrementorum



torum, propter anfractum intestini recti, non pateat excrementis exitus.

Hinc statim dolor cessat cum surgunt vel ambulant, cingulum relaxant, erumpentibus flatibus. Qui cum à colo descendant, illic latuisse credibile, nec subito ex ventriculo hos per totum intestinum ambages, delabi potuisse.

Aliàs enim si in ventriculo fuissent, per ructus erumperent, vel dolor statim in concoctione molestus esset, cum videamus iam vacuo ventriculo maiorem esse dolorem, excrementis & flatibus iam in colo collectis, & tanta illuviie excrementorum biliosorum, ut etiam ventriculi ardorem inferant, & dolor in lumbis perferatur.

Hoc accidit illis, qui satis laudatum habent ventriculum, & multum comedunt & appetunt, postea si longius differant, dolorem hunc sentiunt.

Hac ratione & medicamento cathartico sumpto, rarius dolor ventriculi sentitur, donec iam humores & excrementa in colon perueniant, tunc primum sentitur torsio, & nausea, & statim sequitur excretio, quâ factâ cessat dolor, donec iterum collecta materia in colo, dolorem hunc excitet, qui semper præcedit sedes, in purgationibus. Qui certe si in ventriculo esset, fieret potius ab initio, præterea non statim per aluum facta excretionem, cessaret, & murmur procederet. Non eo inficias, accedere quoque ventriculi imbecillitatem sæpe.

63. *Cur mictio frequens & acris, nonnunquam & cruenta à Cantharidum esu & applicatione?*

**C**antharides assumptas urinam calidam acremque reddere, frequentemque mictionem eamque interdum cruentam causare, veneremque stimulare, experientia testatur, quod non aliunde, quam ab acri ipsarum qualitate, caloreque summo, quibus ferum inflammant, acresque reddunt, unde dein vesica irritatur, partesque Spermaticæ stimulantur, renesque eroduntur, & vesica, proficisci tum illud, quod extrinsecus admotæ inflammant & exulcerant, tum quod alia acria calidaque idem præstent, satis comprobatur.

Vesicatorium ex cantharidibus. *Cantharides* quidam puellæ, quæ facie sua facea dicta, laborabat, in scapularum ne, sub noctem applicuisset, præter magnum cruciatum quem perferens, per totam noctem, cum summo urinæ ardore & stillicidio, continuo mingere, donec vesicatorium rursum amoueretur, coacta fuit, inde mira illa vis cantharidum, quam non tantum assumptæ, ut dictum, verum etiam admotæ, extrinsecus etiam in distantioribus locis, in vesicam exerunt, manifestè deprehenditur.

64. *Qua ardoris urinae causa & cura?*

**Q**ui ardori urinæ obnoxij sunt, ex acrimonia urinæ facile eum patiuntur, quando diutius vel ob pharmacum sumptum, vel aliàs frequentes deiectiones aut duras, diutius in sella sedere coguntur, tum quia membrum illis refrigeratur, tum quia in conatu illo deijciendi, sæpe urinam quoque stillatim fluentem exprimunt. Hi præcauebunt hoc, si mox, in prima egestionem solutâ urinâ, indusio vel pannis aut puluinis, calidis præsertim, membrum obuoluant, & ne refrigeretur muniant. Sic enim etsi diutius sedeant, non tam facile offenduntur. Quo nomine & infusions, quod inferiores hæ partes calefiant potius, quam alio nomine, tam cito in ardore urinæ iuuant. Cum vix nisi refrigerato membro virili, quod tunc summe frigidum esse sentitur, unde Ralsfeich Germani vocant, accidat.

65. *Quæ nam alui fluida, & excretionis illius causa?*

**Q**uibus iuuenibus aluus humecta est, illis senescentibus exiccatur, inquit Hipp. Quam illius observationem, in me ipso veram esse deprehendi: Cui in iuuentute aluus astricta admodum erat, nunc senescenti, quam citissime laxatur, & dyarrhoea frequenter, ex leui etiam errore cibi & potus, superuenire solet, per quam & biliosæ & mucosæ sunt deiectiones, corpusque alleuiatur.

Accedit & hæc ratio ætatis, facta in excretionem per urinam mutatio, quod qui iuuenis ægrè urinam in conuiuiis retinere poterim,

63. *vi frequenter mescens facillimè & sine molestineam, vixque multis post hor-  
cessiue, totam reddam. Verùm & natura mirabilem illum ordinem in me obseruauit, quòd quando ob conuiuia, quibus diutius interesse cogor, diarrhœa sequitur, non prius facultas expultrix excitatur, aut me ad excernendum impellit, donec ferè domum reuersus, in medio sum itineris, vel ædibus propinquus, quo tempore, vno impetu insurgens, ad eò me impellit, vt vix aluum, donec domum reuertar, retinere possim: Ac si prouida natura, non prius opus, donec locus esset ad excernendum idoneus, aggredi vellet, & pudoris & honestatis rationem haberet. Adiuuante fortè & consuetudine, cùm hoc mihi iam diu familiare sit. Cuius causa & sit, vt quoties à cœna in hortum suburbanum deambulatum progressus sum, ferè ad excretionem quoque quæ aloquin non vrgere soleret, exciter.*

66. *Humor melancholicus adustus, sit ne causa Elephantiasis?*

**E**LEPHANTIASIS ab auctoribus cancer generalis, ad differentiam cancri particularis dicti, vocatur. Vtriusque causa efficiens (si placet dicas causam materialem ex qua, licet hæc vel in nullis morbis, vt multi volunt, vel paucissimis reperias) est qualitas quædam occulta, perniciofa & venenata, quam ad certam qualitatem referre non possumus.

Venenum verò hoc certæ alicui parti communicatum, ita illius naturam inficit, vt alimentum postea vel optimum (intelligas hoc idem de elephantiasis causâ; imprimis, cùm elephantiasis correptorum sanguis diligentissimè consideratus, nullam labem habere deprehendatur: etsi forsân arenulæ in eodem appareant, puto tamen hoc rarum quid & accidentarium duntaxat, longè aliâ operante causâ) in peruersam suam naturam conuertat; & hoc videre est ex eo, quòd ab initio sensum ferè effugiens, semper crescendo augeatur, donec tandem ruptus, augeri nequeat, tunc cùm sanguinè virosum, luescentem, viridem & alius coloris emit-


tithumorem; proin in cancro non vtamur medicamentis suppurantibus aut emollientibus: his enim neglectis, æger diutius & commodius superstes esse potest.

Originem huius veneni statuunt humorem melancholicum. Sed cùm neque ab atra bile naturali, nec præter naturam fiat, non vero similis hæc opinio: si enim fieret à bile atra præter naturam erosio, nigredo in prima inuasiõne se manifestaret, quod tamen non fit, sed apparet cancer instar sub-stantiæ carnosæ, sine omni ferè dolore. Non fit à bile atra naturali, nullæ enim inflammationis notæ, nulla signa huius sanguinis apparent.

Proin putamus venenum hoc per contagium corpus haurire, siue fiat contactu indiuidui cum indiuiduo, aut etiam intra corpus sumpti veneni, & à Natura in partem debiliorem propulsi: & hinc particularis cancer magis affligit, quàm vniuersalis, quia in hoc venenum magis dissipatum, in illo magis vnitum est.

67. *Conualescentium marcor, debilitas, appetitus & constipatio unde?*

**C**ONUALESCENTES à morbo aliquo acuto vel diuturno, si præter marcorem & imbecillitatem corporis (quæ duo hisce morbis solutis ferè relinquuntur) aliàs integrè restituti sint, cibum auidè plerumque appetentes, excrementa sicca duraque cum difficultate, tam diu ferè, donec ad pristinam corporis carnositatè, vel etiam ampliorem (habiliores enim interdum fiunt) redeant, regerunt. Quod ipsis, quia corpus succo exhaustum, à chylo humorem omnem vtiliorem, ad corporis refectionem exfugit, accidere, tùm quòd excrementa licet dura, nihilominus benè concocta & naturalia alioquin sint, tùm quòd liquidioribus cibis sumptis, fluidæ tamen vix dum fiant excre-  
cretiones, euidenter comprobatur.



## SIMEIOTICÆ.

88. *An' ne pulsus & Vrina eam quam vulgus illis tribuit, in morbis cognoscendis certitudinem habeant?*



**Q**UAM signorum tractatio maximè sit apud Medicos necessaria & operosa simul, earumq; incertitudine coniecturalis & dubia fiat nostra ars, non abs re fore duximus, de horum recto & vsu & abusu differere. Inter quæ cum vulgus maximè vrinarum iudicium expetat, impostorum artibus & consuetudine quadam deprauata seductum, ita pulsibus præ cæteris fidunt & credunt, neglectis interea veris & indubitatis morborum inditiis & obseruationibus.

Nam cum signa, quæ nos in abditi alicuius in corpore latentis morbi, vel causæ illius, vel loci affecti cognitionem ducunt, Demonstratiua dicta, inter se varient, quod alia ex iis sint certa, morbo alicui propria, alia verò incerta, quæ per se sola nihil significant. Vulgus vt ferè omnia corrupta sunt, incerta pro certis, ea quæ dubia pro indubitatis, & quæ communia sunt, pro propriis seligunt, obseruant, iisque plurimum tribuunt. Cæterum signa omnia desumuntur ab iis, quæ in morbis sub sensus cadunt, vt sunt causæ morbum prægressæ euidentes, ambientia, assumpta, corporis motus & animi. Hæc enim sunt quæ coniecturam aliquam Medico præbent, à qua causa morbus sit ortus, causâ dein cognitâ, ex illius natura, Morbi genus & sedes aliquando deprehenditur, sed admodum obscure, præsertim si morbus nõ repentè, assumpto aliquo, vel admoto irruat, sed sensim & pedetentim, vt ferè fit, inuadat. Et hæc dicuntur & signa & causæ.

Certiora longè his sunt, effectus apparentes, qui morbum sequuntur, accidentia symptomata dicta, ex horum enim natura, & sedes morbi & morbus faciliè agnoscitur, licet in abdito corporis penitus sit inclusus. Talia autem vel in corpore ipso, vel in iis quæ à corpore procedunt, reiectis quibuscunque præsertim excrementis, existunt.

In corpore sunt varij motus, sub quibus

animi motus comprehendi. Simeiotica. <sup>89.</sup> tus actiones seu functiones vocantur. cum à corporis partibus tanquam mentis & organis obeantur, certè læsâ aliquâ actione, siue sublata sit penitus, siue imminuta, siue alia ratione deprauata, ex actionis læsione, partem illam affici, quæ actionem illam edebat, non tantum conijcimus, sed & certò scimus, morbumque simul ex ipsius functionis proprietate deprehendimus.

Itaq; si hominis Animalem functionem offensam videmus, vt in Delirio, Sopore sensu & motu, vt fit in Stupore & Resolutione membrorum, & Conuulsione, statim cerebrum affici, tanquam partem principem, & in hisce neruos quoque Musculosque, qui motum voluntarium edunt, lædi, certissimis hisce argumentis, nixi, statuimus. Quin & morbi speciem ex natura horum cognoscimus, maximè verò Dolor qui est deprauatus sensus tactus, nobis locum dolentem, quasi manu ostendit, ipsiusque proprietas, morbi speciem, cum is sit qui præ cæteris sensus nostros maximè feriat, perturbet, dirisque cruciatibus exagitans, facit vt & bruta animalia muta, dolorem inditiis quibusdam ostendant. Ita quoq; vitali functione laborante, si respiratio imminuta sit, in dyspnœa, si deprauata in stertore: Si Pulsus alteratus, maximè si animi deliquia, syncope inuadant; Hic cor ipsum; In illis Pulmones, vel neruos, qui pectori conferuntur, inditiis hisce, morbo teneri iudicamus.

Ita naturalibus functionibus, si appetentia sit prostrata, si vomitus, nausea infestet ventriculum. Si sanguificatio non fiat, hepar, vel alia ratione, si attractrix, retentrix, concoctrix, expultrix, lædatur functio, eas partes quæ illas obire debebant, ægrotare, & morbum simul agnoscimus.

Verum non tantum actiones hæc in corpore obseruantur, sed & alia accidentia, quæ corpori accidunt, & Visu cognoscuntur, vt colores, Tactu, vt qualitates primæ & secundæ, Auditu vt murmura, rugitus, Olfactu, vt odores: Gustu, vt prauis sapores. Ex iis inquam, tanquam veris internuntiis, Medicus latentes morborum sedes, causas speciesque inquirat.

vi frequenter una eaque motu, vel accidenti-  
 ra defumit Medicus, & secundo lo-  
 re cuius quæ Rejiçiantur: siue partes & por-  
 tiones sint corporis, vel humorum vitium:  
 siue excrementa eaque vel naturaliter, vel  
 præter naturam in corpore collecta, rei-  
 ctaque, vti ex sudore, fœcibus, sputo & vr-  
 nis, ex quibus omnibus partes eas, à quibus  
 hæc procedunt, cognoscit, ex sudore humo-  
 rum totius corporis constitutionem, ex fœ-  
 cibus ventriculi & intestinorum, ex sputo,  
 Thoracis vitia depromens: Ex vrinis verò  
 renum, vesicæ & quia à sero procedit, ven-  
 triculi, hepatis, & venosi generis rationem,  
 diligenti indagatione cognoscit. Hæc est  
 vera & legitima morbos inuestigandi ratio,  
 quæ vt fallere non potest, sic in abditarum  
 rerum cognitionem nos deducit. Neque  
 vnum aliquod signum existit, in quo vni-  
 uersum corpus veluti immersum, vndique  
 cognosci possit, vt de vrinis somniant, ne-  
 que vnus functionis læsio, de totius corpo-  
 ris dispositione, vt pulsibus quidam tribuunt,  
 iudicabit: sed vt hac de re pluribus agerem,  
 mouit me vulgi indocta & peruersa opinio,  
 in multis morborum non tantum signis, sed  
 & curationibus.

Hæc enim duo præcipue, ex iis quæ Me-  
 dicorum sunt, feligunt & obseruant ferè o-  
 mnes cuiuscunque conditionis homines,  
 & cum Empiricis signorum obseruationes,  
 & curationis formulas quasdam, per ma-  
 nus quasi traditas, communes habent, vt  
 vix aliquis inueniatur tam rudis & imperi-  
 tus, qui non in morbo aliquo suum quoque  
 afferat iudicium, consiliumque. Vnde non  
 immerito cum nata esset quæstio; Quam  
 nam omnes passim artem tractarent exer-  
 cerentque, appositè quendam, Medicam ar-  
 tem respondisse asseuerant. Cumque qui-  
 dam experiundi causâ, templi foribus  
 astans, oculo distorto, egrediente multitu-  
 dine, à singulis consilium aliquod & reme-  
 dium peteret, id ipsum factus est, omnes in  
 ea vrbe Medicinam profiteri, atque tam fre-  
 quentes esse Medicos indoctos, quam pauci  
 docti eruditique inueniantur. Cæterum vt  
 in curationibus vt plurimum hallucinantur,  
 sic in signis siue inditiis morborum, ad eam

deuenerunt nostro sæculo dementia, vt  
 iis plurimum tribuant, quæ incertissima  
 sunt, & quæ certa sunt, vera, & infallibilia,  
 negligent contemnantque.

Hinc factum, vt ex vrinis veluti ex specu-  
 lo, non tantum ea quæ foris in homine ex-  
 trinsecus apparent, sed & quæ in intimo  
 corporis latent, tanquam per fenestram il-  
 lam, qualem in hominis pectore, vt intima  
 illius consilia voluntatemque per eam spe-  
 ctare posset, ille oprabat, Medicum quo-  
 que in vrinis lynceis oculis cernere, omnia  
 præfagire, cognoscere, soloque hoc indi-  
 tio, contentum esse debere, imperiti, vti-  
 nam non etiam periti, falsò sibi persuadeant.  
 Quin imò sexum, an mas sit vel fœmina, &  
 plus eò, an virgo vel nupta, grauidane, æta-  
 tem item, an iuuenis vel senex, quot anno-  
 rum, ex vrinis obseruari posse, credant. Et  
 qui magis hisce insaniunt, vitæ etiam con-  
 ditionem, an nobilis, ignobilis, ciuis, rusti-  
 cus, aduena vel indigena, quid egerit, quid  
 assumpserit, scire volunt. Quod exemplum  
 illius satis comprobatur, qui vt amissum as-  
 inum recuperaret, ex vrina Medicum con-  
 sulens, ab eo medicamento prius fortiter  
 purgante exhibito, dimissus, dum in itinere  
 moram trahens, casu asinum inuenisset, me-  
 dicamenti viribus vim eam tribuens, Medi-  
 cum infinitis extulit laudibus. Falsam hanc  
 imperitorum opinionem hi fouent Medici,  
 qui hoc scurrili dicto nitentes: Mundus  
 vult decipi, ne imperitiores esse dicantur  
 aut credantur, ouroscoopi & euromantes  
 sunt, hancque vaticinandi ex vrinis artem  
 sequuntur. Sed quàm facile interim has ar-  
 tes exercentes, si quid astutiâ potius quàm  
 subtilitate quadam consequuti sunt, natam  
 de ipsis vulgi existimationem, rursus amit-  
 tant, turpiterque se quandoque dent, id  
 ostendit, quando grauidas, quæ non sunt,  
 virgines, quæ corruptæ sunt, vt sæpè fit,  
 stultè pronuntiant, seque deridendos o-  
 mnibus propinant. Aut bestiarum vrinis  
 delusi, dum fabula vulgi fiunt, pœnas teme-  
 ritatis dant & audaciæ.

Maximè verò, qui Magicis artibus niten-  
 tes, spiritus maligni operâ, dum secretio-  
 ra quædam proferunt, atque impiam hanc



vaticinandi rationem, vinarum prætextu, excusant, vt hanc falsam de vinarum certitudine persuasionem confirmant, sic vulgus damnosè seducunt.

Ita factum vt iam non ampliùs in morbis cognoscendis Medici præsentia opus sit, modò lotiù vel ante triduù in vase sæpe immundo asseruatum, vel aliunde aduectum agitatumque in promptu sit, hoc solo sufficientem morbi noticiam, Medicum habere debere & posse, magno errore credunt. In quo vt maximè desipiunt, sic in eo sapiunt, quod sic & Medici laboribus, & propriis sumptibus, quibus in Medico accersendo se grauari metuunt, parcut, atque sæpe vno solido, si modò liberales esse volunt, & prædictionem & curationem ægri mercantur. Quibus sanior paulò mens cõrigit: Hi quidè Medici præsentia exoptat, verùm ea ratione, vt si modò pulsus tangat, statim de morbis pronuntiet, quis nam & quæ illius causa sit & origo, quis salutis mortisve exitus.

Quorum si quid vel casu & fortuitò, vel industrià & solertià quadam, varia interim percunctando observandoque à Medico deprehensum fuerit, idque pulsibus acceptum referat, vt sinistram hanc ipsorum mentem seducit, sic ex stultis insanos facit. Nam quæ de Galeni in morbis deprehendendis solertia extant, vt minimè ex pulsibus deprehensa fuere, sic industrià ipsius potius, quam alio quopiam artificio fuerunt inuenta. Mulierem enim morbo detentam, noctesque insomnes ducentem, neque morbi causam fateri volentem, cum inuiseret idem Galenus, pulsusque contrectaret, forteque Pyladis iuuenis mentione facta, ipsius pulsus fluctuaret, idque quotiescunque nomen Pyladis proferebatur, amore illius iuuenis dementatam mulierem, non tam ex pulsu, quam enarratis inditiis (quibus & fortè faciei rubor, animi sæpe sensus detegens accessit) magno astantium stupore ipsum deprehendisse, certum est.

Eadem ratione & æconomum, cum vniuersæ administrationis rationem reddere non posset, non morbo sed mœrore confici, non tam ex pulsu, quam aliis circumstantiis & artibus, licet in pulsibus observandis fue-

rit oculatissimus, sese oblatum gloriatur idem.

Quemadmodum & apud Glaucon philosophum admirandum sese præbuit, cum ægrotanti Medico, cuius pulsus tantum contrectarat, neque quicquam adhuc de ipsius morbo percunctatus esset, iecoris affectum, aliaque dextri lateris symptomata, quæ ex cruenta deiectione casu illi oblata, obseruaret, statim prædiceret. Quin imò quod eger pleuritide se laborasse credidisset, ex hylopi in multa decocto, iuxta fenestram posito, obseruante id Galeno, & detegente, cum in pulsibus hoc ipsum obseruasse crederent, magnam apud omnes iniit & laudem & exultationem. Atque vt ipsemet fatetur Galenus: Fortunà potius quàm arte, magnam quibusdam laudis adipiscendæ ansam suggerente.

Sed quam parum tuta interim sit, instabilisque hæc diuinandi astutia, & quam facile semel comparata laus, in fine sordescat, illius ostendit ridicula fabula, qui cum edoctus à magistro, causam omnem morborum illis imputare, quæ casu se offerebant, quod iis usus esset, vel horum quid assumpisset æger, atque ex eo ægrotare, idque aliquandiu succederet, tandem (vt erat parum versutus) clientellam asini sub lecto conspiciens, asinum ab ægro deuoratum, atque hanc morbi illius causam esse, omnibus persuadere stultè conabatur. Ita sanè Medicam artem profituunt, qui vrinis & pulsibus abutentes, sub specie veritatis imperitum vulgus seducunt.

Nec minùs & illi, qui inditia ab hisce desumpta conserunt penitus, remediaque indifferenter morbis, nullis ferè obseruatis signis, accommodant, indignum Medici exultatione esse censentes, excrementa aliaque corporis explorare inditia. Verùm in tanta animorum discrepantia, si rem rectè meriamur, fatebimur pulsus & vrinas in morbis quibusdam signa esse vera, pathognomonica dicta, quæ nobis & morbum & affectum sedem propriè explicant: In aliis verò morbis incerta admodum esse, atque ad ea referri, quæ *συνεργούντων οργάνων* vocant, quæ per se nil, sed collectione tantum multorum signorum, certius eas, quæ pathognomonica osten-

63  
sed & in multis morbis ne  
m dici posse, demonstrabimus.  
enim signa omnia desumatur ab iis,  
quæ vel morbos præcedunt causis, vel eosdem  
subsequuntur effectibus, maximè functionū  
læsionibus, & reiectis excrementis, pulsus ad  
læsæ functionis symptoma, vrina ad excre-  
menta refertur. Atqui functiones si lædun-  
tur, ostendunt partem affectam tantum, à qua  
illæ functiones eduntur, excrementa verò,  
partium à quibus promanarunt constitutio-  
nem. Hoc posito cum pulsus sit motus arte-  
riarum à corde prodiens, de cordis & arteriarum  
constitutione tantum, nec de aliis functioni-  
bus ullis, nisi fortè ex accidenti, iudicabit.

Hinc de cordis intemperie & imbecillita-  
te (cum his duobus tantum cor nobilissimum  
viscus affici possit) ac proinde de viribus æ-  
grotantis vitalibus maximè, sua magnitudi-  
ne seu paruitate, de cordis calore, sua celeri-  
tate propriè & per se, certum nobis pulsus  
adferet iudicium.

Vrina verò, cum ex cibo liquidior & po-  
tu in ventriculo & hepate in serum transmu-  
tato, atque inde cum sanguine in venas dela-  
to, suam desumat materiā, horum certè ex-  
plicabit constitutionem, uti & earum partiū,  
quas præterlabitur renum vesicæque vitia, à  
quibus partem aliquam seu portionem de-  
sumens, certum nobis loci affecti sit inde in-  
ditium, ut quando arenulas rubras vrinae  
commixtas videmus, à renibus, si albas à ve-  
sica promanasse, nobis constat: si sanguis  
reddatur, venas erosas vel apertas. Nec tan-  
tum loca illa naturalia affecta, sed & morbi  
speciem sæpe vrina explicat, tum contentis,  
si pus mingatur, vlcus, si sanguis, vulnus esse  
illarum partium, colore item & consistentiā,  
partium harum intemperaturas, obstructio-  
nes, concoctiones demonstrat & prædicit.

Sed præter has, vix quicquam absolute de  
vitalibus aut animalibus partibus, nisi ex ac-  
cidenti, quatenus partes inuicem consentiunt,  
proferet. Licet enim serum ab vniuerso cor-  
pore à renibus attractum, vrinae commisceatur,  
tamè ex maioribus, potius venis, quam mino-  
ribus (ubi portio feri superuacanea sudore  
ferè exhauritur) iisque ferè quæ circa vetricu-  
lum & intestina sunt, vrinae copia prouenit.

Itaque in capitis morbis, parum vrinae cre-  
dendum, nisi hi fiant per consensum ventricu-  
li, tunc enim turbide vrinae, quales iumento-  
rum existunt, ut inquit Hipp. capitis morbos  
præsentés vel futuros denuntiant. Quod si  
capitis affectus communis illi sit cum vniuerso  
corpore, ut in febribus accidit, siue harum fo-  
mes alibi, vel etiam in capite, ut in phreneti-  
cis lateat, tunc quidem vrinae mutantur &  
rubent, cum febris non tam cor, sed & caput  
partesque naturales (vnde fitis) humores i-  
tem in venis, excrementaque ab his prodeun-  
tia, accendat & inflammet.

Subtiliores aliqui vroscoپی, diuersas vrinae  
partes pro situ variis corporis accommoda-  
runt partibus, ut Astrologi sua signa coelestia.  
Eminentissimam vrinae partem, quam circu-  
lum & coronam vocant, capitis, mediam pe-  
ctoris, infimam ventris, dextram hepatis, si-  
nistram lienis dispositionem exprimere &  
quasi in vrinis nouum hominem expressum,  
prædicant. Sed quàm illi nugentur id osten-  
dit, quod circulus cui tantum tribuunt, nihil  
aliud quàm umbra, quæ & in limpidissima  
aqua apparet, bullasque ex agitatione quadā  
genitas, in se continet, quas etiam tam stu-  
diosè obseruant, existat. Sed & in pectoris  
affectibus, nisi hi febrem inducant, ut hedi-  
cam, ubi colliquationis signa in vrinis appa-  
rent, vel symptomaticam, ut pleuritis & pe-  
ripneumonia, ubi ratione febris vrinae ru-  
bent, nullam ferè aliam in reliquis vrina  
mutationem ostendit; Sunt præterea asth-  
maticorum & phthysicorum vrinae sanorum  
vrinis similes.

Quemadmodum & in articularum mor-  
bis, vel iis qui in corporis habitu existentes,  
partes maximè exteriores occupant. Ex  
multis duos tantum proferam morbos, qui  
cum vniuersum penè corpus occupent, &  
quasi pessundent, tamen vrinis nullum ma-  
nifestum, quo cognoscantur characterem  
imprimunt. In elephantiasi siue lepra, & lue  
Venerea, quam Gallicum morbum vocant,  
quis certam ex vrinis adferet obseruationem,  
cum harum vrinarum nec substantia, nec  
color nec contenta, diuersum quid à sano-  
rum vrinis possideant.

Qua igitur ratione sexum in vrinis distin-  
guemus,

guemus, cum in singulis ætatibus, pro ratione temperamentorū, assumptorum, exercitiorum, vrinæ variant?

Sed grauidas cognoscere ex iis licet? Quasi verò fœcus vrinæ innatet, vt quendam mentiri non puduit, sed fœtus excrementa matris vrinæ permiscetur? Scilicet. Nōne vrina fœtus per vrachon ex vmbilico ipsius promanans, inter duas ipsius membranas toto gestationis tempore collecta, in partu primū vnā cum fœtu prorumpit, neque matris excrementis vlla ratione permiscetur, vti neque intestinorum fœces, quæ in crassioribus fœtus intestinis, ad partum vsque asseruantur. Nōne in grauidis vterus ita conclusus, vt nihil neq; admittat neque emittat? nōne tantū purissimus sanguis ab excrementis exquisitissimè repurgatus, ad fœtum alendum vtero conferatur? Hæc cum se ita habeant, tamen inepta vulgi increbuit opinio, vt Medicum imperitiorem esse dicant, qui id ex vrinis non possit deprehendere, quod ne ipsa mater quæ fœtum gestat, certò, donec fœtus moueatur, potest cognoscere.

Atque vtinam hæc tam constans & impressa multorum in animis de vrinis falsa persuasio, aliqua ratione eximi tandem posset, vt tantum laboris in explicando casu, quantum perquirendo iudicio ex vrinis impenderent, non ea esset Medicorum in vaticinando miseria & calamitas, quā nos vulgus miserè & torquet & excruciat.

Ex enarratis itaque satis constare arbitror, in naturalium partium affectibus, vrinam maximè consulendam, atq; ita tamen vt plerumque sola, non aliis quoque adhibitis signis, quæ ex functionum læsione, dolore, propriè magis petuntur, incertum admodum fallaxque sit vrinarum iudicium.

Idem de pulsibus iudicium esto. Quare non vni alicui signo credendum, sed pluribus simul collatis morbi sedem, speciem causasque indagare, & de morbis statuere oportet. Horum enim incertitudo, nobis Medicam artem cōiecturalem facit, & mor-

bo non plenè cognito, curatio erit vel nulla, vel planè peruersa, aut fortuita.

69. *Vtrum ex vrina conceptio credatur, possit iudicari.*

**V**Anam vulgi opinionem de prædictione ex vrinæ inspectione, adeò hominum mentibus insitam, vt non solum morbos omnes interiores, sed & alia in corpore latitantia, veluti conceptum, quin & externa quædam ex vrina iudicari posse, sibi persuadeant, alibi explicauimus. Vtinam autem tandem res eò redirèt, vt vulgus desineret Medicis tam importunè vrinam offerre, & Medici vulgo imperito ac superstitioso connuere; Imò longè satiùs esset, primū ab adstantibus magni momenti signa, ex functionum læsionibus petita expiscari, & tandem si qua necessitas exigat, ab excretis signa depromere, ac de morbis iudicare.

Cum constet etiam in grauissimis morbis, peste videlicet, lue venerea, elephantica, &c. vrinam neutrquam ratione luis mutari, sed sanam prorsus conspici.

70. *An circulus in vrinis seu corona vmbra tantum sit?*

**C**irculum qui in vrinæ summitatis ambitu apparet, è quo Medici uroscopi capitis affectus præagiunt, nihil aliud quàm vmbra esse, ab vrnalis circumferentia in vrina relucens, hisce de causis permotus, asseuerare ausus sum. Quòd & aqua limpidissima, in eo contenta, eandem vmbra efficiat: quam & pictores, si vitrum quod liquorem continet, depingant, in adumbratione non omittunt. Cæterum quòd in aliis vrinis latior, in aliis contractior, in aliis quoque colorator diuersimodè circulus appareat, id quoque non ratione affectus in corpore, sed prout vrinæ superficies, vel capacior vel angustior vrnalis sedem, quæ in medio ampla, supra infraque angusta habet, attingit, accidit, cum angustior locus vmbra maiorem, latior proin circulum, è contrà verò amplior minorem efficiat.

Quæ vmbra vti in vase & humore lucidis, minùs fusca, sic in obscuris hisce, vel alio modo coloratis, magis vel nigricans, vel alio colore resplendens apparens, circulos non eodem modo coloratos profert.

vi frequen-  
a fructuam esu.

uctus humidi copiosam faciunt mictionem, vt cucumeres, melones, granata itē dulcia, reliquaq; aded vt qui sub vesperam iis liberalius vescuntur, noctu mictionis causā sēpē surgere cogantur; hinc pueri lectum commingentes, ab iis arceri debent. Olus album primo verē erumpens, quod Germ. *Rebtfressich* vocant, noctu in acetario sumptum, copiosissimam aliquoties mihi mouit vrinam.

72. *An Eclipses ea portendant, quæ illis assignant Astrologi?*

**Q** Væ secundum rationem & naturæ ordinem fiunt, non possunt, quemadmodum ea quæ casu & cōtra naturæ leges contingunt, tanquam portenta & monstrosa, eas calamitates, vt bella, annonæ charitates, terræmotus, aliæque quæ illis communiter attribuuntur, prædicere; Verū eclipses naturales suas causas habere, & necessariō fieri, vel hoc sufficienter demonstrat, quod quot futuræ sunt, quamdiu mundus stabit, astrorum periti, multis ante sæculis scire possunt, quorum & decursus ne horæ quidem minutum fallit: Et proin temerē & falsō Astrologi, ex illorum apparitione, tam multa prodigiosa excogitant, publicant, atque homines iisdem perturbant.

## HYGIEINÆ.

73. *An ne homini ad sanitatem conseruandam, necesse sit, uti aliquando Venæ sectione, Purgatione, Balneo, Scarificatione, Vomitu?*



**Q** Vm Medici officium sit, nō tantum morbos sanare, verū etiā præsentem sanitatem integrā, aut saltem aliquo pacto illēsam, aliquandiu cōseruare, fiatq; hoc causarū sex necessariarū, quas declinare nequim⁹, recto vsu & administratione: Vti Aëris nobis circumfusi clementiā, assumptorum esculentorum poculentorumq; temperantiā, Somni

& Vigiliarum, Motus & Quietis, Excretorum & Retentorum moderatione, & Animi affectuum pathematūque repressio; Si in hisce causis, quæ nos circumstant vndique, & quas euitare non possumus, nullus error committeretur, aut alia extrinsecus irruerent violenta, fortuita, accidentia, sanus homo eousque, donec absumpto humidi vitalis rore, extremum diem clauderet, permaneret. Hanc enim inuitabilem fati legem, seu potius peccati pœnam, nulla ars, nulla vis, potest auertere.

Verū cū casu vel studio & nostra voluntate, voluptatum illecebris seducti & allecti, in illis peccemus sæpenumero, eoque nomine in corpore nostro, vel intemperiem vel illuuiem aliquam continud cōgeramus, ne ea tandem redundans, morbos procreet, vt eam in sanis etiam adhuc extirpemus, sicque morbos imminentes præcaueamus, siue plethora sit, siue cacochymia; euacuationes variæ, arte quadam ad naturalium euacuationum formam institutæ, excogitatæ inuentæque sunt, vt quod natura per se propellere nequit, Medici operā, qui illius minister est, adiuuetur.

Vt sanguinis detractio per venam sectam, si plethorā natura per ordinarias sanguinis euacuationes, per menses, per hæmorrhoides, hæmorrhagias narium fieri consuetas, non sponte tollat; Purgatione quinetiam, si per naturales deiectiones, excrementa corporis crassiora non ejiciantur; Vel Balneo, si tenuiores humores per sudores & insensilem trāspirationem, non sponte natura molitur educere; Vel scarificatione, cū a parte nobiliore, vel quæ læsa est, humor ad aliam vel reuelli, vel deriuari debet, eumq; natura non sponte propellit, aut vomitu quoque, si in ventriculo hærens excrementum, a natura non per se sursum deorsumve propellatur. De quorum quidem & vsu & abusu multa in medium proferenda sunt.

Nam quod venæ sectionem attinet, quā nihil nunc magis consuetum est, quanti momenti sit rectē vsurpata, Gal. in libro de venæ sectione luculenter docet, ad sanguinis redundantias & plethoras, quæ ex intem-



temperantia assumptorum cōtinuò nascuntur, & otio immodico, in quibus duobus præcipuè error committitur, tollendas: quâ omissâ, sanguis faciliè vasa disrumpens, hæmorrhagias parit, vel effusus in partes principes, illarum partium inflàmationes, pleuritides, phrenitides aliaque mala infinita efficit, vel in vasis retentus vel accensus, aut putrescens, febres acutissimas accendit.

Sed & quantum noceat intempestivus & immoderatus illius vsus, quotidiana ostendit experientia, ob quam fortè causam, Erasistratus phlebotomiam penitus improbauit, & è schola Medicorum omninò exclusit, cuius discipulos ob id Hæmaphobos vocauit.

Videmus multos, venâ nunquam sectâ, aut sanguine ea ratione prouocato, nihilominus ad ætatem longævam vsque vixisse, è contra multos ex repetita toties veris & autumnî tempore venæ incisione, ante ætatem consensuisse, & eneruatos inertesque factos esse. Quod & de Scythis recenset Hipp. qui vt nimiam obèsitatem effugerent, id venâ sectâ post aures, auertere solebant, sed postea impotentes Eunuchorum instar & effœminati reddebantur. Nostro sæculo & præsertim in Germania, aded illius vsus inualuit, vt vix dum ex ephebis egressi, mox sanguinem per phlebotomiam detrahant, societatis vt inquirunt, potius quàm necessitatis causâ, & sic corporis incrementum impediunt; quia vt Poëta, succum pecori, & lac subduci agnis scribit, sic illis quoque nutrimentum, è quo corpus augeri debebat, ea ratione subducitur. Sed & senes septuagenarij exsuccati effæti, & eam ætatem quoque prætergressi, decrepiti & pedem in cymba Carontis iam habentes, à venæ sectione minimè abstinere, mortemque propinquam accelerant.

Sed & error illè noxæ maioris causa quoque est, quòd nullâ mensurâ, nullo pondere sanguinem metientes, ad oculi tantum captum, vel chirurgi placitum, vel hominum phantasiâ, qui dum sanguis fluit, clamant, laßt lauffen, & screatu & tussi illius impetum iuuant, eum excutere, & totum ferè sanguinem profundere nituntur. Et quod ex

chirurgi consilio, mox iterum nimiam redeunt, eamque repetunt, potius stum Chirurgi sic iuuant, quàm propriam utilitatem promouentes.

Sed & non minùs consuetum est, ad sanitatem conseruandâ, corpora purgare. Cum enim ex immoderatione & crapula, & propter otium intermissumque exercitium, non tantum sanguinis exsurgat redundantia, quod in sanguineis & bene habitis tantum fit, quam venæ sectionem minuere diximus, sed & ab iisdem causis prauis humores, & magna excrementorum sentina colligatur, non tantum in primis viis, sed & in vniuerso corporis habitu, quæ certè natura per ordinarias naturales euacuationes, vix potest sola expellere, nisi Medici operâ adiuta id efficiat, magnum certè emolumentum accedit corpori, si cum corpora eiusmodi illuie redundare deprehendimus, ea purgantibus catharticis exhibitis euacuemus, & sic futuros morbos auertamus.

Ob quam causam, peccatum quod in eo fit, illius rariore vsu, secus ac in venæ sectione, vbi frequentiore potius peccatur, committitur: Idque quia vulgus fastidit pharmacorum, quæ palato aduersa sunt, vsus, faciliusque fert exiguam illam cutis pertusionem, quæ venâ incisâ fit, sine dolore, aut leui admodum, quem commestratione postea factâ, quam existimant venæ sectioni necessario subiiciendam, leniunt, eaque omnia excrementa etiam ventriculi & intestinorum expurgari, autumant.

Sed & in eo maximus committitur error, quòd purgationem venæ sectioni præmittunt, error certè hominum mentibus ita infixus, vt vix hæc opinio illis eximi queat, cum leui tantum ventris lenitione, si alius adstricta sit, præparari duntaxat corpus ad sanguinis minutionem deberet, purgatio verò primùm venâ sectâ & præparatis dein humoribus, rectè instituatur. In quibus cum omnia finistrè fiant, modoque præpostero, non mirum corpora catharticis vehementer sæpè lædi, & in periculum venire. Nunc de Balneis.

Balneâ, Vina, Venus corrumpunt corpora nostra. Hæc etiam recreant Balneâ, Vina, Venas,

vi frequenter inquit ille. Quid quæso magis con-  
ueniunt nostris præsertim nationibus, bal-  
nei vsu? Quo infantes modò in lucem editi,  
mox à squalore in vtero matris contracto,  
abluuntur. Quo iam adulescentes facti, ad tem-  
pus adolescentiæ vsque, non tantùm quan-  
do scabies vrget (agimus enim hîc de sanis  
corporibus) sed & voluptatis causâ, in aqua  
frigida profluente natâre, corpusq; æstu ac-  
censum, recreare & refocillare, & in labris  
calidis, præsertim veris initio, sedere gau-  
dent. Quid quod iam ætate aliquousque  
prouecti, & senes quoque non tantùm viri,  
sed mulieres præsertim, nisi thermis calidis  
vtantur, eoque nomine tertio vel quarto an-  
no magnis sumptibus, laboribus & pericu-  
lis peregrinationes, sanitatis causâ, in Hel-  
ætiâ, per alpes niuofas, in Lotharingiæ  
vallem Plumbariam, aliâque Germaniæ lo-  
ca, etiam procul dissita, instituunt, se diutius  
superuicturos minimè putant. In quibus si  
non quoque pompam potiùs aliquâ & ma-  
gnificentiam, luxum & otium voluptatém-  
que, reliqua taceo, quærent, non tanti er-  
rores committerentur. Quorum causâ &  
immoderatione postea citius senescunt cor-  
poraq; enervantur, & accenso hepate, ther-  
marum vsu, præsertim dum potu aquæ fri-  
gidæ mulieres, viri vino, calorem hunc re-  
stinguere tentantes, immoderateq; biben-  
tes, viscera lædunt, & hydropem, cachexiam  
atque tremorem inducunt.

Quid de scarificatione? Hæc non minima  
ad bene sanæque viuendum præcautionis  
pars vna, plerisque censetur, quo nomine  
cutem multis vulneribus variisque in locis  
sibi incidi, non tantùm qui cutem hirtam ri-  
gidamque habent, sed & tenerâ delicatâq;  
mulieres & virgines facillè patiuntur, dolo-  
remque hunc æquo animo perferunt, quo  
tamen percussæ Galliæ mulieres (præser-  
tim cum ad scarificationem nouaculis chi-  
rurgii illius loci, cutè longis plagis incidant)  
eam dum sanæ sunt, vix admittunt, vti nec  
viri. Nostris verò in regionibus, nisi hoc in-  
signi præseruatiuo singulis mensibus vtan-  
tur, & hisce vulneribus; veluti superstitiosi  
aliqui, Turcæ præsertim, plagas sibi inferen-  
do, pœnitentiam faciant, non posse se diu-

tiùs à morbis imminetibus tutos esse, exi-  
stimant. Cùm tamen illius vsu inconue-  
nienti, homines postea defluxionibus in il-  
lis locis, ad quæ humores hisce incisionibus  
& adhibitis cucurbitulis cum flamma & su-  
ctione, quòd per vim trahant, & illic sedem  
figere assuescant, continuò & leui ex causa,  
infestentur & diuexentur. Præsertim (in  
quo etiam vehementer peccatur) si pectori,  
spinæ dorsî, aliisque locis defluxionibus ob-  
noxiiis, cucurbitas affigant, eoq; sanguinem  
alliciant.

Non possum etiam hoc reticere, quod An.  
58. quo tempore Medicam artem exercere  
primùm incepti, ex inordinata scarificatio-  
ne, inflammatione natâ, & gangræna post  
eam secutâ, viri aliquot in hac vrbe extincti  
fuerunt.

Iam de Vomitu: Si venæ sectio, purga-  
tio, balneum, scarificatio, etsi violenta non-  
nihil videantur, iuuant, eoque nomine ex-  
plicanda fuerunt, nec vomitus erit reticen-  
dus, quibusdam regionibus & hominibus  
conuersus, non tantùm Gulonibus, de qui-  
bus inquit Auicenna, semel in mense ineb-  
riari bonum, nimirum vt faciliùs vomant,  
quod tamen inter Christianos summum de-  
bet esse dedecus, adeò ventrem implere, vt  
ne disrumpatur, suam per superiora cogatur  
ejicere crapulam.

Sicuti verò inhonestum minimè erit, hu-  
moribus illic congestis, antequam morbum  
producant, in illis præsertim qui assueue-  
runt, hac via educitis, grauissimos morbos,  
qui ex cruditate gignuntur innumeri, cum  
primæ concoctionis vitium non emendet  
altera, auertere. Qua via & canes, non tan-  
tùm postquam se repleverunt, sed ieiuni; gra-  
mina longa acuta, non deuorantes, sed os &  
fauces iis pungentes, vt ejiciant humores il-  
lic congestos, sibi ipsis à natura edocti, me-  
duntur. Non contemnendum præsidij ge-  
nus in peccato primæ concoctionis commis-  
so; cùm illuuiem ventriculi non tollat ve-  
næ sectio, sicuti verò vulgus imperitum, Me-  
dicos interdum de venæ sectione, quæ ven-  
triculum purgare possit, consulunt, quibus  
ego, digito in fauces indito, id fieri posse,  
viam demonstrare soleo. Dein quoq; quòd

excrementa ventriculi, longiore tempore, per purgationē deorsum deturbentur, quod per superiora citò, necessitate exigente, perficitur.

74. *An Temperantia, Exercitium, Alacritas, aliquid conferant ad producendam vitam?*

**Q**uantum ad sanitatem conseruandam, seniumque producendum, in bene constitutis alioquin corporibus, Temperantia, Exercitium & Alacritas conferant, scire iucundum cunctisque vtilissimum, summeq; necessarium, quibus sanitatis propriæ (vri omnibus esse debet) cura est. In horū trium mediocritate rectoque vsu, & animi & corporis consistit sanitas. Quod Poëta ille, vt Mens sana in corpore sit sano, orandum esse, docuit. Hippocrates, dum inquit, Sanitatis studium esse non satiari cibis, & impigrū esse ad labores, quid temperantia exercitiumque ad incolumitatem faciant, satis ostendit. Alibi quoque hilaritatem animi spiritus recreare & refocillare docens; quantū Gaudium ad diu, bene felicitatēque viuendum possit, sufficienter demonstrat.

Vulgatum ex Scholæ Salernitanæ iucundissimis atque vtilibus aphoristicis versibus hoc consuevit exprimi:

Si tibi deficiant Medici, Medici tibi fiant,

Hæc tria, Mens læta, requies, moderata Diæta. Quibus summam totius sanitatis, in Temperantia, Exercitio & Hilaritate, consistere eleganter explicatur.

Quàm autem in hisce pleriq; delinquant, Intemperantiæ, Otio, Animi que affectibus indulgeant, naturamque bene alioquin affectam immutent corrumpantque, ægritudines accersant, mortemq; accelerent, quotidiana ostendit experientia. Plures enim Gulâ, Segnitie, Animi que vel effræni impetu, vel mœrore, internecione tolli, quàm tribus alioquin crudelissimis vitæ humanæ hostibus, fame, bello, pestēve iugulari, certum est.

Plerosque quos ad perfectam maturamq; aliquam ætatem, seniumq; extremum, peruenisse, vel legimus vel cognouimus, in hisce immoderatiùs minimè vixisse, vel rarissi-

mè deliquisse, obseruauimus. Ex quo patet, ita producere possemus. Omisiss antiquioribus, recentiora gratiora erunt.

Vixit annos pœnè centum, nobilis quidam Fey nomine, qui gloriari solebat, se nunquam ex repletionē stomachi grauedinem sensisse, ad solis exortum vsque nunquam dormiuisse, nec ira nec mœrore vehementiùs commotum fuisse.

Noui item Oswaldum Berum, Medicum quondam huius vrbs eximium, piæ memoriæ, primum nostræ Academiæ, post reformatam Religionem, Rectorem, qui Decani facultatis Medicæ officio multos annos functus est. Hic octuagesimum annum ætatis cum superasset, temperatissimè & hilarissimè semper vixit.

Quis quæso vnquam illum non alacrem aut affabilem vidit? qui res serias ridendo quoque tractabat, qui per urbem incedens, cantabat; & licet sua quoque haberet, eaq; non exigua grauamina, & aduersos quoque casus fortunæ experiretur, illis tamen vel minimū vel nihil mouebatur.

Omitto parentis mei piæ memoriæ, qui octuagesimum annum cum tribus, incolumis superuixit, proauī qui centesimum & vigesimum sexum annum attigit, ne propria laus sordere videatur, temperantiam, exercitia, labores & alacritatem.

Sed relictis exemplis rationibusque, quibus innumeris & temperantiæ & laborum atq; animi sedati cōmoda vtilitatesq; commendare possemus, saltem incōmoda, quæ ex horum sinistro & immoderatiore vsu eueniunt, obiter attingamus, ab animi impotentis exorū affectibus.

Quàm grauiā his eueniant accidentia, vitamq; acerbam & breuem ducant, qui Mœrore & Tristitia, ob res vel amissas, vel non consequutas, contabescunt, vel metu & terrore rerum aduersarum perculsi, contremiscunt, vel concupiscentiā inordinatā & immodicā rerum, etiam laudatarum, vt scientiarum vel artium: Aut peruerso appetitu vindictæ gloriæ, diuitiarum, mirabiliter se exerant, amore flagrant, & odio premuntur, inuidiā rumpuntur. Quàm grauiā his corporis accidant pathemata, nulla

63  
 vi frequenti, non id patefaciat. Qui irā  
 laxatis habenis, supramodum  
 eruntur, in febres incidunt, tremores ar-  
 tuum, cordis palpitaciones, conuulsiones  
 patiuntur. Mulieres interdum abortiunt. In  
 maniam & furorem rabiemque aliqui con-  
 uertuntur. Ex mœrore, melancholia, cor-  
 poris tabes atque atrophia sequuntur. Quæ  
 igitur dementia, ita ob res sæpè nullius pre-  
 tij, quæ cum huiusce vitæ incolumitate, ne  
 conferendæ quidem sunt, seipsum excru-  
 ciare, vt & id quod reliquum vitæ est, ob res  
 fluxas & caducas nobis reddatur acerbum,  
 vt illi accidit, qui semper mortem metuit,  
 sicque viuens assidue moritur. Quid iucun-  
 dius, quid salubrius, moderatâ animi tran-  
 quillitate ita se comparare, ne animus rebus  
 prosperis nimium attollatur, aut aduersis  
 deprimatur. Quod Horatius pulchrè hisce  
 versibus ostendit:

Rebus angustis animosus atque  
 Fortis appare, sapienter idem  
 Contrahes vento nimium secundo  
 Turgida vela.

Sed quid de exercitio dicemus, cuius tan-  
 ta est præ cæteris ad vitam diu salubriterq;  
 transigendam vtilitas, vt hoc vnicum sit in-  
 ter omnia, quæcunque sanitatem conser-  
 uant præcipuum, exercitatio corporis ni-  
 mirum, quâ calor innatus in actum deduci-  
 tur, vnde postmodum totius corporis ac-  
 tiones melius procedant, & illius pabulum,  
 humor scilicet primogenius augetur, no-  
 uasque vires adipiscitur. Quo & animi mo-  
 tiones referre possumus, quibus ingenium,  
 iudicium, reminiscencia acuantur, perfe-  
 ctioraque redduntur.

Vnde mirari satis nequeo, plerosque la-  
 bores atque exercitia fugere, otiumq; potiùs  
 appetere & sectari, atque vt eo indefinenter  
 frui possint, omnes neruos intendere, varias  
 artes excogitare, multa pericula subire, vt  
 nimirum postquam opes corraferint, dein-  
 cepti securi otiosique viuere possint. Quam  
 ob causam, multi laborum pertæsi, sub præ-  
 textu religionis otium quærentes, mona-  
 steria potiùs opulenta & pingua, quàm la-  
 tribula nemorum, quibus aliquando uteban-  
 tur eremitæ, subintrant, vigilias, longas o-

rationes, ieiunia, frigora interdum faciliùs  
 quàm labores perferunt. Inutiles sanè ter-  
 ræ fuci, nec sibi ipsis, nec aliis nati aut vi-  
 les. Cum tamen otio nihil sit perniciosius,  
 quo calor noster languescens, spiritusque  
 ignaui facti, functiones corporis imperfe-  
 ctius segniusque perficiuntur. Vnde igna-  
 uiam, hebetudinem, obliuionem, stupidita-  
 tem, torporem, cruditates, excrementorum-  
 que prouentum exoriri necesse est. Corpus  
 graue, molle, pingue, iners fieri, suaque mo-  
 le ad interitum ruere.

Supereft postrema nunc ordine, sed effi-  
 caciâ prima & præcipua sanitatis faulrix,  
 Temperantia, quæ etsi per se aded sit com-  
 mendata, vt nullius commendatione egere  
 videatur, tamen ab ea maior pars declinat  
 hominum, vt plures gula & venter, quàm  
 gladius & infinita emissorum globulorum  
 procella enecet. Ne enim singula quæ ab  
 intemperantia procedunt mala, longiore o-  
 ratione enumerem, satis erit hoc, quod cor-  
 pus humoribus repleat, atque excrementis  
 impurum reddat, sordesq; ab ingluuie ma-  
 gnâ copiâ coaceruentur, & proin omnibus  
 morbis humoralibus, excrementitiis di-  
 ctis, & qui ex plethora & cacochymia gi-  
 gnuntur, qui infiniti sunt, præbeat ori-  
 ginem.

Hinc vel seniu immaturu citius quàm æ-  
 tas requirebat succedit, vel subitanea mors  
 sequitur: vel saltem languores, dolores ex-  
 cruciant, functiones omnes segnius proce-  
 dunt & labefactantur, ingenium hebetatur,  
 perit memoria, deficiunt sensus, omnisque  
 corporis dexteritas, agilitas, promptitudo,  
 in rebus agendis tractandisque languescit.

Quæ etsi intemperantiam tam certò,  
 quàm umbra corpus sequantur, sicuti hoc  
 in ægrotantibus indies experimur, tamen  
 aded ea vulgò inualuit, suauitas eius dele-  
 stat, voluptas stuporem inducit, & quamdiu  
 præsens occurrit, præteritorum malorum  
 obliuionem parit, vt nullis legibus, nullis  
 minis coerceri, nulli dolores, ærumnæ &  
 molestiæ, nec pœnæ ipsius gehennæ, ab hac  
 detertere plurimos queant.

Sed ne ego nimium ab ea deterrendo, in  
 Medicos, quorum intemperantia nutritur ef-  
 se di-



se dicitur, iniurius sim, relictis iis, in Temperantiae laudes longius excurrere desino.

75. *An subitanea refrigeratio corporis dum calet, periculosa?*

**Q**ui calent, subitoque pectus, ut aërem frigidiorē admittant, detegunt, ventriculum denudant, graviter sæpè afficiuntur, cardialgiā & animi deliquium patiuntur. Et qui in æstuariis sedent, & fenestram à tergo refrigerij causā aperiunt, tunc aëre, ipsorum cervicem, nucham dictā percussiente, in eadem pericula, incidere sæpè observavi.

Et dolores postea graves & perseverantes successisse, febresque sæpè sequutas. Periculosum enim est, corpus, quando admodum calet, subito & affatim vno pluribusve locis refrigerare, ob subitam illam mutationem, repercussionemque caloris. Quod post balneum evenire frequenter videmus. In quo si frigidā perfundatur corpus aquā, inflammationes & ulcera inde sequi, quotidiana ostendit experientia.

76. *An aqua solum humectet, vel etiam simul, veluti vinum nutriat? deq; viribus vini.*

**P**lerisque aquam omnibus viventibus vegetantibusque summè necessariam, præter simplicem corporis humectationem & refrigerationem, intra corpus sumptam, nihil amplius efficere, nec ad nutritionem aliquid conferre posse, visum est. Quibus & quare id asserant, rationes probabiles minime defunt: inter quas hæ reliquas vincere videntur, à substantia qualitibusq; ipsius aquæ desumptæ. Quod cum aqua refrigerare credatur, illud verò quod nutrire debet, calidum esse oporteat, omniaque nutrimenta calida esse dicantur, ob alienam hanc in illa qualitatem, corpori alimentum præbere minime queat, eoque minùs, cum non solum frigida, sed & inter omnia quæ sumuntur, frigidissima esse censeatur.

Substantia illius tenuissima, limpidissima, nullo succo, nullo crassamento permixta (quod ex eo quod nullum sedimen-

tum deponat, nulla in illa hypocrisis deat, conicere licet, si modò pura, nec rã, luto succove alieno perturbata sit, quæ eam compositam potius quàm mistam reddant) illud idem innuere videtur; cum ad nutritionem corporis materia solidior, ad deperditam nutritionem, seu illius quod de corporis substantia indies absumitur, reparationem, requiratur, quam aquæ inesse, nec sensus nec ratio comprobare videntur. Quæ duo maioris momenti argumenta, cum sufficiant, non est quod plura in medium proferam. Contrarium tamen qui affirmant, aquam scilicet non penitus nutriendi efficaciam destitui, non carent rationibus.

Primò, quod aquam tantopere refrigerare, uti hætenus creditum est, non concedant. Cui & hoc accedit, quod licet visus in aqua crassamentum hoc separatim minime dijudicet, quia tamen huic sensui obiecta aqua, impedimentum quoque aliquod illi adferre deprehenditur, crassiore sui parte minime destitui verisimile est. Quod etsi exiguum sit, tamen aliquid quoque ad nutritionem adiumenti adferre posse, credibile existit. Eoque magis, quod sicuti ostensum, pisces solā aquā aliqui vivunt: quod in Salmone, cuius intestina semper inania inueniri, piscatores vno ore asserunt, manifestè cernitur; & in piscibus, qui in vivariis inclusi, solā aquā fontis fruuntur, ex eo sic se habere, probabile sit.

Quod cum in piscibus fieri possit, quid obstabit, quo minùs & homo, licet solā aquā sustentari nequeat, inde tamen in nutritione adiumentum aliquod accipiat, sicuti in morbis acutis & diuturnis, ægros diu sæpè solo potu, vel iusculis sustentari observamus. Vidimus quendam in hac vrbe custodiæ inclusum, qui ut supplicium publicum, morte sponteā, quam sibi consciscere voluit, anteuertaret, ab omni cibo abstinens, ad dies quatuordecim vsque, solius aquæ potu refectus; vitam adhuc retinuit, demumque primùm expiravit. Sed & hoc non reticendum est: Aquam solo calore & effervescentiā, etiam nullius rei permixtione, vinositatem aliquam acquirere, sicque arte immutari posse. Ut non sit mi-

63  
 vi frequentius, & facilius in corpore, caloris nati-  
 beneficio posse effici, aquamque adeo ex-  
 coqui, vt corpori non solum qualitibus  
 suis, ad alterationem ipsius inferuiat, sed &  
 nutritionis causâ, tum quia vehiculū succi,  
 ad partes alendas, sit *ἡ χυμὰ τροφὴς*, tum quod  
 de substantia propria aliquid quoque conse-  
 rat, aliquid momenti adferat.

Sed ne aquæ folius patrociniū suscepisse videamur, ad vinum nos conuertamus, illiusque vires insignes & admirandas scrutemur. In quibus indagandis tam occultis, de quibus postea agemus, quàm manifestis, qua ratione hæ procedant, multa in contro- uersiam quoque veniunt. Nam cum vinum aquæ vices, in potu ordinario apud plerosque subeat, illiusque continuus vsus, in siti restinguenda existat, illud æquè atque aquam humectare, non immeritò existimatur. Verum cum & à vino corpus mox incalescere, omnesque illius actiones vegetiores statim fieri videamus, vti calefacere, sic eadem quoque mensura seu gradu, vt vocant, siccare creditur. Eoque maximè, cum interdum adeo corpus accedat, tantopereque inflamet, vt non solum actualis illius maior, ad sitim extinguendam minimè sufficiat, sed potius potèntialis calor, cum bibitur, ac si oleū igni infunderes, sitim nouam & acquisitiuiam excitet, quā cōpulsū, qui vino maduerunt, à potu vini tantū abest vt fatientur, vt potius ad sitim de nouo impellantur: Vnde postea siccitatis accidentia aliaque caloris, à quibus se diebus aliquot vix dum recolligere possunt, tot tantaque superueniunt.

Verum vini temperaturam pro diuersa vini natura, plurimum inter se variare existimo, quod vt credam, non solum effectibus illius diuersis permotus, quibus nunc summo- pere corpus accendit, nunc parcius illud facit, interdum vix dum calefacit, quandoque ventriculum potius perturbat & refrigerat: Sed etiam cum per gustum rerum qualitates, teste Galeno, rectè iudicentur, & per vini saporem, temperamentum illius dignoscatur, illeque adeo varius sit, diuersum quoque in vino temperamentum inueniri, ex eo non immeritò colligo..

Ad quod cognoscendum, & odor aliquid adiumenti adfert, colorque (vt in vini proba- quam Co s esse dicunt, exprimunt) non nihil opitulatur. Verum quàm vini sapor non vnus, sed admodum inter se differēs inueniatur, quis nō nouit, cum vinum aliud post effervescentiam (tunc enim rectius iudicatur) dulcedinem nihilominus seruet, vt in Creticis, Corsicis, Rhæticis, Burgundiacis & Alsaticis quibusdam videre est: Quorum dulcedo calorē illis inesse, eumque validum, cum odorem vehementem simul spirent, satis arguit. Dein & alia mediocribus magisque excoctis, etsi dulcia minimè permaneant, & quæ vetustate præsertim omnem cruditatē deposuerunt, adeoque se repurgarunt, vt aquosi succi nihil in ipsis inueniatur amplius, colore fuluo, fragrantiaque eximia, calorem qui ipsis inest, satis produnt. Quibus etsi continuò eoque mero & solo in potu vtremur, iuniores præsertim & calidiores, id citra offensam, sicuti in aliis hæc citius, aliàs tardius se manifestat, minimè fieret. Sed quantum ab istis hæc vina differant, quæ acetositatem, postquam à musto deferbuerunt, vel ex sua natura mox habent, vel corruptione primū adipiscuntur, atque accescunt, vel ex immaturis vuis expressa cruda permanēt, sapor illorum acetosus satis comprobatur, quæ cum refrigerare omnes fateantur, nos talia vina calefacere, nullo modo possumus asserere, sed hoc potius profiteri, sicuti in aliis fructibus, permultis, cerasis, prunis, pomis, & maximè arantiis, quorum alia dulcia, alia acida, alia media dicta inueniuntur, illa calefacere, alia refrigerare, media temperata esse, omnes fatetur. Ita & in hoc fructu vitis, cuius tantæ varietates deprehenduntur, non minùs quàm in ceteris idē fieri, vt pro racemorum diuersa constitutione & sapore, vinum inde expressum, quod dulce est, calefaciat; quod acidum, refrigeret, eoque magis quo aceti saporis (quod refrigerare illudque admodum, nemo negat) proximius est: quod & effectus illius, cum calorem ventriculi infringat, concoctionem lædat, flatus generet, ventrem conturbet, dyarrhœas moueat, neruis vti & acetum sua frigiditate obsit, sufficienter comprobatur. Ex quo &

dilucidum fit, illud vinum, quod inter hæc est medium, vinosoque propriè dicto sapore constat, vti neq; dulcedine vel aciditate preualet, sed ex vtrisque mixtum, acido nimirum dulce existit, nec refrigerando, aut calefaciendo insignes vires exerere, sed temperatum potius esse, vtiliusq; ob id in potu consueto, ad sitim extinguendam, aliaque quæ potio commoda adferre debet, præstanda, vsurpari. Cum sitis actuali potius refrigeratione & madore, quam potentiâ compescatur. Quæ vt omnibus liquoribus actu inesse potest, etiam in illis, quæ alioquin potentia calida sunt & sicca: Sic & in vino, etsi quoduis hac ratione sitim sedare possit, vtilius tamen illud, quod temperatum esse, ex sua natura dixi, vel si fortius sit, aqua dilutum tale fit, in consueto vsu salubrius minusque noxium existet.

Sed ad quam denuò reuertamur, illaque vinum diluamus, vt quod Zuingerus noster, piæ memoriæ carmine eleganter expressit. Pallada ne rigidus Maurors, Satyrive petulci, Corrupât, puram Naiada Bacchus amet:

Nunc an aqua tantopere refrigeret, vel temperata potius sit, indagemus. Frigidam enim esse communis habet opinio; quod & rationi consentaneum videtur, cum aqua nostra ad naturam elementaris aquæ proximè accedat, omnisque coloris & saporis expers sit; Experienciâ idem comprobante, cum frigidam ex sua natura semper tactus eam esse deprehendat, ignem qui calidissimus est, restinguat, & sitim compescat; Nihilominus tamen etsi hæc insignem aquæ frigiditatem comprobare videantur, cum illius continuo vsu non lædamur, an hoc ita se habeat, non abs re ambigere videbor, non eam ergo quæ vulgò illi attribuitur potentialem refrigerandi vim aquæ inesse, sed talem illius esse temperiem, & mediocritatem, & veluti medium quoddam in omni qualitatibus exuperantia, quod omnes qualitatibus excessus possit suscipere, credimus; sicuti videmus id permissione illorum, quæ aliis qualitatibus prædita sunt, accidere, à quibus vel maceratione vel decoctione aqua vires exhaurit, illisque imbuatur, adeoque permuat, vt tunc reuera potentiâ refrige-

rare vel calefacere, vel factionem humectare, & siccatæ quæ sicuti aqua marina, dicatur.

Dein & cum aqua quam bibimus, vel saltem in iusculis, aut cibis humidis continuo sumimus, madorem corpori idoneum præbere debuerit, & in serum cōuersa, chylum, sanguinem excrementaque diluere, non frigidam, nisi quatenus actu talis, cum ad sitim compescendam bibi debet, requiritur, sed mediâ (vt diximus) naturam obtinere debuit, cum si potentia frigida esset, illud minimè præstaret, visceraq; interna tandem continuo vsu læderet. Ob eamq; causam, si potentiâ agentem illi frigiditatem conciliare volumus, teste Galeno, aceti guttas aquæ permiscemus, aut alia frigida, vt lactucam & violas, in ea decoquimus: quod sanè si per se intensæque vt putant, refrigeraret aqua, superfluum foret, nec vltius illis leuiter frigidis, frigus illius summum adaugeri posset, sicuti nec calor aquæ calidissimæ, tepidæ aquæ permissione augetur, sed potius retunditur.

Et proin relictâ aquâ, ad vinum tanquam magis acceptum redeamus, illiusque vti prius manifestas, sic nunc absconditas & clandestinas vires indagemus: quæ ratione nimirum inebriet. Quod sanè non vno modo, sed diuersis gradibus ebrietatis dictis, pro naturarum varietate, vini plus minusve ingurgitatione facit. Vel enim exhilarat solùm, mentemque minimè perturbat; vel mentem alienando, lætitiâ non veram sed acquisitiâ, & si profusa sit, stultam parit: vel è contra in aliis tristitiâ & melancholiâ prouocat, aliis iram & furorem conciliat: Alios verò penitus confopit, stupidosve & attonitos reddit. Quæ diuersæ vini operationes, quomodo ab vna eademque vini vi, eaque à manifesta qualitate dependente, vt voluerunt, prodire possit, valde est dubium. Plerique tamen à calore illius vaporoso, hæc omnia euenire, existimant, cerebrum aded replente & accendente, vt fatuitas hæc vel dementia aut obstupescencia inde nascantur.

Hoc saltem pro colophone nostræ disputationis, dijudicandum relinquam. Cum

de alienationes & conſter-  
vi frequēs, quas vinum in ebriis conciliat, læ-  
atque ira à calore, ſtupor, ſopor & me-  
lancholia, à frigidityte, illisq; non niſi inten-  
ſis, vti voluerunt, prodeant, diuerſæque hæ  
qualitates in exceſſu vtrinq; poſitæ, tan-  
quam contrariæ in eodem ſubiecto, vino  
ſcilicet, ſimul conſiſtere nequeant: quomo-  
do vnum idemque vinum, diuerſis in ſum-  
mo qualitatibus, diuerſa hæc animi pathe-  
mata, non ſaltem in differentibus, ſed & in  
vno eodemque corpore, ſed mutua conſe-  
quentia poſſit progignere: Ex quo vti ex a-  
liis multis, aliam inſuper præter calefacien-  
di vim in vino (quæ interdum vti dixi, vel  
nulla vel exigua eſt, & tamen inebriat) illud  
efficere, & proprietatem talem in illo, quæ  
tales effectus producere poſſet, inueniri, ſi  
vellem multis poſſem oſtendere, eamq; nar-  
coticam appellare non vereri, cum & talis in  
aliis ſimilibus, inebrians, dementans, ſtupe-  
faciensque in eſſe deprehendatur, quæ ſi præ-  
fertim calori copulata ſit, potentiùs agit; a-  
nimumque potiùs exagitat & perturbat,  
quàm cõſopit, aliàs verò ſola, ſaporem mox,  
ſtuporemque inducit. Quod in ſemine hyo-  
ſcyami accidere, qui ceruiſiam coquunt ap-  
primè norunt, vti que citiùs ceruiſia poten-  
tiùsq; inebriat, illud in ea decoquunt. Idem  
Mandragoram, ſemen lolij, ſolanum furio-  
ſum, cicutam, ſi cum vino bibantur, facere,  
Dioſcor. docet. Ex quibus & Americani po-  
tionem ſuam, quam Cauoin vocant, parant,  
ſicque ſe inebriant, vti & fumo Hyoſquiami  
Peruiani, quem naribus & ore hauriunt,  
narcotico quoque idem faciunt. Quid quod  
Turcæ, cum in aciem prodeunt, vt temulen-  
ti audaciores & furibundi, pericula minùs  
metuant, opium cum vino bibunt, vti teſta-  
tur Bellonius, ne opus ſit plura in medium  
adferre, quæ hac vi idem præſtant. Nec hoc  
obſtabit, ſi temulentiam hanc aliam, quàm  
eam, quæ à vino naſcitur, eſſe dicant, cum  
certum ſit, à vino non minùs quàm ab illis  
inſanos homines, & non minùs ſtupidos,  
quàm ſi opium bibiſſent, reddi poſſe. Quod  
vt multis oſtendi poſſet, ſic hoc ſolo conten-  
tus ero. Non nego vinum moderatè ſum-  
ptum, calore ſuo omnes actiones vegetiores

reddere, & veluti in actum deducere, viresq;  
reſtaurare. Vnde tamen non adhuc lætitia  
illa quam adfert prodiret (vti neque alia ca-  
lida tantum hilaritatem cauſant) niſi vis illa  
mentem nonniſi obſcureſcans, quæ ſimul vi-  
no ineſt, obliuionem quandam laborum &  
moleſtiarum inducendo, vt minùs ab illis  
admoniti, minùs etiam anxij ſimus, alacri-  
tatem eam hoc pacto afferret. Quod poſtea  
immoderatiùs ſumptum, quia mentis fun-  
ctiones ampliùs rationemque peruerſit, non  
verum gaudium, ſed ſtultam lætitiã, vel  
furorem aut melancholiam inducit, aut ſi  
ampliùs ſenſus internos externosque con-  
ſopiat, ſoporem, aut penitus illis ablatis, ſtu-  
porem parit.

77. *An in potu ordinario vinum lacti  
aut ceruiſia ſit præferen-  
dum?*

**A**N vinum loco potionis ordinariæ vſur-  
patum, corporis ſalubritati conſeruandæ  
apprimè conducit, dubitatur. De illius ergo  
vſu diſſeram, ea tamen moderatione, ne vini  
ſuauiſſime delibutus, plùs illi quam in reſeſ-  
ſu habeat tribuiſſe videar, eosque quos alio-  
quin dulce vini venenum continuò allicit,  
magis cupidos audidosque eius perſuadendo  
reddam.

Nam ſi incommoda quæ adferre ſolet,  
commodis illius conferamus, quæ nam  
corpori detrimenta adferat, conſiderandum.  
Si enim quæ corporis ſuſtentationis cauſa  
continuò nos aſſumere cogit neceſſitas, non  
medicamenta ſed alimenta eſſe, non altera-  
re ſed nutrire debent: vinumque medica-  
mentofum ſit, quomodo non frequens præ-  
fertim illius vſus, corpus deſtruet potiùs  
quam eriget?

Cum omnibus in confeſſo ſit, Vinum ca-  
leſacere, eodemque gradu licet actu maſefa-  
ciat, corpora exiccare, quod vt ſemper, ita  
maximè illud, quod naturã potens eſt, vel  
etiã tempore antiquũ, id præſtabit validiùs.  
Hinc non mirum iuuenilia corpora, vſu vi-  
ni ſubinde accendi, febribus, inflammatio-  
nibus internis, pleuritidi, phrenitidi, hepa-  
titidi, aliisq; morbis calidis obnoxia fieri:  
Vel



Vel saltem supercalefacta, absumpto humido viuifico, dissipatoque calore moderato, ac si quis calcem viuam arboribus continuò affunderet, citius senescere, & ad interitum properanter perducì. Sed & senibus quibus vinum hæc incòmoda ratione calorìs (quo potius iuuantur quàm læduntur) minimè adfert, eo tamè nomine exitiosum est, quòd cerebri neruorumque affectus, qui senibus maximè insidiantur, producit, apoplexiam nimirum, paralyfin, stuporem, carum, & præcæteris diuturnum illum acerbumque tortorem, podagram. Vt non immeritò, veluti Colici dolores, crapulæ, lues venerea, luxuriæ, ita podagra ebrietatis flagellum pœnaq; diuinitus missa existimetur.

Verùm præter enormia eiusmodi, quæ humano generi adfert incommoda, hoc quoque non minimum, quòd mentem, vel modicè sumptum statim immutat, intentiones animi cogitationesque adeò distrahens, & vel subitaneo quodam gaudio perfundens, vel mœrore interturbans (prout natura est hominis, quam vinum mox prodit) vt post illius potum quæcunque agimus, vel segnius procedant, vel præcipitanter remeque obeantur.

Intemperantiùs verò sumptum, quantopere animum peruerat & dementer, stultitiam quandam ridiculam excitans, vel horrendum furorem concitâs, aut maniam melancholiâmve acerbam procreans, quotidiana, plus quam conueniat, ostendit experientia.

Quid vero de ceruisia? Cuius siue fastidiosum, præsertim non consuetis, odorem spectes, siue vires illius languidas examines, fateberis, illam neutiquam vino comparandam esse. Si enim ex quibus illa constat aquam, fructus cereales, lupulos consideres, quæ nam in istis occurrit vis, quâ permoti, ceruisiam potius quàm aquam simplicem, ad corporis refectionem, in quotidiano vsu mensis adhibebimus? Aqua refrigerat, neq; illam facultatem etsi decoquatur, deponit. Quæ autem noxæ à frigidorû continuo vsu corpori accidunt, norunt hi præsertim, qui ventriculo debiliori præditi, aquæ vel ceruisiæ potu, quàm faciliè offenduntur.

Adde, quod ex aqua semper tior<sup>ne</sup> excoqui ceruisiam, vulgus si<sup>no</sup> suafum habet. Quam quæso aliad<sup>n</sup> sa, quàm quòd tenacior, magisque fortè ter<sup>n</sup>rida & amara (quibus nimirum notis ceruisia commendari solet) sic præparata redatur.

Est ne obsecro, aliquis mortalium, si illos excipias, quorum gustus, consuetudine à teneris vsu ceruisiæ deprauatus est, adeò stupidus, vt amara dulcibus, foetida odoratis præferat, qui vix dum libans aut olfaciens ceruisiam, non exhorrescat?

Iucunda narratur historia de Rustico quodam, qui accusatus ab illa, cum qua matrimonium contraxisse dicebatur, quòd promissis non stare, deierans ille, nihil factum pœnamque sibi ipsi statuens, vt si tale quid à se perpetratum esset, primus haustus in venenum verteretur, arreptoque poculo ceruisiæ, quam priùs nunquam gustarat, cum bibendo amaritudinem illius experiretur, perterritus Deo vitore, potum in venenum mutatum fuisse, existimans, mox delictum passus, veniamque deprecatus est. Sed quid fructus cereales, triticum, hordeum, auena, ex quibus ceruisia coquitur, aquæ adferent emolumenti: quæ flatulenta cum sint, concoctionem lædunt, aliisque multis morbis, qui à flatibus prodeunt, præbent occasione.

Quid lupuli præter insignem amaritudinem, & quòd caput tentant dementantque (qua de causa & hyosquiamum aliqui magno cum periculo addere solent) aliud quid ceruisiæ iucunditatis vel emolumentum adferet?

Nunc aliquid de lacte: Nisi erga materna vbera impius, aut in patriam Heluetiam iniurius esse viderer, lactis quoq; detrimenta enarrare possem.

Non tantum quæ Hippocrates in Aphorismis obiter duntaxat attingit, inquiens, Lac capite dolentibus malum; Lac item febricitantibus minimè competere. Verùm & quod ventriculum frigidum flatibus adimpler, minima humiditate relaxat, & veluti oleo perungit, imbecilliorumque reddit. Et quod in eo facile acefcens, vel concrefcens, coaguli instar caseosum redditur. In calido verò mox corrumpitur adeò, vt in ve-



sunt, refrigerare credens, vt hordeum, fructus fugaces & similia) fieri non solet, nec in eo tantopere delinquitur, cum sola acidare refrigerare alibi exposuerimus, illisque non adeo delectentur vulgò, vt cibos nimia horum admixtione omnino acidos reddant, leuisque aciditas, ad calorem immoderatum, & biliosos humores, quibus grauius & frequentius nostrum corpus afficitur, contemperanda & infringenda, appetitumq; simul excitando, plus sic iuuando proffit, quam refrigerando obsit. Sed hic error in conditura ciborum, ex iis quæ corpus accendunt & inflammant plerumque procedit, nempe permixtione eorum, quæ dulcia, odorata, acria, falsa, vel aromatizata sunt, quæ cibos adeo calidos reddunt. Quibus tamen sic delectantur homines, vt vix dum cibis apponatur, cui non alium quam natura illi indidit saporem, hisce variis modis commixtis, milleq; rerum formis & condituris concilient, tantopere ea ex deprauata consuetudine appetentes. Vt & quæ amara sunt modò odorata sint, sicut in vino absynthite videre licet, non modò nò respuant, sed & illis delectentur. Immodò quæ & abominabilia sunt, putrida scilicet & foetida, vt caseus putris, haleces suffumigati, & quæ virosi odorem spirant, vt allia, iucunda esse ducant: quos tamen ab alimentario gustu sapores alienos, animalia cætera, nisi quoque ipsorum natura ex conuersatione cum hominibus peruersa sit, auersantur, vnde etiam minùs morbis afflicta, destinatum vitæ terminum reuoluitur. Cum homines calefacientium & siccantium horum alimentorum intemperato vsu, humorem primogenium, caloris natui pabulum absumendo, senium citius quam ætatis ratione fieri, debebat accersant, mortemq; sic accelerent; Vel morbis grauissimis aliisque incommodis occasionem præbeant. Cum ex illis non tantum biliosus humor coaceruetur, sed & sanguis inflammetur, putrescat, vnde febres torquæ alij morbi grauissimi corpori incommodantes, summoque dolore excruciantes, indies nascuntur, & sauiunt: quos omnes recensere non est necesse. Hoc tamen quod priuatim obseruauimus addendū, serum ipsum,

quod & statim in prima concoctione, in modum quoque calidis hisce condituris accenditur, & à falsis falsedinem, à putredinem, à foetidis foetorem concipit, inde quoque genitæ non tantum occasiorem, dum sanguinem diluit, vt inde afficiatur dare, sed & hinc inde, cum serum vniuersum corpus peruadat, viscera alluendo, falsedinemque illis quam in se habet & contrahit, angustioribus illorum ductibus affigendo, arenulis & calculis in hepate, renibus aliisque in locis, originem, sicuti alibi ostensum fuit, præbere. Dein & in vesicam repurgatum, conceptam illam caliditatem, acrimoniam & falsedinem nondum deponere, eoque nomine ad excretionem continuo sollicitando, mictionem illam frequentem, & quæ noctu toties urgere solet, causare. Hancque ex præcipuis quoque causis vnā esse, quòd tot exulcerationes renum & vesicæ homines molestant. Et quòd renibus & vesicæ supra modum calefactis, vicinæ quoque partes spermaticæ, præternaturali calore affectæ, humorem vtilem, qui ad seminis generationem requiritur, absumendo, vt semine abundanti destituatur, etiam illi, qui alioquin ob calorem dictum, ad Venerem incitantur, sed semen exiguum vel nullum profundant, causa sit. Quæ vitia ex hoc errato prodeuntia, vt in matura adhuc ætate, sic & in senectute, tum quia in iuuentute istis condituris immoderatiùs vsi sunt, tum quia sibi ratione frigiditatis conuenientiora, senes esse credunt, damna eiusmodi adferunt. Quæ tantum ex vino, quod tantum nisi dulce sit, vel nimium ingurgitetur, aliàs acidulum seu vinosum existens, adeo inflammare non posset, proficisci omnes clament, nec ab eiusmodi condituris, vti verò sit, eoq; magis si ebrietas quoq; accedat, euenire credūt. Vti & mulieres, quæ se frigidiores cum esse putent, calidis quoq; immoderatiùs vtentes, eadem ratione damna accipiunt. De quibus præmonuisse necessarium esse duxi: cum nimia varietas ferculorum & conditura, plus lædere soleant, quam ciborum aliorum simplicium, à plantis præsertim desumptorum, quos vulgus tantopere obesse putat, moderatus vsus.

63 *Brassica capitata & Caro porcina num  
vtri frones  
adit  
at  
b  
ran*  
leò cibi sint noxi, vt vulgus homi-  
num putat?

**B**rafsicam & carnem porcina, in no-  
stris regionibus, præ cæteris alimentis,  
noxia esse censet vulgus, & præcipuè Chi-  
rurgi, vulneratis prohibere solent. Quæ qui-  
dem nocere solere, vti alia omnia salubria a-  
lioquin alimenta, quando immoderatè su-  
muntur, quòd cum hæc suauias sint, frequen-  
ter accidit, facillè concedo: idque præsertim  
si brassica condita, aciditatem illam in com-  
posito, Gumpist dicto, acquires, calidiores  
naturâ, ad illius nimiam ingestionem inuitâs,  
immoderatiùs sumatur. Et caro porcina fa-  
lita suffumigataque diu asseruata, pinguiore  
illius parte rancorem contrahente, facillè ob  
id in ventriculo corrumpitur; carneque ip-  
sius falsâ, sitim præternaturalem parit, &  
exiccata indurataque ægrè concoquitur.  
Verùm si recentia hæc sint, moderateque su-  
mantur, succum laudatû gignere, & citò cõ-  
coqui, nec obesse, certum est. Brassica enim  
& præsertim quæ foliis constat teneriori-  
bus, albicantibus denseque complicatis, sic-  
ut capitata, (quam tamen præ omnibus da-  
mnant) benè cocta, teneritatem acquires  
eximiam, quod facillè à ventriculo nostro co-  
quatur, satis ostendit. Suauis alimentarius  
illius sapor, eam quoque euechymam esse,  
manifestè declarat, cum nihil in illa nitrosi,  
aut quod alienum saporem redoleat, depre-  
hendatur. Sed & condita, vti dictum, brassi-  
ca, cum prius antequam condiatur iam co-  
cta sit, & sæpe iterum coquatur, licet acidula  
sit, nocere quoque adeò vt putant, minimè  
potest, cum præter quàm quod digeritur si-  
ne labore, appetitum sua aciditate excitet, &  
sitim caloremque internum mitiget. Quod  
porcinam quoque carnem attinet, quam por-  
cellorum iuniorum caro suauius sit, tenera,  
gustus ipse indicat, & quam succum idoneû  
& corporis nostri substantiæ alendæ simi-  
lem generet, Galenus laudare satis non po-  
test. Quam naturam, licet porci sint facti ad-  
uliores, minimè deponunt, licet vetustate  
durius caro facta, difficiliùs coquatur, faci-  
lius tamen quàm taurorum eiusdem ætatis,

quàm tamen longè salubriorem esse putant,  
in ventriculo elaboratur, cuius rei argu-  
mentum est, quòd etiam porcorum adulto-  
rum caro assata, tenera & esui apta fiat, tau-  
rorum verò minimè: quæ vt edi possit eli-  
xatione opus habet, cum per assationem adeò  
fiat tenax, vt ne masticari, longè minùs faci-  
lè in ventriculo digeri possit. Quod pingue-  
dinem verò porcinae carnis attinet, cum so-  
lidior sit, quam diu illa recens manet, nec  
rancida sit, aut alio modo situm contrahit,  
siue cum carne edatur, aut separatim, carni  
vti fieri solet infixâ infarctaque, non facillè  
quoque corrumpitur, sed vt butyrum aliaque  
similia rebus suauiatatem adferens, & molli-  
tiem, vt citiùs concoquatur, efficit. Quæ om-  
nia de rectè præparatis & moderatè sum-  
ptis dicta esse volo.

80. *An oua piscium vti & Gallinarum alui  
fluxum in quibusdam efficiant?*

**O**ua piscium comesta alui fluxum com-  
mouere, experientia ostendit, non so-  
lùm barbi piscis, sicuti vulgus nouit, eoque  
nomine ab illis sibi in epulis cauet, sed & a-  
liorum. Nam & truttæ oua, quæ mollia ad-  
modum sunt, abundantius in cœna sumpta,  
diarrhœam me tota nocte & sequenti die af-  
fligentem, mihi pepererunt. Idem cum  
percæ oua minuta, quæ in delictis habentur,  
sæpe etiam cum Carpionum oua comederem,  
mihi accidit. Quod non vi quadam  
purgandi, quæ illis inesse deberet, sed potius  
quia facillè in biliosis præsertim naturis, cor-  
rupta in ventriculo, in bilem abeunt, acci-  
dit, quæ postea eiusmodi fluxus alui mouet,  
cuius rei inditium, ructus, cardialgia, & de-  
iectiones biliosæ, existit. Sed & oua alia gal-  
linarum in picrocholis sumpta, simili mo-  
do, corruptione in bilem conuerti, aluumque  
conturbare, in me ipso multoties exper-  
tas sum.

81. *Qua nam ouorum piscium assumpto-  
rum vis?*

**O**ua piscium noctu sumpta, Venerem ad-  
modum stimulant, facillè in biliosis ven-  
triculis corrumpuntur, & in bilem transeunt,  
quo nomine diarrhœas biliosas causant, mi-  
tiora sunt carpionum, venerem stimulant,  
fortius



fortius purgant Truitæ. Perce oua Germanorum Versig Nogen/cum noctu affatim comedissem, ardorem in stomacho mihi excitarunt, facile enim corrumpuntur & in bilem abeunt, sicuti & aliorum piscium, cancrorū, barbi oua, vnde diarrhææ postea vt dictum sequuntur. Comedi oua carpiionum non satis elixa, sensiq; ea nocte & die sequenti ardorem stomachi, & postea diarrhæam. Video hæc corrumpi in bilem, hinc multa purgare videntur, quæ in bilem mutantur.

82. *Oua gallinarum quomodo corrumpantur?*

**O**Va dura præsertim, in meo stomacho corrumpi, & ardorem stomachi & biliofas deiectiones mihi causare, sæpe obseruavi. Quam putris sit ouorum putrescentium materia satis fœtor eorum indicat.

Oua vulgus calefacere putat, quod ex eo natum existimo, cum in biliosis & calidis ventriculis facile corrumpantur, & in bilem meracissimā sæpe conuertantur, à qua ardores ventriculi, sitis, pronata, à calore ouorum produsse autumant. Vnde & diarrhæa plerumque sequitur.

83. *Lactis spuma dum feruet cur non urat?*

**L**Ac quod ad casei separationem ebullit, spumam copiosam reddit, quam si quis etiam feruente adhuc lacte bibat, ea tamen, cum calor illius aëris permixtione repeat, os minimè peruret, vt verò accidit, si profundius intincto cochleari, lac ipsum quis bibat. Hoc discrimen cum minimè obseruaret eremita quidam, Heluetiumq; imitari volens, qui spumam lactis prægustarat, ipse altius cochleare immergens, lacque bibens, labia perureret, eos rostrum corneum insensile, non autem labia habere existimans, vbique sparfit.

84. *Cur veneris stimulus à pipere, lacte, decubitu supino?*

**P**iper comestum, sub noctem præsertim, Venerem stimulare, vnde rigor penis, & gonorrhœa sæpe superueniunt, vsu comperitum est, quod quia vrinam acrem calidamq; reddit, quæ postea vicinitate partes sperma-

ticas, maximè si semine turgeant, incidere, vt in cantharidibus quoque est, frequens mætio quæ subsequitur, in facit, & quod post eam pruritus non nihil fat. Hoc autem à pipere proficisci, cum ignoraretur, creditum est hactenus, scolymi fructum, tubera terræ, aliq; similia cruda, quæ non nisi pipere condita eduntur, Venerem stimulare, cum tamen hoc à pipere vti dictū, prodeat. Lac Diettemisch hordeum & Mielbrodt si affatim comedantur, & calida post ea, vt solent ad stomachū corrigendum, venerem noctu stimulat & gonorrhœam facit.

Decubitus supinus, quia renes accendit, venerem stimulat, gonorrhœam in dispositis, semineque turgentibus facile inducit. Hinc & qui in duro strato recumbunt, priapismo magis laborant.

~~~~~

THERAPEVTICÆ.

85. *An Signa cœlestia sollicitè in curatione morborum obseruanda?*



SIGNA cœlestia duodecim distinctis corporis partibus, singulis singula adpropriant, à capite, cui primum signum, arietem nimirum adscripserunt, ad pedes vsque, pisces destinatos procedentes, nimis curiosè, vt in multis aliis, sic præsertim in phlebotomia facienda, nostri Germani obseruant, ita vt illa dies, in quam hoc illudve signum, incidit, venam quæ à parte illa, cui signum accommodatum est, sanguinem educit, incidere, tanquam si cum periculo fieret, summo opere reformident. Tantum horum signorum efficaciæ tribuentes, vt ea non tantum in magnis illis mutationibus in corpore, quæ euacuationibus hisce, vti & purgationibus fiunt, obseruent, sed & in aliis omnibus operationibus, tum in corpore, ad vnguium & pilorum vsq; resectionem, tum extra corpus, in agricultura præsertim, aliisque muniis obeundis, pro horum ratione diem eligant aut vitent, omniaque ferè instituant. Cuius tamen rei neque rationem aliquam, nec experientiam habent: cum

63 *eteribus Græci Latine, nec ex
vi frequentis vel Galli vel Itali Medici, tot iam
atque his, his quicquam tribuant: quæ Mau-
h. in nimis superstitiosè inuenerunt, quo-
tam nugis nos pertinaciter tamen inhæ-
remus.*

86. *Quibus instrumentis instructus
esse debeat Medicus?*

DE instrumentis quibus Medicus, cum sit summus artifex, instructus esse debet, Remediis scilicet, quorum operâ, causas morbosas e corpore exturbat, dolores mulcet, viresque lapsas reficit atque instaurat, nunc agendum: sunt enim hæc præcipua Medici instrumenta, quorum alia cathartica vel purgantia, alia narcotica vel stupefacientia, alia reficientia seu confortantia dicuntur.

Quæ eximiis viribus prædita, cum actiones in corpore & magnas & summè necessarias obeant, non mirum in facultatibus horum remediorum inueniendis, quibus opera hæc perficiunt, tantopere & veteres & neotericos infudasse.

Nam ut de purgantibus primum dicamus. Quæ vi & potentia ea assumpta, sæces primum crassiores, per viam naturalem excretioni destinatas, mox tenuiores serofosque inde biliosos pituitososque humores, eorumque ichores, expurgent, admodum ambigitur.

Fuerunt enim qui non ipsis medicamentis vires hæc adscripserunt, sed naturali motu, per fugam vacui hoc fieri contendunt: cui sententiæ Auerrhoës suffragatur, inquiens: Consequutione quadam, portione vnâ detractâ, ei quæ euacuata est, aliam succedere, ne vacuum quicquam & inane in corpore relinquatur. Verum cum necesse sit in hoc motu, vim quandam ei, quod primum mouet inesse, nec illa hac ratione explicetur, hæc opinio tanquam inanis iam dudum explosa est.

Reiique verò quibus magis sana erant mens, ipsis purgantibus pharmacis, hæc facultates acceptas referunt, quæ id viribus insitis præsent, in eo tamen admodum discrepant, quod alij vi quadam attrahendi

humores, alij verò eosdem expellendi, id efficere contendunt.

Qui Attractionem prætendunt, eam à temperamento proficisci voluerunt, hisce argumentis nixi. Quod cathartica medicamenta omnia calida cum sint, adeò, ut multa etiam acria adurentiaque inueniantur, calorisque proprium sit attrahere, à calore horum sine dubio hanc ipsorum attractionem prodire censuerunt.

Verum cum alij non omnia calida medicamenta, veluti aromata purgationem moliri cernerent, ad totius substantiæ proprietatem, quam alij in materia, alij in forma, alij cæca quadam & occulta vi posuere, transierunt, eamque vel similitudine quadam, vel sympathiâ, uti magnes ferrum, succinum festucam, dictamnus sagittam, musca aculeum, alliciunt, ita humores quoque ad se eiusmodi purgatiâ rapere crediderunt.

Quorum tamen argumentis hæc aduersari videntur. Quod vnum idemque pharmacum diuersos humores educit; quod mortuo si medicamentum infundas, nulla sequatur euacuatio.

Quibus potissimum, uti & aliis multis moti, neoterici præsertim, attrahendi illam vim relinquentes, expellendi potius facultatibus illud præstare opinati sunt. Quæ tanquam inimica, noxios humores propellant protrudantque, & in fugam, uti quibusdam placuit, conuertant. Antipathiam potius in hisce causam statuentes, quæ medicamentum purgans humori, quem purgare debet, aduersatur, eoque nomine humorem ubi primum purgans pharmacum in corpore præfenserit, veluti suum hostem fugere, exitumque per loca à natura ad id destinata, sibi querere & patefacere.

Cæterum cum in quo nam hæc antipathia potissimum sita sit, non explicant, qui huic sententiæ adstipulantur, obscura obscuris magis obscurare videntur. Qui rectius meo iudicio sentire censentur, purgatiâ remedia efficaciam quadam, quæ corpus nostrum exagitant, contrurbant, & ad excretionem sollicitant, facultatemque expultricem stimulant mouentque deiectiones, moliri, multis rationibus conuincunt.

Quod

Quòd nulla è corpore fieri possit euacuatio, nisi facultatis expultricis beneficio.

Quòd alui excretio, cùm actio sit naturalis, seu opus naturæ vt vocant, à facultate aliqua, quæ expultrix est intestinorum, eam prodire necesse sit.

Quòd eodem modo, sicuti spontanea alui excrementorum repurgatio, ab excrementis, copiâ atq; acrimoniâ facultatem expultricem ad excretionem sollicitantibus, proficiscitur, sic & ea, quæ à medicamento cathartico sequitur purgatio, eadem ratione, quia eandem facultatem excitet, proueniat.

Quòd homini mortuo, in quo hæc facultas extincta est, vel illis quoque, quibus ob casum apoplecticum, aut veternum saltem sopita stupidave existit, si purgans exhibeas pharmacû, nulla inde sequatur alui deiectio.

Quæ vt & alia multa, indubitanter in omni siue naturali, siue violenta alui deiectione, facultatis expultricis beneficio expurgationem perfici, apertè declarant, eamq; medicamento peculiari vi excitari, firmiter probant. Quàm catharticonum medicamentorum vim, partim irritantem esse, partim aduersam, eamq; manifestam, vel à leui deterfione quâ mitiora purgantia intestina à facibus abstergunt, naturamq; sollicitant, profectam, vel à vehementiori vi acri, adurentëve, intestina vellicante suscitatum, accedente semper inimica horum pharmacorum purgatiû qualitate, quâ, vel solo odore nauseam, maximè assumpta, subuersionem ventriculi & intestinorum molliuntur.

Quibus certis apertisq; potentiis & qualitatibus hæc operari, suæque munia perficere, cùm multis demonstrationibus rationibusque comprobari possint, ea lubens prætereo.

Verùm cùm narcotica stupefaciëntia pharmaca, non minori efficacia vires suas exercent, non mirum in hisce quoque indagandis plurimos laborasse.

Hæc enim secus ferè ac reliqua omnia medicamenta, potentiâ agëntia, veluti in mômêto, vbi primùm assumpta fuerint, somnû inducunt, sensus consopiant & stupefaciunt, eoq; nomine dolores atrocissimos, in quacunque corporis regione sequentes tollunt:

vnde non immeritò Deorum mâ fuère. Has illorum vires à frigiditate^{ec. nro} cisci, plerique crediderunt, cùm frigidit^{in n} prium sit, partis sensum adimere, calidit^{in n} natium temperiemq; extinguere, omnesque functiones delere: caloris verò, easdem vegetas & ad agendum efficaces reddere.

Verùm si frigida qualitas eorum in causa est, quare ea quæ longè illis frigidiora existunt, qualia sunt aqua ipsa, acida multa, aizoon, non idem operantur?

Adhæc si tanta ipsis inest refrigerandi vis, quæ ad quartum vsque, vt inquit, gradum protenditur, quare extrinsecus admotâ, partem minimè refrigerât? quare inflammationibus, quas potius lædunt, non applicantur?

Contrarium horum vsu euenire, quotidiana ostendit experientia: folia mandragoræ, hyosquiami, papaueris, confusa applicataque, durissimos emollire tumores, materiam potius discutere quàm repellere, quod non aliunde, nisi à calore prouenire necesse est.

Sed & Opii atque Cicutæ amaritudo, calidas illis inesse qualitates, cùm omne amarum sit calidum, apertè declarant.

Torpedinem tanta stupefaciendi vi præditam esse, aiunt, vt non tantùm cõtacta calcataue, sed & per sibi infixum piscatorum tridentem, protinus manum illius stupefaciat. Talpam quoq; si manibus retenta moriatur, stuporem inducere scribunt.

Quis quæso hoc à frigiditate ipsorû, cùm viua sint animalia, proficisci crediderit?

Sed & vinum ipsum, quod calidum esse nemo negauerit, stuporem inducere, somnum conciliare, attonitosq; omnino reddere, quotidiana plus quàm conueniat, docet experientia. Quod licet plerique à vaporibus quibus caput tentatur, prodire arbitrentur, narcotica tamen vi id præstare, vel hæc tantùm probare videntur.

Quòd non recens tantùm vaporosum adhuc, sed & antiquum defæcatum idem efficiat.

Quòd arte chymica summè attenuatum, in liquorem illum, quem aquam vitæ nominant, nihilominus tamè dementet, longeq;

63 potentiùs, quàm vel mustum vel
 vi fresnes, crudum inebriet, stupidosq; reddat;
 atq; sanè, longè aliam in eo qualitatem,
 in vaporum copiam, eiusmodi magnas
 tan corpore alterationes moliri, sensusque
 stupefacere.

Cæterum cum Medicus, nō tantum mor-
 bi, sed & virium potissimum rationem ha-
 beat, vnoque oculo morbum, alio vires in-
 tueri debeat, in viribus conseruandis, quæ
 vsurpantur remedia, præ cæteris ferè subli-
 mia & eximia existunt. Quid enim præstan-
 tiùs, quàm languentes, defessos solari, refice-
 re, vitamq; ipsam, quā nihil mortali homini
 in hac vita contingit præstantiùs, conserua-
 re, vnde & hæc remedia manus Deorum ve-
 teribus, quod veluti manibus collapsos sub-
 leuent, erigantque, dicta fuere?

Hæc quidem cum varia multaq; sint, non
 tantum vniuerso corpori appropriata, sed &
 singulis partibus conuenientia, illorumque
 temperamentum fouentia, Deus opt. max.
 in vsus hominum disposuit.

Hinc alia simpliciter reficientia, roboran-
 tia, restaurantia, confortantia dicuntur, alia
 quæ partibus accommodata, cephalica, oph-
 thalmica, otica, pneumatica, cardiaca, arthe-
 tica, aliòve modo à parte ipsa deducto nomi-
 ne, appellantur.

Inter quæ manifestis qualitatibus frigidis
 calidisve ea operari pleraque, citra dubium
 est, quibus caput, ventriculum, iecur vel ca-
 lesfaciunt vel refrigerant, iisdemque im-
 moderatiùs partes à temperie deductas alterât,
 & ad medium reducunt.

Verum hæc vires in ipsis quatenus mu-
 rationem aliquam in corpore faciunt, mini-
 mè hic requirimus, sed eas, quibus priuatim
 partibus affinitate quadam proprietateque
 coniuncta, eas non alterant solum, sed & fo-
 uent, reficiuntq; simul indagamus, vt cum
 betonica, saluia capiti; euphrasia oculis, por-
 tulaca dentibus, capillus veneris pulmonib-
 us, buglossa cordi, endiuia hepati, scolopé-
 drium lieni, mentha ventriculo, chamæpy-
 this articulis, peculiari vi conuenientia, iis
 præ cæteris accōmodata existunt. Quas vi-
 res à manifestis qualitatibus non prodire,
 vel hoc solum sufficienter probare videtur,

quod ea quæ iisdem qualitatibus prædita
 sunt, non tamen idem in parte, quod reme-
 dium illi appropriatum, possint efficere.

Ad hæc quod eiusmodi medicamenta, ex-
 perientiâ ab animantibus quoq; brutis ob-
 seruata, longoq; vsu comperta, potiùs quàm
 ratione inuenta sint, gustusque qui qualita-
 tes manifestas, simplicium aliàs prodit, hæc
 nihil solidi dijudicer.

87. *Quem usum aquarum naturâ acida-
 rum potus corpori humano præstet?*

Huius rei considerationem summè neces-
 sariâ esse duxi, quod multi diutinis mor-
 bis & languoribus affecti, & penè confecti,
 hisce temporibus, tanquam ad extremum a-
 sylum, ad aquarum illarū acidarum vsum,
 in ea loca, vbi harum inuenitur scaturigo, se
 conferât, nostriq; non iam amplius ita Gōp-
 pingeses, sed ob viciniam, Griesbacenses no-
 uiter inuentas, bibant, illisque etiam ther-
 marum vice vtantur, consueto & vsitato fe-
 rè hoc modo.

Purgato primùm corpore, manè ex hospi-
 tio egressi, ad scaturiginē fontis pedes eunt,
 iterq; hoc horæ propemodum spacio confi-
 ciunt, atq; è fonte aquæ acidæ cyathum hau-
 rientes, primo die; binos altero, mox plures
 dierum numero cyathos, donec ad septem
 vsq; peruentum fuerit, augètes: poculumq;
 manibus aliquamdiu versantes, donec fri-
 giditas aquæ nonnihil mitigata fuerit, eam
 postea vniuersam ebibunt, & mox ad ho-
 spitium iterum se conferunt: Prandioque
 confecto, exactis tribus vel quatuor post il-
 lud horis, denuò itineri se cōmittentes, po-
 tum eadem mensurâ repetunt redeuntque.

In qua deambulatione, tum ob haustum
 aquæ, tum ob exercitium, sudoribus cōmo-
 tis, domum reuersi lectoq; se componentes,
 sudori aliquamdiu operam dant, seq; ab eo
 extergentes, surgentesque, cibum capiunt,
 seq; recreant: Portionisq; loco in prandio &
 cœna, vel eadē aquâ acidâ solâ vel vino per-
 mista & dilutâ vtuntur. Et in vsu harū aqua-
 rum, in potu septimanas binas plerumq; in-
 sumunt. Nihil vltèrius adhibètes, nisi quod
 conditis quibusdam ventriculum, ne actuali
 hac frigiditate aquæ lædatur, muniunt, atq;
 acciden-

accidentibus aliis, si quæ superueniant, certis remediis prospiciunt.

Interim tamen & alij in iisdem aquis acidis arte calefactis, domum ab aquatione reuersi, corpus denudatum lauant, moramq; aliquamdiu trahunt. Quod alij absoluto primum eo, quo eam biberunt tempore, moluntur, septimanasque aliquot hoc balneo vtuntur.

Quæ omnia ritè administrata, multis profuisse experientia testatur, cum multi ex obstructionibus viscerum, malū corporis contrahentes, & cachexiā diutinā laborantes, & quibus hydropis imminerebat periculum, harum potu restituti sint, multis quibus muliebria defecerāt, harū vsu reuocata fuerint.

Et quibus alui constipatio familiaris, sitis præternaturalis inordinata, prostrata appetentia, aliaque quæ bilis præsertim adferre solet incōmoda, negotium facessabant, melius post illarum vsum habuerint.

Quibus fabulum, arenæ, calculi in renibus aut vesica congesta, nephriticos dolores pepererant, postea ab illis liberi & immunes facti sint; Et præsertim quibus illuvies fœda, biliosa, putris, maligna, in venis meseraicis coaceruata, diuque retenta, varia accidentia, quæ melancholiam hypochondriacam, epilepsiam, febres intermittentes, præire, minari atque procreare solent, induxerat, potu acidarum, per dyarrhœam, quam illæ plerumq; mouere solent, excussa, manifesteque in ipsis excrementis subcinereis & subnigris apparente, ab eiusmodi grauib. affectibus, quorum præludia iam senserant, liberati fuerunt. Aliqui quoque scabritie & pforâ infecti, vlceribus cacoëtheis & malignis infestati, balneo harum aquarum curati sunt.

Vnde & factum, vt tot successibus quamplurimi commoti, non solum in enarratis affectibus, hisce aquis vtentes, ab illis iuuentur, sed & aliis oppressi malis, cum in omnibus prodesse credant, in iis quibus minimè conueniunt, eas quoque bibentes, harum vsu incōmodum potius quam emolumentum sentiant: & potissimum ex illis, qui pulmonum morbis detenti aut obnoxij sunt, peripneumonici, asthmatici, anhelosi, phthisi-

ci etiam grauius lædantur. Et cum apud inuoliter, quo in hisce locis morantur, collocent, sed geminum vsu piant, potui huic aquarum, in sektionē & tionem in illis quoq; coniungant, atque intrinsecus sumptas, ita & extrinsecus admotas, profuturas existimant, hac ratione unius incommodo alterius commodū perturbantes; sit, vt non solum sine fructu, sed & cum noxa plurimi illis vtantur.

Quam vt euitemus, accuratiorē instituam tractationem aquarū naturalium, de quibus etsi varia multaq; prodita sint, ego qui subterraneorum naturā diu perscrutatus sum, quid nam singulare in illis cognouerim, observatione digna, breuiter explicabo.

Aquæ naturales dictæ, nulla arte elicita, sed ex terra sponte ex illius visceribus, faucibusq; effluentes & emanates, varium vsu omnibus animatis præstantes, puræ & simplices, & quæ omnino ad huius elementi naturam accedant, vixdū inueniuntur, sed varias illas partes inesse, à terrena mole, quam continuò alluunt, in ipsas deriuatas illisque permixtas, nūc visus, quod minùs perspicue, nonnunquam & turbatae sint: nunc gustus, quod sapore, nunc falso, nunc acido, nunc acri prædita existat: nunc olfactus, quod sulphur vel bitumen redoleant: nunc tactus, quod crassiores & tenaciores sint: nunc visus quoque, quod coloratae nonnihil existat, dijudicant. Nec solum hæc, quas sensus tales esse manifestè indicat, sed & in quib. sensus nihil tale deprehendit, cum limpidissimæ & puræ appareant, vel sponte diutinā residentia, aut vi ignis coctioneq; sedimentum aliquod deponant, permixtae aliena re, simplicesq; omnino esse minimè videntur. Quod qua ratione & à quibus procedat, in singulis demonstrabitur.

Terrenā hanc molem ex quatuor corporibus, quæ subterranea vocat, constare, terra nimirū ppriè dicta, lapide, metallo & succo terrestri, præterq; hæc, aquā etiam continere, suoq; gremio cōcludere, nec alia corpora illic inueniri, omnib. in cōfesso est. Quæ sanè rariùs sola, cōiuncta verò cōfusaq; frequēt. deprehenduntur. Terraq; nō simplex, sed humore irrorata, fabuloq; permixta plerumq; existit.

63
 vii frequenter, cum lapide metalloque interdum
 ta, glebam vocatam, à Metallicarum
 at, peritis efficit. E' quibus omnibus
 ch, atis permistisque, nunc succus falsus,
 tan, veluti sal, alumen, nitrum: nunc acris, vt cal-
 chathum, quod atramentum vocant; Item
 ferrugo, ærugo, nunc succus pinguis, sulphur
 nimirum & bitumen exfudant, efflorescunt
 copioseque interdum emanant.

Cæterum qua ratione hæc aquæ, cuius
 naturam indagare animus est, permisceantur,
 videamus. E' crassioribus corporibus
 subterraneis, terra, lapides, metalla, cum di-
 versæ penitus naturæ ab aqua existant, &
 terrena, si propriam illorum substantiâ con-
 sideremus, cum aqua vera mitione, quæ to-
 tius per totum est commistio, naturaliter, vti
 nec dum arte, etsi in tenuissimum pollinem
 redigantur, misceri minimè possunt. Cum si
 quæ ex illis vti terra præcipuè, aquæ permi-
 sceatur, eaque cœnosa & lutosa fiat, vel are-
 nulis aut sabulo confundatur, sponte graui-
 tate sua fundum petentia, ab ea rursum se-
 parentur. Et metalla, lapides, hisce longè
 grauiora, etsi in aquis deprehendantur, his-
 ce tamen minimè, eo quo diximus modo,
 permisceantur, aquasque hac ratione mini-
 mè immutare aut turbare possint.

Licet plerisque hoc fieri posse, thermasque;
 ex auri, argenti, æris, plumbi, ferri, mineris
 conflare, vnde thermas minerales vocant,
 persuasum sit. Cum ad hanc mitionem, in
 qua res penitus inuicem mistæ cohærent,
 non diuersæ substantiæ, sed naturæ consimi-
 les, vt inuicem coniungi queant, requiran-
 tur. Quales cum aquis succi sunt subterra-
 nei, natiui, quòd in terra nascantur, ita dicti,
 qui nunc ex terra ipsa, nunc lapidibus, nunc
 metallis, vt dictum, exfudantes, & liquidi-
 tate sua, & fluiditate, cum aquæ natura par-
 ticipantes, cui & soli cum soli ex subterra-
 neorū numero, in aqua liquefcere & emol-
 liri dissoluique, & proin illi exactè misceri,
 illiusque vires & naturam, si modò copiosius
 admixti sint, permutare, eo modo quo nunc
 explicabitur, possint.

Ex falsis succis, quanta copia Sal aquis,
 idque frequenter permisceatur, immensum
 pelagus, marisque vt & puteorum aliquo-

rum, aquæ falsæ satis patefaciunt, quibus sal
 inesse, quod ex illis sal coquatur, manifestè
 ostendit, vnde & falsas has aquas appellant.

Ex pinguibus succis, sulphur aquis per-
 misceri, sulphureæ thermæ sufficienter de-
 monstrant, cum in illis & glebæ sulphureæ
 inueniantur, & sulphur pinguedinis instar
 innatet, & ab illis sulphureus exfurgat o-
 dor, quales Badenis, & Brigæ in Heluetia
 existunt, thermæ, puteusque sulphureas a-
 quas promens, in hac nostra vrbe visitur.

Bitumen quoque bituminosas pingues
 aquas reddere, lacus Asphaltites, è quo bitu-
 men copiosè colligitur, aliaque flumina, in
 quibus ambra, succinum, bituminis etiam
 genera, vt & petroleum dictum, extrahun-
 tur, satis comprobant.

Verum vti hæc manifesta indubitataque
 sunt, sic minùs qua ratione reliqui succi a-
 quis permisceantur, sensibus paret maioriq;
 inquisitione opus est.

Ex falsis reliquis succis, alumen & nitrum
 thermis plerisque admisceri, pro comperto
 habetur, quæ tamen cum in illis exactè mi-
 nimè deprehendantur, nec gustus illorum
 in illis appareat nitrosus & astringens, nec
 cum experiundi gratiâ coquantur, residen-
 tia reuera talis esse appareat, nō ausim quid
 temerè hîc pro vero affirmare, negare vero
 multò minus, cum piaculum sit, ab illis quæ
 adeò tenaciter mentibus hominum inhæ-
 rent, recedere: illud tamen, quod si ex illis
 quædam aquæ inerit portio, tam exilem esse,
 vt vires aquarum, nisi aliud accedat, tan-
 topere immutare minimè possit, affirmare
 non dubitamus.

Acres succos erodentes, vt sunt calchan-
 thi seu atramenti genera diuersa, melante-
 ria, sory, chalcitis, mysi, quæ omnia acido
 sapore prædita sunt, & vulgus vitreoli no-
 mine comprehendit, & præter hos succos
 rubiginosos, qui à metallis, vt à ferro ferru-
 go, ab ære ærugo, à plumbo cerussa exfudat,
 aquis quoque certis in terræ cauernis per-
 misceri, sapor acidus, quibus aquæ acidæ
 ob id dictæ, de quibus disputatum est, im-
 butæ sunt, euidenter ostendit, qui ab acidis
 eiusmodi succis, sine dubio, cum præter eos
 acidi nihil in terræ penetralibus contineat-
 tur. pro-

tur, procedit: Tum odor ferrugineus, quem tam hæ aquæ acidæ, quàm & aliæ insipidæ alioquin, odore aliquando referunt, à ferri rubigine promanās, manifestum facit, visq; harum aquarum cathartica, purgans, ab eiusmodi acribus succis, ventrem commouentibus procedens, comprobatur. Præterquam succorum subterraneorū, cum aquis permissionem, multa longaque obseruatione comperimus, in plerisque aquis, non solum à natura actu calidis, thermis appellatis, Plūbariis, Marchio-Badenis, Piperinis, Leucensibus, sed & aliis actu frigidis, quas ad balnei vsum arte calefacere oportet, vt vicinis Fliechēsis, Lofdorfenibus, Ramfensibus, Mulbergenibus, Ettingensibus: & ne locum qui Medicis herbarum causā excurrentibus, hospitii aliquādo præbuit, præteream, Briglicensibus, etsi limpide, perspicuæ & inodoræ sint, vti & insipidæ, in illis tamen succum quandam terrestrem inesse, qualis ex lapidibus vstis seu calcinatis, calce scilicet, cum madefit & funditur, per aquam dispergi solet, eamque inficere, hæc comprobant, quod succus terrenus illis locis, per quæ aquæ hæ transeunt, adhærens, & successu temporis accrescens, in tophos illis affixos & sturias conuertatur, vel ahenis, in quibus hæ aquæ vt calefiant, continuo coquuntur, magna copia calcis, & sabuli instar successiue adnasci soleat. Qui & succus terreus, si copiosius aquis permixtus sit, calcis vel gypsi cum aqua diluti odorem, sicuti in Plumbariis verè obseruauimus, penitus refert. Qualem quoque succum terrenum, quem crassamentum aut terreitatem aquæ aliàs vocare solemus, fontium reliquorum, quorum & aquā bibimus, fluminumq; aquis permixtum etiam esse, licet minori fortè copia, quàm in illis, quæ, quod magis eo redundant, ad balnea adhibentur, sabulosa, calculosa & tophacea materia, quæ aquæ ductibus & receptaculis adhærent, nos similiter docent. Aded vt & illæ aquæ non sanè omnino huius terrestris succi expertes sint, sed & in illis, nunc maiori nunc minori copia adesse, si quis quæ diximus obseruet, aut cōstione explorare velit, deprehendatur, qualem in vrinis quoque contentum a-

renis & calculis generādis occurrere videtur, quàm nescio quam pituitam p-
alibi demonstrauimus.

Ex quibus satis quoque patere videtur hæc aquas, in quibus nihil aliud quod nunc care possit, aliàs deprehenditur, calcis huius causā (vt sic vocem) vim siccandi adipisci, idq; eas potissimum facere, in quibus illius maior redundat copia, si præsertim naturā calidæ sint, actiue, sicuti fieri solet, calefiant. Vti & minus hoc præstare, quæ puriores & tenuiores sunt, easque potius non solum actuali humiditate, sed & potentiali, quæ in illis exuperat, humectare. Vti & illas, quæ actu frigidæ sumuntur, corporiq; adhibentur, refrigerare. Quod tamen potentiā etiam facere, sicuti creditur, minimè crediderim, hæc argumentis motus: Quod in continuo aquæ vsu, non solum per se in potu, sed & commixta aliis omnibus ferè quæ assumuntur, in iusculis cibisq; plerisque, qui in aquis decoqui prius & præparari solent, corpora tamen minimè refrigerentur: quod tamen si potentiā frigida esset, vti & in cæteris succis herbarum frigidis, fieri videmus, necesse esset. Qui etsi calefacti, costiq; & in syrups redacti, aliàsve formas, vti vim refrigerandi minimè deponunt, sed eam in corpore diutius aut maiori quantitate vsurpata, exerūt, sic & aqua quocunque modo parata, nos indefinenter illius vsu, si potentiā, & præsertim summè, vti putatur, frigida esset, corpora nostra tandem refrigerando læderet; quod tamen eam minimè facere, nisi actu frigida, intemperanter vsurpètur, omnes qui et innoxie, si non in potu, saltè inter cibos, vtimur, fateri cogimur. De viribus etiam reliquarum aquarum, alieno sapore salso, acido & odore sulphureo, bituminoso, ferruginoso, efficaciam suam prodentium, multa hic à communi opinione dissidentanea, sed vera in medium profere possemus. Vti & de admirando naturæ in thermis calidis efficiendis, tantaque copia & continuo fluxu, ex terræ faucibus & penetralibus effundendis miraculo. Et quomodo à calce subterranea naturali, qualis in illis locis, aliisve, ad cementum, pro extruendis ædificiis, iam à natura apta, nullaq; arte v. l. a, è terræ cavernis erui-

63 quæ calci artificiali affunditur, ca-
vi freonet, incipiant; Atque ostendere, qua ra-
tione hoc perpetuum esse possit, vt talis fo-
cus in terra oclusus, sicuti ignis in ardenti-
ssimis omnibus Siciliæ bituminosis & sulphu-
reus, non restinguatur, nec materia illius &
fomes absumatur.

88. *Quænam sit illa vis in vino, quæ sensus
primum acuit, mox perturbat, &
 tandem consopit?*

Inter varias quas terra producit stirpes, qua-
rum aliquot millia nostro sæculo inuentæ,
cognitæque fuere, vix dum aliquam inue-
nias, quæ tam eximium vsum mortalibus
præstet, quam suauissimus ille atque vtilis-
simus vitium fructus, expressione, in mu-
stum dulce primum, mox effervescendo in
vinum suaue odoratumque abiens. Cuius
vires mirandas explicabo. Ac primum qui-
dem, quod admiratione dignum est, & in a-
liis plantis non inuenitur, quod cum & ali-
menti & medicamenti naturæ sit particeps,
& nutriendo atque fouendo corpus, nulli ex
alimentis cedit, corpusque alterando atque
immutando, idque subito & quasi in momen-
to, omnia reliqua medicamenta exuperare
videtur. Huic accedit, quod licet eximia
sit illius vis, tamen continuo illius vfu eoque
immoderato lædimur; & quemadmodum
suas vires statim exerit, nosque immutat, ita
statim quoque easdem remittit, & ad pristi-
num statum corpus redire sinit, sine alio (ni-
si illius vfu admodum peccetur) incommodo.

Quæ qua ratione accidant, paulò diligen-
tius explicanda erunt. Quod corpus nu-
triat, vt nemini dubium est, ita hoc maximè
senes, & imbecilles norunt, præsertim verò
ex ægris, qui nausæa laborantes, cibos alios
fastidiunt, vinum solum expetunt, eoque so-
lo sæpè ad multos dies sustentantur & resi-
ciuntur.

Accedit huic, quod præterquam quod
defectum humidi, nutriendo refarcit, simul
etiam spiritus restaurat, resocillat caloremque
natiuum, præ cæteris omnibus alimentis
fouet, ita vt minima illius quantitas, in viri-
bus recolligendis, in animi defectu, deli-
quio, syncope etiam iam animam agentis

bus & morituris, plus possit & præstet, quam
vel aliæ præstantiora alimèta & medicamen-
ta preciosiora, à gemmis, auro, serico, vel ab
ipsis Indis extremis petita. Quod vt quoti-
diana testatur experientia, ita longiori pro-
batione non indiget.

Cæterum vt ad medicamentosas illius fa-
cultates accedamus, præter eas, quas in con-
coctione iuuanda, distributione alimètorum
promouenda, naturalium vitalium atque anima-
lium functionum efficacia suscitanda, exerit, quas
omitto, aded vinum sensus alterat, animum
mentemque immutat atque peruertit, vt vix
dum aliud pharmacum, quod tam potenter,
tamque citò operetur, & tam multa præstet,
inueniatur, non exclusis etiam validissimis,
inter quæ & purgantia narcoticaque, ipsaq;
venena præcipua censentur.

Primum enim ostendat aliquis mihi me-
dicamentum, quod mentem ipsam, etiam
grauissimis curis, affectibusque oppressam
obtenebratamque, æquè & tam subito, vel-
uti adu exilarer, tranquillam & à curis sol-
licitudinibusque quietam placidamque red-
dat, atque ipsum vinum. Quod solum vnà
cum suaui Musices concentu, cor hominis
exhilarare, etiam ipse Sapiens & nouit &
prædicat. Non sanè vlla alia medicamenta,
vel cephalica, vel cordialia id præstabunt,
non ipse puluis requiei, nec lætitiæ dictus
Galenus, non ipse Syrenum cantus id tam e-
leganter & citò, vt vinum efficiet.

Quin quod & implacabiles animi affectus
doloresque, qui nec herbis nec verbis, nul-
lisque admonitionibus, sacrisve consolatio-
nibus, in melancholicis aut morientibus mi-
rigari aut tolli possunt, compescit sedatque.
Et quod temporis diuturnitate tantum fieri
posse ait Cicero, illud vnico veluti momen-
to innuit.

Sed vt moderatus illius vfu exhilarat,
qui primus gradus ebrietatis censetur, ita
immoderatus assumptum, Dij boni, vt cum
Comico loquar, quid hoc morbi est; adeon
homines immutarier, vt nō cognoscas eun-
dem esse. Quanta inquam metamorphosis?
Quæ dementia, qui secundus gradus est.
Quæ socordia & torpiditas, quæ tertium
gradum ebrietatis constituit, eaque diuer-
simodè

simodè, pro naturarum varietate, nunc hoc, nunc illo modo ebrietatem sequuntur.

Et ne singula recenseam, cum vix aliquis sit, qui hæc finò in seipso, in aliis certè sit expertus, hoc duntaxat adjiciendum erit. Sanguineos ebrios, risu iocisque & verbis & factis à stultis & fatuis penitus nihil differre. Cholericos irasci pugnandoq; Phreniticos fieri. Qui atra bile infestantur, mœrendo, tristando, & lachrymando, quod Germani das *Truncken elendt* vocant, Melancholicorum naturam induere. Pituitosos somnolentos, inertes & socordes fieri.

Quæ cum aliis aliter eueniant, commune tamen omnibus, post nimiam & diutinam repletionem, licet aliis feritis aliis citius hoc accidat, quod vel somno immoderato oppressi, profundè dormiunt ægreq; excitantur, vel adeò caro & veterno stupidi attonitique iacent, ut nec clamoribus, nec verberibus expergefieri, immò ne respondere quidam, aut oculos grauatos attollere velint.

Non secus ac si è narcoticis, & stuporem somnumque inducentibus, omnium efficacissimum opium, insigni quantitate assumplissent. Quod quâ ratione accidat, hoc loco maxime in quæstionem venit & dubitatur; De quo, ut paucis dicam, nolo ego iam in aliis vini viribus, ubi calore suo actiones vegetiores reddit, succo euchymo nutrit, & subtilitate penetrat, spirituosaque vi refocillat, enodandis, cum hoc iam alibi à me præstitum sit, longius immorari, sed quâ ratione vinum soporem stuporemq; efficiat, meam sententiam, salvo aliorum iudicio, obiter proponere, quæ hæc est.

Vinum affirmo non manifesta aliqua qualitate, sed abstrusa vi & occultâ, narcoticâ scilicet, quam non tantum quantitate, immoderatus sumptum admodum exerit, sed & moderatè haustum, in somno conciliando ostendit, soporem & stuporem inducere.

Quod etsi durum & inauditum videatur, possem tamen multis & probabilibus argumentis hoc conuincere. Inter quæ hæc sufficiant. Quod manifesta causa alia in vino inueniri non possit, eoque nomine ex effectu ad occultam hanc narcoticam vim, ut in aliis recurrere oporteat.

Nam si quis vapores obijciat, rec^{rit} plentes & dementantes, quare non in vaporosa calida, uti sinapi, allium, cepa^{non} statim oculos irritando lachrymas motu caputque petunt & tentant manifestè, sinum liter somnum conciliant, imò vigilias potius, uti & alia calida promouent. Si quis capitis dolorem, qui ebrietatem sequitur, obijciat, eoque vaporum copiam causam affirmare velit, is intelligat, etiam opium assumptum, capitis dolorem, postquam excitati sunt, eumque grauem efficere.

Sed cum narcotica frigida sint, quâ ratione vinum cum calidum sit, narcoticum erit, inquiet aliquis, cui sic respondeo.

Narcotica frigiditate sua stuporem aut somnum minimè inducere, sed proprietate & vi peculiari, quæ cum & in calidis & frigidis inueniatur, sicuti alia, quæ proprietate agunt, medicamenta cephalica, cardiaca, arthetica, & calida & frigida inueniuntur, nec narcotica necesse esse, tantum in frigidis inueniri medicamentis, sed in ambabus qualitatibus hanc vim posse consistere.

Quod eò magis probabile, cum & narcotica dicta medicamenta, quæ summe frigida esse existimant, neque foris admoda refrigerent, sed potius, sicuti mandragorâ, hyosquiamus, emolliendo, uti sæpè obseruauimus, calorem aliquem ipsis inesse ostendant. Immo ipsius opij amaritudo, quæ tantum calidis inest, calorem aliquem inesse indicat.

Quo facit & hoc, quod in multis aliis succis calidis, eiusmodi vis stupefaciendi, licet non tam efficax, ut in vino inueniatur. Sicuti aliis omisissis, in lupulis esse, ceruifia, quæ quoque inebriat, satis declarat.

Ad hæc, quod vinum ipsam ætate adeò purificatum, arteque chymica ita attenuatū, in liquorem illum, quem aquam vitæ vocant, ut non amplius sit vaporosum, sed summe calidum & subtile, nihilominus tamen caput demerat, longeq; citius quam vel mustum, vel vinum crudum inebriat & stupidos reddit.

89. *Vinum eiusq; faces an narcotica?*

Vinum narcotica vi præditum esse, hisce observationibus motus coepi asseuerare.

63. quod non tantum somnum indu-
 vi frebnes, aded attonitos quoq; reddat, vt nec
 adit at. Iſi expergeſiant, ac veluti apoplectici,
 h. b. bus priuati, donec vim illius edormi-
 tant, cadunt, immobilesque iaceant, alij
 poſt expirent. Quod vt quantitate ſumptu,
 in alijs citius, in alijs tardius facit, pro natu-
 rarum varietate, ita viribus illius collectis,
 parua etiam quantitate valide admodum o-
 perari, oſtendit aqua illius vi ignis elicita,
 quam aqua vitæ aut ardentem vocant: quæ
 aded ſtupefacit, vt illius immoderato potu
 vini infantes, Dolearij cuiusdam, cum pa-
 rentibus abſentibus, aquam eſſe exiſtiman-
 tes, caſu bibiſſent, & aurifabri famulus, &
 mendicus quidam, poſtquam diu mète per-
 culſi iaciſſent, non aliter ac ſi opium ſum-
 piſſent, expirarint.

Memini præterea porcos matris olim,
 cum fæces vini deuoraſſent, aded factos at-
 tonitos, vt incedere amplius nõ poſſent, ſed
 ſtupidi penitus iacerent; vnde apparet, vini
 fæces quoque narcoticas eſſe.

90. *An Metalla omnia naturæ noſtræ
 ſint aduerſa?*

Certum eſt omnia Metallica naturæ no-
 ſtræ aduerſa eſſe, tota ſubſtantia, maxi-
 mē quo impuriora, ſucco conſtant acri vel
 erodente, vt ea quæ rubigine tentantur, vel
 ærugine, vel albugine, ceruſa ſcilicet, ferrū,
 æs, plumbum, & quæ alios ſuccos atramen-
 toſos exudant, ſtibium, cadmia, toto genere
 venenata: Vti & pyrites, in quibus acres
 ſucci efflorefcunt. Sed & puriora noxia
 ſunt, vt argentum viuum, maximē ſi figatur.
 Item aurum & argentum, quæ cum puriſſi-
 ma ſint, nullaque excrementa, niſi pauca vt
 argentum proferant; cum lineas ducat, mi-
 nus noxia, non tamen ſine noxa, præſertim
 ſi vt argētum viuum, vel viſta vel attrita, vel
 quocumque modo attenuata exhibeantur.
 Quæ multis probari poſſunt, ſi quis veram
 metallorum naturam penitiuſ
 conſideret.



91. *An ne aurum lapidēs ve pretioſi, ſub
 quibus & gemma & uniones comprehen-
 duntur, vires noſtras aſſumpta ad-
 motæ ve reficere poſſint?*

Qvæſtio digna quæ exagitetur, præſer-
 tim cum in dubium vocetur à multis,
 an ne iſta terreſtria inanimata, corpori no-
 ſtro penitus diſſimilia, tum ſubſtantiâ, tum
 qualitatibus aliquid efficere poſſint, aut ad
 virium reſtaurationem quippiam conferre.

Corpora ſubterranea animæ expertia, va-
 ria exiſtunt, vt ea quæ è terra prodeunt, vel
 in aqua, aëre verſantur, infinita exiſtunt.
 Nam vt in ſingulis elementis certa verſan-
 tur, ſic in aqua piſces, quorum infinitus eſt
 numerus, in aëre aues, quadrupedia, inſecta,
 & reptilia. E' terra prodeunt arbores, fruti-
 ces & herbæ. Hæc & viuunt, creſcunt &
 vegetant.

Cæterum ea quæ terræ viſceribus inclu-
 ſa, inanimata, recondita, ſubtiliora exiſtunt,
 interiores terræ cauernas & canales, ac mi-
 nimas quasque rimas, receptaculaque adim-
 plent, quæ certè vel illic conſuſa perſiſtunt,
 vel quia ſubtilia, viâ aliquâ patefactâ effluunt,
 erumpuntque. Effluit è terræ penetralibus,
 Humor quem terra quaſi combibit, ſub quo
 comprehenditur Aqua & Succus, nam vel
 aqua pura è terræ venis prodit, vel ea ſucco
 quodam permiscetur acido, vt aquæ nitro-
 ſæ, aluminōſæ, atramentōſæ, vel falſo, vt a-
 qua è qua ſal excoquitur, vel ſulphure quo-
 que aqua miſcetur. Succu hi vel æquē mix-
 ti, vel puri interdum effluunt, ſed rariuſ, vt
 petroleum, quod nos putamus eſſe ſuccu
 num ſolutum.

Cæterum vt hæc interdum è terræ venis
 effluunt, ſic erumpūt ea, quæ adhuc tenuio-
 ra, aër, atque exhalatio, & horum omnium
 ſubtiliſſimus emicat ignis. Sic terra ipſa li-
 cèt elementaris reliqua quoque elementa
 in ſe continet.

Verum craſſiora quæ terreſtria magis, fi-
 xaque exiſtunt; Sunt ea quæ foſſilia dicun-
 tur, cum non alia ratione prodeant, & gra-
 uitate ſua ſubſiſtant, niſi vi eruantur.

Hæc ſunt terra, ſuccus, lapis, metallum,
 quæ ſingula vel pura, ſed rariuſ, plerumque
 impura

impura, quæ vel mista vel composita. Nos omisissis iis, quæ nihil ad rem faciunt, obiter de simplicibus agemus quatuor enumeratis, terra, succo, lapide, metallo, quatenus Medico ea consideranda veniunt. Inter quæ alia molliora, aquâ molliuntur: vti Terra, succus Terrarum, alia utilis agricolis, vt quæ ad stirpes alendas & gignendas conueniens est: alia figulis, vt argilla: alia pictoribus, creta, rubrica: alia medicis, lemnia siue bolus, Samia, Armenia, quia venenis resistere, nescio quàm verè dicunt. Insigniter tamen eam siccare certum est, proinde sanguinis fluorem compescere, bolum, terram lemniam, cimoliam, lachrymantes oculos sanare, & aliis humidis morbis prodesse, docet quotidiana experientia. Succo concreti frequentius à Medicis & Chirurgis maximè vsurpantur: tum illi, qui non ardent, tum qui flammam facile concipiunt. Qui non ardent, sunt hi qui cognoscuntur vel Sapore falso, vti Sal, Nitrum, Alumen, quæ potentissimè foris introque admota exiccant, putredinem arcent, & stimulant, sapore acido & acri constant.

Atramenta omnis generis, Myfi, Sory, Chalcitis, Chalcantum, Melantheria. Quæ omnia non tantum valide siccant, sed & simul exulcerant, proinde per os minùs exhibentur, sed foris plerumque, ad exedendam carnem, in viceribus malignis vsurpantur, & in cutis fœda scabie atque pustulis. Licet & aliqui, vt Antidotorum molem adaugeant, non verentur hæc quoque Antidotis addere, vti Chalcitum theriacæ, Vitreoli oleum, multis compositionibus, quando sudorem elicere volumus, aut detergere.

Quæ reliqua sunt ex succis, colore tantum notantur, Venenata & Deleteria, tota substantia nobis aduersa, vt sunt Chrysocola, Cæruleum, Ærugo, Ferrugo, foris tantum adhibentur, quia erodunt: tamen in purgationibus veteres & neoterici, violentioribus quoque hisce vsi sunt; nam & lapide armeno & lazuli purgant.

Sed quæ septica sunt putrefacientia, auripigmentum, sandaracam, nemo sanus exhibebit, nisi velit præsentaneam mortem, studio inferre, sed tamen foris admota, suas ha-

bent vires siccando & putrefaciendo teriis sine doloribus.

Succos ardentes pingues, vt Sulphurⁱⁿ tumen, Medici quoque vsurpant, sulphoris admotum siccatur, citra calefactionem scabiei medetur, per os in Asthmaticis & Phthisicis datur, ob eandem causam. Bitumen emplastris miscetur, quia cum emolli-
tione quadam siccatur.

Hæc sunt ex fossilibus molliora, quibus Medici suo tempore vtuntur, & manifestis viribus pellere conspicuum, de quibus nunc longius agere nolumus: neque enim de iis quæstio proposita quicquam habet.

Cæterum duriora fossilia quæ sint & quatenus Medicis sint vsui, breuiter adjiciendum. Sunt autem Lapides & Metalla. Lapides durissima sunt corpora, atque vel saxa comprehendunt sub se, lapicidis tantum utilia, vel his pretiosiora marmora, quia radiant polita, ex quibus figuræ fiunt atque ædificia splendida, nec Medici iis vtuntur.

Cæterum gemmis insigniter duris pellucetibus plerumque vel colore valde venusto varioque nitentibus, Medici vtuntur ad virium confortationem, ad certas partes roborandas, ad morbos sanandos, nihilque est quod non gemmarum viribus nos assequi posse, non scripserint Medici. Reliqui lapides, vt sunt Magnes, Hæmatites, Ætites &c. in eodem vsu à multis vsurpantur. Cum tamen Ætites nihil diuersi à saxo possideat, Magnes licet ferrum sibi simile trahat, non tamen agit eâ vi in corpus nostrum, cum quo nullam habet similitudinem. Proinde potius siccante vi, vti & Hæmatites prodest, sanguinis fluorem sistens, & siccans potenter.

De Metallis quid dicam. Inter quæ fluidum illud Argentum quod viuum vocant, multi vsus, nam & viuum vermes enecat, pellit; fugat reliquas quoque bestias ex for-
dibus natas, & purgat: fixum erodit potenter, proinde foris vsurpatur, & sudores mouet.

Cæterum reliqua metalla quæ vel commendantur precio, vt aurum & argentum, vel vsu pro artificibus mechanicis, æs, plumbum, ferrum, à Medicis quoque adhibentur in certis morbis, nam quæ pretiosa, cordia-

63 *the dicant, alij negant. Plumbum*
virescentes, erit vires, foris admotum, vti & ce-
at. Stibium validissimè purgat, vel mi-
ta. portione. Ita vt nihil ferè sit, quod
educit tellus, quod non suas vires quo-
que exerat. Atque cùm terreum in ipsis
elementum exuperat, validè siccare omnia
facile conjicimus: sed & alias insuper vires
possidere, quibus vel validissimè purgant,
vel erodunt. Cæterum an cordialia sint, &
vires nostras restaurent, de eo est quæstio,
hic cardo versatur.

Gemmarum vires incredibiles, & valore inæstimabiles (sub quibus & vniones perlas dictas comprehendo) descripserunt, pauci ex Græcis, maximè verò Arabes, Maurítani, & post hos delicati & splendidi Medici, integris commentariis insigni gemmarum efficaciam descriptâ, nec tantum appropriatas vel partibus, cordiales esse, capitales, oticas &c. vti smaragdum appensum ventriculo conferre, hyacynthum cordis vires augere, chelidoniten oculorum aciem acuere, &c. verum etiam certis morbis certa esse ex his remedia, crystallum vertiginem tollere, iaspidem partum accelerare, bufonium tumores amouere asserentes. Insuper alia multa ab his præstari, corpori incrementum addere, castitatis esse indices, animi affectus tollere graues, gaudium, lætitiâ conciliare, deuotionem, pietatem, propensionem in Deum ipsum excitare, quibus ferè Pontifices atque horum affectu sacras suas vestes magno cum fastu solent exornare. Ex quibus ita colligunt, si solo intuitu, vt de basilisco fabulantur, vires suas exercent, vel contactu, vt de torpedine marina scribunt, quid si indantur corpori, efficiunt, quas vires exerent? Proinde variis artibus illa attenuata, contrita, dissoluta, exhibent, & præsertim Medici, cum quibus mihi nunc est negotium, medicamentis miscent cordialibus. Aurum enim limatum, vel foliatum exhibent; Vel etiam aurum decoquunt, vel candens extinguunt in liquore, quem postea bibendum propinant, sordes potius ablutas, quàm efficaciam propinantes. Alij solum potabile illud efficiunt, spiritum

vel oleum auri vocant, & multis titulis ornant, quibus præter alias eximias virtutes, quas ipsi attribuunt, hoc & sanitatem & iuuentutem conseruari, senectutem tardari, & in morbis extremis extremæ quasi vnctionis loco habent.

Lapides item pretiosos, hyacynthum, rubinum, granatum, smaragdum, margaritas in cote atterunt, confectiõibusque miscent cardiacis. Hinc tabulæ illæ insigni nomine manus Christi, commendatæ ex saccharo & perlis factæ in tanto precio.

Sic paratur confectio de hyacyntho, species cordiales de gemmis fiunt, Diamargaritum calidum & frigidum, vixque est cordialis aliqua remedij forma, quæ non vel aurum, vel lapides preciosos, perlâsve recipiat; & vt splendidiorem faciant, sericum quoque inter ea quæ ab animantibus ad vestitum vsurpantur, adjiciunt: corallia item, & alia.

Subtiliores verò Medici, & qui operâ suâ ditionibus tantum inferuiunt, hæc damnât, in substantia exhibita, proin quintam ex iis eliciunt essentiam quandam, qua modò non immortalitatem pollicentur, oleum, spiritus facientes ex lapidibus, perlis, quorum vnica guttula animam iamiam fugientem (vt aiunt) retinet: quæ si tanti vsus, non mirum quòd immenso æstiment pretio, atque vt vita æterna in ecclesiis abusu defœdatis venalis exponitur; Sic & vitæ præsentis longitudo, nunc coronatis multis, ab arcanis illis philosophis redimitur.

Aurum, gemmæ margaritæque, inter ea quæ Deus optimus maximus subterranea condidit inanimata, pretiosissima semper fuere, & principium culmenque omnium rerum tenuere, vt ait Plinius, idque cùm & rarissima essent, purissima pulcherrimæque, quo nomine reliqua omnia sui generis exuperant. Qua difficultate, quot emensis laboribus, periculis terra marique habitis, aurum gemmæque è terræ visceribus intimis eruuntur, è fluminibus altissimis petuntur? Vniones ex conchis maritimis rugatis, quas Matres perlarum vocant, perquiruntur. Fecit auri sacra fames, vt ad extre-

extremos terræ angulos peruentum sit, ad Indos Orientales, Occidentales, diutina longa & periculosa nauigatione nauigatum. Maris rubri Perficus linus, Arabiæ vnionum causâ peruestigatus. Vnde non mirum sanè, si hæc tot laboribus periculis conquisita, vt rara, sic chara esse.

Maximè verò puritas in hisce & elegantia commendatur, cum aurum, gemmæ, vniones nullo senio, nulla rubigine infestentur, nec quicquam decedat ab iis excrementitijs vnde manibus tractata versataque nullo alieno colore inficiuntur.

Aurum igne liquefit sed non consumitur, & quò frequentius canduerit, tanto fit præstantius, & de sua magnitudine interim nihil deponit, ita purum, vt si eo candente partes adurantur, curata vitione, nullum cicatricis vestigium remaneat.

Hinc factum, vt mulieres cosmeticæ Italiæ, frontem speciosam & latam vt efficiant, auro ignito pilos frontis adurant, si hi partem frontis obtegant, quod illæ indecorum esse putant. Ita tractabile aurum, vt citra fracturam malleo percusum, ex singulis eius denariis, quinquagenæ pluresve efficiantur bractæ vel foliola, quibus & pictores & Medici vtuntur.

Atque vt aurum tenacissimum, sic gemmæ, margaritæ, durissima corpora, nullo igne liquefunt, secus ac marmora & sili-ces fluores & vitra, quæ & atterunt, vti videmus adamantem, vitrum durissimum secare & in eo lineas ducere.

Cæterum si elegantiam spectemus, quid pulchrius hisce atque acceptabilius? Quam relucens in auro color fuluus, vel potius aureus, quis nitor? Quid gemmis splendidius? Pellucet eximie chrystallus, adamas, citrinus. Alij specioso simul colore nitent, nunc aureo, vti Hyacinthus, alij rubro, vti Carbunculus, quem Granatum vocant, vt & Rubinus, Sarda, cæruleo, Cyaneus, quem Turcis vocant. Sapphyrus item & Amerethystus, flauo Berillus, Chelidonites, viridi Smaragdus, Prasius, albo Onyx. Nunc vario nitent,

vti Iris, Opalus, Iridis colore exprimunt. Iaspis omnis generis nunc simplices, nunc mixtos, lineatim ductos, representat. Ex albo rubro tinctus Sardonyx, ex albo & gro, Gemma quam Huiam vocant. Quid perlis nitidius, argenteo colore fulgentibus, politis, quarum venustati, si accedat, par magnitudo & pondus, precio preciosissima quæque exuperant. Tales fuere Cleopatæ illius reginæ Vniones, per manus Orientis regum ipsi traditi, quibus apparatus, & luxum Anthonij, vno vnione ipsi propinato vicit, vna cœna centies sesteritium absumens.

Hæc itaque sunt, quæ Dei omnipotentis admirandam in hisce formandis pingendis poliendis industriam, nobis ante oculos ponunt, quæ & meritis pretiosa habentur: & à magnatibus magni sunt.

Cæterum vt nihil non auri sacra fames docuit, nihilque tam præstans, quod non in abusum veniat. Ita sanè hisce quoque accidit, factumque temporis successu, vt remedia simul ab his peterentur, & vires illis incredibiles ascriberentur, quod exhibitione horum, amplam prædam referrent, vnde Empirici cœperunt iis vti primum, postea & reliqui Medici, citra tamen omnem rationem & experientiam, tantum iis nixi, quæ de iis anilia figmenta sparguntur.

Si enim experientiam obijciant, possum hoc apertè fateri, multa expertus & ipse, nunquam me aliquid tale deprehendisse, neque deprehendisse etiam alios, nisi fortè si quid casu acciderit, illud gemmis ascribamus. Nec enim video Regibus aut alijs ditioribus vitam prolongari præ cæteris, illorum applicatione aut vsu. In virium restauratione & confortatione, vnicum vini haustulum, brodioli exhibitionem, odorem aceti in deliquiis, micam panis, &c. plus efficere aio, quàm si quis auro penitus obruatur.

Succurrit ridiculum quid: Noui diuitem ægrum febre lethali correptum, hic admo-

63

63
virescentes, annulos, radices & alias nugas, quibus inferos languentes ægros potius morantur, quam solent, quàm roborare, quod & huic tantum dicit: nam febrili calore ardens, thoracem sæpè retegebat, & nudus iacebat, hinc factum, refrigeratis istis quæ thoraci instrata erant, & pectore ipsius refrigerato, ex contactu horum, ut tussis suborta esset vehemens, quæ ipsi mortem acceleravit, sicque non aliud commodi à catena illa & gemmis referens, quàm olim Crassus ab auro liquido ipsius ori infuso.

Verum si rationibus contendere velint, quam nam obsecro inuenient qualitatem ne ullam, aut materiam in iis, quæ calor noster reficiatur? Omnibus quidem, quæ Deus naturæ parens produxit, suas inesse vires, & in usum hominis pleraque condita nemo negat. Nam vel defensionis causâ ex metallis, lapidibus, fiunt ædificia, arma, vel commoditatis causâ, instrumenta, vel ex aliis inanimatis quibus artifices vtuntur, indumenta, vestitus, iis scilicet quibus abundamus maximè: reliqua enim rara & chara, à magnatibus tantum in eisdem usus adaptantur: plerumque verò ad fastum potius iis abutuntur; venustatem & elegantiam utilitati præponentes. Nam ex auro & argento fiunt columnæ, simulachra, tripodes, tabulæ, calices, crateres: & ex gemmis quoque, quibus splendent Regum mensæ, indumenta, arma variis terrarum in locis. Sic vidimus Lutetiæ in Templo S. Dionysij, crucem ex massa auri, & alia innumera. Craterem ex lapidibus pretiosis: Salomonis ex Iaspide poculum, & alia multa. Cæterum ut conseruetur homo in statu integro, vel ab eo regressus mutetur, & in integrum restituitur, admovent, assumunt varia. Conseruatur enim, fouetur & restauratur similibus, sanguine primum dum in utero est foetus, mox lacte in lucem editus, inde maturior factus, alimento, quod ab animantibus, suæ naturæ similibus, & plantis quibusdam, sed parcius desumit. Fouetur calore suavi externo, odore iucundo & grato. Illis enim nutritur, illis spiritus resocillatur: Quæ verò secus sunt comparata, nec

cum corpore nostro ullam habent affinitatem, siue materiam siue qualitatem spectes, & proinde contraria sunt, illis alteratur, mutatur, ut quæ insigni vi prædita, calore frigore excellunt, sicca dura, emolliunt indurant, &c. Hæc certè à plantis medicamentosis petuntur, & sapore vires ipsorum dijudicantur, quibus prævalent.

His longè magis adhuc metallica, lapides, corpora inanimata, durissima, siccissima, corpori nostro penitus aduersa, si succo quodam natiuo dicto permixta impura fiant, ut pleraque metalla & lapides multi, & quæcunque rubiginem, æruginem, aut aliam efflorescentiam patiuntur, hæc acri succo prædita, insigniter erodunt, corpusque ad deiectionem & vomitum assumpta violenter impellunt. Vti lapis lazuli, armenus, ærugo, ferrugo, chalybs, argentum viuum, maximè fixum & calcinatum, antimonium, quod et si calcinatum gemmarum instar splendeat, tamen pernitiem suam non deponit. Quæ verò ex metallis & lapidibus purissima habentur, aurum, gemmæ, vniones, corallia, &c. nullam violentiam assumpta vel admota exerunt, quia purissima, terrestretatis tamen participia, insigniter siccant, hinc foris applicata, vlcerebus medentur, oculorum vititiis, cutis maculis, dentibus scrabris vi exicatoria profunt, ut docet Dioscoricus. uti & assumpta vel iniecta, internas exulcerationes sanant, humiditates absument, proinde in dysenteria, phthisi, vlcerebus vesicæ & vteri commodè præscribuntur. Hæc sunt preciosorum horum vires manifestæ, quas & experientia dictat & ratio comprobatur, neque confortatione vlla alia ea nos roborant, nullo sapore, nullo odore prædita, quibus substantiam perditam restaurent, vires reficiant, secus ac moschus & ambra, quæ duo pretiosissima quoque, ut ad voluptatem, & luxum incommodè, sic vtiliter ad restaurationem adhibentur, odore insigni efficaciam prodentia. Proinde aurum, gemmasque siccandi vi polere eaque in variis prodesse morbis, non autem in restauratione ea præstare, quæ fabulantur, asserere non dubitamus, & simul monemus, ne temerè quis fidat iis, qui vanis promissionibus, vires corporis & sanitatem polli-

pollicendo auro gemmisque, loculos inter-
ea exhauriunt, ægris sunt emolumento, se
iplos confortant potius, quàm aliorum in-
commodo, suum ipsorum capientes com-
modum.

92. *Qua' nam Narcoticorum
vires?*

Narcotica medicamenta minimè refrige-
rare, multò minùs frigidityte stuporem
inducere, sic probatur.

Cùm ex narcoticis, fortioribus præser-
tim, quædam admodum amara sint, vt pa-
pauer illiusq; succus seu opium, & grauem
odorem spirent, amara autem & odorata ca-
lida sint, ex sapore, cùm gustus certissimus
sit qualitatum Iudex, teste Galen. ea potius
admodum calida quàm frigida iudicabi-
mus. Cùm frigida vel acida, vel saltem apoia
esse deberent. Dein & inter gratiora narco-
tica, è quorum numero Vinum præcipuè es-
se, alibi probauimus, & sapor & odor, illud
calefacere, satis ostendit, præsertim quo dul-
cius & odoratius illud existit, vel destillatio-
ne in aquam ardentem redactum, quod &
tunc magis stuporem inducit, corpusq; in-
flamat, adeò vt attoniti iaceant, & sic quan-
doq; ac si opium sumpsissent, extinguantur.

Dein & cùm Acetum haustum, post nar-
coticorum vsum, illorum vires in narcofi in-
ducenda, infringat, & vt minùs operentur
citiusque ad se redeant, efficiat, illudque fri-
gidum sit, ex cõtrarietate hac, illa calida po-
tius esse, facile licet conijcere. Sic acetum,
Solani maniaci vires mox labefactare, docet
Matthiolus. Et post opium sumptum, ace-
tum exhibitum, admodum profuisse mul-
ties expertus sum. Atque ebrietatem ali-
quo pacto aceti potu arceri, eamque quæ pe-
nitùs attonitos reddiderat, corrigi, sæpius
cognouimus, è contra Narcotica, cum vino
exhibita, validius operari, vt & Diosc. cucu-
tam cum vino exhibitam, citius interimere
docet.

Sitis quoque post narcoticorum vsum su-
perueniens, capitisque dolor, cum faciei ru-
bore, & pulsu, sudoresque copiosi, calorem
illorum potius quàm frigus denotant.

Quod si ex frigidityte quam extremam

esse oporteret, vt calorem natu-
guendo, sic insensibilia membra rec-
narcofi illa procederet, nò tam citò in-
sum cessaret, & ad se qui eam passi sun-
darent.

Cùm vinum ardens, quod calidissimum
omnium iudicio existit, stuporem vt iam
dictum, inducere viderem, narcotica nò fri-
giditate suà, sed peculiari vi stupefacere, iu-
dicaui. Quod idem amaritudo opij, vt &
papaueris, quæ non nisi in calidis existit, cõ-
probare videtur. Huic accedit, quòd folia
hyosquiami cocta, applicataque, durissimos
tumores emolliunt, vt sæpe numero exper-
tus sum. Quod non nisi à calore illius potest
proficisci. Vnde Narcotica seu Stupefacien-
tia medicamenta ea dico, quæ assumpta ad-
motave vi insita, cerebro neruisq; stuporem
inducunt. Hinc sensum tactus, in parte sen-
sili imminuendo, plus minùsve dolorem se-
dant vel tollunt penitus, vnde & Anody-
na sunt.

Eadem sensus internos sopientia, somnũ
inducunt, hinc & Soporifera dicuntur.

Licet ex accidenti sensus internos per-
turbantia, attonitos deliriumque faciant,
hinc & dementantia existunt.

Hæc certè non frigidityte calorem natuũ
extinguendo, vt volunt, aut alia manifesta
qualitate, sed propriis abditisque viribus
præstant. Nam ex iis non omnia frigida, sed
quædam temperata, quædam etiam calida
existunt, vt supra de amaris & tumores fri-
gidos emollientibus & discutientibus mo-
nitum.

Quòd si verò ex narcoticorum immode-
rato vsum vitæ accadat periculum, id non ali-
ter, quàm ab aliis venenatis, ab oculata vi
proficisci, quæ neruoso generi insidiantur,
satis ex dictis patet.

Dein cum brevis sepe sit Stupor, post nar-
coticorum vsum, abundè indicat partem fri-
gore minimè fuisse mortificatam, sed tanti-
per sensus sopitos. Adde quod & torpedi-
nis tactus stuporem nulla manifesta qualita-
te inducit. Frigida dentiũ stuporem sanant
vti portulaca masticata. Sunt & multa longè
frigidissima, quæ stuporem nullo pacto, as-
sumpta præsertim, pariunt.

omorum succus an narcoticus?

63

vi fronte
ad at

in facies succi pomorum depurati vi-
oli & iam acetositate adepti, porcis
orandas exhiberet familia mea, temu-
rati facti & ebrii, titubabant & cadebant,
donec discusso vapore, ad se redirent.

94. *Quaenam purgantium facultas*

& unde?

Purgatio hodierna die multis litium in-
uoluitur labyrinthis, de qua paucis acturi
sumus. Intelligimus autem per purgatio-
nem, actionem illam, in qua cathartici vi,
humores qualitate peccantes, per secessum
euacuantur. Consideratur hæc quatenus fit
è regione secundâ, solum in primam, & è re-
gione secunda simul & tertia, in intestina,
vel è prima regione extra corpus, loquor
cum Fernelio. Huius purgationis causam
efficientem tanquam maximè controuer-
sam imprimis propono.

Purgationem eam, quæ è prima regione
extra corpus fit, fieri à Naturæ ministrâ fa-
cultate expultrice irritatâ, non solum deie-
ctiones naturaliter fientes, sed etiâ arte quæ
mouentur, siue per suppositoria, siue clysmata,
siue per os assumpta cathartica, satis eui-
denter demonstrant. Quis enim in deiectioni-
bus aluinis, arte promotis (nihil dicam
nunc de naturaliter fientibus) non sentit in
abdominis cavitate, dolores lancinantes,
tormina, item expultricis ad expulsionem
insurgens motus magnos, & similes iis,
qui dysenteria, aut tenesmo affectis, comites
esse solent.

Huc referas & motus excretionum alia-
rum, quas artifex per remedia manifestè na-
turam sollicitantia & irritantia, molitur, vt
est expurgatio pituitæ, è cerebro per errhina,
per apophlegmatismos, sic etiam sæpè vide-
mus, oculos expellere materiam serosam; si
aër frigidior, qui oculis & cerebro inimicus,
aut vapor acris eos contingat; hinc nasi tu-
nica interior ab aliquo vellicante aut pun-
gente afflicta, concutiente se cerebro (in ster-
nutatione) non tantum aëream, sed sæpius
aqueam, imò lentam viscosamque substan-
tiam ejicit. Idem comprobatur ventriculus,
dum membranâ œsophagi (quæ continua

est cum interiore ventriculi tunica) digitis
vel pennâ irritatâ, contenta sibi molesta per
vomitum rejicit, sic in partus difficultate, Na-
tura adiuta irritante aliquo, insurgit, ita, vt
vterus sæctum expellat. In his omnibus cum
videamus, Naturam non nisi sollicitatam &
irritatam expellere, quid obstabit, quò mi-
nus vt verum asserere possimus, Purgatione
è primâ regione vel intestinis extra corpus à
facultate expultrice irritata fieri?

An verò eodem modo, id est irritatâ Na-
turâ, educendi humores per catharticum è
secundâ & tertiâ regione, ad intestina perue-
niant, dubitatur. Hunc nodum vt solvam,
nonnulla fundamenti loco sunt præponen-
da: axioma nimirum hoc, Nihil omnino in
rerum natura motu locali moveri, quod non
moueatur à principio naturali vel violento.
At in purgatione humores motu naturali
moveri localiter, nemo credit. Nullus enim
humor ad intestina peruenit, nisi forsan è ve-
nis meseraicis, aut etiam è capite, sed hoc
mihi non contrariatur.

Sequitur ergo humores è secunda aut ter-
tia regione peruenire ad intestina, principio
violento: & quidem vel tractione vel pro-
pulsionione. Tractionis causa latet in termino,
ad quem motus humorum fieri debet; ex-
pulsionione è contra in termino à quo. Huius
est facultas partium, quæ mole humorum
præter naturam liberandæ sunt, expultrix;
illius verò attractrix, quæ inest vel ipsis inte-
stinis vel cathartico. Ipsi intestinis talis vis
attractrix non inest, quia intestinis cum hu-
more sibi infenso nulla sympathia; quem-
admodum nec ipsi cathartico.

Medicamentum enim si attraheret, attra-
heret vel vt vegetans, vel vt minerale: non
trahit vt magnes ferrum trahit (succinum
manifestâ qualitate paleas trahere & retine-
re videtur) tantam enim copiam humorum
nunquam alliceret, vt hypercatharsis seque-
retur, nec etiam è distantioribus sedibus ad
se traheret. Non trahit, vt vegetans; purgâs
enim intra corpus sumptum, rarissimè for-
mâ vegetantis habet. Exemplo sit Rheum-
barb. quod in pulvere, infusione, aut decocto
datum, non amplius est Rheumbarb. (id est
simplex animâ vegetatiuâ instructum) nisi

analogicè, nec vim eam habet, vt possit succum attrahere & attractum sibi assimilare; iam enim priuatum est facultate hac, quæ dependet à certo mixtionis modo. Insuper, si maximè concederemus, Rheumb. trahendo agere, obstaret tamen hoc, quod non posset trahere, nisi è sedibus propinquis; at ex habitu corporis expurgat, Ergo. Præterea Rheumb. (subsistamus in eodem exemplo) non nisi vnum traheret humorem, nimirum bilem, at in maiore quantitate & sæpius datum, non solum biliosum sed & ferofum, pituitosum, imò tandem (in hypercatharsibus) & sanguineum succum euacuat, quemadmodum & Hippocrates de Natura humana exemplo phlegmagogi docet.

Dicat aliquis, videmus humores à Rheobarb. ductas, flauitie tinctos, ergo sunt biliosi; sed cogitet hæc obijciens, ferofum pituitosumque succum à Rheob. hoc tingi colore, etsi aliàs alterius sint coloris, quemadmodum etiam menstruum Rheubarb. flauo colore tingi, *autopsia* docet.

Cum igitur excrementa educenda in purgatione non moueantur sponte, non tractione, sequitur illa moueri expulsiōe partis, in qua hærent, cuius partis facultas expultrix irritata & stimulata à cathartico, expellit, quod sibi molestum (qualitate inprimis) sentit. Cathartici enim vsu, pars quæ prius sopita, excitatur, & ad noxiæ materiæ expulsiōem irritatur. Hanc assertionem probamus à posteriore: Hypercatharsin enim nullo modo sistimus, nisi sensum partiū irritatarum exquisitiorem, vel leniamus anodynīs, vel stupefaciamus narcoticis, quæ omnia sensum exquisitiorem tollunt.

Sed contra positam assertionē, tres video obiectiones, quæ punctū mereri videntur. Primò, si dicto modo fiat Purgatio, cur Natura non citra vsu cathartici se exonerat, cum in partibus hæreant excrementa qualitate quantitatēve molesta? Secundò, Cur tot cathartidorum ponuntur differentiæ, vt pro-bilioso humore educende, chologoga, Diagryd. Rheumb. pituitoso, Chartam. Agaric. melancholico Lap. laz. Senna; Seroso, Ebulus, sambuc. Iris, &c. si enim eo modo, quo dictum fuit, purgatio fieret, quoduis ca-

tharticum, quemuis humore indiuiduo educeret. Tertiò, ita Zingiber, Arum, & huiusmodi calidiora & naturam nostram aliquouſq; irritant, non purgant?

Ad primam obiectionem respondens. Rei huius causam attribuendam partim mouenti, partim mobili, Mobile enim vel humor præter naturam, nec quantitate tantus, nec qualitate talis, vt adhuc irritare possit. Mouens vel expultrix non expellit, ob sensum obtusorem: inprimis, cum eiusmodi humor, præter naturam sensim coaceruetur, & sensim fiat, sensum latet, si verò iam cum humoribus peccatibus concurrat qualitas cathartici, citò & potèter agentis, non mirum naturam à duplici obiecto irritatam, ad noxiæ expulsiōem insurgere.

Secundæ obiectioni satisfiet; si considerauerimus gradus qualitatum, tam primarum, quam quaratarum (vt vocant) in purgantibus. Cum namque inter omne agens & patiens, proportio quædam requiratur, quis bili-educendæ, vt humori calidis, acri adaptabit helleborū cathartico. calidiss. & acerrimum, & non potius Rheumb. cathart. nec tam calidum nec tam acre, nec nauseosum vt helleborus, quem sanè helleborum legitime vsurpatum, bilis nō respueret, contra indicat tamen eius vsu in bile educendâ, vitale indicans, propter æstuationes, & inflammationes corporis & hypercatharses (exquisitiore enim sensu, prædita corpora calida, quam frigida) quæ hinc sequeretur, in corpore calido, & hæc potissima causa delectus in catharticiis censenda.

Tertiæ obiectioni occurritur sic: sciendū catharticiis omnibus vim quandam inesse (præter acrimoniam & caliditatem) nauseosam & Naturæ nostræ insensam, quæ excitet Naturā ad expulsiōem, primariò ipsius cathartici, secundariò verò humoris peccantis, & hanc qualitatem nauseosam, si à medicamentis omninò dempserimus, nihil omninò, si ex parte, imbecillius purgabunt (quod sæpe per præparationes chymicas in his & aliis medicamentis fit) & hinc piper, &c. nō purgant, quia vim Naturæ inimicam illam, in sua mixtionē non sunt sortita; quamuis

63

vii frene

doit

nonnullis temperamentis, paulo impta, diarrhoeas excitent. Mudantes hanc de purgatione materiae, dicimus purgationem non tantum esse in corpore nostri regione extra corpus, sed etiam esse secundam tertiam in primam ab expellente Natura, vi cathartici stimulata (hinc saepe purgantia propinata in mulierculis menses, in viris haemorrhoides in vtrisque etiam venerem per accidens mouent) fieri.

95. *An una facultas expultrix irritata, alias quoque excitet?*

Mirum quodd facultatum, tantus sit consensus, ut non solum irritatis naribus, sequatur sternutatio, verum etiam si oris ventriculi morsus ex humore prauo, a medicamento, aliaue causa subito oriatur, & quaedam cardialgia, sternutatio illud nitatur expellere, ut singultus hoc alias facere solet. Quod frequenter in me ipso experior.

96. *De impostura Empirici cuiusdam qui ab omnibus vermiculos se expurgare posse gloriabatur.*

Impostor quidam ad quem plurimi aegri, tanquam ad extremum refugium se conferebant, plerisque affectum a vermibus prodire praedicebat, datoque pharmaco, vermiculos putatos rubros exiguos, quales caseorum putrescentium sunt, expurgabat: nec dubito, quin eos clam medicamentis quae exhibebat, indiderit, sicuti quidam obseruauit, & mihi aperuit, nimirum scindendo chordas rubras exiguas, quales testudinibus adaptari solent, quae calorem sentientes, se torquere & incuruare solebant.

Idem impostor celebris hospitii usus operam, apud quem vel aegri ipsi, vel qui ab illis mittebantur, diuerrebant, clam per ipsum expiscabatur aegrorum accidentia, quae ex eo cognita, postmodum omnia, ac si in vrina vidisset, magna admiratione narrabat.

97. *De alia impostura Empirici simulantis se hydragrym esse corpore elicere.*

Iuuenis quidam vir, quem ex lue venerea ulcera maligna atque ossium corruptionem passum fuisse in observationibus no-

stris exposuimus, ab Empirico persuasus, hanc corruptionem ab hydragryo prouenisse, & nisi illud e corpore educeret, curari minimè posse, accepta pecunia, se illud praestitutum pollicitus, occultè mutatis saepe emplastris in vno, sicuti postea obseruatum fuit, argentum viuum, clam antequam apponeret, indidit, eoque postmodum detracto, argentum viuum ostendit, seque illud e corpore extraxisse, gloriabatur, quam illius nequitiam, famula postea, & mercator, a quo argentum viuum emerat, detexerunt.

98. *An ne rupture illa communiter facta cum dolore in inguine, & tumore in scroto, citra castrationem curari queant?*

Ardua est quaestio, & cognitu necessaria: si enim hoc fieri posset, ut multi pollicentur, magno illud fieret humani generis commodo, nobisque a sectione quae in inguine fit, temperaremus, & discrimen, quod multi incurrunt, euitaremus. Hoc cum nonnulli obseruarent herniosi; potius incommodum onus ad dies vitae perferre maluerunt, quam tanta subire pericula. Quidam tamè urgente nimio dolore, lithotomis sese concredidere, nihil amplius, vel exiguum, de sanitate, de vita, sperantes: Ligaturis & fasciis alij hernias retinent, & sanant nonnunquam, adhibitis insuper emplastris stipticis, & ut aiunt, consolidantibus. Noua ratio per puncturam, citra ablationem testis, sed non sine graui cruciatu, nuper inuenta est, & in qua error, ut facilis, sic grauis committitur frequentius. Nam si vasa feminarum discreta ab inuolucro, per quod delapsus intestini in scrotum fit, separatim vincire possent, saluo remanente teste, succederet, quod an hactenus tentatum sit, conatuique responderit successus, non satis constat.

99. *An in Hydrope ascite, paracentesis, sectio nimirum pro Aqua emissionem sit facienda?*


Rem sanè arduam & summè necessariam hactenus ferè neglectam, accuratius examinare debemus. Siquidem potior hydropis ascitis, mali apud nos frequentis cura, in aper-

apertione ventris consistit, quam tamen plurimi reformidant, malentes aquam copiosam in ventre tanquam vtre, diu circumferre, & tandem ob eius virulentiam viscera corrumpentē, succumbere, quā leuiusculum vlcus in parte ignobili, citra periculum administrandum, perferre, & sic aquam magno emolumento emittere.

100. *Qua ratione impostura lithotomi cuiusdam in lapidis extractione detecta fuerit?*

Lithotomus quidam, cum in virgine nobili (cuius affectum in observationibus exposui) meatum vrinarium dilatasset, & forcipem intromisisset, ut calculum quem adesse putabat, & cuius nomine hæc agebat, extraheret, diu multumque eam vertendo quærendoque, cum nihil inueniret, dum forcipes diuersi generis, sub panno occultatas mutat, tandem vnam clausam, clam manibus, illius cochlearia duo anteriora, quibus

calculum apprehendere solent, prehensens, in vesicam intrudit, ne vti aliàs fieri deberet, ad apprehendendum calculum aperit, sed hinc inde, occlusam men quoque torquens, ac si illum perqueret, mox se inuenisse clamans, exiguum modum extrahit: quem ego prius in forcipis cochlearibus occultatum & agglutinatum fuisse, omnino mihi persuadeo, tum ex prædicta obseruatione, tum quia nullum leuamen postea sensit. Quam meam suspensionem postea confirmauit Amerbachius, narrans mihi, se ex parente audiuisse, similem dolum in alio quodam lithotomo fuisse deprehensum, qui cum sectionem institueret, calculum in manibus occultatum gerebat, vt si fortè non inueniret eum, quem in vesica esse prædixerat, hunc tanquam extractum supponeret. Quod me postea magis attentum, ne quid tale committeretur, reddidit, &c.



I N D E X

Q V Æ S T I O N V M C E N T V M.

P H Y S I O L O G I C Æ.

- | | |
|--|---|
| <p>1. AN Vena, Arteria, Nerui à cerebro originem trahant? Pag. 1.</p> <p>2. Anne venarum origo à corde vel iecore dependeat? 10.</p> <p>3. Vasa vmbilicalia continua ne an contigua? 17.</p> <p>4. Cor sit ne viscus præstantissimum, primum viuens & vltimum moriens? Ibidem.</p> <p>5. Cur facies frigus melius quàm reliqua membra ferat? 22.</p> <p>6. Quanam sit barba in viris vtilitas? Ibid.</p> <p>7. Digiti an sint pellucidi? 24.</p> <p>8. Cur corpora humana post mortem non sepulta, mox stauescant, tandem rubeant & sanguinem profundant? Ibid.</p> <p>9. Cur corpora humana terra mandata minime putrescant? 25.</p> <p>10. Mirum in hominibus tot formarum præsertim varietates. 26.</p> <p>11. Mirum hominem tam angustis pedum plantis erectum seruari, nec cadere. Ibid.</p> | <p>12. Inconsueta miraculosa, consueta licet turpia, pulchra videri & è contra. 27.</p> <p>13. Cerebrum rectè indicatur frigidum? 28.</p> <p>14. Quare naturâ alij lati, alij iracundi, alij melancholici, alij pusillanimes existant? 29.</p> <p>15. An sanguis quo nutrimur simplex, aut ex alijs diuersis humoribus sit compositus? 32.</p> <p>16. An rectè sanguis lacti comparatus constare quatuor partibus dicatur, substantiâ sanguineâ seu lacteâ, caseosâ, butyrosâ & serosâ? 33.</p> <p>17. Cur fel, humores, excrementa & quæcunque tenacia sunt & glutinosa, fluida reddat? 34.</p> <p>18. An humor quo substantia corporis, quæ continuè absumitur, reparatur, similis huic, è quo generatur, existat? 35.</p> <p>19. An calor innatus elementaris sit vel cœlestis? Ibid.</p> <p>20. An tres sint spiritus, vitalis, animalis, naturalis? 36.</p> <p>21. An partes principes sensu prædite sint? 38.</p> |
|--|---|

ut fre-
at
h
ran-

- um motu manifesto moueatur, aut
respiratione admittat? 39.
- Somnus quomodo fiat? 41.
- An somni vigiliarumve tempore concoctio ci-
procedat? 42.
- An humor chrySTALLINUS Visionis, tympanum Au-
ditus, lingua Gustus, nares Olfactus, cutis Tactus
sensus primaria sint instrumenta? Ibid.
26. An miraculum censendum sit, quod sonus innu-
meras aures impleat, species tam innumeras o-
culus excipiat, & phantasmata mens concipere
possit? 45.
27. Mirum merito haberi, ex tam paucis litteris,
tam multa verba constitui, ex sonis paucis tot
concentus, ex coloribus tot diuersitates. Ibid.
28. An sensu tactus exquisito, homo omnia anima-
lia superet, cum illa non adeo uti homines volu-
ptate aut dolore afficiantur? Ibid.
29. An pulmones in respiratione motu naturali,
propriis viribus, vel suga vacui ad thoracis mo-
tum moueantur? 46.
30. Virum respirationis & excretionum alui, vrinae
& foetus motus sint mixti, partim à natura, par-
tim à voluntate nostra, à diuersis organis profe-
cti? 50.
- Appendix, quae prioris questionis fusior tractatio, &
an in respiratione, cum motus sit mixtus, plus
valeat natura quam voluntas?
31. An homines simul summe esurire & sitire pos-
sint? 55.
32. An tolerabilior fames sit? 56.
33. An aliquis sit lienis vsus excellentior eo, quem
illi communiter assignant, ut melancholicum
humorem recipiat & expurget? 59.
34. An maius sit miraculum hominem qui nun-
quam extitit nasci, quam qui fuit, per resurre-
ctionem renasci? 64.
35. An semen animalium acre sit & calidum? Ibid.
36. An ex semine solo humani corporis partes, vel
etiam ex sanguine generentur? 65.
37. Quare menstruas purgationes mulier tantum
ferè ex animalium genere habeat? Ibid.
38. Quare mulier definitum tempus quousque ad
concupiscendum & procreandum apta est, vir verò
nullum habeat? 67.

PATHOLOGICÆ.

39. An aer vel cibus & potus in gignendis morbis
potiores vires habeant? 69.

40. An ingluuie, ebrietate, luxuria quàm fame
bello & peste maior strages in humano genere
edatur? 72.
41. Num in venis meseraicis magna illuuias excre-
mentorum coaceruari possit? 74.
42. An aer sit causa veneni pestilentis? 75.
43. Virum febris pestilentialis interna causa in
humorum corruptione consistat nec ne? Ibid.
44. An venenata qualitas febrem pestilentialem
accendens in corpore humano gigni possit? 81.
45. An venena eiusmodi, qualia ab externis corpore
subeunt illudq; insciunt, in corpore etiam gene-
rari queant? 82.
46. An mentis functiones ventriculorum cerebri,
an substantia causa afficiantur? Ibid.
47. Quenam epileptici, an motuum causa? 83.
48. Quae paralytis causa? Ibid.
49. Vnde dolor capitis, post narcoticorum vsu o-
riatur? 85.
50. Dentes an sentiant & doleant? Ibid.
51. An dentium dolor, lesio aut corrosio, à defluxio-
ne in dentem proficiantur? 86.
52. An pulsus aurium ab arteriis? 87.
53. Quenam foetoris oris causa? Ibid.
54. An cartilagine & ossa febrium calore quoque
alterentur? 88.
55. An aqua immersi suffocentur? 89.
56. Phthisis num à vena rupta? Ibid.
57. Excretio tussi facta, an semper à capitis de-
fluente humore fiat? 90.
58. An pleuritis citra pulmonum inflammationem
fieri possit? Ibid.
59. In pleuritide vera, pleurae sola an simul etiam
pulmo afficiatur? 91.
60. An pus citra exulcerationem aut carnis con-
sumptionem interdum generari possit? Ibid.
61. Virum excretio per screatum à salina etiam
procedat? 92.
62. An ventriculi vulgò putati doloris causa sem-
per lateat in ventriculo? Ibid.
63. Cur mictio frequens & acris, nonnunquam &
eruenta, à cantharidum esu & applicatione? 93.
64. Quae ardoris vrinae causa & cura? 94.
65. Quenam alui fluide, & excretionis illius caus-
sa? Ibid.
66. Humor melancholicus adustus, sit ne causa ele-
phantiasis? 95.
67. Conualescentium marcor debilitas, appetitus
& constipatio vnde? 96.

SIMEIOTICÆ.

68. Anne pulsus & vrina, eam quam vulgus illis tribuit, in morbis cognoscendis certitudinem habeant? 97.
69. Vtrum ex vrina conceptus vri vulgò creditur, possit ad iudicari? 106.
70. An circulus in vrinis seu corona, vmbra tantum sit? Ibid.
71. Copiosa & frequens mictio à fructuum esu? 107.
72. An eclipses ea portendant, quæ illis assignant Astrologi? Ibid.

HYGIEINÆ.

73. Anne homini ad sanitatem conseruandam, necesse sit aliquando vri Vena sectione, Purgatione, Balneo, Scarificatione, Vomitu? 107.
74. An Temperantia, Exercitium, Alacritas, aliquid conserant ad producendam vitam? 113.
75. An subitanea refrigeratio corporis, dum calet, periculosa? 117.
76. An aqua solum humectet, vel etiam simul, veluti vinum nuriat? deq. viribus vini. Ibid.
77. An in potu ordinario vinum. Si aut ceruisia sit preferendum? 120.
78. Cur ciborum conditura nimia medicamentosorum factorum vsus noceat? 128.
79. Brassica capitata & caro porcina, num ad edendum cibi sint noxi, vt vulgus hominum putant? 131.
80. An oua piscium vri & gallinarum, alui fluxum in quibusdam efficiant? 132.
81. Quenam ouorum piscium assumptorum vis? Ibid.
82. Oua gallinarum quomodo corrumpantur? 133.
83. Lactis spuma dum seruet, cur non vrat? Ibid.

84. Cur veneris stimulus à pipere, latius supino?

THERAPEVTICÆ.

85. An signa cælestia sollicitè in curatione, rum obseruanda? 135.
86. Quibus instrumentis instructus esse debeat Medicus? 140.
87. Quem vsus aquarum naturæ acidarum potus corpori humano præstet? 147.
88. Quenam sit illa vis in vino, quæ sensus primum acuit, mox perturbat, & tandem consopit? 150.
89. Vinum cuiusq. facies an narcotica? 151.
90. An metalla omnia natura nostra sint aduersa? 151.
91. Anne aurum, lapidesq. preciosi, sub quibus & gemme & vñones comprehenduntur, vires nostras assumpta ad motum reficere possint? 152.
92. Quenam narcoticorum vires? 161.
93. Pomorum succus an narcoticus? 163.
94. Quanam purgantium facultas & vnde? Ibid.
95. An vna facultas expultrix irritata, alias quoq. excitet? 167.
96. De impostura empirici cuiusdam, qui ab omnibus miculis se expurgare posse gloriabatur. Ibid.
97. De alia impostura drargyrum è corpore elicere. 168.
98. Anne ruptura illa communiter facta cum dolore in inguine, & tumore in scroto, citra castrationem curari queant? 169.
99. An in hydropse ascite, paracentesis, sectio nimirum pro aquæ emissionem sit facienda? Ibid.
100. Quæ ratione impostura lithotomi cuiusdam in lapidis extractione desecta fueris? 169.

F I N I S.

